

三因極一方


二三四

大醫^{卷二} 五科九例 紀用備論
 藏府配天地論 三因論 外所因論
 中風 中寒 中暑 中濕
 四氣^{卷三} 痺^{卷三} 歷節 脚氣
 傷風^{卷四} 傷寒 傷寒辨証
 傷寒傳變次序 六經傷寒用藥
 三陽合病 兩感 陰毒 陽毒
 結胸 胸痞 勞復 陰陽易

庫	文	開	內
三〇〇	一	二	漢
函	五	三	書
一	九	三	門
九	八	九	類
架	冊	號	類



漢	書	門
一	二	三
五	三	九
一	九	三
四	九	九
冊	架	函
號	類	

內	閣	文	庫
番	號	漢	12539
冊	數		8 (2)
函	號		300 208



糊等で貼り付けられている部分がめくれない箇所あり

三因經一病證方論卷之二



國家以文武醫入官蓋為養民設未有不自季古而得之者
季古之道雖別而同為儒必讀五經三史諸子百家方稱季
者醫者之經素問靈樞是也史書即諸家本草是也諸子難
經甲乙太素中藏是也百家鬼遺黃樹金鍼刺要鈞人明堂
幼新書產科保慶等是也儒者不讀五經何以明道德性
余仁義禮樂醫不讀靈素何以知陰陽運變德化政令儒不
讀諸史何以知人材賢否得失興亡醫不讀本草何以知名
德性味養生延年儒不讀諸子何以知崇正衛教季識醇疵
醫不讀難素何以知神聖工巧妙理奧義儒不讀百家何以
知律曆制度休咎吉凶醫不讀雜科何以知脉穴骨空奇病
異證然雖如是猶未為博况經史之外又有文海類集如漢

之班馬唐之韓柳及

宋文物最盛難以繁奉醫文漢

亦有張仲景華佗唐則有孫思邈王采等動輒千百卷其如
宋有太平聖惠東閣集效神方方十見案文名醫別錄豈
特汗牛充棟而已哉使學者一覽無遺博則博矣倘未能及
約則何以適從予今所述乃收拾諸經筋髓其亦反約之道
也讀醫方者當推上聖養民設教為意廉不負於先賢也

五科凡例

凡季醫必識五科七事五科者脈病證治及其所因七事者
所因復分為三故因脈以識病因病以識證證十以施治則
能事畢矣故經曰有是脈而元是診者非也究明三因內外
不濫參同脈識盡善尺美

凡季脈須先識七表八裏九道名體證狀了然分別然後以
閱前一分應動相類分別內外及不內外又須知二十四脈
以四脈為宗所謂浮沈遲數分風寒暑濕虛實冷熱交結諸
脈隨部說證不亦約乎

凡審病先須識名所謂中傷寒暑風濕瘟疫時氣皆外所因
藏府靈寶五勞六極皆內所因其如金瘡跌折虎狼毒虫涉
不內外更有三因備其各有其名所謂名不正則言不順言
不順則事不成季不可不備

凡季審證須知外病自經絡入隨六經所出并營輸源經合
各有穴道起沒流傳不可不別內病自五藏鬱發證候各有
部分溢出諸脈各有去處所謂上竟上頭項胃喉中事也下
竟下腹肚腰足中事也

凡用藥須熟讀本草廣看方書雷公炮炙隨方過製汗下補
吐輕重滋滑燥潤等性量病淺深飲服多寡五德五味七情
八及升合分兩朝代不同一一備季將欲對治須識前後故

之班馬唐之韓柳及

宋文物最盛難以繁奉醫文漢

亦有張仲景華佗唐則有孫思邈王采等動輒千百卷其如宋有太平聖惠宋開集效神方方見案文名醫別錄豈特汗牛充棟而已哉使學者一覽無遺博則博矣倘未能及約則何以適從予今所述乃收拾諸經筋髓其亦及約之道也讀醫方者當推上聖養民設教為意庶不負於先賢也

五科凡例

凡季醫必識五科七事五科者脈病證治及其所因七事者所因復分為三故因脈以識辨識隨證以施治則能事畢矣故經曰有是脈而元是診者非也究明三因內外不濫參同脈識盡善尺美

凡季脈須先識七表八裏九道名體證狀了然分別然後以閱前一分應動相類分別內外及不內外又須知二十四脈以四脈為宗所謂浮沈遲數分風寒暑濕虛實冷熱交結諸脈隨部說證不亦約乎

凡審病先須識名所謂中傷寒暑風濕瘟疫時氣皆外所因藏府靈竇五勞六極皆內所因其如金瘡跌折虎狼毒虫涉不內外更有三因備其各有其名所謂名不正則言不順言不順則事不成季不可不備凡季審證須知外病自經絡入隨六經所出并營輸源經合各有穴道起沒流傳不可不別內病自五藏鬱發證候各有一部分溢出諸脈各有去處所謂上竟上頭項胃喉中事也下竟下腹肚腰足中事也

凡用藥須熟讀本草廣看方書雷公炮炙隨方過製汗下補吐輕重滋滑燥潤等性量病淺深飲服多寡五德五味七情八及升合分兩朝代不同一一備季將欲對治須識前後故

經曰先去新病二當在後

凡治病先須識因不知其因病源无目其因有三曰内曰外曰不内外外則七情内則六淫不内不外乃背經常金匱之言實為要道巢氏病源具列一千八百餘件蓋為示病名也以此三條病源都尽不亦及約乎

凡季醫既明五科每科須識其要脉有浮沈遲數病有風勞氣冷證有虛實寒熱治有汗下補吐若於三因推明外曰寒熱風濕内曰喜怒憂思不内外曰勞逸作強各有證候詳而推之若網在綱有條不紊

凡看古方類例最是朝代沿革升合分兩差殊若數味皆用分兩不足較也第中間有用升合枚數大段不同升斗秤尺本自積黍二自不可見度量衡卒亦難明今以錢譜推測想知梗槩

凡度者分寸尺丈引本以一黍之廣為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引觀今之尺數等不同如周尺長八尺京尺長一尺六寸淮尺長一尺二寸樂尺長一尺二寸五分並以小尺為率小尺既自三微起却自可準唐武德年鑄開元錢八分當十二錢半得一尺排錢比之十一个已及一尺又不知唐用何尺顧漢唐命量並用尺寸分布尺寸如是不齊將何憑據博古君子必有說矣

凡量者龠合升斗斛本以黃鍾龠容十二銖合龠為合重二十四銖今以錢準則六銖錢四个比開元錢三个重升斗斛皆壘而成教漢唐同用至宋紹興升容千二百銖則古文六銖錢二百个開元二百二十个以紹興一升得漢五升其餘私用不足計也

凡衡者銖兩斤鈞石亦以黃鍾龠所容重十二銖兩之為兩

二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石每兩則
古文六銖錢四十個開元錢三十個至 宋唐稱以開元錢十個
為兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩為
今一兩以古三升為今一升諸藥類例尤為難辨且如半夏
一升準五兩不知用何升何兩此修合制度之要務不可不
知漢銅錢質如周錢文曰半兩重如其文孝文五年錢益多
而輕乃更鑄四銖其文為半兩雜以鉛鐵錫非穀雜為巧則
不得贏而姦或盜磨錢質取鎔有司言錢輕重請郡國鑄五
銖錢周郭有質令不得磨取鎔則知漢以二半兩錢為兩重
十銖明矣漢唐例以二十四銖為一兩抑未知修史人改作
唐例亦不可知觀錢譜漢无六銖錢至唐方有今以五銖錢
十六個正得開元錢十個重又以六銖錢十二個正得開元
錢九個重則知開元錢每個以重八銖唐武德四年鑄開元

通室徑八分重二銖四索積十錢為兩似難攷據明食貨者
必有說焉

按藥書漢方湯液大齊三十餘兩小齊十有餘兩用水六升
或七升多煎取二升三升並分三服若以古龠量水七升煎
今之三十兩未淹得過况散末藥只服方寸刀圭 圓子如
梧桐子大極至三十粒湯液豈得如此懸絕又如風引湯一
劑計五十五兩每兩只用三指撮水三升煮三沸去滓溫服
一升看其費製每只三指撮末應料齊如此之多此又可疑
也今以臆說漢方常用半兩錢二枚為一兩且以木附湯方
較若用漢兩計一百八十銖得開元錢二十二個半重若分
三服已是今之七錢半重一服若以唐方準計三百三十六
銖得開元錢四十二個重每服今之十四錢重大略可知計
若以開元錢準得一百單五個重分三服每服計三十五錢

重此猶是小齊况有大齊名件兩數之多者未易槩率留心
此道幸少詳焉

凡古書所詮不出脉病證治四科而撰述家有不知此多致
顯晦義重復要當以四字類明之四字者即名体性用也如
脉浮則為名率有餘按不足為体為風為虛曰性可補可汗
曰用如病大陽傷風為名感已畜二為体惡風自汗為性傳
變經絡為用如證大陽風證為名頭項疼腰脚痛為体不与
諸經溢為性候其進退為用如治藥桂則為名出處形色為
体德味備缺為性汗下補吐為用以比推之讀脉經看病源
推方證節本草皆用此法无餘蘊矣

紀用備論

夫陰陽運五氣行乎天地之間則神明為之紀故有德化政
令變書之異物類稟五行孕於八方之內則生靈賴其資故

有功能氣味性用之殊苟氣運之失常非藥石則不療所謂
功奪造化恩備財成者无逾於藥石也故敦和彰顯滄蒸清
潔溥洽者五氣之德也變視育神益氣定魄守志者百藥之
功也生榮蕃茂豐備緊欽清證者五氣之化也通潤悅懌輕
身潤澤益精者百藥之能也舒啓明曜安靜勁功疑肅者五
氣之政也開明利脉濟鬱堅肌強骨者百藥之氣也風熱濕
燥寒者五氣之令也酸苦甘辛鹹者百藥之味也顧茲氣運
与万物虽種二不齊其如成象效法无相奪倫一一至對若
合符契至於勝復盛衰不能相多往來升降不能相无故各
從其動而與矣變亦不相加也於是振發銷鑠驟注肅殺
凜冽者五氣之變也在藥則有收欽乾焦甜緩欽澁滋滑者
百藥之性也散落燔熅霜潰蒼隕冰雪者五氣之書也在藥
則有飭衄溢汗嘔吐涎涌泄利者百藥之用也德化者氣之

祥功能者藥之良政令者氣之章氣味者藥之芳古之治法
遇歲主藏害雖平治之不同必以所勝而命之故經曰上淫
于下所勝平之平天氣也下淫于內所勝治之治地氣也故
司天之氣風淫所勝平以辛涼諸氣在泉風淫于內治以辛
涼此之謂也至於折抑主客鬱發勝復治之亦莫越于功能
氣味蓋從其德化政令之所為也今則不然推取其性用之
所利而治其災變之所傷寒者熱之熱者寒之溫者清之清
者溫之散者收之收者散之滑者澀之法者滑之燥者潤之
急者緩之堅者柔之脆者柔之衰者補之強者瀉之故略去
功能氣味隨其性用以備治法之總目合和修製之大綱備
禦災變之要略爾衛生明哲之士當不拘於此也夫五味各
隨其所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先
入腎久而增氣則藏氣偏勝偏勝則有偏害偏害則致偏絕

天之由也是以政理觀化藥集商量服餌云藥不具五味五
氣而又服之雖且獲勝又必暴夭此之謂也近世庸俗為治
使人單服附子為害滋多可不謹乎

藏府配天地論

韓子曰形而上者謂之天形而下者謂之地介於其兩間者
謂之人人受天地之中以生莫不稟二氣以成形是以六氣
緯空五行肅地人則默而象之故足厥陰肝居於巳午厥陰
右腎居於亥巳亥為天地之門戶故風水化耳足少陰腎居
於子午少陰心居於午子午得天地之正中故君火位耳足
太陰脾居於未手太陰肺居於丑丑未為歸藏之標本故濕
土守耳足少陽膽居於寅手少陽三焦居於申寅申握生化
之始終故相火肅耳足陽明胃居於酉手陽明大腸居於卯
卯酉為日月之道路故燥金行耳足太陽膀胱居於辰手太

陽小腸居於戊辰戌為七政之魁罡故寒水注焉此三才應
奉二氣相須不刊之說如指諸掌至於五行六氣第相資生
亦莫不有自然之序如厥陽風木生少陰君火君火生太陰
濕土濕土下少陽相火相火生陽明燥金燥金生太陽寒水生
順天道而右旋所謂運行也或問君火生土土復能生相火
火復生金其義何在此生成之道也相火既已發焰暈二灰
滅非土不成未見虛空能聚火金在鑛非火不能煅出所以
河圖火七居西室金九居南室蓋互顯其成能也若以一性
而推之无所不備故木焚則為火絞則為水石擊則為火鎔
則為水洲澶之內江河競注大海之中火光常起此皆往之
本有也又何疑土中火火中金走木火土金水此乃常度人
皆知之至於風暑濕燥寒謂之揆度鮮有能明其狀者故以
木比風以火比暑以土比濕以金比燥以水比寒仍以上下

二氣而配手足三陰三陽則謂之奇度又况五行各各不同
有正氣有太過有不及天地氣化既然人之藏府亦然感而
為病或外邪或本氣或稟賦必當推類隨三度而調之非究
心明道之士孰能與此

三因論

夫人稟天地陰陽而生者蓋天有六氣人以三陰三陽而上
奉之地有五行人以五藏五府而下應之於是資生皮肉筋
骨精髓血脉四肢九竅毛髮齒牙唇舌總而成体外則氣血
循環流注經絡喜傷六淫內則精神魂魄志意思喜傷七情
六淫者寒暑燥濕風熱是七情者喜怒憂思悲恐驚若將護
得宜怡然安泰後冒非理百病生焉病發既成須尋所自故
前哲示教謂之病源經不云乎治之極于二者因得之閉戶
塞牖繫之病者教問其經以從其意是欲知致病之本也然

六淫天之常氣冒之則先自經絡流入內合於腑臟為外所
因七情人之常性動之則先自藏府鬱發外形於肢體為內
所因其如飲食飢飽叫呼傷氣盡神度量疲極筋力陰陽違
逆乃至虎狼毒虫金瘡跌折痲忤附着畏壓溺等有背常理
為不內外因金匱有言千般疢難不越三條以此詳之病源
都盡如欲救療就中尋其類例別其三因或內外兼并淫情
交錯推其深淺斷以所因為病源然後配合諸證隨因施治
藥石鍼艾无施不可

外所因論

夫六淫者寒暑燥濕風熱是也以暑熱一氣燥濕同源故
叔而為四即冬傷寒春濕病春傷風夏飧泄夏傷暑秋痲
瘧秋傷濕冬咳嗽此乃因四時而序者若其觸冒則四氣皆
能交結以病人且如溫病憎寒發熱不特拘傷寒也冒風暑

濕皆有是證但風散氣故有汗暑消氣故倦怠濕溢血故重
着雖折傷諸證不同經絡傳變咸尔不可不知飧泄亦然經
曰寒甚為腸辟又熱濕久客腸胃滑而下利亦不止於傷風
痲瘧諸證亦以寒暑風濕互絡而為病因初不偏勝於暑也
咳論以微寒為咳熱在上焦咳為肺痿而風所吹也嘶發咳
豈獨拘於濕也以是觀之則知四氣本乎六化六化本乎一
氣以運變而分陰陽反則為六淫故經曰陰為之主陽與之
正逆之則為病乃亂生化之常矣常則天地四塞矣治之必
求其本當隨交絡互織而推之所謂風寒濕溫六淫皆寒濕
溫五者為并風濕寒風濕溫二者為合乘前四單其十一變
倘有所傷當如是而推之又兼三陽經絡亦有并合能所間
辨甄別脈證毫釐不謬乃可論治非通明淫化邪正之精微
其孰能與於此

六淫天之常氣冒之則先自經絡流入內合於腑臟為外所
因七情人之常性動之則先自藏府鬱發外形於肢體為內
所因其如飲食飢飽叫呼傷氣盡神度量疲極筋力陰陽違
逆乃至虎狼毒虫金瘡跌折痲忤附着畏壓溺等有背常理
為不內外因金匱有言千般疢難不越三條以此詳之病源
都盡如欲救療就中尋其類例別其三因或內外兼并淫情
交錯推其深淺斷以所因為病源然後配合諸證隨因施治
藥石鍼艾无施不可

外所因論

夫六淫者寒暑燥濕風熱是也以暑熱一氣燥濕同源故
叔而為四即冬傷寒春濕病春傷風夏飧泄夏傷暑秋痲
瘧秋傷濕冬咳嗽此乃因四時而序者若其觸冒則四氣皆
能交結以病人且如溫病憎寒發熱不特拘傷寒也冒風暑

濕皆有是證但風散氣故有汗暑消氣故倦怠濕溢血故重
着雖折傷諸證不同經絡傳變咸尔不可不知飧泄亦然經
曰寒甚為腸辟又熱濕久客腸胃滑而下利亦不止於傷風
痲瘧諸證亦以寒暑風濕互絡而為病因初不偏勝於暑也
咳論以微寒為咳熱在上焦咳為肺痿而風所吹也嘶發咳
豈獨拘於濕也以是觀之則知四氣本乎六化六化本乎一
氣以運變而分陰陽反則為六淫故經曰陰為之主陽與之
正逆之則為病乃亂生化之常矣常則天地四塞矣治之必
求其本當隨交絡互織而推之所由也風濕風濕寒濕
濕五者為并風濕寒風濕溫二者為合乘前四單其十一變
倘有所傷當如是而推之又兼三陽經絡亦有并合能所問
辨甄別脈證毫釐不謬乃可論治非通明淫化邪正之精微
其孰能與於此

叙中風論

夫風為天地浩蕩之氣正順則能生長萬物偏邪則傷害品類人或中邪風鮮有不致斃者故入藏則難愈如其經絡空虛而中傷者為半身不遂手脚癱瘓涎潮昏塞口眼喎邪肌膏不仁痺痺牽僻隨其藏氣所為不同或左或右邪氣及緩正氣及急正氣引科啗僻不遂蓋風性緊暴善行數變其中人也卒其眩人也暈激人涎浮昏人神亂故推為百病長聖人先此以示教太醫編集所以首論中風也然四氣皆能中人在證亦有緩縱牽急搐搦痺痺奄忽不知人者不可不以脈別故論曰寒熱諸痺所有證候皆如風狀須得脈別可也要知脈浮則為風緊則為寒細則為濕數則為熱然證走注自汗則為風疼痛无汗則為寒緩弱熱頑則為暑停着腫滿則為濕隨其并合尤宜歷辨唯詳其所因合以脈診在絡在經入腑入臟依而謂之乃可為治

五臟中風證

肝中風者人迎并左關上脈浮而弦在天為風在地為木在人藏為肝肝虛喜中風為類相從故脈應在左關肝風之狀多汗惡風色微蒼頭目暈左關其如阻婦狀筋急牽痺不伸診在目其色青
心中風者人迎与左寸口脈洪而浮在天為熱在地為火在人臟為心心虛因中邪風乃子母相因故脈應在左寸口心風之狀多汗惡風色微赤翕發熱瘡不能言飲欲食食則嘔診在舌其色焦赤
脾中風者人迎与右關上脈浮而微遲在天為濕在地為土在人臟為脾人虛因中風邪為勝尅故脈應在右關上脾風之狀多汗惡風薄黃四肢怠墮皮肉間動發熱短氣不欲飲

食嗜卧如醉人診在唇其色黃
肺中風者人迎与右寸口脉浮濡而短在天為燥在地為金
在人臟為肺。虛因中邪風為乘尅故脉應在右手寸口肺
風之狀多汗惡風色皓然白口燥而喘逆氣眉息身重背痛
面脹腫昼羸暮甚診在鼻其色白
腎中風者人迎与左尺中脉浮而滑在天為寒在地為水在
人臟為腎。虛因中邪風為母子相感故脉應在左尺中腎
風之狀多汗惡風色如始面瘡然浮腫腰脊痛引小腹隱曲
不利昏寢汗愈多志意惶感診在耳其色黑
胃中風者人迎与兩關上脉並浮而大六府无中風論唯胃
有者以胃為臟海納五味以滋養五臟虛而中邪風故其狀額
多汗貪飲不下腸塞不通腹善滿失衣則瞋脹張肩息心
下淡淡貪寒則泄

中風治法

生姜生附湯治卒中風涎潮昏塞不知人并至痰冷癖氣胃
滿嘔沫頭痛飲食不消

大附子

一枚生去皮
臍切作八片

右以水二椀生姜一两切因煎至一大盞去滓温冷服
一法加沈香一錢一法加辰砂末少匕凡中風无問冷
熱虛實皆可服蓋此藥能正氣消痰散風神效

白散子治肝腎虛為風所襲卒中涎潮昏塞不語嘔吐痰沫
頭目眩暈上實下虛真陽耗竭兼治陰證傷寒六脉沈伏
昏不知人又治霍乱吐瀉飲食不進及小便淋瀝不通服
赤口瘡咽喉冷痛

大附子

生去皮臍

桂府滑石

各半

圓白半夏

湯洗二十
一次三分

右為末每服二錢水二盞姜七片蜜半匙煎七分空腹

冷服霍乱加藿香小便不利加木通灯心芎藭根煎此藥
就有差互亦无所苦

紅龍散治中風閉關竅

朱砂別研 五靈脂各兩 茯神去心中木 草薢各一兩
全蝎半兩 腦麝各一分

右為末每服二錢酒調服先服此次服神異溫風丹

神異溫風丹治中風一切諸疾

麻黃五兩不去節 人參 白木
乾姜炮各二兩 茯神 附子炮去皮臍 白膠香別研
甘草炙各兩半 乳香別研 全蝎炒各一兩

右將麻黃細判用水五升熬去半入蜜六兩又熬成膏
入前件藥末和負如彈子大每服一負溫酒下日三服
排風湯治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發

則面青心悶吐逆嘔沫腦滿頭眩不聞人色偏枯筋急曲
蹇而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾
風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐顛倒与
亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎
風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰冷痺骨疼諸有此
證令人心驚志意不定恍惚多忘服此湯安心定志聰耳
明目通臟腑諸風疾悉去之

白鮮皮 白木 芍藥 桂心
芎藭 當歸 杏仁湯去皮尖 防風去叉
甘草炙各二兩 獨活 麻黃湯去節 茯苓各三兩

右剉散每服四錢水盞半姜七片棗二枚煎七分去膠

小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語
奄忽二 神情悶死諸風脹之皆驗不令人虛

麻黃 去節湯 防已 崔氏外 人參

桂心 各一 甘草 炙 白芍藥

杏仁 一兩湯去 附子 一枚炮 防風 兩半

黃芩 各一

右為剉散每服四大錢水一盞半姜七片棗二個煎七分去滓不以時服取汗隨人虛實與所中輕重有人脚弱服此六七劑得差有風疹家天陰節變輒合服之可以防瘡一云恍惚加茯神遠志骨節疼有熱去附子芍藥古今錄驗有白朮无杏仁救急无芎藭杏仁止十味延年无防風一云遺失便利產後失血并老人小兒用麻黃桂心甘草各二兩一法治或歌哭或笑語无所不及用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩无防風附子生姜有當飯一兩

獨活丹治風豔不能言四不收手足轉曳

白芍藥 栝蒌根 獨活 桂心 各二 甘草 三

煎別煎字多抄起 每服四錢七姜五片水二盞煎六分去滓入

生葛汁一合和勻服

三黃湯治中風手足拘牽百節疼痛煩熱心乱惡寒不欲飲食兼治賊風偏風痿退風半身不遂失瘖不言

麻黃 去節湯 黃芪 半兩 黃芩 三分 獨活 一兩

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時服取汗為效心熱加大黃半兩脹滿加枳實一分氣逆加人參三分心忪加牡蛎三分渴加栝蒌根寒加附子一枚炮熟入

小竹沸湯治中風涎潮譫語昏塞四肢緩縱不收

秦艽 去苗 防風 去芦 附子 炮去 獨活 剉各

右水四盞煎二盞入生地黄汁竹瀝各半盞煎三五沸

麻黃 去節湯 防已 崔氏外臺不用 人參

黃芩

桂心 一兩湯去 甘草 炙 白芍藥

芍藥 各一兩

杏仁 皮大炒 附子 一枚炮去皮臍 防風 兩半

右為剉散每服四大錢水一盞半姜七片棗二個煎七分去滓不以時服取汗隨人虛實與所中輕重有人脚弱服此六七劑得差有風疹家天陰節變輒合服之可以防瘡一云恍惚加茯神遠志骨節疼有熱去附子芍藥古今錄驗有白朮无杏仁救急无芍藥杏仁止十味延年无防風一云遺失便利產後失血并老人小兒用麻黃桂心甘草各二兩一法治或歌哭或笑語无所不及用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩无防風附子生姜有當飯一兩

獨活丹治風謔不能言四不收手足轉曳

白芍藥 栝蒌根 獨活 桂心 各二兩 甘草 三兩

右為剉散每服四錢匕姜五片水二盞煎六分去滓入生葛汁一合和勻服

三黃湯治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒不欲飲食兼治賊風偏風攣退風半身不遂失瘖不言

麻黃 去節湯兩半分 黃芩 半兩 黃芩 三分 獨活 一兩

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時服取汗為效心熱加大黃半兩脹滿加枳實一分氣逆加人參三分心忪加牡蛎三分渴加栝蒌根寒加附子一枚炮熟入

小竹沸湯治中風涎潮譫語昏塞四肢緩縱不收

秦艽 去苗土剉 防風 去芦剉 附子 炮去臍 獨活 剉各一分 右水四盞煎二盞入生地黄汁竹瀝各半盞煎三五沸

去滓分四服不拘時服病去以它藥扶持未知再作
 燒竹瀝法新竹截尺許長用兩磚對立相去八寸置竹在上
 每截破作二片仰安磚上急着火磚外兩頭各置椀以盛
 瀝人亦可單服冷暖隨人勿過度劑瀝亦然
 獨活散治男子婦人氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上
 氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏

- 獨活
- 地骨皮
- 細辛
- 芎藭
- 菊花
- 防風去又
- 甘草炙

雄朱圓治中風涎潮咽膈作舌目瞑不開口眼鳴斜手足不
 隨但建其功風疾並宜服之

- 雄黃別研
- 辰砂
- 龜骨
- 麝香各一分別研
- 烏虵酒浸炙去皮骨
- 白壇蚕生去絲
- 天南星生
- 白附子生各半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大如中風涎潮牙關不開先用
 大蒜一瓣搗爛塗在兩牙關外腮上用豆淋酒化一九
 揩牙斷上即閉續用薄荷酒化下一丸如丈夫風氣婦
 人血氣牙關緊急只用豆淋酒化一九揩牙如頭風目
 眩暗風眼黑欲倒者急嚼一二丸薄荷湯下

仁壽圓治肝腎氣虛風冷所中筋脉攣動口眼鳴邪常服補
 肝元行榮衛養氣血

- 附子炮熟去皮一兩
- 桂心
- 白茯苓
- 山茱萸
- 五味子
- 杜仲去皮姜剉炒絲斷
- 續斷
- 枸杞子
- 熟地黃
- 巴戟去心
- 兔絲子酒浸溫研
- 防風各兩半

牛膝酒浸二兩

右為末蜜丸梧子大每三五十九溫酒鹽湯食前任下
 鐵彈圓治男子婦人一切風疾元問遠近癱瘓中風口眼喎
 斜言語蹇淡手足躄拽難以稱幸或發搐癩或如虫行或
 失音不語牙關緊急脚不能行身體頑麻百節疼痛精神
 不爽頭暈煩悶夜卧不安多涎胃膈不利口乾眼淚多因
 少力如破傷風身如角弓口噤不開作汗如油及洗頭風
 腦重眉梁骨痛卒中不語迷悶兼白癩風遍身癢瘡鼻多
 清涕耳作蟬鳴小兒驚風天吊搐搦婦人血風手足煩熱
 夜多虛汗頭旋倒地並皆治之

- 白附子 別研
- 沒藥 別研
- 虎腦骨 酒浸一宿炙乾全蝎
- 自然鈎 燒存性醋浸一宿各一兩
- 五靈脂 一分
- 乳香 柝木 別研
- 烏頭 炮去 麻黃 不去
- 白附子 二十个去皮 別研不入羅
- 木鱉子 二十个去皮 別研不入羅
- 白附子 酒浸 辰砂 一分
- 虎腦骨 酒浸一宿炙乾全蝎
- 自然鈎 燒存性醋浸一宿各一兩
- 五靈脂 一分
- 乳香 柝木 別研

右為末蜜圓彈子大用无灰酒一升浸一負分二十服
 傷風鼻塞分三十服空心臨卧各一服大風互負可安
 活絡通經圓治半身不遂口眼喎斜癱瘓諸風通活經絡宣
 導凝滯常服壯筋骨助血脉起偏廢之疾其效如神

- 川烏頭 二兩一兩生不去皮 尖一兩炮去皮尖
- 班猫 百个去頭外并十斤 翅醋煮香熟焙乾
- 好墨 火 白膠香 各兩 別研
- 草烏 二兩制 如上法
- 木鱉子 三兩三 分別研
- 烏蛇 兩半
- 五靈脂 三兩
- 白膠香 各兩 別研
- 當飯 兩半
- 白花蛇 酒煮去 皮骨焙

右為末將木鱉子末醋研為膏和黑豆末一斤好醋拌
 一兩作十丸以墨為衣空心食前溫酒鹽湯嚼下一丸
 烏藥順氣散治風氣不順手脚偏枯流注經絡并濕毒進襲
 腿膝牽痺筋骨疼痛

- 烏藥 去木
- 麻黃 去節
- 橘皮 各二 兩
- 甘草 炙
- 川芎
- 枳殼 麸炒
- 桔梗
- 白僵蚕 炒去 絲

右為末蜜丸梧子大每三五十九溫酒鹽湯食前任下
 鐵彈圓治男子婦人一切風疾元問遠近癱瘓中風口眼喎
 斜言語蹇澁手足躄拽難以稱幸或發搐癩或如虫行或
 失音不語牙關緊急脚不能行身體頑麻百節疼痛精神
 不爽頭暈煩悶夜卧不安多涎胃膈不利口乾眼淚多因
 少力如破傷風身如角弓口噤不開作汗如油及洗頭風
 腦重眉梁骨痛卒中不語迷悶兼白癩風遍身癢瘡鼻多
 清涕耳作蟬鳴小兒驚風天吊搐搦婦人血風手足煩熱
 夜多虛汗頭旋倒地並皆治之

- 白附子 沒藥 別研
- 烏頭炮去皮尖 麻黃不去節 自然鈎燒存性醋浸一宿各一兩 全蝎
- 白花蛇酒浸半兩 辰破別研一分 五靈脂一分 乳香柝木搥研
- 木鱉子二十个去皮別研不入羅 虎腦骨酒浸一宿炙乾

右為末蜜圓彈子大用无灰酒一升浸一負分二十服
 傷風鼻塞分三十服空心臨卧各一服大風互負可安
 活絡通經圓治半身不遂口眼喎斜癱瘓諸風通活經絡宣
 導凝滯常服壯筋骨助血脉起偏廢之疾其效如神

- 川烏頭二兩一兩生不去皮尖一兩炮去皮尖 草烏二兩制如上述 木鱉子三兩三分別研
- 班猫翅醋煮香熟焙乾 烏蛇兩半 五靈脂三分
- 好墨火 白膠香各兩別研 當飯兩半 白花蛇酒浸去皮骨焙

右為末將木鱉子末醋研為膏和黑豆末一斤好醋拌
 一兩作十九以墨為衣空心食前溫酒鹽湯嚼下一丸
 烏藥順氣散治風氣不順手脚偏枯流注經絡并濕毒進襲
 腿膝牽痺筋骨疼痛

- 烏藥去木 麻黃去節 橘皮各二兩 甘草炙
- 川芎 枳殼麸炒 桔梗 白僵蚕炒去絲

白芷

各一兩

白薑

炮半兩

右為末每服二錢七水一椀姜三片薄荷七葉煎七分空心服治氣去薄荷用桑子二枚同煎

舒筋保安散治左癱右瘓筋脉拘牽身體不遂脚腿少力乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宣導諸氣

乾木瓜

五兩

草薢

五靈脂

牛膝

酒浸

續斷

白僵蚕

炒去絲

松節

白芍藥

川當歸

防風

去義

虎骨

各一兩

烏藥

去木

天麻

藏靈仙

黃芪

右用无灰酒一斗浸上件藥二七日緊封扎日數足取藥焙乾搗為細末每服二錢用浸藥酒半盞調下喫酒盡用米湯調下又方添金毛狗脊一两却將乳香白膠香各一两同研入乾藥末內

松節

筋節

散治風寒冷濕搏於筋骨使筋牽制痛行步艱難但是諸筋牽縮疼痛患主之

茯神中心木

剉如木

乳香

一錢研

右入銀石器內炒留兩分性為末每服二錢木瓜酒下

川烏頭

二兩

桂心

一兩

甘草

炙

乾姜

炮

各一分

右為末每服二錢温鹽酒調下日三服

趁風膏治中風手足偏廢不舉

川山甲

左癱用右足右癱用左足

紅海蛤

如碁子者

川烏頭

大者生用

各二兩

右為末每用半兩搗烈葱白汁和成厚餅約徑一寸半貼在所患一邊脚中心用舊帛裏緊縛定於无風密室中椅子上坐椅前用湯一盆將貼藥脚於湯內浸仍用

人枝病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗欲
出身麻木得汗周遍為妙切宜避風自然手足可幸如
病未盡除候半月二十日以後再依此法用一次自除
根本仍服治風補理藥忌口遠慾以自養

附子酒治中風之冷痰癱脹滿諸痺

大附子

一枚去皮臍切作四片

右用醇酒一升春浸五日夏三日秋冬七日每服一合
日二三服以痺住為效未知再作

小黃芪酒大治風虛痰癱四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或
小腹縮痛服下牽急心下有伏水服下有積飲夜夢悲愁
不樂恍惚善忘此由風虛互蔽受邪所致或久坐腰痛耳
聾卒起眼瞤重或卒体流腫疼痛飲食惡冷瀧人惡寒頭
冒中痰滿心下寒疝及婦人產後餘疾風虛積冷不除

黃芪

附子

去皮臍

川椒

去目并合口者

桂心

秦朮

牛膝

防風

去叉

烏頭

集驗方用山菜

白朮

川芎

獨活

細辛

去苗

甘草

各三兩

大黃

葛根

山茱萸

乾姜

各二兩

當歸

二兩半

右為剉散少壯人无熬煉虛老人微熬之以絹袋盛用
清酒二斗漬之春夏五日秋冬七日可先服食一合不
知至四十合日三服此藥攻痺尤佳亦不令人吐悶小
熱宜冷飲食也大虛加菴蓉二兩下利加女萎三兩多
忘加石斛菖蒲紫石英各二兩心下多水加伏苓人參
各二兩山藥三兩酒尽可更以酒二斗重漬滓服之不
尔可曝滓搗下篩酒服方寸匕不知稍增之服一劑得
力令人耐寒冷補虛治諸風冷神妙

寶朝議經進仙酒方治大風及偏風一切風疾延年益壽

牛蒡根

牛膝

各一斤

秦艽

鼠粘子

各二兩

枸杞子

炒一斗

蒼朮

蒸爛二斤

防风

蚕沙

各二兩

大麻子

炒別研去

桔梗

羌活

各二兩

右為剉散无灰酒二斗淨瓮器內浸密封七日開二時不得對瓶口日進三服每服一大盞温服常令面有酒色其者不過一斗忌麪食并菓由動風物

科簡類例

且人之冒風也輕則為傷重則為中盖風散氣動於陽腠理開故自汗而惡風其色診皆隨藏氣而言六府无論唯胃有中者盖飲食所致故孫真人曰新食竟取風為胃風瘧論亦然六府經絡邪既能中豈不能中諸府也虽曰轉輸在大小腸則有腫脹在胞則有轉戾在膽則有損縮但文缺不論

或謂竟中諸藏故不論諸府此亦一說故兩存之諸方論中所謂左癱右瘓者盖邪氣中人邪氣及緩正氣即急正氣引邪唱僻不隨入風蟄者以心肺間閉不能言但噤之作声盖肺氣入心則能言邪中心肺涎潮逼塞故使然也四肢緩縱為風痲者以風散涎注於關節氣不能行故使四肢不遂也舌強不能言者以風入心脾經心之別脉係於舌本脾之脉緒胃俠咽連舌本散舌下風涎入其經絡故舌不轉而不能言也四肢拘牽者以中風冷邪氣入於肝臟使諸筋牽急屈不可伸也風柔者以風熱入於肝藏使諸筋弛張緩而不收也故經云寒則牽急熱則弛張風顫者以風入於肝藏經絡上氣不守正位故使頭招搖而手足顫掉也風瘡者以風冷之氣客於中滯而不能發故使口噤不能言也与前所謂涎塞心肺同候此以口噤為差耳猥退風者半身不遂失音不

語臨事不前亦偏中於心肺經所致也諸證類倒可推而治
不内外因中風丸倒

凡因不内不外而致風中者亦各從其類也如新沐中風名
曰首風飲酒中風名曰漏風又曰酒風入房中風名曰内風
又曰勞風治之各有方

附子摩頭散治因沐頭中風多汗惡風當先風一日而病甚
頭痛不可以出至日則少愈名曰首風

大附子 一个炮
去皮臍

鹽 等分

右二味為散沐了以方寸匕摩疾上令藥力行

麋衝湯治因醉中風惡風多汗少氣口乾善渴近衣則身熱
如火臨食則汗流加浴骨節懈惰不欲自勞名曰漏風

澤瀉 各

白朮 各

麋衝 半兩

右為末每服二錢酒飲任調下食前服

附子湯治房室竟中風惡風多汗汗出沾衣口乾上瀆不能
勞事身體疼名曰内風

附子 生去
皮臍

人參 各半兩

茴香 炒

茯苓

山藥 各一分

甘草 炙

乾姜 炮各
三分

右為劉散每服四大錢水二盞姜三片鹽少許煎至七
分去滓食前服

叙中寒論

夫寒者乃天地殺厲之氣在天為寒在地為冰在人藏為腎
故寒喜中腎之中之多使卒急疼痛昏不知人挾風則眩暈
兼濕則腫疼治之唯宜溫劑不可吐下皆逆也然寒性虽喜
故腎五藏皆能中之若中於經絡之表則易散入裏則不消
与傷寒脉證无異但輕重不同其有本藏即中寒者經論
載不可不辨明也詳論在傷寒門

五藏中寒證

肝中寒者人迎与左關上脉紧而弦肝虚中寒乃母子相因
弦多則吉但紧不弦在寒表縮為不利故使本部脉紧如切
繩肝中寒之状其人洒洒惡寒翕々發熱薰然面赤熱々如
有汗曾中煩熱服下牽々不得伸

心中寒者人迎与左寸口脉紧而洪心虚中寒賊邪相剋脉
應本供洪洪ナリ則吉但紧舌乾焦為不利心中寒之状其人如噉
狀劇則心痛掣背々痛掣心猶如蟲注惡寒四肢厥自
吐少間頃时復發休作不已昏塞不知人

脾中寒者人迎与右關上脉紧而沈細脾虚中寒々邪乘剋
脉應本部長則吉沈紧唇揭為不利脾中寒之状心腹腹脹
四肢牽急噎噫不通截氣不傳或秘或泄
肺中寒者人迎与右寸口脉紧而瀰肺虚中寒母子相感脉

應本部浮者為吉但紧而瀰鼻乾燥為不利肺中寒之状喜
吐濁涎氣短不能振息洒々而寒吸々而咳

腎中寒者人迎与左尺中脉沈紧而滑腎虚中寒二喜中腎
以類相從脉應本部沈滑者吉紧瀰耳輪黑目睛眊為不利
腎中寒之状色黑氣弱吸々少氣耳聾腰痛膝下清拘牽而
疼昏不知人餘例見傷寒門

中寒治法

附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語音有武
士守邊大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林継作隨行醫官
灌以此藥兩劑遂醒

大附子炮去人參 乾姜炮 甘草炙 白木各分

右為對散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時
服口噤之開灌之

根ナリ

非盡

五藏中寒證

肝中寒者人迎与左關上脉紧而弦肝虚中寒乃母子相因
弦多則吉但紧不弦在寒表縮為不利故使本部脉紧如切
繩肝中寒之状其人洒洒惡寒翕翕發熱薰然面赤熱如
有汗膏中

心中寒者人迎与左寸口脉紧而洪心虚中寒賊邪相剋脉
部供滑則吉但紧舌乾焦為不利心中寒之状其人如噉
狀劇則心痛掣背痛掣心猶如蠱注惡寒四肢厥自
吐少間頃时復發休作不已昏塞不知人

脾中寒者人迎与右關上脉紧而沈細脾虚中寒邪乘剋
脉應本部長則吉沈紧唇揭為不利脾中寒之状心腹脹脹
四肢牽急噎噫不通截氣不傳或秘或泄
肺中寒者人迎与右寸口脉紧而瀋肺虚中寒母子相感脉

應本部浮者為吉但紧而瀋鼻乾燥為不利肺中寒之状喜
吐濁涎氣短不能振息洒洒而寒吸吸而咳
腎中寒者人迎与左尺中脉沈紧而清腎虚中寒喜中腎
以類相從脉應本部沈滑者吉紧瀋耳輪黑目睛眊為不利
腎中寒之状色黑氣弱吸吸少氣耳聾腰痛膝下清拘牽而
疼昏不知人餘例見傷寒門

根一報ナリ

非蓋

中寒治法

附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語昔有武
士守邊大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林繼作隨行醫官
灌以此藥兩劑遂醒

- 大附子炮去 人參 乾姜炮 甘草炙 白木各分

右為對散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時

服口噤之 開灌之

乾薑附子湯治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫狀如暗風手脚
牽搐口噤四肢厥冷或復燥熱

乾姜炮 附子炮去

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服入肝
加木瓜入肺加棗白皮入脾加木入心加茯苓隨證之

中暑論

中暑其脉陽弱而陰虛微遲似死暑在天為熱在地為火
在人蔽為心故暑喜啟心中之使人噎悶昏不知人入肝則
眩暈頭痺入脾則昏睡不甦入肺則喘滿痿躄入腎則消渴
利小便凡中暈死治之切不得用冷唯宜溫養得冷則死道
塗无湯即以熱土慰臍中仍使更溺漿可見矣若發其汗則
惡寒甚加溫針則發熱甚下之則淋甚治之不可不謹也然
傷暑中暈其實一病但輕重不同新校正要略者乃云傷寒

家別有暈病非也詳論治法見傷暑門

中暑治法

大黃龍圓治中暑眩暈昏不知人或身熱惡寒頭痛狀如傷
寒或往來寒熱煩躁渴甚嘔吐泄瀉常服去暑毒分利陰

硫黃各一 消石各一 雄黃通明 滑石
白礬各半 寒食麩四兩

右為末滴水為丸如梧子大每服五丸至七丸漸加至
二十丸新汲水下昏塞不知人則以水化開灌之中暑
忌得冷此藥却似冷水下之乃熱因寒用疑者釋之

中暑凡例

中暑悶倒急扶在陰涼處切不可與冷當以布巾衣物等蘸
熱湯熨臍中及氣海續以湯淋而上令微臍腹暖即漸醒如
倉卒无湯處掬道上熱土於臍以多為佳冷即易古法道塗

无湯即掬土於臍上仍撥開作窩子令人更溺於其中以
代湯續與解暑毒藥如白虎竹葉石膏湯凡覺中暑急醫生
姜一大塊冷水送下如已迷亂嚼大蒜一大瓣冷水送下
如不能嚼即用水研灌之立醒若中倉卒无水渴甚急醫生
葱二寸許津同燕可抵飲水二升

中濕論

中濕者脉沈而細緩以濕溢人肌，浮脉則沈細支濕者
在天為雨在地為土在人為脾故濕喜飲脾，虛喜中濕
故曰濕流關節中之多使人腹脹四肢關節疼痛而煩久則
浮腫喘滿昏不知人挾風則眩暈嘔噦兼寒則牽拳掣痛治
之不得猛發汗及灼艾泄瀉惟利小便為佳故論云治濕不
利小便非其治也大汗大下皆死詳論治法見傷暑門

中濕治法

白朮酒治中濕口噤不知人

白朮

半兩

右酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之日三夜一

四氣兼中證論

風寒暑濕本乎一氣性中相同用中皆背，既能中五藏
暑濕其可不論方論有肝著其人常欲蹈其胷上未若時但
欲飲熱脾著四肢浮腫身重如石不能自反身腎著身重腰
中冷如坐水中欣如水狀及不渴小便自利食飲如故心肺
不見明文恐文簡脫難以臆補或云濕唯中足三陰故不及
心肺然五藏有本病并乘剋勝剋相感相因而得之假如風
中肝為本病中脾為勝剋中肺為乘剋中心為相因中腎為
相感則无所不通謂濕不及心肺未為確論故缺以俟明哲
暑病亦然况六淫均被四氣皆能中人中風則有汗脉必浮

无湯即掬糞土於臍上仍撥開作窩子令人更溺於其中以
代湯續與解暑毒藥如白虎竹葉石膏湯凡覺中暑急醫生
姜一大塊冷水送下如已迷亂嚼大蒜一大瓣冷水送下
如不能嚼即用水研灌之立醒路中倉卒无水渴甚急醫生
葱二寸許津同燕可抵飲水二升

中濕論

中濕者脉沈而細微緩以濕溢人肌，浮脉則沈細支濕者
在天為雨在地為土在人藏為脾故濕喜飲脾，虛喜中濕
故曰濕流關節中之多使人腹脹四肢關節疼痛而煩久則
浮腫喘滿昏不知人挾風則眩暈嘔噦兼寒則牽拳掣痛治
之不得猛發汗及灼艾泄瀉惟利小便為佳故論云治濕不
利小便非其治也大汗大下皆死詳論治法見傷暑門

中濕治法

白朮酒治中濕口噤不知人

白朮

半兩

右酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之日三夜一

四氣兼中證論

風寒暑濕本乎一氣性中相，其相皆風寒既能中五藏
暑濕其可不論方論有肝著其人常欲蹈其胷上未若時但
欲飲漿脾著四肢浮腫身重如石不能自反身腎著身重腰
中冷如坐水中飲如水狀及不渴小便自利食飲如故心肺
不見明文恐文簡脫難以臆補或云濕唯中足三陰故不及
心肺然五藏有本病并乘剋勝剋相感相因而得之假如風
中肝為本病中脾為勝剋中肺為乘剋中心為相因中腎為
相感則无所不通謂濕不及心肺未為確論故缺以俟明哲
暑病亦然况六淫均被四氣皆能中人中風則有汗脉必浮

弦惡風走注中寒則无汗脉必腎教惡寒疼痛中暑則昏憤
面垢脉必虛緩倦怠中濕則重著脉必輕緩四肢歷節疼痛
皆能交絡互織所謂風寒風濕風溫風寒濕人温等當以人迎
脉證別之令无差誤更有七情内忤亦能涎潮昏塞手足顛
曳一如中風不可例作六淫氣治其至天柱及素蓄疾涎隨
氣上厥使人眩暈昏不知人半身不遂口眼喎邪手足顛曳
者故有中氣中痰之別猶當詳辨毋使混濫除外所因方見
於此後内所因各見本門

四氣兼中治法

附子湯治五臟中風手足不仁口面喎斜昏暈失音眼目寒
潤動牙車緊急不得轉動

附子炮去 桂心各半 細辛去苗 防風去叉
白朮人參 乾姜炮各六分

右為劉散每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分

去滓食前服或為末酒調二錢服

防風湯治中風 暑卒然暈倒面青黑四肢緩弱喜呻欠口

邪八餅十 不仁好笑

防風去叉 澤瀉 桂心 杏仁麩炒去

乾姜炮 甘草各等分

右為劉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

生附白朮湯治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足緩縱聚

自汗失音不語便利不禁

附子生去 乾姜各半 白朮一兩 甘草一分

右為劉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服

附子麻黃湯治寒濕所中昏暈緩弱或腰背強急口喎語声

弦惡風走注中寒則无汗脉必腎教惡寒疼痛中暑則昏憤
面垢脉必虛緩倦怠中濕則重著脉必輕緩四肢歷節疼痛
皆能交絡互織所謂風寒風濕風溫寒濕風濕等當以人迎
脉證別之令无差誤更有七情内忤亦能涎潮昏塞手足顛
曳一如中風不可例作六淫氣治其至天柱及素蓄疾涎隨
氣上厥使人眩暈昏不知人半身不遂口眼喎邪手足顛曳
者故有中氣中痰之別猶當詳辨毋使混濫除外所因方見
於此後内所因各見本門

四氣兼中治法

附子湯治五臟中風手足不仁口面喎斜昏暈失音眼目寒
潤動牙車緊急不得轉動

附子炮去 桂心各半 細辛去苗 防風去叉
白朮各半 人參各半 乾姜炮各六分

右為對散每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分

去滓食前服或為末酒調二錢服

防風湯治中風 暑卒然暈倒面青黑四肢緩弱喜呻欠口
喘邪四肢不仁好笑

防風去叉 澤瀉 桂心 杏仁麩炒去
乾姜炮 甘草各各

右為對散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

生附白朮湯治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足緩縱聚
自汗失音不語便利不禁

附子生去 乾姜各半 白朮一兩 甘草一分各
右為對散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服

附子麻黃湯治寒濕所中昏暈緩弱或腰背強急口喎語声

附子炮去 麻黃去節 白朮 乾姜
甘草炙 人參等分

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服

苓朮湯治冒暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不遂骨節離解緩弱不收或入浴暈倒口眼喎邪手足痺曳皆濕溫類也

附子炮去 茯苓 白朮 乾姜炮
澤瀉各 枳實等分

右為剉散每服四錢水盞半煎至七分去滓食前服

三因極一病證方論卷之二

三因極一病證方論卷之三

叙痺論

夫風濕寒三氣雜至合而為痺雖曰合痺其用自殊風勝則為行痺寒勝則為痛痺濕勝則為着痺三氣龍人經絡入於筋脉皮肉肌骨久而不已則入五藏凡使人煩滿喘而吐者是痺客於肺煩心上氣噎乾恐噫瘕脹滿者是痺客於心多飲飲小便小腹痛如懷妊夜卧則驚者是痺客於肝善脹尻以代腫脊以代頭者是痺客於腎四肢解齒發咳嘔沫上為大塞者是痺客於脾又有腸痺者數飲而小便利中氣喘急時發殮泄又胞痺者小腹按之內痛若沃以湯澆於小便上為清涕又六府各有俞風寒濕中其俞而食飲應之故循俞而入各舍其府治之隨其府俞以施針灸之法仍服遂風濕寒發散等藥則病自愈大抵痺之為病寒多則痛風多則

附子炮去 麻黃去節 白朮
甘草炙 人參等分

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服

苓朮湯治冒暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不遂骨節離解緩弱不收或入浴暈倒口眼喎邪手足痺曳皆濕濕類也

附子炮去 茯苓 白朮 乾姜炮

澤瀉 桂心等分

右為剉散每服四錢水盞半煎至七分去滓食前服

三因極一病證方論卷之二

三因極一病證方論卷之三

叙痺論

走風濕寒三氣雜至合而為痺雖曰合痺其用自殊風勝則為行痺寒勝則為痛痺濕勝則為着痺三氣龍人經絡入於筋脉皮肉筋骨久而不已則入互藏凡使人煩滿喘而吐者是痺客於肺煩心上氣噎乾恐噫瘕脹滿者是痺客於心多飲教小便小腹痛如懷妊夜卧則驚者是痺客於肝善脹尻以代腫脊以代頭者是痺客於腎四肢解墮發咳嘔沫上為大塞者是痺客於脾又有腸痺者教飲而小便利中氣喘急時發殮泄又胞痺者小腹按之內痛若沃以湯淡於小便上為清涕又六府各有俞風寒濕中其俞而食飲應之故循俞而入各舍其府治之隨其府俞以施針灸之法仍服遂風濕寒發散等藥則病自愈大抵痺之為病寒多則痛風多則

行濕多則着在骨則重而不平在脉則血凝不流在筋則屈而不伸在肉則不仁在皮則寒逢寒則急逢熱則緩又有血痺以類相從附子此門外有支飲作痺見痰飲門

合痺治法

附子湯治風濕寒痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重着四肢

附子生去皮

白芍藥

桂心

甘草

白茯苓

人參各三分

白朮一兩

右為劑散每服四錢水三盞煎七分去滓食前服

黃芪五物湯治尊樂人骨弱肌重因疲勞汗出卧不時動

加以微風遂作血痺脉當陰陽但微尺中少緊身軀如風

痺狀

黃芪

芍藥

桂心

各等分

右為劑散每服四大錢水二盞姜五片棗三枚煎七分

去滓食前服

黃芪酒治風濕寒痺身軀腫滿疼痛不仁飲食惡冷瀉惡

寒胃中痰滿心下寒 方見中風門

歷節論

夫歷節論疼痛不可屈伸身軀魁癩其腫如脫其痛如掣流注骨節短氣自汗頭眩濕欲吐者皆以風濕寒相搏而成其痛如掣者為寒多腫滿如脫者為濕多歷節黃汗出者為風多顧病源所載飲酒當風汗出入水遂成斯疾原其所因雖涉風濕寒又有飲酒之說自屬不內外因亦有不能飲酒而患此者要當推求所因分其先後輕重為治久而不治令人骨節蹉跎變為癩病不可不知

歷節治法

芍藥知母湯治諸肢節疼痛身軀魁癩脚腫如脫頭眩短氣

温人欲吐

桂心

知母

防风

芍药

甘草

麻黄

附子

炮去皮脐 各三兩

右為剉散每服四錢水一盞半姜五片棗七分去滓空
腹服一法有白朮川芎杏仁半夏

烏頭湯治病歷節痛不可屈伸

烏頭

五枚剉以蜜二分 煎取一斗去烏頭

甘草

麻黄

去節

芍药

黄芩

右為剉散每服四錢水二觔煎至七分去滓投前蜜煎
一合空腹温服千金有老姜桂心大棗無薑黃麻黃治
疝腹中絞痛賊風入腹攻五藏拘急不得轉側叫呼
作有時使人手足厥冷
附子八物湯治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍

附子

炮去皮脐

乾姜

炮

芍药

茯苓

甘草

炙

桂心

各三兩

白朮

四兩

人参

三兩

發

右為剉散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前一方
去桂心用乾地黄二兩

獨活寄生湯最治歷節風近人用之甚效亦治腰背痛及脚

氣流注

方見腰痛門

叙脚氣論

夫中風寒暑湿与脚氣皆漸頽淺深之不同中風寒暑湿得
之頽而淺脚氣得之漸而深以其隨藏氣虛實寒熱發動故
得氣名其如循經絡入腑臟證候虽不一然三陽多熱躁三
陰多熱煩亦可類推但脚氣不專主一氣亦不專在一經故
与中風寒暑湿為異耳兼有續生諸病混雜多端未易分別
治之須尋其經絡病證所在去處然後以脉察其虛實淺深

為治假如三陽經其診多在足外踝及手背三陰經其診多在足內踝及臂內以此粗分陰陽可知大槩矣其如風寒暑濕性用各不同所謂風為行寒為痛暑為頑濕為着乃不刊之說千金方論蕭蕭門類皆蹈龍荅舊說似難憑據唯留心斯道者必有至當之論耳

叙千金論

千金論脚氣皆由感風毒所致多不令人即竟會因他病乃始發動或奄然大悶經三兩日方乃竟之庸醫不識謾作餘疾治之莫不尽斃緣始竟甚微食訖戲如故惟卒起脚屈弱為異耳及論風毒相貌云丈夫有脚未竟異而頭項臂膊已有所苦諸處皆患未知而心腹互內已有所因或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或大小便秘法或胃中衝悸不欲見光明或精神昏悒語言錯亂或壯熱頭痛或身軀酷冷疼

煩或竟轉筋或睡醒腫不甯或時緩縱不隨或復百節牽急或小腹不仁皆謂脚氣狀貌也乃至婦人產後取涼多中此毒其熱悶掣縱驚悸心煩嘔吐氣上臍下冷痞幅然不快兼小便淋瀝不同生平皆是脚氣之候頑弱為緩風疼痛為濕痺右件千金即又但備叙諸證不說陰陽經絡所受去處亦不分風濕寒熱四氣及內藏虛實所因後季從何為治若一向伺書不若無書為愈比之謂也

脚氣脈證

脚氣證狀固多但當以脈診分其陰陽使无差互所謂脈浮為風緊為寒緩細為濕洪數為熱見於諸陽病在外宜發散之愈沈而弦者亦為風沈而緊者為寒沈細為濕沈數為熱見諸陰病在裏宜溫利之愈外證自汗走疰為風勝與汗疼痛幸急為寒勝腫滿重着為濕勝煩渴熱頑為暑勝四氣兼

為治假如三陽經其診多在足外踝及手背三陰經其診多在足內踝及臂內以此粗分陰陽可知大槩矣其如風寒暑濕性用各不同所謂風為行寒為痛暑為頑濕為着乃不刊之說與董氏顛門類皆蹈龍蒼舊說似難憑據唯留心斯道者必有至當之論焉

叙千金論

千金論脚氣皆由感風毒所致多不令人即竟會因他病乃始發動或奄然大悶經三兩日方乃竟之庸醫不識謾作餘疾治之莫不尽斃緣始昏嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱為異耳及論風毒相貌云丈夫有脚未竟異而頭項臂膊已有所苦諸處皆患未知而心腹五內已有所因或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或大小便秘澀或胃中衝悸不欲見光明或精神昏悒語言錯亂或壯熱頭痛或身軀酷冷疼

煩或或或脛腿頑痺或時緩縱不隨或復百節牽急或小腹不仁皆謂脚氣狀貌也乃至婦人產後取涼多中此毒其熱悶掣縱驚悸心煩嘔吐氣上膈下冷痞幅然不快兼小便淋瀝不同生平皆是脚氣之候頑弱為緩風疼痛為濕痺右件千金即又但備叙諸證不說陰陽經絡所受去處亦不分風濕寒熱四氣及內藏虛實所因後季從何為治若一向伺書不若無書為愈比之謂也

脚氣脈證

脚氣證狀固多但當以脈診分其陰陽使无差互所謂脈浮為風緊為寒緩細為濕洪數為熱見於諸陽病在外宜發散之愈沈而弦者亦為風沈而緊者為寒沈細為濕沈數為熱見諸陰病在裏宜溫利之愈外證自汗走疰為風勝與汗疼痛幸急為寒勝腫滿重着為濕勝煩渴熱頑為暑勝四氣兼

有但推其多者為勝治之當以諸證互辨而分表裏寒則溫
熱熱之在表則散在裏則下若大虛氣之間作補溫隨
病冷熱而用之不可拘不得服補藥

叙太陽經脚氣證

病者頭痛目眩項強腰脊連軀循髀外出外踝之後循京
骨至小指外側皆痛者乃是太陽膀胱經為風寒暑濕流注
自汗者為風勝無汗疼痛為寒勝熱頭為暑勝重着腫滿為
濕勝諸經皆當如此推凡太陽經宜隨四氣發散愈

太陽經脚氣治法

麻黃左經湯治風寒暑濕流注足太陽經手足痺行步艱
難憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩暈腰重關節痛

麻黃

去節

乾葛

細辛

白朮

切米泔浸

茯苓

防已

桂心

不見火

羌活

防風

甘草

各分

右為麻末每服四錢水二盞姜三片棗一個剪七分去
滓空腹服自汗去麻黃加桂芍藥重着加木槁皮無汗
減桂加杏仁澤瀉所加並等分

陽明經脚氣論

病者悽々寒熱呻欠口鼻乾腹脹膝膕中循胫外廉下足
跗入中指內間皆痛者乃是陽明胃經為風寒暑濕流注之
所為四氣偏勝並如上說治之宜隨四氣微利之

陽明經脚氣治法

大黃左經湯治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚痺痛行步
艱難涎潮昏塞大小便秘淡腹痛嘔吐或復下利惡聞食
氣喘滿眉息或自汗譫妄

大黃

蒸

細辛

去苗

茯苓

防已

有但推其多者為勝治之當以諸證互辨而分表裏寒則溫
之推則寒之在表則散在裏則下若大虛氣之間作補溫隨
病冷熱而用之不可拘不得服補藥

叙大陽經脚氣證

病者頭痛目眩項強腰脊連軀循髀外出外踝之後循京
骨至小指外側皆痛者乃是太陽膀胱經為風寒暑濕流注
自汗者為風勝無汗疼痛為寒勝熱頑為暑勝重着腫滿為
濕勝諸經皆當如此推凡太陽經宜隨四氣發散愈

太陽經脚氣治法

麻黃左經湯治風寒暑濕流注足太陽經手足痺行步艱
難憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩暈腰重關節
麻黃去節 乾葛 細辛 白木切米 泔浸
茯苓 防已 桂心不見火 羌活

防風

甘草

各分

右為麻末每服四錢水二盞姜三片棗一個剪七分去
滓空腹服自汗去麻黃加桂芍藥重着加木槁皮無汗
減桂加杏仁澤瀉所加並等分

陽明經脚氣論

病者悽々寒熱呻欠口鼻乾腹脹髀膝臍中循胛外廉下足
跗入中指內間皆痛者乃是陽明胃經為風寒暑濕流注之
所為四氣偏勝並如上說治之宜隨四氣微利之

陽明經脚氣治法

大黃左經湯治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚痺痛行步
艱難涎潮昏塞大小便秘法腹痛嘔吐或復下利惡聞食
氣喘滿眉息或自汗譫妄

大黃

細辛

茯苓

防已

羌活

黃芩

前胡

枳殼

麸炒

厚朴

去皮劉

甘草

炙

杏仁

麸炒去皮

尖別研

各等分

右劉散每服四大錢水盞半姜三片棗一個剪七分去
澤空腹挾臍腹痛加芍藥秘結加阿膠喘加桑白皮紫
蘓小便秘加澤瀉四肢瘡痒浸淫加升麻所加並等分
荷葉薑末湯治脚腫生瘡法以酒洗淨膿汁淋漓挾痺痛痒

乾荷葉

四張

藁木

一分

右為劉散以水二斗煎減五升去滓溫煖得所淋潔仍
臍前大黃左經湯佳

少陽經脚氣證

病者口苦善太息眼痛面垢躄无膏澤頭額目兌脊痛缺盆
并腋下馬刀腫自汗振寒發熱胃中脹助解膝外至脗絕骨
外踝及諸節指脊痛者乃足少陽膽經為風寒暑濕流注之

所為四氣偏勝例如前說治之宜隨四氣和解

少陽經脚氣治法

半夏左經湯治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰腿痛頭
疼眩暈嘔吐宿汁耳聾驚悸熱悶心煩氣上喘滿肩息腿
痺緩縱不隨

半夏

湯去滑

乾葛

細辛

白朮

茯苓

桂心

不見火

防風

乾姜

炮

黃芩

小

即遠

甘草

炙

柴胡

麥門冬

去心各

三分

右劉散每服四大錢水一觥半姜三片棗一個剪七分
去滓空腹服熱酒加竹瀝每服半合喘滿加杏仁桑皮

料簡三陽并合脚氣

三陽經有并合如太陽并少陽小陽併陽明陽明并太陽

羌活 黃芩 前胡 枳殼 麸炒 去穢

厚朴 去皮劉 姜汁炒 甘草 炙 杏仁 麸炒 去皮 尖別研 各等分

右判散每服四大錢水盞半姜三片棗一個剪七分去滓空腹挾胎腹痛加芍藥秘結加何膠喘加桑白皮紫蘇小便秘加澤瀉四肢瘡痒浸淫加升麻所加並等分荷葉薑末湯治脚腫 浸淫 腿膝膿汁淋漓挾痺痛痒

乾荷葉 四張 藁木 一分

右為判散以水二斗煎減五升去滓溫暖得所淋瀝仍服前大黃左經湯佳

少陽經脚氣證

病者口苦善太息服痛面垢躄无膏澤頭額目允脊痛缺盆并腋下馬刀腫自汗振寒發熱胃中脹助解膝外至胫絕骨外踝及諸節指背痛者乃是少陽膽經為風寒暑濕流注之

所為四氣偏勝例如前說治之宜隨四氣和解

少陽經脚氣治法

半夏左經湯治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰股痛頭疼眩暈嘔吐宿汁耳聾驚悸熱悶心煩氣上喘滿肩息腿痺緩縱不隨

半夏 湯去滑 乾葛 細辛 白朮

茯苓 桂心 不見火 防風 乾姜 炮

黃芩 甘草 炙 柴胡

麥門冬 去心各三分

右判散每服四大錢水一饑半姜三片棗一個剪七分去滓空腹服熱酒加竹瀝每服半合喘滿加杏仁桑皮

料簡三陽并合脚氣

三陽經有并合如太陽并少陽小陽併陽明陽明并太陽

三陽合病皆於經絡中推改其診隨證治之所謂并者二經相并合者三經會合以此強分使名義易曉不必論其一二

三陽并合脚氣證治

病者憎寒壯熱自汗惡風或无汗惡寒暈眩重着關節掣痛手足拘牽疼痛冷痺緩縱不随心躁氣上嘔不食下利口三陽經中風寒暑濕其脉必浮弦緊數

大料神祕左經湯治風寒暑濕流注足三陽經手足拘牽疼痛行步艱難憎寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛或卒

中昏塞大小便秘澀或腹痛嘔吐下利惡聞食臭解腿頑痺緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿肩息

- 麻黃 去節
- 乾葛
- 細辛
- 厚朴 姜製
- 茯苓
- 防己
- 枳殼 麩炒
- 桂心
- 羌活
- 防風 去叉
- 柴胡
- 黃芩

小草

白姜 炮

半夏 湯洗

甘草

麥門冬 去心各等分

右剉散每服四大錢水盞半姜三片棗一个剪七分去滓空腹服自汗加牡礪白朮去麻黃腫滿加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻腹痛吐利去黃芩加芍藥附子炮大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘘所加並等分凡有此病詳認證狀逐一加減無不愈者常服下氣消痰散風濕退腫進飲食令人不虛江南諸師固秘此方雖父子兄弟不傳予者當敬用之加味敗毒散治三陽經脚氣流注脚踝上掀熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

- 羌活
- 獨活
- 前故
- 柴胡
- 枳殼 麩炒
- 桔梗
- 甘草 炙
- 人參

三陽合病皆於經絡中推攷其診隨證治之所謂并者二經相并合者三經會合以此強分使名義易曉不必論其一二

三陽并合脚氣證治
病者憎寒壯熱自汗惡風或无汗惡寒暈眩重着關節掣痛手足拘牽疼痛冷痺緩縱不随心痛口不利此皆三陽經中風寒暑濕其脉必浮弦緊數

大料神祕左經湯治風寒暑濕流注足三陽經手足拘牽疼痛行步艱難憎寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便秘澀或腹痛嘔吐下利惡聞食臭解腿頑痺緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿肩息

- 麻黃 去節
- 茯苓
- 羌活
- 防己
- 防風 去叉
- 細辛
- 枳殼 麩炒
- 柴胡
- 厚朴 善製
- 桂心
- 黃芩

- 小草
- 白姜 炮
- 半夏 湯洗
- 甘草

麥門冬 去心各等分

右剉散每服四大錢水盞半姜三片棗一个剪七分去滓空腹服自汗加牡礪白朮去麻黃腫滿加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻腹痛吐利去黃芩加芍藥附子炮大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘗所加並等分凡有此病詳認證狀逐一加減無不愈者常服下氣消痰散風濕退腫進飲食令人不虛江南諸師固秘此方雖父子兄弟不傳學者當敬用之
加味敗毒散治三陽經脚氣流注脚踝上掀熱赤腫寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

- 羌活
- 獨活
- 前故
- 柴胡
- 枳殼 麩炒
- 桔梗
- 甘草
- 人參

茯苓 川芎 大黃蒸 蒼木米泔浸 各等分

右判散每服四大錢水盞半姜三片薄荷一頭煎七分去滓挾服不過二服愈皮膚瘙癢赤疹加蟬蛻

太陰經脚氣證治

病者腹滿夾咽連舌系急胃膈痞滿附子股膝內前廉內踝過核骨後連足大指之端內側皆痛者乃足太陰脾經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重溫散之

六物附子湯治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急

自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面手足時時浮腫

附子炮去 桂心各四兩 白朮三兩 甘草炙二兩 防已四兩 茯苓三兩

右判散每服四錢水二盞姜七片七分去滓溫服

少陰經脚氣證治

病者腰脊痛小指之下連足心循內踝入跟中上膈內出膈中內廉股內皆痛上衝胃咽飢不能食面黑小便淋閉咳唾不已善恐心惕若人將捕之狀小腹不仁者難治足少陰腎經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重而溫之

八味圓治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自

汗比證最急以腎乘心水剋火

牡丹皮 澤瀉 茯苓各三兩 附子炮去 皮臍 桂心各二兩 山茱萸 山藥各四兩 熟地黃八兩

右為末煉蜜圓梧子大每服五十元溫酒米湯食前送

下

厥陰經脚氣證

腹臍下

茯苓 川芎 大黃 蒼木 米泔浸 各等分

右判散每服四大錢水盞半姜三片薄荷一頭煎七分去滓服不過二服愈皮膚瘙癢赤疹加蟬蛻

太陰經脚氣證治

病者腹滿夾咽連舌系急循肘骨下股膝內前廉內踝過核骨後連足大指之端內側皆痛者乃是太陰脾經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重溫散之

六物附子湯治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急

自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面手足時時浮腫

附子 炮去 各四 桂心 各四 白木 三兩 甘草 炙二兩 防已 四兩 茯苓 三兩

右判散每服四錢水二盞姜七片七分去滓溫服

少陰經脚氣證治

病者腰脊痛小指之下連足心循內踝入跟中上膈內出膈中內廉股內皆痛上衝胃咽飢不能食面黑小便淋閉咳唾不已善恐心惕若人將捕之狀小腹不仁者難治足少陰腎經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重而溫之

八味圓治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自

汗此證最急以腎乘心水射死旋踵

牡丹皮 澤瀉 茯苓 各三 附子 炮去 皮臍 桂心 各二兩 山茱萸 山藥 各四 熟地黃 八兩

右為末煉蜜圓梧子大每服五十元溫酒米湯食前送

下

厥陰經脚氣證

少陰

病者腰股偏疼從足大指連足趾上廉上脛至內廉循股內
陰氣抵小腹夾臍諸處脹痛兩脚牽急噓乾嘔逆洞泄者是
厥陰肝經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之
各隨其氣所中輕重調理之

神應養真丹治厥陰肝經為四氣進襲肝藏左癱右瘓涎潮
昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澁頭眩目眩牙關緊急
氣喘自汗心神恍惚肢躄緩弱上攻頭目下注脚膝呆氣
凝滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓及張墮車落馬
打撲傷損瘀血在內

當歸 酒浸

天麻

川芎

羌活

白芍藥

熟地黄

各等分 一法无羌活 入木瓜 阿膠等分

右為末蜜圓如雞子黃大每服一圓木瓜兔絲子浸酒
下脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒未渴下

料簡三陰并合脚氣

傷寒三陽有并合三陰無并合藏腑不同故也亦自不妨傳
變脚氣則不然以久滯藏氣隨其虛實寒熱而流注故病多
并合不可不知

三陰并合脚氣治法

抱龍圓治肝腎藏虛風濕進襲流注腿膝行步艱難漸成風
濕脚氣足心如火上氣喘急小腹不仁全不進食

赤小 四兩

五靈脂

白膠香

破故紙 炒

狗脊 炒

木鱉 去殼

海桐皮

藏靈仙

地竜

草烏

右各一兩為末酒糊為丸如梧子大辰砂為衣每服五
十圓空心鹽酒任下

川膝莖治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝歷節疼痛如

病者腰肢偏疼從足大指連足趾上廉上膕至內廉循股內
陰氣抵小腹夾臍諸處脹痛兩脚牽急溢乾嘔逆洞泄者是
厥陰肝經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之
各隨其氣所中輕重調理之

神應養真丹治厥陰肝經為四氣進龍肝藏左癱右瘓涎潮
昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澀頭旋目眩牙關緊急
氣喘自汗心神恍惚肢躄緩弱上攻頭目下注脚膝呆氣
凝滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓反張墮車落馬
打撲傷損瘀血在內

當歸 酒浸

天麻

川芎

羌活

白芍藥

熟地黃

各等分 一法无羌活 入木瓜 阿膠等分

右為末蜜圓如雞子黃大每服一圓木瓜兔絲子浸酒

下脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒米湯下

料簡三陰并合脚氣

傷寒三陽有并合三陰無并合截腑不同故也亦自不妨傳
變脚氣則不然以久滯截氣隨其虛實寒熱而流注故病多
并合不可不知

三陰并合脚氣治法

抱龍圓治肝腎藏虛風濕進龍流注腿膝行步艱難漸成風
濕脚氣足心如火上氣喘急小腹不仁全不進食

赤小 四兩 炒

五靈脂

白膠香

破故紙 炒

狗脊 炒

木 散

白膠香

藏靈仙

地竜

草烏

右各一兩為末酒糊為丸如梧子大辰砂為衣每服五
十圓空心鹽酒任下

川膝莖治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝歷節疼痛如

錐刀鍛刺不可名狀

大烏頭

十個端正者搥研以紙袋盛用烏豆一斗藉蒸一日取出去豆不用去皮尖

牛膝

二兩去

右二味並不得見銅鐵器及火与日木臼搗碎牛膝再

入石磨中磨為末酒糊丸梧子大每服四十回用无灰

酒一瓶中椽木瓜一个切作片入瓶中煨木瓜爛為度

用此酒下不拘時候然肝氣惡鐵忌則有之不見火日

此好事者安忌忌器牛膝採時豈一向陰乾也

十全丹治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩渴小

便或秘或利閉節牽痛神效不可具述

椽一個 但不

菴蓉

酒浸

石斛

酒浸

狗脊

去毛

茯苓

牛膝

地仙子

遠志

熟地黄

杜仲

草薢

右為末蜜元梧子大每服五十九丸温酒鹽湯任下

疼

乳香宣經回治脉虛為風温寒襲四氣相搏半身不遂手足

頑麻骨節煩疼足胫浮腫惡寒發熱漸成脚氣肝腎不足

四肢牽急遍身攻注或閃胸打撲内傷筋骨及風邪内搏

男子疝氣婦人經脉不調常服活血止痛補虛壯筋骨

藏靈仙

烏藥

茴香

川練子

牽牛子

橘皮

草薢

防風

五苓脂

乳香

草烏

右為末酒糊丸梧子大每服五十九元鹽酒鹽湯任下婦

人醋湯下食前

大犀角圓治脾胃經脚腫腫痺小腹頑麻上攻頭面通身洪

腫小便不利上集喘滿悶絕欲死

犀角

鎊

黃芩

各二

旋覆花

略炒

白木

桂心

不焙

防已

各二

香豉

略炒

橘皮

錐刀鍛刺不可名狀

大烏頭

十斤端正者搥研以紙袋盛用烏豆一斗藉蒸一日取出去豆不用去皮尖

牛膝

二兩去

右二味並不得見銅鐵器及火与日本臼搗碎牛膝入石磨中磨為末酒糊丸梧子大每服四十回用无灰酒一瓶中椽木瓜一个切作片入瓶中煨木瓜爛為度用此酒下不拘時候然肝氣惡鐵忌則有之不見火日此好事者

十全丹治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩渴小便或秘或利關節痛神效不可具述

茯苓

酒浸

石斛

酒浸

狗脊

去毛

草薺

茯苓

牛膝

酒浸

地仙子

遠志

去心炒

熟地黄

三兩

杜仲

去皮剉炒三兩

右為末蜜元梧子大每服五十九丸温酒鹽湯任下

疼

乳香宣經山治脉虛為風温寒襲四氣相搏半身不遂手足頑麻骨節煩疼足胫浮腫惡寒發熱漸成脚氣肝腎不足四肢牽急遍身攻注或閃胸打撲內傷筋骨及風邪內搏男子疝氣婦人經脉不調常服活血止痛補虛壯筋骨

藏靈仙

洗去芦

烏藥

去木

茴香

炒

川練子

剉炒

牽牛子

炒

橘皮

去白

草薺

防風

各二兩

五苓脂

乳香

各半兩

草烏

黑豆一合同煮竹刀切首透黑為度去皮焙研半兩

右為末酒糊丸梧子大每服五十九丸鹽酒鹽湯任下婦人醋湯下食前

大犀角圓治脾胃經脚腫痺小腹痛頭麻上攻頭面通身洪腫小便不利上集喘滿悶絕欲死

犀角

黃芩

旋覆花

白木

桂心

防已

香豉

橘皮

犀角

不焙

各二兩

略炒

茯苓 各三兩 前胡 桑白皮 各四兩 紫蘇葉 各四兩

右為對散每服四錢水一錢半姜五片棗兩枚煎七分去滓食前喘加杏仁

四蒸木瓜圓治肝脾三經氣虛為風寒濕搏着流注經絡竭日曠歲治療不痊凡遇六化更變七情不寧必至鼓動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗

藏靈仙 苦葶麻 黃芪 續斷 蒼朮 橋皮 烏藥 去木身黃

右各半兩以大木瓜四個切蓋去穢入前件藥仍用蓋簍定酒洒蒸熟三蒸三賺取藥出焙乾為末研瓜為膏搜和搗千杵圓如梧子大每服五十元空心溫酒鹽湯任下世傳木瓜丸最多惟此方有效當敬之黃松節即茯苓中木

追毒湯治肝脾腎三經為風濕寒熱毒氣上攻陰陽不和四

肢拘牽上氣喘滿小便秘澀心熱煩渴遍身浮腫脚弱

半夏 四兩 黃芪 炙 當歸 炙 人參 善汁製 獨活 各一兩

熟地黃 芍藥 枳實 炙炒 麻黃 去節

桂心 不焙 貝子 二十

右為對散每服四錢水一錢半姜七片棗三個煎七分去滓空心溫服日三夜一

脚氣抱治

千金脚氣論在諸風之前良有以也方論雖多識病者少或竟之傷晚或狐疑不決枉死者半信不誣矣凡有此證最宜急治緩則入腹攻五藏雖神丹亦无如之何又久患續生諸病如大小便不利腫滿飲食傷等不妨別為治所謂先去新病當在後若抱而治之則亦廉平其可也

烏葉平氣湯治脚氣上攻喘滿及五藏偏勝諸氣不和喘咳
奔衝坐卧不安頭暈脚弱上實下虛

烏葉 去木

人參

白朮

川芎

當歸

伏神 去木

甘草 炙

白芷

木瓜乾

五味子

紫葳子 各等分

右為劉散每服四錢水一觥半姜五片棗兩枚炙七分
去滓溫服或作細末湯喫下

紫葳子湯治脚弱上氣陰陽交錯清濁不分上重下虛中滿
喘急嘔吐自汗无復紀律千金云宋湘王在南州患脚氣

困篤服此得效

紫葳子 略炒

半夏 湯洗各

前故 去苗

厚朴 去皮製

甘草 炙

當歸 各二兩

桂心 不見火

橘皮 各三兩

右為劉散每服四錢水二觥姜七片棗兩個炙七分去

滓食後服人謂俞山人降氣湯是也好事者復加附子

黃芪又改其分兩亦班入太醫方用者宜知之

木瓜牛膝圓治寒濕脚氣冷濕下注脚弱无力或腫急疼痛

兼治婦人血風大固腎氣活血壯筋絡

木瓜

大者三四个切開蓋去穢先用糯米將過鹽焙乾為末却將鹽末入瓜內令滿仍用蓋針定蒸三次爛研作膏

川烏

大者去皮尖用无灰酒一升浸薄切酒煮乾研為膏三兩

牛膝 酒浸

草薢

茴香 炒

羌活 蒸八兩

青皮

青鹽 別研入

狗脊 燎去毛

巴戟

海桐皮 九件各一兩

右為末入青鹽和勻將前二膏搜為丸如硬再入酒杵
教干下圓梧子大每服伍十九食前鹽湯鹽酒任下

菜蔓圓治脚氣入腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸 湯洗

木瓜 去穢切

右等分為末酒糊丸如梧子大每服五十九至百四酒

烏藥平氣湯治脚氣上攻喘滿及五藏偏勝諸氣不和喘咳
奔衝坐卧不安頭暈脚弱上實下虛

烏藥 去木

人參

白朮

川芎

當歸

伏神 去木

甘草 炙

白芷

木瓜乾

五味子

紫蘘子 各等分

右為劉散每服四錢水一觥半姜五片棗兩枚炙七分

去滓溫服或作細末湯喫下

紫蘘子湯治脚弱上氣陰陽交錯清濁不分上重下虛中滿

喘急嘔吐自汗无復紀律千金云宋湘王在南州患脚氣

困篤服此得效

紫蘘子 略炒

半夏 湯洗各

前故 去苗

厚朴 去皮製

甘草 炙

當歸 各二兩

桂心 不見大

橘皮 各三兩

右為劉散每服四錢水二觥姜七片棗兩個炙七分去

滓食後服人謂俞山人降氣湯是也好事者復加附子

黃芪又改其分兩亦班入太醫方用者宜知之

木瓜牛膝圓治寒濕脚氣冷濕下注脚弱无力或腫急疼痛

兼治婦人血風大固腎氣活血壯筋絡

木瓜

大者三四个切開蓋去穢先用糯米將過鹽焙乾為末却將鹽末入瓜內令滿仍用蓋針定蒸三次爛研作膏

川烏

大者去皮尖用无灰酒一升浸薄切酒煮乾研在膏中三兩

牛膝 酒浸

草薢

茴香 炒

羌活

青皮

青鹽 別研入

狗脊 燎去毛

巴戟

海桐皮 九件各一兩

右為末入青鹽和勻將前二膏搜為丸如硬再入酒杵

教干下田梧子大每服伍十九食前鹽湯鹽酒任下

菜蔓圓治脚氣入腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸 湯洗

木瓜 去穢切

右等分為末酒糊丸如梧子大每服五十九至百四酒

飲任下或以木瓜蒸爛研膏為丸尤妙
黑附圓治乾濕脚氣

附子 八錢重 去皮 黑豆 半斤入甕瓶內慢火 煮以附子研為

右熟豆一合同附子研為餅焙乾為末煉蜜為丸如皂
角子大每服兩回空心麝香酒嚼下

木通散治脚氣脹補藥太過小便不通淋閉臍下脹

當飯 梔子仁 炒 赤芍藥 赤茯苓

甘草 生各一兩

右為散每服三錢水一盞煎七分去滓服

白皮小豆散治脚氣小便淡兩脚腫氣脹

赤小豆 半升 菜白皮 二兩 紫蘗 一握 生姜 半兩

右剉散水三升煮豆熟取豆食去滓仍取餘汁飲之

勝駿圓治元氣不足真氣虛弱及諸虛寒濕氣進龍衣手足拳

牽脚指連脚面拘急走注疼痛筋脉不伸行步不隨常服

益真氣壯筋骨黑髭鬚滑皮膚一切足弱鶴膝諸凡

附子 一枚炮 去皮 當飯 酒浸 一宿 天麻 酒浸 牛膝 酒浸

酸棗仁 炒 熟地黄 酒浸 防風 去火各 二兩 木瓜 四兩

乳香 半兩 別研 麝香 別研 全蝎 去毒 木香

沒藥 別研 羌活 甘草 炙各 一兩

右件為細末用生地黄三斤淨洗研爛如泥入無灰酒

四升煮爛如膏以前藥勻和杵令堅每兩作十回每服

一丸細嚼隨卧睡下地黄膏春夏極多遇冬或無地黄

只煉蜜為丸如梧子大每服五十九鹽湯溫酒下

加減法

檳榔 革薺 茯苓 酒浸 破故紙 炒

巴戟 去木

右五味各添一兩內熟地黄當歸各減一兩尤妙如服
此藥五七日或半月日見效其速行步如飛千里可至
乃名勝駿

換腿圓治足三陰經虛為風寒暑濕進龍韋痺緩弱上攻胃
胆肩背下注脚膝疼痛漸成風濕脚氣行步艱難足心如
火上氣喘急全不進食

石南

天南星

炮

石斛

酒浸

牛膝

酒浸

羌活

蒼朮

炒

防風

去又草

革薢

黃芪

蜜炙

天麻

當歸

續斷

各兩半

木瓜

四兩

檳榔

二兩半

右為末酒煮麩糊為丸如梧子大每服五十丸空心溫
酒鹽湯任下

三因極一病證方論卷之三

三因極一病證方論卷之四

叙傷風論

經云春傷風夏飡泄此乃四時之序也或表中風在經絡中
循經流注以日傳變與傷寒無異但寒泣血無汗惡寒風散
氣有汗惡風為不同仲景正以此格量太陽經傷寒傷風用
藥不同而纂集者不識門類遂雙編二證使後季混濫率不
知故甚者以傷風暑濕時氣疫疹凡曰太陽病者皆謂之傷
寒晉人經類皆如此固不足道但名義乘錯或於後世不
可不與之辨今別立傷風一門於四淫之前具依先哲以太
陽為始分注六經季者當自知

傷風證治

足太陽膀胱經傷風有汗惡風不惡寒頭項強腰脊痛以其
脉從顛入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊核腰中故太陽

諸證如是治之宜桂枝湯

桂枝湯治太陽傷風脈浮陰弱榮弱衛強頭痛鼻鳴乾嘔

發熱自汗惡風或煩熱汗出則解有如瘧狀脈浮洪虛者

桂枝 去皮 芍藥 各一兩半 甘草 各一兩

右以咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食前服溫覆

令遍身微汗愈或滯汗不止惡風小便難四肢拘急

者加孰附子一分或項背強元元及汗出惡風者加葛

根一兩三錢或汗出後身疼痛脈沈遲者加芍藥生姜

各半兩人參一兩半或下後脈促胃滿者去芍藥若微

寒乃加附子或下後頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿

微痛小便不利者去桂加茯苓白朮各一兩半太陽外

證未除而教下之挾熱利不止心下痞硬表裏不解加

人參一兩或下之微喘者加厚朴六錢三字杏仁十七

粒因燒針令汗針處被寒核起而未必發奔豚矣其後

各一壯加桂一兩與服因燒針煩躁者去芍藥減桂一

兩牡蠣龍骨各一兩可代救逆湯

足陽明胃經傷風口燥煩渴自汗嗜卧身重小便難以其脈

俠鼻絡目下睛屬胃絡脾俠臍入柔術故陽明諸證如是治

之宜杏子湯

杏子湯治陽明傷風能食口苦咽乾腹滿微喘發熱惡風自

汗嗜卧身重小便難潮熱而噦其脈浮弦長而教悉主之

杏仁 去皮尖 半夏 湯去滑 五味子 各二錢半 芍藥

桂心 細辛 乾姜 炮 大黃 蒸

甘草 各三錢 茯苓 四錢

右以咀每服四錢水一盞半煎至五分去滓食前服

足少陽膽經傷風身熱惡風自汗項強股滿以其脈起於目

諸證如是治之宜桂枝湯

桂枝湯治太陽傷風脈浮陰弱榮弱衛強頭痛鼻鳴乾嘔

發熱自汗惡風或煩熱汗出則解有如瘧狀脈浮洪虛者

桂枝

去皮

芍藥

各一兩半

甘草

各一兩

右以咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食前服溫覆

令遍身微汗發滯漏不止惡風小便難四肢拘急

者加孰附子一分或項背強元元及汗出惡風者加葛

根一兩三錢或汗出後身疼痛脈沈遲者加芍藥生姜

各半兩人參一兩半或下後脈促胃滿者去芍藥若微

寒乃加附子或下後頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿

微痛小便不利者去桂加茯苓白朮各一兩半太陽外

證未除而教下之挾熱利不止心下痞硬表裏不解加

人參一兩或下之微喘者加厚朴六錢三字杏仁十七

粒因燒針令汗針處被寒核起而未必發奔豚矣其後

各一壯加桂一兩與脂因燒針煩躁者去芍藥減桂一

兩牡蠣龍骨各一兩可代救逆湯

足陽明胃經傷風口燥煩渴自汗嗜卧身重小便難以其脈

俠臯絡目下腫屬胃絡脾俠臯入系衝故陽明諸證如是治

之宜杏子湯

杏子湯治陽明傷風能食口苦咽乾腹滿微喘發熱惡風自

汗嗜卧身重小便難潮熱而喘其脈浮弦長而教悉主之

杏仁

去皮尖

半夏

湯去滑

五味子

各二錢半

芍藥

桂心

細辛

乾姜

炮

大黃

蒸

甘草

各三錢

茯苓

四錢

右以咀每服四錢水一盞半煎至五分去滓食前服

足少陽膽經傷風身熱惡風自汗項強肢滿以其脈起於目

充皆上抵頭角交出入欽盆下胃中贖絡肝循胆裏出氣衝
合解厭中故少陽諸證如是治之宜柴胡加桂湯

柴胡加桂湯治少陽傷風四五日身熱惡風頸項強服下滿
手足溫口苦而渴自汗其脈陽浮陰弦或發汗多亡陽謔
語可以此和其榮通八通津液自愈

柴胡一兩 半夏半兩 甘草一兩 芍藥三兩

黃芩半兩 人參一兩 桂各半兩

右咬咀每服五錢七水一盞半姜五片棗一個剪七分
去滓食前溫

足太陰脾經傷風自汗胃滿脹痛四肢倦怠以其脈入腹絡
胃上膈俠咽連舌本散舌下故太陰諸證如是治之宜桂枝
芍藥湯

桂枝芍藥湯治太陰傷風自汗咽乾胃腹滿自利不渴四肢

肢倦怠手足自溫其脈弦大而緩者

桂心半兩 白芍藥三兩

右咬咀每服五錢七水一盞半姜三片棗一個剪七分
去滓溫服腹痛甚者大黃一兩

足少陰腎經傷風口燥舌乾咽痛胃滿心煩自汗腰連胛骨
酸痛以其脈貫脊屬腎上貫肝蕪入肺中循喉嚨俠舌本故
少陰諸證如是治之宜桂附湯

桂附湯治少陰傷風胃滿心煩咽喉痛自汗腰疼連胛骨酸
痛嘔吐涎沫頭痛其脈沈弦者

附子生去皮臍 桂心 乾姜 芍藥

甘草炙 茯苓 桃仁去皮尖麩

右咬咀每服四錢水二盞剪七分去滓食前服或咽喉
痛加桔梗

充皆上抵頭角交出入欬益下胃中贖絡肝循胆裏出氣衝
合解厭中故少陽諸證如是治之宜柴胡加桂湯

柴胡加桂湯治少陽傷風四五日身熱惡風頸項強眩下滿
手足溫口苦而渴自汗其脈陽浮陰弦或發汗多亡陽謬
語可以此

柴胡 一兩

半夏 半兩

甘草 一兩

芍藥 半兩

桂枝 半兩

黃芩

人參

桂

右咬咀每服五錢匕水一盞半姜五片棗一個剪七分

去滓食前溫

足太陰脾經傷風自汗胃滿脹痛四肢倦怠以其脈入腹絡
胃上膈俠咽連舌本散舌下故太陰諸證如是治之宜桂枝
芍藥湯

桂枝芍藥湯治太陰傷風自汗咽乾胃腹滿自利不渴四肢

肢倦怠手足自溫其脈弦大而緩者

桂心 半兩

白芍藥 三兩

右咬咀每服五錢匕水一盞半姜三片棗一個剪七分

去滓溫服腹痛甚者大黃一兩

足少陰腎經傷風口燥舌乾咽痛胃滿心煩自汗腰連胛骨
酸痛以其脈貫脊屬腎上貫肝蒂入肺中循喉嚨俠舌本故
少陰諸證如是治之宜桂附湯

桂附湯治少陰傷風胃滿心煩咽喉痛自汗腰疼連胛骨酸
痛嘔吐涎沫頭痛其脈沈弦者

附子 生去皮臍

桂心

乾姜

芍藥

甘草 炙

茯苓

桃仁 去皮尖麩

杏仁 炒各一兩

右咬咀每服四錢匕水二盞剪七分去滓食前服或咽喉
痛加桔梗

足厥陰肝經傷風自汗惡風而勸小腹急痛以其脈循股入
毛中還陰器抵小腹俠胃絡膈布膜與督脈會故厥陰諸證
如是治之宜八物湯
八物湯治厥陰傷風惡風而勸自汗小腹急痛寒熱如瘧骨
節煩疼其脈尺寸俱微而遲者

桂心

當歸

川芎

前胡

防風

芍藥

甘草

茯苓

右改咀每服四錢水一盞半姜五片棗三個藥八分去
滓食前服

叙傷寒論

論云冬傷於寒春為溫病以冬不即病其寒毒藏於風府之
上至春溫煖之氣發而為病故曰溫病或愈或死死則六七
日間愈則多出旬日之外世號為大病要當隨此經終傳變

論八經

仍以脈證別之乃可施治治傷寒法蓋盡於此至晉集仲景
論於大陽經出麻黃桂枝二方治傷寒傷風并錄預備救失
加減之法甚詳至陽明少陽與三陰經傷風證治則淺聞矣
故知仲景只就太陽一經格量二病令勿差互編集既不詮辨
後季惜無所知昏翳曲墳千有餘載畧不加省良可嘆息今
輒提其六經傷寒合用對治諸方以為宗北其如壞證治法
除各見本門外編集于後使皂白自分初不敢取諸會臆蓋
有所本於聖經也

傷寒辨正

內經論傷寒惟說足三陰三陽六經傳受愈否日數及各隨
其藏府經絡流注去處而證以行汗下并兩感脈應病取而
已至張長沙以伊尹湯液作治法兼述傷風暑濕等詳畧不
同格量互顯使後季奉隅而反至晉不解其義隨行編集遂

行於世此後貽襲者不可勝計 謂百問證治提綱目錄撮
要備全活人書傷寒論乃至圖形指脉皆剽採晉集初無及
隅雖有意於廣傳皆未明其義類緣晉集不識偏正以此類
預備之方難於正治而正治之方多所簡脫故使典籍愈繁
後季固封不削繁蕪固知樞要因別論千後

傷寒證治

足太陽膀胱經傷寒頭項強腰脊痛無汗惡寒其經絡流注
去處与傷風同但脉浮洪緊數為異耳惟足太陽寒水為諸
陽主氣故寒先傷之

麻黃湯治太陽傷寒脉浮緊而數頭痛身疼發熱惡寒無汗
曾滿而喘者

麻黃 去節

桂心 各一兩

甘草 炙半兩

杏仁 二十粒

右以咀每服伍錢水一盞半煎八分去滓食前服覆取

微汗夏則加知母半兩石膏一兩黃芩一分或汗出後
與大熱而喘者去桂加石膏四兩

小青龍湯治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴
或利或噎或小便不利小腹滿而喘者

麻黃 去節

細辛 去苗

乾姜 炮

甘草 炙

桂心

芍藥 各三兩

半夏 湯去滑

五味子 各二兩半

右以咀每服五錢水二盞煎八分去滓食前溫服噎者
去麻黃加熟附子一錢若小便不利小腹滿者加茯苓
一錢喘者加杏仁七枚去皮尖

溫粉凡發汗不欲多多則亡陽宜用此粉撲之即愈效如神

白朮

藁本

川芎

白芷

右為末每末一兩入米粉三兩和勻撲之

大青龍湯治太陽中風傷寒脉緊發熱惡寒身疼不汗出而

煩渴或脉浮緩身不疼但重乍有輕時或傷寒見風脉傷
凡見寒脉

麻黃 去節 三兩

桂心

甘草 炙各 一兩

杏仁 去皮尖 一兩

石膏 一兩

右為散每服五錢七木一觔半姜五片棗一个煎七

分去滓食前服

足陽明胃經傷寒身熱目痛而鼻乾不得卧不惡寒腹滿咽
乾口燥而渴其脉流注与傷風日以陽明主由故次傳之

大承氣湯治陽明傷寒脉長身熱不惡寒目疼鼻乾不得卧

腹滿咽乾渴大便硬譫語或汗後脉沈實或下利心下堅
或已經下其脉按之浮沈尚有力者

大黃 酒洗 半兩

芒消 一分別 研入

厚朴 姜製 一兩

枳實 一分別 炒去穢

右為末每服五錢水二盞變八分去滓入消并煎服

若淋遲而滑汗出身重時發潮熱并得病二三日無太

陽證煩躁心下硬下利後譫語者去芒消名小承氣或

發汗不解蒸蒸發熱温温欲吐胃中痛大便反澹及吐

利後腹脹厥煩譫語去厚朴枳實大便秘入甘草半兩酒

一分並名調胃承氣或結熱膀胱如狂狀下血小腹急結

者去厚朴枳實加桃仁十二个桂甘草各半兩消一分

名桃核承氣

大柴胡湯治證狀大畧与大承氣湯同輕則柴胡重則承氣

柴胡 四兩

黃芩

赤芍藥 各 一兩 湯去滑

枳實 一分 炒

右為末每服三大錢水一盞半姜五片棗一枚煎八

分去滓食後温服若内熱裏實身熱疼痛是表證未解

不可服

足少陽膽經傷寒胃脘痛耳聾口苦咽乾往來寒熱目眩乾嘔其脈流注与傷風同以少陽主膽屬半表半裏故三傳之小柴胡湯治少陽傷寒脈弦或沈緊往來寒熱胃脘苦滿噤噤不欲食心煩喜嘔或渴腹痛或腹下痞鞭或心悸小便不利或咳有微熱亦有不渴不嘔者又治婦人傷風傷寒經水適折發熱惡寒晝日明了暮則譫語此為熱入血室其血必結故使如癰狀得七分熱除脈遲身涼胃滿譫語如結會狀前刺期門隨其實而取之投此湯即愈又大陽病不解轉入少陽并陽明傷寒脈及弦浮身目赤黃小便難潮熱時噦

柴胡 二兩

半夏

湯笑滑六錢一字 黃芩

人參

甘草 各三分

右為剉散每服五錢水一盞半生姜五片棗一枚煎七分

分去滓食前服若腹痛去黃芩加芍藥三分心下悸小便不利加茯苓一兩若不渴則有微熱去人參加桂三分若咳嗽去棗加五味子三分乾姜半兩胃中煩不嘔者去半夏加枳實一枚四分之一若渴去半夏加枳實根一兩胃中痞鞭去棗加牡蠣一兩若過經不解日晡發熱已而微利加芒消一兩

足大陰脾經傷寒手足溫自利不渴腹滿時痛咽乾其脈流注與傷風同治之各有正方

治中湯治大陰傷寒手足溫自利不渴腹滿時痛咽乾其脈尺寸俱沈細

人參

乾姜 炮

白朮

甘草 炙

陳皮

青皮 各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

五積散治太陰傷寒脾胃不和及有積聚腹痛

蒼朮 泔浸一宿 二十兩 桔梗 十兩 陳皮 六兩 白芷

甘草 炙各 三兩 當歸 二兩 川芎 一兩半 芍藥

白茯苓 湯去滑 各一兩 麻黃 去節 春夏二

乾姜 春夏兩半 秋冬二兩 枳殼 湯浸去穢 剉炒四兩 厚朴 姜剉炒 二兩 桂心 春夏三兩 秋冬四兩

右先將前十二味吹咀微炒令香取出當風涼之入後枳殼桂朴三味同為細末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分食前溫服傷寒手足逆冷自汗不止脉沈細面青嘔逆加順元散一錢日煎熱服產婦陳踈難產經三兩日不生胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澀加順元散水七分酒三分煎相繼兩服氣血內和即羗胎死者不過三服當下其順元散多少量產母虛實加減傷寒發熱俠內寒者加葱白二寸豉七粒同煎相繼

服當以汗解

順元散

烏頭 炮去皮 尖二兩 附子 炮去皮臍 一兩 天南星 炮各 一兩 木香 半兩

右為末同煎法並此藥治內外感寒脉沈伏遲細手足冷毛髮拘攣傷寒陰證大噉一二盃氣和汗出即愈

足少陰腎經傷寒口燥舌乾而渴背惡寒及發熱倦怠其脉流注与傷風同

附子細辛湯治少陰傷寒口中和而背惡寒及發熱倦怠自汗而渴其脉尺寸沈而緊者

麻黃 去節 細辛 附子 炮去皮臍 各半兩

右麻末每脂四錢水一盞半煎七分去滓食前服手足厥者去麻黃細辛加乾姜半兩甘草一分或口燥舌乾而渴宜急下之

足厥陰肝經傷寒煩滿發熱惡寒往來如瘧或囊縮小腹急痛其脉流注与傷風同

本論用小建中湯方見九痛門去遠志即是

麻黃桂枝各半湯治厥陰傷寒煩滿發熱惡寒往來如瘧或囊縮其脉尺寸俱微緩者主之若脉沈短其囊必縮急以大承氣下之可保互死一生承氣湯乃利陽明藥耳若病到厥陰其勢已甚蓋陽明養宗筋為熱毒所攻乃以承氣湯瀉其能養故利陽以救陰此猶假虞伐虢圍魏救趙之意也

桂心 四錢 一字

芍藥

麻黃 去節

杏仁 十二个 去皮尖

甘草 炙各半兩

右麻末每服五錢水一饑半煎八分去滓食前服入姜

秦艽亦得

大承氣湯 方見足陽明經

小建中湯 方見九痛門

傷寒傳變次序

內經熱論之傷寒云太陽為諸陽主氣傷寒必先自太陽始至漢諸師凡外所因皆曰太陽病未為了義足太陽寒水其位居辰為六氣化原故丙辛遁起戊子至辰為壬辰水而太陽正化居与在天為寒在地為水寒喜飲水故寒必首傷太陽以此例推寒既自太陽入凡當自少陽入濕當自陽明入經曰陰為之主陽与之正別於陽者知病從來別於陰者知死生之期此之謂也或問傳變次序當如何邪然陰陽流行出入次序固有定說及其中病或喜入或成虛或成兩感或守一經其可拘也但當以脉證分別陰陽表裏盛衰為治尤不可以日數期也

料簡

論曰有汗不得服麻黃與汗不得服桂枝切忌不得悞若寒證見風脈風證見寒脈却以麻黃桂枝各半湯古人治傷風熱多寒少惡風脈浮緊無汗用青龍湯蓋先傷風而後傷寒風證尚在而寒脈已行故有是備也若先傷寒而後傷風寒多熱少不煩躁微厥脈當浮緩弱而自汗即傷寒見風脈但青龍緊暴不若各半湯平和無悔吝也諸經皆倣此

六經傷寒用藥格法

夫傷寒始自太陽逆傳陽明至于厥陰而止六經既別治法不同太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃者以麻黃生于中牟雪積五尺有麻黃處雪則不聚蓋此藥能通內陽棄却外寒也陽明屬胃非通泄則不愈必用大黃芒消以利之少陽屬膽無出入道柴胡與半夏能利能汗佐以子苓非此不解太陰屬脾中州土也往惡寒濕非乾姜白朮不能溫燥少

陰屬腎性畏寒燥非附子則不能溫厥陰屬肝藏血養筋非溫平之藥不能潤養此經常之道也後季不知倫類妄意進餌遂致錯亂諸證蜂起夫傷人命可不究辨且三陽病汗下和解人心知之至太陰脾經溫燥不行亦當溫利自陽明出如溫脾圓用大黃者是也少陰腎經雖用附子復使麻黃則知少陰亦自太陽出厥陰用桂自少陽出明矣及其二陽鬱閉昏當自陽明出故三陰皆有下證如少陰口燥咽乾下利清水太陰腹滿時痛厥陰舌卷囊縮皆當下之季者宜審詳不可率易投也

溫脾圓治久病虛羸脾氣弱食不消喜噫

黃蘗

大麥蘗

吳茱萸

桂心

乾姜

細辛

附子

當歸

大黃

神麩

黃連

右為未蜜和元如梧子大每服三十九空腹酒飲任下
三陽合病脉證治

三陽有合病三陰无合病所謂三陽合者有太陽人明有少
陽人明自太陽傳至陽明頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻
乾者陽明也尚惡寒脉必浮大而長浮者太陽脉也長者陽
明脉也當隨證調本之太陽證因發汗多則譫語屬陽明故有
太陽人明也少陽證未罷猶當和解不可便作陽明下之
葛根湯治太陽病項背強兀兀然无汗惡寒并治三陽合病

自利方

葛根 一两

麻黃

三分

桂心

半兩

甘草

炙

芍藥

各半兩

右剉散每服五錢匕木一觔半姜五片棗一枚炙七分
去滓食前溫服三陽合病不下利但嘔者加半夏六錢

兩感證論并治法

兩感傷寒者表裏俱病也一日太陽与少陰俱病頭痛口乾
咽滿而渴二日陽明与太陰病腹滿身熱不食譫語三日俱
少陽与厥陰俱病耳聾囊縮而厥兩病俱作治有先後先宜
救裏截氣內正急宜攻表救內固宜急而表亦不可緩也救
裏解表各隨諸證而善用之自非精妙甄別其孰能与於此
四逆湯治少陰傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便
不利或汗出過多脉微欲絕腹痛脹滿手足冷及一切虛
寒厥冷凡病傷寒有此證候皆由陽氣虛有寒宜更覓頭
痛躄疼發熱惡寒四肢拘急表裏悉具者未可攻表宜先
服此藥以助陽救裏

甘草

炙一分

乾姜

二錢炮

附子

炮去皮
臍半兩

右剉散每服五錢匕水一盞半棗七分去滓食前服強

人加乾姜一錢或惡寒脉微而利止仍亡血者加人參半兩或發汗若下之病仍不能解煩躁者仍加茯苓半兩面赤者加連翹葱九葉腹中痛者去葱加芍藥一兩嘔者加生姜一兩咽痛者去芍藥加桔梗半兩

兩感治法料簡

桂枝麻黃皆攻太陽經表藥方各見太陽經其如陽明大陰少陽厥陰並可於風寒二方論中隨證施治

陰毒證治

陰毒為病手足冷腰背強頭疼腹痛或煩渴精神恍惚額與手背時出冷汗音啞鄭重瓜甲面色青黑多因脾腎虛寒伏陰重感於寒所致
附子散治陰毒傷寒唇青面黑身重強四肢冷或因服冷藥過度心腹脹滿昏沈不識人

附子

炮去皮
臍三分

桂心

半兩

當歸

白朮

各半兩

半夏

湯洗
去滑

乾姜

各一分
炮

右為末每服三錢水二盞生姜三片煎六分不以時熱服衣覆取汗

返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷面青腹脹脉沈伏者

硫黃

通明五
兩別研

消石

別研

太陰玄精

各二兩
別研

乾姜

炮

桂心

各半兩

附子

炮
各半兩

右用錢鈔先鋪玄精次下消末各一半中間鋪硫黃末又將二兩餘末蓋上以小盞合着熨灰火三斤燒令得所勿令煙出急取尾並合着地上四面灰蓋勿令煙出候冷取出研細入後藥為末同研勻末糊圓如梧子大每服二三十丸煎艾湯下頓服汗出為度未退乃大着

艾姓灸臍下丹田氣海更不退則以葱熨之

治_之虛陽脫躄冷元脉氣息欲絕不省人事及傷

寒陰厥百藥不效者

葱一束以索纏如餅餡大去根葉唯存白長二寸許先
以火煨一面令通熱勿至灼人乃以熱處着病人臍下
上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四
餅遇一餅壞不可熨即易一餅候病人醒手足溫有汗
乃差更服四逆湯良

陽毒證治

陽毒為病躁熱面赤咽痛身斑色如綿紋下利赤黃內外結
熱舌焦鼻黑類如煙煤妄言狂走或賜腸_熱燥熱陽氣獨盛
陰氣暴絕妄服燥藥熱食所致
升麻湯治陽毒傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成

陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利面赤
班_人如錦紋咽喉痛下體血脉大浮數五日可治七日不
可治

升麻 半兩

犀角屑

射干

黃芩

人參

甘草 各一分

右為剉散每服五錢匕水一盞煎七分去滓熱服併進
三四服溫覆汗出為度

梔子仁湯治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子仁 炒

赤芍藥

大青

知母

升麻

黃芩

石膏

杏仁

柴胡 一兩半

甘草 各半兩

去皮尖
各二兩

右剉散每服四大錢水一盞姜三片豉二十粒同煎七
分去滓不以時服

艾姓灸臍下丹田氣海更不退則以葱熨之
法氣虛陽脫躄冷无脉氣息欲絕不省人事及傷
寒陰厥百藥不效者

葱一束以索纏如餅餡大去根葉唯存白長二寸許先
以火煨一面令通熱勿至灼人乃以熱處着病人臍下
上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四
餅遇一餅壞不可熨即易一餅候病人醒手足温有汗
乃差更服四逆湯良

陽毒證治

陽毒為病躁熱面赤咽痛身斑色如綿紋下利赤黃內外結
熱舌焦鼻黑類如煙煤妄言狂走因賜胃燥熱陽氣獨盛
陰氣暴絕妄服燥藥熱食所致
升麻湯治陽毒傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成

陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利面赤
班如錦紋咽喉痛下體血脉大浮數五日可治七日不
可治

升麻 半兩

犀角屑

射干

黃芩

人參

甘草 各一分

右為剉散每服五錢匕水一盞煎七分去滓熱服併進
三四服温覆汗出為度

梔子仁湯治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子仁 炒

赤芍藥

大青

知母

升麻

黃芩

石膏

杏仁

柴胡 一兩半

甘草 各半兩

去皮尖
各二兩

右剉散每服四大錢水一盞姜三片豉二十粒同煎七
分去滓不以時服

結胃證治

結胃證者心下堅滿按之石鞭而痛心芻高起手不得近項強如柔瘰狀此本傷寒身熱發汗下之早熱氣乘虛而入痞結不散之所致也若脉浮大皆不可下之則死尚宜發汗若沈緊者宜以大小陷胃湯量輕重而下之又結胃有不按而痛者有按而痛者有水結在胃脘間但頭汗出者有熱實結者有寒實結者治之不可不知其輕重也各正方

大陷胃湯治傷寒表未解發汗及下之芻內拒痛手不可近短氣煩躁心中懊憹心下鞭大便不通舌燥而渴熱實脉沈而緊又治身无大熱有水結在胃脘間者

大黃 半兩

芒消 四錢

甘遂 半錢

右各為末水三盞先煮大黃至一大盞入消煮鎔下甘遂末煮一沸分二服得利止

小陷胃湯治結胃病正在心按之則痛脉浮滑者

黃連 一分

半夏 湯洗去滑八錢

枳椇實 不用四分

右為剉散水二錢先煮枳椇至半盞入前藥煮至六分去滓分二服利黃涎沫即安

大陷胃圓治病發於陽而反下之熱入因作結胃以下之大早故也其病項強如柔瘰狀下之則和

大黃 二兩

葶藶 炒

杏仁 去皮尖炒

芒消 各三分

右前二味為末將杏仁芒消合研為脂和藥取如彈子大一枚別杵甘遂末一錢七白蜜一大匕水二盞煮至七分頓服之一宿乃下如不下更服取下為效甘遂性猛宜斟酌量實入之

胃痞證治

胃痞證者胃中不和心下堅硬乾嘔惡寒汗出噫氣不除亦

有因傷寒身冷醫及下之遂成骨痞
枳實理中湯治傷寒及諸吐利後胃痞欲絕膈高起急痛手
不得近

枳實

去穢 麸炒

茯苓

人參

白朮

乾姜

炮

甘草

炙各等分

右為末蜜和一兩作四圓熱湯化瀉瀉加枳椇根下利
加牡蛎粉各等分

枳椇根湯治中寒氣痞胃滿欲死

枳椇

去穢 麸炒 各一分

右為剉散每服五錢七水一盞半煎七分去滓食前服
三黃湯治傷寒陰證下之太早致心下痞按之輒其脉關上
浮者主之若表未解未可攻宜先隨風寒二證投桂枝麻
黃湯表解已即服此方

大黃

黃連

黃芩

右剉散每服五錢沸湯二盞熱漬之一時又去滓分為
二服暖服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合同服
半夏厚心湯治心下痞滿而不痛者

半夏

湯洗七枚 一兩一錢

黃芩

人參

甘草

炙

乾姜

炮各兩半

黃連

半兩

右剉散每服五錢水盞半姜五片棗一個煎七分去滓
溫服或傷寒中風醫及下之下利日數十行穀不化腹
中鳴心下痞硬乾嘔心煩者加甘草半兩人參一兩名
甘草厚心湯或汗出解後胃中不和心下痞硬乾嘔食
臭腹下水鳴下利者加生姜一兩減乾姜一兩餘如正
方名生姜瀉心湯

勞復證治

累減乾姜半兩

三黃湯之方

有因傷寒身冷醫反下之遂成骨痞
枳實理中丸治傷寒及諸吐利後胃痞欲絕膈高起急痛手
不得近

枳實去穢 麸炒 茯苓 人參 白朮

乾姜炮 甘草炙各等分

右為末蜜和一兩作四回下漏加桔樓根下利
加牡蛎粉各等分

桔梗枳殼湯治中寒氣痞胃滿欲死

桔梗 枳殼

右為剉散每服五錢七水一盞半煎七分去滓食前服
三黃湯治傷寒陰證下之太早致心下痞按之輒其脉關上
浮者主之若表未解未可攻宜先隨風寒二證投桂枝麻
黃湯表解已即服此方

大黃蒸 黃連 黃芩

果 減乾姜半兩

右剉散每服五錢沸湯二盞熱漬之一時又去滓分為
二服暖服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合日服
半夏厚心湯治心下痞滿而不痛者

半夏湯洗七枚 一兩一錢 黃芩 人參 甘草炙

乾姜炮各兩半 黃連半兩

右剉散每服五錢水盞半姜五片棗一個煎七分去滓
溫服或傷寒中風醫反下之下利日數十行穀不化腹
中鳴心下痞硬乾嘔心煩者加甘草半兩人參一兩名
甘草厚心湯或汗出解後胃中不和心下痞硬乾嘔食
臭腹下水鳴下利者加生姜一兩減乾姜一兩餘如正
方名生姜瀉心湯

勞復證治

傷寒新差後不能將攝因憂愁思慮勞神而復或梳沐浴洗浴作勞而復並謂之勞復或飲食不節謂之食復此皆大病後精神血氣腸胃並虛之所致也論有正方可依證調治唯犯房室為女勞復多死不治

白朮散治傷寒氣脈不和憎寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠粘痰嗽雍滯或冒涉風濕憎寒發熱骨節煩痛或中暑嘔吐眩暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初患者之治又治五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡卧不寧肢躄倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水藏府滑泄腹內虛鳴及胃吐逆心腹絞痛及瘧及利及腸氣咽塞下氣喘促坐卧不安或飲食所傷胃膈痞悶腹脹膜脹婦人產前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四時正之氣及小兒疳瘵疫神效不可具述

白芷

甘草

青皮

陳皮

白茯苓

桔梗

山藥

香附

乾姜

白朮

山藥

香附

不

右為末每服二錢七水一盞姜三片棗一個木瓜乾一片紫蘘二三葉莢七分食前服若吐瀉入白梅莢喘入桑白皮杏仁莢傷寒後復又入木通三寸麝香少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荊芥莢霍亂入藿香莢氣厥入鹽湯調下

陰陽易證治

陰陽易者其男子病新差未平復而婦人與之交接得病名曰陽易裏急腰膝連腹內痛婦人病新差未平復而男子與之交接得病名曰陰易身重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上衝會頭痛不欲舉眼中生花蓋男女病相換易故謂之陰陽

傷寒新差後不能將攝因憂愁思慮勞神而復或梳沐洗浴
作勞而後並謂之勞復或飲食不節謂之食復此皆大病後
精神血氣腸胃並虛之所致也論有正方可依證調治唯犯
房室為女勞復多死不治

白朮散治傷寒氣脈不和憎寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠粘痰
嗽雍滯或冒涉風濕憎寒發熱骨節煩痛或中暑嘔吐眩
暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初患者之治
五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡卧不寧肢躄倦怠潮熱
盜汗脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水藏府滑泄
腹內虛鳴及胃吐逆心腹絞痛及瘧及利及腸氣咽塞下
氣喘促坐卧不安或飲食所傷胃腸痞悶腹脹膜脹婦人
產前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四
時 正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

白芷

甘草

青皮

陳皮

白茯苓

桔梗

山藥

香附

乾姜 半兩

白朮 一兩

去毛各
三兩

右為末每服二錢七水一盞姜三片棗一個木瓜乾一
片紫蘘二三葉莢七分食前服若吐瀉入白梅莢喘入
桑白皮 後又薄荷膈氣入木通三寸麝
香少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荊芥
莢霍亂入藿香莢氣厥入鹽湯調下

陰陽易證治

陰陽易者其男子病新差未平復而婦人與之交接得病名
曰陽易裏急腰膝連腹內痛婦人病新差未平復而男子與
之交得病名曰陰易身重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上
衝會頭痛不欲舉眼中生花蓋男女病相換易故謂之陰陽

不

易治

燒視散治傷寒陰易其人身軀重少柔小腹裏急或引陰中拘牽熱上衝冒頭重不欲平眼中生花膝脛拘急悉至之

婦人視襠燒灰

右細研以方寸匕水調服小便利陰頭痛即愈

假單黃湯治丈夫傷寒病後女人与之交接病名陽易

韭根

去青一約徑寸半

假單黃

十四枚兩頭尖者是

右二味水一觔煎至半盞去滓溫頓服粘汗出為效

未知再作

發斑證治

傷寒發斑者蓋不當下而下之熱則乘虛入胃當下而失下

則胃熱不得泄二者皆能發斑其狀如錦紋赤者易治黑者

難治蓋熱毒入胃深也

玄參升麻湯治傷寒失下不當下而下之熱毒在胃發斑如

錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參

升麻

甘草

炙各半兩

右為散每服五錢匕水盞半煎七分去滓溫服溫毒

亦能發斑

三因極一病證方論卷之四

三國書院藏書之... 小... 竹...

三國書院藏書之... 小... 竹...

三國書院藏書之... 小... 竹...

三國書院藏書之... 小... 竹...

三國書院藏書之... 小... 竹...

三國書院藏書之... 小... 竹...



Blank page with faint bleed-through text from the reverse side.

