分布……本州(東京), 朝鮮(水原), 歐洲。

10. トビカツオブシムシ

Dermestes coarctatus Harold.

鰹節蟲科

體は暗褐色の地に灰黄色の短毛を裝ふ。前胸背の後緣兩側に楔形の2個の凹陷あり。頭部,前胸背及び翅鞘には小點刻を密布す。脚は赤褐,腹面の兩側には曲玉狀の斑紋あり。雄は第6節の下面に黄色の剛毛束を有す。極めて普通種にして,年2回の發生をなし幼蟲又は蛹態にて越年し,成蟲は第1回は8月上旬,第2回は9月下旬に羽化す。成蟲は倉庫內の如き暗所を好みて棲息す, 幼蟲は乾魚,毛皮,蠶繭等を食害す。

體長……8–9 mm.

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 臺灣。

11. ハラジロカツオブシムシ

Dermestes vulpinus Fabricius.

鰹節蟲科

腹面は白色の短毛を以て覆はれ,頭部は圓く,頭頂に淺き圓形の凹陷あり。前胸背には點刻を密布し,兩側に白毛後緣に黄毛を裝ふ。翅鞘には點刻を密布し,個體によりては肩部赤褐を呈するものあり。脚は黑褐色にして黄毛を裝ひ,轉節及び腿節には白毛を生ず。

腹部各節の腹面兩側には各1對の黑紋あり。前種と同樣に普通に產し鰹節類,毛布,乾魚其の他動物標本,蠶繭,生絲等を食害す。

體長……9–10 mm.

分布……本州, 九州, 臺灣。

12. ケアカカツオブシムシ

Dermestes tesselatocollis Motschulsky.

鰹節蟲科

體は黑色,腹面には白色の短毛を密生す。頭部は小形,黄褐色の短毛を密生し,粗大なる點刻を裝ふ。前胸背には黄褐色の縮毛を裝ひ斑紋を現はし又點刻を裝ふ。腹部各節の腹面兩側に各1個の黑紋あり。年1回發生し8月上旬羽化し,乾魚,動物剝製品,蠶繭等へ產卵し幼蟲はこれ等を食害す。

體長……7 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 臺灣, 朝鮮。

13. ヒメカツオブシムシ

Attagenus japonicus Reitter.

鰹節蟲科

外形前種に似たれども黑色小形種なり。頭部は扁圓形,頭頂に微細の點刻を密布し褐色毛を粗生す。頭部の中央に赤褐色の1單眼あり。前胸背及び翅鞘には微細の點刻を密布し。且つ黄色の短毛を裝ふ,年1回又は2年に1回の發生をなし幼蟲態にて越年す。成蟲は6月上,中旬羽化しツヽヂ等の花に來り蜜を吸收す。毛布,蠶繭等へ產卵し,幼蟲は蠶繭,生絲,毛皮,毛織物等を食す。

體長……3.5–4.5 mm.

分布……北海道, 本州, 九州, 朝鮮, 臺灣。

14. ノコギリコクヌスト

Silvanus surinamensis Linnaeus.

扁蟲科

極めて小形にして頭部は平たく粗なる點刻を密裝す。頭楯は幅廣し。胸部の左右が鋸齒狀を呈せるが故にこの名あり。普通種にして年2,3回以上發生し成蟲態にて貯穀又は穀芥中にて越冬す。卵はこれ等の中へ產み付けられ,幼蟲成蟲共に貯穀の害蟲なり。

體長……2 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州。

15. コクヌスト

Tenebrioides mauritanica Linnaeus.

扁蟲科

頭部及び前胸背には小點刻を密布し,稜狀部は略三角形を呈し點刻を缺く。翅鞘には判然せる7條の點刻ある縱溝を裝ひその間室には微細の點刻あり。普通種にして米穀の害蟲なり。

體長……7-8 mm.

分布……北海道, 本州, 九州, 臺灣, 支那, 歐洲。

16. ナガヒラタムシ

Cupes clathratus Solsky.

長扁蟲科

頭部に凹凸多く,觸角の下方に各1個の瘤狀突起あり,頭頂の中央には細き縱溝あり。その兩側にも瘤狀突起を具ふ。又複眼の後方にも同樣の突起を有す。前胸背の中央には太き縱隆起を裝ひその

兩側は甚だ凹陷す。翅鞘には9條の縱隆起有りこれに格子樣の橫隆を具へ,第5の縱隆起は特に太し。腹節の中央には橫溝あり。尾節は最も長し。花上にて捕獲出來るも又夜間燈火に飛來す。

體長……12 mm. 內外。

分布……北海道本州西伯利亞。

第十五圖

1. ベニヒラタムシ

Cucujus coccinatus Lewis.

扁蟲科

體は扁平にして翅鞘以外は黒色,頭部は大形にして凸凹多く,點刻を密布す。大腮は大にして先端に3歯を裝ひ,觸角は太く糸狀,ともに黄褐色の剛毛を粗生す。前胸背は略正方形にして中央に1縦隆起を裝ひ,その周圍は長楕圓形に深く凹陷し,左右兩側に近く各1個の大隆起部あり,その部分及び中央の凹陷部には多數の粗大點刻を密布す。側緣には5,6の歯狀突起を具ふ。翅鞘は美麗なる朱毛にして3條の縦隆起を裝ひ,前緣に近きものは最も太く,間室には粗大點刻を裝ふ。但し前緣に近きもの程小なり。體の下面には黒色の短毛を密生す。脚は黒色にして轉節及び各跗節は赤褐色,腿節は太き棍棒狀を呈し微細の點刻を密布す。

體長……12 mm. 內外。

分布……北海道, 本州。

2. ヨツボシオホキスヒ

Helota gemmata Gorham.

大木吸蟲科

腹部は赤褐色にして他は唐金色を呈す。頭部は3角形にして前方へ突出し,粗大點刻を粗布し,複眼の內側に點刻多し。觸角は赤緣色,前胸は前方細く,前後兩緣角は突出し,背面の中央部には4條の平

滑部あり,他は粗大點刻を密布す。翅鞘には各2個の黄色圓紋を裝ひ,10條近くの點刻縦列を具へ,前緣に近きもの程粗大なり。その間室は不規則に陷起す。脚は黒褐色,腿節の上面及び脛節は赤褐色なり。樹液に多く來集す。

體長……13 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 西伯利亞。

3. ヨツボシケシキスヒ

Libroder japonicus Motschulsky.

出尾蟲科

全體光澤ある黒色,頭部は扁平にして微細の點刻を裝ひ,後緣に近く淺き横溝あり,大腮は著しく發達し,末端は叉狀に2分す。觸角は赤褐色,末端は球形にして黄褐毛を裝ふ。前胸背は長方形にして細點刻を散在し,後緣及び左右兩緣は隆起す。翅鞘は腹部より幾分短かく各2個の赤紋あり,全面に小點刻を裝ふ。脚は赤色,跗節は赤褐色なり。樹液に集まる普通種なり。

體長……10 mm. 內外。

分布……本州, 四國, 九州, 臺灣, 支那。

4. デヲキノコムシ

Scaphidium japonicum Reitter.

出尾蔓蟲科

全體短紡錘形を呈し,光澤ある黒色種なり。頭部は小形にして小點刻を密布す。觸角は赤褐色を呈し,末端の5節は大にして黒色なり。前胸背は略梯形にして淺き點刻を密布し,後緣の近くに大なる

點刻の横列あり,弓形狀に排列す。翅鞘には各2個の黄赤紋を裝ひ,共に半月形を呈し,翅鞘に近きものは大なり。全面に淺き點刻を密布し,會合線及び翅底に沿ひて1條の大點刻列を裝ふ。腹部尾端は長く圓錐形を呈し翅鞘外に露出す。體の下面及び脚は黒色,脚は細長く,跗節は赤褐色なり。本州に於ては比較的高地にある枯木より得らる。

體長……6–7 mm.

分布……本州, 九州。

5. オニヒラタシデムシ

Silpha subrugosa Portevin.

埋葬蟲科

體は黒褐色にして灰黄色の短毛を密生す。頭部は小形にして特に短毛多し。觸角は黒色にして末端の3節は膨大す。頭楯の前緣は稍凹陷し,赤褐色を裝ふ。前胸背の中央には20個内外の不規則なる隆起あり,全面に小點刻を密布すれども底部は短毛のために覆はる。稜狀部の中央には縦の淺き凹陷部あり。翅鞘には3條の縦隆を裝ひ,その間室には大隆起及び小點刻あり。體の下面及び脚は黒褐色なり。動物の屍體に來集すれども比較的少なし。

體長……11–12 mm.

分布……本州。

6. ヒラタシデムシ

Silpha perforata Gebler.

埋葬蟲科

體は黒色乃至黒褐色(嚴密に述べれば本州より産するものは黒褐色にしてその他のものは黒色なり),頭部には小點刻を密布し,頭頂の中央に1個の凹陷あり。頭楯の前端は深く陷入し赤褐色なり。兩鬚は黒色にして各節の末端は赤褐色,觸角も黒色,第1節は大にして末端は赤褐色,最後の3節は太く,灰色の短毛を密布す。前胸背の左右兩緣は赤褐色にして中央は隆起し黒色を呈し,全面に點刻を密布し,外緣に近きもの程粗大なり。稜狀部は稍5角形を呈し,外緣は幾分隆起し平滑,他は小點刻を密布す。翅鞘には判然せる3條の縦隆を裝ひ,その間室には粗大の間室を密布し,前緣は上反す。體の下面及び脚は黒色なり。

體長……8 mm. 內外。

分布……樺太, 千島, 北海道, 本州, 朝鮮, 西伯利亞, 滿洲, 支那。

7. ベツカウヒラタシデムシ

Silpha brunneicollis Kraatz.

埋葬蟲科

頭部及び翅鞘は黒色,前胸背は黄橙色,但し中央は暗褐色,腹部は黒藍色なり。頭部は小形,頭頂に3個の凹陷あり。觸角は比較的短かく黒色,兩鬚は黒褐色,末端は赤褐色なり。前胸背の周圍には點刻を密布し,中央のものは微細なり。翅鞘には3條の縦隆起あり,前緣に近きものは短かく中途にて消失し,間室には點刻を密布す。脚は黒色,極めて普通種にして腐敗したる動物質に來集す。

體長……20 mm. 內外。

分布……本州, 四國, 九州, 臺灣。

8. ヒメヒラタシデムシ

Silpha auripilosa Portevin.

埋葬蟲科

オニヒラタシデムシ(Silpha subrugosa Portevin.)に酷似すれども前胸背の隆起を缺き淺き凹陷部あり,これに灰色の短毛を生ず。翅鞘隆起の間室には隆起部なく,小點刻を稍規則正しく排列し,前胸背と共に殆んど毛を缺く。雌に於ては翅端は弓狀に剝らる。極めて普通に產し動物の屍體又は塵芥の腐敗物に來集す。

體長……10-12 mm.

分布……樺太, 千島, 北海道, 本州, 朝鮮, 臺灣, 西伯利亞, 支那。

9. クロシデムシ

Necrophorus concolor Kraatz.

埋葬蟲科

全體黑色の大形種なり。頭部は凸狀を呈し,頭頂より前頭に向つて3條の縱溝あり,中央のものは短かし。後頭には極めて微細なる縮刻を裝ひ,兩側に細き平滑部あり。頭楯は黃橙色,前胸背は圓盤形を呈し,微細の點刻を裝ひ,周緣は幅廣く水平にして帽子の鍔狀を呈す。稜狀部は極めて大にして後半の點刻も大なり。翅鞘には極めて不明瞭なる2條の縱隆あり,その間室には小點刻を密布す。脚は黑色なり。普通種にして鳥獸の屍體に來集す。

體長……30-45 mm.

分布……北海道, 本州, 九州, 朝鮮, 臺灣, 支那。

10. コクロシデムシ

Ptomascopus morio Kraatz.

埋葬蟲科

比較的細長き黑色種にして頭部は凸狀を呈し,微細の點刻を密布す。頭楯は橙黃色,觸角及び兩鬚は黑褐色,前胸背には光澤あり,極めて微細の點刻を密布す。稜狀部には點刻あれども前半には黃毛を密生してこれを覆ふ。翅鞘は短かくして腹端の3節は露出し一見ハネカクシに似たり脚は黑褐色,胸下及び各腹節の後緣にはともに黃毛を裝ふ。鳥獸の屍體に集まる普通種なり。

體長……14 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 九州, 朝鮮, 臺灣, 支那。

11. シラオビヒラタシデムシ

Nodynus leucofaciatus Lewis.

埋葬蟲科

幅廣き扁平種にして光澤ある黑色を呈す。頭部には點刻を密布し,觸角は黑色にして末端の5節は膨大す。前胸背は半圓形を呈し,前緣及び左右兩緣に沿ひて大點刻を裝ひ,中央は平滑なり。翅鞘は短かく略中央に黃白色の多少凹凸ある1廣帶を具へ,尾端の3節は3角形を呈し露出す。脚及び體下は黑色なり。樹液又は腐敗物に集まる。

體長……11 mm. 內外。

分布……北海道, 本州。

12. オホヒラタシデムシ

Silpha japonicus Motschulsky.

埋葬蟲科

扁平長橢圓形にしてベツカウヒラタシデムシ (Silpha brunneicollis Kraatz.) に酷似するも全體黒色なり。頭部は方形を呈し小形にして後頭部に粗大點刻を裝ふ。頭楯の前端は深く陷入す。觸角は棍棒狀にして黒色,前胸背の中央には淺き縱溝を裝ひ,その兩側に幅廣き1縱隆あり,後緣の近くに至りて2分す。この縱隆部には微細點刻,他は粗點刻を密布す。翅鞘には3條の縱隆を裝ひ,その間室には點刻を密布す。雄は翅端細長く,雌は圓し。極めて普通種にして動物の屍體に來集す。

體長……22 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 臺灣。

13. ヨツボシマヘモンシデムシ

Necrophorus quadripunctatus Kraatz.

埋葬蟲科

頭部は黒色にして凸狀を呈し,中央に淺き縱溝,前頭に判然せる1橫溝を裝ひ,それより前緣までは點刻を缺き平滑なり。但し左右兩緣に沿ひて1縱溝あり,その外側及び頭頂,後頭には點刻を散在す。頭頂には1個の赤紋を裝ふ。觸角は黒褐色にして末端の3節は膨大し黒色を呈し,兩鬚は赤褐色なり。前胸背は黒色にして略圓形を呈し中央より稍前緣に近く十字形の溝を裝ひ,前緣に4個の瘤狀隆起を橫列し,全面に點刻を有す。稜狀部は3角形を呈し點刻及び刺毛を散在す。翅鞘は黒色にして,翅底の近く及び翅端に太き橙黄色

の橫帶を裝ひ,低き2條の縱隆あり,間室には粗大の點刻を密布す。體の下面及び脚の腿節は黒色,脛節以下は黒褐色なり。前脚の跗節には多數の黄毛を密生す。

體長……15–17 mm.

分布……北海道, 本州, 支那。

14. マヘモンシデムシ

Necrophorus maculifrons Kraatz.

埋葬蟲科

前種に酷似すれども幾分大形(殆んど同形のものあれども幾分大形なる事普通なり),頭部は黒色にして光澤あり,中央に縱溝を缺き前頭には淺き橫溝あり,全面に小點刻を散在す。前種と同樣頭頂に赤紋を裝ひ,觸角は黒褐色,末端の3節は黄色,兩鬚は赤褐色なり。前胸背に有する十字狀の溝は稍淺く,翅鞘は黒色,橫帶の幅は狹く會合線に近づき消失す。腹面及び脚は黒色なり。前種より多く動物の屍體に集まる普通種なり。

體長……15–22 mm.

分布……本州, 四國, 支那。

15. オホモンブトシデムシ

Necrodes asiaticus. Portevin.

埋葬蟲科

全體黒色にして頭部には小點刻を密布す。頭楯の前緣中央は陷入し黄褐色の剛毛を裝ふ。觸角の末端3節は膨大し,橙黄色を呈す。兩鬚は黒色,各節の末端は赤褐色,前胸背は圓形にしてその周緣は黒

褐色,中央より前緣までは1隆起,他には點刻を密布す。但し外緣のものは粗大なり。翅鞘は黑褐色にして3條の判然せる縱隆を裝ひ,間室には粗大點刻を密布し,その第3間室の中央に近く1隆起を裝ふ。脚は黑色にして雄の腿節は甚だ膨大す。動物の屍體に來集す。

體長……12 mm. 內外。

分布……千島, 北海道, 本州, 朝鮮, 西伯利亞, ペルシヤ, チベット。

16. モンブトシデムシ

Necrodes nigicornis Harold.

埋葬蟲科

前種に酷似すれども體は小形なり。觸角の末節は黑褐色,頭部,前胸背及び翅鞘の點刻は前種より粗大,特に翅鞘に於て然り。前胸背は稍扁圓形,翅鞘は幅狹し,前種と同樣動物の屍體に來集す。

體長……20 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 臺灣, 支那。

第十六圖

1. オホハネカクシ

Creophilus maxillosus Linnaeus.

隱翅蟲科

全體黑色を呈し灰白毛を裝ふ。頭部は楕圓形に近く小點刻を粗布す。觸角は黑色にして比較的短かく,兩鬚は黑褐色なり。前胸背は半圓形にして前緣のみ點刻を有し,他は平滑にして甚だ光澤あり。翅鞘は黑色にして中央に灰白色の橫帶を有し,他は黑褐毛を裝ふ。腹部は幅廣く第2より第4までの各節腹面に灰白毛を密生し兩側に黑色の圓紋を有す。脚は黑色,あまり多からざる種類なり。

體長……15–17 mm.

分布……樺太, 北海道, 本州, 四國, 九州, 臺灣。

2. オホアカバハネカクシ

Staphylinus carinatus Sharp.

隱翅蟲科

翅鞘は赤褐色,他は黑褐色を呈す。頭部は圓形にして點刻を密布し,頭楯は黃色,觸角は黑褐色なれども各節の基部は赤褐色,兩鬚も亦赤褐色なり。前胸背には點刻を密布し,その中央に極めて細き平滑部あり。翅鞘は前胸より短かく赤褐色を呈し,褐色毛を裝ふ。腹部各節の基部には黃毛を裝ひ,脚は赤褐色にして黃褐毛を密生す。本州に於ては山地に多し。

體長……22 mm. 內外。

分布……北海道, 本州。

3. アカバハネカクシ

Staphylinus paganus Sharp.

隱翅蟲科

頭部及び前胸背は黄銅色を呈し,粗點刻を密布す。觸角は連鑽狀にして黒褐色を呈し,褐色の刺毛を裝ひ,中部以下には灰白色の短毛を密生す。兩鬚は褐色,後頭の兩側には黄毛を裝ふ。前胸の後緣に近き中央部に細き平滑部あり。稜狀部は天鵞絨狀黒色,翅鞘は赤褐色にして粗點刻及び黄褐毛を裝ふ。腹部は黒色を呈し第2節より第5節まで各節の基部に光線の方向によりて銀白色の斑紋を現はす。各節の末端には黄金色の毛を生じ,尾端には4本の附屬物を具へ多數の剛毛を生ず。脚は黄褐色,極めて普通種にして石又は倒木の下などに多し。

體長……16 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 九州。

4. ダイメウハネカクシ

Ocypus daimio Sharp.

隱翅蟲科

體は黒褐色,頭部は扁平,前方及び後方に金色の短毛を裝ひ,觸角は暗褐色にして基部3節は赤褐色,兩鬚も亦赤褐色なり。前胸背には點刻を密布するも,中央には細き平滑部を縱走す。翅鞘は赤褐色にして粗點刻を密布し黒色毛を裝ふ。腹部は赤褐色にして雄は最後の3節の背面,雌は第2節の後緣及び第6節の基部に金色毛を裝ふ。尙ほ腹部各節の腹面には金色毛を密生す。脚は赤褐色なり。山地に多し。

體長……15 mm. 內外。

分布……北海道, 本州。

5. キンボシハネカクシ

Ocypus Wiesei Harold.

隱翅蟲科

體は黒褐色なるも金色の短毛を密生し,頭部は方形にして小點刻及び金色毛を密裝す。觸角及び兩鬚は赤褐色,前褐背には點刻を密布し,金毛は頭部のものより稍短かし。頭部及び前胸背の中央に縱隆あり。翅鞘には密に金色毛を裝ふも翅底はこれを缺き,翅端には褐色毛を生ず。腹部背面の第4,5兩節にも金色毛を裝ふ。脚は黄褐色なり。本邦産ハネカクシ中美麗なるもの丶1にしてあまり多からず。

體長……16 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 九州。

6. キンバネハネカクシア

Ocypus gloriosus Sharp.

隱翅蟲科

體は黒褐なるも前胸を除き金色毛を裝ふ。頭部は金色長毛を以て覆はれ,觸角の基部に近き半分は赤褐,後半は黒褐にして灰白毛を裝ひ,兩鬚は黄褐色なり。前胸背は黒褐色,天鵞絨樣にして點刻を密布す。稜狀部は小形にして黒褐色,翅鞘は褐色にして金色毛を密生し美麗なり。腹部は黒褐なるも第4,5兩節及び各節の兩端には金色毛を裝ふ。脚は黄褐色にして金毛を生ず。極めて美しく且つ珍

らしき種類なり。

體長……12 mm. 內外。

分布……本州。

7. アヲバアリガタハネカクシ

Paederus idae Lewis.

隱翅蟲科

頭部は黑色にして漆狀光澤あり。中央は平滑なれども周圍には粗點刻を裝ふ。觸角は褐色なれども基部3節は黃色,兩鬚も亦黃色を呈す。但し先端は稍暗色なり。前胸背は橙黃色を呈し光澤あり。翅鞘は藍色又は暗綠色を呈し點刻を密布す。腹部は暗黃色なるも末端の2節及び尾狀物は黑色,脚は黃褐色なるも腿節の末端は暗色を呈す。田圃,塵芥の下等に極めて普通なり。

體長……6 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 九州, 臺灣(高地)。

8. アリガタハネカクシ

Paederus Poweri Lewis.

隱翅蟲科

體は光澤ある黑色,頭部は稍扁圓形にして粗點刻を散在し,觸角及び兩鬚は黃色,前胸背には極めて小點刻を粗布す。翅鞘は極めて短かく靑藍色を呈し,會合線は稍隆起す。腹部全面には黑褐色の軟毛を生ず。脚は黃色にして各腿節の末端は黑褐色なり。樹木に登攀する性あり。山地性にして普通叩網にて得らる。

體長……11 mm. 內外。

分布……本州。

9. フタホシメダカハネカクシ

Stenus tenuipes Sharp.

隱翅蟲科

單にメダカハネカクシとも稱し光澤ある灰黑色の小形種なり。頭頂は凹陷し中央に1隆起あり,その隆起を除き點刻を密布す。複眼は大きく突出し觸角は赤褐色にして細く,兩鬚は黃褐色,前胸は圓筒形にして點刻を密布し,背面中央部に短かき凹陷あり。翅鞘は方形を呈し,點刻を密布し,中央に黃色乃至橙黃色の圓紋を裝ふ。腹部は細く先端尖り,步行の際尾端を上方に上ぐるの性あり。脚は黑褐色を呈し,赤褐色に近きものあり。極めて普通種にして田圃又は有機物の堆積下に多し。

體長……4 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 九州。

10. ハイイロハネカクシ

Eucibdelus japonicus Sharp.

隱翅蟲科

頭部及び前胸背は黑色にして前頭は黑褐色,前頭の點刻は大にして後部に至るに從つて微細となる。複眼は小,觸角は暗黃褐色,前胸背は幅狹く點刻を密布し,頭部とともに金色の短毛を散生す。翅鞘は黑褐色にして金屬性光澤あり,金色毛を裝ふ。腹部も亦黑褐色,背面には金色毛を生じ,光線の方向により銀色とも見える。前中兩脚は暗褐色,後脚は黑褐色なり。普通種にして樹上に棲み叩網採集に

り得らる。

體長……15 mm. 內外。

分布……本州，九州。

11. アカバホソハネカクシ

Othius rufipennis Sharp.

隱翅蟲科

頭部及び前胸背は長方形にして黑褐色,頭頂は平滑なるも周圍に點刻を粗布す。觸角及び兩鬚は赤褐色,前胸背は卵形にして點刻を缺き平滑なり。翅鞘は赤褐色にして稜狀部の附近は暗色なり。腹部は黑褐色,各節の後緣は淡黃褐色脚は黃褐色なり。極めて普通種にして田圃の塵芥の下に棲息す。

體長……9 mm. 內外。

分布……樺太，北海道，本州。

12. クビボソハネカクシ

Stilcus rufesans Sharp.

隱翅蟲科

小形種にして頭部及び前胸背は赤褐色,微細の點刻を密布す。觸角は褐色,前胸背は兩端細く縊れ中央に低き縱隆を裝ふ。翅鞘は黃褐色,腹部は黑褐色,脚は黃褐色なり。

體長……3.5 mm. 內外。

分布……本州，九州。

13. サビハネカクシ

Leistotrophus gracilis Sharp.

隱翅蟲科

全體暗褐色にして金屬性光澤を帶ぶ。頭部,前胸背及び翅鞘には點刻を密布し,金色の短毛を生じ,斑紋を裝ふ。觸角は黃褐色にして黑褐色を裝ふ。稜狀部は黑色天鵞絨狀を呈す。腹部は黑色,第1より第3環節までの背面には金毛を密生す。脚は黃褐色にして腿節の內側に黑褐斑紋あり。

體長……10-13 mm.

分布……北海道，本州。

14. アカバナガハネカクシ

Lathrobium digne Sharp.

隱翅蟲科

アカバホソハネカクシ(Othius rufipennis Sharp.)に酷似すれども幾分小形にして頭部は稍細く,後頭部は圓味を帶び觸角は幾分赤味多し。前胸背は後方稍細まり點刻を密布し,中央に平滑部縱走す。稜狀部は黑褐色,翅鞘は赤黃色にして脚も亦赤黃色なり。

體長……7.5 mm. 內外。

分布……本州，九州。

15. ヒラタハネカクシ

Siagonium Haroldi Weise.

隱翅蟲科

扁平なる黑色種なり。前頭には2個の角樣突起を裝ひ頭頂に點

刻多し。觸角は黒褐色にして長く,大腮はよく發達す。前胸背は略頭部と同大,點刻を具へ,中央に極めて淺き1縦溝を裝ふ。翅鞘には會合線に沿うて5條の縦溝を具へその中及び前緣に點刻を裝ふ。又前緣に近く赤褐色の1縦紋を裝ふ。脚は赤褐色にして短く腿節は肥大す。朽木の樹皮下等に棲息す。

體長……5.5 mm. 内外。

分布……北海道, 本州, 九州, 歐洲。

16. オホアカバコガシラハネカクシ

Philonthus spinipes Sharp.

隱翅蟲科

頭部は圓形にして黒色光澤あり,中央は平滑,後部及び複眼の近くに粗大點刻を裝ふ。觸角は灰褐色なるも基部3節は黒色,但しこれ等各節の基半は赤褐色なり。兩鬚は黒褐色,前胸背は黒色,半楕圓形にして前方は稍細く,平滑にして光澤あり。周緣には黒褐の粗毛を裝ふ。稜狀部は黒色,翅鞘は赤褐色,腹部は黒色,脚は黄褐色なるも腿節は黒褐色なり。普通種にして石又は塵芥等の下に棲息す。

體長…… 13—15 mm.

分布……本州, 九州。

第十七圖

1. コガムシ

Hydrocharis affinis Sharp.

牙蟲科

光澤ある暗黒色を呈す。頭部に微細なる點刻を密布し,前頭の兩側に楔形の凹陷あり,この中に「へ」狀をなせる點刻列あり。觸角及び兩鬚は黄褐色なり。前胸背には極めて微細の點刻を密布し,4隅には粗大の點刻を密集し,前緣に近き兩側には短かき倒八狀の凹陷あり,10數個の點刻を縦列す。翅鞘には4條の點刻列を有し,尚ほ前緣には不明瞭の點刻列あり。脚は黄褐色乃至赤褐色なり。普通種にして池,沼に多し。

體長…… 15—18 mm.

分布……本州, 四國, 九州, 朝鮮。

2. ガムシ

Hydrophilus acuminatus Motschulsky.

牙蟲科

光澤ある暗黒色を呈し,大形種にして,複眼の内側に點刻を密集し,前頭には鉤狀に點刻を排列す。觸角は棍棒狀を呈し,兩鬚とともに黄褐色なり。前胸背は短かく,兩側に小點刻を散在し,背面の中央より,稍前緣に近く倒八狀に點刻を排列す。翅鞘には4條の點刻縦列あり,尚ほこれらの各兩側には微細なる點刻列を伴ふ。胸片に棘狀突起を具へ,脚は細長く後脚跗節の内面には金色毛を密生す。極めて普通種にして前種同様池,沼に多し。

體長……35 mm. 內外。

分布……北海道，本州，四國，九州，朝鮮。

3. ヒメガムシ

Sternolophus rufipes Fabricius.

牙蟲科

全體光澤ある黒色にしてコガムシ (Hydrocharis affinis Sharp.) に酷似すれども小形(約半分)なり。觸角は赤褐色なるも先端の棍棒部は暗褐色,兩鬚は赤褐色なり。前胸背の倒八狀の點刻列は延長して翅底に沿ひて前緣に至る。それに略並行して兩側の中央部にも點刻列を裝ふ。翅鞘の末端は赤褐色を呈し,4條の點刻列はあれども稍粗に散在し不明瞭なり。腹部各節の兩側に赤褐紋を裝ひ,脚は赤褐色なり。

體長……10 mm. 內外。

分布……本州，四國，九州，朝鮮，琉球，臺灣。

4. ゴマフガムシ

Berosus punctipennis Haro'd.

牙蟲科

暗黄褐色を呈し,複眼は黒色にして著明,觸角及び兩鬚は暗黄色,頭部及び前胸背には點刻を密布す。翅鞘は暗褐色,不定の斑紋を具へ,9條の明瞭なる縱溝を裝ひ,その間室には暗色の點刻あり。山地の池,沼に普通なり。時に燈火を慕ひて飛來する事あり。

體長……5—6 mm.

分布……北海道，本州。

5. マメガムシ

Volvulus profundus Sharp.

牙蟲科

稍藍色の光澤ある黒色種にして紡錘形を呈す。頭部は半圓形を呈し下向し,點刻を密布す。觸角は赤褐色なり。前胸背には微細の點刻を裝ひ,翅鞘には10條の點刻縱列を具へ,尙ほその間室にも點刻を裝ふ。脚は黒褐色,但し跗節は赤褐色なり。極めて普通種なり。

體長……4 mm. 內外。

分布……本州，四國，九州。

6. アトアカマグソガムシ

Cercyon vagus Sharp.

牙蟲科

頭部及び前胸背は黒綠色にして光澤あり,兩側は黄褐色にて緣取らる,共に粗點刻を裝ふ。翅鞘は黒褐色にして周緣は暗褐色なり。微細の點刻列を縱走す。脚は黄褐色なり。池沼に普通なり。

體長……3 mm. 內外。

分布……本州。

7. オホクロマルガムシ

Cyclonotum simplex Sharp.

牙蟲科

黒色種にして前胸背の左右兩緣及び翅鞘の前緣は黄褐色にて緣取らる。頭部の兩緣は赤褐色を呈し觸角及び兩鬚は黄褐色にして

觸角の末端の膨大部は暗褐色なり。前胸背の前緣は赤褐色にして頭部とともに微細の點刻を裝ふ。翅鞘には會合線に沿うて1條の縱溝を裝へる他縱條は認められず。全面に微細の點刻を密布す。東京附近に於ては普通種なり。

體長……5 mm. 內外。

分布……本州。

8. チビガムシ

Helochares striatus Sharp.

牙蟲科

體は卵圓形を呈し,暗黃色,光澤あり。觸角及び兩鬚は黃色,但し觸角は末端の膨大せる3節は黑褐色なり。後頭部は廣く黑褐色頭部及び前胸背には小點刻を密布す。翅鞘は稍膨起し,翅底の中央に各1個の黑點を裝ふ。翅面には9條の點刻縱溝を具へ,その間室には點刻を密布す。脚は黃褐色,腿節は少しく濃色なり。東京附近に於ては普通の種類なり。

體長……4.5mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 臺灣。

9. タマガムシ

Amphiops mater Sharp.

牙蟲科

體は稍球狀に膨大す。暗黃褐色乃至黑褐色を呈し頭部は圓形にして扁平,點刻を密布し前緣は黃褐色を呈す。觸角及び兩鬚は暗黃色,前胸背の兩側は幅狹く全面に點刻を密布す。翅鞘には8條內外

の點刻列を裝ひ,その中間に1條の粗點刻列を具へ尙ほ間室には微細の點刻あり。前,中兩脚は黃色,但し腿節の基部は暗色,後脚は淡褐色にして腿節に點刻あり。東京附近より關西地方にかけて田圃の小溝等に普通なり。

體長……5 mm. 內外。

分布……本州, 九州。

10. ミズスマシ

Gyrinus curtus Motschulsky.

鼓豆蟲科

黑色にして光澤あり,頭部は小形にして平滑,觸角は黑色なるも第2節の分岐枝は褐色を呈す。前胸背も平滑にして光澤あり。翅鞘には9條の點刻縱列を裝ひ,間室は平滑なり。尾節は少しく翅鞘の後方へ突出し,これに縱に縮紋を裝ふ。脚は赤褐色なり。極めて普通種にして各地の水面に棲息す。

體長……7 mm. 內外。

分布……樺太, 北海道, 本州, 四國, 九州。

11. ヒメミヅスマシ

Gyrinus japonicus Sharp.

鼓豆蟲科

前種に酷似するも一層小形なり。頭部は點刻なく光澤あり。觸角は黑色,兩鬚は赤褐色なり。前胸背も點刻を缺き,中央に淺き橫溝あり。翅鞘には10條の點刻縱列を有し,尾節背面に灰色毛を裝ふ。前種同樣に極めて普通種にして何れの池,沼,河流にも棲息す。

體長……5 mm. 內外。

分布……北海道，本州，四國，九州。

12. オホミヅスマシ

Dineutus marginatus Sharp.

鼓豆蟲科

背面は帶綠灰黑色を呈し,油狀光澤あり,點刻なし。觸角は黑色,兩鬚は黃褐色,前胸背の左右兩緣は黃褐色にて緣取られ,中央に1縱線あり。翅鞘の前緣も亦前胸背と同樣に黃褐色にて緣取られ,翅端に近く各1個の凹陷あり,翅端及び翅端の近くに棘刺を具ふ。腹面は黃褐色にして暗色の不規則の斑紋あり。脚も亦黃褐色なり。池沼又は河川の淀み等に多く棲息す。

體長……9 mm. 內外。

分布……樺太，北海道，本州，四國，九州，朝鮮，琉球，臺灣，支那，西伯利亞，馬來半島，ジャバ，印度支那。

13. オナガミヅスマシ

Orectochilus Régimbarti Sharp.

鼓豆蟲科

背面は黑色にして灰色の短毛を密生し光澤なし。頭部には點刻及び短毛を缺き,觸角及び兩鬚は赤褐色なり。前胸背には微細の點刻を裝ひ,中央部の短毛は粗なり。稜狀部は平滑,翅鞘の末端は截斷狀に終り,腹部尾節は細長く延び,翅鞘外へ突出し,その先端に赤褐色の軟毛を生ず。腹面は黑色,腹部環節の末端は赤褐色,前脚は赤褐色,中後兩脚は黃褐色なり。比較的冷たき水を好み高地の湖沼に棲息

し,岸に近き岩石間の水面を旋廻す。

體長……10 mm. 內外。

分布……本州(中禪寺湖，蘆ノ湖)。

14. コガシラミヅムシ

Pettodytes intermedius Sharp.

小頭水蟲科

暗黃色を呈し卵圓形にて桃狀,頭部は小さく,複眼は大,觸角は絲狀,兩鬚は長楕圓形,前胸背は梯形にて全面に點刻を散在し,後緣に近きもの程粗大なり。翅鞘には10條の判然せる點刻縱列を具へ,各翅鞘には4個の黑褐色の斑紋を裝ふ。腹面は光澤ある黃色,脚も亦黃色なり。極めて普通種にして池沼又は田圃の小溝等に多し。

體長……35 mm. 內外。

分布……北海道，本州，四國，九州，支那。

15. クビボソコガシラミヅムシ

Haliplus japonicus Sharp.

小頭水蟲科

長楕圓形にして兩端尖り,前種に似れども小形にして體の幅狹く頭部は黑褐色,觸角及び兩鬚は黃色,前胸背には點刻を散在し,後緣に近き左右兩側に凹陷部あり,凹陷部の中にも2,3個の小點刻あり。翅鞘は暗黃色にして10條の點刻列とその間室に小點刻列を粗に排列す。約10個の黑褐斑紋を裝ひ,會合線の略中央にある斑紋は大形の十字狀を呈す。體の下面は黑褐色,後脚基節の板狀物及び脚は赤褐色なり。前種と同樣普通種なり。

體長……3 mm. 內外。

分布……本州，九州，支那。

第十八圖

1. コガタノゲンゴロウ

Cybister tripunctatus Olivier.

龍蝨科

頭部,前胸背及び翅鞘は帶綠黑色を呈し腹面は黑色なり。前頭に黃褐紋を裝ひ,觸角及び口部は黃褐色,前胸背の側面は黃褐色,中央に細き縱溝あり,翅鞘には細き2條の連續點刻線縱走し,周緣は黃褐色なり。脚は黃褐色,後脚は黑褐色なり。雄の前脚は跗節膨大し吸盤形をなす。普通種にして廣く分布す。

體長……26 mm. 內外。

分布……本州，四國，九州，朝鮮，琉球，臺灣，八丈島，支那，印度，馬來半島，濠洲，阿弗利加，大洋洲，南歐洲等。

2. ゲンゴロウ

Cybister japonicus Sharp.

龍蝨科

前種に似たる大形種なり。觸角及び口部は淡黃褐色,前胸背の兩側には幅廣き黃褐色の紋あり,雌は縮刻を裝ふ。翅鞘には前種と同樣2條の連續點刻列を具へ,その間室は雄は平滑なれども雌にては縱に多數の縮刻を裝ひ,點刻は判然せず。腹面は黑褐色,脚は黃褐色にして金色毛を裝ふ。前種同樣雄の前脚には大形の吸盤あり。極めて普通種なり。

體長……38 mm. 內外。

分布……北海道，本州，四國，九州，朝鮮，臺灣，支那，滿洲。

3. クロゲンゴロウ

Cybister brevis Aubé.

龍蟲科

背面綠黑色,腹面黑色,短楕圓形なり。頭部には點刻多く前頭及び口器は黃褐色なり。觸角は黃色,前胸背には點刻を有すれども頭部のものより小形なり。翅鞘には間隔遠き點刻の3縱條あり,間室は平滑なり。翅端に近く各1個の黃紋を裝ふ。前,中兩脚の轉節,脛節及び雄の前脚吸盤は赤褐,後脚は黑褐にして褐色の刺毛を生ず。池沼に產するも前2種より稍少なし。

體長……22 mm. 內外。

分布……本州，四國，九州。

4. ハイイロゲンゴロウ

Eretes sticticus Linnaeus.

龍蟲科

頭部及び前胸背は黃褐色,頭頂に黑紋を裝ひ,觸角は淡黃色なり。前胸背の中央兩側に各1個の大橫紋とその內側及び前後兩緣に近く小點刻を散在す。翅鞘は暗黃色にして3條の黑色點刻列(但し第3點刻列は極めて粗なり)あり,間室には顆粒狀點刻を密布す。前緣の中央に船底形の1凹陷を裝ひ,この部分は黑色なり。それより稍後方には點刻密集し波狀斑紋を裝ふ。この斑紋は不規則にして殆んど消失せるものあり。翅端に近く黑紋を裝ふ。腹面及び脚は淡黃褐色なり。

體長……14 mm. 內外。

分布……樺太，本州，四國，九州，琉球，臺灣，支那，西伯利亞，印度，濠洲，阿弗利加，南歐洲，亞米利加等。

5. スナムグリゲンゴロウ

Ilybius apicalis Sharp.

龍蟲科

頭部,前胸背及び翅鞘は赤味を帶びたる黑褐色にして油狀光澤あり。頭頂に赤色2紋を有す。觸角,兩鬚及び前胸背の兩側,翅鞘の前緣角及び體下は赤黃色なり。翅鞘には點刻列なく1條の極めて淺き縱溝あれども判然せず。腹面及び脚は赤褐色なり。寒地より暖地に至るまで廣く分布す。

體長……9 mm. 內外。

分布……樺太，北海道，本州，四國，九州，朝鮮，臺灣，支那。

6. マメゲンゴロウ

Agabus japonicus Sharp.

龍蟲科

翅鞘は暗褐色,他は黑色なり。頭頂の兩側に赤紋を裝ふ。前胸背は平滑にして前緣に沿ひて不規則なる點刻列あり。翅鞘は滑らかにして2條の極めて淺き點刻列あれども判然せず。腹面は黑色,脚は赤褐色,腿節は黑褐色なり。極めて普通種にして廣く分布す。

體長……7 mm. 內外。

分布……樺太，北海道，本州，四國，九州，臺灣，支那，印度。

7. シマゲンゴロウ

Hydaticus Bowringi Clark.

龍蟲科

頭部は黒色,前頭,頭楯及び上唇は黄褐色,兩鬚及び觸角は淡褐色,前胸背は大部分黄色にして前縁及び後縁の中央部は黒色,翅鞘は黒色にして各2條の太き黄褐色の縦線と略中央に1點刻縦列を装ひ,尚ほ稜狀部の後方に黄褐の圓紋を有す。腹部は赤褐色,前,中兩脚は黄褐色なり。各地に普通に産す。

體長……15 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 朝鮮, 支那。

8. マルガタゲンゴロウ

Graphoderes Adamsi Clark.

龍蟲科

頭部は黄褐,後頭及び複眼間の斑紋は黒色,前胸背も亦黄褐色にして前縁及び後縁は黒色,翅鞘は前縁を除き微細なる黒色の網目狀斑紋を装ふ。但し翅底及び前縁に近きものは判然せず。體の下面は黒褐色,腹部は赤褐色なり。脚は暗黄色,跗節は褐色,後脚の腿節は赤褐,他は黒褐色なり。他のものと同様に雄の前脚に圓形の吸盤を具ふ。東京附近には比較的少なきも關西方面に多し。

體長……14 mm. 內外。

分布……本州, 四國, 九州, 朝鮮, 支那。

9. コシマゲンゴロウ

Hydaticus grammicus nigrovitatus Clark.

龍蟲科

頭部,觸角及び兩鬚は黄褐,後頭は黒色,前胸背も亦黄褐色,その前縁及び後縁に細き黒褐斑紋あり。翅鞘には數條の暗黄褐色斑紋あり,その間室に黒點を密布す。前縁は黒點を缺き暗黄褐色なり。腹面は赤褐色,脚は黄褐色なるも後脚は暗褐色なり。北海道を除き極めて普通に産す。

體長……10 mm. 內外。

分布……本州, 四國, 九州, 朝鮮。

10. クロヅマメゲンゴロウ

Agabus conspicus Sharp.

龍蟲科

頭部は黒色にして頭頂に2個の赤紋を有す。頭楯の前縁及び上唇は赤褐色,觸角及び兩鬚は黄色,前胸背は黒色にして兩側は赤褐色,翅鞘は灰褐色にして微細の鮫肌狀を呈し2條の淺き點刻列あれども判然せず。體の下面は黒色,前,中兩脚は黒色にして基節,轉節,腿節の各末端並に脛節,跗節及び脚刺は赤褐,後脚は大部分黒色なり。雄の吸盤はあまり大ならず。東京附近には多く産す。

體長……12 mm. 內外。

分布……本州, 四國, 九州。

11. ヒメゲンゴロウ

Rhantus pulverosus Stephens.

龍蟲科

頭部,觸角及び兩鬚は黄褐色,後頭及び複眼間に黒斑あり。前胸背は黄褐色にして中央に黒色の横紋あり,前縁に沿ひて不規則なる點

刻列あり。稜狀部は黒色,翅鞘は暗黄色,周縁を除き黒色の點刻を密布す。中央に2條の點刻列を裝ふ。腹面は黒色,第3,4,5腹節の後縁及び尾節は赤褐色なり。前中兩脚は黄褐,後脚は黒褐色を呈す。各地に極めて普通に産す。

體長……12 mm. 內外。

分布……樺太, 北海道, 本州, 四國, 九州, 朝鮮, 西伯利亞, 歐洲。

12. シヤープツブゲンゴロウ

Laccophilus Sharpi similis Regimbart.

龍蟲科

頭部は黄褐色,觸角及び兩鬚は黄色,前胸背も亦黄褐色にして前縁及び後縁の中央は少しく黒褐色を帶ぶ。翅鞘は淡黄色にして褐色不正形の斑紋を縦に配列す。腹面及び前,中兩脚は黄褐色,後脚は赤褐色なり。

體長……4mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 臺灣, 支那, 印度, ジヤバ, スマトラ, ビルマ, 濠洲。

13. ツブゲンゴロウ

Laccophilus difficilis Sharp.

龍蟲科

頭部及び前胸背は黄褐色,觸角,兩鬚は淡黄色にしてその先端は褐色を呈す。翅鞘は帶綠黄褐色にして光澤あり,點刻なく,斑紋は判然せず。周縁は淡色なり。體の下面は黄色,脚は綠褐色なり。

體長……4 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 九州, 朝鮮, 支那。

14. キスヂケシゲンゴロウ

Bidessus japonicus Sharp.

龍蟲科

頭部は黒褐,頭頂に赤紋あり。觸角の前半は黄褐,後半は黒褐色なり。前胸背の前部は赤褐,後部は黒褐色なり。後縁に近き左右に各1個の凹陷あり,點刻を裝ふ。翅鞘は暗黄にして黒褐色の斑紋を裝ふ。翅底の略中央に各1個の凹陷及び會合線に平行して各1條の點刻列あり。全面に小點刻を粗布す。體の下面は暗褐色にして脚は淡黄褐色なり。極めて小形の種類にして春季東京附近には多し。

體長……2 mm. 內外。

分布……本州, 四國, 九州。

15. ケシゲンゴロウ

Hyphydrus japonicus Sharp.

龍蟲科

體は厚く略球狀を呈す。頭部,觸角及び兩鬚は黄褐色,頭頂に2個の黒紋を裝ふ。前胸背は黄褐色にして後縁に山形の黒褐斑紋あり,小點刻を密布す。翅鞘は暗黄色にして龜甲様の黒斑を裝ふ。略中央に1條の點刻列あり,全面に小點刻を密布す。體の下面及び脚は黄褐色なり。東京附近には春季極めて多し。

體長……4 mm. 內外。

分布……本州, 四國, 九州。

16. チヤイロケシゲンゴロウ

Noterus japonicus Sharp.

龍蟲科

頭部,觸角,兩鬚及び前胸背は黃褐色,翅鞘は暗褐色にして甚だ光澤あり。長卵圓形にして中央部隆起す。後頭部及び前胸背の前,後兩緣は暗褐色なり。翅鞘には淺き3條の點刻列あり,間室は極めて平滑なり。體の下面及び脚は赤褐色を呈す。春季東京附近には極めて多し。

體長……4 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 四國, 九州。

第十九圖

1. クロナガオサムシ

Carabus procerulus Chaudoir.

步行蟲科

頭部は稍光澤あり。前頭には褐色の剛毛を裝ひ,觸角の第5節以下には褐色の短毛を密生す。前胸は光澤を缺き小顆粒を密布す。背面に細き縱溝あり,稜狀部は中央凹陷す。翅鞘には3條の短隆起線縱走し,その中間に2乃至3條のそれより一層短かき不規則なる隆起線及び顆粒を裝ふ。腹面は黑色にして光澤あり。朽木,倒木又は石の下等に棲む稀ならざる種類なり。

體長……30 mm. 內外。

分布……樺太, 北海道, 本州。

2. アヲオサムシ

Carabus insulicola Chaudoir.

步行蟲科

頭頂は綠色なれども光線の方向に依りて黑色を呈することあり。兩鬚の先端は赤褐,觸角は黑色,第4節以下褐色の短毛を密生す。前胸背の中央には淺き縱溝を具へ粗大なる點刻列あり。稜狀部は黑色にして三角形なり。翅鞘には15條の判然せる縱隆起を具へ,その第4,8,12の各隆起線は約10個に切斷さる。腹面は黑色光澤あり。稀ならざる種類なり。

體長……28–34 mm.

分布……本州，四國，九州。

3. コマイマイカブリ

Carabus blaptoides Lewisi Rye.

歩行蟲科

頭部は細長く,顎は圓筒狀,兩鬚の末端は稍赤褐色なり。觸角は黑色にして第5節以下には褐色短毛を密生す。前胸背は幅廣く橫皺及び不規則なる小隆起を裝ひ,中央に1條の縱溝あり。翅鞘は紡錘狀にして翅端は尖り稍上反す。3條の斷續せる隆起線を具へその中間に大小不規則なる隆起を裝ふ。體下は黑紫色にして光澤あり,脚は黑色なり。

體長……40–48 mm.

分布……本州，九州，種子ヶ島。

4. アヲマルガタゴミムシ

Amara chalcites Zimmermann.

歩行蟲科

小形種にして楕圓形,黑色にして少しく綠色光澤を帶ぶ。頭頂は圓く隆起し,觸角は基部の3節及び第4節の半部は赤黃色,他は黑色にして褐色の短毛を密生す。小腮鬚は褐色にして各節の末端は赤黃下唇鬚は黃色なり。前胸背の中央に淺き1縱溝あり,その後緣に近き兩側には各1個の淺き凹陷部を裝ひ,この部分に小點刻あり,他はこれを缺く。翅鞘には9條の縱溝を裝ひその第9條目の縱溝に沿ひて粗大なる點刻を裝ふ。脚は黑色,脛節及び跗節は赤褐色なり。本邦には極めて普通に產す。

體長……8–11 mm.

分布……北海道，本州，四國，九州。

5. スヂアオゴミムシ

Chlaenius costiger Chaudoir.

歩行蟲科

頭部及び前胸背は光線の方向によつて赤色又は綠色光澤を有す。觸角は褐色にして短毛を密生す。兩鬚は暗褐色なり。前胸背に淺き點刻を散在し中央には判然せる縱溝を裝ふ。後緣に近き左右には各1個の凹陷あり。翅鞘には8條の縱隆起線を裝ひ,その間室には點刻を密布す。腹面は黑色,脚は赤褐色なり。東京附近に於ては倒木,石の下等に棲み珍らしからず。

體長……20–23 mm.

分布……本州，九州，朝鮮，臺灣。

6. オホゴミムシ

Triplogenius magnus Motschulsky.

歩行蟲科

體は光澤ある黑色,頭部は大,頭頂の兩側には各1條の縱溝を裝ひ,觸角は黑色にして第4節以後は褐色短毛を密生す。前胸背は前緣の幅最も廣く,中央は圓く隆起す。中央に淺き1縱溝と後緣に近き兩側に凹陷部あり。翅鞘には判然せる8條の縱溝あり,その溝の中には小點刻を裝ひ,第2溝に2個,第3溝に1個の大點刻あり。尙ほ外緣には1個の粗大點刻列を裝ふ。脚は黑色,跗節は黑褐色なり。石の下又は倒木の下等に多く棲む。

體長……25 mm. 內外。

分布……北海道，本州，四國，九州。

7. マダカチビカハゴミムシ

Asaphidion semilucidus Motschulsky.

步行蟲科

黑色にして金屬性眞鎗光澤を有す。頭部比較的大にして複眼は甚だよく發達す。前頭部は稍凹陷し顆粒狀にして短毛を密生す。觸角は暗褐色を呈す。前胸背には點刻を裝ひ中央に1縱溝あり。翅鞘には點刻及び短毛を裝ふ。但しこれを缺く部分數ヶ所ありて恰かも斑紋の如し。腹面及び脚は黑色なり。

體長……5 mm. 內外。

分布……樺太，北海道，本州。

8. ナガヘウタンゴミムシ

Scarites pacificus Bates.

步行蟲科

光澤ある黑色にして兩鬚は赤褐,觸角は稍連鎖狀,大腮はよく發達す。頭の前部には縱に多數の皺を有す。前胸背は前緣に沿ひて1條の橫溝及び中央に淺き1縱溝を裝ひ,他は滑らかなり。前胸と中胸との接合部は細し。翅鞘には7條の判然せる縱溝を裝ふ。塵芥等の下に稀ならず。

體長……18–20 mm.

分布……本州，四國，九州，臺灣。

9. アヲハラアカゴミムシ

Colpodes sylphis Bates.

步行蟲科

頭部は稍細長く頭長は平滑にして光澤あり。觸角及び兩鬚は赤褐色なり。前胸背は黑褐色にして光澤あり,左右兩緣は黃褐色にして稍上反す。中央には淺き1縱溝あり,後緣に近く點刻を裝ふ。翅鞘には8縱溝あり,その各々には點刻を密布す。腹面及び脚は赤褐色なり。

體長……10–12 mm.

分布……北海道，本州。

10. マダラミヅギハゴミムシ

Bembedium varius Olivier.

步行蟲科

頭部及び前胸背は黑色にして綠色の光澤あり。觸角及び小腮鬚は黑褐色にして基部は黃褐色なり。前胸背の中央に淺き縱溝あり,後緣の兩側稍凹陷す。翅鞘には7條の淺き點刻列を裝ひ,肩部及び翅端に近く黃紋あり。腹面は灰黑色,脚は黃色,腿節は褐色,水邊に多く棲息す。

體長……4.5 mm. 內外。

分布……樺太，北海道，本州。

11. ミイデラハンメウ

Pheropsophus jezzoensis Morawitz.

步行蟲科

頭部は平滑,觸角は黄褐,兩鬚は赤褐色なり。前胸背の中央には極めて淺き縦溝と前,後兩縁に近く點刻を散在す。翅鞘には7條の幅廣き縦溝を具へ,その中に菱形の縮紋を裝ふ。雄にありては尾端に迄達すれども雌にては短かくして終りの2,3節は翅鞘の外に露出す。胸部下面及び脚は黄色,腹部は黒色,極めて普通種にして危險に陷れば尾端より瓦斯を發散するを以て有名なり。

體長……16–20 mm.

分布……本州, 四國, 九州。

12. アトボシゴミムシ

Chlaenius naeviger Moraiwitz.

步行蟲科

頭部及び前胸背は金赤色を帶び觸角は第3節まで黄色,他は褐色,兩鬚は黄色,頭頂は扁平して點刻を裝ふ。前胸背は粗糙にして不定の點刻を散在す。翅鞘には8條の判然せる縦溝を裝ひ,第8縦溝には大點刻を散在し,間室には細點刻及び黄色短毛を密布す。腹面は黒色なり。普通種にして塵芥中又は倒木,石の下等に棲む。

體長……13–15 mm。

分布……北海道, 本州, 九州。

13. ジユウジゴミムシ

Lebia japonica Chaudoir.

步行蟲科

頭部及び前胸背は暗黄色,頭部は平滑にして觸角,兩鬚共に黄色,前胸背の左右兩縁及び後縁近くは凹陷し翅端に至りて再び上反す。

中央に1縦溝あり。翅鞘には8條の縦溝を裝ひ,腹面及び脚は黄色なり。稀ならざる種類なり。

體長……6 mm. 內外。

分布……本州, 九州。

14. ヤホシゴミムシ

Lebida octoguttata Morawitz.

步行蟲科

頭部は黄褐色にして微細の點刻あり。前胸背の周縁は上反し,左右及び後縁は特に大なり。この部分は淡黄,中央は黄褐にして淺き縦溝を裝ふ。翅鞘には小點刻を密布し,8個の斑紋に依り容易に他の種と區別せらる。多くは樹上に棲み叩網採集法により獲らる。

體長……10–12 mm.

分布……北海道, 本州, 九州。

15. ゴミムシ

Anisodactylus signatus Illiger.

步行蟲科

黒色を普通とすれども綠色を帶べるものもあり。觸角は黒褐色,各節の末端は赤褐色,頭頂には小點刻を有し2個の赤紋を裝ふ。前胸背には點刻を密布し後縁の點刻は大なり。翅鞘には8條の判然せる縦溝あり,腹面及び脚は黒色にして腹部末節には2個の赤紋を有す。最も普通種にしてよく飛翔す。

體長……13–15 mm.

分布……北海道, 本州, 四國, 九州, 朝鮮。

第二十圖

1. オサムシモドキ

Craspedonotus tibialis Schauman.

步行蟲科

頭部は大きく,前頭には粗大の點刻あれども頭頂の點刻は小形にして少なし。觸角は黒褐,基部及び末端は赤褐色なり。前胸背の前半は幅廣く後方に至りて急に細まる。點刻及び横皺多く,中央に1縦溝を具へ後緣に近く縮紋あり。翅鞘には點刻縦列不規則に並列し,會合線に近き7,8條はその中間稍隆起す。腹面及び脚は黒色,脛節(基部を除く)は黒色,跗節は黒褐色なり。普通種にして河畔の砂地に多し。

體長……22–24 mm.

分布……北海道, 本州, 朝鮮, 臺灣。

2. キベリツヤゴモクムシ

Chlaenius proximus Chaudoir.

步行蟲科

頭部及び前胸背は漆黒色にして光澤を有し,翅鞘は綠色にして光澤を有す。前頭には淺き凹陷部あり,點刻を缺く。觸角は黒褐,基部及び第2節は黄色,兩鬚は黄褐色なり。前胸背の兩側は黄色にて縁取られその前部には點刻なく後緣に近く稍陷入し小點刻を密布す。翅鞘には點刻なく8條の縦溝あり,その第6條より外緣は黄色,胸部下面は黒褐色,腹部は黄褐色なり。脚は黄色にして褐色の刺毛を生ず。

體長……9 mm. 內外。

分布……北海道, 本州, 朝鮮, 支那, 歐洲。

3. クロヒメゴミムシ

Tachycellus congruus Motschulsky.

步行蟲科

頭部は光澤ある黒色にして頭頂は隆起す。前頭には淺く短かき横溝あり。觸角は黄褐色,前胸背の前部は平滑にして後緣に近き左右には小凹陷部あり,その近くに小點刻を裝ふ。外緣は赤褐色を帶ぶ。翅鞘は光澤なく8條の縦溝を裝ひ點刻を缺く。腹面及び脚は黒色,但し脛節以後は赤褐色なり。東京附近に多し。

體長……7–8 mm.

分布……本州。

4. ホソオサムシ

Carabus tenuiformis Bates.

步行蟲科

頭頂,前胸背及び翅鞘は赤銅色,光線の方向により綠色を呈す。前頭は黒色にして粗大點刻あり。觸角の基部4節は黒色,第5節以下は褐色短毛を密生す。前胸背には不規則の點刻を裝ひ,後緣には縮紋多く,中央には淺き縦溝を裝ふ。稜狀部は甚だ小にして中央は凹陷す。翅鞘には12,3條の縦隆線を裝ひ,その中第3,7,11の隆線は10個以上に斷續す。これ等は翅端の近くに至りて消滅す。金綠色のものあり。北海道には普通に產し本州に於ては高山に於て捕獲せらる。

體長……22 mm.

分布……北海道，本州(日光)。

5. キベリアヲゴミムシ

Chlaenius inops Chaudoir.

步行蟲科

頭部は金綠色光澤あり點刻なく,縮紋を裝ふ。觸角の基部3節は褐色,それ以下は黑褐色にして短毛を密生す。前胸背には微細の點刻を密布し中央に縱溝あり,その後緣に近き兩側には凹陷部あり,外緣は褐色を帶ぶ。翅鞘は暗綠色にして光澤を缺き,外緣は暗黃色を以て緣取らる。8條の縱溝を裝ひ,間室は稍隆起し,多數の微細點刻を裝ひ,黃色の短毛を密生す。腹面は黑褐色,脚は褐色なり。極めて普通種にして田圃の塵芥の下に多し。

體長……13–15 mm.

分布……北海道，本州，九州。

6. ヒラタゴミムシ

Agonum magnus Bates.

步行蟲科

頭部及び前胸背は黑色にして甚だ光澤あり。前頭には八狀の凹陷を具へ頭頂には2個の赤紋あり。觸角及び兩鬚は赤褐色,前胸背は稍心臟形,兩緣は上反す。中央に縱溝を裝ひ,その後端に近き兩側には凹陷部あり,これに粗大點刻を散布す。翅鞘には8條の判然せる縱溝を裝ひ,その第3溝には2個の大點刻あり,その間室は稍隆起す。胸部腹面は褐色,腹部は赤褐色,脚も亦赤褐色なり。

體長……13–16 mm.

分布……北海道，本州，四國，九州。

7. セアカゴミムシ

Dolichus halensis Schallar.

步行蟲科

頭部は黑色にして光澤あり,複眼の間に2個又は4個の赤色橫紋あり,觸角は褐色,兩鬚は赤褐色なり。前胸背は赤褐色,中央に縱及び橫皺を裝ひ,周緣に近く點刻を有す。翅鞘は黑色にして光澤を缺き8條の縱溝を裝ふ。腹面は光澤ある黑褐色にして脚は黃褐色,本邦には極めて普通に產す。

體長……17–23 mm.

分布……北海道，本州，四國，九州，朝鮮，支那，歐洲。

8. ヨツボシゴミムシ

Panageus japonicus Chaudoir.

步行蟲科

頭部は細長く黑色,頭頂は圓く隆起し光澤あり,前頭には點刻を裝ふ。觸角は黑褐色にして基節は赤褐色なり。前胸背は黑色にして深き點刻及び褐色毛を散在す。中央には縱溝を裝ふ。翅鞘は黑色にして4個の黃褐紋を裝ひ,全面に褐色毛を生じ,8條の縱溝を具へ,各溝には點刻を裝ふ。間室は稍隆起し小點刻あり。腹面は黑色,脚は赤褐色なり。北海道に多く東京附近にはあまり多からず。倒木,石の下等に棲む。

體長……11–12 mm.

分布……北海道，本州。

9. ハンメウ

Cicindela chinensis Degeer.

斑蚩科

一名ミチオシヘ又はミチシルベとも稱し,體は金綠色及び紫色に輝き,美麗なる種類なり。頭部は金綠色,複眼の內側は青紫色にして多くの細皺を有す。觸角及び兩鬚は紫藍色,前胸背は青綠色にして前緣及び後緣は紫藍色,中央に縱溝を裝ふ。翅鞘は紫黑色にして肩部,會合線,翅端及び中央の大橫帶は赤綠色を呈す。尙ほ前緣に1個,中央に2個及び翅端に近く1個の黃白紋を裝ふ。脚は藍綠色,腿節は赤綠色なり。田圃,砂地等に極めて普通に產す。

體長……18–20 mm.

分布……本州，四國，九州，朝鮮，琉球，支那。

10. ニハハンメウ

Cicindela japana Motschulsky.

斑蚩科

頭部は唐金色を呈し,前頭には橫縮,後頭には縱縮を裝ふ。上脣及び大腮は黃白色,末端は黑褐色,兩鬚は黑褐色なり。觸角の基部4節は赤黑色,他は黑色にして灰色の短毛を裝ふ。前胸背は中央に細き縱溝と前緣及び後緣には橫に凹陷部あり。多數の細縮を裝ふ。翅鞘は帶紅灰綠色にして濃紫色の斑點を散在し全面に小顆粒を密布す。肩部,中央部及び翅端に黃白色の斑紋を裝ふ。腹部は金綠色,胸部は金赤色にして長白毛を裝ひ,脚は唐金色を呈す。普通種にして

色彩及び斑紋は變化多し。

體長……17 mm. 內外。

分布……北海道，本州，四國，九州，朝鮮。

11. コニハハンメウ

Cicindela japonensis Chaudoir.

斑蚩科

前種に似れども小形なり。頭部は唐金色を呈し,縮紋を裝ひ,上脣は黃白色,前緣は黑褐色,兩鬚は金綠色にして白毛を裝ふ。前胸背は前,後兩緣に近く各1條の橫溝,中央部に縱溝を裝ふ。翅鞘は赤綠色にして青紫色の小點刻を散在す。斑紋は4個にして肩部のものは最も小なり。腹面は胸部赤紫色,腹部は金綠色にして長毛を裝ふ。普通種なり。

體長……11–13 mm.

分布……本州，朝鮮。

12. カハラハンメウ

Cicindela laetescripta Mostchlsky.

斑蚩科

頭部は青藍色,上脣は大にして黃白色,大腮も亦黃白色,先端は黑褐色,兩鬚は黃褐色なり。前胸背は圓筒狀にして中央は心臟形に隆起し,その中央に縱溝を具へ,兩側に長毛を生ず。翅鞘は青綠色にして紫色の點刻を密布し,翅底及び前緣には黃白色の斑紋を裝ふ。腹面は帶綠紅紫色にして白色長毛を裝ひ美麗なり。脚は細長く金綠色を呈し白毛を裝ふ。河原,海岸等の砂地に多し。

體長……14–15 mm.

分布……樺太，北海道，本州，四國，九州，琉球，朝鮮，支那，西伯利亞。

13. ミヤマハンメウ

Cicindela sachalinensis Morawitz.

斑蚨科

ニハハンメウ(Cicindela japana Motschulsky)に酷似すれども翅鞘の中央にある山形紋は高く且つ細長く判然せる故に容易に識別することを得。上唇は黄白色にして周縁は黒褐色,前縁の中央に1個の黒色突起を具ふ。大腮は基部黄白色,先端は黒褐色,兩縁は黒綠色,前胸背は青紫色にして細縮を裝ふ。翅鞘は赤綠色にして青紫色の點刻を散在す。4個の斑紋は黄白色にして肩部のものは最小なり。腹面は赤綠色光澤あり。白毛を散生す。脚は紫色にして白毛を生ず。北海道には普通,本州に於ては高山に多し。

體長……16–17 mm.

分布……樺太，北海道，本州(高山)，朝鮮，西伯利亞。

14. ヒメハンメウ

Cicindela elisae Motschulsky.

斑蚨科

頭部は唐金色を呈し,複眼の內側には縮紋を有す。上唇は黄白色,大腮は基部黄白,末端は黒褐色,兩鬚は淡褐色を呈し末節は金綠色なり。前胸背は頭部と同色にして,中央は縦れ,兩側に白色長毛を生ず。翅鞘は赤褐色にして綠色の小斑紋を有す。腹面は黒綠色にして白色の長毛を裝ふ。脚は赤綠色にして白毛あり。田圃の濕地に多し。

體長……10 mm. 內外。

分布……本州，朝鮮，臺灣，支那，西伯利亞。

15. ホソハンメウ

Cicindela gracilis Pallas.

斑蚨科

頭部は黒色にして縮條を裝ひ,上唇は黒色にして中央に縦隆あり,雄は黄白紋を裝ふ。大腮は黄白色,先端は暗褐色,兩鬚は黄褐色にして末節は暗色なり。前胸背は細き圓筒形,兩側に灰白紋を裝ふ。翅鞘は天鵞絨様黒褐色を呈し,前縁の中央に長き黄白色斑紋,翅端に近く同色の小斑紋を有し,會合線の後方には赤褐色の長紋を裝ふ。腹部は黒褐色,脚は暗綠色,脛節,跗節は褐色なり。

體長……11–12 mm.

分布……北海道，本州，四國，九州，朝鮮，滿洲，西伯利亞。

16. ヤツボシハンメウ

Cicindela aurulenta Batesi Fleutaux.

斑蚨科

色彩はハンメウ(Cicindela chinensis Degeer)に似るも稍小形,頭部は金綠紫色にして觸角の基部4節は紫色,他は黒色,前胸背は頭部と同色,中央及び兩側は紫色,翅鞘は黒紫色の部分多く,周縁は青綠色にして各4個の楕圓形斑紋あり,その中3個は判然するも,肩部にあるものは最小にして上面より殆んど認められず。脚及び腹面は藍綠色にして白毛を裝ふ。本邦に於ては臺灣のみ産す。

體長……15–17 mm.

分布……臺灣，支那。

學名索引

(羅馬數字は圖版番號，亞剌伯亞數字は圖中の番號同じく，ゴヂックの數字は記載文の所在頁を表はす。)

A

Acrothinium Gaschkewitchi Motshulsky……Ⅱ, 13, **23**
Aderorrhinus crioceroides Roelofs……Ⅴ, 15, **47**
Adoxus japanus Motschulsky……Ⅱ, 16, **24**
Adretus tenuimaculatus Waterhouse ……Ⅺ, 11, **93**
Aenidia armata Baly ……Ⅰ, 19, **16**
Agabus consicus Sharp……ⅩⅧ, 10, **145**
Agabus japonicus Sharp……ⅩⅧ, 6, **143**
Agelastica caerulea Motschulsky……Ⅱ, 9, **21**
Agonum maguus Bates……ⅩⅩ, 6, **158**
Agrillus cyaneoniger Saunders ……Ⅹ, 11, **86**
Alcides trifidus Pascoe ……Ⅵ, 6, **51**
Allecula melanaria Makelin……Ⅷ, 6, **67**
Allecula simiola Lewis……Ⅷ, 7, **67**
Amara chalcites Zimmermann……ⅩⅩ, 4, 150
Amphiops mater Sharp……ⅩⅦ, 9, **136**
Ancylopus melanocephalus Olivier……Ⅰ, 15, **14**
Anisodactylus signatus Illiger……ⅩⅩ, 15, **155**
Anomala cuprea Hope……Ⅺ, 1, **89**
Anthrenus pimpinellae Fabricius ……ⅩⅣ, 9, **111**
Anthrenus verbaci Linnaeus……ⅩⅣ, 8, **111**
Anthypna pectinata Lewis……Ⅻ, 1, **95**
Aphodius elegans Allibert……Ⅻ, 9, **99**
Aphodius Solskyi Harold……Ⅻ, 12, **100**
Apoderus Jekeli Roelofs……Ⅶ, 1, **57**
Apriona rugicollis Chevrelat……Ⅳ, 6, **37**
Arthromacra decora Marseul……Ⅷ, 5, **67**
Asaphidion semilucidus Motschulsky……ⅩⅩ, 7, **152**
Aspidimorpha difformis Motschulsky……Ⅱ, 6, **20**
Aspidobyctiscus lacunipennis Jekel……Ⅴ, 12, **46**
Attagenus japonicus Reitter……ⅩⅣ, 13, **113**
Aulacophora angulicollis Motschulsky……Ⅱ, 7, **20**
Aulacophora femoralis Motschulsky……Ⅰ, 16, **14**
Aulacophora nigripennis Motschulsky……Ⅱ, 8, **21**
Aulacochilus japonicus Crotch ……Ⅲ, 13, **32**
Autoserica japonica Motschulsky……Ⅺ, 3, **90**

B

Balaninus dentipes Roelofs……Ⅵ, 7, **52**
Baris Reinii Roelofs……Ⅵ, 8, **52**
Baryrrhynchus Poweri Roelofs……Ⅷ, 5, **59**
Batocera lineolata Chevrolat……Ⅳ, 5, **37**
Bembedium varius Olivier……ⅩⅩ, 10, **153**
Berosus punctipennis Harold ……ⅩⅦ, 4, **134**
Bidesus japonicus Sharp ……ⅩⅧ, 14, **147**
Bolbocerus nigroplagiatum Waterhouse……Ⅻ, 14, **101**
Buprestis japonensis Saunders……Ⅹ, 7, **84**
Byctiscus venustus Pascoe……Ⅴ, 14, **47**

C

Cagosima sanguinolenta Thomson……Ⅴ, 4, **42**
Cantharis ciusiana Kiesenwetter……Ⅸ, 14, **78**
Carabus blaptoides Lewisi Rye ……ⅩⅩ, 3, **150**
Carabus insulicola Chaudoir……ⅩⅩ, 2, **149**
Carabus procerulus Chaudoir ……ⅩⅩ, 1, **149**
Carabus tenuiformis Bates……ⅩⅩ, 4, **157**
Cassida equestris Fabricicus ……Ⅲ, 7, **29**
Catharsius molossus Linnaeus ……Ⅻ, 16, **102**
Cereyon vagus Sharp……ⅩⅦ, 6, **135**
Cetonia Roelofsi Harold……Ⅻ, 2, **95**
Chalcophora japonica Gory ……Ⅹ, 9, **85**
Chilocorus similis Rossi ……Ⅰ, 7, **11**
Chilocorus tristis Faldermann ……Ⅰ, 11, **12**

Chlaenius costiger Chaudoir ..... XX, 5, 151
Chlaenius inops Chaudoir ..... XX, 5, 158
Chlaenius naeviger Morawitz ..... XX, 12, 154
Chlaenius proximus Chaudoir ..... XX, 2, 156
Chloridolum thaliodes Bates ..... IV, 10, 39
Chlorophanus graudis Roelofs ..... VI, 13, 54
Chlirophorus Motschulskyi Ganglbauer ..... III, 9, 30
Clytra laeviascula Ratzeburg ..... II, 1, 18
Chrysochroa elegans Thumbeg ..... X, 12, 86
Chrysomel aurichalcer Gebler ..... I, 17, 15
Chrysomela guttata Gebler ..... II, 5, 19
Cicindela aurulenta Batesi Eleut ..... XX, 16, 163
Cicindela chinensis Degeer ..... XX, 9, 160
Cicindela elisae Motschulsky ..... XX, 14, 162
Cicindela gracilis Pallas ..... XX, 15, 163
Cicindela japana Motschulsky ..... XX, 10, 160
Cleindela japonensis Chaudoir ..... XX, 11, 161
Cicindela laetescripta Motschulsky ..... XX, 12, 161
Cicindela sachalinensis Morawitz ..... XX, 13, 162
Cis seriatulus Kiesenwetter ..... X, 1, 73
Cleonus japonicus Faust ..... VI, 2, 49
Coccinella Brukii Mulsant ..... I, 1, 9
Coccinella 12-maculata Gebler ..... I, 8, 11
Colpodes sylphis Bates ..... XX, 9, 153
Copris ochus Motschulsky ..... XII, 17, 103
Copris tripartita Waterhouse ..... XII, 15, 102
Coraebus quadriundulatus Motschulsky ..... X, 10, 86
Corymbites pacatus Lewis ..... X, 1, 82
Corymbites pruinosus Motschulsky ..... X, 2, 82
Craspedonotus tibialis Schauman ..... XX, 1, 156
Creophilus maxillosus Linnaeus ..... XVI, 1, 125
Cryptocephalus approximatus Baly ..... II, 15, 23
Cryptocephalus japanus Baly ..... II, 3, 19
Cryptoderma fortunei Waterhouse ..... VI, 11, 53
Cucujus coccinatus Lewis ..... XV, 1, 116
Cupes clathratus Solsky ..... XIV, 16, 114
Cybister brevis Aubé ..... XVIII, 3, 142
Cybister japonicus Sharp ..... XVIII, 2, 141
Cybister tripunctaus Olivier ..... XVIII, 1, 141
Cyclonotum simplex Sharp ..... XVII, 7, 135
Cyenotrachelus Roelofsi Harold ..... V, 16, 47
Cynauges Gorhami Lewis ..... I, 14, 14

D

Dasyvulgus angusticollis Waterhouse ..... XII, 5, 97
Denticollis miniatus Candéze ..... X, 4, 83
Deporaus minimus Kôno ..... V, 9, 44
Dermatoxenus nodosus Motschulsky ..... VI, 4, 50
Dermestes coarctatus Harold ..... XIV, 10, 112
Dermestes tesselatocollis Motschulsky ..... XIV, 12, 113
Dermestes vulpinus Fabricius ..... XIV, 11, 112
Dihammus cervinus Hope ..... III, 4, 28
Dihammus luxuriosus Bates ..... IV, 2, 35
Dineutus marginatus Sharp ..... XVII, 12, 238
Dinoderus japonicus Lesne ..... K, 6, 75
Distenia gracilis Blessig ..... V, 1, 41
Dolichus halensis Schallar ..... XX, 7, 159

E

Echinocnemus bipunctatus Roelofs ..... VII, 6, 59
Ectatorrhinus Adamsi Roelofs ..... VI, 5, 51
Ectinohoplia obducta Motschulsky ..... XII, 6, 97
Epicauta Gorhami Marseul ..... VIII, 2, 65
Epilachna admirabilis Crotch ..... I, 4, 9
Episcapha taishoensis Lewis ..... III, 12, 31
Episomus turritus Shönherr ..... VI, 3, 50
Eretes sticticus Linnaeus ..... XVIII, 4, 142
Eucibdelus japonicus Sharp ..... XVI, 10, 129
Eucteis bimaculata Guérin ..... K, 17, 80
Eugnathus distnctus Roelofs ..... VI, 15, 55
Eumolpus Petasites Motschulsky ..... II, 17, 24
Eutetrapha variicornis Bates ..... III, 14, 32
Eurytrachelus montivagus Lewis ..... XII, 8, 107
Eurytrachelus platymelus Saunders ..... XII, 3, 104

Eurytrachelus rectus Motschulsky ..... XII, 7, 106
Eurytrachelus rubrofemoratus Vollenhoven XII, 9, 107

F

Formicomus braminus Laferte ..... VII, 13, 62
Formicomus 4-maculauts Matsumura ..... VII, 14, 63

G

Galeruca multicosta Jacoby ..... III, 2, 27
Geotrupes auratus Motschulsky ..... XII, 6, 103
Geotrupes laevistriatus Motschulsky ..... XII, 2, 104
Geortupes purpurescens Waterhouse ..... XII, 4, 105
Glycphana fulvistemma motschulsky ..... XI, 3, 96
Graphoderes Adamsi Clark ..... XVIII, 8, 144
Gynandrophthalma affinis Illiger ..... III, 6, 29
Gyrinus curtus Motschulsky ..... XVII, 10, 137
Gyrinus japonicus Sharp ..... XVII, 11, 137

H

Haliplus japonicus Sharp ..... XVII, 15, 139
Helochares striatus Sharp ..... XVII, 8, 136
Helops strigipennis Marseul ..... VIII, 10, 69
Helota gemmata Gorham ..... XV, 2, 116
Hister cadaverinus Hoffman ..... XIV, 3, 109
Hister jamatus Motschulsky ..... XIV, 1, 108
Hsiter japonicus Marseul ..... XIV, 4, 109
Hister simplicisternus Lewis ..... XIV, 2, 108
Hispa angulosa Solsky ..... II, 18, 25
Hispa subquadrata Baly ..... II, 19, 25
Holotrichia kiotoensis Brenske ..... X, 4, 90
Holtica coerulescens Baly ..... II, 11, 22
Hoplia communis Waterhouse ..... XI, 4, 96
Hybius apicalis Sharp ..... XVIII, 5, 143
Hydaticus Bowringi Clark ..... XVIII, 7, 144
Hydaticus grammicus nigrovitatus Clark XVIII, 9, 144
Hydrophilus acuminatus Motschulsky ..... XVII, 2, 133
Hydrocharis affinis Sharp ..... XVII, 1, 133
Hyphydrus japonicus Sharp ..... XVIII, 15, 147

I

Ithone hexaspilota Hopkins ..... I, 10, 12

L

Laccophilus difficilis Sharp ..... XVIII, 13, 146
Laccophilus Sharpi similis Regimbart ..... XVIII, 12, 146
Lacon bindulus Motschulsky ..... X, 3, 82
Lagria rufipennis Marseul ..... VIII, 4, 66
Larinus ovalis Roelofs ..... VI, 9, 52
Lathrobium digne Snarp ..... XVI, 14, 131
Lebia japonica Chaudoir ..... XK, 13, 154
Lebidia octoguttata Morawitz ..... XK, 14, 155
Leistorophus gracilis Sharp ..... XVI, 13, 131
Leontium viride Thomson ..... IV, 11, 41
Leptura succedanea Lewis ..... V, 3, 42
Librodor janoicus Matschulsky ..... XV, 3, 117
Liocola brevitarsis Lewis ..... X, 13, 87
Lochmaea capreae Linnaeus ..... II, 20, 25
Lucanus maculifemoratus Motschulsky ..... XII, 5, 105
Lucernula fumosa Gorham ..... K, 12, 78
Lucidina biplagiata Motschulsky ..... K, 9, 76
Luciola cruciata Motschulsky ..... K, 8, 76
Luciola parvula Kiesenwetter ..... K, 11, 77
Luciola picticollis Kiesenwetter ..... K, 7, 75
Lycus modestus Kiesenwetter ..... K, 10, 77
Lyprops sinenis Marseul ..... VIII, 12, 70

M

Mallambyx Raddei Blessig ..... IV, 7, 38
Megopis sinica White ..... IV, 9, 39
Melamauster chinensis Förster ..... IV, 4, 36
Melanotus Harmandi Fleutiaux ..... X, 5, 83
Melanotus legatus Candéze ..... K, 20, 81

Melasoma aenea Linnaeus ..... I, 20, 16
Melasoma vigintipunctata Scopoli ..... II, 2, 18
Meloe corvinus Marseul ..... VIII, 1, 65
Melolontha frater Arrow ..... XI, 5, 90
Melolontha japonica Burmeister ..... XI, 7, 91
Melospila consociata Baly ..... II, 4, 19
Mesosa japonica Bates ..... V, 5, 43
Mimela lucidula Hope ..... XI, 13, 94
Motoecus abdominalis Matsumura ..... VIII, 3, 66
Myllocerus griseus Roelofs ..... V, 10, 45

N

Necrodes asiaticus Portevin ..... XV, 15, 123
Neorodes nigricornis Harold ..... XV, 16, 124
Necrophorus concoler Kraatz ..... XV, 9, 120
Necrophorus maculifrons Kraatz ..... XV, 14, 123
Necrophorus quadripunctatus Kraatz ..... XV, 13, 122
Neotriplax atrata Lewis ..... III, 11, 31
Nephus bipunctatus Kugel ..... I, 6, 11
Nodostoma aeneipenne Motschulsky ..... II, 10, 21
Nodynus leucofaciatus Lewis ..... XV, 11, 121
Noterus japonicus Sharp ..... XVIII, 16, 148
Novius limbatus Motschulsky ..... I, 5, 10

O

Oberea japonica Thunberg ..... V, 7, 44
Octoglossa flabellata Kiesenwetter ..... K, 18, 80
Octotemus laminifrons Motschulsky ..... K, 2, 73
Ocypus daimio Sharp ..... XVI, 4, 126
Ocypus gloriosus Sharp ..... XVI, 6, 127
Ocypus Wiesei Harold ..... XVI, 5, 127
Oedemera lucidicollis Motschulsky ..... VII, 12, 62
Onthophagus ater Waterhouse ..... XII, 11, 100
Onthophagus nitidus Waterhouse ..... XII, 8, 98
Onthophagus viduus Harold ..... XII, 10, 99
Onthophilus flavicornis Lewis ..... XIV, 6, 110
Onthophilus sp. ..... XV, 7, 110
Oniticellus phanaeoides Westwood ..... XII, 13, 101
Opatrum japonicum Motschulsky ..... VIII, 15, 71
Opatrum pubens Marseul ..... VIII, 16, 71
Orectochilus Régimbarti Sharp ..... XVII, 13, 138
Othius rufipennis Sharp ..... XVI, 11, 130
Oxycetonia jucunda Faldermann ..... XI, 12, 93

P

Paederus idae Lewis ..... XVI, 7, 128
Paederus Poweri Lewis ..... XVI, 8, 128
Panageus japonicus Chaudoir ..... XX, 8, 159
Paraplapoderus pardalis Vollenhoven ..... VII, 4, 58
Paratrachelophorus longicornis Roelofs ..... VII, 2, 57
Pectocera fortunei Candéze ..... X, 6, 84
Peltodytes intermedius Sharp ..... XVII, 14, 139
Phaedon brassicae Baly ..... II, 14, 23
Pheropsophus jezzoensis Morawitz ..... XX, 11, 153
Phialodes rufipennis Roelofs ..... VII, 3, 58
Phileurus chinensis Faldermann ..... XI, 10, 92
Philonthus spinipes Sharp ..... XVI, 16, 132
Phyllobius armatus Roelofs ..... VI, 16, 55
Phyllobius incomptus Sharp ..... VI, 14, 55
Phyllobius longicornis Roelofs ..... V, 11, 45
Phyllopertha orientalis Waterhouse ..... XI, 8, 92
Phyllopertha pubicollis Whterhouse ..... XII, 7, 98
Phytodecta gracilicornis Kraatz ..... III, 3, 28
Phytodecta rubripennis Baly ..... II, 12, 22
Phytoecia rufiventris Gautier ..... III, 16, 33
Plagiodera distincta Baly ..... I, 18, 15
Plesiopthalmus laevicollis Harold ..... VIII, 9, 68
Plesiophtalmus nigratus Matschulsky ..... VIII, 8, 68
Popilia japonica Newman ..... XI, 2, 89
Prionus insularis Motschulsky ..... IV, 1, 35
Propylea japonica Thunberg ..... I, 9, 12
Psacothea hilaris Pascoe ..... IV, 3, 36
Psalidoremus inflexus Harold ..... XIII, 1, 104
Ptilineurus marmoratus Reitter ..... K, 4, 74

Ptomascopus morio Kraatz ..... XV, 10, 121
Ptychanatis axyridis Pallas ..... I, 2, 3, 9
Ptynus fur Linnaeus ..... K, 5, 75
Purpuricenus spectabilis Motschulsky ..... III, 5, 28
Purpuricenus Temminckii Guérin ..... III, 1, 27
Pyrochroa vestiflua Lewis ..... VII, 16, 64

R

Rhantus pulverosus Stephens ..... XVIII, 11, 145
Rhomborrhina japonica Hope ..... X, 15, 88
Rhomborrhina polita Waterhouse ..... X, 14, 87
Rhomborrhina unicolor Motschulsky ..... X, 16, 88
Rhynchites heros Roelofs ..... V, 8, 44
Rosalia Batesi Harold ..... V, 2, 41

S

Saprinus subaeneus Schmidt ..... XIV, 5, 109
Saula japonica Gorham ..... I, 13, 13
Scaphidium japonicum Reitter ..... XV, 4, 117
Scarites pacificus Bates ..... XX, 8, 152
Scepticus insularis Roelofs ..... VI, 10, 53
Schizotus rubricollis Lewis ..... VII, 15, 63
Scolytus esuriensis Blandf ..... VII, 7, 60
Scyrtes japonicus Kiesenwetter ..... K, 16, 79
Semanotus japonicus Lacordaire ..... III, 18, 34
Serica orientalis Motschulsky ..... XI, 9, 92
Siagonium Haroldi Weise ..... XVI, 15, 131
Silpha auripilosa Portevin ..... XV, 8, 120
Silpha brunneicollis Kraatz ..... XV, 7, 119
Silpha japonicus Motschulsky ..... XV, 12, 122
Silpha perforata Gebler ..... XV, 6, 118
Silyha subrugosa Portevin ..... XV, 5, 118
Silvanus surinamensis Linnaeus ..... XIV, 14, 114
Sipalus hypocrita Boheman ..... VI, 1, 49
Spheniscosomus cete Candéze ..... K, 19, 81
Sphenophorus carinicollis Grllenhal ..... VI, 12, 54
Spondylis buprestoides Linnaeus ..... IV, 8, 38
Staphylinus carinatus Sharp ..... XVI, 2, 125
Staphylinus paganus Sharp ..... XVI, 3, 126
Stenus tenuipes Sharp ..... XVI, 9, 129
Stenygrnum quadrinotatum Bates ..... III, 17, 34
Sternolophus rufipes Fabricius ..... XVII, 3, 134
Stilcus rufensans Sharp ..... XVI, 12, 130
Strangalia ochraceofasciata Motschulsky ..... III, 8, 30
Symbiotes nipponensis Gorham ..... I, 12, 13

T

Tachycellus congruns Motschulsky ..... XX, 3, 157
Telephorus suturalis Motschulsky ..... K, 15, 79
Telephorus viridipennis Kiesenwetter ..... K, 13, 78
Tenebrio ventralis Marseul ..... VIII, 13, 70
Tenebroides mauritanica Linnaeus ..... XIV, 15, 114
Tetraphyllus lunuliger Marseul ..... VIII, 14, 71
Trachys griseofasciata Saunders ..... X, 8, 85
Trichodesma fasciculatum Kiesenwetter ..... K, 3, 74
Triplax subflava Lewis ..... IV, 10, 31
Triplogenius magnus Motschulsky ..... XX, 6, 151
Tropideres nodulosus Sharp ..... V, 13, 46

U

Uloma latimanus Kolbe ..... VIII, 11, 69
Uraecha bimaculata Thomson ..... V, 6, 43

V

Volvulus Profundus Sharp ..... XVII, 5, 135

X

Xanthochroa Hilleri Harold ..... VII, 11, 61
Xanthochroa luteipennis Marseul ..... VII, 10, 61
Xanthochroa Waterhousei Harold ..... VII, 9, 61
Xyleborus atratus Eichhoff ..... VII, 8, 60
Xylotrechus chinensis Chevrolat ..... III, 15, 33
Xylotrupes dichotomus Linnaeus ..... XI, 6, 91

和名索引

(數字は學名索引に同じ)

A

アカアシクチキムシ……Ⅷ, 6, 67
アカアシオホクシコメツキ……Ⅸ, 19, 81
アカアシクハガタ……XIII, 9, 106
アカバホソハネカクシ……XVI, 11, 130
アカバハネカクシ……XVI, 3, 126
アカバナガハネカクシ……XVI, 14, 131
アカビロウドコガネ……Ⅺ, 3, 90
アカボシテントウ……Ⅰ, 11, 12
アカガネサルハムシ……Ⅱ, 13, 23
アカハナカミキリ……Ⅴ, 3, 42
アカハネムシ……Ⅶ, 16, 64
アヲバアリガタハネカクシ……XVI, 7, 128
アヲバネサルハムシ……Ⅱ, 10, 21
アヲハムシダマシ……Ⅷ, 5, 67
アヲハナムグリ……Ⅻ, 2, 95
アヲハラアカゴミムシ……XX, 9, 153
アヲカメノコハムシ……Ⅲ, 7, 29
アヲカミキリダマシ……Ⅶ, 9, 61
アヲカナブン……Ⅹ, 16, 88
アヲキクスヒダマシ……Ⅸ, 13, 78
アヲナガタマムシ……Ⅹ, 11, 86
アヲマルガタゴミムシ……XX, 4, 150
アヲオサムシ……XX, 2, 149
アリガタハネカクシ……XVI, 8, 128
アリヅカエンマムシ……XIV, 6, 110
アルマンドクシコメツキ……Ⅹ, 5, 83
アサマルハナノミ……Ⅸ, 16, 79
アシナガコガネ……Ⅻ, 4, 96
アシナガオトシオブミ……Ⅶ, 3, 58
アトアカマグソガムシ……XVII, 6, 135
アトボシゴミムシ……XX, 12, 154
アトボシウリハムシ……Ⅱ, 7, 20
アトホシヒメテントウ……Ⅰ, 6, 11

B

バラルリハムシ……Ⅱ, 15, 23
ベツカフヒラタシデムシ……XV, 7, 119
ベニボタル……Ⅸ, 10, 77
ベニヘリテントウ……Ⅰ, 5, 10
ベニヒラタムシ……XV, 1, 116
ベニカミキリ……Ⅲ, 1, 27
ベニコメツキ……Ⅹ, 4, 83
ビロウドカミキリ……Ⅲ, 4, 28
ビロウドコガネ……Ⅺ, 9, 92
ブドウハマキチヨツキリ……Ⅴ, 12, 48

C

チビガムシ……XVII, 8, 136
チビイクビチヨツキリ……Ⅴ, 9, 44
チヤイロヒゲナガザウムシ……Ⅵ, 14, 55
チヤイロケシゲンゴロウ……XVIII, 16, 148
チヤイロコガネ……Ⅺ, 11, 93

D

ダイコハムシ……Ⅱ, 14, 23
ダイコクコガネ……Ⅻ, 17, 103
ダイメウハネカクシ……XVI, 4, 126
デヲキノコムシ……XV, 4, 117
ドウガネ……Ⅺ, 1, 89

E

エダヒゲマルハナノミ……Ⅸ, 18, 80
エグリゴミムシダマシ……Ⅷ, 11, 69
エンマムシ……XIV, 1, 108

F

フヂハムシ……Ⅱ, 12, 22
フキサルハムシ……Ⅱ, 17, 24
フタホシメダカハネカクシ……XVI, 9, 129

G

ガムシ……XVII, 2, 133
ゲンゴロウ……XVIII, 2, 141
ゲンジボタル……Ⅸ, 8, 76
ゴマフガムシ……XVII, 4, 134
ゴマフカミキリ……Ⅴ, 5, 43
ゴマダラカミキリ……Ⅵ, 4, 36
ゴマダラオトシブミ……Ⅶ, 4, 58
ゴミムシ……XX, 15, 155
ゴミムシダマシ……Ⅷ, 13, 70

H

ハギツルクビオトシブミ……Ⅴ, 16, 47
ハイイロハネカクシ……XVI, 10, 129
ハイイロゲンゴロウ……XVIII, 4, 142
ハツカハムシ……Ⅱ, 5, 19
ハンメウ……XX, 9, 160
ハムシダマシ……Ⅷ, 4, 66
ハンノキカミキリ……Ⅴ, 4, 42
ハラジロカツオブシムシ……XIV, 11, 112
ハスヂザウムシ……Ⅵ, 2, 49
ヘイケボタル……Ⅸ, 7, 75
ヘリグロベニカミキリ……Ⅲ, 5, 28
ヒゲブトゴミムシダマシ……Ⅷ, 12, 70
ヒゲブトハナムグリ……Ⅻ, 1, 95
ヒゲコメツキ……Ⅹ, 6, 84
ヒゲマルハナノミ……Ⅸ, 17, 80
ヒメアカボシテントウ……Ⅰ, 7, 11
ヒメボタル……Ⅸ, 11, 77
ヒメエンマムシ……XIV, 4, 109
ヒメガムシ……XVII, 3, 134
ヒメゲンロゴウ……XVIII, 11, 145
ヒメゴボウザウムシ……Ⅵ, 9, 52
ヒメハンメウ……XX, 14, 162
ヒメハナムグリ……Ⅻ, 6, 97
ヒメヒゲナガザウムシ……Ⅴ, 13, 46
ヒメヒラタシデムシ……XV, 8, 120
ヒメカメノコテントウ……Ⅰ, 9, 12
ヒメカツオブシムシ……XIV, 13, 113
ヒメキマハリ……Ⅷ, 9, 18
ヒメクチキムシ……Ⅷ, 7, 67
ヒメマルカツオブシムシ……XIV, 8, 111
ヒメミヅスマシ……XVII, 11, 137
ヒメシロコブザウムシ……Ⅵ, 4, 50
ヒメスナゴミムシダマシ……Ⅷ, 15, 71
ヒラタゴミムシ……XX, 6, 158
ヒラタハナムグリ……Ⅻ, 5, 97
ヒラタハネカクシ……XVI, 15, 131
ヒラタシデムシ……XV, 6, 118
ホソハンメウ……XX, 15, 163
ホソカミキリ……Ⅴ, 1, 41
ホソクビアリモドキ……Ⅶ, 13, 62
ホソクビキマハリ……Ⅷ, 10, 69
ホソオサムシ……XX, 4, 157
ヘウホンムシ……Ⅸ, 5, 75

I

イネザウムシ……Ⅶ, 6, 59
イタドリハムシ……Ⅱ, 4, 19
イタヤハマキチヨツキリ……Ⅴ, 14, 47

J

ジンガサハムシ……Ⅱ, 6, 20
ジユウジゴミムシ……XX, 13, 154

K

カブトムシ……Ⅺ, 6, 91
カメノコテントウ……Ⅰ, 10, 12
カミキリダマシ……Ⅷ, 10, 61
カミナリハムシ……Ⅱ, 11, 22
カナブン……Ⅹ, 15, 88
カホジロアシナガザウムシ……Ⅵ, 11, 53
カシハクチブトザウムシ……Ⅴ, 10, 45
カタビロトゲトゲ……Ⅱ, 19, 25
カタクリハムシ……Ⅲ, 2, 27
カタモンオホキノコムシ……Ⅲ, 13, 32
カハラハンメウ……ⅩⅩ, 12, 161
ケアカカツオブシムシ……ⅩⅣ, 12, 113
ケマダラシバンムシ……Ⅹ, 4, 74
ケシゲンゴロウ……ⅩⅧ, 15, 147
キベリアヲゴミムシ……ⅩⅩ, 5, 158
キベリトゲトゲ……Ⅱ, 18, 25
キベリツヤゴモクムシ……ⅩⅩ, 2, 156
キボシカミキリ……Ⅳ, 3, 36
キボシルリハムシ……Ⅲ, 6, 29
キボシテントウムシダマシ……Ⅰ, 12, 13
キイロヒゲナガチヨツキリ……Ⅴ, 15, 47
キイロカミキリダマシ……Ⅶ, 11, 61
キイロオホキノコムシ……Ⅲ, 10, 31
キイロテントウムシダマシ……Ⅰ, 13, 13
キクスヒダマシ……Ⅹ, 15, 79
キクスヒカミキリ……Ⅲ, 16, 33
キスヂケシゲンゴロウ……ⅩⅧ, 14, 147
キンバネハネカクシ……ⅩⅥ, 6, 127
キンボシハネカクシ……ⅩⅥ, 5, 127
コアヲハナムグリ……Ⅺ, 12, 93
コブマルマグソコガネ……Ⅻ, 10, 99
コダイコクコガネ……Ⅻ, 15, 102
コエンマムシ……ⅩⅣ, 3, 109
コフキコガネ……Ⅺ, 7, 91
コフキザウムシ……Ⅵ, 15, 55
コガネムシ……Ⅺ, 13, 94
コガムシ……ⅩⅦ, 1, 133
コガシラミヅムシ……ⅩⅦ, 14, 139
コガタノエンマムシ……ⅩⅣ, 2, 108
コガタノゲンゴロウ……ⅩⅧ, 1, 141
コカブトムシ……Ⅺ, 10, 92
コクヌスト……ⅩⅣ, 15, 114
コクロシデムシ……Ⅹ, 10, 121
コクハガタ……ⅩⅢ, 7, 105
コマイマイカブリ……ⅩⅩ, 3, 150
コニハハンメウ……ⅩⅩ, 11, 161
コノコギリクハガタ……ⅩⅢ, 1, 103
コセスヂエンマムシ……ⅩⅣ, 7, 110
コシマゲンゴロウ……ⅩⅧ, 9, 144
コシラホシテントウ……Ⅰ, 8, 11
クビボソハネカクシ……ⅩⅥ, 12, 130
クビボソコガシラミヅムシ……ⅩⅦ, 15, 139
クビナガオトシブミ……Ⅶ, 2, 57
クリシギザウムシ……Ⅴ, 7, 52
クロゲンゴロウ……ⅩⅧ, 3, 142
クロハナムグリ……Ⅻ, 3, 96
クロヒメゴミムシ……ⅩⅩ, 3, 157
クロカミキリ……Ⅳ, 8, 38
クロカナブン……Ⅹ, 14, 87
クロキマハリ……Ⅷ, 8, 68
クロコガネ……Ⅺ, 4, 90
クロマルコガネ……Ⅻ, 11, 100
クロナガオサムシ……ⅩⅩ, 1, 149
クロオバボタル……Ⅹ, 12, 78
クロオホハナノミ……Ⅷ, 3, 65
クロオホキノコムシ……Ⅲ, 11, 31
クロシデムシ……Ⅹ, 9, 120
クロタマムシ……Ⅹ, 7, 84
クロトラカミキリ……Ⅲ, 9, 30
クロウリハムシ……Ⅱ, 8, 21
クロヅマメゲンゴロウ……ⅩⅧ, 10, 145
クシコメツキ……Ⅹ, 20, 81
クハハムシ……Ⅰ, 19, 16
クハヘウタンザウムシ……Ⅵ, 10, 53

クハカミキリ……Ⅳ, 6, 37
クハマルコシンクヒ……Ⅶ, 8, 60

M

マダラアシザウムシ……Ⅵ, 5, 51
マダラミヅギハゴミムシ……ⅩⅩ, 10, 153
マヘモンシデムシ……ⅩⅤ, 14, 123
マグソコガネ……Ⅻ, 12, 100
マメガムシ……ⅩⅦ, 5, 135
マメゲンゴロウ……ⅩⅧ, 6, 143
マメハンメウ……Ⅷ, 2, 65
マメコガネ……Ⅺ, 2, 89
マルガタゲンゴロウ……ⅩⅧ, 8, 144
マルキノコムシ……Ⅹ, 1, 73
マルクビツチハンメウ……Ⅷ, 1, 65
メダカチビカハゴミムシ……ⅩⅩ, 17, 152
ミドリカミキリ……Ⅳ, 11, 40
ミイデラハンメウ……ⅩⅩ, 11, 153
ミツキリザウムシ……Ⅶ, 5, 59
ミヤマハンメウ……ⅩⅩ, 13, 162
ミヤマカミキリ……Ⅳ, 7, 38
ミヤマクハガタ……ⅩⅢ, 5, 104
ミヅスマシ……ⅩⅦ, 10, 137
モモブトカミキリダマシ……Ⅶ, 12, 62
モゝブトシデムシ……ⅩⅤ, 16, 124
ムネアカダイコク……Ⅻ, 14, 101
ムラサキセンチコガネ……ⅩⅢ, 4, 104

N

ナガヒラタムシ……ⅩⅣ, 16, 114
ナガヘウタンゴミムシ……ⅩⅩ, 8, 152
ナミガタチビタマムシ……Ⅹ, 8, 85
ナナホシテントウ……Ⅰ, 1, 9
ナラノチヤイロコガネ……Ⅻ, 7, 98
ナシノチヨツキリザウムシ……Ⅴ, 8, 44
ニジゴミムシダマシ……Ⅷ, 14, 71
ニレノコシンクヒ……Ⅶ, 7, 60
ニハハンメウ……ⅩⅩ, 10, 160
ノコギリカミキリ……Ⅳ, 1, 35
ノコギリコクヌスト……ⅩⅣ, 14, 114

O

オバボタル……Ⅹ, 9, 76
オバタマムシ……Ⅹ, 9, 85
オホアカバハネカクシ……ⅩⅥ, 2, 125
オホアカバコガシラハネカクシ……ⅩⅥ, 16, 135
オホアヲカミキリ……Ⅳ, 10, 39
オホアヲザウムシ……Ⅵ, 13, 54
オホバコハムシ……Ⅱ, 20, 25
オホフタホシマグソコガネ……Ⅻ, 9, 99
オホゴミムシ……ⅩⅩ, 6, 151
オホハネカクシ……ⅩⅥ, 1, 125
オホヒラタシデムシ……ⅩⅤ, 12, 122
オホコフキコガネ……Ⅺ, 5, 90
オホクロマルガムシ……ⅩⅦ, 7, 135
オホミヅスマシ……ⅩⅦ, 12, 138
オホモゝブトシデムシ……ⅩⅤ, 15 123
オホセンチコガネ……ⅩⅢ, 6, 106
オホザウムシ……Ⅵ, 1, 49
オジロアシナガザウムシ……Ⅵ, 6, 51
オナガミヅスマシ……ⅩⅦ, 13, 138
オニヒラタシデムシ……ⅩⅤ, 5, 118
オサムシモドキ……ⅩⅩ, 1, 153
オトシブミ……Ⅶ, 1, 57

R

リンゴハムシ……Ⅱ, 9, 21
リンゴヒゲナガザウムシ……Ⅴ, 11, 45
リンゴカミキリ……Ⅴ, 7, 44
リンゴコフキザウムシ……Ⅵ, 16, 55
ルリボシカミキリ……Ⅴ, 2, 41
ルリエンマムシ……ⅩⅣ, 5, 109
ルリハムシ……Ⅰ, 20, 16
ルリテントウムシダマシ……Ⅰ, 14, 14

S

サビハネカクシ……XVI, 13, 131
サビキコリ……X, 3, 82
セアカゴミムシ……XX, 7, 159
セマダラコガネ……XI, 8, 92
センチコガネ……XIII, 2, 104
センノカミキリ……IV, 2, 35
シヤープツブゲンゴロウ……XVIII, 12, 146
シマゲンゴロウ……XVIII, 7, 144
シモフリコメツキ……X, 2, 82
シナカミキリ……III, 14, 32
シラホシハナムグリ……X, 13, 87
シラオビヒラタシデムシ……XV, 11, 121
シラオビマルカツオブシムシ……XIV, 9, 111
シラオビナガタマムシ……X, 10, 86
シロホシザウムシ……VI, 8, 52
シロコブザウムシ……VI, 3, 50
シロスジカミキリ……IV, 5, 37
スギカミキリ……III, 18, 34
スヂアオゴミムシ……XX, 5, 151
スナゴミムシダマシ……VIII, 16, 71
スナムグリゲンゴロウ……XVIII, 5, 109

T

タイシヤウムシ……III, 12, 31
タイワンダイコクコガネ……XII, 16, 102
タケノコシンクヒ……K, 6, 75
タマガムシ……XVII, 9, 136
タマムシ……X, 12, 86
テントウムシ……I, 2, 3, 9
トビカツオブシムシ……XIV, 10, 112
トビサルハムシ……II, 16, 24
トホシハムシ……III, 3, 28
トホシテントウ……I, 4, 10
トラフコメツキ……X, 1, 82
トラカミキリ……III, 15, 33
トサカシバンムシ……K, 3, 74
ツブゲンゴロウ……XVIII, 13, 146
ツノコガネ……XII, 13, 101
ツヤマルキノコムシ……K, 2, 73
ツヤマルマグソコガネ……XII, 8, 98

U

ウスバカミキリ……IV, 9, 39
ウスチヤキクスヒダマシ……K, 14, 78
ウリハムシ……I, 16, 14

Y

ヤハヅカミキリ……V, 6, 43
ヤホシゴミムシ……XK, 14, 155
ヤナギハムシ……II, 2, 18
ヤナギルリハムシ……I, 18, 15
ヤツボシハンメウ……XX, 16, 163
ヤツボシハムシ……II, 3, 19
ヨモギハムシ……I, 17, 15
ヨツボンゴミムシ……XX, 8, 159
ヨツボシホソクビアリモドキ……VII, 14, 63
ヨツボシカミキリ……III, 17, 34
ヨツボシケシキスヒ……XV, 3, 117
ヨツボシマヘモンシデムシ……XV, 13, 122
ヨツボシオホキスヒ……XV, 2, 116
ヨツボシサルハムシ……II, 1, 18
ヨツボシテントウムシダマシ……I, 15, 14
ヨツボシザウムシ……VI, 12, 54
ヨツスヂナハカミキリ……III, 8, 30

昭和五年七月十日印刷
昭和五年七月十八日發行

著作權所有

著者檢印

日本の甲蟲

實價金七圓

著作者　横山桐郎
原畫　水島南平
同　關口俊雄
原色版　半七製版所　田中松太郎

發行者　東京市赤坂區一ツ木町三一番地　合資會社西ケ原刊行會　代表者　戸田節治郎

印刷者　東京市京橋區銀座西二丁目三番地　高橋郁

發行所
東京市赤坂區一ツ木町三一
合資會社西ケ原刊行會
振替東京一一四一八番
電話青山二三六三番

發賣所
東京市京橋區南傳馬町二丁目
目黒書店
振替東京二八〇九番
電話京橋三四一七番

資合會社 西ヶ原刊行會發行・圖書要覽

農學博士 桑名伊之吉著	日本介殼蟲圖說	前篇・後篇	絕　版
牧野・朝比奈兩博士序 飯柴永吉著	日本產蘚類總說	菊判 340頁 索引 30頁	定價3圓40錢 送料 27錢
農學博士 高橋偵造著	綜合農產製造學 農產物加工篇	菊判 480頁 挿圖 130個	定價5圓50錢 送料 27錢
農學博士 佐藤寬次著	新農業精說 上卷 下卷近刊	菊判 720頁 挿圖 350個	定價5圓80錢 送料 27錢
同	信用組合論	菊判 800頁	定價 6 圓 送料 27錢
林學博士 園部一郎 共著 三浦伊八郎	標準林學講義 上卷・下卷	菊判各430頁 挿圖 350個	定價各4圓50錢 送料各 27錢
農學博士 關豐太郎著	新撰提要土壤學	菊判 200頁 挿圖 35個	定價 2 圓 送料 18錢
九大助教授 川島祿郎著	肥料學	菊判1000頁 挿圖 60個	定價 9 圓 送料 36錢
農學士 水野正治著	栽培葉と花 花卉續篇近刊	菊判 410頁 挿圖 110個	定價4圓50錢 送料 27錢
農學博士 桑名伊之吉著	增訂實用害蟲驅除法	菊判 500頁 口繪 15版	定價 6 圓 送料 27錢
農學士 神谷一男著	昆蟲採集と標本製作法	新型 141頁 挿圖 65個	定價 80錢 送料 6 錢
農林技師 村田藤七著	米麥作の害蟲と豫防驅除	菊判 600頁 口繪 11版	定價 6 圓 送料 36錢
元農林技師 喜田茂一郎著	趣味と實用蔬菜の研究	菊判 740頁 索引 45頁	定價 8 圓 送料 36錢
同	增稿蔬菜園藝全書 上卷・下卷	菊判1030頁 挿圖 650個	上5圓 下7圓 送料各 27錢
農林省囑託 卜蔵梅之丞著	增訂作物病害豫防驅除法 上卷・下卷	菊判1150頁 挿圖 200個	上6圓 下7圓 送料各 27錢
農學士 廣部達三著	農用機具 作業機具篇 一卷・二卷	菊判各230頁 挿圖 65個	定價各2圓50錢 送料各 180錢
同	改訂農用機具 農業動力篇	菊判 250頁 挿圖 230個	定價2圓50錢 送料 18錢

21146

合資會社 西ヶ原刊行會發行・圖書要覽

兒玉完次郎著	穀物檢査事業の研究	菊判布製 712頁	定價5圓50錢 送料 27錢
萩尾貞造著	穀物檢査論	菊判 254頁	定價2圓50錢 送料 18錢
久保田喜代太郎著	陸稻の作り方	菊判布製 230頁	定價2圓50錢 送料 18錢
元農林技師 石塚鉄平 後藤寛助 共著	增訂家畜の飼料とかひかた	菊判 537頁	定價 6圓 送料 27錢
農學博士 住江金之著	酒	46判 564頁 挿圖 120個	定價2圓50錢 送料 18錢
東大教授 田中貞次著	農業土木學	菊判 200頁 挿圖 130個	定價 2圓 送料 18錢
農學博士 高橋偵造著	資料農産製造學	菊判 350頁	定價3圓80錢 送料 18錢
東大助教授 衣川義雄著	副業養鷄法	菊判 270頁 挿圖 250個	定價2圓50錢 送料 18錢
農學士 近藤康男著	チウネン孤立國の研究	菊判 285頁	定價2圓20錢 送料 18錢
鈴木良德著	現代日本農業史	菊判假綴 258頁	定價1圓50錢 送料 8錢
喜田茂一郎 久野正明 共著	實驗 蔬菜の溫室園藝	菊判 354頁 挿圖 87個	定價 3圓 送料 27錢
久野正明著	トマト栽培及加工法	46判 112頁 挿圖 25個	定價 1圓 送料 8錢
元農林省囑託 岡崎一著	農界の現狀より視た自給肥料綠肥及堆肥	46判 240頁	定價1圓50錢 送料 10錢
工學士 本田哲致著	農用石油發動機取扱法	46判 352頁 挿圖 35個	實費 1圓 送料 10錢
農學博士 山下脇人著	二十餘年間の實驗 鷄のかひ方	46判 132頁	定價 1圓 送料 10錢
養鷄中央會理事 深川景義著	チヤボ	46判 194頁 挿圖 100個	定價 2圓 送料 19錢

30.11.30

562-121
1200501512707
562
121