特1
2498

国立国会図書館　　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』

ガラス使用

特1
2498

国立国会図書館　　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』

ガラス使用

東醫寶鑑雜病篇卷之十一

東醫忠勤貞亮扈　聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

小兒

小兒病難治

古語曰寧醫十丈夫莫醫一婦人寧醫十婦人莫醫一小兒蓋小兒難問證難察脈治之尤難故也○為醫之道大方脈為難治幼為尤難以其臟腑脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡如絲脈息如毫易虛易實易冷易熱兼之口不能言手不能指疾病之莫知非觀形察色聽聲切脈究其病源詳其陰陽表裏虛實而能療之者蓋亦寡矣

臟腑生成

夫一月之孕有白露之稱二月之胚有桃花之譬及其三月則先生右腎而為男陰包陽

特1
2498

也先生左腎則爲女陽包陰也其次腎生脾脾生肝肝生肺肺生心以生其勝已者腎屬水故五臟由是爲陰其次心生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其勝已者小腸屬火六腑由是爲陽其次三焦生八脉八脉生十二經十二經生十二絡十二絡生一百八十纏絡纏絡生三萬四千孫絡孫絡生三百六十五骨節骨節生三百六十五六穴六穴生八萬四千竅則耳目口鼻百骸之身皆備矣醫

初生解毒法

嬰兒在胎口中有惡物兒纔生不候聲出穩婆急用軟帛裹手指蘸黃連甘草濃煎汁拭去口中惡物若嚥入腹中必生諸疾○更以煉蜜少許用硃砂末一字抹入口中令嚥下則一生免瘡痘之患○候物嚥下然後乃飼乳酌量與之勿令大飽恐致吐妳哺○既綳裹了取黃連

甘草煎汁以綿纏手蘸入兒口令咂之三日以來退惡物于大便謂之臍尿哺

初生洗浴法

三朝洗兒用虎頭骨桃枝猪胆金銀器煎湯洗之則兒少驚○參常澡洗用猪胆汁入湯中洗之即不生瘡疥哺熱或遇澡浴即願久坐湯水之中風冷外傷水濕內慘變成風搐可不戒之哺

初生斷臍法

子在腹中胞胎十月止于臍中與母通氣雖出胞胎其臍中所通之氣猶未盡絕斷帶離肚五六寸先用軟綿繒住脚于線外將臍咬斷片時去線待血流盡以手輕輕捺散艾炙臍頭三壯或五壯結作紇絡軟帛要裹切不可常時揭看待臍根落去自然無事忌臍根繒住待第三日離肚二指許將臍剪斷用生

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

薑自然汁或香油和麪畏臍四圍子臍頭以艾炙三壯謂之熏臍後不招風○先斷兒臍帶可只畱二寸許以線繫定然後洗浴不然則濕氣入腹必作臍風之疾旗

擇乳母法 凡擇乳母須精神爽慧性情和悅肌肉充肥無諸疾病知寒溫之宜能調節乳食婦汁濃白則可以餵兒不得與婦母大段酸鹹飲食仍忌纔衝寒暑來便餧兒婦如此則必成婦癖或驚疳瀉痢之疾旗○陰陽交接之際切不可餧兒婦此所正謂之交婦必生癖旗○婦母不可頻飲酒恐兒作疾嗽驚熱昏眩之疾旗○乳母宜謹節飲食飲食下咽乳汁便通情慾動中乳脉便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或爲口糜或爲驚搐或爲夜啼或爲風痛病之初來其尿必甚少便須詢問隨證調治母安子安可消患于未形也○夫飲食之擇猶是小可

乳母稟受之厚薄性情之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤爲關係○垣

小兒乳哺法 人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如月方圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之道不可不謹○凡初乳先須揑去宿乳後與之○母欲寐即奪其乳恐睡困不知飽足也○兒啼未定乳母勿遽以乳飲之恐停滯胷膈而成嘔吐也○乳後不與乳乳相併則難以剋化結于腹中作痛大抵成癖成瘕皆自此始○小兒血氣俱盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄一切發熱難化之物皆宜禁絶只與乾柿熟菜白粥非惟無疾病可以養德此外生栗味鹹乾柿性涼可爲養陰之助然栗大補柿大澁亦宜少與○垣

小兒保護法 凡嬰兒肌膚未實若厚衣過煖則傷皮膚損血脉發瘡瘍汗出腠理不閉風邪易入

六腑也又云變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似但變蒸則耳冷尻冷上唇中心發白疱狀如魚目珠者是也治法和平之劑微表之宜用惺惺散方見熱實則微利之宜用紫霜丸方見或不治亦自愈切不可妄投藥餌及鍼灸(錢乙)

小兒繼病魅病 母有娠乳兒有病如瘧痢他日亦相繼鴨卵博勞也又以紅紗袋盛夜明砂與兒佩之(藏)○小兒生十餘月後母又有娠令前兒精神不爽身體瘦瘁名爲魅病魍魎魑魅總也用伏翼燒灰細研效伏翼卽蝙蝠也聖○婦人先有小兒未能行而以粥飲調下五分日四五次灸香熱嚼哺兒亦母更有娠使兒飲此乳則作魅病令兒黃瘦骨立發熱髮落千金論小兒魅病者是也姙婦被惡神導其腹中妬嫉小兒令生此病魅病亦小鬼也其證微微下利寒熱往來毛髮鬅鬙不悅者是也宜服龍胆湯(陽)

龍膽湯 大黃煨二錢龍胆草柴胡黃芩桔梗鉤藤皮赤芍藥赤茯苓甘草各一錢蟬蛻兩個右�mutilated作一貼水一升煮取五合去滓一月內兒服一合十歲以下服二三合得下利卽止(卜)

相兒命長短法 凡兒三歲以上十歲以下視其性氣高下卽可知其夭壽○兒少時識悟通敏過人者多夭○預知人意回旋敏速者亦夭○兒骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神彫琢者壽○聲絶而復揚急者不壽○啼聲散啼聲深汗不流頭四破小便凝如脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人○臍中無血者好臍小者偏身軟弱如無骨者汗血者多

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

厄並其不壽○鮮白長大卵縫通達黑者亦壽○
目視不正數動者大非佳兆○早坐早行早齒早
語皆惡性非佳人○髮稀少者性强不聽人○額
上有旋者妨父母或早貴○初生枕骨不成能言
而死尻骨不成能踞而死○掌骨不成者能匍匐
而死○臏骨不成能立而死○膕骨不成能行而
死○身不收者死○股間無生肉者死○人中深
長者壽○陰不起者死○陰囊下白者死赤者亦
死天氣和煖抱之使見風日則氣血堅剛可耐風
寒不致疾病今人懷抱小兒不着地氣致令筋骨
緩弱疾病易生非愛護之道歟○夜間不得令兒
枕臂須作一二豆袋令兒枕拿左右附之可近乳
母之側蓋覆衣衿須露兒頭面若一向仰卧恐成
驚疾須時時回動之旋○天寒時兒用父母常着
舊衣作衣服不可用新綿絹只用舊者若太溫煖
則筋骨軟弱易致疾病旋○宜用七八十歲老人
舊襯衣衫直氣相滋令兒有壽
貴之家切不宜新製紵絲綾羅之類與小兒穿不
惟生病抑且折福○初生三五月宜繃縛令卧
勿豎頭抱出六箇月方可與稀粥亦不可與乳同
吃入門

養子十法一要背煖○二要肚煖○三要足煖○四
要頭涼○五要心胷涼○六要勿見怪物
○七脾胃常要温○八啼未定勿使飲
乳○九勿服輕粉硃砂○十少洗浴
門入
調護歌養子須調護看承莫縱弛○乳多終傷胃食
壅則傷脾○被厚非爲益衣單正所宜○無
風須見日寒
暑順天時
門入
變蒸候小兒變蒸俗謂之牙生骨長比如蠶之有眠龍
之脫骨虎之轉爪皆同此類變生而長也欛○

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

小兒變蒸是胎毒散也耶○變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸畢卽覺性情有異于前何者長生臟腑意智故也何謂三十二日長骨脈添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生腎六十四日二變一蒸生膀胱九十六日三變生心一百二十八日四變二蒸生小腸一百六十日五變生肝一百九十二日六變三蒸生胆二百二十四日七變生肺二百五十六日八變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手少陽三焦無形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云氣入四肢長辟骨于十變是矣儀○變蒸旣畢兒乃成人也變者變生五臟也蒸者蒸養

也增益

虎口三關脈法

初生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子周春○小兒初生至半歲看額脈一歲至五歲六歲曰嬰孩察三關脈三關在小兒男左手女右手次指內有紅紋似線者爲驗第一節名曰氣關無脈則無病有脈則病輕○第二節名曰氣關脈見則病重尙可治○第三節名曰命關脈見則病極乃死一生若直射三關青黑紋者死（入）○第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋微乃火驚黑紋水驚青紋乃天雷四足驚內隱青紋微屈則是急風候○第二節紫色紋乃驚痘青色紋乃痘傳肝白色紋乃痘傳肺黃色紋乃痘傳脾黑色紋難安○第三節青黑紋者死（入）治效○五色之中紅黃易安紅盛作紫紫盛作青青盛作黑青黑之色至紳黑則不可治（入）○歌曰

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

紫風紅傷寒青驚白色疼
時因中惡黃則困脾端軟黑

三關圖

三關在虎口次指之側第一風關第二氣關第三命關也決病輕重死生

診小兒脈法小兒三歲至五歲以一指按掌後人迎氣口之脈常以一息六七至爲常脈○七歲八歲曰齔九歲十歲曰齔始可以一指按三部脈而以一息七八至爲平十一至十四歲曰童脈以一息五六至爲常脈○小兒之脈以一息六七至爲平和八九至爲發熱五至爲內寒關○小兒脈亂不須治藥也須治○弦急氣不和○沉緩傷食促急虛驚○浮爲風○沉細爲冷氣○浮緩傷風洪緊傷寒數則爲熱遲則爲寒

觀形察色圖

額上屬心火居南
左顴屬肝木居東
鼻準屬脾土居中
右顴屬肺金居西
頤下屬腎水居北

左顴爲肝右顴爲肺天庭爲心地閣爲腎準頭爲脾凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛○天庭爲火色

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

紅主大熱青乃肝風○印堂青者人驚紅白者水火驚紅者痰熱○印堂連準頭紅者三焦積熱○胃熱○鼻居面中爲脾肺大腸熱山根至鼻柱紅紅者心紅主渴蛔虫咬心頭者唇必反人中唇際也黑者瀉痢死紅色熱痰壅成青色驚風黑色爲痛中惡黃色傷食吐利○左太陽青色驚輕紅色傷寒黑青色乳積○右太陽青色驚重紅色風搐眼目黑者死○地閣爲腎色青食時驚或煩躁夜啼黃多吐逆紅者腎中氣病兩頤赤者肺熱○山根青黑頻見災危必死黑色痢紅色夜啼紫色傷飲食○中庭天庭司空印堂額角方廣皆命門部位青黑爲驚風惡候亦忌損陷凹人

面上形證歌

痢疾眉頭皺驚毒熱眼朦朧○山根若見脉横青此病明知兩度驚赤黑困疲時吐瀉色紅啼夜不曾停○青脉生于左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒微燥熱黑青知是乳中傷○右邊青脉不須多有則頻驚怎奈何紅赤爲風抽眼目黑青三日見閻羅

五體以頭爲尊一面惟神可恃小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉

目睛無鋒芒如魚貓眼狀或兩眼閉而黑睛朦朧者死或外若昏困而神藏于內不脫者生黑珠滿輪睛明者少病眼白多睛珠或黃或小者稟弱多病目證內赤者心熱淡紅者心虛熱青者肝熱淡淡者肝虛黃者脾熱無睛者腎虛白而混者肺熱也

聲有輕重啼有乾濕聲輕者氣也弱也重濁者痛也高喊者熱欲狂也聲急者

神驚也聲塞者痰也聲嘶者氣不順也喘者氣促也噴噎者傷風也驚哭聲沉不響者重也聲濁沉靜者疳積也如生來不大啼哭聲啾啷者天。火之大發忽然驚叫乃火動氣虛必死夜半發者多有口瘡宜看之門。睡中驚啼聲浮者易治聲沉不響者難救或聲如鴉中彈者不治。直聲往來而無淚者是痛也連聲不絕而多淚者是驚也慈煎聲煩躁者難愈躁促聲音者感寒

小兒初生救急　有治法十八條　詳見婦人門

噤口撮風臍風證　噤口風者眼閉啼聲漸少舌上聚肉皆通此胎中熱毒流于心脾一名鵝口瘡。鵝口如鵝之口鼻外亦有不瘡小兒初生有白屑滿口能吮乳由心脾熱也以亂髮纏指頭蘸薄荷汁拭淨如不脫用保命散朱礬散門。又法用一捻金

散又亂髮纏指頭蘸井花水揩拭之又蘸粟殼汁粟殼皮也拭之湯氏。辰砂膏最妙訪見。又地雞膜水塗之妙蜘蛛婦。又白楸枝燒取灰付之神效衄

撮口者面目黃赤氣喘啼聲不出乃胎熱流毒心脾則舌強唇青撮口聚面飲乳有妨用白殭蚕二枚炙爲末蜜調付唇口撮口者初生一臘內之篤疾按臘三令兒氣促口撮如囊而不乳也蜘蛛合調和時抹口中卽差或用蝎梢散門。治法牛黃一錢竹瀝一證若口出白沫四肢水冷最爲惡候一臘見之尤急。初生七日內患撮口臍風不得飲乳急看兒齒齦上有小泡子如粟米狀急以手指蘸溫水輕輕擦破卽開口便安不開南星末一錢腦子少許研勻調薑汁以指蘸擦兒牙齦上口立開瞬

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

臍風者小兒斷臍後爲風濕所乘或尿濕襁褓遂成臍風面赤喘急啼聲不出其證臍腫突腹脹滿日夜多啼不能飲乳甚則發搐噤口撮口宣用調氣益黃散甚者用金烏散或宣風散門○亦有熱在胃堂伸引努氣亦令臍腫邊青黑爪甲黑者死候門○初生七日內見噤口撮口不得飲乳宜蝎梢餅宣風散門○凡臍腫發風宜千金龍胆湯亦不治門○臍風三證者危百日內見此證手足蹉者

臍腫臍瘡治法臍腫以荊芥煎湯洗淨後取葱葉火炙過候冷指甲刮薄貼腫處次日便消方服通心飲門○斷臍後臍腫多啼不能乳哺宜用柏墨散五通膏香螺膏ㄴ錢○臍中流水汁出或赤腫痛當歸白石脂末乾蝦蟆燒灰油髮灰皆可付之

斷臍作瘡白礬枯龍骨煅當歸末皆可慘上或油調付之妙門

保命散治鵝喉瘡不能吮乳枯白礬朱砂各一錢馬牙硝五錢右爲末每取一字用白鵝糞搗水調塗舌上及口內日三次卽效門

朱礬散治同上朱砂白礬枯右等分爲細末付口舌上日三次門

一捻金散治同上雄黃三錢鵬砂一錢甘草半錢龍腦少許右爲末乾摻或蜜調塗之門

蝎梢散治撮口風及一切胎風臍風蝎梢四十九枚每箇用生薄荷葉卷定以線札之砂鍋內滾炒以薄荷乾酥爲度再入白殭蠶四十九箇薑汁炒乾入腦麝少許右爲細末調勻以紫雄雞肝二片煎湯調下一字門

宣風散 治臍風撮口多啼不乳口出白沫全蝎二十箇全者酒炙爲末入麝香末一字和勻每取半字以金銀器煎湯調下

調氣益黃散 治噤口撮口臍風三證金頭赤足蜈蚣一條酒浸炙蝎梢四箇白殭蠶七箇炒瞿麥五分右爲末每一字以鵝翎管吹入鼻中噴嚏啼哭則可治仍用薄荷煎湯調一字服之錢乙

金烏散 治臍風金頭赤脚蜈蚣半條酒浸炙川烏尖三箇生麝香少許右爲末每取半字以金銀器煎湯調下叭○一名麝香散癍○一名定命散

通心散 治旋螺風赤腫而痛清心火通小便退潮熱連翹木通瞿麥梔子仁黃芩甘草各四分右劑作一服入燈心麥門冬同煎服癍○臍中腫突出似旋螺故名之癍

栢墨散 治臍風臍腫多啼不能乳哺黃柏末釜下烟煤各等分爲末乾摻之或油調付之亂髮灰

五通膏 治臍風撮口生地黃生薑葱白蘿蔔子田螺肉右共搗爛搭臍上四圍一指厚抱住下屁泄而愈癍

香螺膏 治臍風腫硬如盤田螺三箇入麝香少許右搗爛搭臍上須臾再易腫痛立消癍

客忤中惡 客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未識見之人觸之或經神廟佛寺與鬼神氣相忤也故謂之客忤其狀口吐青黃白沫或下水穀鮮穢面變五色腹痛反側癖癡狀似驚癎但眼不上竄耳其口中懸雍左右若有小小種核卽以竹針刺潰之或以指爪摘破急作醋炭皂角燒烟薰之却服蘇合香元紡開關薑湯調化頻與服之次服雄麝散兼用黃土散癍○中惡者其狀卒然心腹

刺痛悶亂欲死人中青黑節齒緊合香油未醒以皂角末吹鼻兼用辟邪膏又以唾和麝香一錢重研和醋一合服之即差○客忤取豉三合水濕搗爲丸雞子大摩兒額上及足心各五六遍次摩臍心及上下良久中自有毛于路上即燔之灰中馬汗氣或馬鳴驚忤取馬尾燒烟熏兒面以差爲度

雄麝散　治客忤雄黃一錢乳香五分麝香一字右爲末每一字刺雄鷄冠血調灌之仍以母衣覆兒身即愈

黃土散　治小兒卒客忤灶心黃土蚯蚓糞各等分右研細水調塗兒頭上及五心良癒

辟邪膏　治小兒中惡墜眞香白膠香沉香虎頭骨人參鬼箭羽草龍腦各五錢右爲末人雄黃五錢燒卧內尤妙

錢麝香一錢煉蜜和勻作膏取少許以乳香湯化下兒口中又令兒帶及燒

夜啼　小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰口瘡重舌四曰客忤○寒則腹痛而啼面青白口有冷氣手足冷腹亦冷曲腰而啼又曰下半夜啼者蓋夜則陰盛寒則作痛所以夜半後啼也宜用六神散益黃散防見○熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹煖或有汗伸身而啼又曰上半夜仰身有汗而啼面赤身熱者必痰熱也到曉方息導赤散防風觀加黃芩煎服通心飲防見亦可○口瘡重舌則吮乳不得口到乳上即啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡則舌必重也照口瘡重舌類治之其啼自止○客忤者犯客忤夜啼或觸生人氣忤犯而啼有日啼驚夜必黃昏前後尤甚者乃客忤中惡也錢氏安神丸主之防見依客忤法治之○月內夜啼驚搐者乃胎中受驚所致宜用猪乳膏鎮驚散

有痰者抱龍丸防見○小兒夜啼作心經有熱有虛治之宜用燈心散黃連飲蟬花散○夜啼不止蟬脫二七枚去足爲末入朱砂末一字蜜調送下瞤○又法潛取鷄窠草一握置小兒臥席下即止咿○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾咿

六神散治膚冷痛夜啼白茯苓參白朮山藥炒各一錢甘草炙七分右爲粗末每取一錢入薑三棗二水煎服嬭

猪乳膏治胎驚夜啼琥珀防風各一錢朱砂五分爲末猪乳汁調一字抹兒口中咿

鎮驚散治同上朱砂牛黃麝香各少許右合細研猪乳汁調稀抹入口令嚥下靜

燈心散治小兒心燥夜啼燈花三四顆研細以燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三○一方燈花七枚胞砂一字朱砂少許研細蜜調塗唇上立止旺○一名花火膏傳

黃連飲治心經有熱夜啼人參二錢黃連一錢半甘草炙五分青竹葉十片生薑一片右剉水煎取汁灌口中咿

蟬花散治小兒夜啼狀若鬼祟蟬殼下半截爲末初生兒抄一字薄荷湯調用啼人酒少許調下卽止或以上半載爲末依湯調用啼復如初古人格物之妙如此癰

五臟所主虛實證虛則補其母實則瀉其子必先實母後瀉子也○凡五臟各至本位卽氣盛不可更補到所剋位不可更瀉如肝病到春不可補到秋不可瀉餘倣此

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐○心氣熱則合面卧實則仰卧也蓋實則氣上下澁若合面而

臥則氣不得通故喜仰臥使氣上下得通也○心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水○心主熱實則煩熱饑○心實發搐難言合面而臥煩熱故仰臥哭舅熱故欲合面而臥竄舌强故欲言不能而叫哭就涼宜瀉心湯導赤散二方見五疳○虛則困卧悸動不安生犀散方見主之饑

肝主風實則目直視大叫呵欠項急煩悶○實則兩目青必發驚咬牙甚者亦發驚手循衣領亂捻物甚則身强反張宜瀉青丸方疳○虛則咬牙呵欠目連瞤不搐宜地黃元方疳○肝病風搐拘急實則風搐力大瀉青丸主之虛則風搐力小六味地黃元主之饑

脾主困實則困睡身熱飲水○脾病困睡泄瀉不思飲食○實則多睡體重昏倦困睡不露睛身熱欲飲水泄瀉赤黃色宜瀉黃散方疳○虛則吐瀉生風或泄瀉白色睡露睛或有痰宜錢氏白

術散方見

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者○肺主燥自病則喘嗽實則喘而氣盛或渴宜瀉白散方疳○虛則哽氣長出氣短虛則唇白色喘而少氣先服益黃散後用阿膠散見方疳○肺氣怯則唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣粗喘促硬氣者難治肺虛損故也○脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故曰怯此以唇診肺之法也

唇白色者肺臟怯也饑

腎主虛無實○腎病目無睛光畏明體骨重○腎虛證者兒本虛怯由胎氣不盛則神氣不足目中白睛多顱解顱開面色白白者皆爲難養雖長不過八八之數若恣色慾則不及四旬而止或有

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

因病而致腎虛者非此類也○又腎不足下竄蓋骨重故欲墜下而身縮也腎者陰也腎氣虛則畏明皆宜補腎六味地黃丸主之妨臟○腎主寒白病則足脛寒而逆人之五臟惟腎無實但小兒瘡疹變黑陷則是腎實水剋退心火也磯○腎虛者下竄足熱下竄者骨重惟慾墜下而縮身也足熱者不喜覆衣也○心氣熱則上竄宜導赤散腎氣虛則下竄宜地黃元門

五臟相乘 凡五臟自病者爲正邪○母乘子爲虛邪子乘母爲實邪○妻乘夫爲微邪夫乘妻爲賊邪磯○所謂乘者猶乘車之乘五臟相乘莫測如肝病必先治肺補腎然後審肝臟虛實而調之餘臟倣此門人○從前來者爲實邪鄭子乘母也○從後來者爲虛邪鄭子母乘子也○從所勝者爲微邪夫乘妻也○從所不勝者爲賊邪妻乘夫也○從所不勝者爲正邪○子乘母爲實邪○夫乘妻也○五臟傳變皆痰爲患蓋痰乃風苗火靜則伏于脾火動則壅于肺痰火交作則爲急慢或成嗽痺痰火結滯則爲癇鉤或爲咳嗽痰火來去則爲瀉青皆由痺濕而成所以驚風忌純用風藥當以養血藥爲使古方保元湯加白芍藥爲慢驚風也門人

驚風證 小兒之病急慢驚風與夫痘疹等證最爲酷疾以其吉凶反掌生死須臾故也儻○小兒驚風三發則爲癇乃惡證也門人○小兒疾之最危者無越驚風之證驚有急驚慢驚慢脾風三者之異醫

驚風先見之證 驚者虛悸怔忪氣怯神散痰涎來去其瀉必青積漸而生風也嬭○驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼○驚邪入肝則面目俱青眼睛窺視○驚邪入腎則面黑惡吐嚙妳咬牙○驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏○驚邪入脾則面色淡黃嘔吐不食補兒○凡乳兒欲發驚風者

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

先神志不定恍惚懼人劄眼上視左顧右盼伸手握拳悶欝怒氣情態不如常皆驚風先證也搐

○咬牙甚者發驚○目直視面色青身反折者生驚○呵欠面青者驚風○呵欠面黃者脾虛驚○目赤兼青者發搐○肝臟實熱手爭衣領亂捻物目直視必發驚○肝有風目連劄不搐有熱則目直視亦不搐得心熱則搐○肝主風風動而上于頭目目屬肝風入于目上下左右如風吹不定兒不任故目連劄也若熱入於目牽其筋脉兩背皆緊不能轉視故目直視也若得心熱則搐其子母俱有實熱風火相搏故也錢氏曰肝風心火二臟交爭而致搐也

驚有四證八候四證驚風痰熱也小兒熱盛生痰痰熱動心神而生驚○錢氏曰肝主風風動而上于頭目屬肝風入于目上下左右如風吹不定兒盛生驚驚盛發搐搐盛則牙關緊急而八候生焉○其肝主風其脾主痰其肺主熱其心發驚四證相臨重者先發搐○八候者一搐二搦三掣四顫五反六引七窩八視也搐者兩手伸縮搦者十指開合掣者臂若開弓窩者目直似不正反者身仰向後引者臂若開弓窩者目直似怒視者精露不活搐○又云一搐者臂肘搐縮○二搦者十指開合搦之不已即成握拳男子看大拇指其指握在外爲順在裏爲逆女子反看之○三掣者肩膊搐掣或連身跳脚或頭或身四體顫動○四顫者或手或引者以手有如挽弓狀男右手直右手曲爲順右直左曲爲逆女子反看之○五反者身首反張○六窩者眼上窩觀高男子上窩爲順下窩爲逆女子反看之○八視者男子斜目視左爲順視右爲逆女子反看之搐

驚風大抵熱論虛實證別順逆治有後先蓋實勢爲急驚虛熱爲慢

驚慢驚本無熱所以熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以温甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也○男眼上竄女眼下竄右○男搐左視左女搐右視左直右曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難痊故曰證別逆順者此也○熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先于截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先于解熱其若四證俱有又當兼施並理一或有遺必先他證故曰治有先後者此也○凡搐痰因氣鬱氣順則痰化而搐自止先以蘇合香元方見氣門以薄荷湯入薑汁化下或星香散貼

驚搐之證有五驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者爲急驚身冷力小者爲慢驚仆地作聲醒時吐沫者爲癎頭目仰視者爲天吊角弓反張者爲痙治各不同也○因潮熱變爲搐在早晨寅卯辰時者肝旺也當補腎治肝補腎地黃元治肝瀉青丸○因潮熱發搐在巳午未時者心症也當補肝治心補肝地黃元治心導赤散凉驚丸防見○因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之時也是肝旺當補脾瀉青丸治心導赤散益脾病肝强法當補脾恐木賊害故先瀉心肝以挫其强而後補脾○因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也當補脾治心補脾益黃散治心導赤散凉驚丸

搐搦瘈瘲輕重百日內發搐眞者不過兩三次必死假者頻發不爲重眞者內生驚癎假者外

傷風冷盖氣血未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之○方觀乙下○其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者多是外感或內傷夾驚而成謂之假搐非內生驚癇也宜參蘇飲薷閱人參者手足牽引一伸一縮則瘈瘲之甚者也○閻孝忠作似搐而不甚搐此名瘈瘲○凡搐男左女右爲順易治男右女左爲逆難治○急驚初則搐搦俱作久而搐住只搦有急有緩但止有動瘈瘲瘈瘲者候之輕也搐則盛也搦又重也楠

驚搐有聲無聲驚癇發搐男發搐目右視無聲左視有聲相勝聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證○又曰男反右視女反左視亦皆有聲錢氏○男爲木故左視木位無聲右視金位相擊則有聲女爲金故右視金位無聲左視木位有聲相擊故也楊○一童子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭錢氏曰此逆也男爲陽木發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者在肝木也右肺金也逆則二臟相戰金木相擊而有聲也治宜瀉强補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肝錢後治其心續治其肝錢

驚風發搐不可把捉小兒急驚方搐時不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐時但扶持之不可擒捉盖風氣方盛恐流入筋脉或至手足成拘攣也○小兒搐搦時切戒把促手足握持太急必半身不遂也當其搐時置一竹簟鋪之凉地使兒臥其上任其搐風力行遍經絡勢極自止不至傷人秤○一小兒病手足搐搦戴人曰心火勝也勿持捉其手任其搐搦此由乳母保護太過所致乃令淨掃地以水洒之令極濕臥兒於地上良久渾身轉側泥漿皆滿仍以井水

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

急驚風　急驚者因聞大聲或大驚而發搐過則如故無陰也當下之宜利驚丸○急驚者內有熱卽生風或因驚而發涎潮搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起卽了了如故用藥利下痰熱心神安寧卽愈○急驚乃卒然得之心受驚肝主風致筋脈搐搦肝又主筋宜通心飲坊見瀉青丸涼驚元大青膏效○急驚者因聞不常之聲或遇禽獸之吼以致牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顫動口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝屬風心火二臟交爭血亂氣併痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣蕃盛而無所泄故暴烈也愼○痰其熱尚作則當下之一泄已後急須和胃鎮心○治法通關截風定搐去心丸鎮肝丸錢氏安神丸鎮驚丸保幼化風丹靈

洗之卽差矣

胎驚癇風　者乃孕婦嗜慾忿怒驚樸或傷風邪兒初生下卽嘔吐搐掣口眼喎斜聲啼聲短腮縮顧開或頰赤或面青噤口咬牙眼合涎潮筋骨拘攣身腰强直臍腹腫起與噤口撮口同證視其眥間氣色紅赤者生青黑者死辰砂膏最妙猪乳膏鎮驚散見上方並大乙散亦佳卽入

辰砂膏　治胎驚癇風及噤口風辰砂三錢玄明粉二錢鵬砂馬牙硝各一錢半全蝎眞珠末各一錢麝香一字右爲末每取五分乳汁化下卽入

大乙散　治胎驚天漿子天南星白附子天麻防風白芷荊芥各二錢全蝎朱砂各一錢麝香一字右爲末每取五分乳汁調塗乳頭上令兒吮之

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

神膏痰盛宜抱龍丸鎮安心神宜金箔鎮心丸寧心膏○所謂溫驚丸利驚丸凉驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則凉之是謂活法慉○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚元小驚元巓○急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散○急驚截風定搐爲要風搐既定次與下熱熱去則無風風散則不搐慉

利驚丸　治急驚身熱面赤口中氣熱大小便黃赤宜下用此黑丑頭末五分天竺黃青黛輕粉各一錢右爲末蜜丸豌豆大一歲兒用一丸薄荷湯化下

溫驚丸　治急驚虛證牛胆南星四兩天竺黃一兩朱砂一錢半胆膽胆胚半錢龍胆五分右末牛胆汁和丸芡實大砂糖冰化下○一名紛紅丸

凉驚丸　治急驚風黃連一兩胆草防風青黛各三錢龍腦五分牛黃麝香各一字右爲末麪糊和丸粟米大每取一二十丸金銀泡湯下

瀉青丸　治肝熱急驚搐搦元緣肝主風宜先凉肝而風自退

大青膏　治急驚風宜用此發散白附子一錢半天麻青黛各一錢烏蛇肉蝎梢各半錢朱砂天竺黃麝香各一字右細末生蜜和成膏月內兒粳米大半歲兒半皂子大一歲兒一皂子大以薄荷竹葉煎湯化下

開關散　治驚風口噤不開蜈蚣一條炙白殭蠶南星炮各一錢麝香一字猪牙皂角三錠畧燒存

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

性右爲末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥三兩點于口中涎出自開嚥

噫驚散 治急驚慢驚昏迷不省半夏生一錢皂角半錢右爲末取豆許吹入鼻中卽醒嚥

驅風膏 治肝風發驚搐及胎風辰砂蝎梢當歸草龍胆川芎梔子大黃羌活防風甘草各一錢右爲末入麝香少許砂糖和丸芡實大每一丸薄荷竹葉蜜湯化下

鎭心丸 治急驚風安心止驚散邪凉膈山藥白茯苓各一兩寒水石甘草各炙各七錢半甜硝白者朱砂各五錢人參二錢半龍腦麝香各五分爲末蜜和每一兩作五十丸金箔爲衣薄荷湯下一丸

鎭肝丸 治急驚風熱天竺黃生乾地黃當歸竹葉草龍胆川芎大黃煨羌活防風各二錢半右爲末蜜丸芡實大每二丸砂糖水化下嚥

錢氏安神丸 治急驚風及心熱驚啼麥門冬馬牙硝三錢龍腦二字右爲末蜜和兩作三十丸每服一丸砂糖水化下嚥

鎭驚丸 治急驚風鎭驚寧神退熱化痰牛胆南星五錢朱砂三錢半琥珀天竺黃雄黃各三錢牛黃二錢珍珠一錢麝香半錢金箔十片右爲末麪糊和丸梧子大金箔爲衣薄荷薑湯下五六丸斟候去風痰驚熱南星半夏川烏白附子各一兩麝金五錢右爲末蜜和丸如麻子大燈心薄荷湯研化下一二丸

保幼化風丹 治驚風四證八般乾百日取出研爲末每一兩入雄黃朱砂硼砂焰硝各一錢片腦麝香各少許共爲末蜜丸豌豆大麥門冬五錢麝香二錢末裝入臘月黃牛胆內陰乾餅子每一餅臨睡以薄

靈神膏 赤茯苓朱砂各一兩半右爲末蜜和作小

荷湯化下神效○一老醫乃三世小兒科家傳只有四五藥愈病無數如小兒驚搐多是熱證不宜便用驚風藥只以導赤散防風竹葉同煎用二三貼導去心經邪熱其搐便止次服靈神膏睡能下痰熱乃心肺肝兩無胆星則只取生者

抱龍丸 治驚風潮搐身熱昏睡藥也牛胆製南星一兩無胆星則只取生者劉炒熟用之天竺黃五錢雄黃朱砂各二錢半麝香一錢右爲末煮甘草膏和丸皂莢子大（一錢）温水化下百日內兒一丸作三次服五歲兒服一二丸臘雪水煮甘草和藥尤佳（一錢）抱者保也龍者肝也肝爲母心爲子母安則子安況心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生

截風丸 治驚風痰搐天麻白殭蚕一條白附子防風朱砂全蝎各一錢麝香一字右爲末蚕丸梧子大每一丸薄荷湯化下

金箔鎮心丸 治驚風鎮安心神全蝎七箇以薄荷葉包裹慢火炙乾天麻防風羌活牛黃赤茯苓犀角朱砂麝香甘草各一錢右爲末蚕丸梧子大以金箔爲衣每取一二丸薄荷湯化下

寧心膏 治小兒不定恍惚不寧恐畏多哭睡中驚覺朱砂二錢人參白朮白茯苓神山藥羌活甘草各一錢龍腦麝香各一字右爲末蚕丸薄荷湯下一丸

防風温膽湯 治驚風消痰疎風順氣牛夏枳殼赤茯苓各五分陳皮防風各二分半人參二分甘草一分半右剉作一貼入生薑一片紫蘇二葉煎水調下大驚元小驚減半

大驚元 治驚風安神定驚又治心熱夜啼酸棗仁去皮蚱蜂粉炒甘草各五錢人參赤茯苓白朮朱砂麥門冬木香代赭石醋煎各二錢半白殭蚕桔梗尾各一錢二分半全蝎三箇金銀箔各三片

右爲末蜜丸梧子大金銀箔爲衣薄荷湯化下一二九〇一名大安神元粥

小驚元 治驚風癬金皂角水浸煮黃連馬牙硝木香藿香草龍胆各二錢半全蝎三箇右爲末麪糊和丸梧子大以雄黃朱砂麝香金銀箔爲衣薄荷湯化下一二九

急驚風不治證 眼睛翻轉口中出血兩足擺跳肚腹搐動摸體急衣神昏氣促噴藥不下通關不噓心中熱痛忽大叫者皆不治

慢驚風 慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼慢騰騰或露睛手足瘈瘲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脉沉遲用白朮散益黃散加防風冬瓜仁煎服○慢驚者因吐瀉日久中氣太虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘈瘲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃芪湯瀉脾○陰證慢驚自急驚陽證傳來纔經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之爲重女子以吐得之爲重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脉或浮或沉身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病因吐瀉得者宜加味朮附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蠍散陽證傳來纔經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之爲重女子以吐得之爲重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脉或浮或沉身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病因吐瀉得者宜加味朮附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蠍散陽證尚在宜蟬蝎散截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足氷冷方可回陽用硫黃附子如腦麝銀粉巴硝輩一切禁斷以防泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚補○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚未尅土也○凡兒瀉出青色者由脾土受肝木尅勝而見本質由其臟之虛寒黃芪益黃散主之○小兒慢驚

或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用來復丹鬱悶五粒研碎米飲送下卽效得

○慢驚宜用溫驚丸神效散觀音散全蝎觀音散三味天漿子散補脾湯保生丹參朮半夏湯延生丹防風元銀白散藭○延盛宜奪命散防見僂金丸南星飲橘

白朮散 治吐瀉日久不止津液枯竭煩渴引飲欲成慢驚風葛根二錢人參白朮白茯苓木香藿香甘草各一錢右粗末每二錢水煎任意服○泄瀉加山藥白扁豆肉豆寇巳成慢驚加天麻細辛全蝎白附子○驚風泄瀉煩渴皆津液內耗也不問陰陽多煎滿意取足飲之彌多彌好○名錢氏白朮散

名清寧散 效得

益黃散 治慢驚風黃芪二錢人參陳皮各一錢白芍藥七分生甘草炙甘草各五分白茯苓四分右粗末水煎時時服○一名黃芪益黃散凡驚兒瀉青色大禁涼驚丸蓋風木旺必剋脾土當先實其土後瀉其木也當于心經中以甘溫補土之源更于脾土中瀉火以甘寒補金以酸泰使脾土中金旺火衰則風木自虛矣睡

黃芪湯 治慢驚風大便泄青色黃芪二錢人參一錢甘草炙五分右作一貼水煎加白芍藥一二錢尤妙○此證風木旺必剋脾土宜先實其土而後其木是謂神治之法○一名保元湯東垣

溫白丸 治慢驚風白殭蠶炒白附子生南星炮各一兩天麻生五錢全蝎二十一箇右爲末麪糊和丸綠豆大生薑米飲下五七丸至二三十丸

加味朮附湯 治吐瀉後變成慢驚或因臟寒洞泄得者附子炮白朮各一兩肉豆蔻煨二箇

木香甘草炙各五錢右粗末
每二錢薑三棗二水煎服即
醒脾散 治脾困昏沉吐瀉不止漸成慢驚人參白朮
白茯苓白附子白殭蠶
分全蝎二分半右粗末每二
二棗一水煎漸漸服不可頓
釀乳方 治慢驚風人參木香藿香沉香陳皮神麴麥
芽各一錢丁香五分右剉作一貼入薑五片
紫蘇五葉棗三枚同煎乳母食後須去乳汁盡方
取服之卽仰卧霎時次令兒吮數口不可過飽如
嘔定急宜截風服八仙散兩目後宜醒
脾散此良法也如此調理無不愈者
八仙散 治慢驚風天麻白附子白花蛇肉防風南
星半夏麴冬瓜仁全蝎各二分半加川烏一
分右剉作一貼入薑二棗
一薄荷二葉同煎服

烏蝎散 治慢驚純陰證吐瀉不止四君子湯調服加
川烏全蝎南星各一錢右剉入薑二棗二水
煎服
之即

蟬蝎散 慢驚風陽證尚在宜用此藥全蝎七箇蟬退
二十一箇南星一箇甘草二分半右粗末每
一錢入薑三片棗
二枚水煎服即

神效散 治慢驚風○歌曰一粒丁香一箇蝎一字辰
砂一點血○右三味俱爲末男用男左手中
指血女用女右手中指血
蘸藥末擦兒唇上卽愈瞬

觀音散 治脾困多瀉不思乳食調神麴昏困四肢冷欲
成慢驚人參一錢蓮肉神麴各二分白茯苓
一分半白朮黃芪木香白扁豆甘草各一
分右剉入薑二棗一葉同煎服
即

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

全蝎觀音散　治吐瀉後成慢驚風亦治慢脾風卽前方加羌活防風天麻全蝎也門入

三味天漿子散　治慢驚風天漿子白殭蠶全蝎各二枚右爲末每一字薄荷湯調下補

補脾湯　治慢驚風白朮一錢三分白茯苓半夏各七分陳皮黃芪蜜水炒人參當歸川芎肉豆蔻煨乾葛神麴炒各五分黃連炒甘草炙各三分右剉作一貼水煎稍稍服醫鑒

保生丹　治慢驚風朱砂天麻白附子炮白殭蠶微炒各二錢甘薑炮牛黃麝香各一錢右爲末蜜丸麻子大薄荷湯下三丸補

延生丹　治同上南星炮二錢半朱砂半黃羌活各一錢二分半麝香六分蝎稍七枚白殭蠶三枚右爲末棗肉和丸綠豆大薄荷湯化兩丸服之補

參术半夏湯　治慢驚風子母俱服人參白朮各二錢半夏天麻各七分白茯苓陳皮各五分細辛薄荷甘草各二分全蝎炒枚右剉作一貼薑三水煎服

防風丸　治慢驚風天麻防風人參各五錢全蝎白殭蠶蚕甘草各二錢半朱砂雄黃各一錢七分半右爲末蜜丸芡實大入參湯或冬瓜仁湯化下效得

銀白散　治慢驚風祛風助胃蓮肉白扁豆白茯苓各二錢白附子炮入參天麻全蝎炒木香藿香甘草炒各一錢陳米炒三錢右粗末每二錢以薑二片防風少許同煎服效

南星飲　治慢驚脾胃延盛不思乳食大南星一箇炒赤冬瓜仁七粒同煎服效　白扁豆薑汁炒各三錢右爲末每

雙金丸 治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞
贋與青州白元子勿覩等分同研生薑米飲調灌
多睡露睛口鼻氣冷欲成慢驚風金液丹貶
之惟多服乃效雖至危者往往
服方驗○一云金液丹治吐利垂絶服之得活須多
九沈存中云金液丹眞小兒吐瀉之妙劑也臞

驚風治驗 一小兒吐瀉諸醫以藥下之至虛變成慢
驚其候昏睡露睛手足瘈瘲而身冷錢氏
與瓜蒌湯枋靚其兒卽開目而身溫其兒不大小
便諸醫以藥利之錢曰不當利小便利之必身冷
一二日果身冷錢曰不能食而胃虛若利大小便
則脾胃俱虛當身冷而閉目卽死今幸胎氣實而
難衰也用益黃散枋覩使君子丸枋靚四服後果
能飲食後又不語諸醫作失音治之錢曰此因凉
藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛
用六味地黃元一月而瘥聲音如故

慢驚風不治證 慢驚一四肢厥冷吐瀉咳嗽面黯神昏胃痛喘聲兩脇動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉遊鳴喘噎頭軟大小便不禁手足一邊牽引者皆不治證○似搐而不甚搐似睡而精神慢四肢與口中氣皆冷雖中露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也證○慢驚欲絶之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸粗大脉來浮數是謂陰盛強陽錯認以爲陽氣已復直與蛟藥下痰痰隨藥下氣隨痰絶人以警殺咎之此不識覆燈將絶之候雖不下藥亦無生意矣植

急慢驚風通治 宜備急丸牛黃抱龍丸保命丹至聖保命丹千金散星香散朱砂散奪命蠟礬

備急丸 治急慢驚風五月五日取白顚蛔頭不拘多少云泥焙乾爲末亦朱砂等分搗丸菜豆大
金箔爲衣每一丸白湯下○一法取蛔頭以竹刀
中斷之倉取急跳者治急慢驚各另

研爛和末砂末作丸菉豆大分
二器貯之記而用之神妙
治急慢驚風痰嗽潮搐能鎮驚安神牛
牛黃抱龍丸　膽南星一兩天竺黃五錢雄黃辰砂各
二錢半麝香珍珠琥珀各一錢
片右細末水煮甘草膏和丸
三歲兒服一丸五歲二丸十歲服三五丸薄荷
湯化下麵○此方與上鎮驚丸同而錢數異
治急慢驚風尚有陽證者常服安神化痰全
保命丹　蝎十四箇防風南星蠍梢各二錢白附子辰砂各一錢
黃片臍各五分右爲末粳米飯搗丸皂子大金箔爲衣每
爲衣乳汁或薄荷
湯化下一丸
千金散　治急慢驚風痰喘難至死但灌藥下咽即活
黃連天麻朱砂各四分全蝎白殭蠶各三分

牛膽南星甘草各二分半
右爲末每用五厘薄荷燈心湯調下
星香散　治急慢驚風搐搦寬視涎潮南星炮二錢半
木香搗紅各一錢全蝎二箇右剉作一貼薑
四片水煎服滓大
便去涎即愈熱
朱粉散　治急慢驚風○蚯蚓一條赤砂一片雪白粉
七箇重蚕三箇竭不開急風與慢風服時須
用生人血化汁○右先將蚕蝎微炒燥取出待冷
用砂粉研爲細末却以丹乳汁調抹于兒口內立
效二
奪命散　大能治風痰不問急慢驚風痰塞咽喉其響
如潮名曰潮証百藥不能過咽命在須臾但
用此入候喉即墜下功有萬全奪天地之生化也
青礞石一兩同焰硝一兩入鍋內火煅待冷盡候

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

礞石如金色取用右細末每
入客調微溫服其藥本自稟痰
湧膠粘乃藥之功也又服
驚極危者用此藥以青州白
調煎如糊熟蜜調一下其涎即
蛇川烏等藥○此藥治急慢驚風身熱用薄荷汁
盛木吐痰水上以樂少許摻之痰隨藥而下須用
木香湯調下或煮○礞石雖利痰非胃家所宜故以
木香佐之能聚痰從大便出而
無糞來不動臟腑始知藥妙
探生散治急慢驚風諸藥不效用此吹鼻定其死生
雄黃藥末各一錢乳香五分麝香一字右爲
末吹少許入鼻如服淚
鼻涕俱出者可治
至聖保命丹治急慢驚風及吹鼻驚風天麻蟬殼白殭蠶白附子防風
九

各二錢麝香半錢全蝎十四箇右爲末飯丸
梧子大朱砂爲衣每一九薄荷湯化下
慢脾風慢脾風由慢驚後吐瀉損脾病傳已極總歸虛
處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若
療驚則無驚可療但脾間痰涎凝滯虛實往來其
眼合者乃脾困氣乏神迷也世所謂慢風難療者
是也補○若見眼合卽是脾
眼睛昏定爲重窩視爲重
眨爲重難眨不左右顧亦重
忽作鱉點色至重眼在半合
所盛傳入臟間陽氣已虧脾經屬陰次第入脾故
言慢脾風疾○慢驚其眼半開半合則當預作慢
脾風調理之○慢脾風之候面青額汗舌短頭低
眼合不開睡中搖頭吐舌噫腥臭噤口咬牙手
足微搐而不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉
微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚風而

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

傳變宜用黑附湯救之又生附使君子湯蝎附散皆可補○慢脾風用藥乃不得已也其危如燈無油漸見昏滅錢氏用金液丹朱砂與青州白元子各半研勻飯飲薄荷湯下一錢半此截風回陽也補○小兒頭雖熱眼睛青白而足冷○頭雖熱或泄瀉而足冷○頭雖熱或腹脹而足冷○頭雖熱或嘔吐而足冷○頭雖熱或渴而足冷已上五證作搐者名曰慢脾風速與補脾益眞湯加全蝎一枚或全蝎觀音散吸止

黑附湯 治慢脾風危急者附子炮三錢木香一錢半白附子一錢甘草炙半錢右剉分二貼入薑五水煎以匙灌下若手足煖而甦省卽止

生附使君子湯 治慢脾助胃回陽使君子湯料加生附子二錢入薑五片水煎以匙灌口中手足煖卽止吸鼻門

蝎附散 治慢脾風回陽豁瘀附子炮二錢南星炮白附子炮木香各一錢全蝎七箇右剉取一錢薑五煎服

補脾益眞湯 治慢脾風丁香木香訶子皮陳皮厚朴草果肉豆蔻白茯苓人參白朮桂枝半夏附子炮甘草炙各二分全蝎炒一枚右剉入薑二棗一水煎灌服服訖令搖心下以助藥力瞤卧如尸喘嗽頭軟背直

慢脾風不治證 口噤頭搖大小便不禁唇縮氣粗痰如鋸之聲者不治槽○慢脾風苦也一臟絶卽不可用藥如眼無光指甲黑四肢垂韌五體俱冷並不須下藥槽

天吊驚風

孫眞人曰乘馬遠行當沐浴更衣然後方可近于嬰兒否則多爲天吊急驚之疾錢仲陽曰步履糞穢之氣無使近于嬰兒令兒急驚風搐也類○天吊亦驚風之證但天吊發時頭目仰視驚風則無也瞤○小兒癡癎不定翻眼戴睛狀若神祟頭目仰視手足抽掣如魚之上鉤故曰天釣甚者爪甲亦青宜服蘇合香元過飡熱毒心肺生熱加以外感風邪所致宜用九龍控涎散鈎藤散熱勝則保命丹痰盛則抱龍丸二方並○又有驚風內鈎之證腹痛多啼面青唇黑嘔逆反張外腎腫尿如米泔紅筋血點乃寒氣壅結宜鈎藤膏門

九龍控涎散

治天吊螈蚣一條酒塗炙臘茶炮黃甘草各二錢乳香元竺黃白礬枯荊芥穗各一錢蜈蚣半生半炒一百粒右爲末每半錢人參薄荷湯調下

鈎藤散

治同上人參犀角各五分全蝎天麻各二分甘草一分右剉水煎服門○一名鈎藤飲有

鈎藤　一味湯

鈎藤膏

治驚風內鈎木香薑黃各二錢乳香沒藥各一錢半木鱉子肉五箇右爲末蜜調成膏收

罐內以鈎藤煎湯或薄荷湯化下少許門

痙瘛

痙與瘛亦驚風之類○痙者手足氷冷瘛者舉身強直痙瘛本一病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗其證支體強直腰身反張甚於風癎大抵不治愼○身軟時醒者爲瘛十無一生不時醒者爲痙十無一生瀉○證候治法詳其風門

癲癎

驚風三發則爲癎癎者小兒惡病也大人曰癲小兒曰癎其實一也又曰十歲以上爲癲十歲以下

爲癎吼○驚癎卽急驚之證但驚癎發時作地作聲醒時吐涎沫急慢驚則不作聲不吐沫也瞤○癎者卒然暈倒目瞪流涎神氣鬱教四肢搐搦溺沉默昏憒似死似生其聲惡叫過後惺惺如常○錢氏方有五癎病關五臟用五色丸神朮閉○治法惟以驚風食三種陰陽二證別而治之○驚癎者恐怖積驚而發啼叫忧惕宜定魄丸沉香天麻湯○風癎者風邪外襲先屈手指如數物乃發宜追風祛痰丸神朮閉○食癎着乳食時遇驚停積或成癖或大便酸臭宜紫霜丸○始也身熱抽掣啼叫是爲陽癎易治宜龍腦安神丸淸心滾痰丸見二神朮門○始也身無熱手足淸冷不抽掣不啼叫是爲陰癎難治宜五生丸引神歸舍丹見二神朮門○因急驚爲癎宜三癎丹○因慢驚成癎取來復丹勸閉薄荷泡湯化下一二丸得利卽愈吼○又有胎中受驚成癎宜燒丹丸神朮閉○癎病方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急用爪破須令血出啼叫尤得氣通易效也癎

定魄丸 治因驚發癎人參琥珀茯神遠志朱砂天麻石菖蒲天門冬酸棗仁甘草各等分右爲末蜜丸皂子大朱砂爲衣每一丸燈心薄荷煎湯化下吼

沉香天麻湯 治小兒因驚成癎發搐痰涎壅塞目多白睛項背强急喉中有聲神思如痴羌活五分獨活四分防風天麻半夏附子炮各三分沉香益智川烏炮各二分薑屑當歸甘草各一分右㕮咀水煎服先炙兩蹻脈各一七壯

紫霜丸 也代赭石醋淬七次赤石脂各一兩巴豆三十粒去皮油杏仁五十箇去皮尖右先將杏仁泥巴豆霜入二石末相和搗千杵若硬入少蜜貯蜜治食癎及腹中有食積痰癖吐哯乳癖礙虫

於器中月內兒服麻子大一粒乳汁化下百日內服小豆大○食癇用此取積並不虛人凡兒有熱不欲飲乳眠睡不寧常常驚悸此皆發癇之漸郎以此藥導之減其盛勢則無驚風釣癇之患矣門人

○一方赭石二錢巴豆一十一粒去皮油杏仁二十一箇右末飯丸粟米大乙錢

三癇丹治急驚爲癇蜈蚣一條南星製半脚二錢全蝎防風白附子遠志蘆薈玄胡索辰砂各一錢麝香一字金銀箔各三片右爲末糊丸梧子大金銀箔爲衣每一九以薄荷湯化下乙錢

疳病

疳者乾也瘦瘁少血也兒童二十歲以上曰芳皆由氣血虛憊臟腑受傷故有五臟疳外有蛔疳脊疳腦疳乾疳渴疳勞疳瀉疳腫脹疳無辜疳丁奚哺露疳皆五疳死證所以然者五臟俱病故也凡○大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者爲肥熱疳久病者爲瘦冷疳冷熱交作者爲冷熱疳當分治之乙錢○疳病多因食肥甘所致故命名曰疳虧○凡兒大便色白小便濁如米泔此疳病也翻○諸疳皆依本臟補其母假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母法當先補肝母肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱自愈矣乙錢

揉鼻揉目脊聳體重聞甲咬牙焦渴白汗瀕白瀉酸肛脹腸鳴結癖潮熱或身多瘡疥酷嗜瓜果酸酸炭米泥土多飲水者是也惟腎疳害人最速蓋腎虛受邪疳奔上焦故以走馬爲喻初作口臭次傳齒黑齦爛熱血迸出甚則齒脫宜急治之縱得全活齒不復生矣爛○疳病腫皆五疳之危證曰蝴疳腦疳脊疳無辜疳丁奚哺露疳皆五疳死證所以然者五臟俱病故也凡○大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者爲冷熱疳久病者爲瘦冷疳冷熱交作者爲冷熱疳當分治之乙錢○疳病多因食肥甘所致故命名曰疳虧○凡兒大便色白小便濁如米泔此疳病也翻○諸疳皆依本臟補其母假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母法當先補肝母肝實而後瀉

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

五臟疳一曰肝疳其證搖頭揉目白膜遮睛合面而卧
羸瘦又曰肝疳一名風疳白膜遮睛雀目昏暗○
二曰心疳其證渾身壯熱吐利無常頻赤面黃口
舌生瘡痢久不痊多下膿血有時虛驚又曰心疳
一名驚疳若要驚啼常弄水○三曰脾疳其證腹
多青筋乳食不多心腹脹滿面色萎黃骨立毛焦
乳食不消好喫泥土痢多酸臭又曰脾疳赤白食
疳面黃腹大好食泥土身有瘡瘍○四曰肺疳其
證咳嗽氣逆皮毛乾焦揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻
生瘡頻頻泄利糞中米出皮上粟生又曰肺疳亦
曰氣疳咳嗽氣急口鼻生瘡○五曰腎疳其證肌
肉消瘦齒齦生瘡寒熱時作腦熱如火脚冷如氷
乳食減少嵩痢頻作又曰腎疳又名急疳言五疳
中惟腎疳爲最急卽走馬牙疳也亦曰骨疳喜卧
冷地○五疳通用五疳保童元疳積餅消疳丸○

心疳舌乾肝疳啼乾脾疳口乾肺疳聲乾腎疳尿乾通用連胝丸

治五臟疳黃連白蠟頭無則燕代之草龍胆各二錢半蠐螬炒若練根雄黃麝香天漿子熊胆蘆薈胡黃連各二錢半蠐螬炒若練根雄黃麝香天漿子熊胆蘆薈胡黃連各二錢半蠐螬炒若練根雄黃麝香天漿子熊胆蘆薈胡黃連各二錢半蠐螬炒若練根雄黃麝香天漿子熊胆蘆薈胡黃連各二錢半蠐螬頭一枚炙黃色右爲末飯丸麻子大一歲兒米飲下一二丸

九牓

疳積餅治五疳諸積使君子肉一兩白朮黃連各三錢青皮陳皮山査肉神麴炒麥芽炒二稜煨蓬朮煨木香各二錢半縮砂檳榔肉豆蔻訶子肉甘草炙各二錢茴香炒川練肉夜明砂炒各一錢半乾蟾一箇右爲末白麪三斤炒黃以砂糖五兩水煮化和勻得所印作餅子每重一錢每服二三餅任意嚼吃米飲送下

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

連膽丸　治五疳乾疳黃連五錢猪胆汁浸瓜蔞根烏梅肉蓮肉杏仁各二錢右爲末牛胆汁浸糕和丸麻子大每十五丸烏梅薑蜜煎湯下四五丸

消疳丸　治五疳蒼朮陳皮厚朴枳殼檳榔神麴炒山查肉麥芽炒三稜煨蓬朮煨縮砂茯苓黃連炒胡黃連燕黃使君子蘆薈各等分右爲末蒸餅和丸彈子大米飲化下一丸

諸疳

羗疳有熱疳冷疳冷熱疳蚘疳腦疳春疳走馬疳無辜疳丁奚疳哺露疳又有疳漏疳勞疳瀉疳痢疳腫疳瘡洗藥煽

熱疳　疳病初起瞼赤唇焦潮熱如火大便秘澁者爲熱疳黃瘦雀目夜不見物或生瘡宜五福化毒丹局方龍膽元四五丸

心疳舌乾肝疳啼乾脾疳口乾肺疳聲乾腎疳尿乾通用連胆丸蟾頭無蟾代則蕪草龍胆一二丸

五疳保童元　治五臟疳黃連白蟾頭砂炒苦練根雄黃麝香青黛天漿子熊胆蘆薈胡黃連各二錢半蟾頭一枚炙黃色右爲末飯丸麻子大一歲兒米飲下一兩白朮黃連各三

疳積餅　治五疳諸積使君子肉錢青皮陳皮山查肉神麴炒麥芽炒三稜煨蓬朮煨朮香各二錢半縮砂炒川練肉夜明砂炒各一錢甘草炙各二錢茴香炒川練肉夜明砂炒檳榔肉訶子肉半乾蟾一箇右爲末白麪三斤炒黃以砂糖五兩水煮化和勻得所印作餅子每重一錢每服二三餅任意嚼吃米飲送下

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

連膽丸　治五乾疳黃連五錢猪膽汁浸厥蒌根烏梅肉蓮肉杏仁各二錢右爲末牛膽汁浸糕和丸麻子大每十五丸烏梅薑塩煎湯下一服

消疳丸　治五疳蒼朮陳皮厚朴枳殼檳榔神麴炒山查肉麥芽炒三稜煨莪朮煨縮砂茯苓黃連炒胡黃連燕蒌使君子蘆薈各等分右爲末蒸餅和丸彈子大米飲化下一丸

諸疳

疳有熱疳冷疳走馬疳無辜疳丁奚疳哺露疳又有疳渴疳勞疳瀉疳痢疳腫疳瘡洗藥塡

熱疳

疳病初起臉赤唇焦潮熱如火大便秘澁者爲熱疳宜胡黃連丸服○熱疳黃瘦雀目夜不見物或生瘡宜五福化毒丹局方龍膽元服

冷疳

疳病久則目腫面黧腹脹滑泄或青或白或如垢膩者爲冷疳宜至聖丸服○冷疳多渴好卧冷地煩躁啼叫大便滑泄漸成羸瘦宜木香丸使君子丸疳在內目腫腹脹痢色青白無常漸瘦弱此冷證也

冷熱疳

冷熱交加非新非久宜消積和胃滋血調氣用如聖丸錢

蛔疳

因缺乳吃粥飯肉食太早或甘肥過多化爲蛔虫多啼嘔沫腹痛唇紫蛔進從口鼻出者難治凡疳積久莫不有虫宜服下虫丸服

腦疳

腦疳者鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦鼾○頭皮光急頭髮作穗或有頭瘡腫至頸顙腫則多損眼項軟倒肥而不瘦附子生天南星右爲末薑汁調攤貼患處又鯽魚胆滴于鼻中三五日效瘥○齒

疳滿頭餅瘡腦熱如火顱腫顏高遍身多汗宜龍胆丸

脊疳 小兒疳積漸黃瘦拍脊如蘆薈丸露星膏 湯○脊疳者虫蝕脊膂骨如鋸齒拍脊如皷鳴十指脊生瘡頻咬爪甲煩熱黃瘦下痢宜蘆薈丸門人

走馬疳 腎疳又名急疳多因痘後餘毒更加乳食不調甘味入脾而生虫上蝕齒齦則口瘡出血臭氣甚則齒根潰爛齒黑脫落顋有穴者名曰走馬疳言陽明熱氣上奔如馬然下蝕腸胃則下痢肛爛其證腦熱削手足如木瓜黑面黧甚者天柱骨倒宜腎氣丸 虛方 加使君子川練肉門人○走馬牙疳宜用乳香丸立效散銅青散尿白散瞤○桔梗八錢人參赤茯苓馬牙硝各五錢青黛二錢生甘草一錢麝香五分金箔銀箔各八片右爲末蜜和每兩作十二丸金銀箔爲衣一歲兒一丸分四服薄荷水化下雀 丹 陳粟米泔水化下 心

龍膽元 治熱疳龍膽草黃連青皮使君子各等分爲末猪胆汁和丸蘿蔔子大熱水下一二十丸

至聖丸 治冷疳木香厚朴使君子各一錢丁香丁香皮各一錢右爲末神麴糊和丸麻子大米飲下七丸至十九至十五丸門人

木香丸 治冷疳木香青黛檳榔肉豆蔻各二錢半麝香一錢半千金子去皮砂一兩蝦蟆晒乾燒存性右爲末蜜丸大每三五丸至一二十丸薄荷湯下○一女子得疳疾百藥無效與此藥不數服而愈後用無不獲效錢

使君子丸 治冷疳使君子麵裹煨去殼一兩厚朴訶子皮半生半煨甘草炙各五錢陳皮去白

二錢半和勻爛飯和丸黍米大一歲兒十九二歲兒二十九米飲下湯瓦

露星膏 治同上黃芪蜜水炒胡黃連地骨皮柴胡各等分右爲末蜜丸芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去酒薄荷湯浸服之湯瓦

乳香丸 治走馬牙疳如神乳香輕粉研霜各五分麝少許右研細以薄紙一韭菜許按過揉紙少許和丸如黃米大臨臥填患處至明卽愈忌食醬醋腦將藥

立效散 治走馬牙疳青黛黃柏白礬枯五倍子各一錢右爲末先以米泔漱口摻之

銅青散 治同上白芷五錢銅綠二錢半馬牙硝一錢麝香一字右爲末乾摻之效得

尿白散 治走馬牙疳雖遍口齒落脣穿者亦效人中白霜肉燒存性各二錢右爲

二錢半右爲末蜜丸芡實大每一丸米飲化下三歲以下服半丸乳汁化下亦得

如聖丸 治冷熱疳黃連胡黃連蕪荑使君子肉各一兩麝香五分乾蝦蟆五箇酒浸煮成膏右五味爲末和膏丸如麻子大大人二十丸小兒七丸乙錢

下蟲丸 治蛔疳乾蝦蟆灰三錢苦練根皮貫衆木香桃仁蕪荑檳榔各二錢鶴虱一錢輕粉半錢使君子肉五十箇右爲末糊丸麻子大每一二十丸肉汁下得效

龍膽丸 治腦疳龍膽草升麻苦練根防風赤芍藥荅蘆薈浸膏和丸麻子大薄荷紫蘇湯下一二十丸臥黃連蕪荑各一兩先炒蕪荑各等分右爲末豬胆汁炒赤色右爲末另入蘆薈

蘆薈丸 治脊疳龍膽草黃連各等分右爲末豬胆汁黃色次入二味同炒赤色右爲末另入蘆薈

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

末先用韮菜根陳艾煎濃汁以雞翅蘸汁刷去腐肉洗去鮮血然後敷藥日二三次門

一月蟾丸　治無辜疳蝦蟆一箇打殺置桶中以尿浸之却取糞蛆一枘入內任蛆食一口夜取出以布袋繫之于急流水中浸一宿兎上焙乾入麝香一字爲末飯丸麻子大每三十丸米飲下一服虛煩退再服渴止三服瀉任門

十全丹　治丁奚哺露無辜壞證陳皮青皮蓬朮川芎五靈脂白豆蔻檳榔蘆薈各五錢木香使君子蝦蟆灰各三錢右爲末以豬胆汁浸糕和丸麻子大米飲下二三十丸門

二連丸　治無辜疳黃連胡黃連蝦蟆一箇酒浸去骨焙右爲末糊丸粟米大米飲下二三十丸日三次服之

布袋丸　治丁奚哺露無辜疳夜明砂蕪荑黃使君子各二兩蘆薈人參白朮白茯苓甘草各五錢右爲末湯浸蒸餅和丸彈子大每一丸用絹袋盛之次用猪精肉二兩同煮候肉爛熱提起藥掛風前陰乾只用肉和汁與兒食之次日依前煮服藥盡爲度門

褐丸子　治疳種腹脹蕭蔔子一兩黑丑頭末半生半炒七錢半青皮陳皮三稜蓬朮五靈脂赤茯苓檳榔各五錢胡椒二錢半木香一錢半右爲末麪糊和丸菜豆大每取十五丸蘿蔔煎湯下治五疳八痢肌瘦腹大者如神妙

化蠶丸　治肺疳鼻流臭汁汁流處隨卽成瘡名曰疳蠶宜用此蕪荑蘆薈青黛川芎白芷胡黃連黃連蝦蟆灰各等分右爲末猪胆汁浸糕和丸麻子大杏仁湯下一二十丸門

玉蟾散 治諸般疳瘡乾蟾燒灰三錢青黛一錢麝香一字右爲末先以甘草湯洗後塗之妙 醫鑑

猪肚黃連丸 治疳瘡自孩提至弱冠潮熱發瘡乃疳氣使然疳虫蝕其肌膚肌膚空虛疳熱流注遍身熱疳發歇無已雄猪肚一具洗淨黃連七兩剉右黃連入猪肚中線縫蜜頓在五升米上蒸十分爛取入臼中入些飯搗千杵衆手丸如菜豆大米飲下二三十丸冠者倍之 得效

木香丸 治疳痢黃連三錢木香厚朴縮砂夜明砂炒各二錢訶子肉一錢右末飯丸麻子大薑湯下十五丸 得效

洗疳瘡藥 甘草黃柏馬鞭草連根葱荊芥穗煎湯溫洗後訶子燒灰入麝香輕粉各少許摻之

童元方見上

諸疳通治藥 通治宜用肥兒丸疳積食元消疳丸 方見上 五疳消 方見上 十味蘆薈丸 五疳保

肥兒丸 凡疳病以肥兒丸疳積餅爲主此藥消疳化積磨癖清熱伐肝補脾進食殺虫胡黃連五錢使君子肉四錢半人參黃連薑汁炒神麯炒麥芽炒山查肉各三錢半白朮白茯苓甘草炙各三錢蘆薈硫盛泥裹糠灰火煨透二錢半右爲末黃米粉和丸菜豆大米飲下二三十丸 鑑

五疳消食元 通治諸疳殺虫退熱磨積進食使君子肉各等分右爲末陳米飯和丸黍米大米飲下二三十丸 得效

十味蘆薈丸 治諸疳殺虫和胃止瀉退熱胡黃連雷丸蘆薈蕪荑木香青黛鶴虱黃連各五

錢蟬退十箇麝香五分右爲末猪胆汁浸糕和丸麻子大米飲下二三十丸㕮

疳眼 小兒疳眼雀目或盲膜不見物或流膿宜煮肝丸龍胆飲子瞤

煮肝丸 治疳眼盲膜不見物夜明砂青蛤粉穀精草各等分右細末小兒一錢七歲以上三錢猪肝一大片批開摻藥麻線縛定米泔半碗煮肝熟取出肝湯則傾碗內熏眼眼取肝分三次嚼訖却以肝湯下一日三服十日必退如大人雀目空心服至夜便見物瞤

龍膽飲子 治疳眼流膿神效青蛤粉各五錢羌活草龍胆各三錢麻黃二錢半黃芩炒升麻各二錢麝金廿草各半錢右末每二錢茶清調下瞤

諸疳不治證 肝疳目帶青左脇下硬多吐沫眼頭黑者不治○心疳耳邊有青脈舌上有焦點者不治○脾疳肚大青筋唇口無血色人中平下不止者不治○肺疳咳逆氣急瀉白水身上黑痣者不治○腎疳要嘔鹹醋吃水不住小便如粉汁齒黑有瘡骨出耳乾腦焦不治瞤○如疳勞疳瀉面槁身上粟生色斑黑者必死㖞色夭骨露齒張腹硬不食皆危篤證也瞤○疳渴飲水不止舌黑者死○疳勞氣促者死○疳瀉痢脫肛咳逆者不治㖞

諸熱 有肝熱心熱脾熱肺熱腎虛熱蒸熱疳熱驚癇變瘧熱潮熱驚熱瘧熱風寒熱壯熱實熱虛熱○五臟熱變胎熱骨蒸熱痰熱瘧熱上面上左腮爲肝右腮爲肺額上爲心鼻爲脾頰爲腎赤色者熱也隨證治之○身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在內也○小兒熱病六一散方見暑門妙藥也寒水石散亦佳○凡熱證疎利後或和解後無虛證勿溫補熱必隨生乙錢○諸熱通用小兒清心丸天乙丸㕮

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

痰熱　痰熱者面赤身熱喘咳胸膈不利咽喉有痰聲宜抱龍丸方見驚門或止心煩錢半

瘧熱　瘧熱者一日一發或二三發寒熱往來宜禁漿飲門

風寒熱　風寒熱者發熱不歇身熱呵欠鼻塞宜人參羌活散門

壯熱　壯熱者遍身發熱一向熱而不已甚則發驚搐宜通心散方見人參羌活散門

實熱　實熱者身熱飲水大小便澁宜清凉飲子方見門

虛熱　虛熱者身熱不飲水大小便如常宜服地骨皮散門

寒水石散　治小兒諸熱利大腸心熱下驚涎寒水石滑石各一兩甘草一錢半右爲末每錢暑月冷水調下寒月溫湯調下

肝熱　肝熱者手爪衣領亂捻物左腮赤瀉青丸方見驚門

心熱　心熱者口中氣溫或合面臥額赤搖頭咬牙導赤散方見驚門

脾熱　脾熱者面黃肚大怠惰嗜臥飲水鼻赤色瀉黃散方見驚門

肺熱　肺熱者咳嗽寒熱壯熱飲水喘悶右腮赤色瀉白散方見驚門

腎熱　腎虛熱者下竄畏視頰赤色地黃元方見驚門

潮熱　潮熱者似潮有信每日應時而發過時即止宜用通心飲方見甘露飲門

胎熱　胎熱者胎中受熱生下面赤眼閉大便秘小便赤黃不飲乳宜生地黃湯及釀乳方喂之

骨蒸熱　骨蒸熱者肌瘦頰赤口乾潮熱盜汗五心煩躁宜用地仙散方見順生犀散門錢

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

甘露飲 治潮熱寒水石石羔攀酌金薄荷甘草各等分右爲末每一錢薄荷湯調下嬾

梨漿飲 治同上青蒿童便浸一宿晒乾柴胡人參黃芩前胡秦艽甘草各二分生梨一片薄荷二葉生地黃一寸右剉作一貼水煎服即

生地黃湯 治胎熱生地黃赤芍藥川芎當歸瓜蔞根各一錢半猪苓赤茯苓右剉作一貼水煎乳母食後服以餉乳并署與小兒服之

釀乳方 治同上澤瀉二錢生地黃一錢半猪苓赤茯苓右剉作一貼乳母食後煎服

生犀散 治骨蒸熱犀角地骨皮赤芍藥柴胡乾葛甘草各三分右粗末入薄荷葉水煎服之嬾

人參羌活散 治傷風寒發熱羌活獨活柴胡前胡枳殼桔梗人參赤茯苓川芎甘草各二分右剉作一貼入薄荷三葉水煎服即

天麻地骨皮 各一分右

地骨皮散 治虛熱知母半夏柴胡人參地骨皮赤茯苓甘草各三分右粗末薑三片水煎服忘錢

小兒清心丸 治諸熱及驚砂柴胡各二錢金箔三十片右爲末蜜丸梧子大每一丸竹瀝調下嬾

天乙丸 凡小兒生理本天道通利爲揵徑此方清心利小便所以散火也凡小兒蘊熱丹毒驚風瘈熱變蒸發熱之病用之最當而嘔吐瀉利無不治也燈心一兩六錢以米粉漿水洗晒乾爲末入水澄之浮者爲燈心取二錢半入赤茯苓白茯苓神各一錢七分滑石一生水之妙凡治病以水

猪苓各二錢半澤瀉三錢右爲末用人參一兩煎膏和丸如櫻桃大朱砂爲衣金箔裹之每一丸以燈心麥門冬湯或薄荷湯化下門人

積癖 食積者凡小兒失乳以食飼之未有食腸不能剋化致成食積腹脹瘦弱痢色無常腫○積證有傷乳傷食而身體熱者惟肚熱爲甚耳夜間有熱者傷積之明驗也癖○小兒積證面黃腫○腹脹○多嘔○小便如油○眼睛黃○腹內虛鳴○多睡○赤白痢下○多瀉凡有積滯須辨虛實實者可服進食丸消食丸虛而有疳瘦者宜服肥兒丸肥兒丸見上○小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疳寒熱飲水腸下有形硬痛法當用藥漸消磨之以其有癥癖故令兒不食脾胃虛而發熱故引飲也○癖塊者僻于兩脇痞結者否于中脘皆因乳哺失節飲食停滯邪氣相搏而成也○乳食積宜用七聖丸厚腸丸白餅子○癖塊宜用紫霜丸方見上六味三稜丸廣木化癖丸千金消癖丸化癖如神散○愛吃泥土宜清胃養脾湯治嗜泥方見綱目

進食丸 消癖積木香枳殼當歸代赭石朱砂各三錢巴豆霜一錢麝香五分右爲末麪糊和丸黍米大一歲兒取二三丸米飲吞下○

消食丸 治宿食不消消乳積食積香附子炒五錢縮砂陳皮三稜蓬朮神麴麥芽各二錢半右爲末神麴糊和丸麻子大依上法服之湯○一名消乳丸

無辜疳 無辜疳者其候面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂至于死言天有鳥名曰

無辜晝伏夜遊兒家洗浣衣褥露天經宿或遇此鳥飛過落羽所汚而與兒穿卧便冷有此疾也又腦後有核初生軟而不覺痛其中有虫如米粉不速破去則熱氣漸長虫隨氣血流散侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血漸漸黃瘦頭大髮豎手足細弱宜用月蟾丸

十全丹二連丸　俱細

丁奚疳 丁奚者腹大頸細極小伶仃也奚者腹大也甚者尻高肉削臍突胸滿或生穀癥愛喫炭等物宜服十全丹布袋丸門入生米土

哺露疳 虛熱往來頭骨分解反食吐虫煩渴嘔穢骨體瘦削亦由胎稟所成盡皆無辜種類並難治大體相似宜用十全丹布袋丸門入

疳渴 疳病日則煩渴引飲進夜則渴止宜用連胆丸門入乳食不

疳勞 骨蒸潮熱益汗咳嗽泄瀉肚如石面色如銀斷不可治宜連胆丸加蝦蟆灰救之門入

疳瀉 身瘦面黃有瘡疥或食泥土瀉青白黃色或如垢膩或所瀉爛如泥宜全聖丸門入

疳痢 疳在內則目胞腫腹脹痢色無常數○疳痢黃白積或見五色下無時度漸加瘦瘠宜使君子

丸木香　元數

疳腫 小兒疳病虛中有積身面浮腫肚脹大宜肥兒丸脹甚者宜頭圍丸子數

疳瘡 脾疳腎疳皆身有瘡疥作瘡肺疳鼻下生瘡○疳亡病遍體生瘡乃虫蝕皮膚宜用蘆薈丸月蟾丸化蟲丸猪肚黃連丸玉蟾散洗疳藥門入

胡黃連丸　治熱疳胡黃連連各五錢朱砂二錢半右細末塡入猪胞內用淡漿水于砂銚內

懸胆煮一飯時許取出入蘆荟曾青黛螵蛸灰各二錢麝香一分右爲末飯丸麻子大米飲下三五丸至一二十丸

五福化毒丹

治熱疳多生瘡及痘瘡餘毒口齒出涎血臭氣或雀目夜不見物玄參一兩川練子青皮陳皮芫花黑醋浸芫花一宿炒令微焦取陳練再炒令微焦取乾次入蓬稜同炒赤色又出爲末入杏仁泥和勻醋糊和丸黍米大一歲兒二分右爲末麪糊和丸麻子大溫水下二三十丸

七聖丸

治乳食積三稜蓬术川練子青皮陳皮芫花杏仁泥各等分右先黑醋浸芫花一宿炒令微焦取陳練再炒令微焦取乾次入蓬稜同炒赤色又出爲末入杏仁泥和勻醋糊和丸黍米大一歲兒一夜而化永無疳疾使黃疸常服二丸臨卧溫湯送下使及日間所食之物

厚腸丸

治乳食積腹脹瘦弱如子作化生兒湯下

分橘紅半夏蒼术人參實麥芽神麯末各五二分右爲末麪糊和丸麻子大溫水下二三十丸

各三分厚朴青皮各

腹中有癖則不食但飲乳此主之滑石輕粉

白餅子

白附子南星炮各一錢爲末巴豆二十四粒去皮膜水一升煮水盡爲度右研勻糯米飯和丸如菜豆大捏作餅子三歲以下一二餅三歲以上三五餅葱白湯下賤○一名玉餅子一名白玉餅附○人乳味甘戀膈易于停積小兒之病多繫于此此方南星以豁痰輕粉滑石以瀉濕熱巴豆去積所以爲妙研

六味三稜丸

治未哺食小兒有癖積者蓬术三稜並煨神麯麥芽並炒青皮陳皮各等分右爲末麪糊和丸菜豆大白湯下一二十丸研

廣术化癖丸

治乳癖食癥木香五錢代赭石煅醋淬當歸炒朱砂研枳殼炒蓬术三稜並泡各二錢半麝香巴豆霜各一錢二分半右爲末麪糊和丸麻子大一歲兒米飲下二三丸研

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

千金消癖丸　治小兒癖塊水紅花子微炒神麴炒麥芽炒各四錢人參白朮白茯苓各三錢使君子胡黃連山查肉香各二錢蘆薈阿魏青黛木香附子三稜蓬朮並醋炒各一錢右將阿魏研水和麵打糊和丸菉豆大白湯下三四十丸

化癖如神散　治痞塊積聚蟾酥黃蠟各二錢巴豆肉一錢羚羊角末牛黃各五分麝香三分硇砂龍腦各一分右爲末丸如菜子大每用一丸以鍼刺破患處用藥貼上一伏時揭起其痞化膿血出盡而愈

清胃養脾湯　治小兒愛喫泥土乃脾虛胃熱所致石蓋一錢陳皮白朮赤茯苓甘草黃芩各二分右剉作一貼水煎時時服之

治喫泥方　治小兒喫泥土及癖物腹脹粉一分砂糖搜和丸麻子大空心米飲下一丸瀉出土卽差瞤○小兒食土取好土濃煎黃連取清汁搜和日乾與服卽止名曰黃金餅子

吐瀉　小兒吐瀉泄黃傷熱乳也吐瀉泄青傷冷乳也皆當下白餅子主之方見下後傷熱乳者主露散傷冷乳者益黃散方藏見服之儘○初生吐瀉大便色白朱砂丸後以朱沉煎調之○初生吐瀉香橘餅○吐瀉昏睡露睛停乳也紫霜丸下後用香橘餅○吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也宜白朮散坊見和中散吐瀉昏睡不露睛者胃實熱也宜益元散藏方見玉露散○暑月吐瀉身熱宜玉露散或五苓散方見寒門益元散各半調服○寒月吐瀉身冷宜益黃散黃散方藏見理中湯坊藏見○吐瀉有寒痰半夏散坊藏見中穢惡不盡嚥入喉中故吐不止宜用木瓜丸○如吐驟或瀉完穀者傷風甚也凡傷風多作吐瀉

若風木好侵脾土故祖宜大青膏坊見○吐瀉不止危甚若用燒鍼丸○經年吐乳眼慢糞穢有筋膜者乃父母交感時嘻乳所致名曰交精吐妳宜用益黃散五疳保童元方見○吐瀉久將成慢驚風宜用和胃丸雙金元方觀乙上○小兒吐瀉通用助胃膏最妙湯氏

玉露散 治暑月吐瀉身熱或煩渴石羔寒水石各五錢生甘草一錢右細末或半錢或一錢溫水涼水任下乙錢

朱砂丸 治初生兒吐瀉此因穢惡入胃中所致朱砂南星巴豆霜各等分右爲末糊丸黍米大以薄荷湯化下二三丸後以朱沉煎調之門

朱沉煎 朱砂二錢藿香三錢滑石五錢丁香十四粒右爲末以新汲水一盞入麻油滴成花抄藥五分在上須臾墜下澄去水別用溫水下○門內生嘔先用朱砂丸下之次用朱沉煎隆其邪氣使穢物自下而不爲嘔也瞞

香橘餅 治初生停乳吐瀉木香橘皮青皮各二錢半厚朴神麴麥芽縮砂各五錢右爲末蜜丸芡實大每一丸以紫蘇煎湯或米飲任下門

和中散 炙乾薑黃芪白扁豆炒藿香各二分半右粗末作一貼水煎服亦名水煎服乙錢○一方治和水散慘

半粟散 治吐涎沫或白綠水者胃冷宜用此半夏薑製二錢陳粟米一錢右作一貼入薑十片水

煎服　一錢　傳

木瓜丸　治初生吐不止木瓜麝香木香檳榔臟粉各一字右爲末麪糊和丸如黍米大甘草湯下一二丸　傳

燒鍼丸　治內傷乳食吐瀉不止危甚者黃丹朱砂白礬枯各等分右爲末棗肉和丸艾實大每一丸用鍼挑于燈燄上燒存性乳汁或米飮化下此藥清鎭專主吐瀉　醫鑑

和胃丸　治吐瀉不止欲生慢驚丁香白朮各一兩半夏五錢藿香蝎尾各一錢右爲末薑汁糊和丸小豆大一歲兒十丸薑湯化下　綱目

助胃膏　治小兒吐瀉和脾胃進乳食最妙山藥五錢人參白朮白茯苓陳皮甘草各二錢半木香一錢縮砂二十箇白豆蔻二箇右爲末蜜丸皂子大每一丸米飮化下或爲末木瓜湯調下一錢　錢氏湯

吐瀉論證　一五歲兒吐瀉壯熱不思食飮錢氏見曰此兒目中黑睛少而白睛多面色皎白必多病夫面色皎白者神怯也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣酒色若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可下下之虛入肺則嗽入腎則益虛但以消積丸磨化之爲微有食積也　錢乙

感胃風寒　貪睡口中氣熱呵欠煩悶者傷風證也頭目疼痛而畏人畏寒者傷寒證也　錢乙○頭痛○

體痛○鼻塞流涕○咳嗽噴嚏○頰赤○眼澁○山根青色皆傷風寒也湯○傷風宜用大青膏貼上雄黃膏○感冒風寒通用人參羌活散方見上參蘇飲方見寒門

雄黃膏 治傷風溫壯熱引飲寒水石五錢甜硝甘草末各三錢龍腦一字朱砂五分雄黃小棗大研蘿蔔根水幷醋一大盞煮令盡右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大一錢

惺惺散 治傷風發熱痰嗽煩渴人參白朮白茯苓桔梗川芎白芍藥瓜蔞根甘草各二分半細辛薄荷各一分右剉作一貼薑二水煎服一錢

痰涎喘嗽 痰乃風苗火靜則伏于脾火動則壅于肺痰火交作則咳嗽喘急宜瀉白散防風合導痰湯方見飲煎服門○寒嗽宜華蓋散熱嗽宜清金降火湯二方見咳嗽門○脾肺母子也二藏俱虛則生頑涎

頑涎者脾肺所出也涎則流溢在於咽喉如水雞之聲喘嗽煩悶宜抱龍九奪命散二方見上○馬脾風宜用馬脾風散牛黃奪命散保命丹二方見門

馬脾風散 治寒邪入肺寒鬱爲熱痰喘上氣肺脹齁鮯若不速治立見危亡辰砂二錢半甘遂一錢半輕粉五分右爲末每取一字以溫漿水少許上滴香油一點抄藥在油花上待沉下却去漿水灌之神效門

牛黃奪命散 治小兒肺脹胸滿喘粗氣急兩脇扇動兩鼻竅張痰涎潮塞悶亂喘喝死在朝夕白丑半生半熟黑丑半生大黃一兩檳榔二錢半木香一錢半右爲末入輕粉一字和勻每取一錢或二錢蜜水調下微利爲度忌一名一捻金

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

泄痢小兒痢痢瀉青白黃沫水痢膿瀉膿卽脹也其證自胞腫腹脹痢色無常好飲水漸加瘦瘠○赤痢宜黃芩芍藥湯虛滑宜固腸丸(二方俱見大便)○白痢宜益元散(暑方)渴溫六丸(大方便見)○赤白痢宜黃連阿膠元六神丸(二方俱見大便)○痛脹宜蘇感元(大方俱見)○八痢危證一曰赤痢二曰白痢三曰赤白痢四曰食積痢五曰驚痢六曰脾虛痢七曰時行痢八曰疳痢通宜小駐車元眞人養臟湯(三方俱見大便)○小兒痢數道不閉黃汁長流者不治(數得痢穀)

一方治瀉痢五倍子炒黃爲末烏梅肉水浸和丸彈子大每一丸白痢米飲下赤痢薑湯下水瀉冷水下

(回春)

腹痛腹脹小兒腹痛曲腰乾啼無淚面青白唇黑肢冷或大便色青不實(一爲盤腸內吊急煎葱湯淋洗其腹揉葱白熨臍腹間良久尿自出其痛立止)續用乳香散(楊氏)○小兒腹痛多是乳食所傷宜用消食散消積丸○面青白身冷水瀉爲冷痛宜理中湯○積痛食痛虛痛蟲痛大同小異惟蟲痛小兒多有之其證心腹痛叫哭倒身撲手嘔吐清水涎沫面色青黃時作時止口唇紫黑色者是蛔厥也宜用安虫散安虫丸(礦)○腹脹者由脾胃虛氣攻作也宜用揚氣丸消積丸(二方俱見)

乳香散治盤腸內吊腹痛乳香沒藥各少許細研另取木香一塊于乳缽內磨水一分滾數沸調乳汁未服之只一服卽效(楊氏)

消食散治食積腹痛白朮陳皮土炒二錢半麥芽縮砂山查肉各一錢橘紅香附米神麴青皮各七分甘草五分右爲末每一錢米飲調下或剩取二錢入薑三片煎服亦可(醫)

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

消積丸 治乳食傷積腹脹氣急丁香縮砂各十二箇烏梅肉巴豆肉各三箇使君子肉五箇右爲末飯丸麻子大每三丸或五丸橘皮湯下㊁門

安蟲散 治虫痛胡粉炒黃檳榔苦練根鶴虱白礬半生半枯各二錢右爲末每服一字大兒五分米飲調下○或以米糊和丸麻子大一歲兒五丸溫漿水入清油打勻送下名曰安虫丸

揚氣丸 治小兒腹虛脹胡椒全蝎各四十九箇右末麪糊和丸粟米大米飲下五七丸至一二十丸如腹大者加蘿蔔子炒熟

五軟五硬 五軟者頭項軟○手軟○脚軟○身軟○口軟是也頭項軟者天柱骨倒也通用健骨散外貼生筋散○手軟者無力以動也宜意苡仁○脚軟者行遲也治兒法同大人○身軟者肉少皮膚自或瀉身筋軟者鹿茸四斤丸加當歸青鹽服之○口軟者語遲也治法已上五軟皆稟受不足或因吐瀉若不治必成篤疾㊁門○五硬者頭項硬○手硬○脚硬○身硬○口硬也一云者強直冰冷乃肝受風邪宜用烏藥順氣散㊁門

健骨散 治頭軟頭不能正也頭軟者天柱骨倒也白殭蠶炒爲末每服五分或一錢薄荷泡酒調下㊁日三瞬

生筋散 外貼之木鱉子三箇蓽麻子三十粒俱去殼右研勻先抱起兒頭摩項上令熱作片貼之

薏苡九 治手軟薏苡仁當歸秦艽羌活各五錢右爲末蜜丸芡實大荊芥湯化下瞬

鹿茸四斤丸 治身軟筋骨痿弱肉蓯蓉牛膝木瓜兎絲子熟地黃鹿茸天麻杜仲五味子各

等分爲末蜜丸梧子大溫酒或米飲下三五十丸○一名加減四斤丸瞤

解顱 年大小兒頭縫不合如開解不成故也腎主骨髓而腦爲髓不足故不能合也凡得此疾者不過千日其間亦有數歲者乃成廢人也腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多面皃白色瘦者多愁少喜也乙錢○解顱郎小兒頭縫不合也宜服六味地黃元虛勞親或八物湯虛勞親加酒炒芩連煎服外宜貼三辛散天南星散且以頭巾裹遮護之自令亦良法也乙錢

三神散 治解顱乾薑七錢半細辛桂心各五錢右爲末薑汁和付顱上小兒面赤卽愈日三

天南星散 治同上大天南星微泡爲末醋調塗幷臍上貼顱七炙手頻熨立效臨

囟填顱陷 顱填者顱門腫起也囟門乳哺失常或寒熱乘脾其氣上衝則顱高而突又有肝盛風熱攻亦致顱填突起汗出毛髮黃而短是也若寒氣上衝則牢硬熱氣上衝則柔軟當瀉風熱宜用瀉青丸方見四臟○顱陷者顱門成坑也因臟腑有熱渴引水漿致成泄痢則氣血虛弱不能上充臨狗頭骨炙黃爲末雞子清調付卽滿宜用黃

語遲行遲 語遲者五軟中口軟是也兒在胎時母有驚怖驚氣入于心包絡使心神不足舌本不通語遲行遲或宜服菖蒲丸乙錢○小兒諸病後不能言宜雞頭丸乙錢○一小兒五歲不能言歲以爲廢人用六味地黃丸加五味子鹿茸及補中益氣湯防覩將半年始發一二言至一年始言語如常軟弱不能行或者腳軟是也氣血不充骨髓不滿軟弱不能束骨宜六味地黃元肝腎俱虛肝主筋筋弱不

加鹿茸牛膝五味子五加皮久服之虎骨丸亦佳或用五加皮散麝○凡小兒行遲齒遲解顱五軟鶴膝睛白多愁皆因禀受腎氣不足宜以六味地黃丸加鹿茸補之或用調元散麝○小兒鶴膝者由禀受不足血氣不充故肌肉瘦瘠骨節呈露如鶴之膝乃腎虛得之宜六味地黃元加當歸牛膝鹿茸久服仍以天南星炮爲末醋調烘熱貼之甚良龜甲治心氣不足五六歲不能言石菖蒲人參麥門冬遠志川芎當歸各等分右爲末蜜丸麻子大米飲下十丸至二十丸日三服鷄頭丸治小兒諸病後不能言雄鷄頭炙一個鳴蟬炙焦三箇大黃煨甘草各一兩當歸川芎遠志麥門冬各七錢半木通黃芪各五錢右爲末蜜丸菉豆大空心米飲下五丸日三四服

虎骨丸治行遲虎脛骨生黃地黃醋稟仁白茯苓皮桂防風當歸川芎牛膝黃芪各等分右爲末蜜丸麻子大木瓜湯下五丸或十丸

五加皮散治三歲不能行五加皮二錢半牛膝木瓜各一錢二分半右末每一錢米飲調下

調元散治行遲山藥五分白朮白芍藥熟地黃當歸川芎黃芪蜜炒各二分半人參白茯苓茯神三味各二分甘草一分半右爲末每二錢水煎服

髮不生齒不生髮不生者因禀受血氣不足不能榮于髮宜服蔥薑元○齒不生者由齒者骨之所終髓之所養禀氣不足則髓不能充於骨故齒久不生宜服芎黃散麝○齒久不生用雄鼠齒門現○長齒生牙賴雄鼠之骨擇取大老鼠去肉取脊骨爲末擦牙齦上日二次效緐

蔞蓉元　當歸生乾地黃肉蔞蓉白芍藥各一兩胡粉五錢右爲末蜜丸黍米大每十丸黑豆湯吞下兼磨化二三十

九塗擦頭上效得

芎黃散　川芎生乾地黃當歸山藥白芍藥各一兩沉香五錢甘草三錢右爲末白湯調服半錢因將乾末摻擦齒齦上日二次效得

龜背龜胸　龜背者初生不能護背風入于脊骨或坐太早亦致僂僂背高如龜多成痼疾宜服松蘂丹枳殼丸且取龜尿點脊骨節上卽平○龜胸者胸高脹滿其狀如龜此肺藏受熱所致也或乳母多食五辛及酒麪過度或夏月多飲熱乳宜服百合丹效得龜胸乃肺熱脹滿攻於胸膈而成宜瀉白

松蘂丹　治龜背松花枳殼防風獨活各一兩麻黃大黃前胡桂心各五錢右爲末蜜丸黍米大粥飲下十丸效得

枳殼丸　治同上枳殼防風獨活大黃前胡當歸麻黃各三錢右爲末麪糊和丸黍米大米飲吞下一二十丸卽○一名龜背丸翻

百合丹　治龜胸大黃七錢半天門冬杏仁百合木通桑白皮枳殼甜葶藶石膏各五錢右末蜜丸菜豆大白湯下五七丸至十丸效得

滯頤　小兒滯頤者口角流涎是也涎者脾之液流出積于頤下此由脾胃虛冷不能制其津液故也法當溫脾○內經論舌縱涎下皆屬於熱可辦冷熱而治之熱涎者胃火炎上宜用通心飲上方見冷涎者

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

胃虛也宜用木香半夏丸（入湯瀉反）○滯願冷症宜用溫脾丹（入湯瀉反）

木香半夏丸 木香半夏麴丁香各五錢白朮青皮乾薑各二錢陳皮各二錢半右末蒸餅和丸麻子大米湯灌下（入門）

溫脾丹 半夏麴丁香各五錢白朮青皮乾薑各二錢半右爲末糊丸黍米大米飲下一二十丸（入湯瀉反）

丹毒 小兒丹毒乃熱毒之氣與血相搏而風乘之故赤腫其遊走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺人也（入湯瀉反）○小兒丹毒百日內發者必死急急救之（入湯瀉反）○金絲瘡一名紅絲瘡其狀如線巨細不一經謂丹毒是也（入瀉反）○丹毒自腹內生出四肢則易愈自四肢入裏腹脹則生毒氣所走之處截經刺之出血一二血卽消（入門）○丹毒宜服犀角地黃湯（入血門祝四順清涼飲門祝）外用拔毒散水黃散泥合之（入門）又溝渠中小蝦搗敷之又伏龍肝和雞子清塗之又鯉魚血鱔魚血芭蕉根汁藍葉汁水中若塗之皆可○蚯蚓糞和醋塗亦妙（入門）

拔毒散 治丹毒遊走燃熱寒水石二兩三錢石羔一兩黃柏甘草各二錢右爲末水調塗之芭蕉汁調尤妙（入門）

氷黃散 治同上（焰硝大黃末各五錢）右井水調勻雞羽掃塗（入門）

泥金膏 治丹毒熱癮無名腫毒（焰硝一分右新汲水濃調敷上（入門）

諸瘡 小兒初生月裏諸瘡之淺者若一二歲後所生之瘡乃胎毒之深者宜拔法治之（入瘍門）○小兒惡瘡天氣溫和時頻與澡洗更衣名曰外宣亦不須服藥春用柳條荊芥夏用棗葉槐枝秋用苦參

煎湯溫洗（瘍瘡）○一二歲生瘡遍身先服五福化毒丹坊見犀角地黃湯坊見外用炙親熱小便雞羽蘸洗青黛末摻之妙（門）○小兒面瘡通面壞爛無分膚流膿水百藥不效（胡）○枝燒取灰付之亦效（胡）○小兒癩頭瘡以防風通聖散坊見門見酒製爲末每一錢水煎漏三十貼見效又詳見諸瘡門可參考（胡）○小兒口中百病及口瘡重舌重腭喉痺痺腫塞宜用牛黃散（鏡）○胎熱血熱風熱諸瘡遍身痒痛宜用大連翹飲生料四物湯（鏡）

牛黃散 牛黃片腦鵬砂各一分辰砂雄黃青黛各二分黃連黃栢末各八分焰硝一錢半右末每少許摻之（鏡）

大連翹飲 治諸瘡甘草四分柴胡芎藭荊芥各三分連翹車前子（雞冬酒石一惡實赤芍藥梔子

木通薄荷防風各二分甲乙方十棗本煎服（鏡）作一貼入竹葉二片燈心十莖

生料四物湯 治同上生地黃赤芍藥川芎當歸防風各三分黃芩薄荷各二分右劑作一貼水煎服（鏡）

紅絲瘤 一人生子遍身生紅絲瘤不救後生三四子皆然東垣曰汝腎中伏火精中多有紅絲以氣相傳生子故有此疾俗名胎瘤是也令視之果如其言遂以滋腎丸數服瀉腎中火邪忌酒肉辛熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血後受胎五月以黃芩白朮作散與服而生子前疾不復作矣

藥毒成淋 一童子自初生患淋五七日必一發發則大痛下如黍粟者約一盞然後定意其父

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

必服多下部藥遺毒在胎酉子之命門而然以
紫雪和黃柏末丸梧子大晒極乾熱湯下百丸又
半日痛大作連腰腹乃下如黍米者一椀許病滅
十分之八又與陳皮一兩桔梗木通各五錢作貼
與之又下如粟米者一合而安父得燥熱且能病
子兒母得之者乎書此以證東垣紅絲竊之事(見胎)

斷乳 小兒二三歲時欲斷乳宜用畫眉膏(臼)

畫眉膏 山梔子炒黑三箇雄黃朱砂輕粉各少許爲末清油調勻候兒睡着濃抹畫兒兩眉上睡來自不哺乳未效再畫仍用墨搽乳頭(臼)

小兒諸病死證 眼上赤脈下貫瞳人(水絕)顱門腫起(脈絕)○鼻乾黑燥(絕)○肚大青筋(絕)○目多直視覩不轉睛(五藏俱絕)○指甲黑色(絕)○吐出曰絕○齒齒咬人(腎絕)○蛔虫既出必是死形(絕)○病困汗出如珠不流者死○凡兒病其頭毛皆上逆者死○唇口乾白皮反口中氣冷手足四垂其卧如縛掌中冷者皆死(臼)○其五硬五軟五冷五乾皆惡證也(臼)

瘡瘢疹三證專由胎毒

太古無瘡疹周末秦初乃有之已成形食母腹中穢液(臼)○夫胎在腹中至六七月則液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連甘草水下其膓糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟中遇風寒邪氣相搏而成瘡疹也(乙錢)○子在母腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢渴皆食母血兒隨月長筋骨皮肉血脈形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發(臼)醋吸而下此惡血復啼

命門胞中僻子一隅隱伏而不發直至兒因內傷乳食濕熱之氣下陷合子腎中二火交攻榮氣不從逆子肉理惡血乃發諸瘡疹皆出於腎水其瘍後聚肉理歸于陽明故三番瘡始見之證皆足太陽壬膀胱尅丙小腸其始出皆見于面終歸於陽明肉理熱化爲膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從太陽傳變中來也○瘡之爲病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也○內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火蓋因胎毒藏於命門遇少陰少陽司天君相二火太過熱毒流行之年則發作矣

稀痘方

滁穢兎疸湯　稀痘方有服朱砂法延生第一方稀痘兎紅丸

服朱砂法　如米細光明朱砂水飛爲末每五分作三次煉蜜調量兒大小加減溫水送下不拘痘出未出首尾可服蜜者可稀稀者可無黑陷者可起痘癮者可消但性微寒不可多服門人○一法蜜少許調朱砂末一字用數得

延生第一方

小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放土地上用瓦蓋之類蓋之存性研爲末預備細末水飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五厘生地黃當歸身濃煎汁一二蜆殼調和前兩味抹兒上膀胱及乳母乳頭上一日之內用盡次日大便遺下污穢濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生一子得一子十分妙法也醫

稀痘兎紅丸

一名太極丸臘月初八日取採生兎一隻取血以蕎麥麵和之少加雄黃四五

分候乾成餅凡初生小兒三日後與菜豆大者二三丸乳汁送下一歲兒五丸或七丸三歲後十五丸服久則遍身發出紅癍是其驗也有終身不出痘疹者雖出亦稀小兒已長會飲食者就以兎血唉之尤妙或云不必八日但臘月兎亦可用然終不若八日佳（醫鑑）

滌穢兎痘湯 五六月間取絲瓜小小曼藤絲陰乾約一兩半重收起至正月初一日子時炙令焦研為末每服二錢煎湯待溫洗兒全身只三五顆而已（醫鑑）

獨聖丹 絲瓜近蒂取三寸連皮子納于固濟砂鍋內以桑柴火燒存性為末以如數配入砂糖搗成餅時時與兒吃盡為佳小兒痘疹服此則少或全然只燒蒸三兩日不出者或每與作熟時則與食之出痘必少（醫鑑）凡痘疹初出或未出時服此藥則多者可少少者可無重者二可令輕也又云入朱砂少許尤妙（海藏）

百壽散 初生月內用之老無瘡疹黃連一兩朱砂一錢右水煎先拭去口中涎淨灌下少許令藏之郤以餘藥傾盆中浴兒身令遍（海藏）

服梅花方 服梅花可免出痘十二月收梅花不拘多少陰乾為末煉蜜丸如芡實大每一丸好酒化下念太乙救苦天尊一百遍妙不可言（種）

秘傳稀痘湯 六月上伏日採葫蘆嫩蔓數十莖陰乾遇正月初一日五更勿令人知將葫蘆蔓安鍋內燒湯一盆洗未出痘小孩兒渾身頭面上下無處不洗到方可此後即不出痘（瘡科）

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

痘瘡預防法 每遇冬月温熱恐春發痘宜預服三豆飲油飲子隊〇天行痘疹鄉鄰有此證預服之能活血解毒則不染宜獨聖再兎紅丸見上方並龍鳳膏醫鑑

三豆飲 赤小豆黑豆菉豆各一升甘草五錢右水煮熟日逐飲汁吃豆任意服已染則輕解未染者服之過七日永不出痘

油飲子 小兒陽盛無陰以制令頭髮豎直飲食減少此伏熱之兆鄉鄰有痘證取眞麻油一升逐日飲之令盡則永不出痘

龍鳳膏 烏雞卵一箇地龍細小活者一條右鷄卵開一小竅入地龍在內皮紙糊其竅飯鍋上蒸熟去地龍與小兒食之每歲立春日食一二枚終身不出痘疹覺鄉鄰有此證者食一二枚亦效

新痘症 傷寒傷食瘡疹證皆相似〇傷寒則增寒壯熱口中氣熱呵欠煩悶項急〇傷食則口中醋氣嘔下不消腹中疼痛〇瘡疹則腮赤燥多噴嚏悸動昏倦四肢冷〇瘡疹也〇瘡疹候者面燥腮赤目胞亦赤呵欠煩悶乍凉乍熱咳嗽噴嚏足稍冷夜卧驚悸多睡〇瘡疹證呵欠噴嚏睡中急驚耳尖冷眼澁〇痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有因感傷風寒而得有因跌撲驚恐畜血而得或爲目竄口噤驚搐如風之證或口舌咽喉肚腹疼痛或煩燥狂悶昏睡譫語或自汗或下痢或發熱或不發熱證候多端卒未易辯必須以耳冷尻冷驗之蓋瘡疹屬陽腎藏無證其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅脈赤縷爲之眞也

(凝)証○痘疹症以耳冷尻冷冷足下冷及耳後有紅縷赤脉驗之然須見心胸間細點如粟起則爲眞也(得效)

痘瘡亦時氣之一端

凡傷寒時氣熱毒內盛多發皰瘡其色或白或赤若頭若瘭漿戴白膿者其毒則輕若紫黑色作根隱隱在肌肉裏者其毒則重甚則周匝遍身五內七竅皆有也(麟)

痘有五般證

五臟各有一證○肝臟水疱色或青○肺臟膿疱色或白○心臟瘡其色赤○脾臟疹或如麩糠色○歸腎變黑此謂五色凡痘疹一色者善或二色三色相合而作者凶第大小不等爲好(海藏)○小兒在胎十月食五臟之液肝主淚肺主涕毒當出故瘡疹之狀皆五臟之液出有五名肝爲水疱以淚出如水其色青而小肺爲膿疱以涕稠濁如膿其色白而大心爲瘡主血其色赤黃而小次於水泡脾爲疹其色赤而小次於水泡脾多故膿疱水疱皆大血榮於內所出不多故瘡疹皆小(藏海)○病水疱膿疱者以淚從瘡出故也譬如泡中容水水去則泡腰矣(麟)○水疱者俗謂之痘子也瘡者俗謂之最大水痘次之瘡又次之痲子最小隱隱如痲子也(海藏)

痘瘡諸證

初熱三日類傷寒初證○自初熱至報痘類傷寒六經證○六日以後謂之稚證○報痘次至收靨謂之常證○異常謂之變證○水痘瘡疹謂之類證○不治謂之壞證○餘毒謂之瘡證

痘瘡治法

凡痘瘡治法或發或瀉或解肌或化毒凉血滿肺調其臟腑平其飲食謹其禁忌嚴其攝

養適其寒溫使出無不快之經成無不痂之潰既愈之後不致遺毒流汗虛膝目疾腎膜瘡癰癱癤喉閉嗌腫潮熱汗泄此治法之大畧也○痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢決無陷伏之患○諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能起發比之種豆值天時暄暖則易生癤○凡見出遲發慢者根窠欠紅活者便當憂慮調治切勿袖手待斃○瘡疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發受風冷○瘡疹始終未有他證不可下當用平和藥頻與乳食不受風冷可也錢氏○溫平者非熱劑如荊芥薄荷防風惡實甘草之類活人書鼠粘子湯潔古解毒防風湯選而用之○方見藏○惡實連翹山查甘草乃痘瘡始終必用之藥也○首尾俱不可妄下但用溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已○有大熱者當利小便宜導赤散四苓散有小熱者當解毒宜消毒飲四聖散○四勸見下

痘瘡日限

聖瘡七日熱而發七日疱而乾又七日則平復如舊矣○除初熱三日不算蓋有熱發三五日或十餘日故也自報痘至收靨首尾一十二日中間有不守禁戒以至滯纏又有氣血和者不及一十二日而愈○痘瘡屬虛寒者可延至十數日後方死屬毒盛轉紫色者不過七八日死蓋痘是胎毒自內出外二三日方出齊毒氣尚在內出至六日則當盡發于表七八九日成膿而結痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入臟腑故須六日以前急服涼血解毒之藥以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日久而後死矣○發熱三朝出痘三朝起脹三朝貫膿三朝收靨三朝自出痘至收靨要十二日可保平安

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

發熱三朝瘡瘡亦時氣之一端大抵與傷寒相類○瘡疹欲出證○呵欠○噴嚏○耳尖冷○眼瀝○睡中急驚○卒暴壯熱○肌膚繃急○又曰昏睡喜嚏悸者將發瘡疹也乙錄○瘡疹欲出之時熱動五臟則五臟之證俱見其呵欠煩悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面與顯頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在臍下不能食穢故也乙錄○或發驚搐渾身熱甚一向發熱者是也○發熱似傷寒未辨疑似間且與升麻葛根湯參蘇飲見二方門加味敗毒散解表○治熱盛發驚搐爲吉候用紅線散調加味六一散表之痰涎壅盛者薄荷湯化下抱龍丸上方見○發熱欲出瘡作腰痛者急服神解湯出汗以痛止爲度免出腎經之瘡○發熱之初急宜表汗使臟腑胎毒久外感之邪盡從汗散則瘡出稀少然表藥必加紅點未見之前也醫鑑○傷寒疹瘡疫癘潮熱五日已衰疑似未辨者宜用四物解肌湯五日已棗發出卽出五日已外無者非痲也○發熱三日未見形跡宜以生酒塗身上時時看之狀如蚕痕者是痲也瞤瞷

發熱時吉凶證發熱時身無大熱腹痛腰不痛過三日後纔生紅點堅硬碍手者吉勿藥有喜○發熱時不時發驚者瘡在心經而出也乃爲吉兆○發熱時一日遍身卽生紅點稠蜜如蚕種樣模過不碍手者凶○發熱時腹中大痛腰如被杖出瘡乾燥者凶○發熱時瘡面上有一片色如胭脂者凶已上皆決死醫鑑

加味敗毒散柴胡前胡羌活獨活防風荊芥薄荷枳殼桔梗川芎天麻地骨皮各二分右劑

作一貼宜加紫草蟬蛻紫蘇麻黃葱白煎服表汗之本方除參苓熟助火也

紅線散　全蝎麻黃荊芥穗天麻甘草各五分右剉作一貼更加薄荷紫草蟬蛻水煎服

加味六一散　治熱毒太盛狂言煩渴及痘瘡紅紫黑陷滑石六兩研水飛甘草細末六錢辰砂水飛三錢片腦三分另研別入右和勻春秋以燈心煎湯調下夏月以新汲水調下三五歲兒服一錢十歲服二錢發熱之初用散調下能解毒稀痘出痘紅紫者亦效

神解湯　治發熱欲出痘而腰痛者柴胡一錢半乾葛一錢麻黃白芷荊芥防風各八分甘草五分右剉作一貼水煎服溫覆出汗不汗再進一服免出腎經之痘此法甚奇

四物解肌湯　卽升麻葛根湯去甘草代黃芩也○凡傷寒瘡疹疑似未辨者以辛凉之劑調之卽此湯也

出痘三朝　發熱一日卽出痘者太重二日卽出痘者亦重微微發熱三日後乃出痘者爲輕四五日一日至二三日方齊身涼乃見痘者尤輕自出痘一凡痘出至足謂之出齊○痘瘡初出與麻疹痧痱瘡畧相似若根窠紅頂圓突堅實捫之碍手者痘也若根不紅頂虛軟畧有清水模過不碍手者麻也疹痧瘡也○如發熱過三日瘡不出或不快出卽微發之用消毒飲化毒湯犀角消毒飲如瘡發後不多出卽加藥發之如發後不多出卽加藥發後不多出卽瘡本稀不可更發也如三四錢○痘先出者爲母後出者爲子孫母好子孫多則自然有不等者然多此乃毒盛宜服消毒飲解毒防風湯以防後毒青乾黑陷○出盛而亦無害○出速且密胸背尤多則內外壅熱煩渴譫狂宜用豬尾膏以見○年壯皮

厚痘難快出宜用透肌湯○痘出而被風寒復入者宜用加味四聖散或快癍儼似疔痘者名曰飛痘五箇或止一箇高大紫黑此最輕或只此一痘再不生痘即見紅點此由毒氣太盛故出速宜用化毒湯加紫草紅花蟬蛻凉血解毒聖散加味四聖散紫草飲及綠瓜湯之類醫○一發便密如針頭形勢重者合清其表而凉其內連翹升麻湯主之○瘡疹稠密身表熱急與鼠粘子湯以防後日靑乾黑陷瞤○痘出太盛恐入眼爲害宜消毒飲加酒炒芩連外用護眼膏入門○痘出不快宜樺皮飲子胡荽酒傳

出痘時吉凶證

痘一出卽變黑者腎證也此爲惡候保元湯防見加紫草紅花救之○痘出紅赤以手撲過皮軟不指者名曰賊痘過三日變成水泡甚至紫黑痂此危證也保元湯加紫草蟬蛻紅花解之已成水疱則保元湯加四苓散方見寒門利之此妙法也不然則遍身瓜破赤爛而死○發熱出痘時頭面上有一片色如胭脂者凶○出痘時發紅癍如錦紋者六七日後決死急用化毒湯加紅花黃芩升麻救之變黑癍則卽死醫鑑

消毒飲

治痘不快出及胸前稠密急用三四服快透解毒神效鼠粘子二錢荊芥穗一錢生甘草防風各五分右剉作一貼水煎服或加山查子酒芩紫草服或和犀角磨汁服尤佳醫鑑

化毒湯

治痘出不快且令稀少紫草葺一錢升麻甘草各五分右剉作一貼入糯米五十粒同煎服神效鏡

犀角消毒飲 治痘疹未能快透或已出熱尚未解急服此藥鼠粘子二錢荊芥穗防風黃芩各一錢荊芥穗防風甘草各五分右剉作一貼水煎服

解毒防風湯 凡痘出速且密或七日後壯熱毒盛氣弱聲啞此藥主之防風一錢地骨皮黃芪白芍藥枳殼荊芥穗鼠粘子各五分右剉作一貼水煎服

透肌湯 治痘不快透紫草白芍藥升麻各一錢糯米五十粒右剉作一貼水煎服

四聖散 治痘瘡出不快及倒靨紫草甘草各等分右爲粗末每一錢水煎服

痘最要大小分解錢氏四聖散用木通枳殼極好

加味四聖散 治痘出不快或陷伏倒靨一切惡候紫草茸木通木香黃芪川芎人參甘草各

四分爛殼二分右剉作一貼水煎服

紫草飲 治痘瘡出不快三四日隱隱將出未出紫草茸蟬殼人參白芍藥各六分木通三分甘草二分半右剉水煎服

快癍散 治痘出不快或被風復入紫草茸蟬殼人參白芍藥各六分木通三分甘草二分半右

米百粒水煎服能養而發之

勿令氣出候溫服半合或一合痘卽出鞕○治痘

紫草皆當用茸有發出之功今人用根反利大便

大便泄者

勿用

絲瓜湯 發痘疹最妙取絲瓜連皮子燒存性爲末砂糖溫水調下半匙許或以紫草茸甘草煎湯調服尤妙今人水煎服亦得

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

連翹升麻湯 治瘡疹一發便密如蚕種或如糠粃毒盛者卽升麻葛根湯勦覩加連翹一味也

鼠粘子湯 治痘疹稠密身表熱急用此以防後患地骨皮五分柴胡連翹黃芩黃芪各三分半右剉作一貼水煎服蜂蠟一分

鼠粘子當歸身甘草各一分

樺皮飲子 治痘不快出樺皮剉濃煎汁飲之甚及

胡荽酒 治同上胡荽莖剉二兩以淸酒二升同煎令沸便以物蓋定勿泄氣候溫去滓噴一身令遍勿噴頭面以衣溫覆須臾卽子快出神效無莖則用子半

又方 治痘出不快蒲萄研濾取汁飲之又食之盡出無生則用乾者○蟬殼三十箇水煎取汁服之妙○

山査子取肉爲末湯點服之

起脹三朝 起脹三朝毒盡浮於表蓋痘出三日後當潮起後出者後起至五六日毒氣盡發於表觀痘虛實變毒淺深全在此關○顴上紅者終不起脹顴虛乃一身之主若顴上先脹者四肢必順顴上不脹遍體皆不脹○上體已脹下體緩慢者無害下體已脹上體緩慢者逆○起體時漿滯不行頂陷不起或風寒所剋俱宜水楊湯浴之方見門○凡起脹時毒盡在表須賴裏實則無虞苟畧有瀉則內氣虛脫毒乘虛內攻而瘡陷伏矣宜用固眞湯防見○痘不起脹灰白頂陷者或酒調紫草膏若紫草湯調四齒散或黑陷伏不起乃火盛血熱宜紫草湯調四齒散或獨聖散二防並○起脹時有痘長大而紫黑名曰痘疔把住痘瘡令不起失治則死急用保元湯貶

下○加鼠粘子荊芥穗芩連並酒炒外用銀簪挑破疔頭令父母吮去惡血或綿纏指甲捆去惡血蓋瘡破而毒氣發泄故也仍用雄黃末一錢調胭脂汁令濃點疔瘡上立見紅活雄黃拔毒胭脂活血也　醫鑑

起脹時吉凶證五六日頂尖潚起如鼓釘捫之碍指直待起脹時陸續出如粟米於瘡空隙處圓淨者吉○出不快○出不止○起脹時根窠全不起頭面紅腫如匏瓜之狀者凶○起脹時瘡頂皆黑其中有眼如針孔者凶○起脹時遍身陷伏不起腹脹不食氣促神昏者凶　醫鑑

內托散活血行氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出令易收易醫郎癰疽門十散加白芍藥一味

仁齋○若紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香當歸而不貫膿者倍參芪當歸煎熟入人乳好酒溫服　醫鑑

紫草膏治瘡疹不起脹白附子麻黃紫草茸甘草各五錢蟾酥一錢全蝎二十箇白殭蠶炒八箇右細末另將紫草一兩剉煎成膏又用蜜二兩入酒半盞煉過同紫草膏攪勻調藥末九如皂角子大一歲兒半丸三歲兒一丸用之紅紫黑陷者紫草湯化下淡白灰陷者好酒化熱服　醫鑑

又方治瘡不肥綻不起脹黃狗蠅四五枚溫酒研服未綻再服冬月蠅在狗耳內可取用　藏海○老桑樹內蟲虫二三箇溫酒研服未起再服○烹鼠水治丁起脹雄鼠大者一枚去腸肚洗淨以水煮熟取汁服臘月尤佳　捷○母酒能令瘡肥脹取母酒和水猛煮以殺酒毒乃服之亦能補氣　捷○蕎麥

麪能發起痘疹取細末作粥
能解痘毒令發起可作粥和砂糖服又云極好養
胃氣蚌○痘不起脹煮黍穰汁煮芸薹汁煮兎皮
汁臘猪肉煮汁並洗之蚌○胡荽酒噴身能起脹

肪見上

貫膿三朝 貫膿三日胃氣升也痘以胃氣爲本胃之氣
升騰化毒成膿自肌肉上貫起漸至頂尖充
滿光澗者順○氣血大振毒漿已滿將欲收斂之
時也○當結膿窠而不結由血熱相搏毒氣內外
灌注必復入心宜用猪尾膏防見○貫膿時九竅
愼宜封閉飲食藥餌極忌寒涼疎淡之物若傷脾
胃則澗氣下陷不能貫膿也門○出痘歷七日當
貫膿之時外若起脹而中空乾燥無膿血者死若
畧有澗水根窠紅活猶有生意用內托散防見倍
人參黃芪當歸煎入好酒人乳各半盞温服此貫

膿之初法也鑑○九日十日回水之時元氣漸
漸陽運化其水自然消爍此循環之妙理也若夫
曾解毒則至此時水不能化反歸于肖胃病則不
能貫膿成就或致吐瀉陷伏宜用定中湯防見
○痘七日後壯熱毒盛氣弱
聲啞宜用解毒防風湯防見

貫膿時吉凶證 漿行疱裏肥滿黃色或蒼蠟色或黃
下加乾薑肉桂糯米煎服○頭面先回漿四肢方
繞起脹者吉○貫膿時或吐瀉不食乳食不化腹
脹聲啞寒戰咬牙痘爛無膿肌肉黑者凶門○貫
膿純是清水皮白薄如水疱三四日遍身抓破而
死○貫膿時遍身抓破痘中乾枯
全無血水皮白乾如豆殼者凶鑑

收膿三朝 收膿三日漿老痂結如菓熟蒂落氣收血
平光色始飲自上而下按之堅硬蒼蠟色

或黃黑色或似紫紅蒲萄色者佳○當靨不靨謂之慢有毒盛不結痂者猪心龍腦膏最妙防見有觸穢不收靨者異功散調四聖散最妙二防並見○氣戰咬牙足膝如氷耳尻反熱于起脹貫膿收靨時拘忌乃氣血虛極宜保元湯防見加桂甚者異功散救之防見○痘痂不焦是內熱蒸于外散慢而行故也宜宣風散防見導之生犀磨汁解之必着痂矣飢餓○當靨不靨發熱蒸蒸用甘露回天飲即時熱退痘靨○外潰不結痂甄陶散摻之防見即○發膿窠不肯靨但調砂糖水與吃即結痂膿痘疹膿而不焦此失清凉之氣也如五穀得陽氣而成熟非凉風一至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與痘清凉之則瘡必即痂矣饑渴隨之猪尾膏龍腦膏並佳

收靨時吉凶證痂落從頭上至胸膈手腹腰足節節白無血色者凶○靨謝後癍紅者吉○靨謝後癍紅者吉用補氣血養脾胃藥預防之○陰囊及足上先靨起者凶陷○將靨時其痘一時盡黑非靨也火極攻裏即凶證○當靨時遍身臭爛如餅搭不可近目中無神者凶

甘露回天飲砂糖屑半盞入百佛湯一碗調服靨

通治痘瘡首尾宜保元湯爲主治○不快出不起脹不貫膿不收靨通用豬尾膏救之防見○凡出痘起脹回漿貫膿頂陷不起漿滯不行俱以水楊洛之防見

保元湯人參二錢嫩黃芪甘草各一錢右劉作一貼入薑一片水煎服醫鑑○一二日初出乾紅少

潤此毒尚淺宜用活血勻氣兼解毒之藥加白芍藥一錢當歸五分以活血加陳皮五分以勻氣加玄參鼠粘之各七分以解毒○二三日根窠雖圓而頂陷者爲氣虛血弱亦難聚宜加川芎官桂○四五日根窠雖起色不光潤爲氣弱血盛宜加白芍藥官桂糯米○五六日氣盈血弱色昏紅紫宜加木香當歸川芎○六七日不能成漿爲氣血少寒不能制宜加官桂糯米○七八日毒水化漿而不滿宜加官桂糯米發陽助漿○八九日漿不冲滿氣弱而險宜加糯米以成漿○十一日十二日血盡漿足濕潤不飲者內虛也加白朮白茯苓助其收斂○十三十四十五日毒雖盡解或有穢證相仍只以此藥隨證加減不可大寒大熱之劑恐致內損之患醫鑑

解毒跡則無毒窓則有毒急用凉藥解之雖數十貼不妨無害眼之患○窓則毒甚宜以清凉之劑解之酒炒芩連之類是也酒炒芩連能解瘡毒（必用）○瘡初出如胸前稠窓急用消毒飲（方見加山查子酒黃芩紫草茸○瘡出太多以犀角地黃湯（方見加蟬蛻味犀角消毒飲加山查子紫草茸糯米解之（必用）○瘡毒攻脾則泄瀉浮腫攻肝則眼生翳膜攻腎則耳痛膿出攻肺則咳嗽痰盛（用人齒散猪尾膏（方見下）○毒氣與熱相搏也宜用四齒散（方見加蟬）色黑者毒氣與熱相搏也宜用四齒散（方見下）○毒鬱臟燥痰盛狂叫宜或紫草燈心煎湯磨犀角玳瑁汁調服（方見加蟬）驚狂譫妄宜加味六一散（方見）黑陷驚狂譫妄宜加味六一散（方見）死○毒入胃則腹上瘡多青紅紫色外證口角流涎者死（必用）○瘡初出如蚊咬不分地界毒氣太盛宜神功散（方見）解之翻○解瘡毒宜解毒湯黑散子三豆飲（方見）緑瓜湯服朱砂法貶（方見）加味犀角消毒飲治瘡疹毒氣蘢遏未能勻透及口舌生瘡不能吮乳鼠粘子一錢二

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

分甘草五分防風升麻各三分
犀角桔梗各二分右剉作一貼水煎服
神功散　治痘毒太盛以此解之毒氣卽散陷者卽起
川芎當歸升麻甘草各六兩右爲粗末一起
取東流水煎三次每次用水三碗文武火煎至一碗半濾下又煎二次共藥水四碗半聽用又用好
朱砂四兩以絹袋懸入磁罐加
盡爲度取出焙乾爲末以綵羅
散用糯米二三合以紙包緊外
煉紅冷定打碎取米黃色者用
服以砂末一錢米末一錢煉蜜
沸湯一小鍾共一處調勻用茶
黑子散　解痘毒初出服此便消不出臘月諸糞瓶子
盛瓦片蓋口火煅存性放冷研細每二錢新
水調下

痘吉凶　痘者豆也大小不一無妨惟欲圓滿硬實宜虛軟陷伏○痘自頂額上陽位起且稠者固亦然遍身變壞獨頂額上不變則吉貫膿時變成水疱惟額上不破者可生收靨時敗證悉具維頂額上未靨如舊者可生○頭粒尖而白根窠紅潤譬如一顆珍珠放在胭脂上故曰生頭粒紅紫地界不分譬如鮮血猪肝故曰死翻○凡痘疹只出一般者善或二色三色相合而作者凶謂痘癍疹相合也○痘腳稀疎○根窠紅活○不瀉不渴○乳食不減○四肢溫和○身無大熱已上六證並不服藥自愈○痘子一者憎寒困倦痘子縮伏○三者瘡作坑內無膿血或作黑色疱○四者憂齒痘黑陷喉中涎喘○二者煩渴○五者聲啞氣噎或嚥藥腹中鳴○六者痘初出半在皮膚帶紫黑色不出○七者誤于疎轉氣啞者○凡痘出前後忌客

及兩手心兩足心密者皆不治○不治証又有五○一曰痒塌寒戰咬牙煩燥○不寧○三曰頭溫足冷悶亂欲飲○四曰灰白色頂陷腹脹喘渴○五曰目上視氣促泄瀉不止○不治證又有六○一者初出勇壯○二者出如蚕種○三者隨出隨沒○四者如蚊虫咬○五者倒出○六者飲水如促鼻翻○燥有黑氣以手扒鼻孔者必死○鼻

辨痘輕重順逆

輕者作三次出○大小不一○頭面稀○眼中無○臍中無○重者一齊並出○密如蚕種○稠密無縫○身熱腹脹○肥滿光澤○耳中無不止○耳中有○臍中有○頭溫足冷○渴瀉○不忌口○先曾渴○飲冷水○輕變重者犯房室○者避風寒○常和暖○大便稠○飲涼藥○重變輕冷○忌外人踰○凡出痘收靨從頭至足爲順從頭至足爲順從頭至足爲順

鮮紅則爲血熱初起紫者大熱也全白者氣虛也灰白者血衰而氣滯也黑者毒滯而血乾也○痘色初出淡紅紅變白白變黃者吉初出鮮紅紅變紫紫變黑者逆○痘出色不紅潤者毒盛壅塞故也宜用紫草飲方見外用芥子末塗脚心方見○黑屬血熱涼血爲主四物湯方見加黃芩黃連紅花○白屬氣虛補氣爲主保元湯方見去甘草加紫草柳方照燈影法凡痘形色雖險若燈光影與痘根圓暈相照燈影深厚則皆可調治若根窠不紅不起血死不活漿無影者雖輕難治故白日亦必用席油紙擦照之眼法神巧全在于此八門

辨痘虛實吐瀉少食爲裏虛陷伏倒靨灰白色爲表虛二證俱見爲表裏俱虛並用異功散救之貼

○不吐瀉能食爲裏實紅活凸銳無汗爲表實涼膈散方見加升麻乾葛紫草荊芥解之瞞○身熱無汗爲表實身涼多汗爲表虛便秘能食爲裏實吐瀉少食爲裏虛門○表裏俱實者難出易靨表裏俱虛者易出難靨表實裏虛難靨門○肺主氣氣不足則致三證○白汗○聲不出○瘡頂陷塌宜保元湯方見四君子湯方見○心主血血不足則致三證○灰白色○狠窠不紅○不光澤宜芎歸湯方見或四物湯方見加紫草紅花正傳

辨痘陰陽證足脛冷○腹虛冷○嘔乳食○目睛青○糞青色○面皖白○不可服冷藥○足脛熱○兩腮紅○脈沉數已上屬陰證便赤○渴不止○上氣急○大便秘○小不可服熱藥正傳○痘瘡虛寒用異功散方見實熱用凉膈散方見有起死回生之效矣

保護瘡瘡頻與乳食不受風冷可也○瘡變爲倒靨黑陷者由不愼風冷而不能食由內虛所致也（丹溪○瘡瘡常令衣服適中溫凉處坐臥調護使房室溫益（丹溪○瘡瘡當謹避風寒蓋內外熱氣毛孔俱開易於感襲一有觸冒諸證隨作且靨落之後氣血大虛尤當謹于防避也（醫鑑）

飲食瘡以脾胃爲主自始至終以能食爲佳○貫膿時宜食老雞補血收靨時宜食雄鴨又曰淡食收毒或精肥猪肉惟終始忌魚腥以助痰滯氣故也○瘡瘡忌食生冷肥膩鹽鹹茶醋酒葱蒜魚羊肉猪肝血柿棗飴糖犂忌鷄鵝鴨卵烹食令兒自育（丹溪○勿食酸辣五辛（忌葱同雞）熏肝生眼中瞖障瞤○瘡瘡首尾切不可飲冷水少與滾熱水則可○自發熱至收靨諸般血肉皆不宜食蓋助火邪滋熱毒故也若脾胃虛弱則止用鮝魚鮓鮓及精猪肉去盡脂膜淡煮少食以助滋味（醫鑑）○乳母當愼口不可令飢及受風寒必變黑歸腎難治（簡）○嬰兒未能服藥則當兼治乳母令服藥蘸乳以飼之俾其氣血清和飲食有節按以調氣通榮之劑則瘡心肥滿光澤無陷伏之憂矣（丹溪○乳母食後須揑去宿乳令盡乃服藥即仰臥雲時乃令兒吮其乳汁（瞤）

瘡疹宜食物宜食菜豆○赤小豆○黑豆○雄猪肉（山猪○石首魚○廣魚○鯧魚○薯蕷○蓮藕○茨菰○軟白飯○糯米粥（溫熱食之）○蕎麥麵（冷食）○雞○鵝○雞子（煨食）○栗子○蒲萄○海松子○胡桃（飯後食）○雪水酒（冷飲）○砂糖飴糕

禁忌瘡瘡切忌諸般臭穢煎炒油烟父母行房梳頭等觸犯未發而觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸則瘡痛如割以致黑爛切宜深戒（癍）○瘡瘡勿親近狐臭漏腋房中淫慾及婦人月後醉酒暈穢硫

礦蚊藥一切腥燥燒頭髮等氣瞤○痘瘡最怕穢惡之氣切忌外人及僧道看經往來蓋人之氣聞香則行聞臭則止故也○房內勿燒沉檀降眞龍腦麝香恐燥血傷○痘自初至終父母切忌房事

浴法

痘瘡因氣血虛弱或爲風寒所剋不能起脹成漿貫膿或陷伏宜用黍穰煮湯○胡荽煎湯○芸薹煎湯○兎皮毛煎湯○臙猪肉煎湯○馬肉煮湯猪馬無生肉則乾脯亦得皆可浴靹

水楊湯

楊柳五斤春冬用枝夏秋用葉洗淨搗碎取長流水一大釜煎六七沸去渣將三分之一注盆中先用保元湯方見加川芎桂皮糯米煎服乃乘熱洗浴良久以油紙撚點燈照之纍纍然有起勢陷處有圓暈紅絲此漿影也漿必滿足如不滿又如前浴弱者只浴頭面手足勿浴背如燈照而無起勢則必添湯久添使透徹肌肉疎通內外令毒氣隨暖氣而發也此藥升提開豁萬竅枯者自起轉潤白者轉紅陷伏者自起矣冬寒則溫房內浴之

穰法

痘瘡觸犯穢汚痒痛者酒坊見化下蘇合香元方見辟穢門○痘兒左右常令有胡荽氣能辟去穢惡之氣瞤○懸胡荽于房中且以胡荽酒噴床帳及衣被○常燒蒼朮猪蹄甲乳香以辟惡氣○汚穢毒氣入內成黑陷宜用再甦散門

辟穢散

一名祛穢散亦名辟穢丹蒼朮細辛甘松川芎等分爲治用烈火焚之末

再甦散

一名再甦丹明白礬地龍砂各等分右爲末每取五分以小猪尾血卜椹斗許同新汲水

調下
門入

痘瘡諸證有聲音咽喉痛腰腹痛驚搐嘔吐泄瀉痰喘煩渴腹脹自汗痒痛斑爛寒戰咬牙失血尿澁便秘倒靨黑陷護眼滅般凡二十一條

聲音瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲先變者氣病也慞○聲出肺與心或感風寒或多啼氣噎不問痘已出未出失聲者身温則解毒防風湯防上身冷則內托散倍桔梗防肺氣絶也不治○痘出不好聲啞者亦死門入

咽喉痛痘出咽喉痛宜消毒飲防澁痛口爛齦腫乃心胃熱也宜如聖飲若水漿不入宜用紫雪炀覜○咽喉有毒飲食如鯁挫不能吐乳宜水漿不入或吐出或常乾嘔者危惟貫膿時見

證二便閉者反吉○痘毒人臟腑咽喉間寒宜用猪尾膏防覜○痘生於口舌瘡爛不能吮乳宜加味犀角消毒飲防覜效

如聖飲麥門冬桔梗各一錢鼠粘子甘草各五分右剉入竹葉三片同水煎服瘡出汗以後發干外宜升麻葛根湯防覜加減紅綿散參蘇飲防覜去人參茯苓相薄欲出而不能出宜加縮砂表之醫○收醫時熱毒凝滯痰血作痛宜手捻散翻○痘疹出不透

腰腹痛凡發熱欲出痘腰痛痛止為度免出腎經之痘○發熱時腰中大痛如被杖及出痘乾燥若死醫○痘初出便作腰痛見紫黑點者多死醫○痘瘡腹痛多是痘毒當臨證消息○痘疹必先腹痛蓋痘子先自腸胃中出然後發干外宜升麻葛根湯防覜加減紅綿散防覜○發熱時腹痛或腹脹者由毒氣與外邪相薄欲出而不能出宜參蘇飲防覜去人參茯苓加縮砂表之醫○收醫時腹痛不醫痛在中脘乃熱毒凝滯痰血作痛宜手捻散翻○痘疹出不透

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

腹痛甚或黑陷
宜蟬退湯 方見
手捻散 鼠粘子白芍藥大黃桃仁各六分紅花四分柱枝二分半右剉作一貼水煎服
蟬退湯 蟬殼二十一箇甘草一錢半右剉水煎服或爲末每一錢白湯調下腹痛立止而出透神效

驚搐 欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦非驚風宜服發散藥加減紅綿散是也○痘毒驚者心肝熱也瀉肝則風自去宜瀉青凡方見○先驚後痘者輕先痘後驚者逆凡赤散方見○發熱時發驚者痘在心經而出也乃爲吉兆○血未出先發搐是兼外邪宜加減紅綿散如痘稠密毒熱內熾或倒靨黑陷時作搐宜用猪心龍腦膏子方見

加減紅綿散 麻黃蕤仁全蝎天麻薄荷紫蘇各五分右剉作一貼入葱白一莖煎服凡

嘔吐 凡顯痘疹若自吐瀉者不可妄治而多吉謂痘氣上下皆出也○痘初熱吐瀉無妨痘出後忌之○吐瀉喘渴蛇虫已出目直視大便流腸垢者死○痘出而吐者毒盛乘火宜神功散方見吐瀉並作宜用定中湯○寒甚腹痛嘔逆下痢宜理中湯加木香丁香肉豆蔻煨服

定中湯 收斂胃氣止吐瀉神妙取眞正黃色上不濕沙石者一塊置塊肉以百沸湯泡之以蓋合定候溫右用兩酒煮和水飛雄黃末一錢少加砂糖溫服二服立止

泄瀉 痘出後極忌泄瀉起脹時尤忌○痘瀉急用保元湯方見加肉桂白芍藥煎服腸滑者肉豆蔻煨一

箇乳香一豆大爲末糯米飲調下㕮○痘出不光澤不起發根窠不紅或瀉而渴或腹脹或氣促是表裏俱虛宜異功散煎水吞下肉豆蔻丸○腹脹瀉渴乃胃中津液少也宜用木香散㕮○泄瀉頗多津液內耗血氣不榮其痘雖起發必不能靨宜木香散救之㕮○起脹時泄瀉則內氣虛脫瘡必陷伏宜用固眞湯㕮

異功散 治痘靨之際頭溫足冷腹脹渴瀉如寒戰咬牙腹脹足冷過膝者用此救之木香當歸各三分半桂皮白朮白茯苓各三分陳皮厚朴人參肉豆蔻煨丁香各二分半附子炮半夏各一分半右剉作一貼入薑三棗二水煎服○此等證亦多屬熱不可察有熱則不可用㕮

木香散 治痘瘡發脹渴瀉木香丁香桂皮陳皮半夏赤茯苓人參前胡甘草各二分右剉作一貼薑三片棗一枚煎服○冷證可用有熱則不可用㕮

肉豆蔻丸 治痘疹泄瀉赤石脂白礬各七錢半白龍骨肉豆蔻煨訶子肉各五錢木香縮砂各三錢右爲末麪糊和丸黍米大溫水飲吞下一歲兒三十丸三歲兒百丸㕮

固眞湯 治痘瘡泄瀉黃芪人參白朮白茯苓白芍藥炒木香陳皮訶子皮肉豆蔻煨甘草炙各三分右剉作一貼入糯米五十粒同水煎服○糯米止泄瀉養胃氣最好醫

痰喘 附咳嗽咳逆○痘出後痰盛喘急宜人參清膈散前胡枳殼湯㕮○痘紫黑陷伏而痰盛先用抱龍丸坊見降痰醫○痘痰用白附子杏仁煎水磨服切不可用二陳湯坊見燥胃中津液○貫膿時咳逆乃胃氣上越欲絕故也以眞黃土鼻邊聞之立止翻○痘疹咳嗽氣喘乃毒攻肺脹也胃高聲啞

者死○凡無痰而喘急不得卧者亦死�passim

人參清膈散 白朮黃芪紫菀地骨皮滑石各三分石羔桔梗甘草各二分人參黃芩桑白皮前胡當歸白芍藥知母赤茯苓甘草各一分右剉作一貼水煎服瞤

前胡枳殼湯 前胡枳殼大黃赤茯苓甘草各六分右剉作一貼水煎服瞤

煩渴 痘瘡煩渴飲水渴轉甚者乃脾胃虛津液少也宜木香散坊見○一云脹渴漬鴈渴驚悸渴寒戰渴嗽牙渴亦多屬熱不可不察若誤用則禍如反掌○當屬而不屬煩渴腹脹泄瀉頭温足冷速與木香散救之○痘瘡煩渴不可與冷水噀亦不宜與蜜水紅柿西瓜梨橘等冷物若冷毒內攻腹脹喘悶寒戰咬牙則難治瞤○痘瘡首尾不可飲冷水少與滾熟水則可若飲水過多濕損脾胃則氣血

愛滯不散故瘡痂遲落而生癰腫也○痘瘡發渴乃氣弱而津液枯竭也宜保元湯坊見加麥門冬五味子煎服若不止參苓白朮散坊覩加乾葛天花粉五味子煎服雖口中如烟起鼠粘子煎服雖口中如烟起若大渴者定中湯坊見和砂糖服立止瞤○痘瘡渴宜紅花子湯加煩渴乃毒火炎上也宜烏梅多而尿少恐濕滋脾土成癰腫宜益元散坊覩滲之○血虛痘黑火動發渴者難治凡虛證見渴者死�passim

紅花子湯 治痘瘡渴及痘不快出花子一合水煎服之

烏梅湯 治同上黑豆蒸豆各一合烏梅三箇右水煎服之

甘草湯 治同上甘草瓜蔞根各二錢右剉水煎服之

腹脹 腹脹由脾胃虛氣攻作也又脾虛則腹脹飲水多服之亦腹脹（錢○瘡瘡泄瀉毒陷腹脹酒調人齒散○瘡病腹脹有二傷生冷而脹宜木香散坊見毒氣內陷而脹宜人齒散○腹脹不食神昏者死門入

自汗 瘡瘡初起自汗不妨蓋濕熱熏蒸而起故也甚者當以參芪止之防其難膿必用○瘡出汗切忌汗多必難貫膿收膿急用保元湯坊見止之門入

疼痛 血不榮肌膝所以疼血和肌潤疼自不作矣○一足常搖動者將發疼也因食毒物及食鹽而疼四君子湯加芎連大黃微潤之○瘡疹血多身痛叫喚及煩燥脹痛宜小活血散○瘡瘡瘡用蟬退湯疼甚水煬湯浴之坊見○又法鹽和百草霜水拌畧炒燒烟熏之疼立止又審水調滑石末糝羽刷瘡上亦止○瘡乃瘡之善證初出時宜參蘇飲坊見起脹貫膿時作瘡瘡不妨門入○瘡病輕者消毒飲坊見○凡瘡痛不爲外寒所折而痛則必皮膚厚密難出爲痛寒折宜參蘇飲肉膝密宜小活血散○因食毒物作疼宜蟬退湯坊見百花膏雜○瘡疼難任宜糝敗草散坊見蕎麥粉亦好瘡瘡○因虛發疼遍身爪破宜內托散坊見去桂倍白芷當歸木香氣行血運其疼自止膿○瘡瘡煩痛宜硝胆膏坊見仍用真黃土細末糝之良○瘡將膿乾硬而痛宜塗酥油潤之猪脂亦好瘡瘡○收膿時遍身發疼爪破無膿如豆敲者死瘡膿

小活血散 白芍藥爲細末每一錢淡酒調下雜

百花膏 白蜜畧用湯和時時以雞羽刷身上雜

斑爛 痘毒出盛表虛難靨以致肌肉壞爛名曰斑爛腐不乾作痛宜敗草散或黃土細末糝之○暑月痘爛生蛆以帶葉柳枝鋪地上臥之或藉以芭蕉葉又以水楊湯坊見浴之門○痘瘡斑爛煩痛或臭爛深坑不收口並用硝胆膏藏○痘瘡斑爛成片膿水不乾宜白龍散傳○穢氣衝觸發痒爪破斑爛宜服內托散坊見外用祛穢散坊見焚熏醫○瘡瘡周身不能回水或痘靨濕爛淋漓粘滯並宜甄陶散摻之最妙翻○遍身臭爛如餅搭目中無神者死門

敗草散 多年蓋房上爛草曬乾細末糝之若渾身瘡爛則攤于席上令坐卧其上此草經霜雪雨露感天地陰陽之氣善解瘡毒門

硝膽膏 芒硝爲末調猪胆汁塗之無芒硝則以硝亦可瞬

白龍散 黃牛糞曬乾火煅成灰取中心白者綿裹樸付之傳

甄陶散 新瓦研爲細末羅過絹包裹樸患處若乾痂堆積內有膿以鴨卵清調付翻

寒戰 痘瘡黑陷必寒戰蓋黑者歸腎水惡證也腎旺勝脾土不剋水故脾虛寒戰則難治錢○七日前寒戰者表虛也咬牙者內虛也七日後寒戰者氣虛也咬牙者血虛也氣虛用保元湯坊見加桂血虛用保元湯加川芎當歸鼈○當靨不靨泄瀉寒戰此屬虛寒宜異功散坊見靚

咬牙 上下齒相磨切有聲謂之齒齲○傷寒論曰熱極口噤齒齲即咬牙也亦曰戞牙以大承氣湯貶胃腑也然則咬牙一證門下之此熱入胃腑也錢仲陽曰痘黑陷口噤咬牙以百祥丸下之此毒入腎腑也百祥丸治憂齒甚妙乃熱毒入臟腑也然太峻宜代以加味宣風散○痢門見下

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

失血 瘡疹熱盛吐衄便尿失血並宜犀角地黃湯紡隴○出瘡時口鼻及耳血不止二便下血者亦死吐利不止二便壞也不治瀉○起脹貫膿時便血而內壞無膿者死又九竅流血者亦死門

尿澁 瘡疹小便澁者宜導赤散紡湖當消息二便如何如小便澁則通大便宜四順清涼飲紡隴心○瘡瘡不快煩躁咬牙尿澁宜用人參蟬蛻散

紫蘇木
通湯瞤

人參蟬蛻散 人參蟬蛻穀木通白芍藥赤茯苓紫草茸甘草各五分右剉作一貼水煎服瞤

紫草木通湯 紫草茸木通人參赤茯苓各四分甘草一分右剉水煎服門

瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通一有結則腸胃壅遏脈結氣滯毒氣無從發泄目閉聲啞肌肉釐黑不旋腫而變矣儘○大便二日一夜者爲順三四日不便爲秘一日三四便爲利門○錢氏雖云瘡疹始終不可下若有裏證及大便結若安得不下當歸丸褰變百祥丸紡見四順清涼飲紡隴酒○瘡熱壅盛便閉不通蜜皂丸導之或用油醬法潤之醫○四五日不大便可用肥嫩豬油白水煮熟與兒食之令臟腑滋潤大便自通瘡痂亦易落最妙心

當歸丸 治瘡瘡大便秘結當歸五錢甘草二錢半黃連大黃各一錢半右爲末先將當歸熬膏子乃入三味末和勻作丸菉豆大米飲吞下五七丸漸加服以利爲度藏

蜜皂丸 蜜二三兩熬如飴糖入皂角末二錢和勻捻作小錠子納穀道中今用熬蜜入猪胆汁皂

角末和勻作錠用之尤速效醫鑑

油醬法 治大便久不通香油清醬各一合攪令十分和勻以小竹筒插入肛門內取油醬灌入竹筒內令人吹之令漸入或以物推入肛內卽通諸

倒仵 痘形陷伏倒仵者自其內傷氣虛而不能起發謂之陷伏當溫中托裏宜內托散保元湯見二坊自其外感及觸穢而言謂之倒仵當溫散寒邪宜調解散若觸穢則辟穢散坊見熏解之○當出不出當出不出脹不脹當貫不貫當仵不仵均謂之陷伏倒仵○痘出或爲風冷所折致氷硬宜調解散卽○痘白色將仵時如豆胀者因初起時飲水多其仵不齊俗呼爲倒仵但服實表之劑宜出不快及倒仵宜四聖散保元湯坊見加味四聖散二錢坊見上

調解散 青皮陳皮桔梗枳殼當歸紫蘇葉半夏川芎紫草茸木通乾葛甘草各三分人參一分半

右剉作一貼入薑三棗二水煎服卽

水楊湯 治陷伏倒仵不起浴之神效方見上

黑陷 痘變不過陷伏倒仵黑陷斑爛四者而黑陷最危可不究諸○痘瘡黑陷毒氣入裏心神昏悶宜猪尾膏○痘瘡黑陷毒氣炎熾躁瘈犯穢汚毒入內黑陷者服再甦散焚辟穢散○痘疹重者十活四五黑者十難救一其候寒戰咬牙或身黃腫紫急以百祥丸或棗變百祥丸下之身熱氣溫欲飲水者可治如惡寒不已身冷出汗耳尻反熱者死蓋脾能勝腎故身熱欲飲水脾不勝腎故惡寒身冷腎主黑陷故也○未綻一齊黑者爲黑陷已綻而不齊黑者爲將仵磯

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』
ガラス使用

○青乾黑陷身不大熱大小便澁則是熱在內也宜用宣風散加味宣風散○瘡瘡初出光壯忽然黑陷心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神不速治則毒入臟必死宜回生散龍腦膏子○瘡瘡黑陷宜加味四聖散更以胡荽酒噴其身見一二坊若未效則用獨聖散甚則宜加味宣風散○瘡黑倒陷猪尾膏龍腦膏子無比散無不驗人○瘡黑陷危惡至死宜四聖散藏海○黑陷狂躁煩渴熱毒太盛宜加味六一散方見醫鑑○瘡焦乾黑陷身熱如之宜用二角飲種○黑陷發搐目直喘急宜用周天散附○瘡瘡倒靨黑陷宜用麻黃湯靳○瘡黑陷悶亂神昏者死又目閉無魂者死不治附

猪尾膏 治瘡瘡陷伏倒靨不起發或毒氣入裏黑陷危惡者龍腦一錢刺取小猪尾尖血和丸小豆大淡酒或紫草飲化下熱盛則新汲水化下神驗蓋猪尾無一時休息取振掉發揚之意也

齒散 治瘡不紅不起發或黑陷焦枯人齒猫齒狗齒猪齒各等分盛研鍋內火煆候冷研爲細末每取五分熱酒調下一二歲兒服二三分五六歲兒服四五分取效如神蓋黑證屬腎四齒亦屬腎故能解熱毒若無猫齒只用人齒亦可但不如四齒全方附

百祥丸 治瘡紫黑陷伏寒戰口噤戛齒危證紅芽大戟不以多少陰乾爲末右水丸黍米大每一二十汁中煮汁盡焙乾搗爲末右水丸黍米大每一二十丸研脂麻湯下此方大峻宜代以棗變百祥丸加味宣風散

棗變百祥丸 治瘡黑陷及大便秘結紅芽大戟去骨一兩大棗去核二十枚右水二盞同煎水盡爲度去大戟不用將棗肉作丸如上法服之蓋大戟性峻以棗變者緩其性也

宣風散 治痘靑乾黑陷煩渴腹脹而喘二便未澁乃熱蓄于內宜服黑丑四兩取頭末一兩半生半炒陳皮甘草各二錢半檳榔兩箇右細末二三歲兒服五分四五歲已上兒一錢蜜湯下磁

加味宣風散 治同上卽宣風散加靑皮二錢半也依上法服之先下黑糞次下褐糞後以四君子湯方見加厚朴木香糯米煎服和胃良久糞黃赤自微出又以胡荽酒方見噴身卽發起癮

回生散 生人齒小兒齒自落者佳火煆研爲細末每齒一箇作一服淡酒調下入麝香少許尤妙

黑陷甚則用人齒五分羌活一錢穿山甲炮麝香各少許爲末每一錢麻黃薄荷湯調下一服便起

凡人齒不可過用一錢過則陽盡出表急以四君子湯方見加芎歸救之瞬○一名人齒散治痘出不快或倒靨黑陷門○錢氏方

龍腦膏子 治痘瘡未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而倒靨黑陷不速治則毒入臟必死梅花腦子一錢研細滴猪心血和丸如豆子大每服一丸井花水化下心煩狂躁紫草湯化下

獨聖散 治黑陷氣欲絶穿山甲取前足及嘴上者炒研爲末木香煎湯入酒少許調五分服入麝香少許尤妙

無比散 治黑陷焦枯熱毒內熾惡候朱砂二錢半牛黃麝香龍腦各二分半右爲細末新汲水入小猪尾血三五點同調服小兒二分半大兒五分得睡後利下惡物便安

氣虛則只用紫草湯自好

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

四糞散 治倒靨黑陷危惡者童男黑猫黑犬黑猪各一具取未破陽雄者先于重九日各置淨室中勿礙食收其屎陰乾至臘月初八日未出時火煆存性爲細末每用一錢窖水調下服○一方倉卒無此藥只取無病小兒糞燒灰以窖水調下服○一名無價散一名提效化毒散

二角飲 治痘焦乾黑陷身熱如火犀角羚羊角各等分井水濃磨取汁服有回生之功

周天散 治黑陷發搐目直喘急蟬殼五錢地龍一兩爲末每二錢研乳香湯調下服

麻黃湯 治倒靨黑陷麻黃去節五錢煎沸去上沫再煎去三分之一去滓乘熱服神效散

一方 治黑陷牛黃淸心元半丸井水調下服○京鼠水溫服妙

護眼痘瘡盛發先用此藥則痘不入眼爲害宜消毒飲

黃柏膏 ○痘出太盛恐入眼加酒炒芩連桑白皮草龍膽煎服外塗胭脂膏○回漿時眼腫不能開者以水濕絹巾拭去膿屎畧用手指攀開眼皮透一點風則不致生翳膜○眼角出膿太甚必損雙目宜淸解內毒以預防用

消毒飲 犀角地黃湯○入眼

黃栢膏 一名護眼膏一名神應膏黃栢一兩甘草四兩紅花二兩菉豆粉一兩半右爲末淸油調從耳前至於兩眼四畔厚塗之

胭脂膏 乾胭脂窖調塗兩眼睡則痘不入眼砌心

一方 痘初出鼠粘子爲末水調貼顖門上則痘不入眼矯

滅瘢痘纔著痂即用菜子油（瞤書子蔓）**不住潤之可揭則揭若不潤及遲揭則瘡痂硬必隱成瘢痕**（一錢）○痘將靨乾痂頻以酥油或白蜜潤之可乾硬必成瘢痕○痘痂雖落其瘢猶之無酥則猪脂煎汁代之效○痘痂雖落其瘢猶黯肉起而或凹或凸當用滅瘢痕方羊骨髓一兩煉一二沸輕落總宜用滅瘢痕方羊骨髓一兩煉一二沸輕粉一錢（一分半）右研如膏每日塗瘡上○或用稀痘湯（一盞）瞤○蜜陀僧末臨卧塗面明乾洗去靣

滅瘢散　韶粉一兩（一錢）輕粉二分半右研細練猪油調和塗瘢上日三次瞤

蜆子水　痘後以此洗面漸生肌肉無瘢痕取活蜆子不以多少以水養五日每日取此汞常洗手面

稀痘湯　卽秘傳稀痘湯也凡痘收靨時取此湯微溫洗面則無瘢痕洗半面則半面無瘢痕神效（方見上方○方見下方）

痘後禫病　痘疹愈而再發或氣虛稟弱坐卧振搖者宜用保元湯（方見上方）○愈後忽遍身青黑口噤搐搦搦此氣虛感風宜用消風散（方見上方）○愈後非時發搐目竄面赤乃心熱挾痰宜用抱龍丸（方見入門上）○愈後餘瘡塞鼻中不得睡卧宜用木筆花散（方見入門上）○愈後心痛不可忍此餘毒歸心急服乳香散（方見入門上）○痘愈後失音宜用天花散（方見入門上）○痘愈後餘毒成瘡癰○痘愈後牙齦腐爛宜付搽牙散（方見入門上）○痘愈後咽喉腫走馬疳牙齦腐爛宜付搽牙散（方見入門上）○痘餘毒肝虛則入眼目痛宜服七味甘桔湯（方見入門上）○痘餘毒肝虛則入眼目肺虛則爲疥癬或爲癰癤或發在肌肉脾之虛也或在筋骨節腎之虛也或在面或牙齒疳蝕或咽喉腫痛宜服解毒藥清毒飲三豆飲

之類方見鼻齆門。

木筆花散　辛夷花爲細末加麝香少許以葱白蘸入鼻中數次卽通。

乳香散　乳香二錢水一盞煎服。

天花散　天花粉桔梗白茯苓訶子肉石菖蒲甘草各等分右爲末用水調半匙在碗內外以小竹七莖黃荊七條縛作一束點火在碗內煎服。

搽牙散　白梅肉燒存性白礬枯各二錢半人中白煅五錢右爲細末先以韭菜根老茶濃煎水雞豜洗去腐爛惡肉至見鮮血乃付藥日三次爛至喉中者用小竹筒吹藥入雖牙齒爛落口唇穿破付藥皆愈但鼻梁發紅點則不可治。

七味甘桔湯　甘草桔梗各五分防風玄參鼠粘子升麻射干各三分右剉水煎服。

痘後諸疾　有痘後翳膜痘後癰瘢痘後餘毒入眼生瞖膜遮睛用瀉青丸防風湯和砂糖化下微利神效。

痘後瞖膜　痘後瘢痕後剩疾各三條大效初覺易治每取二九或三九以竹葉煎宜蜜蒙花散通聖散。痘毒入眼生瞖膜宜用蟬猪散半年內者一月取效一年者不治。痘後目生瞖但活血解毒則疼痛自止瞖膜自去。痘不宜點藥蓋毒氣自臟達外點藥攻逼反以爲害。無瞖但眼目無光者過百日氣血復則自明。

痘後眼腫痛或生赤脉或白膜遮睛四邊散慢者易治若暴遮黑睛多致失明宜用地黃散。食毒物睛凸出宜二仙散。眼腫突如桃者貼護眼膏坊見眼腫不開黃連末調雞子青貼兩太陽穴及

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

兩足心㖞。瘡瘡入眼雖赤白障醫膜遮漫黑睛但瞳子不陷者可治宜用決明元。瘡後生翳宜用蟬菊散薏菊散㸃。瘡後生翳醫膜宜服通明散兼用吹雲散入耳又宜兎屎湯四皮飲瀹

蜜蒙花散 蜜蒙花青箱子決明子車前子各等分右爲末取二錢用羊肝一大片薄批摻藥用濕紙裹煨熟空心以米泔嚼下入活

通聖散 白菊花菜豆皮穀精草各等分右爲末取一錢乾柿一箇米泔一盞同煎候泔盡只取柿食之日三入活

蟬猪散 蟬殼一兩猪懸蹄甲二兩入鑵內塩泥固濟燒存性羚羊角屑二錢半右爲細末一歲兒取三分三歲兒五分漿水調服日三夜一入活

地黃散 生地黃熟地黃當歸防風羌活蟬殼犀角木賊穀精草白蒺藜大黃各一錢玄參五分木通甘草各二分半右爲末每取五分以羊肝煮汁調服㖞

二仙散 仙靈脾威靈仙各一錢右剉作一貼水煎服㖞

決明元 石決明煅川芎黃柏各一兩蒼朮五錢右爲末以兎肝和丸菜豆大米泔下三十丸無兎肝代以羊肝㸃

蟬菊散 蟬殼白菊花各一錢右入蜜少許水煎服之㸃治瘡後生翳膜疼痛羞明風甘菊穀精草木賊槐子白蒺藜大黃黃連甘草各等分右爲末每一錢淸水泔調下㸃

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

通明散 當歸川芎赤芍藥生地黃防風乾葛甘菊天花粉蟬殼各二分半穀精草五分右劑作一貼水煎服醫鑑

吹雲散 黃丹水飛一錢輕粉三分龍腦一厘右爲末以鵝翎管吹入耳內如左眼病吹入右耳右眼病吹入左耳一日三次兼服通明散宜早治之久則難治醫鑑

兎屎湯 治痘後生瞖障兎屎焙爲末每一錢茶清調下最妙門

四皮飲 治痘後生瞖蓁豆黑豆赤小豆水浸取皮各半錢新採桑白皮一錢右劑煎水調下蟬菊散最妙方○生桑白皮能瀉肺膜不生瞖便退門

點法 治痘後瞖膜生蠐魚倒懸刺項下取血點瞖上最妙方○痘後瞖雖云不宜點藥惟此最妙方

痘後癰瘢 凡痘癰必先手足及脉絡之處或有紅腫或有硬痛處皆發癰之兆也痘未愈則不須治胸脇手足肢節瘢腫作痛宜用消毒湯○痘後生疳瘡疥癬宜用金血不收宜用斂肌散○痘後生瘡頭面身體多生癰瘡宜華散門○痘疹餘毒未清用犀角化毒丹醫鑑○痘癰鍼後成疳蝕瘡膿水不止若不治則多潰爛筋骨終成廢人宜用雄黃散綿裹散瞤○痘癰初起紅腫時黑蓁赤豆醋浸研取汁以雞羽蘸刷上隨手退消神效○痘後癰毒腫痛宜消毒飲上方見必勝膏傳○痘瘡落後餘毒不盡變成癩瘡苦痒臘豬油塗之神效瞤

消毒湯 赤芍藥連翹各一錢甘草節桔梗各五分貝母忍冬草白芷瓜蔞根各三分右劑作一貼水煎服○此卽丹溪消痘癰方也門

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

歛肌散 黃連 黃柏 地骨皮 五倍子 甘草各等分 右爲細末 乾摻之 門人

金華散 黃連 黃柏 黃丹 大黃 黃芪各三錢 輕粉 麝香各一錢 右爲末 乾摻或以猪脂調塗之 門人

犀角化毒丹 治瘡疹餘毒未解 頭面身體多生癰瘇 牙齦出血 口臭 枯梗 或唇口腫破生瘡 一兩 連翹 玄參各六錢 生乾地黃 酒洗赤茯苓 鼠粘子 微炒各五錢 焰硝 犀角 鎊甘草各三錢 青黛二錢 右爲末 蜜和每一兩分作二十丸 每一丸薄荷湯化下 醫鑑

雄黃散 石雄黃一錢 銅綠二錢 右爲末 乾摻 綱

綿鞏散 綿鞏一箇 須用出蛾穴者 以生白礬末 填滿其中 炭火燒令礬汁盡 取出研細 乾摻之 瞤

必勝膏 馬齒莧搗取汁 猪脂白蜜 右等分合和 熬膏塗之 傳正

痘後痢疾 痘後下痢膿血或下腸垢 宜用犀角地黃湯 紡閥 黃連阿膠元 紡見 方 見 人便 正傳 ○痘後下痢黃

赤膿血宜服

薤白湯 薤白切半盞 豆豉一盞 山梔子十枚 去皮 右水煮薤白爛 去滓 溫服 門人

附孕婦痘瘡 孕婦發痘瘡宜罩胎散 熱甚宜參蘇飲 貶 門牒 瘡稠密宜內托散 上方見 倍芍藥當歸去

桂加香附烏藥 胎動宜安胎散 傳正

罩胎散 赤茯苓 白朮 赤芍藥 柴胡 乾葛 人參 當歸 桔梗條 荊芥 枳殼 紫草 阿膠 白芷 川芎 縮砂 甘草各三分 右剉作一貼 入糯米百粒 柿蒂七箇 葶藶根七寸 瓜蒂一箇 以銀器用荷葉蓋覆 水煎空心服 無銀器以砂鑵煎之 荷葉雖無 無不妨 傳正

妊胎散 人參陳皮大腹皮白朮當歸川芎白芍藥香附子童便炒縮砂紫蘇葉赤茯苓甘草各三分右剉作一貼入燈心七莖糯米百粒同煎服傳

附瘢疹 有色黑而無顆粒者曰瘢浮小而有顆粒者曰疹傳○瘢紅痕如錦紋或如蚊跡熱極則發疹者如粟米微紅隱隱皮膚不出作痒全無腫痛○麻子最小隱隱如麻子頂平軟不碍指即有清水痘多挾疹同出麻亦多挾疹同出故曰痘疹麻疹○痘屬五臟爲陰難出難靨麻屬六腑爲陽易出易靨○麻毒原來只肺胃紅瘢五六日方出狀如麻子遍身無空處初熱三日出發起脹共三日出而又沒沒而又出出沒一週時許重者遍身瘭脹眼亦封閉有赤白微黃色不同仍要紅活最嫌黑陷○麻疹襍證與痘瘡大同但始終藥宜清凉○麻疹以升麻葛根湯(寒方門見)加葱白紫蘇葉乃麻疹初起之神方也或用蘇葛湯亦佳或以加味敗毒散(表方門見)表之汗後身涼紅痕自滅○麻不出而喘者死變成黑瘢者亦死麻沒後餘毒內攻循衣陷床譫語神昏者亦死(入門)○麻疹襍證與痘瘡大同但始終藥宜清凉○麻疹以升麻葛根湯(寒方門見)加葱白紫蘇葉乃麻疹初起之神方也或用蘇葛湯亦佳或以加味敗毒散(表方門見)表之汗後身涼紅痕自滅○麻不出而喘者死變成黑瘢者亦死麻沒後餘毒內攻循衣陷床譫語神昏者亦死(入門)○其麻自出如渴只宜葱白湯飲之常微汗潤澤可也過三日不沒者內有實熱犀角地黃湯紡靦解之(醫鑑)○瘢疹毒之病是肺胃熱毒熏發于皮膚狀如蚊蚤所咬故謂之赤瘢今俗謂之紅疫疫宜用葛根麥門冬散(心門)

蘇葛湯 紫蘇葉乾葛甘草各二錢白芍藥一錢半陳皮縮砂研各五分右剉入葱白二莖生薑三片水煎服(醫鑑)

葱白湯 生葱去青葉取白根連鬚不拘多少水煎取汁服(醫鑑)

葛根麥門冬散　石羔一錢　葛根　麥門冬　各六分　人參
丹麻　赤茯苓　赤芍藥　甘草　各三分　右
劉水煎服必用

單方凡七十種

白礬　小兒臍瘡及臍中汗出不止　枯白礬末摻之。
　　令血出以枯白礬末敷之若不摘去兒必啞　草本

伏龍肝　治小兒赤遊丹毒行於身上下至身即死　取爲細末芭蕉汁或雞子白或井水調塗　草本

胡粉　小兒卒患肚皮青黑不急治即死　酒和胡粉塗腹上乾則再塗又用灸法　證

臘雪水　治小兒熱癇狂啼少溫飲之　○赤遊丹毒取水塗之　草本

焰硝　治小兒火丹毒　取硝納湯中雞羽頻頻塗上　草本

地龍汁　治小兒熱病癲癎　取少許飲之　草本

藍葉汁　殺疳虫　治小兒壯熱疳　取飲之亦治丹毒入內　草本

黃連　殺疳虫　猪肚蒸搗爲丸服。亦治鼻疳鼻下作瘡　取爲末付日三　草本

蒲黃　治小兒虛熱蜜和作　草本

暴食之甚益小兒　草本

酸漿　小兒食之能除熱有益　草本

王瓜　封臍治小兒病疾良方　王瓜藤經霜晒乾燒存性爲末香油調納臍中立效　醫鑑

使君子　殺小兒疳虫及蛔虫寸白　取中仁食之虫即下　草本

天南星 治驚風聲啞不能言及諸病後不能言天南星一箇去皮臍抱爲末三歲兒半錢或一字以猪胆汁調下卽能言神效鑑

蒴蓄 治小兒蛔虫痛煮汁令濃飲之虫卽下取汁煮粥服亦佳韓

苧根 治小兒惡毒瘡五色無常苧根煮湯浴日三四韓

五加皮 治小兒三歲不能行取皮細末每取一錢粥飲調次入好酒少許服日三便行走韓

竹葉 治小兒驚熱煎湯飲之。竹瀝尤好溫服一二合韓

柳絮 多積可作穅極柔軟宜與小兒卧極佳以其性涼故也韓

龜尿 治小兒龜背取尿摩背上卽差韓

鯽魚 小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦取鮮滴入鼻中三五日差。頭瘡口瘡取頭燒灰爲末塗之韓

露蜂房 治小兒赤白痢燒爲末和飲服。大小便不通蜂房燒爲末酒和服一錢日二韓

鱉 小兒骨蒸勞瘦取肉作臛食之。小兒脫肛鱉頭燒爲灰付之韓

蟹 小兒解顱不合取蟹螯并白及末爛搗貼顖上顱卽合韓

蟬殼 主小兒驚癇夜啼身熱爲末和飲服。取殼水煎服出痘疹甚快韓

蠐螬 丹走皮中浸漬取蠐螬汁塗之良韓

烏賊魚骨 治小兒痢爲末以米飲調下韓

白殭蚕治小兒客忤及臍風撮口噤取二枚爲末蜜和付唇內卽差㚑

蝸牛入嬰兒驚風藥最勝細研入藥和用㚑

蟾蜍治小兒疳殺虫燒爲灰和米飲服○疳瘡臍瘡口瘡燒爲末付之㚑

牡鼠肉主小兒疳丁奚嘯露以黃泥裹燒去骨取肉和五味作羹與食之勿食骨甚瘦人㚑

雄鼠糞治小兒齒不生取三七粒每日用一粒揩齒齦上二十一日齒當出其兩頭尖者是雄糞也㚑

小蝦小兒赤白遊疹丹毒取溝渠中小蝦生搗碎付之㚑

蛇蛻主小兒一百二十種驚癎燒灰服○身上諸瘡燒末豬脂調付㚑

蜘蛛主小兒大腹丁奚三年不能行者燒熟啖之㚑

蚯蚓治小兒丹毒流腫及月餘取地龍糞水和塗之妙㚑

蜈蚣初生小兒口噤不開不吮乳蜈蚣炙爲末豬乳二合調半錢灌服㚑

水蛭小兒丹毒及赤白遊疹用蛭法取木蛭吮出惡血最妙㚑

雀糞治小兒慢驚天漿子糞卽雀白殭蚕全蝎各三枚爲末麻黃煎湯調服一字神效○驚癎臨汁灌口中常服令兒無疾○服口病取汁塗口旁卽差㚑

蛙治小兒熱瘡搗碎付之○赤白癎及泄瀉煩熱或煮或燒食之妙㚑

蠶錢治小兒吐逆取二七枚煮汁飲之㚑

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

粟毛敷主小兒火丹及五色丹粟敷煮汁洗𤼵

蒲萄主瘡疹不出食之盡出或研酒服之亦佳𤼵

乾柿和米粉作糕與兒吃治秋痢𤼵

梨治心臟風熱昏憒燥悶生梨取汁入米煮粥食之𤼵○治痰嗽喘梨去核入蜜煨食之𤼵

脂麻生嚼付小兒頭瘡良亦治軟瘡○若客熱搗取汁飲之𤼵

赤小豆治小兒丹毒及詐腫軟瘡搗爲末和雞子白塗之遂手即消𤼵

蓼實治小兒頭瘡搗爲末和雞子白塗之𤼵

冬瓜仁主慢驚風或末服或煎服皆效𤼵

滑石主小兒驚風壯熱又治風涎爲切要之藥水煮取汁飲𤼵

馬齒莧主小兒痢痢煮熟和五味空心食之○瘡後瘢痕及白禿瘡馬齒汁熬膏塗之妙𤼵

芥子治瘡出不快色不紅潤宜內服紫草飲上方見外用芥子爲末白湯調如膏塗兒脚心乾則再塗

卽快出紅活飢

鷄腸草治小兒赤白痢搗取汁一合和蜜服之甚良𤼵

水芹治小兒暴熱及霍亂吐痢搗取汁服之或煮取汁飲之𤼵

人爪甲小兒初生便多驚剪取爪甲燒爲灰麪糊和丸麻子大井水下一丸許

亂髮灰治小兒熱瘡取亂髮雞子大於銚上熬令汗出塗之甚妙𤼵

国立国会図書館　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

雞子治小兒痘瘡及休息痢雞子和黃蠟作煎餅與食○頭身諸瘡雞子殼末和豬脂付之靯

白鴨主小兒熱驚癇頭生瘡腫取肉和葱豉煮汁飲之靯

鵝毛取輕茸細毛夾布爲褥偏宜覆小兒兼辟驚癇蓋柔而性冷故也麵

夜明砂治小兒無辜痘及諸瘡夜明砂炒爲末入飲食中任意與食靯

鷓鴣屎主小兒痘蜘取屎研爲末炙猪肉點與啖有奇效靯

鵪鶉治小兒痘痢下五色取鵪鶉炙熟朝朝食之甚補下止痢靯

百舌烏治小兒久不語取肉炙食之靯○卽今之鶯也一名反舌黃鸝

麝香主小兒驚癇及客忤取當門子一粒朱砂相似細研熟水和灌下靯

牛黃治小兒驚癇迷悶日直口噤取牛黃大豆許研和蜜水灌之靯

熊胆主小兒五疳殺虫療疳疹大豆許和乳汁或竹瀝服之靯

阿膠能育神凡小兒驚風後眼中瞳子不正者阿膠一倍人參半倍煎與服之靯

虎骨水煮作湯浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇○虎爪懸小兒臂上辟惡鬼○驚啼客忤虎眼睛爲末竹瀝調下靯

臘月收兎肉作醬食去小兒跳豆瘡雖發亦稀少靯

猪乳汁主小兒驚癇天吊取乳三合以綿纏浸入兒口令嚥之或和朱砂牛黃各少許尤效○小兒頭瘡猪胆汁敷之○頭生白禿瘡臘猪屎燒末付之靯

孤陰莖玉小兒陰潰卵腫取得煮炙任令食之韭

鍼灸法小兒初生臍風撮口諸藥不效然谷鍼入三分或灸三壯立效眶○癲癎灸上入髮際三分宛宛中央三壯百會瘈脈瞤○癲癎癇瘈瘲兩蹻主之男陽女陰晝發治陽蹻申脈夜發治陰蹻照海各灸二七壯錫○急慢驚灸印堂○急慢驚風角弓反張不可灸者先當兩乳頭黑肉上男左女右各灸三壯○次灸髮際眉心顱會各三壯○手足大指當甲角以物縛兩手作一處以艾騎縫灸男近左邊女近右邊半甲半肉之間灸三壯先脚後手亦可治陰陽諸癎艾炷如小麥大瘥○慢驚脾惡逆證候諸藥不效者如有大衝脈則取百會穴各灸三壯○灸之神效怙○小兒卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸五壯仍洒和胡粉塗腹上乾則易瘥○小兒龜背灸脯俞膈俞各三五壯止炷如小麥瘥○小兒龜胸取兩乳前各二十五分上兩行三骨罅間凡六處各灸三壯炷如小麥春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法灸之無效瘥○顱門不合臍上臍下各五分二穴各灸三壯灸瘡未發先合瘥○小兒癖氣中脘童門各灸七壯瘥○灸癖法穴在小兒背脊中自尾骶骨將手揣摸脊骨兩旁有血筋發動處兩穴每一穴用銅錢三文壓上穴上以艾炷安乳中各灸七壯此是癖之根貫血之所也細○小兒癆久不愈內庭灸一壯大衝百會各灸隨年壯瘥○小兒霍亂男左女右第二脚指上灸三壯即愈瘥○小兒雀目灸兩手大指甲後一寸內廉橫文頭白肉際各一壯○疳眼灸合谷一壯瘥○小兒脫肛灸尾骶骨尖上一壯又灸臍中三壯百會七壯瘥

特1
2498

東醫寶鑑雜病篇卷之十一

国立国会図書館　　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4卷外景篇4卷雜病篇11卷湯液篇3卷鍼灸篇1卷目2卷』
ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 特1-2498
タイトル『東醫寶鑑内景篇4巻外景篇4巻雑病篇11巻湯液篇3巻鍼灸篇1巻目2巻』

ガラス使用