

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十三

產後諸疾門

虛汗

附論

明 周王朱橚 撰



夫虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不

復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗也因之
遇風則變為瘧縱不成瘧則虛乏短氣身體柴瘦唇口
乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

方

牡蠣散

出聖
惠方

治體虛汗出心煩食少四肢羸弱

牡蠣

一兩

龍骨

一兩

黃骨

一兩

白朮

一兩

當歸

剉微

桂心

芍藥

熟乾地黄

五味子

各半

人參

三分去
蘆頭

白茯苓

三分

甘草

一分炙
微赤剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六
分去滓不拘時溫服

隱居羊肉湯

出肘
後方

治虛汗乏氣不欲食卒氣血結風

顛倒悶亂

羊肉

三斤

芍藥

一兩

甘草

各一兩

芍藥

各三

當歸

各三

生薑

五兩

右以水一斗五升煮肉取九升去肉內諸藥煮取三
升分溫三服大效一方云大補虛損有黃者三兩入

參二兩

甘草湯 治產後血虛汗出不止

甘草 炙三分 當歸 焙切 人參 各一兩 芎藭 一斤去脂切碎水四碗煮取汁三碗去

藥 一兩 生乾地黄 焙四兩 羊肉 一斤去脂切碎水四碗煮取汁三碗去

油澄清

右除肉外粗搗篩每服三錢匕肉汁一盞煎至七分去滓溫服不拘時

黃芪湯 出便產須知 治產後汗出血虛為風邪所搗若兩

手拭不及者不可治或產後汗不止因陰虛而得又

遇風邪發為此疾一方有甘草一名延壽湯

黃芪 白朮 防風 熟地黄 牡蠣粉 白茯

苓 麥門冬 各等分

右以咀每服四錢水一盞半紅棗二箇煎大半盞服

茯苓湯 治產後虛汗不止心悸恍惚休惕多驚

白茯苓 去黑皮 甘草 炙 芍藥 剉炒 桂 去粗皮 麥

門冬 去心焙 當歸 切炒 黃耆 一兩半剉

右搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分切棗二枚
擘煎至八分去滓服不拘時

黃耆飲子 出聖惠方 治產後體虛瘦四肢少力不思飲食

心神虛煩汗出口乾

黃耆 剉 人參 去蘆頭 生乾地黄 五味子 麥門冬

去心 當歸 各一兩半 牡蠣 燒為粉

右細剉和勻每服半兩水一大盞入薤白五莖豉五十粒煎至五分去滓不拘時分溫二服

麻黃根散 出聖惠方 治產後虛汗不止此陰血裏虛陽氣

表實陽加於陰陰虛下傷者汗出不止遇風則變為

瘧或虛乏羸瘦唇口乾燥經水斷絕津液竭也

當歸 黃耆 麻黃根 牡蠣 煨為粉 人參 粉草

各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服一方

加小麥二合

芍藥湯 治產後虛汗不止虛煩憤悶

芍藥剉炒當歸切炒生乾地黃焙黃耆剉石

斛去根白茯苓去黑皮

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

日三

麻黃根湯 治產後虛汗不止

麻黃根二兩牡蠣燒黑黃耆剉人參一兩龍骨一兩

枸杞根皮二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞半棗二枚擘破同煎

至一盞去滓溫服不計時候

白朮散出聖惠方 治產後體虛汗出四肢乏力腹內疼痛

不思飲食

白朮 龍骨 當歸剉微炒生乾地黃 黃耆

剉牡蠣粉各一兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分不拘時溫服

當歸散出聖惠方 治產後惡露少汗出多虛無力

當歸剉微炒 白芍藥 木通 熟乾地黄 牡蠣粉

蒼朮剉微炒 各二兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分去滓不拘時
溫服

附子湯 治產後榮血虛損汗出日夕不止形體困急

附子炮製去皮 臍半兩 桂去粗皮 二兩 生乾地黄焙三分 甘草炙 令

黃芍藥各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚

煎七分去滓溫服不計時

石斛湯 治產後虛熱汗出不止

石斛去根 附子炮製去皮臍切 白朮剉炒 秦艽去苗土 桂去粗皮 各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞小麥五十粒同煎
至七分去滓服不拘時

療產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸出

類鈔方

甘草炙一兩 附子半箇炮製 去皮臍 桂心 芍藥各一兩半

右吹咀每服三錢水一盞生薑四片棗一枚煎至七分去滓空心服忌猪肉冷水生蔥等物

地髓湯 治產後亡陰血虛汗出不止

生地培芍藥 當歸切芎藭各一兩

右粗搗篩每服三錢七水二盞煎至一盞去滓溫服

日三

人參散 治產後虛汗不止煩熱體痛渴躁引飲

人參 芍藥剉甘草炙龍膽各一兩

右為散每服二錢七麝香溫酒調服日三

又方出聖惠方 治產後虛汗不止

當歸 黃耆各一兩麻黃根二兩

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

撲肌散 治汗不止

黑附子二錢半炮牡蠣半兩鹽泥煨糯米一兩炒

右為末以絹袋盛身上撲之

止汗散出永類鈔方 治產後盜汗不止應多汗者皆可服

牡蠣煨細研小麥麩炒令黃色

右等分細研煮生猪肉汁調下三錢無時服

人參湯出永類治產後諸虛不足發熱盜汗

人參去蘆川當歸去頭尾

右等分為末以猪肉子一隻去脂膜切小片子以水三升糯米半合蔥白兩條煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分溫服不拘時

牡蠣散出聖惠方治產後虛汗不止膝理虛踈

牡蠣一片燒研如粉麻黃根四兩

右搗羅麻黃根為細末同牡蠣粉勻粉汁

龍骨散出聖惠方治產後虛汗不止

龍骨麻黃根各一兩

右為散每服二錢不拘時以粥飲下

吳茱萸散出聖惠方治產後體虛汗出心煩食少四肢羸

弱勃色惡寒

吳茱萸半兩陽浸五味子一兩

右搗篩酒二大盞浸半日煎至一盞三分去滓不拘時分溫三服

療產後血氣暴虛汗出

用淡竹葉湯三合微溫服之須臾再服一方用淡竹瀝

又方

出便產須知

治產後血痢小便不通臍腹痛刺

用馬齒莧研取汁三大合如無乾者亦可煮一沸投蜜一匙令停頓服

葶草汁方 治汗出正赤汚衣名曰汗血皆由大喜傷

心喜則氣發血隨氣行婦人產蓐多有此證及膏淋尿血

以葶草不拘多少搗取汁二升醋二合空腹服一盞或濃煮汁飲亦淋瀝尿血

桂枝附子湯

出千金方

治產後虛風汗出不止小便難四

肢微急難以屈伸者

桂枝 芍藥

生薑 各三

甘草

一兩半

附子 一大棗

用十枚

右以咀以水七升煎取七升分為三服

佛手散 出大全良方

治產後血虛勞倦盜汗多困力少欬

嗽有痰

當歸 川芎 黃耆 各一兩 北柴胡 前胡 各一兩

右以咀每服三錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一枚薑三片煎至六分去滓溫服如有痰去烏梅

又方 出聖惠方 治產後虛汗不止

牡蠣粉 人參 去蘆頭 當歸 剉微炒 白芍藥 麻黃根

已上各一兩

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

單方 出朱氏集驗方 治產後虛汗

用防風不拘多少麩炒赤色為末煎豬皮湯下

虛熱 附論

夫新產之後陰血虛弱失於將理則陽氣偏勝使陰陽不能平均身體煩悶唇口乾燥肢節倦痛是為產後虛熱

方

栢子仁丸 治產後虛熱羸瘦困倦補益

- 栢子仁 炒
- 澤蘭葉
- 甘草 炙
- 當歸 切
- 芎藭 各一兩
- 白朮 去粗皮
- 桂皮 去粗皮
- 細辛 去苗葉
- 防風 去蘆
- 人參
- 牛膝 去苗酒浸切焙
- 麥門冬 去心焙
- 生乾地黄 焙
- 石斛

去根各一兩 厚朴 去粗皮生薑汁炙剉 藁本 去苗土 蕪荑 各半 附子 炮製去皮臍 乾薑 炮各一兩

右粗末煉密和丸如梧桐子大每服三十九温酒或米飲下不拘時候

柴胡湯 治產後虛熱久不解漸成勞氣

- 柴胡 去苗
 - 生乾地黄 焙
 - 附子 炮製去皮臍
 - 當歸 切
 - 人參 焙
 - 芎藭
 - 黃耆
 - 芍藥
 - 肉苁蓉 去粗皮切
 - 石斛 去根
- 各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時候

芍藥湯 治產後虛熱骨節煩倦瘦瘁

芍藥 剉

牡丹皮 人參 各一兩

芎藭 一兩

乾薑

炮半兩

白茯苓

去黑皮一兩

甘草

炙

白薇

麥門冬

去心焙

熟乾

地黄

焙各一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

地黄湯 治產後虛熱不解煩倦無力困悴

熟乾地黄

焙

附子

炮裂去皮臍

當歸

切焙各一兩

柴胡

去苗三分

一方用人參三分

白茯苓

去黑皮

芎藭

各三分

肉蓯蓉

切酒

浸 黃耆

剉各一兩

芍藥

三分

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

桂心湯 治產後虛熱狀似勞氣瘦悴無力

桂 去粗皮一兩

黃耆

剉一兩

芎藭

一兩

當歸

切焙半兩

赤芍藥

剉一兩

兩甘草炙 人參各一兩 附子炮製去皮

右粗搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一枚
擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

當歸湯 治產後血虛肢體壯熱煩悶困瘁不食

當歸切 黃耆剉 芍藥各一兩 桂去粗皮 芎藭 甘草炙

人參 柴胡去苗葉 各一兩

右粗搗篩每服二錢匕羊肉汁一盞同煎至七分去
滓溫服不拘時候

香豉湯 治產後虛羸肌肉枯悴肢體虛弱

豉半兩 豬腎一隻去脂 當歸切焙 蔥白三莖 人參

桂去粗皮 白粳米淘一合

右將當歸人參桂粗搗篩每服三錢匕水三盞入豬
腎蔥白豉米煎取一盞半去滓空心日午臨卧溫服

芍藥湯 治產後虛熱煩悶瘦悴

芍藥一兩 知母半兩 甘草炙 桂去粗皮 人參一兩 黃芩去
皮一兩 生乾地黃焙三兩 黃耆剉二兩

右麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓温服不拘時候

蜀漆湯 出千金方 治產後虛熱往來心胸中煩悶滿骨節

疼及頭痛壯熱晡時輒甚又似微瘧

蜚母 知母也 芍藥 各二兩 蜀漆葉 甘草 炙 桂心 黃

芩 各一斤 生地黄 一斤 黃耆 五兩

右切以水一斗先煮地黄取七升去滓下諸藥煮取二升半分三服湯療寒熱不損人忌如常法

芍藥湯 出千金方一名桂心牡蠣散 療產後虛熱頭痛身體發熱

腹中拘急疼痛

桂心 三兩 牡蠣 白芍藥 生乾地黄 各五兩 黃芩 二兩

千金翼云若通身發熱方加黃芩

右呔咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服一方治產後頭疼食後腹痛食前服此方不傷損人無

毒

八仙湯 治煩悶煩悶者虛熱也血氣有陰陽臟腑有

虛實實則生熱虛則生寒常服溫補藥而積溫成熱
 致發煩渴名曰客熱經下少而煩熱血熱也煩滿短
 氣者虛熱也煩渴而欲吐痰熱也妊娠煩躁者子煩
 也產後口乾煩渴心下悶痞者虛也煩悶之疾八仙
 湯主之

赤茯苓

麥門冬

知母

前胡

半夏麩

各二錢

右以咀每服三錢水一盞入甘草三寸煎至七分空
 心熱服

獨聖湯

治煩熱

麥門冬

烏梅

去核

右以咀等分用水一碗煎至八分露一宿清晨服之

無憂散

出華陀中藏經方

治產後發熱

琥珀

一兩研

生地黄

半斤切

右將地黄於銀器中炒煙盡合地上出火毒乳鉢內
 研為末每一兩琥珀末二錢和勻用童子小便與酒
 中半調下一錢日三服

薤白湯

出朱氏集驗方

治產後胸中煩熱逆氣

薤白

半夏

甘草

人參

各二兩

枯樓根

一兩

麥門

冬半斤

右以咀水一斗三升煮四升分五服熱甚加知母一

兩

虛渴

附論

產後虛渴者血虛內亡津液故也血為陰陰虛則勝勝則生熱重熱重蒸津液內涸咽乾口燥故令渴而引飲

也凡婦人產後一二日漸熱口乾可用新汲水調玉燭散或水調甘露散服亦妙勿作虛寒治之 煩渴者本

起於腎虛而或飲之所發也膀胱為津液之腑宣行陽

氣上蒸於肺化水液滋潤五臟調養骨髓其次為肌膚

為血肉上為涕淚下為溲溺陽無陰而不降陰無陽而

不升陰陽阻隔氣血不交遂令發渴或耽嗜酒肉多食

辛辣好食熱麵恣性荒淫將養失理耗損津液好酒虛

氣積於肺熱氣聚於臍脾經受熱腎水乾枯故成渴疾

治之宜與獨聖湯主之

方

地黃當歸湯 治產後血虛煩渴飲食不進

熟乾地黄焙 赤石脂各二兩 當歸切 木占斯 地榆

黃連去鬚 白茯苓去黑皮 天雄炮製去皮臍 黃耆剉一兩半

黃芩去心各半兩 桑耳 紫葛剉 麻黃去根節各一兩半

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

乾地黃湯 治產後下血過多虛煩熱渴

生乾地黄焙三分 芍藥 芎藭各一兩 桔梗炒三分 丹參

一兩 當歸切微炒 乾薑炮製 白茯苓去黑皮 知母焙

兩 人參一兩 葛根剉碎 甘草炙半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

石斛丸 治產後虛渴或脫血過多臟腑虛渴骨節煩熱倦怠

石斛去根牛膝去苗酒澤瀉浸切焙附子炮製去皮臍桂去粗皮

鹿茸酥炙去毛山茱萸山芋肉蓯蓉酒浸切焙白茯苓

去黑皮杜仲去粗皮炒剉生乾地黄微炒各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九煎棗湯下

不拘時候

黑神丹出御院藥方治婦人產後大發熱消渴不止煩燥

不休或汗病後胃脘水者並宜服之

黑附子炮製去皮臍一兩天麻去蘆頭天南星炮製桂去粗皮

夏漿水煮熟麻黃去根節各一兩半草烏頭一兩炮製乾薑

炮製一兩半白附子炮黃色半兩麝香去毛細研一兩天雄二兩慢火上炙

熟好酒內蘸如此七遍無令折藥力更用童子小便內蘸七遍掘一坑子納深五寸先用熱火坑內炙乾去火坑內洒酒約半斤天雄在內用磁碗蓋定週迴泥好不教漏冷定取出用之

右各修製訖一處碾為細末煉和搜成劑約搗千餘

杵丸如梧桐子大發熱渴用蜜子化服欲出汗熱酒

化服汗病後胃脘硬停水依前用蜜水化服一丸

竹葉湯出千金方治產後虛渴少氣力

竹葉三升 生薑半 半夏各三兩 大棗十四枚 小麥五合 茯苓

人參 甘草各一兩 麥門冬五兩

右以咀以水九升煮竹葉小麥生薑棗取七升去滓
內諸藥更煎取二升半一服五合日三夜一

葛根飲 治產後虛煩熱渴

葛根剉 人參各一兩 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 甘草

炙半兩 檳榔二枚 芎藭 麥門冬去心 赤芍藥各半兩

右為粗末每服三錢匕水一觥煎七分去滓溫服不

拘時候

黃耆湯 治產後氣血虛之內燥引飲心下煩悶

黃耆微炙剉三分 白茯苓去黑皮 當歸切微炒 桑寄生微炙各半

兩 陳麴微炒 桃仁湯浸去皮尖雙仁麴炒黃三分 乾薑炮製 桔梗炒

兩半

右為粗末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服
不拘時候

回津丸 出便產須知 治產後虛渴去血多津液少腎氣虛

飲無度當養血通氣回津補腎則安

白芍藥一錢 白朮二錢 澤瀉 茯苓 川芎各一錢 當歸

二錢 五味子 三錢 烏梅肉 一錢

右為末煉蜜丸服或嚼或熱水吞下二三十丸可加

甘草二錢阿子肉一錢

又方

出千金方

治產後渴不止

枯萋根四兩 人參 麥門冬各三兩 甘草崔氏不用 乾地黄

各二兩 大棗二十枚 王瓜根五兩 崔氏用蘆根

右呔咀以水一斗二升煮取六升分六服一方無地

黃麥門冬有牡蠣粉等分

蘆根飲

出永類鈴方

療產後大渴不止

蘆根一斤 切一 枯萋 人參 甘草 茯苓各三分 大棗

二十枚 麥門冬生四兩

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即瘥忌菘

菜一方無大棗

竹葉湯 治產後虛渴

竹葉 一兩切

甘草 炙

人參

各半兩

小麥

一兩

白茯苓

去黑皮半

兩半夏

薑汁製一分

麥門冬

去心焙二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

延胡散

出濟生拔粹方

治產後血渴不止

延胡索

蔚金

乾葛

桂心

青皮

枳殼

製等

分

右等分並以好醋浸一宿焙乾杵為細末每服一錢

冷橘皮湯調下不過三服即瘥

麥門冬人參湯 治產後虛渴引飲

麥門冬

去心焙

人參

甘草

炙

括萎根

生乾地黄

焙

王瓜根

各一兩

右粗搗篩每服三錢七水一盞半煎至一盞去滓食

後溫服

熟地黄散

出危氏方一名地黄湯

治產後虛渴不止少力脚弱

眼昏頭眩飲食無味

熟乾地黄一人參 三兩 麥門冬 二兩 括萋根 四兩 甘草 半兩

右剉散每服四錢水二盞糯米一撮生薑三片棗子三箇煎至七分去滓食前服一方無棗煎

菖蒲散 治產後津液減耗虛渴引飲

石菖蒲 括萋根 各一兩 黃連 去鬚半兩

右為散每服二錢匕新汲水調下日三

薑米湯 治產後虛乏津液衰耗燥渴不止

乾薑 炮一兩 陳粟米 炒二兩 甘草 炙一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食前稍熟服日三

又方 治產後血渴甚者

紅花子 人參 乾葛

右等分為末每服三錢水一盞半淡竹葉一把同煎至一盞去滓放溫時時呷之如無紅花子以乾胭脂代之

地黃散 治產後血虛煩熱引飲不止

生乾地黄

焙一兩

熟乾地黄

焙四兩

右為散每服三錢七温酒調下温粥飲調亦得日三
黄芩散 治產後血渴飲水不止

黄芩 麥門冬

右等分咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓温
服不拘時

治婦人產後口乾舌縮渴不止

用雞子一箇打煎水一盞衝之揉蓋少時服

治產後渴

用蜜不拘多少煉過熟水温調服即止

治產婦渴疾神效

用縮砂皮不拘多少煎湯百沸候通口飲之不過一

盞渴疾自止

治產後血渴不止

用蒲黄羅細每服二錢温米飲調下不渴住服

療產後血渴疾

用生連子心為末以米飲調下三錢服之立愈

見覓丸 治產後口乾痞悶此證蓋因產後榮衛大虛血氣未定食麩太早胃不能稍化麩食之毒結聚於胃腕上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅滯以藥下之萬不一應服見覓丸則愈或云未必只因食麩產母內積憂煩外傷燥熱好食甘辛亦令口乾痞悶當隨其所因調之可也宜四物湯去地黃加入參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當

隨經為治又恐是乳欲行去血弱使然

薑黃 三稜 葶澄茄 陳皮 良薑 人參

莪茂 各等分

右為細末用蘿蔔湯煮爛研將汁煮麩糊為丸如梧桐子大用蘿蔔湯下三十九丸或子煎湯下治食麩早胃不能化 評曰傷食可見覓丸若煩心所致先宜用

四物湯

當歸 人參 芍藥 川芎 等

用

烏梅煎如別傷燥熱當察所因調之為善

心虛驚悸 附論

夫產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘也或恐懼憂迫令心去受風邪風邪傳於心則驚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣

方

治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂 一名牛黃散

麥門冬 人參 各八錢 牛黃 研 白薇 各二錢 茯神 獨

活 遠志 生地黄 一作熟地黃 朱砂 飛 防風 天竺

黃 甘草 龍齒 研各四錢 龍腦 麝香 並細研各一錢

右為末用薄荷酒調下二錢

大遠志丸 治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍

恍惚腹中拘急痛夜卧不安胸中吸吸少氣內補

傷損益氣安定心神亦治虛損

遠志 甘草 乾地黄 桂心 茯苓 麥門冬

人參 當歸 白朮 澤瀉 獨活 菖蒲各三

兩 薯蕷 阿膠各二 乾薑四兩

右為末蜜和丸如大豆末食溫酒服二十九日三不

效稍增至五十九若大虛身體冷少津液加鍾乳三

兩為善

遠志丸 治產後臟虛心神驚悸志意不安腹中心痛

遠志去心 黃耆剉 白茯苓 桂心 麥門冬去心 人

參去蘆頭 當歸剉微炒 白朮 鍾乳粉 獨活 柏子

仁 阿膠搗砂炒 菖蒲 熟乾地黄 薯蕷各一兩

右為末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大不拘時

候溫酒下二十九

丹砂丸出聖惠方 治產後風虛心神驚悸或時煩悶志意

不定

丹砂一兩 細研 龍齒三分 鐵精三分 金薄十二片

水飛過

普濟方

三五

牛黃 一分 細研 麝香 一分 細研 柏子仁 半兩 菖蒲 半兩 遠志 半兩 去心

琥珀 半兩 細研 人參 三分 去蘆頭 茯苓 半兩 生乾地黄 三分

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每服二十丸不拘時以金銀花湯下

芍藥湯 治產後血氣虛弱心下驚悸夢寐不安妄見

鬼物 方見本門虛 羸計十二味

白茯苓散 由聖惠方一名 熟乾地黄散 治產後心神驚悸不定語

言失常心中憤憤

白茯苓 一兩 半 熟乾地黄 一兩 半 遠志 一兩 去心 甘草 一兩 白

芍藥 一兩 黃耆 一兩 桂心 一兩 麥門冬 一兩 門冬 一兩 人參 一兩

菖蒲 三錢 桑寄生 三錢

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚竹

葉三七片煎至七分去滓不拘時候

茯苓散 治產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂

不自覺知

茯苓 遠志 人參 麥門冬 桂心 生地黄

一方作熟
乾地黄

當歸

龍齒

白芍藥

羚羊角

各等分

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分去滓溫服不拘時

龍齒散

出聖惠方一名
熟乾地黄散

治產後心虛驚悸神思不安

龍齒

黃耆

白薇

生地黄

各一兩

人參

茯神

遠志

羌活

甘草

桂心

防風

各半兩

右為粗搗末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分去滓無時服一方無黃耆有荊芥與銀一方用

熟地黄

療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不定

出永

類鈴方

上等銀

一升

桂心

甘草

各六分

細辛

四分

人參

生薑

遠志

茯神

各八分

生地黄

各十兩

人骨

三分

棗子

一枚

右以水八升煮銀至一升半入藥煎至一升分作三服溫進

白羊心湯

出聖惠方

治產後內虛心神驚悸志意不定皆

為風邪所攻

白羊心

一枚細切以水六中

熟乾地黄

三分牡蠣搗碎

妙令微黃

防風

去蘆頭

人參

去蘆頭

遠志

去心

獨活

白芍藥

黃耆

剉

茯神

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以羊心汁一中盞煎至六分去滓

不拘時溫服日三

茯神散 療產後心虛怔悸志意不定煩躁恍惚

茯神

當歸

黃芩

麥門冬

甘草

人參

芍藥

酸棗仁

白鮮皮

各三兩

大棗

七枚

右為粗末以水二升煮取七合去滓溫服

遠志湯

出千金方

治產後忽苦心中衝悸不定志意不安

言語錯誤惚惚憤憤情不自覺

遠志

麥門冬

人參

甘草

當歸

桂心

各二

兩

芍藥

一兩

茯苓

五兩

生薑

六兩

大棗

二十枚

右為末以蜜棗膏和丸三升去滓分服日三贏者分

四服產後得此正是心虛所致無當歸用芍藥若其

人心胸逆氣加半夏三兩

甘草湯出千金方

治產後心虛不足驚悸心神不安呼吸

乏氣或若恍恍惚惚不自知覺者

甘草 遠志 菖蒲各三兩 人參 麥門冬 乾薑

茯苓各二兩 澤瀉 桂心各一兩 大棗五十枚

右為末蜜丸如大豆酒服二十九日四五服夜再服

不效稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增乾薑

人參丸

出千金方

治產後大虛心悸志意不安不自覺恍

惚恐畏夜不得眠虛煩少氣

人參 甘草 茯苓各三兩 麥門冬 菖蒲 澤瀉

薯蕷 乾薑 肉桂心各一兩 大棗五十枚

右為末以蜜棗膏和丸如梧桐子大未食酒服二十

丸日三夜一不效稍增若有遠志肉二兩為善若風

氣內當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

龍齒散 治產後臟氣虛心神驚悸不自覺知語言錯

誤志意不定

龍齒 遠志 人參去蘆頭 茯神 熟乾地黄 甘

草剉炙微赤 當歸剉微炒 白芍藥 麥門冬去心焙 牡蠣燒為粉各一兩

右為散每服三錢水一中盞入艾葉三七片生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服

羊心湯 治產後血氣驚悸神志不寧

羊心一枚以水五盞煎取三盞汁用 甘草炙一兩 遠志去心半兩 防風去叉

半兩 生乾地黄焙一兩半 芍藥剉 牡蠣熬各一兩 羚羊角鎊屑半兩

人參一兩半

右將八味麤搗篩每服三錢匕水煮羊心汁一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

茯神湯 治產後忽苦心中衝悸或志意不安恍惚

惚言語錯謬心虛所致

茯神四兩 人參 茯苓各三兩 芍藥 甘草 當歸

桂心各二兩 生薑八兩 大棗三十枚

右以咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三良

人參散

出聖惠方

治產後臟虛心忪驚悸語言錯亂

人參去蘆頭

茯神

麥門冬

去心焙

羚羊角屑

黃芩

犀角屑

龍齒

各一兩

白鮮皮

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

右搗篩每服二錢匕水一中盞煎至六分去滓入竹

瀝半合更煎一兩沸不拘時候溫服

遠志湯 治產後心虛驚悸夢寐不安

遠志

去心

龍腦

人參

茯神

桂皮

去粗

芍藥

剉

黃

者剉麥門冬

去心焙各半兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服不

拘時候

茯苓湯

出千金方

治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍惚

惚惚心中憤憤此皆心虛所致

茯苓

五兩一方用三兩

甘草

二兩一方用一兩

芍藥

二兩

桂心

二兩一方

用一兩 當歸 二兩一方用一兩

生薑

六兩一方用三兩

麥門冬

一斤

大

棗

三十枚

右呔咀以水一斗煮取三升去滓三分服日三無當

歸可用芎藭若苦心苦不定人參二兩亦可內遠志
 二兩若苦煩悶短氣加生竹葉一斤先以水一斗三
 升煮竹葉取一斗內藥若有微風加獨活三兩麻黃
 二兩桂心二兩用水一斗五升若頸及脊背膊强者
 加獨活葛根各二兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用
 水一斗五升

安心湯

出千金方

治產後心悸不足恍恍惚惚不自知覺

言語錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致

遠志

甘草各二兩

人參

茯神

當歸

芍藥各三

兩麥門冬

一斤大棗 三十枚

右以水一斗煮取三升去滓分三服日三若苦

虛煩短氣者加淡竹葉二斤水一斗二升煮竹葉服

一斗內藥若胸中少氣者益甘草為三兩善

產乳七寶

出永類
鈴方

療初產後服之調和氣血補虛安

神壓驚悸

辰砂 桂心 當歸 川芎 人參 白茯苓

羚羊角 燒存性已 乾薑 一錢 產科

右為末每服三錢用羌活豆淋酒下將護產婦用之

如不飲酒用清米飲調下如覺心煩熱悶以麥門冬

去心煎水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下

若覺心胸煩熱即減薑桂冷即加之眼痛如當歸心

悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人

參虛顫加茯苓以意斟酌日二夜一服

人參湯 治產後驚悸不安

人參 一兩 遠志 去心 半兩 白茯苓 去黑皮 二兩 麥門冬 去心 焙 芍藥

剉各半兩 當歸 切桂去粗皮 焙各一兩

右粗搗篩每服二錢匕生薑三片棗一枚擘破水一

盞煎至七分去滓通口服不拘時候

琥珀散 出聖惠方 治產後心氣不足驚悸不安言語不定

錯亂不眠

琥珀 研一兩 人參 半兩 白茯苓 去黑皮 一兩 遠志 去心 半兩 甘草

炙一分 熟乾地黄 焙用 半兩 鉛粉 研半兩

右先以五味搗羅為散再入研者藥研勻每服二錢匕煎金銀湯調放溫服空心日午臨卧各一

茯神湯 治產後虛驚心氣不安

茯神去木二兩 人參 白茯苓去黑皮各一兩半 芍藥剉甘草

炙當歸切桂去粗皮各一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

白茯苓丸出聖惠方 治產後心虛驚悸神不安定

白茯苓一兩 熟乾地黄一兩 琥珀 桂心 人參去蘆頭

遠志去心 菖蒲 柏子仁各半兩

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大不拘時候以粥飲下三十九

人參湯 治產後虛驚心神恍惚

人參剉一兩 麥門冬去心半兩 木通剉 芍藥各二兩 甘草炙一兩

兩 羚羊角鎊屑一分

右粗搗篩每用水三盞先煮羊肉三兩取汁一盞去

肉入藥末三錢再煎至七分去滓溫服不拘時候

琥珀地黄丸 治產後驚悸亂道言語如見鬼狀精神

不定者研好硃砂酒調下局方龍虎丹三丸作一服

兼服此藥

南番琥珀 別延胡索 糯米同炒 赤去米 當歸 各一兩 蒲黃 炒香

四生薑 洗研裂汁留滓以生薑汁於銀石器內炒

兩生薑 地黃滓以地黃汁炒生薑各至乾乾堪為

末則生地黃 各二斤研 裂汁留滓 右為末煉蜜丸如彈子大食前當歸湯化一丸服

麥門冬湯 治產後心虛驚悸恍惚不安

麥門冬 去心焙 半兩 熟乾地黄 焙一兩 白茯苓 去黑皮 甘草

炙 芍藥 剉各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗一枚

擘破煎至七分去滓溫服不拘時候

療心虛多驚及產後敗血諸疾 出永類 鈐方

辰砂 琥珀 沒藥 並細 研 當歸 各等分

右為末每服三錢空心日午臨卧白湯調服

治產後血邪安心止驚悸

用自然銅以酒磨服之

傷寒 附論

夫人觸冒寒氣而為病者謂之傷寒產婦血氣俱虛日月未滿而起早勞動為寒所傷則浙浙惡寒翕翕發熱頭顱肩背骨節皆痛至七八日乃瘥也 凡產後發熱頭痛身中不可便作感冒治之此等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且

以平和之劑與服必效如玉露散或四物湯以生地黃湯易熟地黃加北柴胡等分煎服或人參當歸散秦艽鼈甲散人參輕骨散人參百解散逍遙散皆可選用多見不學無聞纔見產後發熱不退便以為熱入血室便以小柴胡湯竟不可救者亦有用竹葉石膏湯而死者亦有見前失而投以溫劑其熱愈熾者諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰臆度徒傷人命殊不知此等病狀是產後去血過多而陰虛發熱亦有寒極生熱

但以上件之藥以瓜證選用無不獲安若是陰陽不和乍寒乍熱宜增損四物湯如敗血不散者宜奪命丹大調經散五積散加酸煎却效王子亨云婦人生產去血過多津液燥少陰陽俱虛大凡有疾如中風傷寒時氣之類雖當發熱汗如麻黃謹不可取汗毋令過多以意斟酌直指方云產婦傷寒論云或問婦人傷寒可得聞乎曰傷寒三百九十七條一百十有三方此范氏誠然之筆削也於某證則見有某藥曷嘗以男女為別哉要

之月事去來產前產後男女所無請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以血為主發熱惡寒經水適來經日熱除而胸滿讖語者是則邪氣結於胸脇當刺期門隨其實而取之傷風經曰續生寒熱發作似瘧而經水適斷者是則血結而不行當以小柴胡湯散之所謂治之而愈者此也至而傷寒發熱經水適來晝醒暮讖如見怪狀是則裏無留邪熱隨血散所謂不治自愈者此也前乎吐血下血兩條併以犀角地黃湯桃仁承氣湯芪當

湯丸之類言之詳矣抑產前產後治法將何擇焉曰產前安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何桑寄生阿膠縮砂為要藥他如桂枝半夏桃仁大黃墮胎及燥熱等輩則不可輕用也消瘀者何川芎蒲黃赤芍藥生地黃為要藥他如內補攔住敗血之劑則不可輕進也朱氏以阿膠桑寄生人參茯苓白朮等而細末糯米飲調劑為孕婦安胎以紅花一分官桂芍藥甘草半之薑棗同煎為解表消瘀以蔥白薑生大

劑濃汁為產前發散以小柴胡湯去半夏和解熱入子宮郭稽中以枳殼防風一度甘草減半末之點服主大便秘瀝又蜜奪一法真可活人然則產婦證治觀此可以問津索塗矣雖然知壯胎則不可不調氣知消瘀則不可不扶虛枳殼香附陳皮以調氣也當歸川芎黃耆人參以扶虛也退熱則柴胡黃芩解肌則紫蘓乾葛滋腸則麻仁枳殼助陽則乾薑其間採摭擇雖未備古人之理然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人之意

婦人產後亡血汗多故令鬱月其脈微月不能食人便反堅但願汗出所以然者血虛而厥厥而不冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以為產婦無汗出者亡陰血陽氣獨盛故當汗出陰陽不復所以便堅者嘔不能食也方可用小柴胡湯加生乾地黄主之

方

人參湯 治產後傷寒頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼

寒壅欬嗽鼻塞聲重

人參 赤茯苓去黑皮 當歸切炒 前胡去蘆頭 芎藭剉 羌

活去蘆頭 白朮 柴胡去苗 枳殼去穢炒 桔梗 甘草炙

獨活去蘆頭 各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片薄荷五葉煎至七分去滓溫服不拘時候

前胡散出聖惠方 治產後傷寒頭目疼痛四肢煩熱心胸

滿悶不欲食飲

前胡 三分去蘆頭 石膏 二兩 麻黃 一兩去根節 葛根 剉 人參 去蘆

黃芩 頭 芎藭 枳實 微炒 赤芍藥 甘草 炙微赤剉

半夏 湯洗七遍去滑 桂心 已上各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉五十

粒蔥白五寸煎至六分去滓稍熱頻服以微汗為效

半夏散 出聖惠方 治產後傷寒欬咽喉不利四肢煩疼

半夏 湯洗七遍去滑 人參 去蘆頭 赤芍藥 細辛 白朮

桔梗 去蘆頭 桂心 陳橘皮 湯洗去白穰焙 前胡 去蘆頭 甘草

炙微赤剉已上各半兩 麻黃 一兩去根節 杏仁 三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時候溫服

桂心散 出聖惠方 治產後傷寒頭目四肢俱疼心胸煩熱

桂心 一兩 石膏 二兩 麻黃 去根節 荆芥 赤芍藥 葛根

各三分 柴胡 一分去苗 芎藭 人參 去蘆頭 細辛 去苗各半兩 甘草 一分炙

微赤

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓溫服如人行五七里再服以得汗出為度

桂枝湯 治產後傷寒頭目昏痛體熱煩悶夫產後血氣俱弱邪氣易襲藏於膚腠之間與正氣相搏則令頭痛體疼熱發惡寒是為產後傷寒之證汗下之方比常用之宜輕不可一槩也

桂枝去粗皮 麻黃去根節煎 前胡去蘆頭 芍藥 柴胡
當歸切 甘草炙 芍藥 石膏各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候

前胡湯 治產後傷寒發熱頭疼體痛欬嗽痰壅

前胡 麻黃 柴胡 人參 桔梗 芍藥 細辛 枳殼 甘草 半夏

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一枚大切煎至七分去滓溫服不拘時候

麻黃散出聖惠方 治產後傷寒三日已前頭項腰脊俱痛

發汗不出煩躁者

麻黃 一兩去根節 桂心 三分 杏仁 半兩湯浸去皮尖 人參

三分去 白朮 三分 乾薑 半兩炮製 芎藭 三分 厚朴 三分去粗皮塗生薑

汁炙令 附子 三分炮製 甘草 半兩炙 微赤剉

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓稍熱服以衣覆取微汗如人行五七里未汗即再服

前胡散 出聖惠方 治產後傷寒欬嗽心胸不利背煩疼

前胡 三分去蘆頭 杏仁 半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃 桂心 兩半 人參 兩三

去蘆頭 麻黃 三分去根節 赤茯苓 三分 白朮 兩三 細辛 兩半 甘草

一分炙 赤芍藥 兩半 微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不拘時候

小柴胡加生地黃湯 出濟生 治產後往來寒熱而脈

弦者少陽也

柴胡 兩 黃芩 七錢 人參 五錢 半夏 一兩剉 甘草 七錢 大

棗一枚 生地黃 梔子 枳殼五錢 麩炒各

右剉細每服一兩水煎服

葛根散出聖惠方 治產後傷寒三日前頭疼惡風寒熱

葛根一兩 麻黃一兩 桂心三分 甘草三分 赤芍三分

藥三分 柴胡一兩 細辛三分 石膏一兩 厚朴一兩 塗生薑汁炙

微香 熟

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓稍熱服之如人行五七里再服以微汗為度

白朮散出聖惠方 治產後傷寒四肢拘急心腹滿悶頭痛

壯熟

白朮 芎藭 赤芍藥 附子炮製去皮臍 桂心 青

橘皮湯浸去白穰 甘草一分 厚朴一兩 塗生薑汁炙

令香 熱 石膏一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候去滓稍熱服

石膏湯 治產後傷寒時行溫疹熱惡風頭痛體痛鼻

塞咽乾心膈煩滿寒熱往來欬痰壅

石膏二分 黃芩去黑心

一兩半

前胡去蘆頭

葛根

各二兩半

升麻

桑根白皮

剉荆芥穗各一兩半

赤芍藥

柴胡

去苗各二兩半

右粗搗每服三錢匕水一盞生薑三片豉一粒同煎

至七分去滓溫服不拘時候

羚羊角飲 治產後傷寒壯熱胸膈煩悶渴燥

羚羊角屑

前胡

去蘆頭

人參

桂

去粗皮

芍藥

大

皮剉 蘆根

洗剉

甘草

炙

當歸

切焙各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚煎

至七分去滓溫服不拘時候

柴胡當歸湯 治產後喘急躁煩或戰而作寒陰陽俱

虛不可汗下此湯主之

柴胡剉三兩

白木

二人兩

人參

甘草

炒

川當歸

芍藥

五味子

木通

各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑四片棗二枚煎至

七分去滓服不拘時候日進二三服

荊芥湯 治產後傷寒頭目昏疼欬嗽痰壅肢節疼痛

荊芥穗 麻黃去根節煎 乾薑炮 五味子 石膏

甘草炙 人參 芍藥各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

麻黃湯 治產後傷寒欬嗽痰壅氣短

麻黃去根節煎 前胡去蘆頭 白朮 甘草炙 貝母去心

桑根白皮剉 杏仁去皮尖雙 當歸切炒各一兩

掠去沫焙 仁麩炒

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片蔥白三寸

煎至七分去滓溫服

細辛散出聖惠方 治產後傷寒虛煩體頭疼四肢骨節俱

疼

細辛兩半 桂心兩一 赤芍藥三分 前胡一兩去蘆頭 石膏二兩半

葛根剉三兩 黃芩兩半 甘草兩半炙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分蔥白五

寸豉五十粒煎至六分去滓不計時候溫服以微汗

為度

梔子散 出聖 惠方

治產後傷寒煩熱不解大小便澀

梔子仁 兩半 犀角屑 三分 赤芍藥 三分 黃芩 兩半 柴胡 一兩 去苗

川大黃 一兩半 微炒 甘草 半兩 炙 木通 一兩 剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分不計時候去滓溫服

人參散 出聖 惠方

治產後傷寒胸膈痰壅嘔逆四肢煩熱

人參 一兩 去蘆頭 丁香 半兩 前胡 一兩 去蘆頭 半夏 半兩 湯浸七遍去滑

桂心 兩半 甘草 半兩 炙 訶梨勒皮 三分 厚朴 一兩 去粗皮塗生薑

汁炙令香熟

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

療產後感風傷寒欬嗽多痰唾粘

甘草 桔梗 各六分 款冬花 四分 生麥門冬 生地黃

各十 蔥白 一握 豉 二分 合舊名方 無蔥白與豉

右以泔水二升煮取八合去滓食後分二服

芍藥湯 治產後傷寒肢體疼痛乾嘔頭昏煩燥潮作

赤芍藥 葛根 各一兩 麻黃 兩 甘草 石膏 人參

當歸

右粗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓不拘

時候溫服

竹葉湯 治產後傷寒煩燥迷悶熱渴頭痛

淡竹葉 半兩 人參 芍藥 黃芩 石膏 麥門

冬 去心 甘草 各一兩

右粗搗篩每服三錢七水一盞生薑三片棗二枚煎

至七分去滓溫服不拘時候

枇杷葉散 出聖惠方 治產後傷寒嘔噦不止虛煩渴燥

枇杷葉 半兩 炙 毛 麥門冬 去心 厚朴 半兩 去粗皮塗

熟 葛根 三分 陳橘皮 湯浸去白穢 人參 去蘆頭 甘草 半

炙 赤

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服不計時

麥門冬散 出聖惠方 治產後傷寒頭痛身體如火心胸煩

燥

麥門冬 一兩 去心 赤芍藥 黃芩 梔子仁 犀角屑

各三分 石膏 二兩 甘草 半兩 炙 微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分蔥白五寸豉五十粒煎至六分去滓稍熱頓服微汗出為度

羚羊角湯 出肘後方 治產後時行兼邪氣似瘧者

羚羊角 鼈甲 炙各六分 知母 甘草 炙各二兩 香豉 五合 牡

蠣 一兩

右以水五升煮取一升八合去滓分五服近用有殊效

小柴胡湯 治產後傷寒時氣發熱惡風頸項強急胸滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來大小便不利或骨肉煩熱傷寒過經不解或差勞復百節疼痛

柴胡 去苗 四兩 黃芩 去黑心 人參 甘草 炙 半夏 湯浸去滑各二

兩半

右粗搗篩每服三錢七水中盞半入生薑五片棗肉

二枚煎至八分去滓溫服不拘時候

射干散

出聖惠方

治產後傷寒經數日後胸中煩悶咽喉

噎塞不能飲食

射干

兩半

川升麻

三分

人參

三分去蘆頭

甘草

半兩炙陳橘

皮

三分湯浸去白穰焙

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不拘時候溫服

羌活散

出聖惠方

治產後傷寒心膈煩躁肩背強硬四肢

拘急煩疼

羌活

三分

石膏

一兩去根節

甘草

一分炙微赤剉

桂心

芎藭

赤茯苓

赤芍藥

葛根

白朮

黃芩

細辛

已上各半兩

右件藥搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑

半分蔥白五寸豉五十粒煎至六分去滓稍熱服微

汗出為度

桂藥散出衛生家寶方

治產後如傷寒候寒熱不調心驚頭昏體虛四肢無力飲食全不思產中所犯並宜服

沒藥一分研 官桂半兩 當歸三分生用

右為末每服一大錢炒蔥白酒下日三服

三物黃芩湯大全良方

治婦人草蓐中風傷寒四肢苦煩

熱頭痛與柴胡湯後頭不疼但煩者

方見本門前產後諸疾類千金

三物黃芩湯

陽旦湯大全良方

治婦人產後傷寒十數日不愈頭微痛

惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出

桂枝兩 芍藥各三兩 甘草炙 黃芩各二兩

右以咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分去滓溫服無時候日汗者去桂加炮熟附子一枚渴者去桂加栝蒌根三兩下痢者去芍藥加乾薑三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴為佳若脈浮緊無汗發熱者莫與也

普濟方卷三百五十三

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十四

明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

寒熱 附論

產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產傷勞臟腑血弱不

得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人
 若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗
 血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗
 血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一
 皆隨病加減 乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗
 血不散豈止入脾肺二臟邪大抵一陰一陽閉即作寒
 熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰
 則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作

大調經散五積散入醋煎佳

方

紅藍花散 出聖惠方

治產後寒熱頭痛手足疼惡露不快

心腹刺痛

紅藍花 一兩 甘菊花

當歸 剉微炒

芎藭 蓬莪朮

赤芍藥

鬼箭羽

桂心 已上一兩

牛膝 去苗 劉寄奴

赤茯苓

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

羚羊角屑

已上各三

分 生薑 分半

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候溫服

黃耆散

出聖惠方

治產後乍寒乍熱骨節疼痛四肢無力

面色痿黃

黃耆

判一兩

附子

三分判去皮臍

鬼箭羽

兩半

當歸

三分判

芎

薊

兩半

桂心

兩半

牡丹

兩半

赤芍藥

三分

鼈甲

微黃去裙欄

牛膝

三分

桃仁

雙仁

麩炒微黃

去苗

赤茯苓

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服

療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時

乾嘔困乏悶絕

人參

獨活

白鮮皮

葛根

防風

青竹茹

遠志

各六分

茯神

八分

白斂

十分

元參

十二分

竹瀝

二升半

右銀一斤水一斗五升煎取七升下諸藥重煎取三

升分三溫服忌魚酒麪等物

猪腎湯

出聖惠方

治產後體虛寒熱發渴四肢少力心神

煩悶不思飲食

猪腎

一對去脂膜切作四片

豉

半兩碎

白粳米

一合桂心

半兩去 人參

當歸

半兩

蔥白

三根切

右細剉以水二大盞煎至一盞去滓食前分為三服

赤芍藥散

出聖惠方

治產後血氣不散乍寒乍熱骨節煩

痛唇口乾焦心胸悶亂

赤芍藥

人參

去蘆頭

防風

去蘆頭

當歸

剉

生乾地黄

紅藍花

藕節

已上各一兩

芍藥

三分

羚羊角

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分黑豆五

十粒煎至六分去滓不拘時候溫服

增損四物湯

大全良方

治產後陰陽不和乍寒乍熱如有

惡露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為

異

人參

當歸

芍藥

乾薑

各一兩

甘草

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓熱服無時候一方無甘草有乾地黄一方云大抵一陰

閉一陽即作寒熱陽勝故熱陰勝故寒只可云敗血
循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解
則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

石膏散 出聖惠方 治產後寒熱頭痛

石膏 二兩 黃芩 一兩半 桂心 一兩半 生乾地黄 一兩 牡蠣 二兩

燒 赤芍藥 二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘
時候溫服

蓬莪茂散 出聖惠方 治產後惡血滯留憎寒壯熱心腹疔

痛

蓬莪茂 一兩 當歸 一兩 蒲黃 三分 桂心 三分 川大黃 一兩

碎剉 桃仁 一兩 雙仁 一兩 麩炒微黃

右為散不計時候以煖酒調下二錢

治產後乍寒乍熱通身溫壯心胸煩悶 出聖惠方

知母 生乾地黄 劉寄奴 鬼箭羽 羌活

當歸 剉微炒已 柴胡 一兩 鼈甲 一兩 塗醋炙

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

芎藭散 出聖惠方 治產後血氣不散體虛乍寒乍熱骨節

疼痛四肢少力

芎藭 芍藥 黃芩 各二兩 桂心 一兩 甘草 二兩

右以水六升煮取二升分三服比於蔣家得此方無

桂加生地黃一斤

知母散 出聖惠方 治產後壯熱憎寒四肢少力不思飲食

知母 當歸 剉炒 鬼箭羽 劉寄奴 白朮 已上各二

兩 桃仁 一兩半湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水酒各半盞煎至六分去滓不計時候溫服

療產後寒熱心悶極脹及百病 出肘後方

以羚羊角燒末用酒服方寸匕未瘥再服

橫產後寒熱心悶極脹及百病

以馬通絞取汁一盞以酒和服之瘥

瘧疾 附論

產後血氣未至和平邪氣客於風府循膂而下與衛氣大會陰陽交爭虛實更作寒熱相移其始發也起於毫毛伸欠及作寒慄頭頷腰脊俱痛去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲是寒熱瘧之證也瘧證曰并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱 有產後病瘧而作寒熱有一日一發或一日二三發或間一日一發或三兩日一發或先寒後熱先熱後寒或寒多熱少

或熱多寒少或但寒但熱者亦有產前病瘧而產後未愈者最難用藥如柴胡常山信砒等斷不可用今有經草果飲子生熟飲子用之有效如易簡方四獸飲亦可用

方

秦艽湯 治產後瘧先寒後熱頭痛發渴骨節痛

秦艽 去苗 麻黃 去根節煎 烏梅 去核 常山 甘草

炙 麥門冬 去心 青蒿子 柴胡 大黃 剉 當歸 切

鼈甲醋炙去裙襴 赤茯苓去黑皮各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至八分去滓當未發前服欲發時再服

草菓飲子出危氏方 治婦人產後瘡疾寒熱相半者或多

熱者

半夏炮 赤茯苓 甘草炙 草菓炮去皮 川芎 陳皮

白芷各二錢 青皮去白 良薑 紫蘘各一錢 乾葛四錢

右咬咀每服三錢以水一大盞薑三片棗二枚同煎

至七分去滓當發日侵早一連進三服無有不安

犀角飲 治產後寒熱瘡往來不歇

犀角屑 麥門冬去心焙 升麻洗焙 知母切 當歸切焙 甘

草炙 生乾地黃焙 鼈甲醋炙去裙襴 石膏打碎 柴胡去苗各一

兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓當

未發前服欲發時再服

木香丸 治產後一切瘡

木香 常山剉 牡蠣火燒 大黃剉 知母焙 鼈甲炒

去裙 烏梅去核 當歸切焙 各一兩 丹砂別研 麻黃去根

掠去 沫焙

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

當未時服發

芍藥飲 治產後寒熱瘧頭疼體痛煩渴

赤芍藥一兩 當歸切焙 柴胡去苗 麥門冬去心 黃

芩去黑心 白茯苓去黑皮 白朮剉 甘草炙 鼈

一兩

甲去裙 常山分

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚

煎至八分去滓溫服當未發前不拘時候

人參飲 治產後寒熱往來不已煩渴體痛

人參 甘草炙 厚朴去粗皮 薑汁 知母半 常山半

麥門冬去心 柴胡去苗 猪苓去黑皮 白茯苓去黑皮

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至半

盞去滓當未發前服

生熟飲子出危氏方

治產後瘧疾多寒者

肉苳蔻

草果仁

厚朴

生去粗皮

半夏

陳皮

甘

草

大棗

核去生薑

右各等分細剉和勻一半用濕皮紙煨令香熟去紙

與一半生者和勻每服秤五錢重水二盞煎至七分

食前一服食後一服

烏梅飲

治寒熱瘧產後發渴頭痛

烏梅肉

炒

黃連

須去

柴胡

去苗

人參

各一兩

甘草

炙三分

當

歸

歸

切焙一兩半

常山

兩半

生乾地黃

焙三分

當

右粗搗篩每服五錢七水一盞半生薑三片棗二枚

煎至八分去滓當未發前溫服

知母飲 治產後寒熱瘧發或半月間日發

知母

兩半

白茯苓

去黑皮一兩

烏梅肉

剉三分

大青

兩半

麥門

冬

去心焙一兩

柴胡

去苗一兩

甘草

炙三兩

冬

去心焙一兩

柴胡

去苗一兩

甘草

炙三兩

當歸

切焙一兩

當

歸

切焙一兩

當

歸

當

右粗搗篩每服五錢七水一盞半生薑三片棗二枚

煎至八分去滓當未發前服欲發時再服

柴胡湯 治產後諸瘡寒熱往來煩渴

柴胡去苗 黃芩去心 人參 當歸切焙 生乾地黃焙 甘

草炙 猪苓去黑皮 各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓當

未發前及空心日午臨卧服

七勝飲 治產後寒熱瘡煩渴引酒頭疼體痛

乾薑半兩炮 黃連去鬚 桃仁去皮尖 當歸切焙 常山剉 柴

胡去苗 猪苓去黑皮 各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓當未

發前空心温服欲發時再服

常山飲 治產後寒熱瘡

常山 甘草各一兩 黃芩去心 石膏碎各二兩 烏梅去核

四枚 當歸切焙 芍藥一兩半

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚

煎至八分去滓當未發前温服

小柴胡湯 治產後寒熱瘡方見本門

大黃散 治婦人天行瘧病因產後心下痞悶氣逆潮熱小便澀秘不通者

大黃 陳皮 黑牽牛 各一兩炒

右為末每服三錢清茶調下若加半兩木香名大通

散

無憂散

出衛生家寶方

治產後瘧疾

蘿蔔子 不拘多少炒

右一味為末每服二錢米飲調下只一服立愈

治產後腎勞如瘧者

婦人體熱用猪腎體冷用狗腎燒灰酒服之

大小便秘澀 附論

內經謂大腸與膀胱受五臟濁氣名曰傳化之府此不能以留輸寫者也婦人大小腸本挾熱者既產之後血氣暴竭津液內涸燥熱相搏大小腸秘澀不能傳導故大小便俱不通也

方

三腕散 治產後臟腑壅滯腸胃燥溢大小便秘兼治

脚氣

大腹皮灸紫蘓莖葉 沉香 木瓜切焙獨活去蘆頭各

白朮一兩 芎藭 木香 陳橘皮去白焙 甘草灸 檳榔兩

麩裏煨熟去麩各三分

右為粗散每服三錢七水一盞煎至六分去滓溫服

不拘時候一方有羌活

檳榔散出聖惠方 治產後大小便秘心腹脹滿氣促

檳榔一兩 車前子三分 冬瓜仁三分 川大黃一兩 木通一兩

桂心半兩 甘草半兩 當歸半兩 滑石一兩 川朴一兩 硝石一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時候

溫服

柴胡湯 治產後內熱大小便不通

柴胡去苗 黃芩去心 陳橘皮湯浸去白切焙 澤瀉 石膏推

羚羊角鎊各三分 梔子仁一兩 赤茯苓去黑皮 芒硝別研

半

右粗搗篩八味每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒硝末半錢匕更煎一服温服

榆白皮散出聖方 治產後大小便秘澀小腹疼痛

榆白皮三分剉 木通一兩剉 黄芩半兩 當歸三分剉 葵子半兩

赤芍藥半兩 滑石一兩 蒲黄半兩 川大黄一兩剉炒

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不計時温服

茯苓丸 治產後大小便不通

赤茯苓去黑皮 赤芍藥 當歸切焙 人參 枳殼去穢炒

白朮剉炒 大麻仁別研如膏 大黄剉炒

右搗羅七味為末與麻仁研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎茅根湯送下以利為度

梔子仁湯 治產後大小便不通

梔子仁 石膏碎 黄芩圓小者 澤瀉 柴胡去苗 赤芍

藥剉 姜蕤各一兩半 車前葉切半

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前

溫服以利為度

檳榔散 治產後大小便不通臍下疼痛兼腹滿急脹

檳榔剉半兩 桂皮去粗皮 芎藭 獨活去蘆頭 木香各半兩 大

黃剉郁李仁去皮尖雙 赤茯苓去黑皮

右為散每服二錢七食前溫水調下以利為度

木通飲 治產後大小便秘澀

木通剉冬葵根剉各二兩 黃芩去黑心 甘草炙 當歸焙 蒲

黃微炒陳橘皮湯浸去白焙 瞿麥穗各半兩

右粗搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫

服日再

桃仁散出聖惠方 治產後大小便秘澀心腹脹滿時時拘

作疼痛

桃仁皮一兩湯浸去尖雙仁炒 葵子一兩 川大黃剉炒 甜瓜子一兩

青橘皮一兩湯浸去白焙 檳榔 當歸剉炒 甘草半兩剉炒

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時溫

服

木通散出聖惠方 治產後大小便不通

木通 大麻黃 葵子 滑石 檳榔 枳實

甘草各半兩

右為粗末每服三錢匕水一盞半煎至七分去滓温

服

赤芍藥丸 治產後風虛壅結大小便不通

赤芍藥一兩 桂一分 去粗皮 瞿麥取穗三分 大黃剉炒半兩 檳榔

剉 當歸焙切 羌活去蘆頭各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下以利為度

木香丸 治產後因腫滿小腹急脹大小便不通

木香一兩 炮 牽牛子二兩炒別搗為末 防己 陳橘皮去白炒各

半兩 訶梨勒炮去核 羚羊角鎊 檳榔剉各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑

橘皮湯下以利為度

石韋湯 治產後大小便不通臍下妨悶兼痛

石韋去毛赤芍藥各一兩當歸二兩赤茯苓去黑皮瞿麥

取糖一兩半冬葵子二合大黃半兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

以利為度

大黃丸 治產後關格閉塞大小便不通

大黃二兩芒硝一兩黃芩去黑心赤芍藥 赤茯苓

去黑皮杏仁去皮尖雙生乾地黄焙各一兩半

右為末煉蜜搗和丸如梧桐子大每服二十九食前

煎粟米飲下以利為度

療產後大小便不利下血一名蒲黃散

車前子 黃芩 蒲黃 牡蠣 芍藥各六分生地

黃半兩

右為細末空心米飲服方寸匕忌麩蒜

芍藥湯 治產後大小便不通腹脹氣急

赤芍藥 芒硝別研杏仁去皮尖雙大黃剉大麻

仁三分當歸切炒各

右將四味麤搗篩入大麻仁同研令勻每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒硝半錢匕溫服以利為度

當歸散

出聖惠方

治產後大小便秘澀

當歸二兩

黃芩一兩

紫葛一兩

白茅根三分

川朴三分

二兩甘草半兩

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫服

牽牛子丸

治產後大小便秘澀腹脹疼痛

牽牛子一兩

大麻仁一兩

當歸一兩

川大黃一兩

木通一兩

一兩桃仁一兩 尖雙仁麩炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候粥飲下三十丸以利為度

榆白皮湯 治產後大小便不通

榆白皮四兩

桂皮去麤

當歸切

甘草炙

滑石各一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

以利為度

木香丸 治產後胸膈噎塞心下痞堅行滯氣消飲食

大小便通利

木香二兩牽牛子二十四兩

炒香別搗取末十二兩

華澄茄 補骨

脂炒檳榔

酸粟米飯裏濕紙煨熟去飯各四兩

右搗四味為末與牽牛末和勻漸滴并華水和丸如

菜豆大每服四十九茶清熱水食後任下

麻仁丸

出鮑氏方

治產後大小便秘澀者何荅曰產後水

血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也

若五六月腹中悶脹者此有燥糞在腑臟以其乾澀

未能出耳宜津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則

陽消陰長變證百出性命危矣

麻仁 枳殼 人參 大黃各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十九未

通漸加不可大過 評曰產後不得利利者百無一

生去血過多臟燥大便秘澀之故當滑之大黃似難

輕用唯蔥涎調臘茶為丸復蔥茶下之必通嘗以局
 方四物湯以生地黃湯易熟地黃加青皮去白煎至
 效或用阿膠枳殼等分為末滑石衣熱水下二十九
 半日未通再作郭以大黄治秘澁陳非之陳乃以大
 黃芒硝治血暈所見不同如此二藥皆難輕試

療產後津液燥竭大小便不通

出永類
鈴方

芍藥 大黄 枳殼 麻仁 各等分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心熱水下二十九

一方有甘草山梔仁

療產後勞傷熱大小便赤澀

雞蘓一分通草十分冬葵子三合芍藥 滑石 芒硝各八分

分生地黃十二分

右水三升煮取八合下芒硝空心分三服

桃花散 治產後大小便秘澁

桃花 葵子 滑石 檳榔

右各等分為細末每服二錢蔥白湯空心調下

芫花丸 出聖惠方 治產後大小便秘澁坐卧不安

芫花 半兩 醋炙乾 滑石 一兩 川大黃 一兩 剉炒

右為末煉蜜和丸如桐梧子大每服二十九蔥白湯

下

療產後血滲入小腸大腸 出永類鈐方

車前子汁 一升 蜜 一大合

右相和煎一沸分為二服

蔥膠湯 治產後大小便不通

蔥白 握一牛膠一片廣二寸長四寸

右剉碎以水三升和煮煎盡去滓頓服

木香煮散 治產後冷熱不調大小便不通

木香 炮為末 青黛 研各一兩

右再研令勻每服二錢匕水半盞麻油少許同煎十

餘沸和滓溫服少頓即通

濡臍湯 治產後大小便不通六七日腹中有燥屎寒

熱煩悶氣短出汗出腹脹滿

生葛根

五兩切無生者用乾葛一兩

大黃半兩剉炒

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

以利為度

又方

出便產須知

治產後大小便秘澀此是津液少不可

可服利藥宜潤其腸若通利之則必至腸滑不禁不

可治

以麻仁粥每用半盞搗仁取水煮粥服之

治產後大小便不通并服瀉藥腹脹氣喘方

用青鹽半斤炒令變色先以漿水一斗半煎沸下鹽

末在湯中攪和傾盆中看冷熱通手即入盆中坐浸

腰腹須臾便通湯或漸冷即入新熱湯投之常令稍

熱人困即扶起少頃又浸

又方

出聖惠方

用羊蹄根一兩水一大盞煎至六分去滓為二服食

前服之

又方

出聖惠方

用桃花三兩為末每服二錢新汲水調下

枳殼丸

出衛生寶鑑

治產後大小便澀滯

枳殼

一兩 麩炒

大黃

一兩

木香

三錢

麻仁

炒黃

一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前

溫水送下如飲食不化亦得服之

麥蘖散

出大全良方

療產後五七日不大便切不可妄服

藥先宜用之

大麥芽 不拘多少

右炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服

大便不通 附論

大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗胃中枯燥潤養不足糟粕壅滯故大便難而或不通凡新產之人有此病由去血多內亡津液故也 產後水血俱下至腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通若過五六日腹中悶脹者有此燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜腹麻仁丸津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽消

陰長變證百出性命危矣

方

調胃散 治產後大便秘澀不通

大黃剉炒 當歸切焙 麥門冬焙去心 桃仁去皮尖雙 菖蒲

剉 鼈甲醋炙去 生乾地黄焙 柴胡去苗各 秦艽去

土 黃連去鬚各 桂去皮粗 厚朴去粗皮三分 吳茱

萸湯浸去涎焙 乾炒半兩

右為散每服二錢七溫水調下空心食前服

三脫湯一名三脫散 治產後大小便不通方見本門大便

治產後大小便不利出余居士選奇方

大黃 芍藥 麻黃各六分 枳殼五分 甘草三分 山梔三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服米飲吞下三十

丸

十聖丸 治產後大便不通秘澀臍腹堅痛

檳榔剉 木香 芎藭 羌活去蘆頭 桂去粗皮 大黃

剉 郁李仁去皮尖別 當歸切焙 人參 熟乾地黄各

兩焙

右除郁李仁外搥羅為末入郁李仁和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時以利為度

又方 治產後熟燥大便秘澁

升麻 枳殼去穰 麩炒 黃芩去黑心 各三分 大黃剉 梔子仁

杏仁去皮尖 雙 麩炒 當歸 人參 甘草炙 生乾地黄

焙各一兩

右粗搥篩每服二錢七水一盞煎至七分去滓食前

服

大腹皮湯 治產後熟毒氣結燥大便不通壅滯氣悶

疼痛腰重脇脹

大腹皮五枝 剉 細 枳殼去穰 麩炒 赤芍藥剉 別 一兩 秦艽去黑皮 羌

活去蘆頭 各半兩 天門冬去心 焙 三分 甘草焙 一兩 生乾地黄焙 一兩

郁李仁去皮 炒 半兩

右麤搥篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服

得利為度

大黃丸 治產後大便秘澀不通

大黃剉當歸切赤芍藥 厚朴去麤皮生薑汁枳

殼去穰大蘇仁別研生乾地黄焙各三分

右搗羅六味為末與麻仁膏同研令勻煉蜜和丸如

梧桐子大每服十九米飲下不拘時候

訶梨勒丸 治產後大便秘澀不通

訶梨勒煨去核大黃剉當歸切熟乾地黄焙人參

大麻仁別研如膏

右搗五味羅為末與大麻仁同研令勻煉蜜和丸如

梧桐子大每服三十九米飲下不拘時候

厚朴丸 治產後大腸虛結秘澀不通

厚朴去麤皮生薑汁炙透人參 陳橘皮去白大黃剉郁李

仁去皮別研如膏各一兩當歸切焙一兩半

右搗羅五味為末入郁李仁膏同研令勻煉蜜和丸

如梧桐子大每腹三十九溫酒下不拘時

升麻湯 治產後大便秘澀

升麻 大黃剉各當歸切焙生地黃焙前胡去

頭二山梔子仁微炒

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食

前溫服

人參丸 治產後大便不通

人參 檳榔剉各一當歸切焙厚朴去麤皮生薑

郁李仁去雙仁皮尖

右搗羅四味為末入郁李仁膏同研令勻煉蜜和丸

如梧桐子大每服二十九溫水下加至三十九不拘

時

產後大便不通皂莢內藥方

猪牙皂莢生杏仁湯退皮尖雙仁蛇蛻皮微炒乾薑炮各

兩半

右先搗四味細羅為末於銚子內熬蜜三兩沸後下

藥末不住手攪候可丸即丸如棗核大每服一九用

綿裹了藥以麻油潤藥上內下部中仰卧便通未通

再內

大黃丸 治產後風熱大便秘澀

大黃剉炒大麻仁研如膏當歸切焙各三分生乾地黄焙四兩切

右搗羅三味為末與麻仁膏研同勻煉蜜和丸如梧
桐子大每服十九丸米飲下以利為度

郁李仁飲 治產後腸胃燥熱大便秘澀

郁李仁 朴硝 當歸 生乾地黄

右將二味麤搗篩與別研者二味和勻每服三錢匕

水一盞煎至七分去滓溫服未通更服

治產後大便不通大腸結燥腹中壅脹內藥方

皂莢不蛀者一挺去皮子酥炙搗為末鹽豉半合研細白蜜合一

右先熬蜜令消次下鹽豉皂莢末慢火煎不住手攪
候如餠堅丸如棗核大內一九入下部中未通可內

三五丸不效藥在內自化如得通利即隨出

中和散 治大便不通不問老幼可皆服

附子一兩一半生大黃一兩一半生

右同碾為散每服二錢七温米飲調下臨卧服

治產後大腸熱燥糟粕綆藥勢不入大便不通宜以皂

莢導方

以皂莢肥不蛀者去皮子一挺為末煉蜜和丸如棗

大取一丸內下部中須臾即通

治產後下部閉塞大便秘結不通以烏梅導方

用烏藥十四枚温湯浸取肉搗丸如小檳榔大每服

用一枚內下部中立通

温中丸 專治產後大便不通七八日以上者

以硫黃用柳木細研飛過生用用水浸炊飯和丸如

梧桐子大每服二十九或三十九用木香少許煎湯

吞下即效

麻蘓粥

出永類
鈴方

治婦人產後有三種疾鬱冒則多汗

則大便秘澁故難於用藥唯此粥能治之

紫蘓子 大麻子仁

右等分淨洗研令極細用水再研取汁一盞分二次

煮粥啜之此粥不唯產後大抵老人諸虛風秘皆得
 用嘗有一貴人母年八十四忽爾腹滿頭痛惡心不
 下食占醫者數人議皆作補脾進食治風清利頭目
 數日病愈甚全不入食其家憂懇予辯之者予曰前
 藥皆誤此疾正是老人風秘臟腑壅滯聚於膈中則
 腹脹惡心不喜食又上於巔則頭痛神不清也若得
 臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩粥而氣泄先
 下結尿如班班者十餘後漸得通利不用藥而自愈

蔥涎丸

治產後大便秘澁由產後水血俱下腸虛津
 液不足所致若過五六日腹中俱脹有燥糞宜潤其
 腸若以為熱投以寒劑則陽消陰長性命危矣

麻仁 枳殼各等分

右為末蔥涎調臘茶為丸每服五七十九空心食前
 蔥茶下之必通

阿膠枳殼丸

出三方

治產後虛羸水血俱下腸胃虛竭

津液不足大便秘澁

阿膠 枳殼

右各等分煉蜜丸如梧桐子大別研滑石為衣溫水下二十九半日以來未通再服

蜜兌丸 療產後熱結大腸不通

以白蜜五合慢火煎令如硬錫以投冷水中良久取出捻如母指大長二寸內穀道中即通

調導飲 出直指方 治婦人產前產後大便不通

當歸 川芎 防風 枳殼 製各四錢 甘草 炙三錢

右細剉每服三錢水一盞薑棗煎食前服

小便不通 附論

產後氣血俱虛弱津液虛少將溫過度熱入膀胱氣脈內燥壅塞不通始則淋瀝甚則不通令人小腹繞臍脹痛氣滿於內亦令胞轉治法使氣得通則愈

方

髮灰湯 治產後小便不通

亂髮燒灰 車前子 大黃 剉炒 桂皮 去麤皮 當歸 切焙 滑石 各

兩冬瓜子合五木通剉一兩半

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

日三夜一

榆白皮散 治產後小便秘澀小腹疼痛

榆白皮剉木通剉黃芩去黑心葵子炒各半兩芎藭芍

藥炒滑石研搗蒲黃各三分

右搗研為散每服二錢匕濃煎木通湯調下

葵根湯 治產後小便不通

葵根二兩洗剉亂髮灰半兩大黃 桂去皮滑石 木通

當歸剉炒各一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服食

前日再服

澤瀉散 治產後小便不通

澤瀉剉二兩井泉石半兩研車前子洗焙乾赤茯苓去黑皮剉

當歸切焙各一兩半葶藶子紙上炒甘遂生各半兩

右為散每服一錢匕蜜湯溫調下食前日再服

木通湯 治產後小便不通

木通細對黃芩去黑心石韋去毛各一兩榆白皮細研二兩甘草

炙三兩白朮炒用二兩冬葵子對一兩半

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

食前日二服

滑石湯 治產後小便不通煩悶

滑石 當歸切焙木通對各一兩冬葵子炒黃芩去黑心麥

門冬去心焙各三分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

空心食前

當歸湯 治產後小便秘澁小腹疼痛

當歸切焙一兩白芷對微炒紫葛 芎藭各半兩白茅根

胡萎各三分

右細剉每服五錢匕水一盞半入蔥白五寸同煎至

八分去滓溫服食後夜卧

黃芩湯 治產後小便不通

黃芩去心 瞿麥取穗 當歸切焙 冬葵子炒 木通剉各一兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓温服日

三

車前子湯 治產後小便不通

車前子焙洗 瞿麥取穗 當歸切焙各一兩 黃芩去心洗 鬱金剉

兩半

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服

不拘時日二

葵子湯 治產後小便不通

葵子炒 石膏研生 滑石各一兩 阿膠炒令燥半兩 貝齒四枚

右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服

日三

治產後小便不利

用鼠婦七枚一味熬為膏作一服酒調下鼠婦俗名温生蟲

治產後小便不通出余居士選奇方

蒲黃 芍藥 黃芩 牡蠣 車前子各四分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十九空心服

療卒不得小便

用杏仁十四箇去皮尖炒為末和飲頓服立通

療脬轉小便不通八九日

滑石分十三寒水石分八

右水二升煮取八合空心分三服

蔥餅子

出余居士選奇方

治產後婦人小便不通腹脹如鼓

悶亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂至產時尿胞運動不順

用鹽於產婦臍中填與臍平却用蔥白剝去麤皮十餘根作一縛切作一指厚片安在鹽上用大艾炷滿蔥餅子大小以火炙之覺熱氣直入腹中即時便通神驗不可具述

療產後小便不通

用陳皮一兩去白為末空心溫酒調二錢一服便通

救

治產內小便不利心腹脹滿

出朱氏集驗方

蔥白五燈心

麥門冬

各少許

荆芥

穗薑五片

右咬咀水一盞半煎一盞不拘時非時發熱變成風氣攻手足抽動用金銀耳環并薑棗煎溫服傷寒鼻塞用蔥白五寸煎服

治產後小便不通

出聖惠方

右用蔥搗爛蜜調以紙花貼臍下

淋瀝

附論

產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便瀝痛故謂之淋 治諸產前產後淋秘其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最為產後要藥唯當尋其所因則不失機要

方

茅根湯

出三因方

治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主

之

白茅根兩八 瞿麥穗 白茯苓各四兩 葵子 人參各二

兩 蒲黃 桃膠 滑石 甘草各一兩 紫貝十箇 石

首魚頭中石二十箇 燒

右為散每服四錢水一盞半薑三片燈心二十根煎至七分去滓溫服亦可為末木通湯調下二錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調服

當歸散出聖惠方 治產後卒淋瀝小腹疼痛

當歸半兩 生乾地黄三分 石韋半兩 梔子仁半兩 赤芍

藥半兩 赤茯苓三分 王不留行半兩 瞿麥三分 麥門冬三分

木香三分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三四服

石韋湯出千金方 治產後卒淋氣淋血淋石淋

石韋 黃芩 通草 甘草各二兩 榆皮五兩 大棗十三

葵子二升 白朮產寶用芍藥 生薑各三兩

右呔咀以水八升煮取一升半分三服集驗無甘草
生薑崔氏同產寶不用薑棗

葵根湯出千金方 治產後淋瀝

葵根二兩 車前子一斤 亂髮燒灰 大黃 桂心 滑石各

兩 通草三兩 生薑六兩 冬瓜穰七合一

右呔咀以水七升煮取二升半分三服十金翼不用
冬瓜練一方云既有大黃亦可治大便不通故錄如
此更宜斟量虛實而投之

茅根湯出千金方 治產後淋瀝

白茅根一斤 瞿麥 茯苓各四兩 地脈 人參各二兩 生

薑三兩 桃膠 甘草各一兩 鯉魚齒一百枚

右呔咀以水十升煮取二升半分三服

黃芩散出聖惠方 治產後小腸結熱淋瀝心神煩燥口舌

乾焦不思飲食

黃芩兩半 瞿麥 甘草炙 麥門冬去心各半兩 滑石 木

通 車前子 葵子各一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

葵子散出聖惠方 治產後小腸風氣隔閉淋澀不通

葵子兩一 滑石三分 黃芩 瞿麥各三分 燈心一分 石白英

粉兩一 防葵兩半 甘草一分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

四服

療產後患淋小便不通此氣虛挾熱產前當安胎產後

當思逐血出永類

鈴方

通草兩三 大棗三十枚 葵子一升 白朮一兩 榆白皮五兩 石韋

黃芩各二兩

右以水八升煎取二升半空心溫服呷千金有甘草

生薑

療產後小便痛及血淋出聖惠方

白茅根兩五 瞿麥 車前子各二兩 冬葵子二合 鯉魚齒

十箇 通草三兩 為末

右水二升取煮一升入齒末空心服

葵根散

出聖惠方

治產後小便淋瀝臍下妨悶

冬葵根一兩車前子三分滑石一兩冬瓜仁三分木通一兩

川大黃三分桂心一分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

四服

療產後卒患淋小便滲痛及至尿血

冬葵子一升通草三兩石韋去毛三兩滑石末別處四兩茯苓

黃芩各二兩

右水九升煮取三升入滑石末空心服忌熱麪醋物

蠅蛸散

出便產須知

治產後房勞舉重能令發作清水續

續小便淋露不止

海蠅蛸 枯礬 五倍子各等分

右件為末研桃仁拌勻傅之

鯉魚齒湯

出便產須知

治產後淋痛及血淋

鯉魚齒一百二十箇葵子三合黃芩五錢瞿麥二錢車前子

木通各二錢

右水二升煎取一升入齒末空心日三服

滑石散出聖惠方

治產後小便淋澀心神煩悶

滑石一兩木通一兩車前子一兩葵子三分黃芩 麥門冬

去心各三分

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服日

三四服

療產後小便澀痛或血淋者

瞿麥 黃芩 冬葵子各二兩通草三兩大棗十一枚

右以水七升煮取二升半分作兩服

大麻仁散出聖惠方

治產後小便淋澀疼痛

大麻仁一兩榆白皮一兩葵子一兩瞿麥半兩甘草一分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

滑石散 治產後淋

滑石五兩通草 車前子 葵子各四兩

右粗搗篩酢漿水服方寸匕稍加至二匕

療產後血淋

車前子

瞿麥

各四兩

黃芩

三兩

鬱金末

一兩

右以水六升煮取二升下鬱金末分三服

瞿麥湯 治產後淋痛因虛損有熱氣客於胞中血隨

小便出為血淋淋者如雨之淋者也內虛則起數內

熱則小便澀痛乃曰淋

瞿麥

黃芩

通草

各半兩

大棗

十二枚

右以水一盞半藥四味每四錢煎至大半盞去滓服

治產後小便淋不通七八日

滑石

六錢

葵子

三錢

寒水石

四錢

右為散每服三錢水一盞煎至大半盞空心服

治產後小便淋澀不通

葵子

一合

朴硝

八分

右水二升煮取八合下硝分四服

又方熨法

用蛇牀子炒乘熱布裹之熨患處亦治陰痛

治產後小便淋澀腹脇脹滿時復疼痛

用鼠婦半兩炒為末每服半錢温酒調下

產後小便血 附論

夫產後損於血氣虛而挾於熱血氣得熱則流散滲於
腠故血隨小便出也

方

石韋散 治產後臟有積熱致小便出血

石韋 去毛 榆白皮 剉 黃芩 木通 赤芍藥

三兩 二兩 二兩 二兩 二兩

二兩 冬葵子 二兩 甘草 二兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分去滓食前温服

一方無甘草

茜根散 治產後小便出血

茜根 木通 黃芩 生乾地黃 滑

石 二兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

又方

瞿麥 黃芩 冬葵子 木通 茜根 當歸 各

欽定四庫全書

普濟方

四三

右為末每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

又方

貝齒五枚燒灰 葵子一兩 車前子一兩 滑石二兩 生乾地黄一兩

茜根一兩

右為末每服二錢食前溫水調下

又方

車前子二兩 瞿麥二兩 黃芩 鬱金 蒲黃各一兩

右為末每服二錢茅根湯食前調下

又方 治產後小便出血

亂頭髮洗淨燒 滑石各半兩

右為末令勻每服一錢生地黄汁調下一方無滑石

米飲調服

又方

生地黄 生刺薊各半斤

右搗絞汁每服一小盞食前飲下

又方

生乾地黄 阿膠搗炒各一兩

右為末每服二錢食前茜根湯調下

小便頻數不禁 附論

夫產後小便頻數不禁者此由脬內宿有冷氣因產後發動冷氣入腹虛弱不能制其小便故也

方

雞臍脰方 治產後小便頻

雞臍脰二三具 雞腸三具 乾地黄 當歸 甘草各二

兩麻黃四兩 厚朴 人參各三兩 生薑五兩 大棗二十枚

右以咀水一斗煮臍脰及腸大棗取七升去滓內諸

藥煎取三升半分三服

鹿茸散出聖惠方 治產後臍虛小便數多

鹿茸一兩去毛 黃耆剉一兩半 牡蠣燒為末一兩半 人參去蘆一兩

頭 熟乾地黄二兩 當歸剉炒一兩 五味子一兩 甘草炙剉半兩 雞

臍脰炙一兩半

右為末每服二錢食前粥飲調下

栝蒌湯出千金方 治產後小便數兼渴

栝蒌根 麥門冬 甘草 黃蓮各二兩 人參 生

薑各三兩 大棗十五枚 桑螵蛸二十枚

右呔咀以水七升煮取二升半分三服一方無麥門

冬忌猪肉冷水

桑螵蛸散出聖惠方 治產後小便數此胞有宿冷冷氣又

入腹中虛弱不能制其小便故數有遺尿者冷在胞

囊漏不禁也

桑螵蛸三十箇燒 鹿茸炙酥 黃耆各三兩 牡蠣煨 人參 厚

朴 赤石脂各二兩

右為末空心粥飲調下二錢外臺方無厚朴石脂有

甘草生薑不禁加龍骨

龍骨散出聖惠方 治產後小便數多

龍骨一兩 牡蠣一兩燒 桂心半兩 菝葜剉一兩 烏藥一兩

螵蛸炒半兩 熟乾地黄切半兩

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六分食前溫服

又方出聖惠方

雞肫脰十具熟乾地黄半兩當歸半兩牡蠣為粉

厚朴三分去麤皮黃耆兩

右為末每服二錢食前溫酒調下

又方出聖惠方

黃耆兩鹿茸一兩去尾桑螵蛸微剉牡蠣燒為

粉雞肫脰一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

麥門冬散出聖惠方治產後小便數兼煩渴

麥門冬三分龍骨三分當歸微炒黃耆三分甘草

一分

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至五

分去滓食前溫服

又方出聖惠方

桑螵蛸半兩 龍骨

右為細末每服二錢空心食前粥飲調下

療產後遺尿不知出出便產須知

白薇 芍藥

右等分為細末以酒服方寸匕日服三

療產後小便不通出聖惠方

用雞尾燒作灰細研温酒調方寸匕日三

固腠散出楊氏家藏方 治婦人臨產時傷手胞破小便不禁

用黃絲絹自然黃者不用染成三尺以灰汁煮極化

爛用清水洗去灰令淨入黃蠟半兩蜜一兩白茅根

二錢馬屁勃末二錢以水一升再煎至一盞空心頓

服服時歛氣服之不得作聲如作聲無效

治產後遺尿

用故雞窠中草燒作末酒服二錢匕瘥

治產後小便不禁出肘後方

用雞屎燒灰空心酒服方寸匕

治產後小便不禁

用雞子燒灰酒服日三

治產後小便不記度數小腸虛損方

出護命方

當歸

五味子

石斛

牛膝

牡蠣

火煨各半兩

草

薤

白芷

各三分

益智子

去皮一分

龍骨

一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下四

十九病減即住只作散子喫不喫滓

補脬飲

出危氏方

始婦人產後傷胞動破終日不能小便

但漏濕不乾

黃絲絹

生者一尺煎碎

白牡丹皮末

千葉者他無效

白芨末

錢一

右用水一碗煎至絹爛如錫空心頓服服時不得作

聲作聲不效

普濟方卷三百五十四

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官中書臣孫球

謄錄監生臣王晉