



頭痛方

小柴胡湯

見瘟

治少陽頭痛

麻黃附子湯

治少陰頭痛

吳茱萸湯

吳茱萸 生姜 五錢

人參 二分

加大棗水煎

補中益氣湯

見內傷

治氣虛內傷頭痛

本方倍黃芪加川芎藁本

四物湯

見中風

治血虛頭痛

卷五

頭痛

三

利集

本方倍歸芎加白芷細辛

調中益氣湯

見內傷

治氣血兩虛頭痛

本方加川芎蔓荊子細辛

白朮半夏天麻湯

見眩暈

治痰結頭痛

清空膏

治偏正頭痛兼治風濕熱頭痛上壅頭目

及腦痛不止者除血虛頭痛不治

川芎

五錢

柴胡


七錢

真連

防風

羌活

一兩



炙甘草 兩半 片苓 二兩半 生代炒

右末入杯內茶調如膏白酒臨卧送下

選奇湯 治眉稜骨痛

羌活 二錢 甘草 一錢 夏片苓 一錢 五分 冬炒用

水煎食後服

茶調散 治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重

薄荷 四兩 荆芥 川芎 二兩 羌活 白芷

炙甘草 一兩 細辛 五錢 防風 二錢 五分

谷五頭痛

壹

利集

右末食後茶清調下二錢五分

安神湯 治頭旋眼黑

生甘草 炙甘草 二錢 防風 二錢 五分 柴胡 升麻

生地 酒浸 知母 酒浸 五錢 酒枳 羌活 一兩 黃芪 二兩

其用水煎熟加入蔓荆子五分川芎三分再煎

臨卧時熱服

徹清膏

蔓荆子 藜木 一錢 細辛 一分 薄荷 川芎 三分

生甘草

炙甘草

五分

石為末茶清調下二錢

茶煎散

川芎

一錢

薄荷

白芷

細辛

羌活

荆芥

藁本

辛夷

防風

五分

甘草

三分

加細茶一撮同煎服

胃脘痛俗呼爲心痛。古方名爲脾疼。蓋胃之上口名賁門。賁門與心相連。故經所謂胃脘當心而痛是也。其症由積痰食積鬱於中。七情九氣觸於內。以致清陽不升。濁陰不降。而肝木之邪得以乘機侵侮而爲病也。然其病不一。有真心痛者。客寒觸犯心君。或汚血冲心。手足青黑。過節腕者。且發夕死。其餘有痰有火。有死血。有客寒犯胃。有虛痛。有實痛。有食積痛。有蟲痛。治火用牛黃丸。定痛神効。煎藥用芩連梔子末藥。或用白蕤藜作散服。治痰用玄明粉水調服。或用搽面粉生炒各半。俱量人虛實用。一二錢湯用。二陳加枳實片芩山梔木香少許。死血在胃脘宜。桃仁承氣加玄胡紅花歸尾。先用韭汁頻飲之。治。客寒犯胃用草豆蔻丸。劫止如神。或蘓合香丸。涉藥。用姜砂仁木香。虛痛以物拄按痛處則痛止者是也。宜理中湯。二陳湯。加和血藥。久病元氣虛弱肢體。

怯薄脉弱手欲拔者六君子加砂仁香附 實痛因

氣怒飲食卒痛便閉心胸高起手不可按是也二陳

加行氣消食藥 蠱痛者必面上有白斑唇紅能食

時作時止二陳加苦練根煎服 丹溪曰治心痛當

分新久若明知身受寒氣口食寒物於初病之時當

用溫散溫利之劑若稍久而成鬱鬱則成熟若用溫

劑寧不助痛添病乎故古方多用山梔為君熱藥為

之向導則邪易伏病易退此病雖日久不食不死若

卷五 胃脘

美

利集

痛纔止即恣口腹痛必再作此確論也

火脉浮散 痰脉滑實 死血脉濇 寒脉沉遲

虛脉軟弱細小 實脉敦實而滑 痛甚脉伏 蠱

脉沉弱而弦面上有白斑唇紅能食時作時止或吐

涎沫

要畧曰陽微陰弦則胸痺而痛責其虛也

今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其脉陰弦故

也胸痺之病喘急咳唾胸痺痛短氣寸口脉沉而

遲閉上小緊而數。心脉微急爲痛微大爲心痺引
背痛。脉短而數者心痛。潛者心痛。脉浮大弦
長者死。



胃脘心痛方

用効煎方 治火痛痰痛

山梔 一錢 陳皮 赤茯苓 貝母 青皮 香附

玄胡 川芎 厚朴 五分 草薢仁 二分

有死血加丹皮桃仁 有猛痰加胆星半夏

牛黃丸 治火定痛

牽牛 大黃 一兩

二味爲末水丸黍米大強人一錢弱入七分稍

行自愈

卷五 胃脘

美

利集

白蒺藜散 治火痛

白蒺藜一兩桃柳條同炒研末酒調下一錢

又方 治痰痛

玄明粉一錢白湯下

桃仁承氣湯

見蘊

治死血在胃脘作痛

本方加桃仁紅花歸尾先用蕪汁頻呷之

草豆蔻丸

治客寒犯胃作痛

薤仁 一两 橘紅 人參 蠶垂 黃芪 益智 一錢

甘草 生炙 歸身 青皮 六錢 澤瀉 小便利 半夏 一兩

桃仁 七粒 麥芽 兩半 神麩 柴胡 脇不痛 姜黃 四錢

吳萸 一錢

右除桃仁另研餘共為末蒸餅九梧子大白湯

下一二服不可多用

二陳湯 見中風 治飲食兼怒卒痛便閉心胸高

起手不可按 本方加行氣消食藥

卷五 胃脘 完 利集

又方 治蟲痛 二陳加苦練根煎服

失笑散 治心氣痛并治小腸氣痛

蒲黃 五靈脂

等分先以醋二杯煎成膏再入水一鍾煎食前

熱服心膈大痛攻走腰背發厥嘔逆諸藥不効

者就吐中以鵝翎撲之去痰碗許而痛即止

黃丸子 治心痛極驗并治裏急後重作痢亦効

木香 候榔 茯苓 五錢 三棱 莪朮 甘草 四錢

陳皮 黃連 黃芩 六錢 黃柏 一 枳殼 三錢

青皮 大黃 牽牛 一兩 白芫 七錢 香附 八錢

右末水丸菜豆大量人虛實多寡用之

泰山奪命還魂丹 治心氣虛痛極驗

黃芩 黃連 枳殼 石膏 當歸 熟地

木香 生地 薄荷 菊花 半夏製黃柏

兔絲 酒炒 桂皮 桔梗 甘草 陳皮 蔓荊 一兩

白茯苓 柴胡 小茴 炒 殭蚕 炒 人參 白芍 炒

卷五

胃院

罕

利集

知母 杜仲 二兩 羌活 防風 二兩 蛤蚧 一對

白朮 藁本 川芎 麻黃 天麻 獨活 兩半

全蝎 骨皮 細辛 一兩

為末蜜丸彈子大金箔為衣每服一丸因病用

湯下

中風癱瘓酒化下

經水不調紅花酒下

一身筋痛熱醋下

反胃噎食木香酒下

心氣 惡醋下

咳嗽吐痰冬花酒下

頭風痛茶清下

喘逆氣急桑皮湯下

風更牙痛花椒湯下

嘔吐生姜湯下

驚癩吐沫温酒下

跌打桃仁湯下

赤白痢烏梅湯下

血淋黃胆車前湯下

卷五

胃脘

早

利集

浮腫壯脹陳皮湯下

耳鳴氣閉茱萸湯下

胎前產後香附酒下

小腸疝氣茴香酒下

腰背疼牛膝湯下

遺精白濁茯苓湯下

日昏暗菊花湯下

瘧疾桃枝湯下

腸風下血槐花湯下

雙鵝喉閉薄荷湯下

痞塊積聚木香湯下

大小便閉大黃湯下

盜汗不眠浮麥湯下

筋骨痛威靈仙湯下

脫肛痔漏片苓湯下

胸膈脹滿紫蘘湯下

泄瀉燈草湯下

傷風發熱葱白湯下

血崩藕節湯下

無名腫毒金銀花湯下

丹溪曰腹痛有寒有火熱有死血有食積有濕痰有
虛有實。夫寒痛者常痛而無增減是也。陳無已曰
陰寒為邪則腹痛而兼吐利治宜理中加吳萸玄胡
甚者入桂附。火熱痛者時痛時止原病式曰熱鬱
於內則腹滿堅結而痛不可例言為寒也。脈洪者黃
芩芍藥湯便秘脈大者宜下調胃承氣湯脩急九
死血痛者痛有常處而不移陳無已曰邪氣聚於下

卷五 腹痛

聖

利集

焦津液不通氣血不行或溺或血留滯於下是生脹
滿小便利者宜川芎白芍歸尾桃仁紅花跌打瘀血
宜桃仁承氣若小便不利者則為溺澀之症非畜血
也。食積痛者痛甚便欲大便便後則痛減脈弦宜
溫散之保和丸加行氣利氣藥以食得寒則滯得熱
則行也。或用吐法。濕痰痛者凡痛二便不利脈滑
以痰因氣滯而聚阻碍道路氣不得宣通故痛治宜
導痰開鬱二陳湯。實痛者腹脹滿手不可按元氣

者宜推蕩之大承氣湯。虛痛者以手按之則痛止。戴人云其人本體孱弱或大病後氣血兩虛不可拘於諸痛不可用參芩之語。急投溫補重劑。四君子理中加順氣藥。汗多倍加參芩炒白芍。治腹痛必用溫散藥。以其鬱結不行。阻塞不運故也。凡人臍下忽大痛人中黑色者多死不治。

凡在胃脘下痛者多屬食積。連臍痛者屬火。臍左右少腹痛者多屬死血。少腹痛者屬寒。當以部位辨之。

卷五 腹痛

三

利集

白芍藥惟治血虛腹痛。餘不治。今考古方治腹痛用白芍四錢。生甘草二錢。甚效。又考白芍不惟治血虛而能大行氣。腹痛者榮氣不從逆於肉裏。今得白芍行其榮氣。而又以甘草之甘緩和其逆氣。此不治之治。乃所以深治之也。大抵痛隨利減。故有連臍大痛勢急欲死。百藥不効。後用大承氣連下二次。方止。硝黃或各用至五錢。以上方効。然此法亦不得已而用。未可視爲常例也。亦有寒痛者。多在少腹。宜吳萸湯。

甚者椒附及炒塩葱熨之

脉經曰脉細小緊急病速進在中腹中刺痛 陰弦

則腹痛 脉急小腹痛 尺脉緊臍下痛 尺脉伏

小腹痛癥疝 尺脉實小腹痛當利之 心腹痛不

得息脉細小遲者生脉大而疾者死 腹痛脉反浮

大而長者死

腹痛方

用効治腹痛方

白芍二錢五分 甘草一錢 青皮 陳皮 砂仁 玄胡

山梔七分 烏藥五分

脇痛加柴胡五分 熱加黃芩五分

理中湯 見霍亂 治虛寒腹痛

本方加吳萸玄胡甚者加桂附

黃芩芍藥湯 治火痛脉洪

卷五 腹痛

壘

利集

調胃承氣湯 見見瘟 治火痛脉大便秘

脩急丸 見內傷 治全上

桃仁承氣湯 見瘟 治死血痛

保和丸 見內傷 治食積痛

本方加行氣利氣藥

二陳湯 見中風 治濕痰痛

本方加導痰開鬱藥

大承氣 見瘟 治實痛腹脹滿手不

六君子湯

見中風

治虛痛以手按之則痛止

四逆湯

見濕

治少腹痛

承氣湯

見溫

治遠臍痛

卷五 腹癰

異

何



丹溪曰腰痛有腎虛有瘀血有寒濕有濕熱有痰積有挫閃痛而不已者屬腎虛痛有定處日輕夜重大便黑小便黃赤者屬死血往來走痛者屬痰積腰冷身重如帶五千錢或遇陰寒即作晴煖即解者屬寒濕痛而或作或止者屬濕熱治法腎虛者脉大宜補之煨腎丸知栢杜仲枸杞山萸菟絲子瘀血者脉濇宜逐之四物加桃仁紅花蘇木乳

卷五 腰痛

畢

利集

香沒藥 濕熱者脉緩宜分利之滲濕湯蒼朮湯加

杜仲黃栢川芎 痰積者脉伏滑宜開導之二陳湯

加蒼朮南星竹瀝杜仲 挫閃者宜行之用如神湯

寒濕痛即腎着痛治宜滲濕兼用温散腎着湯

經曰動搖不能腎將憊矣故腰痛雖有五症其原皆

本於腎虛蓋腰者腎之府人身之大關節諸經皆貫

於腎而絡於腰故腎經一虛而腰痛諸病作矣正經

所謂邪之所湊氣必虛是也諸腰痛不宜用補氣藥

亦不可峻用寒涼藥

腰痛之脉皆沉。弦沉弦緊者爲寒。沉弦而浮者爲風。沉弦而濡細者爲濕。沉弦而實者爲挫閃。

丹溪曰。脉必沉而弦。沉爲滯。弦爲虛。濇者是瘀。血緩者是濕。滑者伏。者是痰。大者是腎虛也。

腰痛方

煨腎丸 治腎虛痛不止

杜仲三錢炒去絲為末用猪腰一具薄切六七片入藥在內濕紙包裹漫火煨熟空心常酒二三鍾

送下

補腎丸

見勞

治腎虛腰痛

四物湯

見中風

治瘀血痛

木方加桃仁紅花蘊木乳香沒藥

卷五 腰痛

晃

利集

溲濕湯

治寒濕所傷身體重着如坐水中

蒼朮

白朮

茯苓

甘草

乾姜

橘紅

丁香

加姜棗煎服

蒼朮湯

治濕腰腿疼痛

防風

蒼朮

黃柏

柴胡

二陳湯

見中風

治痰積痛脉伏澀

本方加蒼朮南星杜仲竹瀝

如神湯 治挫閃腰痛

川芎 肉桂 玄胡 丹皮 桃仁

腎着湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便利

乾姜

地 茯苓 一錢 甘草 炙 白朮 炒 一錢

立安散 治腰痛不止緩弱冷痺行步無力空心服

蒼朮 防風 知母 澤瀉 黃芩 生地

猪苓 當歸 五分 甘草 炙 茵陳 羌活 八分

卷五 腰痛

利集

不利者去生地

摩腰丹 治年老虛人腰痛

附子尖 烏頭尖 南星 二錢 雄黃 一錢 獐腦

丁香 乾姜 吳萸 一錢 五 分 硃砂 麝香 三分

右末蜜丸如龍眼大每用一丸姜汁化開如粥

厚火上煨熟置掌中摩腰上俟藥盡粘腰上再

烘熟帛包縛定隨即覺熱如火日易一次

獨活寄生湯 治腎虛氣弱為風濕所乘流注腰膝

寧牽掣痛不得屈伸或經弱冷痺行步無力

獨活 桑寄生 細辛 牛膝 秦艽 茯苓

白芍 桂心 防風 人參 熟地 川歸

杜仲 甘草 各五分

如無桑寄生以續斷代下利者去地黃水煎

心服

當歸拈痛湯 治濕熱為病腰痛上牽肩背肢節皆

痛胸膈不利

卷五 腰痛

五

利集

白朮 四分 人參 升麻 苦參 酒炒 乾葛

蒼朮 五分 防風 知母 酒炒 澤瀉 黃芩 酒炒

豬苓 當歸 六分 炙甘草 一錢 茵陳 羌活 八分

一方加生黃芩五分

青娥丸 治腎虛腰痛

破故紙 酒浸片 川茸 童便浸 黃芩 搗水 炒 知母 酒

杜仲 姜盞汁 牛膝 再各 核桃肉 去皮

共蜜為丸

胸脇者肝膽二經往來之道路也。故木氣受傷。痛在胸中。肝氣實盛。痛在兩脇。然脇痛之病。有數証焉。歲木太過。肝氣旺盛。兩脇充滿。莫能舒泄。壅脹爲痛。勢急難支。此肝火之盛爲之也。稀涎宿痰。留注兩脇。或僻一脇。綿綿隱痛。或作或止。一有嘔惡。則吊動掣痛。久則形腫。色赤。堅硬不移。若以腫毒治之。增劇此痰氣之結爲之也。心生血。肝納血。肝有熱。則妄

卷五 脇痛

聖

利集

行注於脇。則脇痛。或紫黑。或結塊。上部抵當湯。中部桃仁承氣湯。皆稱捷効。此汚血之積爲之也。又歲金肅烈。制木太過。致肝氣鬱而不伸。兩脇痛而不止。此須抑金扶木。瀉白散。合阿膠。四物湯。瀉有餘而補不足。使兩氣和平。則痛自止。此肝氣被鬱爲之也。又有傷寒往來寒熱。胸脇痛耳聾。此雖屬少陽。然膽者肝之府。痛甚。則肝氣亦受。似傷。惟小柴胡少加牡蠣。胆草。則二經皆平矣。此傷寒之虛熱爲之也。又

有飲食填塞太陰肝氣被壓然肝者將軍之官其性
猛烈不受壓制上冲之則胃脘痛橫行之則兩脇痛
惟消食順氣少熱溫散則食下而肝氣自舒脇痛自
止有醫言脇下一條杠起作痛者食積也夫飲食入
胃安得出脇而爲杠起必食積偏墜一邊而近脇作
痛故醫云然孰信哉信於理而已矣 又有挫閃跌
撲一症或氣鬱或血積亦作脇痛若以涼藥治之則
痛益甚須用行血行氣之劑而兼溫藥以散之輒効

卷五 脇痛

五

利集

又有陽虛陰虛二症皆屬之不足非可以有餘者
例治也有陰虛火動咳嗽吊動兩脇而痛者有肝氣
橫行兩脇而大痛者此相火爲之用蘆薈丸二痛皆
止但勞症本病莫之能療其肝氣虛並元氣弱而
痛者若以肝氣實盛治之立禍惟四物少加炒鹽以
補肝四君子少加柴苓以補氣則虛回而痛自止矣
凡此皆身經親歷而驗之非敢泛論以悞人也
脉雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

脇痛方

當歸龍薈丸

瀉肝火太盛之要藥因內有濕熱兩

脇痛甚伐肝木之氣實者

當歸 龍胆草 山梔 黃連 大黃 蘆薈

青黛 五錢 木香 二錢 五分 麝香 五分 另研

右末神麩糊為丸梧子大每服二十九丸姜湯下

一方加青皮一兩柴胡五錢

加減小柴胡合龍胆瀉肝湯 治肝火盛脇痛

卷五 脇痛

五

利集

柴胡 白芍 一錢 半夏 黃芩 人參 青皮

歸稍 車前 五分 胆草 三分 枝子 四分 甘草 三分

姜一片煎服仍下龍薈丸一二次

又用効方 治肝木太盛脇痛不止

白芍 一錢 二分 青皮 柴胡 牡蠣 陳皮 七分

胆草 四分 荀子 通草 五分 黃連 厚朴 三分

甘草 二分

伐肝並血潤燥湯 治火盛脇痛血衰溺赤便秘

白芍 歸稍 桃仁 一錢 青皮 柴胡 八分

郁李仁 生地 七分 山梔 胆草 川連

通草 五分

祛痰散腫降火開鬱方 治痰注脇下形高色赤

半夏 白芥子 松節 一錢 陳皮 黃芩

歸身 七分 海粉 六分 胆星 香附 赤茯苓

川連 羌活 五分 薄荷 四分

加童便竹瀝冲服

卷五 脇痛

五

利集

抵當湯 治肝血脇痛

桃仁承氣湯 見瘟 治全上

瀉白散合阿膠四物湯 見火 治肝氣被鬱脇痛

小柴胡湯 見瘟 治傷寒寒熱外來耳聾胸脇痛

本方加牡蠣胆草

保和丸 見內傷 治食積脇痛

四物湯加炒鹽補肝 治元氣虛弱脇痛

四君子湯加柴胡茯苓以補氣 治全上

推氣散 治右脇痛甚脹滿不食

姜黃 枳殼 桂心 五錢 甘草 二錢

右末姜湯下煎服亦可

枳芎散 治左脇痛

枳實 川芎 五錢 炙甘草 一錢 五分

右末姜湯下二錢

驗方

柴胡 半夏 片芎 甘草 白芍 青皮

卷五 脇痛

五 利集

茯苓 陳皮 左痛加胆草 右痛加藟子

姜三片煎服

經曰背者胸之府背曲肩垂府將壞矣是知背乃太陽膀胱經所主夾背四脉直下其位高其氣清凡病犯背者咸稱重病若發背若對口瘡若肩背大痛輕者可救重者難治除外科所屬者姑置勿論而背痛之症亦有五焉按經云諸陽受氣於胸中而轉行於背若三陽之火盛而潛行於背則背大痛難忍始發者卽以當歸拈痛合蘇子降氣加減用之則升清降濁而火可散濕亦流矣如痛積日久氣血日衰邪着不出恒見其危者衆矣人有寒氣積於胸中而爲心痛徹背背痛徹心仲景用烏頭赤石脂丸以溫散之所謂溫中散表皆不遠熱是也又有痰涎流滯在背或隱隱酸痛或一點揪痛或上下左右更換而痛蓋氣滯則痰亦滯氣行則痰亦行故濕痰宜燥結痰宜潤皆以順氣爲先氣順痰行痛自息矣人有腎氣不循故道逆而上行臟病必傷於腑背重而痛如有所

卷五

背痛

五七

利集

負而然必用滋腎丸或四物加知母黃柏杜仲牛膝
以壯水之主水足則又循故道而病痊矣又有病後
虛損元氣不充以入之又有汗多亡陽汗過多則心
液損耗陽不足故致痛也二者皆當溫補不可用疎
利之藥愈疎則愈痛此理至微不可不慎

背痛方

治背痛神驗方

羌活 秦艽

赤茯苓

片苓

陳皮

半夏

八分

防風 烏藥

薑子

五分

加姜三片煎服

常歸拈痛湯合蘧子降氣湯

治肩背痛濕熱甚

人參 白朮

苦參

秦艽

四分

知母

黃芩

羌活 當歸

薑子

五分

葛根

蘧子

茵陳

卷五 背痛

蒼朮

三分

升麻

二分

水煎服看症再加減

火盛背痛方

如其人素弱必兼滋補

人參 茯苓

當歸

川芎

羌活

秦艽

片苓 知母

薑子

蘇子

加姜棗煎服

烏頭赤石脂丸

治心痛徹背背痛徹心

蜀椒

烏頭

附子

乾姜

赤石脂

右末蜜丸梧子大食先服二三丸

痰涎流滯在背作痛方

半夏 赤茯一錢 羌活 海粉八分 陳皮 前胡

片苓 花粉七分 草薺 香附 藟子五分

生甘草三分

加姜棗煎服

治腎氣熱盛不循故道逆上太陽作背痛方

知母 滑石錢 杜仲八分 熟地 白芍 當歸

卷五

背痛

李

利集

黃栢 牛膝七分 石斛 甘草稍五分 桂一分

蘓子三分

加淡竹葉十

養榮益元湯

氣虛損及汗多十陽背痛

人參 白朮 芪 當歸 棗仁 麥冬八分

茯神七分 川 麻黃根五分 升麻五分 五味十

加龍眼肉

蒼生司命卷之五終

