

周氏
致酉
二字
鼓書



巢氏諸病源候總論卷七

傷寒病諸候上 凡三十三論

傷寒候

經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬物深藏君子固密則不傷於寒夫觸冒之者乃爲傷耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也卽病者爲傷寒不卽病者其寒毒藏於肌骨中至春變爲溫病夏變爲暑病暑病者熱重於溫也是以辛苦之人春夏必有溫病者皆由其冬時觸冒之所致非時行之氣也其時行者是春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應

涼而反熱冬時應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無少長多相似者此則時行之氣也夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣交爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表洗浴發汗卽愈病三日以上氣浮在上部胸心填塞故頭痛胸中滿悶當吐之則愈病五日以上氣深結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死皆以六七日間其愈皆以十日以上何也巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故爲諸陽主氣故人之傷於寒也則爲病熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死兩感於寒者

其脈應與其病形何如兩傷於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不食譖言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入則不知人六日而死夫五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也陽明者十二經脈之長也其氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死其不兩傷於寒者一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脈夾鼻絡於目故身熱而鼻乾不得臥也三日少陽受之少陽主骨其脈循脣絡於耳故胸脣痛耳聾三陽經絡皆受病而未入通於藏也故可汗而已四日太陰受之太陰脈布於胃絡

於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡肺
繫舌本故口熱舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰
器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆病
榮衛不行五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日巨
陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽
病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十
一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而次十二日厥陰病
衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣治之奈何治之
各通其藏脈病日衰其病未滿三日者可汗而已其病
三日過者可泄之而已太陽病頭痛至七日已上並自
當愈其經竟故也若欲作再經者當針補陽明使經不

傳則愈矣相病之法視色聽聲觀病之所候脈要訣豈不微乎脈洪大者有熱此傷寒病也夫傷寒脈洪浮秋佳春成病寸口脈緊者傷寒頭痛脈來洪大傷寒病少陰病惡寒拳而利手足四逆者不治其人吐利躁逆者死利止而眩時時自冒者死四逆惡寒而拳其脈不至其人不煩而躁者死病六日其息高者死傷寒熱盛脈浮大者生沈小者死頭痛脈短濶者死浮滑者生未得汗脈盛大者生細小者死診人攘攘大熱其脈細小者死不治傷寒熱病脈盛躁不得汗者此陽之極十死不治未得汗脈躁疾得汗生不得汗難瘥頭痛脈反濶此爲逆不治脈浮而大易治細微爲難治發汗若吐下者

若亡血無津液者而陰陽自和必愈夫下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便必自愈陽已虛尺中弱者不可發其汗也咽乾者不可發其汗也傷寒病脈弦細頭痛而發熱此爲屬少陽少陽不可發汗發汗則誠語爲屬胃胃和則愈不和則煩而悸少陰病脈細沈而微病在裏不可發其汗少陰病脈微亦不可發汗無陽故也陽已虛尺中弱澀者復不可下太陽病發熱而惡寒熱多而寒少脈微弱則無陽不可發其汗脈浮可發其汗發熱自汗出而不惡寒關上脈細數不可吐若諸四逆病厥者不可吐虛家亦然寒多熱少可吐者此謂痰多也治瘧亦如之頭項不強痛其脈微胸中幅牢

衝喉咽不得息可吐之治傷寒欲下之切其脈牢牢實之脈或不能悉解宜摸視手掌濺濺汗濕者便可下矣若掌不汗病雖宜下且當消息溫暖身體都皆津液通掌亦自汗下之卽了矣太陰之爲病腹滿吐食不可下下之益甚時腹自痛下之胸下結牢脈浮可發其汗陽明病心下牢滿不可下下之遂利殺人不可不審不可脫爾禍福正在於此太陽與少陽合病心下牢頭項強眩不可下三陽并病腹滿身重大小便調其脈浮牢而數渴欲飲水此不可下其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云端坐生腰徐以鼻內氣以右手持鼻

閉目吐氣治傷寒頭痛洗洗皆當以汗出爲度

又云舉左手頓左足仰掌鼻內氣四十息止除身熱背

痛

傷寒發汗不解候

傷寒初一日至二日病在皮膚名爲在表表者陽也法宜發汗今發汗而不解者此是陽不受病陽受病者其人身體疼痛發熱而惡寒勅嗇拘急脈洪大有此證候則爲病在表發汗則愈若但煩熱不惡寒身不疼痛此爲表不受病故雖強發其汗而不能解也

傷寒取吐候

傷寒大法四日病在胸鬲當吐之愈有得病二三日便

心胸煩悶此爲毒氣已入有痰實者便宜取吐

中風傷寒候

中風傷寒之狀陽浮熱自發陰弱汗自出嗰嗰惡寒淅
浙惡風喻喻發熱鼻鳴乾嘔此其候也太陽病中風以
火刲發其汗邪風被火熱血氣流溢失常兩陽相熏灼
其身發黃陽盛卽欲劙虛則小便難陰陽俱虛竭身體
則枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不
大便久則誠言甚者至噦手足躁擾尋衣摸牀小便利
者其人可治陽明中風口苦而咽乾腹滿微熱惡寒脈
浮若緊下之則腹滿小便難陽病能食爲中風不能食
此爲中寒少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩不可

吐之吐之則悸而驚太陰中風四支煩疼其脈陽微陰澀而長爲欲愈少陰中風其脈陽微陰浮爲欲愈厥陰中風其脈微浮爲欲愈不浮爲未愈

傷寒一日候

傷寒一日太陽受病太陽者膀胱之經也爲三陽之首故先受病其脈絡於腰脊主於頭項故得病一日而頭項背膊腰脊痛也

傷寒二日候

傷寒二日陽明受病陽明胃之經也主於肌肉其脈絡鼻入目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸陽在表表始受病在皮膚之間可摩膏火灸發汗而愈

傷寒三日候

傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脈循於脇上
於頸耳故得病二日胸脇熱而耳聾也三陽經絡始相
傳病未入於藏故皆可汗而解

傷寒四日候

傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也爲三陰之首是
故三日已前陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其脈
絡於脾主於唉嗌故得病四日腹滿而嗌乾也其病在
胸鬲故可吐而愈

傷寒五日候

傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脈貫腎絡肺

繫於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在腹故可下而愈

傷寒六日候

傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脈循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胃故可下而愈

傷寒七日候

傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病竟故也今七日已後病反甚者欲爲再經病也再經病者是陰陽諸經絡重受病故也

傷寒八日候

傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣未盡所以病證猶在也

傷寒九日已上候

傷寒九日已上病不除者或初一經受病卽不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不罷者或三陽三陰傳病已竟又重感於寒名爲兩感傷寒則府藏俱病故日數多而病候改變

傷寒咽喉痛候

傷寒病過經而不愈脈反沈遲手足厥逆者此爲下部脈不至陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏故咽喉不利或痛而生瘡

傷寒斑瘡候

傷寒病證在表或未發汗或經發汗未解或吐下後而熱不除此毒氣盛故也毒既未散而表已虛熱毒乘虛出於皮膚所以發斑瘡隱軫如錦文重者喉口身體皆成瘡也

傷寒口瘡候

夫傷寒冬時發其汗必吐利口中爛生瘡以其表裏俱虛熱熱不已毒氣熏上焦故也

傷寒豆瘡候

傷寒熱毒氣盛多發炮瘡其瘡色白或赤發於皮膚頭作瘰癧戴白膿者其毒則輕有紫黑色作根隱隱在肌

內裏其毒則重甚者五內七竅皆有瘡其瘡形如登豆故以名焉

傷寒登豆瘡後減癥候

傷寒病發瘡者皆是熱毒所爲其病折則瘡愈而毒氣尙未全散故瘡痂雖落其癥猶麤或凹凸肉起所以宜用消毒滅癥之藥以傅之

傷寒謬語候

傷寒四五日脈沈而喘滿者沈爲在裏而發汗其津液越出大便爲難表虛裏實久久則謬語發汗後重發其汗亡陽誠語其脈反和者不死陽明病下血而謬語者此爲熱入血室但頭汗出當刺期門穴隨其實者而瀉

之濺然汗出者則愈病若讞言妄語身當有熱脈當得洪大而反手足四厥脈反沈細而微者死病也讞言妄語身熱脈洪大者生沈細微手足四逆者死

傷寒煩候

此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少陰病惡寒而拳時自煩欲去其衣被者可治也病脈已解而反發煩者病新瘥又強與穀脾胃氣尙弱不能消穀故令微煩損穀卽愈少陰病脈微細而沈但欲臥汗出不煩欲自吐五六日自利後煩躁不得臥寐者死發汗後下之脈平而小煩此新虛不勝穀氣故也

傷寒虛煩候

傷寒發汗吐下已後府藏俱虛而熱氣不散故虛煩也

傷寒煩悶候

傷寒毒氣攻胃故煩悶或服藥已後表不解心下有水氣其人微嘔熱滿而煩悶也

傷寒渴候

傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲

傷寒嘔候

傷寒陽明病熱入胃與穀氣并故令嘔或已經吐下虛熱在藏必飲水水入則胃家虛冷亦嘔也傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濁然是爲轉在陽明傷寒嘔多

雖有陽明證不可攻也少陰病下利脈微澀者卽嘔汗者心數更衣反少當溫其上灸其厥陰渴欲飲水者與之愈

傷寒乾嘔候

此謂熱氣在於脾胃也或發汗解後胃中不和尙有蓄熱熱氣上熏則心下否結故乾嘔

傷寒吐逆候

傷寒少陰病其人飲食入則吐或心中溫溫欲吐不能當遂吐之若始得之手足寒脈弦遲此中有寒飲不可吐也當溫之病人脈數數爲有熱當消穀引食反吐者師發其汗陽微鬲氣虛脈則爲數數爲客陽不能消穀

胃中虛冷故也

傷寒嘔候

傷寒大吐下之後極虛復虛極其水鬱以發其汗者因得嘔所以然者背寒中冷故也傷寒嘔而滿者視其前後知何部不利利之卽愈陽明病能食下之不解其人不能食攻其熱必嘔所以嘔者胃中虛冷故也又病人本虛伏熱在胃則胸滿胸滿則氣逆氣逆不可攻其熱攻其熱必嘔

傷寒喘候

傷寒太陽病下之微喘者外未解故也夫發汗後飲水者必喘以水停心下腎氣乘心故喘也以水灌之亦令

喘也

傷寒厥候

厥者逆也逆者謂手足逆冷也此由陽氣暴衰陰氣獨盛陰勝於陽故陽脈爲之逆不通於手足所以逆冷也傷寒一日至四五日厥者必發熱前發熱者後必厥厥深熱亦深厥微熱亦微厥下之發其汗者口傷爛赤傷寒先厥發熱下利必自止而反汗出必咽喉中強痛甚爲喉痺發熱無汗而利必自止不止便膿血便膿血者其喉不痺傷寒先厥者不可下之發熱而利者必止見厥復利傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥之者自愈厥不過熱五日故知愈也發熱而厥七日而

下利者爲難治其脈從手足厥逆者可灸之下利手足厥無脈灸之不溫反微喘者死下利厥煩躁不能臥者死病六七日其脈數手足厥煩躁陰厥不還者死發熱下利至厥不止者死下利後其脈絕手足厥卒時脈還手足溫者爲生不還者死

傷寒悸候

悸者動也謂心下悸動也此由傷寒病發汗已後因以下之內有虛熱則渴渴則飲水水氣乘心必振寒而心下悸也太陽病小便不利者爲多飲水心下必悸小便少者必苦裏急夫脈浮數法當汗出而愈而下之身體重心悸不可發汗當自汗出而解所以然者尺中微裏

虛表實津液自和便自汗出愈也

傷寒痓候

痓之爲狀身熱足寒項頸強惡寒時頭熱面目熱搖頭
卒口噤背直身體反張是也此由肺移熱於腎傳而爲
痓痓有剛柔太陽病發熱無汗而反惡寒爲剛痓發熱
汗出而惡寒爲柔痓診其脈沈細此爲痓也

傷寒心否候

太陽少陰并病脈數緊而下之緊反入裏則作否否者
心下滿也病發於陰者不可下下之則心下否按之自
喫但氣否耳不可復下也若熱毒乘心心下否滿面赤
目黃狂言恍惚者此爲有實宜速吐下之

傷寒結胸候

結胸者謂熱毒結聚於心胸也此由病發於陽而早下之熱氣乘虛而否結不散也按之痛其脈寸口浮關上反自沈是也脈大不可下下之卽死脈浮而大下之爲逆而陽脈浮關上細沈緊而飲食如故時小便利者名爲藏結藏結病舌上白胎滑爲難治不往來寒熱其人反靜舌上不胎者不可攻之

周氏校刊
皖南建德

巢氏諸病源候總論卷八

傷寒病諸候下 凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脈洪大實數腹內脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤此爲府藏有結熱故也

傷寒五藏熱候

傷寒病其人先苦身熱嗌乾而渴飲水卽心下滿酒漸身熱不得汗惡風時欬逆者此肺熱也若其人先苦身熱嗌乾而小腹繞臍痛腹下滿狂言默默惡風欲嘔者此肝熱也若其人先苦手掌心熱煩心欲嘔身熱心下

滿口乾不能多飲目黃汗不出欲得寒水時妄笑者此心熱也若其人先苦身熱四支不舉足脛寒腹滿欲嘔而泄惡聞食臭者此脾熱也若其人先苦嗌乾內熱連足脛腹滿大便難小便赤黃腰脊痛者此腎熱也

傷寒變成黃候

陽明病無汗小便不利心中懊惱必發黃若被火額上微汗出而但小便不利亦發黃其人狀變黃如橘色或如桃枝色腹微滿此由寒濕氣不散瘀熱在於脾胃故也

傷寒心腹脹滿痛候

此由其人先患冷癖因發熱病服冷藥及飲冷水結在

心下此爲藏虛動於舊癖故也或吐下已後病不解內外有熱故心腹脹滿痛此爲有實也

傷寒宿食不消候

此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃內有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消

傷寒大便不通候

傷寒陽脈微而汗出少爲自和汗出多爲太過陽明脈實因發其汗汗出多者亦爲太過太過者陽氣絕於裏陽氣絕於裏則津液竭熱結在內故大便牢而不通也

傷寒小便不通候

傷寒發汗後而汗出不止津液少胃內極乾小腸有伏熱故小便不通

傷寒熱毒利候

此由表實裏虛熱氣乘虛而入攻於脾胃則下黃赤汁此熱毒所爲也

傷寒膿血利候

此由熱毒傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁壯熱而腸痛此濕毒氣盛故也

傷寒利候

傷寒病若表實裏虛熱乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁若濕毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦如爛肉汁

若寒毒入胃則腹滿身熱下清下清者不可攻其表汗
出必脹滿表裏俱虛故也傷寒六七日不利更發熱而
利者其人汗出不止者死但有陰無陽故也下利有微
熱其人渴脈弱者今自愈脈沈弱弦者下重其脈大者
爲未止脈微數者爲欲自止雖發熱不死少陰病八九
日而身手足盡熱熱在膀胱必便血下利脈浮數尺中
自滑其人必清膿血若利止惡寒而拳手足溫者可治
也陽明病下利其脈浮大此皆爲虛弱強下之故傷寒
下利日十餘行其脈反實死

傷寒病後胃氣不和利候

此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥以自瀉下病折已

後熱勢既退冷氣乃動故使心下幅牢噫噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也

傷寒上氣候

此由寒毒氣傷於太陰經也太陰者肺也肺主氣肺虛爲邪熱所客客則脹脹則上氣也

傷寒欬嗽候

此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽

傷寒衄血候

傷寒病血衄者此由五藏熱結所爲也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻血出也肺主於

氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必劙劙家不可攻其表汗出額上迫急而緊直視而不能眴不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脈浮緊發熱其身無汗自劙者愈

傷寒吐血候

此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五藏內有瘀積故吐血

傷寒陰陽毒候

夫欲辨陰陽毒病者始得病時可看手足指冷者是陰不冷者是陽若冷至一二三寸者病微若至肘膝爲病極過此難治陰陽毒病無常也或初得病便有毒或服

湯藥經五六日以上或十餘日後不瘥變成毒者其候身重背強喉咽痛糜粥不下毒氣攻心心腹煩痛短氣四支厥逆嘔吐體如被打發斑此皆其候重過三日則難治陽毒者面目赤或便膿血陰毒者面目青而體冷若發赤斑十生一死若發黑斑十死一生陽毒爲病面目斑斑如錦紋喉咽痛清便膿血七日不治五日可治九日死十一日亦死

壞傷寒候

此謂得病十二日已上六經俱受病訖或已發汗吐下而病證不解邪熱留於府藏致令病候多變故曰壞傷寒本太陽病不解轉入少陽脇下牢滿乾嘔不能食往

來寒熱尙未吐下其脈沈緊與小柴胡湯若已吐下發汗飲柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之寸口脈洪而大數而滑洪大榮氣長滑數胃氣實榮長陽卽盛鬱怫不得出胃實卽牢大便難卽乾燥三焦閉塞津液不通醫已發陽氣盛不用復重下之胃燥畜大便遂儻小便不利榮衛相搏煩心發熱兩目如火鼻乾面正赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病

傷寒百合候

百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也其狀意欲食復不能食常默默欲得臥復不得臥欲出行復不能行飲食或

有美時或有不用飲時如強健人而臥不能行如有寒復如無寒如有熱復如無熱苦小便赤黃百合之病諸藥不能治得藥卽劇吐利如有神靈者身形如和其人脈微數每尿輒頭痛其病六十日不愈若尿頭不痛浙浙然者四十日愈若尿快然但眩者二十日愈體證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月微見其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便聊三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十三日當愈各隨其證以治之耳

傷寒狐惑候

夫狐惑二病者是喉陰之爲病也初得狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲眠目攀不得臥起不安蟲食於喉咽爲惑食於陰肛爲狐惡飲食不欲聞食臭其人面目翕赤翕黑翕白食於上部其聲嗄食於下部其咽乾此皆由濕毒氣所爲也

傷寒濕慝候

凡得傷寒時氣熱病腹內有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食食人五藏及下部癧病之候齒無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四支沈重忽忽喜眠如此皆爲蟲食其肛肛爛見五藏卽死當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者則心內懊憹痛此蟲在上食其五藏下

脣內生瘡者其人不寤此蟲食下部皆能殺人

傷寒下部痛候

此由大腸偏虛毒氣衝於肛門故下部卒痛甚者痛如鳥啄

傷寒病後熱不除候

此謂病已間五藏尙虛客邪未散真氣不復故日暮猶有餘熱如瘧狀此非真實但客熱也

傷寒病後渴候

此謂經發汗吐下已後府藏空虛津液竭絕腎家有餘熱故渴

傷寒病後不得眠候

夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡
陰氣盛則目瞑矣今熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛
陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也

傷寒病後虛羸候

其人血氣先虛復爲虛邪所中發汗吐下之後經絡損
傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尙少五藏猶虛穀神未復
無津液以榮養故虛羸而生病焉

傷寒病後不能食候

此由陽明太陰受病被下之後其熱已除而脾胃爲之
虛冷穀氣未復故不能食也

傷寒病後虛汗候

夫諸陽在表陽氣虛則自汗心主於汗心藏偏虛故其液妄出也

傷寒內有瘀血候

夫人先瘀結在內因傷寒病若熱搏於久瘀則發熱如狂若有寒則小腹滿小便反利此爲血瘀宜下之其脈沈結者血證諦也

傷寒毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛重者生瘡翳白膜息肉

傷寒毒攻足候

此由熱毒氣從內而出循經絡攻於足也人五藏六府

井榮俞皆出於手足指故毒從臟腑而出

傷寒毒流腫候

人陰陽俱虛濕毒氣與風熱相搏則榮衛澀榮衛澀則血氣不散血氣不散則邪熱致壅隨其經絡所生而流腫也

傷寒病後脚氣候

此謂風毒濕氣滯於腎經腎主腰脚今腎既濕故脚弱而腫其人小腸有餘熱卽小便不利則氣上脚弱而氣上故爲脚氣也

傷寒病後霍亂候

霍亂吐下利止後更發熱傷寒其脈微澀本是霍亂今

是傷寒却四五日至陰經上轉入陰當利本素嘔下利者不治若其人卽欲大便但反失氣而不利是爲更屬陽明心強二十二日愈所以然者經竟故也下後當強能食者愈今反不能食到後經中頗能食復一經能食過之一日當愈若不愈者不屬陽明也惡寒脈微而後利利止必亡血

傷寒病後瘧候

病後邪氣未散陰陽尙虛因爲勞事致二氣交爭陰勝則發寒陽勝則發熱故寒熱往來有時休作而成瘧也

傷寒病後渴利候

此謂大渴飲水而小便多也其人先患勞損大病之後

腎氣虛則熱熱乘之則腎燥腎燥則渴渴則引水腎虛則不能制水故飲水數升小便亦數升名曰渴利也

傷寒肺痿候

大發汗後因復下之則亡津液而小便反利者此爲上虛不能制於下也虛邪中於肺肺痿之病也欲嗽而不能唾濁涎沫此爲肺萎之病也

傷寒失聲候

邪客於肺肺主聲而通於氣今外邪與真氣相搏真氣虛而邪氣勝故聲爲之不通也

傷寒夢泄精候

邪熱乘於腎則陰氣虛陰氣虛則夢交通腎藏精今腎

虛不能制於精故因夢而泄

傷寒勞復候

傷寒病新瘥津液未復血氣尙虛若勞動早更復成病故勞復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脈緊者宜下之

傷寒病後食復候

傷寒病新瘥及大病之後脾胃尙虛穀氣未復若食猪肉腸血肥魚及久膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅糲黍飴餌餅炙鱠棗栗諸菓脯物及牢强難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虛冷大利難禁不可下之必死下之亦危皆難救也

大病之後多坐此死不慎護也夫病之新瘥後但得食糜粥羹少食乃飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹慎不可食猪狗等肉

傷寒病後令不復候

傷寒病後多因勞動不節飲食過度更發於病名之爲復復者謂復病如初也此由經絡尙虛血氣未實更致於病耳令預服藥及爲方法以防之故云令不復也

傷寒陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人傷寒病新瘥未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新瘥未平

復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著如人之換易也其得病之狀身體熱衝胸頭重不能舉眼內生眯四支拘急小腹疼痛手足拳皆卽死其亦有不卽死者病苦小腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱氣血虛骨髓空竭便悒悒吸吸氣力轉少著牀不能搖動起居仰人或引歲月方死

傷寒交接勞復候

夫傷寒病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死也有得此病愈後六十日其人已能行射獵因而房室卽吐涎而死病雖云瘥若未平復不可交接必

小腹急痛手足拘挾二時之間亡范汪方云故督郵顧子獻得病已瘥未健詣華萼視脈萼曰雖瘥尙虛未平復陽氣不足勿爲勞事也餘勞尙可女勞卽死臨死當吐舌數寸獻婦聞其瘥從百餘里來省之住數宿止交接之間三日死婦人傷寒雖瘥未滿百日氣血骨髓未牢實而合陰陽快者當時乃未卽覺惡經日則令百節解離經絡緩弱氣血虛骨髓空竭便悒悒吸吸氣力不足著牀不能動搖起居仰人食如故是其證也丈夫亦然其新瘥虛熱未除而快意交接者皆卽死若瘥後與童男交接者多不發復復者亦不必死

傷寒令不相染易候

傷寒之病但人有自觸冒寒毒之氣生病者此則不染着他人若因歲時不和溫涼失節人感其乖戾之氣而發病者此則多相染易故須預服藥及爲方法以防之

周氏校刊
晚南建德

巢氏諸病源候總論卷九

時氣病諸候 凡四十三論

時氣候

時行病者是春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣也從春分後其中無暴大寒不冰雪而人有壯熱爲病者此則屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之過也若三月四月有暴寒其時陽氣尙弱爲寒所折病熱猶小輕也五

月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳然得時病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日法針服行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗卽愈不解止勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若病固藜蘆丸不吐者服赤豆瓜蒂散吐已解視病者尙未了了者復一法針之當解不愈者六日熱已入胃乃與雞子湯下之愈百無不如意但當諦視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七日下之時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日在胃六胃乃可下也熱在胃

外而下之熱乘虛便入胃然病要當復下之不得下胃
中餘熱置此爲病二死一生此輩不愈胃虛熱入胃爛
微者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生病人有
強弱相倍也若得病無熱但狂言煩躁不安精神語言
與人不相主當者勿以火迫但以猪苓散一方寸匕已
上飲之以一升若升半水可至一二升益佳當以新汲井
水強令飲之以指刺喉中吐之隨手愈不時吐者此病
皆多不瘥勿以餘藥治也不相主當必危若此病不時
以猪苓散吐解之者其殆速死亦可先以法針之尤佳
以病者過日不以時得下之熱不得泄亦胃爛矣其湯
熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉又引鬢髮卽流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩面從上下二七止去肝氣令面有光又摩手令熱令熱從體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

時氣一日候

時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰脊痛

時氣二日候

時氣病二日陽明受病陽明主於肌肉其脈絡鼻入目故病二日肉熱鼻乾不得眠夫諸陽在表始受病故可

摩膏火灸發汗而愈

時氣三日候

時氣病三日少陽受病少陽脈循於脇上於頸耳故得病三日胸脇熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故可汗而愈

時氣四日候

時氣病四日太陰受病太陰爲三陰之首三日已後諸陽受病訖卽傳之於陰太陰之脈主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胸鬲故可吐而愈也

時氣五日候

時氣病五日少陰受病少陰脈貫腎絡肺繫於舌故得

病五日口熱舌乾而引飲其病在腹故可下而愈

時氣六日候

時氣病六日厥陰受病厥陰脈循陰器絡於肝故得病六日煩滿而陰縮此爲三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

時氣七日候

時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲爲再經病也再經病者謂經絡重受病也

時氣八九日已上候

時氣病八九日已上不解者或是諸經絡重受於病或

已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未卽相傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之

時氣取吐候

夫得病四日毒在胸鬲故宜取吐有得病二三日便心胸煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也

時氣煩候

夫時氣病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則謬語時繞臍痛腹爲之滿皆當察其證候也

時氣狂言候

夫病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽爭而外並於陽四支者諸陽之本也邪盛則四支實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親戚大熱遍身狂言而妄見妄聞之

時氣嘔候

胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲水多胃虛冷亦爲嘔也

時氣乾嘔候

熱氣在於脾胃或發汗解後或大下之後胃內不和尚

有蓄熱熱氣上熏故心煩而嘔也

時氣噦候

伏熱在胃令人胸滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃氣虛冷亦令致噦也

時氣嗽候

熱邪客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而嗽也

時氣渴候

熱氣入於腎藏腎惡燥熱氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也

時氣衄血候

時氣衄血者五臟熱結所爲心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衄血也衄者血從鼻出也

時氣吐血候

諸陽受病不發其汗熱毒入深結在五藏內有瘀血積故令吐血也

時氣口瘡候

發汗下後表裏俱虛而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡也

時氣喉咽痛候

陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉故痛或生瘡也

時氣發斑候

夫熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬言語此爲表虛裏實熱氣躁於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開泄更增斑爛表虛故也

時氣毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱毒乘虛上衝於目故赤痛或生翳赤白膜息肉及瘡也

時氣毒攻手足候

熱毒氣從臟腑出攻於手足手足則焮熱赤腫疼痛也人五藏六府井榮俞皆出於手足指故此毒從內而出

也

時氣炮瘡候

夫表虛裏實熱毒內盛則多發炮瘡重者周布遍身其
狀如火瘡若根赤頭白者則毒輕若色紫黑則毒重其
瘡形如登豆亦名登豆瘡

時氣癩瘡候

夫病新瘥血氣未復皮膚尙虛疎而觸冒風日則徧體
起細瘡瘙痒如癬疥狀名爲逸風

時氣蠶候

毒氣結在腹內穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五臟多
令洩利下部瘡痒若脣內生瘡但欲寐者此蟲食下部

也重者肛爛見五藏也

時氣熱利候

此由熱氣在於腸胃挾毒則下黃赤汁也

時氣膿血利候

此由熱傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁壯熱而腹疼痛此濕毒氣所爲也

時氣蠶利候

夫熱蓄在藏多令人下利若毒氣盛則變膿血因而成蠶蠶者蟲食人五藏及下部也若食下部則令穀道生瘡而下利名爲蠶利若但生瘡而不利者爲蠶也

時氣大便不通候

此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾結
熱在內大便不通也

時氣小便不通候

此由汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通也

時氣陰陽毒候

此謂陰陽二氣偏虛則受於毒若病身重腰脊痛煩悶
面赤斑出咽喉痛或下利狂走此爲陽毒若身重背強
短氣嘔逆脣青面黑四肢逆冷爲陰毒或得病數日變
成毒者或初得病便有毒者皆宜依證急治失候則殺
人

時氣變成黃候

夫時氣病濕毒氣盛蓄於脾胃脾胃有熱則新穀鬱蒸
不能消化大小便結澀故令身面變黃或如橘柚或如
桃枝色

時氣變成瘧候

病後邪氣未散陰陽尙虛因爲勞事致二氣交爭陰勝
則發寒陽勝則發熱故令寒熱往來有時休作而成瘧
時氣敗候

此謂病後餘毒未盡形證變轉久而不瘥陰陽無復綱
紀名爲敗病

時氣勞復候

夫病新瘥者血氣尙虛津液未復因卽勞動更成病焉

若言語思慮則勞於神梳頭澣洗則勞於力未堪勞而強勞之則生熱熱氣還經絡復爲病者名曰勞復

時氣食復候

夫病新瘥者脾胃尙虛穀氣未復若卽食肥肉魚鱠餅餌棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實因更發熱復爲病者名曰食復也

時氣病瘥後交接勞復候

夫病新瘥者陰陽二氣未和早合房室則令人陰腫入腹腹內疼痛名爲交接勞復

時氣病後陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人時氣病新瘥未平復而與之

交接得病者名陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名曰陽易其婦人得病新瘥未平復而男子與之交接得病者名曰陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體熱衝胸頭重不能舉眼中生眵四支拘急小腹疼痛手足拳皆卽死其亦有不卽死者病苦小腹裏急熱氣上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱氣血虛骨髓竭使悒悒吸吸氣力轉少着牀不能搖動起居仰人或引歲月方死

時氣病後虛羸候

夫人榮衛先虛復爲邪熱所中發汗吐下之後經絡損

傷陰陽竭絕虛邪始散真氣尙少五藏猶虛羸神未復無津液以榮養故虛羸而生衆病焉

時氣陰莖腫候

此由腎臟虛所致腎氣通於陰今腎爲熱邪所傷毒氣下流故令陰腫

時氣令不相染易候

夫時氣病者此皆因歲時不和溫涼失節人感乖戾之氣而生病者多相染易故預服藥及爲方法以防之

熱病諸候 凡二十八論

熱病候

熱病者傷寒之類也冬傷於寒至春變爲溫病夏變爲

暑病暑病者熱重於溫也肝熱病者小便先黃腹痛多
臥身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不安臥庚辛
甚甲乙大汗氣逆則庚辛死心熱病者先不樂數日乃
熱熱爭則卒心痛煩冤善嘔頭痛面赤無汗至壬癸甚
丙丁大汗氣逆則壬癸死脾熱病者先頭重頰痛煩心
欲嘔身熱熱爭則腰痛腹滿泄兩領痛甲乙甚戊己大
汗氣逆則甲乙死肺熱病者先淅然起毛惡風舌上黃
身熱熱爭則喘咳痺走胸應背不得太息頭痛不甚汗
出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死腎熱病者先
腰痛脛酸苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強脛寒骨且
酸足下熱不欲言其項痛淖澹戊己甚壬癸大汗氣逆

則戊己死肝熱病者左頰先赤心熱病者額先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤凡病雖未發見其赤色者刺之名曰治未病一曰汗不出顴赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱而腹滿者死五曰汗不出嘔血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬血衄血汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而瘻者死凡此者不可刺也熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病者脈常盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生熱病七八日脈微小病者洩血口中乾一日半死脈代一日死熱病已

得汗脈尙數躁而喘且復熱勿庸刺喘甚者死熱病七八日脈不躁躁不數後三日中有汗三日不汗四日死未嘗汗者勿庸刺也診人熱病七八日其脈微小口乾脈代舌焦黑者死診人熱病七八日脈不數不喘者當瘡之後三日溫汗不出者死熱病已得汗常熱不去者亦死不治也脈靜安者生脈躁者難治脈常躁靜此氣之極亦死也腹脢常喘而熱不退者死多汗脈虛小者生脢實者死養生方云三月勿食陳蠶必遭熱病

熱病一日候

熱病一日病在太陽太陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊疼痛

熱病二日候

熱病二日陽明受病病在肌肉故肉熱鼻乾不得眠故可摩膏火灸發汗而愈

熱病三日候

熱病三日諸陽相傳病訖病猶在表未入於臟故胸脇熱而耳聾故可發汗而愈

熱病四日候

熱病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣已入胸鬲其病喉乾腹滿故可吐而愈

熱病五日候

熱病五日少陰受病毒氣入腹內其病口舌乾而引飲
故可下而愈

熱病六日候

熱病六日厥陰受病毒氣入腸胃其人煩滿而陰縮故
可下而愈

熱病七日候

熱病七日三陰三陽傳病訖病法當愈今病不除者欲
爲再經病也再經者謂經絡重受病也

熱病八九日已上候

熱病八九日已上不解者皆由毒氣未盡所以病證不
除也

熱病解肌發汗候

此謂得病三日已還病法在表故宜發汗或病已經五六日然其人喉口不焦乾心腹不滿又不引飲但頭痛身體壯熱脈洪大者此爲病證在表未入於臟故雖五六日猶須解肌發汗不可苟依日數輒取吐下

熱病煩候

此由陽勝於陰熱氣獨盛否結於藏則三焦隔絕故身熱而煩也

熱病胞瘡候

夫熱病胞瘡者此由表虛裏實熱氣盛則發瘡重者周布遍身若瘡色赤頭白則毒輕色紫黑則毒重其形如

登豆故名登豆瘡

熱病斑瘡候

夫病在表或未發汗或已發汗吐下後表證未解毒氣不散煩熱而渴渴而不能飲表虛裏實故身體發斑如

錦文

熱病熱瘡候

人藏府虛實不調則生於客熱表有風濕與熱氣相搏則身體生瘡痒痛而膿汁出甚者一瘡一劇此風熱所爲也

熱病口瘡候

此由脾藏有熱衝於上焦故口生瘡也

熱病咽喉瘡候

上實下虛熱氣內盛熏於咽喉故生瘡也

熱病大便不通候

夫經發汗汗出多則津液少津液少則胃乾結熱在胃所以大便不通又有府藏自生於熱者此由三焦否隔脾胃不和蓄熱在內亦大便不通也

熱病小便不通候

熱在膀胱流於小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通也

熱病下利候

熱氣攻於腸胃胃虛則下赤黃汁挾毒則成膿血

熱病蠶候

熱氣攻於腸胃則穀氣衰所以三蟲動作食人五臟及下部重者肝爛見府藏

血祖主屎闕遺氣鼻厭

熱病毒攻眼候

肝藏開竅於目肝氣虛熱毒乘虛則上衝於目重者生瘡翳及赤白膜也

熱病毒攻手足候

夫熱病攻手足乃人五藏六府井榮俞皆出於手足指今毒氣從府藏而出循於經絡攻於手足故手足指皆腫赤焮痛也

熱病嘔候

胃內有熱則穀氣不和新穀入胃與熱氣相搏胃氣不平故嘔或吐下已後臟虛亦令嘔也

熱病嘔候

伏熱在胃則令人胸滿胸滿則氣逆氣逆則嘔若大下已後飲水多胃內虛冷亦令嘔也

熱病口乾候

此由五藏有虛熱脾胃不和津液竭少故口乾也

熱病衄候

心藏傷熱所爲也心主血肺主氣開竅於鼻邪熱與血氣并故衄也衄者血從鼻出也

熱病勞復候

夫熱病新瘥津液未復血氣尙虛因勞動早勞則生熱
熱氣乘虛還入經絡故復病也

熱病後沈滯候

凡病新瘥後食豬肉及腸血肥魚脂膩必大下利醫所
不能復治也必至於死若食餅餌粢飴哺炙膾棗栗諸
菓物脯及牢實難消之物胃氣尙虛弱不能消化必結
熱復病還以藥下之

皖南建德
周氏校刊

巢氏諸病源候總論卷十

溫病諸候 凡三十四論

溫病候

經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃爲傷耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣焉卽病者爲傷寒不卽病者爲寒毒藏於肌骨中至春變爲溫病是以辛苦之人春夏必有溫病者皆由其冬時觸冒之所致也凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑其冬復有非節之暖名爲冬溫毒與傷寒大異

也有病溫者汗出輒復熱而脈躁病不爲汗衰狂言不能食病名爲何也曰病名曰陰陽交陰陽交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪卻而精勝則當食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不稱其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死凡皮膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑如故脈直疾八日死四五日頭痛脈疾喜吐脈來細十二日死此病不治八九日脈不疾身不痛目不赤色不

變而反利脈來牒牒按不彈手時大心下鞠十七日死病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不治也下利腹中痛甚者死不治其湯熨針石別有正方存神攘辟今附於後

養生方導引法云常以雞鳴時存心念四海神名三遍辟百邪正鬼令人不病

東海神名阿明

南海神名祝融

西海神名巨乘

北海神名禹強

又云存念心氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎氣黑出周其身又兼辟邪鬼欲辟卻衆邪百鬼常存心爲炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干之可以入溫疫之中

溫病一日候

溫病一日太陽受病諸陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊痛

溫病二日候

溫病二日陽明受病病在於肌肉故肉熱鼻乾不得眠故可摩膏火灸發汗而愈

溫病三日候

溫病三日少陽受病故胸脇熱而耳聾三陽始傳病訖未入於藏故可發汗而愈

溫病四日候

溫病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖

傳入於陰故毒氣入胸膈之內其病咽乾腹滿故可吐而愈

溫病五日候

溫病五日少陰受病毒氣入腹其病口熱舌乾而引飲故可下而愈

溫病六日候

溫病六日厥陰受病毒氣入腹胃其病煩滿而陰縮故可下而愈

溫病七日候

溫病七日病法當愈此是三陰三陽傳病竟故也今七日病不除者欲爲再經病也再經病者是經絡重受病

也

溫病八日候

溫病八日已上病不解者或是諸經絡重受於病或經發汗吐下之後毒氣未盡所以病證不罷也

溫病九日已上候

溫病九日已上病不除者或初一經受病卽不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於三陰所以停滯累日病證不罷皆由毒氣未盡表裏受邪經絡損傷府藏俱病也

溫病發斑候

夫人冬月觸冒寒毒者至春始發病病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時

溫暖人感乖戾之氣未卽發病至春又被積寒所折毒氣不得發泄至夏遇熱溫毒始發出於肌膚斑爛惡瘻如錦文也

溫病煩候

此由陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心府而煩者則令人悶而欲嘔若其胃內有燥糞而煩者則謬語而繞脣痛也

溫病狂言候

夫病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽爭而外并於陽四支者諸陽之本也邪盛則四支實實則能登高

而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親
戚大熱遍身狂言而妄聞視也

溫病嗽候

邪熱客於胸府上焦有熱其人必飲水水停心下則上
乘於肺故令嗽

溫病嘔候

胃中有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲
水多胃虛冷亦爲嘔也

溫病噦候

伏熱在胃令人胸滿胸滿則氣逆氣逆則噦若大下後
胃氣虛冷亦令致噦

溫病渴候

熱氣入於腎藏腎藏惡燥熱盛則腎燥腎燥則渴引飲
溫病取吐候

溫病熱發四日病在胸鬲當吐之愈有得病一二日便
心胸煩滿爲毒已入兼有痰實亦吐之

溫病變成黃候

發汗不解溫毒氣瘀結在胃小便爲之不利故變成黃
身如橘色

溫病咽喉痛候

熱毒在於胸府三焦隔絕邪客於足少陰之絡下部脈
不通熱氣上攻喉咽故痛或生瘡也

溫病毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱毒乘虛上衝於目故赤痛重者生瘡翳也

溫病衄候

由五藏熱結所爲心主血脉肺主氣而開竅於鼻邪熱傷於心故衄者血從鼻出也

溫病吐血候

諸陽受邪熱初在表應發汗而不發致熱毒入深結於五藏內有瘀血積故吐血也

溫病下利候

風熱入於腸胃故令洞泄若挾毒則下黃赤汁及膿血

溫病膿血利候

熱毒甚者傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁此由溫毒氣盛故也

溫病大便不通候

脾胃有積熱發汗太過則津液少使胃乾結熱在內故大便不通

溫病小便不通候

發汗後津液少膀胱有結熱移入於小腸故小便不通也

溫病下部瘡候

熱攻腸胃毒氣既盛穀氣漸衰故三蟲動作食人五藏

則下部生瘡重者肛爛見府藏

溫病勞復候

謂病新瘥津液未復血氣尙虛因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

溫病食復候

凡得溫毒病新瘥脾胃尙虛穀氣未復若食犬豬羊內并腸血及肥魚炙脂膩食此必大下利下利則不可復救又禁食餅餌炙膾棗栗諸生菓難消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事等皆須慎之

溫病陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人溫病新瘥未平復而與之交接因得病者名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病雖瘥未平復男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不自相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體熱衝胸頭重不舉眼中生眵四支拘急小腹疼痛手足拳皆卽死其亦有不卽死者病苦小腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱氣血虛骨髓竭便悒悒吸吸氣力轉少著牀不能搖動起居仰人或引歲月方死

溫病交接勞復候

病雖瘥陰陽未和因早房室令人陰腫縮入腹腹疼痛名爲交接之勞復也

溫病瘥後諸病候

謂其人先有宿症或患虛勞風冷積聚寒疝等疾因溫熱病發汗吐下之後熱邪雖退而血氣損傷府藏皆虛故因茲而生諸病

溫病令人不相染易候

此病皆因歲時不和溫涼失節人感乖戾之氣而生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須預服藥及爲法術以防之

疫癘病諸候

凡三論

疫癘病候

其病與時氣溫熱等病相類皆由一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散則民多疾疫病無長少率皆相似如有鬼厲之氣故云疫癘病

養生方云封君達常乘青牛魯女生常乘駮牛孟子綽常乘駮馬尹公度常乘青驃時人莫知其名字爲誰故曰欲得不死當問青牛道士欲得此色駮牛爲上青牛次之駮馬又次之三色者順生之氣也云古之青牛者乃栢木之精也駮牛者古之神宗之先也駮馬者乃神龍之祖也云道士乘此以行於路百物之惡精疫氣之癘鬼將長揖之焉延年之道存念心氣赤肝氣青肺氣

白脾氣黃腎氣黑出周其身又兼辟邪鬼欲辟卻衆邪
百鬼常存心爲炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干之
可以入溫疫之中

疫癘炮瘡候

熱毒盛則生炮瘡瘡周布遍身狀如火瘡色赤頭白者
毒輕色黑紫黯者毒重亦名爲登豆瘡

瘡氣候

夫嶺南青草黃芒瘴猶如嶺北傷寒也南地暖故太陰
之時草木不黃落伏蟄不閉藏雜毒因暖而生故嶺南
從仲春訖仲夏行青草瘴季夏訖孟冬行黃芒瘴量其
用藥體性嶺南傷寒但節氣多溫冷藥小寒於嶺北時

用熱藥亦減其錙銖三分去二但此病外候小遲因經絡之所傳與傷寒不異然陰陽受病會同表裡須明識患源不得妄攻湯艾假令宿患痼熱今得瘴毒毒得熱更煩雖形候正盛猶在於表未入腸胃不妨溫而汗之已入內者不妨平而下之假令本有冷今得溫瘴雖暴壯熱煩滿視寒正須溫藥汗之汗之不歇不妨寒藥下之夫下痢治病等藥在下品藥性凶毒專主攻擊不可恒服疾去卽止病若日數未入於內不可預服利藥藥盡胃虛病必承虛而進此不可輕治治不瘥成黃疸黃疸不差爲尸疸尸疸疾者嶺南中瘴氣土人連厯不瘥變成此病不須治也嶺北客人猶得斟酌救之病前熱

而後寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於陽者攻其外發於陰者攻其內其一日二日癰氣在皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重若寒氣在表發汗及針必愈三日以上氣浮於上填塞心腎使頭痛胸滿而悶宜以吐藥吐之必愈五日已上癰氣深結在臟府故腹脹身重骨節煩疼當下之或人得病久方告醫醫知病深病已成結非可發表解肌所當問病之得病本末投藥可專依次第也

巢氏諸病源候總論卷十一

瘧病諸候 凡十四論

瘧病候

夏日傷暑秋必病瘧瘧之發以時者此是邪客於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以日作常晏也衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內注於伏衝伏衝脈其行九日出於缺盆之中其氣既上故其病稍早發其間日發者由邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日蓄積乃作夫衛氣每至於風府腠

理而開開則邪入焉其衛氣日下一節則不當風府奈何然風府無常衛氣之所應必開其腠理氣之所舍則其病作風之與瘧也相與同類而風獨常在也而瘧特以時休何也由風氣留其處瘧氣隨經絡沈以內薄故衛氣應乃作陽當陷而不陷陰當升而不升爲邪所中陽遇邪則捲陰遇邪則緊捲則惡寒緊則爲慄寒慄相薄故名瘧弱乃發熱浮乃來出旦中日發暮中暮發夫瘧其人形瘦皮必慄問曰病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月盡解

足太陽瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱渴渴然後熱止汗而出難已刺郄中出血

足少陽瘧令人身體解倦寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出其刺足少陽

足陽明瘧令人先寒酒淅酒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日光火氣乃快然刺足陽明脚肤上

足太陰瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰卽取之

足少陰瘧令人吐嘔甚久寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難止

足厥陰瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃非癃狀也數小便意恐懼氣不足腸中悒悒刺足厥陰

肺瘧者令人心寒寒甚熱間善驚如有所見者刺手太

陰陽明

心瘧者令人煩心甚欲得清水乃寒多寒不甚熱刺手少陰

肝瘧令人色蒼蒼然太息甚狀若死者刺足厥陰見血脾瘧令人疾寒腹中痛熱則腸中鳴已汗出刺足太陰腎瘧令人洒洒腰脊痛宛轉大便難目眩睭睭然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧令人且病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脈出血

肺病爲瘧乍來乍去令人心寒寒甚則熱發善驚如有所見此肺瘧證也若人本來語聲雄而恍惚不亮拖氣

用力方得出言而反於常人呼其語直視不應雖曰未病勢當不久此卽肺病聲之候也察觀疾表裏相應依源審治乃不失也

心病爲瘧者令人心煩其病欲飲清水多寒少熱若人本來心性和雅而急卒反於常倫或言未竟便住以手剔脚爪此人必死禍雖未及呼曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可治者明而察之

肝病爲瘧者令人色蒼蒼然氣息喘悶戰掉狀如死者若人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未竟以手向眼如有所思若不卽病禍必至矣此肝病聲之證也其人若虛則爲寒風所傷若實則爲熱氣所

損陽則瀉之陰則補之

脾病爲瘧者令人寒腹中痛腸中鳴鳴已汗出若其人本來少於喜怒而忽反常瞋喜無度正言鼻笑不答於人此是脾病聲之候證不盈旬月禍必至也

腎病爲瘧者令人悽悽然腰脊痛而宛轉大便澀自掉不定手足而寒若人本來不喜不怒忽然謇而好瞋怒反於常性此腎已傷雖未發覺是其候也見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手柵腹此是腎病聲之證虛實表裏浮沉清濁宜以察之逐以治之夫瘧脈者自弦弦數多熱弦遲多寒弦小緊者可下之弦遲者溫藥已脈數而緊者可發其汗宜針灸之脈浮大者不可針灸

可吐之凡瘧先發如食頃乃可以治之過之則失時

溫瘧候

夫溫瘧與寒瘧安舍溫瘧者得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因遇大暑腦髓爍脈肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕由此病藏於腎其氣先從內出之於外如此則陰虛而陽盛則熱衰則氣復反入人則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧

瘧先寒而後熱此由夏傷於暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於

風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘡先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘡夫病瘡六七日但見熱者溫瘡矣

瘡瘍候

夫瘡瘍者夏傷於暑也其病秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏則多汗者然其蓄作有時以瘡之始發先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓領腰脊痛寒去則外內皆熱頭痛而渴欲飲何氣使然此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實陽虛陽明虛則寒慄鼓領巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛陰氣勝勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內

外皆熱則喘而渴欲飲此得之夏傷於暑熱氣盛藏之
於皮膚之間腸胃之外此榮氣之所舍此令汗出空疎
腠理開因得秋氣汗出遇風乃得之及以浴水氣舍於
皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行陽此氣得陽如
外出得陰如內薄是以日作其間日而作者謂其氣之
舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出
是以間日而作

間日瘧候

此由邪氣與衛氣俱行於六府而有時相失不相得故
邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行遲不能與衛氣偕
出是以間日而作也

風瘧候

夫瘧皆生於風風者陽氣也陽主熱故衛氣每至於風府則腠理開開則邪入邪入則病作先傷於風故發熱而後寒慄

瘧瘧候

夫瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒寒氣內藏於心而外舍分肉之間令人消爍肌肉故命曰瘧瘧其狀但熱不寒陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔也

山瘴瘧候

此病生於嶺南帶山瘴之氣其狀發寒熱休作有時皆由山溪源嶺瘴濕毒氣故也其病重於傷暑之瘧

痰實瘧候

痰實瘧者謂患人胸鬲先有停痰結實因成瘧病則令人心下脹滿氣逆煩嘔也

寒熱瘧候

夫瘧者風寒之氣也邪並於陰則寒並於陽則熱故發作皆寒熱也

往來寒熱瘧候

此由寒氣并於陰則發寒風氣并於陽則發熱陰陽二

氣更實更虛故寒熱更往來也

寒瘡候

此由陰陽相并陽虛則陰勝陰虛則寒寒發於內而並於外所以內外俱寒故病發但戰慄而鼓領頤也

勞瘡候

凡瘡積久不瘥者則表裏俱虛客邪未散真氣不復故疾雖暫間小勞便發

發作無時瘡候

夫衛氣一日一夜大會於風府則腠理開開則邪入邪入則病作當其時陰陽相并隨其所勝故生寒熱故動作皆有早晏者若府藏受邪內外失守邪氣妄行所以

休作無時也

久瘧候

夫瘧皆由傷暑及傷風所爲熱盛之時發汗吐下過度府藏空虛榮衛傷損邪氣伏藏所以引日不瘥仍故休作也夫瘧歲歲發至三歲發連月發不解脇下有否治之不得攻其否但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自溫覆汗出小便自引利即愈也

皖南建德

周氏校刊

巢氏諸病源候總論卷十二

黃病諸候 凡二十八論

黃病候

黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後壯熱在裏有血當下之法如肫肝狀其人少腹內急若其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急卽是患黃多大便澁但令得小便快卽不慮死不用大便多多卽心腹脹不存此由寒濕在表則熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏煩鬱不得消則大小便不通故身體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌無脈口鼻冷氣並不可治也

急黃候

脾胃有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也有得病卽身體面目發黃者有初不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃也

黃汗候

黃汗之爲病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣正黃如蘖汗其脈自沈此由脾胃有熱汗出而入水中浴若水入汗孔中得成黃汗也

犯黃候

有得黃病已瘥而將息失宜飲食過度犯觸禁忌致病發胃名爲犯黃候

勞黃候

脾藏中風風與瘀熱相搏故令身體發黃額上黑微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四支煩小便自利名爲勞

黃

腦黃候

熱邪在骨髓而腦爲髓海故熱氣從骨髓流入於腦則身體發黃頭腦痛眉疼名爲腦黃候

陰黃候

陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲陰黃

內黃候

熱毒氣在脾胃與穀氣相搏熱蒸在內不得宣散先心腹脹滿氣急然後身面悉黃名爲內黃

行黃候

瘀熱在脾藏但肉微黃而身不甚熱其人頭痛心煩不廢行立名爲行黃

癬黃候

氣水飲停滯結聚成癬因熱氣相搏則鬱蒸不散故脇下滿痛而身發黃名爲癬黃

噤黃候

心脾二藏有瘀熱所爲心主於舌脾之絡脈出於舌下若身面發黃舌下大脈起青黑色舌噤強不能語名爲

疎黃也

五色黃候

凡人著黃五種黃皆同其人至困冥漠不知東西者看其左手脈名手肝脈兩筋中其脈如有如無又看近手屈肘前臂上當有三歧脈中央者名爲手肝脈兩廂者名歧脈看時若肝脈全無兩廂壞其人十死一生難可救濟若中央脈近掌三指道有如不絕其人必不死脈經三日漸徹至手掌必得汗汗罷必愈婦人患黃看右手脈眼青黃視其瞳子青脈亦青面色青者是其由脾移熱於肝肝色青也其人身熱而發黃赤視其眼赤高視心腹脹滿脈赤便是此由脾移熱於心心色赤故其

人身熱而發赤黃不可治治之難差其人身熱發黃白
視其舌下白垢生者是此由脾移熱於肺肺色白也其
人身熱發黑黃視其脣黑眼黃舌下脈黑者是此由脾
移熱於腎腎色黑也故其身熱而發黃也

風黃候

凡人先患風濕復遇冷氣相搏則舉身疼痛發熱而體
黃也

因黃發血候

此由脾胃大熱熱傷於心心主於血熱氣盛故發黃而
動熱故因名爲發血

因黃發痢候

此由瘀熱在於脾胃因而發黃挾毒卽下痢故名爲發
痢

因黃發痔候

此病由熱傷於心主血熱盛則血隨大便而下名爲血
痔

因黃發癬候

夫黃病皆是大熱所爲熱盛之時必服冷藥冷藥多則
動舊癬

因黃發病後小便澀兼石淋候

黃病後小便澀兼石淋發黃疸此皆由蓄熱所爲熱流
小腸小便澀少而痛下物如沙石也

病源傳說 卷十一
因黃發吐候

黃病吐下之後胃氣虛冷其人宿病有寒飲故發吐

黃疸候

黃疸之病此由酒食過度府藏不和水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如飢令身體面目及爪甲小便盡黃而欲安臥若身體多赤黑多青皆見者必寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也渴而疸者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱

酒疸候

夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃內生熱因大醉

當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑若下之久久變爲黑疸面目黑心中如噉蒜薹狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱故知酒疸心中熱欲嘔者當吐之則愈其小便不利其候當心中熱足下熱是其候證明也脈浮先吐之沈弦先下之

穀疸候

穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝熏所致陽明病脈遲食難用飽飽者則發煩頭眩者必小便難此欲爲穀疸雖下之其腹必滿其脈遲故也

女勞疸候

女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接交接竟人水所致也

黑疸候

黑疸之狀苦小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是夫黃疸酒疸女勞疸久久多變爲黑疸

九疸候

夫九疸者一曰胃疸二曰心疸三曰腎疸四曰腸疸五曰膏疸六曰舌疸七曰體疸八曰肉疸九曰肝疸凡諸疸病皆由飲食過度醉酒勞傷脾胃有瘀熱所致其病身面皆發黃但立名不同耳

胞疸候

胞疽之病小腸有熱流於胞內故大小便皆如糞汁此爲胞疽

風黃疸候

夫風濕在於府藏與熱氣相搏便發於黃卽小便或赤或白好臥而心振面虛黑名爲風黃疸

濕疸候

濕疸病者脾胃有熱與濕氣相搏故病苦身體疼面目黃小便不利此爲濕疸

冷熱病諸候 凡七論

病熱候

夫患熱者皆由血氣有虛實邪在脾胃陽氣有餘陰氣

不足則風邪不得宣散因而生熱熱搏於府藏故爲病熱也診其脈關上浮而數胃中有熱滑而疾者亦爲有熱弱者無胃氣是爲虛熱跗陽脈數者胃中有熱熱則消穀引食跗陽脈龐而浮者其病難治若病者苦發熱身體疼痛此爲表有病其脈自當浮今脈反沈而遲故知難差其人不卽得愈必當死以其病與脈相反故也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云偃臥合兩膝布兩足而生腰口內氣振腹七息除壯熱疼痛通兩脰不隨

又云覆臥去枕立兩足以鼻內氣四十所復以鼻出之極令微氣入鼻中勿令鼻知除身中熱背痛

又云兩手却據仰頭向日以口內氣因而咽之數十除
熱身中傷死肌

客熱候

客熱者由人府藏不調生於虛熱客於上焦則胸鬲生
痰實口苦舌乾客於中焦則煩心悶滿不能下食客於
下焦則大便難小便赤澀

冷熱候

夫虛邪在於內與衛氣相搏陰勝者則爲寒真氣去去
則虛虛則內生寒視其五官色白爲有寒診其脈遲則
爲寒緊則爲寒濇遲爲寒微者爲寒遲而緩爲寒微而
緊爲寒寸口虛爲寒其湯熨針石別有正方補養宣導

今附於後

養生方導引法云一足向下踏地一足長舒向前極勢手掌四方取勢左右換易四七去腸冷腰脊急悶骨疼令使血氣上下布潤又云兩足相合兩手仰捉兩脚向上急挽頭向後振勢極三七欲得努足手兩向舒張身手足極勢二七去竅中生百病下部虛冷

又云又跌兩手反向拓席漸漸向後努齊腹向前散氣待火急還放來去二七去齊下冷脚疼五藏六府不和又云兩手向後拓腰蹙骨極勢左右轉身來去三七去腹肚齊冷兩髀急胸掖不和

又云牙跪兩手向後手掌合地出氣向下始漸漸向下

覺腰脊大悶還上來去二七身正左右散氣轉腰三七
去齊下冷解谿內疼痛

寒熱候

夫陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒
陽者受氣於上焦以溫皮膚分肉之間令寒氣在外則
上焦不通不通則寒獨留於外故寒慄也陰虛內生熱
者有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通
胃氣熱熏胸中故內熱也陽盛而外熱者上焦不通利
皮膚緻密腠理閉塞不通衛氣不得泄越故外熱也陰
盛而內寒者厥氣上逆寒氣積於胸中而不寫不寫則
溫氣去寒獨留則血渙泣血渙泣則脈不通其脈不通

脈則盛大以濇故陰陽之要陰密陽固若兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂聖度故陽強不能陰氣乃絕因於露風乃生寒熱凡小骨弱肉者善病寒熱骨寒熱病無所安汗注不休齒本槁取其少陰於陰股之絡齒爪槁死不治診其脈沈細數散也

寒熱往來候

夫寒氣并於陰則發寒、陽氣并於陽則發熱陰陽二氣虛實不調故邪氣更作寒熱往來也脈緊而數寒熱俱發必當止乃愈脈急如絃者邪入陽明寒熱脾脈小甚爲寒熱

養生方云已醉飽食發寒熱也

冷熱不調候

夫人榮衛不調致令陰陽否塞陽並於上則上熱陰並於下則下冷上焦有熱或喉口生瘡胸鬲煩滿下焦有冷則腹脹腸鳴絞痛泄痢

寒熱厥候

夫厥者逆也謂陰陽二氣卒有衰絕逆於常度若陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥熱厥之爲熱也必起於足下者陽起於五指之表集於足下而聚於足心故也故陽勝則足下熱熱厥者酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主爲胃行其津液陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營其四

支此人心數醉若飽已入房氣聚於脾中未得散酒氣與穀氣相并熱起於內故遍於身內熱則尿赤夫酒氣盛而剽悍腎氣有衰陽氣獨勝故手腳爲之熱寒厥之爲寒必從五指始上於膝下陰氣起於五指之裏集於膝下聚於膝上故陰氣勝則五指至膝上寒其寒也不從外皆從內寒寒厥何失而然陰者宗筋之所聚太陽陽明之所合也春夏則陽氣多而陰氣衰秋冬陰氣盛而陽氣衰此人者質壯以秋冬奪其所用下氣上爭未能復精氣溢下邪氣因從之而上氣因於中陽氣衰不能滲榮其經絡故陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒夫厥者或令人腹滿或令人暴不知人或半日遠至一

日乃知人者此由陰氣盛於上則下氣重上而邪氣逆
逆則陽氣亂亂則不知人太陽之厥踵首頭重足不能
行發爲昫仆陽明之厥則癲疾欲走則呼腹滿不臥臥
則面赤而熱妄見妄言少陽之厥則暴聾頰脣胸熱脇
痛骭支不可以運太陰之厥腹滿脹脹後不利以不欲
食食之則嘔不得臥也少陰之厥者則舌乾尿赤腹滿
心痛厥陰之厥者少腹腫痛脣脹不利好臥屈膝陰縮
腫脛外熱其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後
養生方導引法云正偃臥展兩足鼻內氣自極搖足三
十過止除足寒厥逆也

周氏校刊

周氏校刊

周氏校刊

周氏校刊

周氏校刊

周氏校刊