

千金翼方



于金囊方卷第二十四

瘡癰

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

明翰林院檢討國史纂修官王肯堂重校

內閣典中文書舍人加四級金匱要略附校刻

瘡疽發背

疳濕第六

蟲附

風癰第二

腸癰第七

脫肛附

瘡疽第三

疥癬第八

鴉瘻附

頭核第四

瘡疽第九

瘡疽第五

瘡疽第六

惡瘻反花

瘡疽發首第一

瘡疽發首第二

瘡疽發首第三

瘡疽發首第四

瘡疽發首第五

瘡疽發首第六

瘡疽發首第七

瘡疽發首第八

瘡疽發首第九

瘡疽發首第十

瘡疽發首第十一

瘡疽發首第十二

瘡疽發首第十三

瘡疽發首第十四

瘡疽發首第十五

瘡疽發首第十六

瘡疽發首第十七

瘡疽發首第十八

瘡疽發首第十九

瘡疽發首第二十



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

凡癰腫及癰疽腫已漬未潰方

取苦酒三升少與冰和熟搗麻油化膿作餅子厚三
上有孔勿覆孔上布破餅以艾列其上炙之使溫溫
勿令破肉也如熱痛急易之癰疽當便減快得安或一日
度灸之若先有瘡孔孔中汁出卽差

癰腫發膿并諸毒腫方

榆白皮 桔梗 兩 嫩太月布洗取汁 一升 煎藥玉

貨鼠土 各朴兩用金粟土 作鼠全土 右五味搗和作泥封之一日漸消五

日全差若壞封四畔差

有癰腫無腮頰發背及癰癧已疼痛方

蒸糜穀更遞熨之卽愈

一云薑薇殼
更炙熨之

癰疽發腹背陰隱處通身有數十癰方

取牛糞乾者燒末以雞子白和塗乾則易差正

又方

以牡蠣粉大醋和塗卽愈

是則皆高半人也

散人作散人

人作散人

人作散人

占斯散王消腫癰疽消膿方

曰東山人如之

人如之

人如之

人如之

未占斯人參甘乾姜

一云黃地黃

桂心細辛

厚朴

敗醬

防風桔梗桔梗

甘草

炙各

中藥經典

中藥經典

右二十一味搗篩爲散酒服方寸匕藥人咽覺藥流入瘡中
若難近灸之不能發瘡者可服之瘡未墮者去敗醬已發膿



內服醬服藥日上夜一以多爲善若病在下當膿血由出
爲腸癰也諸病在裏惟服此藥卽覺其力痛者卽本病
治諸瘍及疽痔瘍已潰便早愈醫人不知用此藥發背無
不治者惟服此耳昔始覺背上有不好而渴者即勤服之若
棄力行覺渴止便消散若雖已壞但日夜服之勿住佳也服
之腫癰消散不覺去時欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜服
服一方無

杜心

通潔潔男陰背女發乳及五痔方

明皮燒

蜂蜜

燒各一

蜀椒

各半

乾薑

各一

厚朴

二兩

附子皮

桂心

當歸

續斷

藁本

地榆皮

各五分

右十一味搗篩爲散酒服方寸七旦三加

七枚益良

治瘡疽百方治不差方

可於瘡上以次灸之二日一夜無不愈

又方

久瘡不愈瘻而復發骨從孔出者名爲骨疽取一死烏雌雞淨去肉取骨熬令成灰取三家牛狗木刮取屑三家炊篩各一兩皆別熬成灰合導瘡中碎骨當出數手片愈

鼠瘻第二

論一首方十首

論曰一切癰疽皆是瘡瘻根本所患癰之後膿汁不止得冷即

是鼠瘻氣以漏方入之大須急救之

治鼠瘻方

馬齒草五升

柳白皮一觔

取一升加澄清

麝香半時乾

之研末

杏仁半升

搗如膏

右四味以器貯之合和以三四重

密繫口病已成瘻者以湯清煎減半洗作貼于塗藥貼瘻瘍

上日三易之若未作瘻如癰癰子者以艾一升熏黃如棗大

乾漆如棗大三味末之和艾作炷炙之三七壯止

治諸漏方

新兒屎百口以來皆收置密器中五六日取塗瘻孔中

取鰣魚燭切作五段火上煖之先洗瘡拭乾以腸貼之冷即易之從旦至夜乾止覺癢開看蟲出卽差

又方

取雞子三顆米下熟茶水取黃熟令黑先拭瘡汗令乾以藥內瘡孔中不過三度

又方

以臘月豬脂以紙綃沾取內瘡孔中日五度夜三度

風漏及鼠漏方

赤小豆

白斂

牡蠣熬

黃耆

右四味等分擣篩爲散酒服方寸七日三

蠅漏方

取陵鱗甲貳拾枚燒爲末猶膏和傅

又方

取半夏一枚屑之以鴟膏和傅之

漏方

鍛落鐵屑 猪胰車連齒骨 虎糞 鹿角甲半取毛
各三兩
金云鹿皮合毛燒爲灰 右四味擣節爲散以猪膏利內瘡孔中須臾
易之日五六度

治鼠漏方

死鼠一枚中形者 亂髮一雞子大 右二味以臘月猪膏纔得沒之微



火煎之鼠髮消盡膏成以塗瘡上又以酒服半分許鼠瘡
中出

寒熱瘰癧方

遠翹 黃連 苦參 菰樓 土瓜根 苦藥 恆山各一

龍膽二 狸頭骨一枚

炙

右九味擣篩爲散酒服五分七日三

千金無
狸骨

治身體瘰癧及常有細瘡又口中有瘡薺薇丸方

薺薇根參黃檗 黃耆 黃芩 苦藥 苦參 白斂

桔梗

防風

龍膽

鼠李根皮

石龍芮

各二兩

梔子仁四兩 右一十三味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子飲服

十五丸

千金無
黃葉

頸漏

搗生商陸根作餅子如大錢厚三分貼漏上以艾灸之熱則易之可灸三四升艾便差

一法

草薢子

合豉升

右一味搗大爛熟作餅之如上以一餅子

當孔上貼以艾炷如小指大穴上三壯一易三餅九炷日三

隔三日一炙

一法

凡是瘰疬有結核作癰癧者以獨頭蒜去兩頭足之如前法

日炙三度差

一法

七月七日日未出時採麻花五月五日取艾等分合作
漏上百莊

治癢方

馬齒草陰臘月淳麻燭乾 燭右一味等分搗細篩以臘月豬
脂和之先以燶泔清洗瘡拭乾塗之

又方

人解木皮一尺闊六寸去黑皮細切以水一斗煮取去五升去
滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器中貯之若吐吐著



器中看之

人參散主寒熱瘰癧在頸脈下如杏李方

人參 乾薑 白芷 甘草各一兩

右四味搗篩爲散

飲服方寸七日三少小半七以意增減

又方

狸骨

五分
炙

烏頭

十分
炮
去皮

黃藥

一兩

右三味搗篩爲散先食酒服一錢七日二

又方

連翹

黃連

芍藥

苦參

土瓜根

龍膽

當歸

各半

右七味搗篩爲散先食以溫酒服錢五七日三

稍加至方寸

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨



七

千金無當歸有枯
葛恆山爲八味

又方

取桃枝生不落子擣末以大醋和傅之

鼠乳方

常思根拭去土勿洗以附本繫之一日一夜便斷消

癰疽第三

方八首

癰疽秘方世所不傳神良無比

千金分

兩異

升麻

乾地黃 枳實

各三兩

大黃

三兩半

前胡

三分

犀角

一兩

麝香

射干

甘草

炙各半兩

右九味以水九升煮取二升分三服以差爲度不限劑數

豬蹄湯主癰疽諸瘡十指

赤痛癰已潰方



全真方

卷三

白芷

芎藭

黃芩

豬蹄一具治如食去

當歸

藁本

藜蘆本無

莽草

甘草各一兩

右十二味以水三斗煮豬蹄

斗去蹄內諸藥煎取五升洗潰瘍

搘湯主癰疽潰瘍欲作未成或如桃李核或如雞子赤吸方

薰芩

黃連

大黃

當歸

芒硝

甘草

右六味以水六升煮取二升去滓還鎗中內芒硝一沸貼布帛中以搘腫上數百遍

癰疽浸淫多日漸大方

胡粉

一分熬

黃連

木

蘭茹

甘草

各二兩

右四味搗篩爲散以粉瘡上日三

癰疽著手足眉青紫累如米起色白刮之汁出愈而復發

黃耆一兩半
款冬花升麻各一
赤小豆附子炮去皮兩

苦參各一分

右六味搗篩爲散酒服半錢七稍增至一錢七日三服

又方

取虎矢白者以馬矢和之暴乾燒灰以粉之

又方
千金分兩異

龍骨

胡粉燒

渭石各二分

青本香二兩

右四味搗篩爲散以米粉一升和之稍稍粉之日四五

癰疽方

金匱要略

卷之十四

竈室塵 竈突中墨 竈釜下土 各一升

右三味以水九升煮三沸取汁以洗瘡日三四度

惡核第四

論一首方
一十三首

論曰凡惡核似被射工毒初得無定處多惻惻然痛時有不痛者不痛不憂不憂則救遲救遲則殺人是以宜早防之此尤忘牛肉雞豬魚驢馬等肉初如粟或如麻子在肉裏而堅似炮長甚速初得多惡寒須更卽短氣取茱萸五合作末水一升和之絞取汁頓服之以滓傅之須臾更服此汁令毒氣散不入腹入腹則致禍切慎之

江南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡五香散方

黃藥

千金作
陸分

來取之

甲香

人血

薰陸香

青木香

翔羊角

丁香

沈香

犀角

鱗甲虫

升麻

烏鵲

千金作

黃芩

黃連

甘草

各四分

吳茱萸

三錢

右一

十五味

搗飾爲末

中射

正毒

及諸毒皆水

服方寸七日

三以雞子白和

塗腫上乾則易之

兼以水和少

許洗腫上

千金有牡蠣

水三升

桑根皮

根一束

甘草

各十二錢

野葛膏主射工惡核卒中惡毒方

野葛一

頭

巴豆皮

鳥頭

蜀椒

各五

附子

丹砂

茴芋

各一

雄黃

人少太黃

各一

躡躅

兩

右一十味

搗飾爲散

以不中水

豬膏三

觔煎三

上三下

去滓



南京中医药大学图书馆版权所有

內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩病止勿近眼凡含名膏
皆不用六畜婦人小兒見之千金分兩小異

麻子湯主遍身流腫方

黑麻子五升炒 赤小豆三升 防風三兩 附子炮

當歸各一兩

右五味先擣麻子令熟以水三斗煮麻子取一斗三升去滓
內藥及豆合煮取四升去滓食豆飲汁
治惡毒腫或者陰卵或偏著一邊疼痛攀急痛牽小腹不可忍
一宿殺人方

取茴香草搗取汁飲一升日三四服滓傳腫止此外國方神
驗從永嘉以來用之起死人神效無比

凡風勞毒腫疼痛攀急或牽引小腹及腰胯痛方

取茺蔚仁一升去尖皮兩仁者熬令黑烟出熟餅如脂以好酒三升攪令相和作一服覆取汗不過兩三度作之差

若從腳腫向上稍進入腹殺人方

取赤小豆一斗以水三斗煮爛出豆以汁瀆膝以下日一數日則愈矣若已入腹者不須瀆漆但煮豆食之斷一切鹽菜飲食米麵惟祇食豆一物渴飲豆食差乃止

大麻子赤小豆湯主毒腫無定處或赤色惡寒或心腹刺痛煩悶者此由毒氣深重也方

大麻子熬赤小豆各五升生商陸二升薄切升麻四兩附子炮射干各三兩



右六味以水四斗煮諸藥取二斗三升去滓研麻子令破和
煮麻子一沸去滓取汁煮豆令極熟去滓可得六七升一服
一升一日一夜令盡小便當利卽毒除腫減食兼此豆益壯
如湯沃雪凡用麻子皆不得用鬱泡者可揀擇用之

丁腫方

狗尿珠一名龍葵取汁傅之拔出根冬用乾者湯漬取汁用
之

又方

取蒼耳燒灰和醋泔濱作泥封之乾卽更塗勿住取拔根出
乃止



又方

取黑牛垢封之

又方

刮竹箭上茹作炷炙上二七壯卽消失

又方

末附子醋和傅上燥卽塗

又方

取生薺根汁一合去滓塗不過二度

丹疹第五

方二十
八首

治丹毒腫升麻搘湯方



南京中医药大学图书馆版权所有
1954

升麻

漏蘆

芒硝

各一兩

蒴藋根

五兩

黃芩

三兩

梔子

二十枚

右六味切以水一斗煮取七升冷分用漬搗常令濕爲丸

丹毒一名天火肉中忽有赤如朱塗之小乾卽塗逐手消

復合漏蘆湯以防其內其方如左

漏蘆

白斂

薰芩

白薇

枳實

炙

升麻

芍藥

麻黃

去節

甘草

炙各一兩

大黃

二兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服
治五色丹俗名油腫若犯者多致死不可輕之方

繡母豬枕頭卧卽差

又方 牛屎塗乾則易之

又方 雞子白和蒲席灰塗之

又方 捣麻子水和塗之

又方 煎羊脂摩之青羊脂尤佳

又方 赤小豆五合末水和取汁一合服滓塗五心

又方 以芸薹末雞子白和塗之

一二云芸薹葉汁服
參合溥塗丹上

又方 榆根白皮爲末雞子白和傅之

又方 燒苦竹葉篩灰和臘月豬脂塗之亦治油腫

又方 捣芸薹末封卽差止

又方 捣慎火草封之神良

又方 鯽魚五枚五寸以上者去鱗及骨一合和搗如泥

封病上厚二日易之

瘤病方

取麋鹿二肉治如厚脯火炙令熟捐掩瘤上令更炙捐可也
炙四易痛膿便愈更炙新肉用之

曰瘤方

先極搔刮以
之卽愈又取東向空禾中水熱刮瘡上洗
之二三遍卽愈

又方 磬石燒硫黃 以上二味等分末以醋和傅上

麻遊腫方

以生布一月搘油中布入油出以火然之持照病上咒曰曰

月遊遊不知羞脂火燎你頭七遍差

白遊腫方

熟搗生羊脾塗之

青白赤遊手近微痛者方

大黃 蒲黃 伏龍肝 各二兩

右三味以水和如薄粥塗之

治赤遊方

以鷹矢水和塗之三三次差

又方

胡蘿蔔灰醋和傅之日二三



南京中医药大学图书馆版权所有
1954

又方

以冷水射注

又方

大黃

紫檀

各一兩
豉一合

右三味搗細篩爲末大醋和傅之

又方

搗慎火草如泥塗之此最大良

火遊腫方

大黃慎火草和爲末塗之

又方



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

胡粉一兩和醋一合煎塗之

火遊腫流遍身赤色者入腹卽死方

以生豬肉傅上其肉蟲鳥不食臭惡故也

瘧濕第六

論二首方
三十八首

論曰夫瘧濕之爲病也或寒或寒如病瘧狀或時下痢或痢或斷或常痢不止無有時節或時睡眠有時思食而氣力漸弱日日羸瘦腹摶急頭項無力嗜卧食少試法先指作其脊上兩邊若逐指卽起如粟者卽是瘧病若不起者非是瘧也若起者可漸向上琢若起至頸骨兩邊者卽是蟲已入腦矣病難愈矣療一得二終須多炙若未入腦醫之可差



灸法

先以繩拘項向心厭頭令當齊骨下尖處卽插著轉繩
背上當脊骨插頭橫量病人口兩吻頭作定於捉繩頭
上點兩處灸必須細意點處齊平卽灸初日灸一壯滿一
日至第二七日灸二七壯第三七日卽暮灸七壯第四七日
日祗三壯第五七日日二壯看初灸二三日若灸瘡發膿者
易差五六日乃發者難差惟得食白飯首蓿苦苣蔓菁菜香
漿少許燒鹽差後百日乃可得依常食又須灌藥二遍相去
五日一灌

白葱一握
豉一升
蜀椒三合
鹽二合

右四味以水一斗煮取七升去滓煑灌之取一升乃灌也
療疳濕食口齒及下部方

飛廉蒿蜀人名

右一味燒作灰擣篩爲兩錢七著病處

忍之若不痛則非疳也特忌油膩蜜魚有人患疳食口刺痛

穿著此得差著下部中蟲如馬尾大相續出無數十日後差

二十日平復

又方 取五葉柴花草未和杏仁葷花灰相吹下部中差

疳濕方

搗五葉熟先病上拭乾內著病上差爲限所中疳者絞取汁

五合服之日三夜一



下部癰如蟲行方

真朱砂一錢石二分

銖鐵石燒

分兩

芎芻一兩

右三味搗末綿裹內下部

又方

取蝦蟆末

免矢末用之如上法

又方

以紙裹黃芩根焙火燒熟以蜜塗內下

中一切蟲痔皆愈

又方

黃連 蛇床子

各半兩

黃芩

梔子各一

右四味搗篩爲散以臘月豬脂和塗內下部中日再

又方

大黃 黃芩

黃耆

玄參各一兩

丹參三分

芍藥半兩

吳茱萸

炒五分

右七味搗篩爲散酒服方寸七日三

治瘡濕久下疳赤白百瘍不差方



无

豕

狐骨

皆陽月採灰

夢簾子

款

五月五日收

蛇頭

炙

蝦蟆

炙

蟻

皆五灰日採灰

石黛

千金作青黛

晚蠶蟻

熬

青礬

熬

丁香

麝香

蒜莫

灰

鼓緋

灰

苦參

蘖皮

乾薑

角蒿

灰

丹砂

芒硝

鐵衣

印成鹽

救月木

蝎蟲屎

桂心

麻中榮

黃礬

熬

右二十七味等分細研如粉

以筒子吹下部日二良

千金有倒挂草莊子

疳濕下蟲方

大黃

朱砂

石黛

石鹽

麝香

丁香

礬石

熬

梔子

鐵衣

黃芩子

熬細辛

生蒲

熬

蝦蟆

乾者熬

乾薑

熬

蜀椒

汗

華懋子

熬

菖蒲

熬

蝦蟆

乾者熬

生瓜

熬



故靴底炙之枯腐者
觸體骨新者不任用

右一十九味等分搗篩爲散以筒子吹藥杏仁大下部
有患瘡瘍悉傳之其丁香麝香皆別研細內藥中合之
有芥子若病大重者用灌法如左

丁香

麝香

甘草

各三

犀角

五

右四味細末如粉別以鹽三合蜀椒三合豉二合以水三升
煮取一升去滓內諸藥合和分再灌之旦一酉一

月蝕惡瘡息肉方

硫黃

一云雌黃

蘭茹

蟹螯

去翅足各一兩

篩爲散以粉瘡上乾者以豬膏和塗日三夜二



治瘡食人諸處凡足赤白痢久不差秘之方

五月五日蠅臺

一枚半熬半生作末

金銀土竭

人參灰

各五分研作各五兩

銀末大豆

麝香

一分

右五味細研如粉傅病上卽差三七

慎食甜物病者吹下部中

凡人口中生瘡不差下至咽喉胃中有三年不差者此亦是瘡食病宜塗角葛灰於病上有汁咽之不過一宿差

又方 薔薇根濃煮汁含咽三宿差

又方

大麻子

胡麻

各一升半並熟令焦赤

人翻日一熟重者更

右二味以二升瓦罐泥裹上厚一寸待乾內麻子等令滿以四五枚葷管插口出蜜泥之掘地作竈倒立瓶口中竈底



著瓦器底之蜜燒孔與地平聚炭餅四面以擊壘之日沒
放火燒之至明白開取脂適寒溫灌下部中一合尋覺
有藥氣爲佳亦不得過多多則傷人隔日一灌重者再
止曰一起灌至日夕極覺體中之勞勿恆也非惟治瘡濕凡百
異同疥癬並洗塗之無不差一云口含一丸

瘡食下部生瘡及日月食瘡方

麝香 乾薑 蟲蟲矢 姜莖灰 磐石 各三分

五月五日蝦蟆

一枚

右六味搗篩爲粉以竹管吹下部入內三寸日再

各五分

正合于全

又方

蘿蔔

兩

狼牙

兩

橘皮

兩

薑蓄

青節

是青蘿

兩或

右五味準前法用之

疳濕方

取乾羊矢一升以煖水三升漬之宿絞取矢汁和末

一顆內汗中溫之灌下部令藥停腹一日久病乃差

又急疳食鼻口數日盡欲死方

藍澱塗所食上令遍日十度夜四差止

又方 細末沒石子吹下部立差

又方 燒文蛤灰臘月豬脂和塗

又方 漏馬尿一升

治疳癩方

本草綱目不著中藥卷第廿二章

細枝葉水洗煎稠可以水筒內下部中疳痔漏皆差前
林葉汁敷洗之良

臘月蝕濕等方

臘月兔頭二枚

五月五日蝦蟆一枚

青黛兩

小薊灰

地黃葉灰名麻子大

虎頭八分

貝齒七枚

右七味爲散綿裹如棗核大內下部中亦筒吹半棗核大成
人者并華水日服五分七隔日一服

論曰患濕惡蟲多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中
而遇暑濕涼氣者多生此病病亦有燥齧不甚洩痢而下部瘡
瘻不問燥濕久則殺人爲病診齒無色舌上盡白甚者滿口有

瘡四肢沈重喜眠如此者此爲蟲蝕其肛腸爛盡見五藏即
矣治之方

黃連

生薑

各十兩
切艾葉八兩
苦參四兩

右四味㕮咀以水一升煮取三升爲三服日三久者三劑良
凡濕匱欲得冷而苦痢單煮黃連及艾葉苦參之屬皆可得用
燠懷散主濕匱瘡爛殺蟲除熱方

葎蘆

青葙

女青

菟仁去皮尖二兩
雙仁熬雷丸各二兩

七酒服亦得

濕匱神方

萹蓄半兩

右六味搗篩爲散粥飲服方寸七日三稍增至一



取生薑刮去上皮斷理切之搗極熟取汁一升五合又以水一升五合和合相得旦空腹服之仍刮生薑二枚如指大柳葉茱萸數重裹之塘火中燒之令極熱內下部中須臾濕盛者頻三日作之無有不差

陰蝕瘡方 蒲黃一兩 水銀一兩 右二味熟研令散以粉瘡二五

月六月七月食特忌肥濃慎之者卽免此

又方 肥豬肉三十斤并得陰肉雜用益良以水二石煮取熟訖去肉以湯汁內大盆中以自洗冷卽易不過四遍

殺九蟲散主寒疝心痛及蟲噉心痛方

藿蘆

貫眾

乾漆各二兩熬

狼牙硝

右四味搗篩爲散以羊腎和服之合冒三日下矣

治熱心中懊憹方

藿蘆半
乾漆熬

萹蓄各三分

右三味搗篩爲散粥飲服方寸七日三

治蟲痛方

蒸乾漆末之蜜和丸如桐子飲服十丸日三

又方

燒槐木耳灰水服東大差不止飲一盞熟湯立有蟲出

有人患心腹脹滿不能食飲至於死有人教取羊子肝搘蒜薤
服之逐轉下五升如粉粥寸寸皆是蟲即差此人口中生瘡名



日乾渴以此療之得差百日內必不得食醬食醬卽發常食蒜
薑半日服至日西卽下其薑須和調作不同尋常食薑也

臘痔第七

方三十論一首

癩痔方

臘月牛脾一具炙熟食之令盡卽差

又方 牛脾一具熟煮空腹食之盡勿與鹽醬等一具不差更
與一具從旦至未令盡

治外痔方

麻子四升搗生布袋盛飯下蒸之絞取脂銅盤盛煖之以綿
貼子坐使正當蒸痔孔須臾易之更坐蟲出



又方

搗麝齋絞取汁瀝麪作餌飪空腹喫日三頓常食之良

療痔方

桑耳切三升水一斗五升煮取三升日服一升日

三日服一劑

又方 桑耳作羹臘調和令美空腹不飯取飽不過二頓差

又方

蝟皮

一具

乾地黃

伍連翹子

槐子

當歸

乾薑

附子

炮

續斷

礬石

燒

黃耆

各二

右一十味擣篩爲末鍊

蜜丸如梧子飲服十五丸日二稍加至三十丸兼主漏

又方

取生槐白皮十兩熟搗丸如彈丸綿裹內下部中長喫

萹蓄菜及煮汁作羹粥食之大佳

治下部癢痛繞緣腫起內欲生肉突出方



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

大豆

三升水七升急火煮取四升

槐白皮金作三升

甘草炙三升

右以大

切六升于三兩

豆汁取二味取二升漬故帛薄之冷則易之日三五度

槐白皮膏主下部癢痛痔瘡方

槐白皮

五兩

赤小豆二合

棟實

菟仁各五

當歸三

白芷十枚

兩

甘草

各二兩

右七味以成

熙豬脂一

觔微火煎白芷色黃去

津摩病上兼導下部中

一千五百分

兩小異

療痔方

取故鑿

一枝燒作灰

以井華水空腹服

一分三

又方

取地黃末傅下部中

一日三夜一良

又方

乾薑

芫花

蜀椒各一

兩半汁

豬懸蹄

十枚燒

附子

三枚炮

大黃

牡蠣熬桂心各半

甘草一兩

芍藥

白薇

白斂

大黃

牡蠣

桂心

甘草炙兩

大黃

牡蠣

桂心

甘草炙一兩



右十二味搗篩爲散酒服方寸匕日一

療治下部出膿血有蟲傍生孔方

取槐白皮一擔以水煮令熟擣出置木盆內坐其中欲大
狀蟲悉出冷復易之不過二三度差

又方 煮槐梗汁洗之

又方 煮桃根汁洗之

諸痔去血過多氣急懶不下食或腹痛大孔下部痛當歸湯
方 當歸 乾薑 桂心 甘草各三兩炙八兩 牡丹 白芷

附子

炮

芍藥

人參

各三兩

乾地黃

四兩

右十一味㕮咀以

水一斗煮取三升三合去滓內糖令消分爲四服

諸大去血積日虛乏內補湯方

人參

續斷

白芷



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

芍藥

附子

炮當歸

甘草

各二兩
炙桂心

茯苓

乾薑

芍藥

乾地黃

五味子

麥門冬

去心各三兩

大棗二十枚

去核

右十五味

㕮咀以水一斗煮取四升分四服

諸痔下血蒲黃湯方

蒲黃一升

當歸

白芷

白石脂

各二兩

黃連

芍藥

甘草

各二兩

乾地黃

右八味

㕮咀以水一斗

煮取三升分三服

諸痔去血大虛黃耆湯方

黃耆

當歸

芍藥

各三兩

龍骨

芍藥

桂心

各四兩

糖

一附子

炮

甘草

各二兩

右九味

㕮咀以水一斗煮取三升

二合去滓入糖令消分

五服

槐子丸主燥濕痔瘻有雌雄皆主之方



南京中医药大学图书馆版权所有

槐子

吳茱萸根皮

乾漆

各四兩
熬

蒺藜

各二兩
熬

秦艽

各一兩
熬

黃芩

牡蠣

熬

雷丸

白芷

龍骨

黃耆

各二兩
炮去皮

桂心

丁香

各一兩
炒去皮

青木香

八角茴子

各二兩
炮去皮

右一十五味搗篩爲末

各二兩
白斂

金有

土元

大丸

各一兩
白斂

小槐實丸主五痔十年方

槐子

各三十

白糖

二錢

礬石燒

而驗

硫黃

各一

龍骨

大黃

乾漆

各十

兩
炒去皮

右七味搗篩四味其礬硫及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁以和藥令作丸併手丸之如梧子陰乾酒服二十丸日二稍增至三十九

槐子酒主五痔十年不差者方

槐東南枝

細切一石



槐白皮

細切一
千金無

石槐東南根

細剉三石
槐子一斗

右四味以大金中安十六斛水煮取五斛澄取清更煎熬
石六斗炊兩斛黍米土麴二斗釀之攬令調封泥七日
取清飲適性常令小小醉耳合時更煮淬取汁淘米洗器
得用生水作酒須知此藥忌生水故也

王痔神方 七月七日多採槐子熟搗取汁重綿絞之內銅
器中著中庭高門上暴乾之二十日以上煎成如鼠屎大內
穀道中日二亦主癩及百種瘡

又方 取三具鯉魚腸以火炙令香以綿裹之內穀道中一
食頃蟲當出魚腸數數易之盡一枚便差

又方 炙魚腸令香坐上蠭卽出

又方 虎頭骨炙犀角末

右一味各末之如雞子大以不中水豬膏和全

治痔方 取八月槐子搗取汁煎作丸塗之

又方 取熊膽塗之取差止但發卽塗

又方 以紙裹小爪或是木爪以泥裹厚三四分塘火埋燒之令大
熱經宿勿食使大饑開取承熱任意飽食之覆煖卧一炊久
其痔永差

五痔方 五月五日收蒼耳莖葉搗爲末水服方寸七日三差
採時陰乾 又方土燒生角鯪末酒服方寸七日三

宗服瀉黃方廿七日三良

凡人大便有血即是一時多得食之傾乾毒油膩猪
脂在身所服名藥皆不得力徒乘功夫一無所益欲服
之乃可服也第一槐子仁丸大有效驗方在前篇中必
服之勿致疑也

治脫肛方 濟瘻二味以豬脰和傅肛門上內之日二

愈

又方 腸出不入生地梗根取汁猪脂膏等分湯上溫內之差
又方 以鐵精粉土兩之每用即粉取差止

於癰第八四首方二十一

論曰癰瘡疥癬百瘡諸蟲若不速愈二年不差便爲惡疾何者
諸蟲極盛藥不能當所以須防之不可輕也凡療疥瘡黃耆酒
中加烏蛇脯一尺烏頭附子茵芋石南莽草各等分大秦丸
亦相當干金云小秦丸散
中加烏蛇肉一兩

香瀝主燥濕癬及癰瘡百瘡方

沉香

松節

各一觔一方
更有柏節杉

節各一觔

右二味破之如指大以布袋盛之令置麻油中半食

久取一口塞耳穿底令孔大如雞子以松葉一小把籍孔上

以耳安著白盃上以黃泥耳固濟令厚五分以藥內耳中以
生炭著藥上使然其瀝當流入盃中然盡乃開出耳取汁以
傳瘡上日再并治白禿疽惡瘡皆差當服秦芄散卽差

礬石瀝主乾濕癩及惡瘡白堊方

礬石 硫黃 芒硝

大鹽各三
分

松脂 白糖各八
兩

右六味切諸藥令如指大

走

取甌蔽仰銅器上內甌中以藥安破上以松脂白糖布織
都訖重以大蔽覆之臨用小溫塗瘡上日再

治癬秘方

搗羊蹄根著甌器中分以白蜜和之臨用刮瘡

四邊令傷先以蜜和者傅之如炊二石米願拭去更以三年
大酢和之以傅癬上燥便差若刮瘡處不傷卽不差或作
大蒜

治久疥癬方

丹砂 雄黃 雌黃 亂髮洗淨 松脂

白蠟各一
兩

巴豆十四枚去皮 豬膏升 蘭茹三兩

右九味先煎髮令

消盡內松脂蠟等三上三下去滓末蘭茹石藥等內中更一



北京中医药大学图书馆版权所有

水沸正傳之三四度差

千金用蜜

治久癬不差方

細研水銀霜如粉和蠟月豬膏先以油

洗癩拭乾塗之一塗卽差後時重發更塗卽永差塗時大

薄慎勿厚也

又方

水銀

礮石

蛇床子

黃連

右四味各一兩臘

月豬膏七合和攪不見水銀爲熟傳之治一切無問幼小諸

又瘡

一切塗瘡頭
加蘭茹一兩

治諸瘡癬療不差

水銀

一猪膏臘月者

一勑千金
作五勑

右二味以鐵器中壘寵用馬通七日七夜炊之停冷取豬膏去水銀不妨別用以膏塗一切諸瘡無不應手卽差

又方

特牛尿

一升
干金作半升
牛

羊蹄根

切二升
金作五升

右二味內羊蹄瀆一宿日累之乾則內尿中瀆一宿更累

盡止搗作末塗諸瘡癬上和豬膏用更精

又方

諸瘡疥皆單用水銀豬膏研令極細塗之

又方

取生烏頭十枚切煮取汁洗之卽差

治癬方

洗淨瘡取醬瓣尿和塗之差止

千金方云 醬瓣雀屎
和傅之一作尿和

又方

水銀 猪膏

右二味酥和塗之卽差

千金作水銀
黃和酥傅之

又方

正月中午時炙病處影上二姓炙之呴曰癬中蟲毛茸

針若欲療待日中

又方

取酥墨塗之

千金酥
作蒜

凡諸瘡癬初生時或始痛癢卽以種種單方救之或嚼鹽金之



又方 取鯉魚鮓椹塗之

千金作以鯉魚鮓移傳之

又方

取薑黃塗之

又方

取半李子汁塗之

治癬方

取黃葛穗作末粉傅上日三夜二一切濕癬並差

又方

取八月八日日未出時令病人正當東向戶長跪平舉

兩手持戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中炙之兩火俱下
各三壯若七壯十日愈

又方

擣刺蘆汁服之

又方

服地黃汁佳

又方

服驢尿良

又方

擣黃芩蜜和封之良

又方

熱榻煎餅不限多少日一遍薄之良

又方

酢煎艾塗之差 又方 擣羊蹄根和乳塗之



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

又方 大酢和雄黃粉先以新布拭之令癬傷傳之妙

治癰疥百瘻經年不差方

棟實升 地榆根 茄皮

苦參

各五兩

右四味以水一斗煮取五升稍溫洗之日

治癰疥濕瘡浸淫日痛癢不可堪搔之黃水汁出差復發方

取羊蹄根勿令婦女小兒貓犬見之淨去土細切熟熬以大

酢和淨洗傅瘡上一時間以冷水洗之日一傅凡方中用羊

蹄根皆以日未出時探者佳

又方 作羊蹄根散瘻時搔汁出以粉上又以生根揩之神驗

療渴利後發瘡坐處瘻疥及疵癬方

薔薇根

石龍芮

芍藥

雀李根

黃蘖

黃芩

各三兩

當歸 繢斷 黃連 大黃

各一兩

桔梗

四兩

苦參

黃耆

各二兩

右一十三味搗篩鍊蜜和以飲服之丸如梧子大一服十五丸日三加至三十丸瘡差乃止所是癰疽皆須服之

于金玉堂

又云 赤小豆

一升熬內
中如此七返

人參

甘草

炙

瞿麥

白斂

當歸

黃芩

豬苓

各二兩

防風

一兩

黃芪

薏苡仁

各三兩

升麻

四兩

右一十二味搗篩爲散飲服方十七日三夜一

治瘻疽諸瘍方

水銀

胡粉

各一兩半

黃連

二兩

黃蘖

七分

礬石

附子

各三兩

蛇床子

半兩

苦參

一兩

右八味下篩六種水銀胡粉別以豬脂研令水銀減不見乃以豬膏和研令調如泥以傅瘍上日三夜一

代指第九

方六首

治代指逆腫方 以毛雜黃土作泥泥指上令厚五分內塘麻
中令熱可忍之泥乾卽易之不過數返卽差

又方 單煮地榆作湯漬之半日便愈

治代指方 麻沸湯內指其中卽愈

又方 先刺去膿血炙魚鮮皮令溫以繩指周匝痛止愈

治指疼欲脫方 取豬脂和薑末稍令熱內指甲中食頃卽差

治指掣痛方 取醬清和蜜日多少溫塗之卽愈

濕熱瘡第十

方三十四首

治濕熱諸惡瘡方 芍藥二兩

大黃 白芷 各三兩

狼牙 黃藥

各三兩

黃藥



南京中医药大学图书馆版权所有
1964

丹參

各五兩

右六味切以水四升煮取一升半以洗之日三度

治濕熱瘡多汁粉散方 萸芻 大黃 白斂 芍藥 薑連

甘草

龍骨

各一兩

右七味搗篩爲散以粉瘡上日三度

又洗之方

茵芋

莽草

各三兩

蛇床子

躄躅

石南

礬石

各二兩

右六味切以水一斗煮取五升洗瘡日再

治惡瘡三年不差方

巴豆

去皮

甘草

右二味等分細下爲散

先別煮甘草湯洗瘡訖以藥傅之先從四面

日三夜一

治惡瘡似火爛洗湯方

取白馬矢燥乾以水和煮十沸綾取汁洗之極佳

治惡瘡十年不差似癩者方

蛇蛻皮

一枚

右一味燒之末下篩以豬脂和傅之良

又方 苦瓠

一枚

右一味㕮咀煮取汁洗瘡日三度洗煎以洗

癬甚良須先以泔清洗瘡也

治諸惡瘡烏頭膏方 烏頭 雄黃 雌黃 荀蕪

升麻

各半兩

杏仁

三十枚

胡粉

一去皮

巴豆

七枚去皮

黃連

一分

黃藥

各半兩

亂髮

松脂

各如雞子一枚

及已

三分干金作乃已

右一十三兩切以

豬膏

三升急煎令亂髮消盡去滓停小冷以真朱二錢七投

中攬令相得以傅之凡用膏皆令先溫酢泔清洗瘡拭乾乃

傅之訖以赤石脂黃連散粉之此治諸惡瘡皆差

干金有竹灰水銀蠟

梔子湯主表裏俱熱三焦熱實身體生瘡發卽大小便不利方



大黃四兩

梔子仁二七枚

黃芩三兩

芒硝知母

甘草各二兩

各二兩

右六味㕮咀以水五升煮減半下大黃煮取一升入八合鹽

津內芒硝分爲三服

又方

礬石、蠟、松脂、亂髮

右四味各半兩猪脂四

兩煎之令髮焦內礬石令消內松脂次內蠟去滓先刮洗瘡
以塗之日再三不痛久瘡時愈新瘡遲愈瘻瘍頭禿皆卽愈
生髮此膏勝飛黃膏及諸名藥

治諸瘡久不差共療六畜方

棗膏三

右一味以水三斗煮取一斗五升數洗取差爲度

治身瘡及頭瘡不止方

以菖蒲末傅之日二夜一

治濕熱瘡惡瘡洗湯方

槐子二升 蛇床子一兩 黃連五兩 當歸當歸 茜藥黃藥 各三兩

各三兩

右六味切以水三斗煮取一十五升去滓以洗瘡日三度

治濕熱瘡方

生地榆二觔

右一味以水三斗煮取一斗五升以洗瘡日三度

烏膏主種種諸瘡治不愈方

水銀一兩 黃連二兩 級墨半兩

右三味末之以不中水豬脂和傅之不過三四度神効欲多任人惟不治金瘡其藥惟須熟研

瘡黃水出流方 燒故鞍屨氈灰和臘月豬脂封塗

又方 黍蘆 武豆 右一味等分燒灰和臘月豬脂封塗

又方

松脂

灰
薰陸香

各五分

生地黃

汁合

白羊脂

石鹽

亂髮灰

各半兩

右六味以豬脂一升煎取五合內地黃

成膏去滓貼之日再

治癰瘡癰瘍方

杏仁

去皮巴豆各二兩

黎蘆

黃連

各一兩

水銀

一錢許

右五味以青羊脂和研水銀令減先以鹽湯洗

之去上痂傅瘡日三

時氣病後得風生瘡疼搔之黃汁出方

皂莢

炙烏頭

礬石

各三分

黃連

一升

牡蠣

四兩

黎蘆

桂心

各二兩

右七味切以水一斗煮取七升去滓先搔瘡令血出溫洗瘡

緩浸良久佳

卒患發熱瘡方 取炭長二尺者一枚燒令赤置地中以水一升灌之取地上汁洗瘡即差

瘡中惡肉出方

取烏梅顆燒作灰傅瘡中其瘡中惡肉乃盡矣

治惡瘡方 取白芨煮汁洗瘡訖傅膏膏用桑東向枝作末以臘月豬膏和塗之亦主狗瘡初大痛一宿即愈

瘡初患似癧後破無痂疼痛難忍名曰豬喙瘡方

燒豬鼻作灰傅之差

友花瘡方 煎柳葉爲煎塗之差

又方 燒馬齒草灰傅之

又方 燒鹽末灰傅之



又方 以蜘蛛幕裹之

王不留行湯主白禿及頭面久瘡去蟲止痛方

王不留行 杞東南枝 茄萸根皮 各五錢
蛇床子 滾熟

牡荆

苦竹葉

切各三升 大麻仁一升

右八味㕮咀以水二斗半

者取一斗洗瘡日再并治癰疽及月蝕瘡爛

治白禿瘡方

三月三日桃花開者陰乾

赤桑根 桔子

分

右三味爲末豬脂和先以灰汁淨洗禿處拭乾塗之

又方

細柳枝

水銀

皂莢

炙

右三味以醋煎如錫塗之

松脂膏主白禿及癰疽百瘡方

木蘭皮

兩

礬石

杜蘅

雄黃

附子

大黃

石南

秦艽

真珠

苦參



水銀各三兩金各一兩松脂陸兩

右十二味㕮咀以酢漬一宿

膏一斤半煎之候附子色黃去滓乃內磐石雄黃水銀

穴煮三沸安潔地待凝以傅瘡日三

又方

以牛肉作五味脯炙令香及熟搗瘡不過三四度卽差

千金作羊肉

治頭瘡腫方

燒杏仁令黑磨塗復取東柴葛蔓及乾魚頭燒灰和熏黃臘

月豬脂塗之

千金翼方卷第二十四

千金翼方卷第二十五 色脈

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正
明翰林院檢討國史纂修官王肯堂重校

內閣撰文中書舍人加四級金匱華希閔校刻

診氣色法第一

診脉大意第二

診四時脉第三

診寸口脉第四

診關上脉第五

診尺中脉第六



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

診雜病脉第七

診氣色法第一

夫爲醫者雖善於脈侯而不知察於氣色者終爲未盡要妙故曰上醫察色次醫聽聲下醫脉侯是知人有盛衰其色先見於面部所以善爲醫者必須明於五色乃可決生死定狐疑故立候氣之法冠其篇首焉

肝受病色青 心受病色赤 脾受病色黃

肺受病色白 腎受病色黑皆先視於本色

春面色青目色赤新病可療至夏愈

夏面色赤目色黃新病可療至季夏愈

季夏面色黃目色白新病可療至秋愈

秋面色自白色黑新病可療至冬愈

冬面色黑色青新病可療至春愈

論曰此四時王相本色見故療之必愈夫五臟應五行若有病則因其時色見於面目亦猶灼龜於裡吉凶之兆形於表也扁鵲云病人本色青欲如青玉之澤有光潤者佳面色不欲如青藍之色若面白目青是謂亂常以飲酒過多當風邪風入肺絡於膽膽氣妄洩故目青雖云天救不可復生矣

病人本色赤欲如雞冠之澤有光潤者佳面色不欲赤如赭土若面赤目白憂恚思慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十



病人本色黃欲如牛黃之澤有光潤者佳面色不欲黃如橘
黃土若面青曰黃者五日死

病人著牀心痛氣短脾竭內傷百日復愈欲起衡徨因坐於地
其亡倚牀能治此者是謂神良

病人本色白欲如璧玉之澤有光潤者佳面色不欲白如璽若
面白目黑無復生理也此謂酣飲過度榮華已去血脉已盡雖
遇岐伯無如之何

病人本色黑欲如重漆之澤有光潤者佳面色不欲黑如炭若
面黑目白八日死腎氣內傷也

病人色青如翠羽者生青如草滋者死

赤如雞冠者生赤如衃血者死

黃如蟹腹者生黃如枳實者死

白如豕膏者生白如枯骨者死

黑如烏羽者生黑如炲煤者死

凡相五色面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑皆不死

病人目無精光及齒黑者不治

病人面失精光如土色不飲食者四日死

病人及健人面色忽如馬肝望之如青近之如黑必卒死

論曰夫五色者五臟之華也故天晴明時覩萬物辨白黑審長



短若五色不分長短乖錯此爲錯亂故人亦然
黃帝問伯高曰察色知病何如伯高曰白色起於兩眉間薄者病在皮膚膚色青黃赤黑者病在肉榮氣蒸然者病在血脈目色青黃赤白黑者病在皮耳焦枯受塵垢者病在骨問曰病狀如是取之奈何伯高曰皮有部肉有柱氣血有輪筋有結骨有屬經曰皮部在於四肢肉柱在於臂腋諸陽分肉之間及少陰分肉之間氣血之輸在於諸經絡脉氣血留居則盛而起筋部無陰陽左右唯疾之所，在骨之屬骨空之間所以受津液而益腦髓若取之者必須深病間甚者也閒者淺之少之甚者深之多之隨變而調之故曰上工經言知一藏爲下工知二藏爲

中工參而知之爲上工上工十全九中工十全六下工十全三
此之謂也

雷公問曰人有不病而卒死者何以知之黃帝曰大氣人於府者不病而卒死矣

雷公問曰病少愈而卒死者何以知之黃帝曰赤色出於兩權上大如拇指者病雖少愈必卒死矣黑色出於顏貌大如拇指者必卒死顏貌者面之首也顏當兩目下也貌當兩目上眉下也

扁鵲曰察病氣色有赤白青黑四氣不問大小在人年上者病也惟黃氣得愈年上在臍上兩目間如下黑氣細如繩在四墓發反兩權骨上者死或冬三月遠期至壬癸日逢年衰者不可



理病者死四墓當兩眉坐直上至髮際左爲父墓右爲母墓從口吻下極頤名爲下墓於此四墓上觀四時氣

春見青氣節盡死

夏見赤氣節盡死

夏秋見白氣節死

春見白氣至秋死

夏見氣暴死黑氣至冬死

秋見赤氣節盡死冬至後甲子日死

冬見赤氣暴死見黃氣至長夏死

論曰凡病黃色入鼻從口入井竈百日死井在鼻孔上曲中是



竈在口吻兩傍上一寸是若入者丙丁日死

凡人死色易驗但看年上有黑色橫度者此人不出百日死
天中從髮際兩裏皆發黑色此人三年死天中當鼻直上至髮際是也若權骨上發黑色應之者二百日死

目下有黑色橫度年上者不出三十日死黑色入口應天中者不出一年死

若天中發死色年上命門上竝黃色者未好半惡也以天中爲主五年內死天中發黑色法三年內死所以然者有二處得主故五年死

凡天中發黑色兩權上發赤色應之者不出六十日兵死若年

上發赤色應之者不出三十日死若命門上發赤色應之者不出百日市死婦人產死兵死同氣從命門入耳年上死赤色從眉衝下入目五日死或丙丁日死

黑色在左右眉上一日死或壬癸日死

赤色入口三日死遠期丙丁日死

黑色從天中及年上入目三日死或壬癸日死或二三日死或百日半年死

青色如鍼在目下春死或甲乙日死

黃色入目匝四邊戊己日死

黑色準上行或入目期壬癸日死遠期二十日死若入耳鼻三



目死
準上者當鼻上也。謂在
死壽上年上下降接相次

黃色橫兩確入鼻一年死

黑色如拇指在眉上不出一年暴死一云三年

赤色如馬黑色如烏見面死

在口傍左右也。
右名馬左名烏。

黑色從眉繞目死

赤色在口兩傍死

黑色如深漆綺曰或白色皆死

黃帝問扁鵲曰人久有病何以別生死願聞其要對曰按明堂

察色有十部之氣知在何部察四時五行王相觀其勝負之變
色入門戶爲凶不入爲吉白色見衝眉上者肺有病入闕庭者



夏死黃色見眞上者脾有病入口者春夏死青色見人中者肝
有病入目者秋死黑色見權上者腎有病入耳者六月死黑
見頤者心有病入口者冬死所謂門戶者闕庭肺門口目
戶耳腎門戶口心脾門戶皆有色氣入者皆死黃帝曰善

問曰病而輒死甚可傷也寧可拯乎對曰藏實則府虛府實則
藏虛以明堂祀面色以鍼補寫調之百病卽愈鼻孔呼吸氣有
出入出爲陽入爲陰陽爲府陰爲藏陽爲衛陰爲榮故曰人一
日一夜一萬三千五百息脈行五十周於其身漏下一刻榮衛
之氣行度亦周身也

夫面青者虛虛者實之補虛瀉實神歸其室補實瀉虛神捨其

虛眾邪竝進大命不居黃帝曰善此取故知之重病

五寶未見

六虛者皮虛則熱脉虛則驚肉虛則重骨虛則痛腸虛則
髓虛則憊

仲景曰鼻顏色青者腹中冷若痛者死鼻頭色微黑者有水氣
色白者無血色黃者胸上有寒色赤者爲風色青者爲痛色鮮
明者有留飲

又仲景曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節閒病言聲喑喑然不
徹者心膈間病言聲啾啾細而長者頭中病一作痛

診脈大意第二

問曰手足三陰三陽十二經皆有動脈而獨取寸口者何也扁鵲曰晝夜漏下百刻凡一刻一百三十五息十刻一千二百五十息百刻一萬三千五百息脉行五十度周於身漏下百刻榮衛行陽二十五度行陰二十五度合五十度爲一周而復會於手太陰手太陰者寸口也寸口者五藏六腑氣血之所終始故法取於寸口也脉有尺寸者從關至尺是尺內陰之所治從關至魚是寸內陽之所治寸口位八分關上位三分尺中位八分合三部一寸九分寸口關上爲陽陽脉常浮而速尺中爲陰陰脉常沈而遲初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺脉也如六菽之重與血脉相得者心脉也如九菽之重與肌肉相得



者脾脉也如十二菽之重與筋乎者肝脉也按之至骨舉指系疾者腎脉也

凡診脈當視其人大小長短及性氣緩急稱其形性則吉凶性相乖則凶何則人大而脈細人細而脈大人樂而脈實人苦而脈虛性急而脈緩性緩而脈躁人壯而脈細人羸而脈大此皆爲逆逆則難治反此爲順則爲易治

凡婦人脉常欲濡弱於丈夫也小兒四五歲者脉自疾駛呼吸八至也

凡春脉細弦而長夏脉洪浮而長來疾而去遲秋脉微浮而散冬脉沈滑而寶季夏脉洪而遲

凡心肺二脉大率俱浮何以別之浮而大者心也浮而短者肺也凡肝腎二脉俱沈何以別之率而長者肝也按之濡舉指來實者腎也遲緩而長者脾也

夫人受氣於穀穀入於胃乃傳於五藏六腑五藏六腑皆受氣於胃其清者爲榮濁者爲衛榮行脈內衛行脈外陰陽相貫如環之無端故曰胃爲水穀之海主稟四時故皆以胃氣爲本

凡人病脉不病名曰內虛脈病人不病名曰行尸死不治

夫平和之脉不緩不急不澀不滑不存不凸不長不短不低不昂不縱不橫此爲平也無病尺欲小大關欲小實老人脉欲微陽羸於陰者平也

夫按之不足舉之有餘名曰浮浮陽也

撮之去來促急名曰數數陽也

按之如琴瑟絃三關通病梗梗無有屈撓名曰弦弦陽也

按之如動珠子名曰滑滑陽也

按之實強其脈有似沈伏名曰牢牢陽也

按之浮大在指下而滿名曰洪洪陽也

按之洪大牢強隱指名曰實實陽也

脈見於關上無頭尾大如豆厥厥搖名曰動動陽也

右件八條皆陽脈也

按之有餘舉之不足名曰沈沈陰也



按之無舉之來兩傍實而中央空名曰芤芤陰也

按之遲小名曰細細陰也

按之短實而數有似切繩狀名曰緊緊陰也

按之依依名曰緩緩陰也

按之大遲名曰虛虛陰也

按之短小不至動搖若有若無或復浮薄而細急輕手乃得重手不得名曰微微陰也

按之乃得舉之無有濡而細名曰弱弱陰也

按之盡牢舉之無有不前不卻但出不入如魚接食動中名曰遲遲陰也

遲遲陰也



按之無有舉之有餘或如帛衣在水中輕手與肌肉相得而裸
名曰濡濡陰也

按之促數浮短如刮竹皮輕手乃得重手不離其處或多一
少曰名曰涩涩陰也

按之來數時一止名曰促促陰也

脈來動而中止按之小數中能還者舉指則動名曰結結陰也
不死

脈動而止不能自還因而復動名曰代代陰也代者死

右件一十四條皆陰脉也

脈有相薄者寸口微而尺中弦此爲相薄也或但寸口微而弦

相薄也

卷二十一

沈與伏相類

濡與弱相類

弦與緊相類

浮與芤相類

牢與實相類

微與涩相類

遲與緩相類

滑與數相類

凡脉出爲陽入爲陰來往之間爲脾大陰也

凡脉浮滑長皆爲陽沈澀短皆爲陰也

脉有一陰一陽者脉來沈而滑也一陰二陽者脉來沈滑而長也一陰三陽者脉來浮滑而長時一沈也一陽一陰者脉來浮而澀也一陽二陰者脉來長而沈澀也一陽三陰者脉來沈澀而短時一浮也



脉有伏匿者謂陰陽更相乘伏也若脈居陰部反陽脈見爲陽乘陰也雖陽脈時沈澀而短者此爲陽中伏陰也脈居陽部陰脈見爲陰乘陽也雖陰脈時浮滑而長者此爲陰中伏陽故重陰者癲重陽者狂

脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者謂之太過減者謂之不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脉關之後者陰之動也脈當見一寸而沈過者謂之太過減者謂之不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脉是真藏之見也得此諸脉人不病自死寸脉下不至關爲陽絕尺脉上不至關爲陰絕此皆死不治欲決

死生富以月節期之

脉有相乘有縱有橫有逆有順何以知之水行乘火金行乘水
名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰
逆金行乘水木行乘火名曰順也

夫欲知人病將愈當診其三部之脉大小遲疾浮沈正等雖有
寒熱不解然陰陽已平知當愈也

夫病者發熱身體疼痛此爲表有病其脉當浮大今脉反沈遲
故知當愈病卒腹中急痛此爲裡有病其脉當沈細今脉反浮
次故知當愈然此二脉其人不卽愈者必當死以其病與脉相
反也

夫脉者血之腑也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少短而急者病在長而緩者病在下弦而沈者病在內浮而洪者病在外脈實病在內脉虛者病在外滑而微浮病在肺下堅上虛病在脾胃長而弦者病在肝脉小血少病在心大而緊者病在腎

凡脉腑爲陽主熱藏爲陰主寒陽微自汗陰浮自下陽數卽口瘡陰數卽惡寒陽數出血陰涩下血脉與肌肉相得久持之至者可下之

夫脉有三部陰陽相乘榮衛氣血任人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作効象形容春弦秋浮冬沈夏

洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或有或凹病輒改易進退低昂心迷意惑動失矩綱領爲具陳令得分明師曰子之所問道之根源脉有三部尺寸及關榮衛流行不失衡銓醫沈心洪肺浮肝弦此自經常不失鉛分出入升降漏刻周旋水下二刻一周循環常復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沈潛水畜支飲急弦動卽爲痛數卽熱煩設有不應知有所緣三部不同病各異端太過可怪不及示然邪不空見終必有奸審察表裡三焦別焉知其所舍消息診看料度藏腑獨見若神爲子條記傳

與賢人

凡療病當察其形氣色澤脈之盛衰病之新故乃可療之形氣相得色澤以浮脉順四時此爲易治形氣相失色天不澤脈實堅甚脉逆四時此爲難療

夫形盛脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胸中氣多者死形氣相得者生三五不調者病

夫關前爲陽關後爲陰陽出陰入以關爲界陽數則吐陰數則下陽弦頭痛陰弦腹痛

診四時脉第三

春肝木王其脉弦細而長者乎脉也反得微浮而短涩者是肺之乘肝金之克木爲賊邪大迺十死不 反得浮大而洪者是

心之乘肝子之乘母爲實邪不治自愈反得沈濡而滑者是腎之乘肝母之歸子爲虛邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘肝土之畏木爲微邪雖病不死

夏心火王其脉浮大而洪者是平脉也反得沈濡而滑者是腎之乘心水之尅火爲賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母爲實邪不治自愈反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子爲虛邪雖病當愈反得微浮而短澀者是肺之乘心金之畏火爲微邪雖病不死

季夏六月脾土王脉大穰穰而緩者爲平脉也反得弦細而長者是肝之乘脾木之尅土爲賊邪大逆十死不治反得微浮而

短澀是肺之乘脾子之乘母爲實邪不治自愈反得浮大而洪者是心之乘脾母之歸子爲虛邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘脾水之畏土爲微邪雖病不死

凡脾脉王則不見衰時卽見

秋脉金王其脉微浮而短澀者是平脉也反得浮大而洪者是心之乘肺火之尅金爲賊邪大逆十死不治反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之乘母爲實邪不治自愈反得弦細而長者是肝之乘肺母之歸子爲虛邪雖病自愈反得洪大而緩者是脾之乘肺木之畏金爲微邪雖病不死



土之逆水爲賊邪大逆土不治反得弦細而長者是用之乘腎子之乘母爲實邪不治自愈反得微浮而短澀者之乘腎母之歸子爲虛邪雖病自愈反得浮大而洪者是乘腎火之畏水爲微邪雖不死

診計口脈第四

寸口緊者中風風頭痛亦爲傷寒頭痛
寸口沈而橫者脇下有積腹中有橫積痛
寸口浮大而實宿食不消浮滑亦然

寸口沈而緊寒結在心下痛千金云沈而緊者心下有寒時時痛有積邪
寸口沈滑胸中有水氣面目腫有微熱名爲風水

寸口沈而弱寒熱痼瘕少腹痛

寸口微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汁出

寸口弱而弦胸中脇下腰背竝痛

寸口雙弦脇下拘急而痛濇濇而寒

寸口弦緊而細痛在心下

寸口洪而大傷寒熱病兼胸脇下滿痛

寸口細沈滑者有積聚在脇下左右背漏背相引痛

寸口細而數數卽發熱細卽反吐

寸口緩而數者中風

寸口沈而喘則寒熱



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library
1951

寸口盛而緊者傷於食也

寸口急痛瘦少腹痛

寸口浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中寒出陰氣不通臂不能舉

寸口脈壯大尺中無有此爲陽干陰病苦腰背痛陰中傷足脰寒

寸口偏絕者則臂偏不其人兩手俱絕者不治

寸口脉弱而遲弱卽衛氣微遲卽榮中寒榮爲血血寒卽發熱衛爲氣氣微卽心中饑餓而虛滿不能食

寸口脉弱而緩弱則陽氣不足緩卽胃氣有餘噫而吞酸食卒
不下氣填於膈上一作下

寸口脉微而弱微卽無氣弱卽血不足血不足卽不能呼氣
足則不能吸呼吸不足則胸滿短氣

寸口脉微而澀微卽衛氣不行澀卽榮氣不逮榮衛不能相將
三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足卽瘡而煩滿口卽難言衛
氣虛卽惡寒而數欠

寸口脉微而澀微卽衛氣衰澀卽榮氣不足衛衰其色黃榮不
足其色青榮爲根衛爲葉榮衛俱微卽根葉枯槁而寒慄欬逆
唾腥吐涎沫

寸口脉微而緩微卽衛氣疎疎卽其膚空緩卽胃氣足足卽穀消而水化穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必疎三焦絕經名曰血崩

寸口脉微而數微卽爲風數卽爲熱微爲風風卽汗出數爲熱振而寒慄

寸口脉微而遲尺脉沈卽爲血滑卽爲實血實內結入絡胸臆肺痿色薄不能喘息而心堅脫色口不能言肝舉筋厥四逆不識人

寸口脉微而濡濡卽爲弱微卽爲寒濡卽惡寒弱卽發熱濡卽厥逆微濡相薄卽爲煩其氣在心

寸口脈微尺中緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽
寸口諸微爲無陽諸濡爲無血諸弱爲發熱諸緊爲寒微濡爲
血不足

診關上脉第五

關上浮而數胃中熱

關上浮大風在胃中腹脹急心下澹澹然羸瘦不能食

千金云
關上浮

大風有胃中張口肩
息心下澹澹食欲囁

關上細微而絕者腹中癥少氣不能食

關上微而芤唾血亦吐血

關上弦緊而細癥在胃管

關上緊而滑者蛔蟲動

關上微浮積熱在胃中

關上滑而大小不均是爲病方欲來不出一二日內復欲發動其人欲多飲飲卽注痢如痢止者生不止者死

關上弦而痛臍左右上下

脈經云關脈弦長者
積在臍左右上下

診八中脉第六

尺中緊而弦下痢病

尺中浮緊小便不利尿黃

尺中微而滑帶下病

尺中微而芤尿血



尺中弦而細癥在臍下

尺中細而急筋攣疼痺不能行

尺中細而滑婦人欲產

尺中虛小者足脛痠寒憇脚冷

尺中虛者漏血小便不禁

尺中沈細者名曰陰中之陰病苦兩脚疼痛不能久立陰氣衰

小便有餘瀝陰下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦少腹痞滿不能尿尿則

陰中痛大便亦然

尺中牢長關上無看此爲陰中陽病苦兩脅重少腹引腰痛



尺寸俱數有熱俱遲有寒

尺寸俱濡緩熱汗出

尺寸俱浮直下此爲督脈腰背強痛不得仰俯大人癲病
風癇

尺寸俱微血氣不足其人短氣

尺寸俱牢直上直下此爲通衝脈胸中有寒疝

診雜病脉第七

熱病大汗後脉不安靜者死

熱病脉盛大而缺不得汗此熱發也

寒熱癆癰脉絕代者死



熱病未得汗脈盛大者生細小者死

熱病多汗脈虛小者生緊實者死

熱病多汗脈常喘而熱不退者死

汗出而動其脉小滑者生大躁者死

一云微細爲難治

傷寒脉浮而洪大者易治譖言妄語身熱脉洪大者生沈細而微手足四逆者死

欬而尿血羸瘦脉大者死

欬且羸瘦脉堅大者死

上氣注液脉虛慢伏直者生牢弦者死

寒症上氣脈虛濡者生牢急而疾者死

上氣喘息脉滑手足溫者生溫而四肢寒者死

上氣面浮腫肩息脉浮大者死

上氣喘息脉滑者生大而缺者死

喘血脉沈弱者生

一云緊強者死滑者生

吐血脉牢實者死

吐血鼻衄脉沈細者生浮大而牢者死

中惡腹大脉緊實細者生浮大者死

金瘡出血不斷脈大而止者七日死

金瘡出血太多脈虛細者生大數者死

金瘡所傷在陽處者去血四五升脈弱微緩而遲者生急緩者



死

人被笞榜內有結血脈實大者生虛小者死

從高墮下及金瘡內有瘀血腹脹脉牢大者生沈細者死

心腹痛脉沈細者生浮大而長者死

腹脹脉浮者生虛小者死

下痢脉微細者生浮大者死

下痢脉代絕者不死

腸澼便膿血脉沈細虛遲者生疾大而有熱者死

腸澼下赤白沫脉沈者生浮者死

腸澼下白沫脉細微而遲身體溫暖可治

腸澼其脈滑者生浮者死懸絕者死

洩痢脈緩時小結者生浮大而數者死

洞泄或去膿血食不化者脈微小者生實急者死

洩痢脈細微而澀者生緊大而滑者死

洩痢寸關脉不見尺中時一見此腎氣見爲難治

下痢脈絕手足寒眸時脈還手足溫者生脈不還不溫者死

霍亂脈大可治微細難治

霍亂吐下脉微遲氣急劣口不欲言者不治

病手足厥逆脈當此細而澀反得堅大而滑者死

水病脉洪大者生微細者死

消渴脉數大者生細小浮短者死

卒中風四肢不收口僻語言不正脉浮遲者生癲病卒瘈者死

堅弦實大者生虛伏濶小者死

癲狂恍惚脉牢者生沈細者死

中風口噤不能言四肢不收其脉浮遲者生實大數急者死病

風痺不仁痿厥脈虛數者生牢急者死

目睭睭脉大緩者死

閑曰不欲見人脉得肝脉者生反得肺脉者死

耳聾脉大者生沈遲細者難治

堅積洩痢脉微細者生浮者死

頭痛脈短澀者死浮滑者生

中毒榮陽脈洪大而速者生微細者死

脈經速作遲

暴病脉微細者生大急洪首者死

大人得小人脉者死

脉但出不能入者死

將死之脉如羣鳥之聚一馬之馭系木交繫一作馳之狀如懸石
之落出筋之上藏筋之下堅關之裡不在榮衛伺候交射不可
知也

困病脉如蝦之游如魚之翔者死蝦游者冉冉而起尋復退沒
不知所在久而復起起輒遲而沒去甚速是也魚翔者似魚不



行而但掉尾動身其動疏而住久是也

脈病人不病脉如屋漏雀啄者死屋漏者其脉既絕而止時一起不相連屬也雀啄者脉來甚數而急疾絕止久已復頓脈來如彈石去如解索者死彈石脉辟辟急也解索脉動數而隨散亂無次續也

脈來涌涌不去者死

脉如轉豆者死

脉如偃刀者死

脉怒來忽去暫止復來者死

脉中移者死



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

脉久經者死

脉有表無裏者死

婦人尺脉之不絕者胎也

產後寸口

疾不調者死沈微附骨不絕者生新產後渴熱病
脉細而四肢冷者死

三部脉沉升正等不斷絕者有娠也

妊娠脉滑疾重手按之不散者胎已三月也但疾不滑者五月
也妊娠七八月脉實大牢強弦緊者生沈細者死欲產者其脉
細而滑也

婦人欲產其脉離經者曰生也

新產脉小緩滑者生實人弦急者死

已產脉沈虛小者生實牢堅者死

婦人月經不通脈絕小實者生浮虛者死

婦人脉寸關調如故而尺脉絕不至者月經不利當患少腹引

腰絞痛氣積聚上攻胸膈也

漏下赤白脉急疾者死遲滑者生

婦人脉尺寸俱微弱則絕子不產也

小兒脉沈者乳不消也

小兒弦急者客忤氣也

凡按人脈五十至而不止者五藏皆受氣足吉也四十動而一



止一藏無氣四歲死三十動而一止者二藏無氣三歲死二十動而一止者三藏無氣二歲死一十動而一止者四藏無氣中死

凡脈一動一止或三動一止或十動一止投數無常此死脉地
命雖未盡正當小引日月耳

凡脈一呼再至一吸吸至呼吸定息其脉五至不大不小爲平
若一呼三至一吸三至始爲得病也

大脈前大後小則爲頭痛目眩前小後大則爲胸滿短氣

問曰何謂損至答曰脉有損至謂一呼再至曰平三至曰離經
曰至曰奪精五至曰死六至曰命絕此謂至脉也一呼一至曰

離經二呼一至曰奪精二呼一至曰死四呼一至曰命絕此謂
損脈也至脈從下上也損脈從上下也損脈之爲病也一搘
於皮毛皮聚而毛落二搘損於血脉血脉虛少不能榮於五
三搘損於肌肉肌肉消瘦飲食不爲咀膚四搘損於筋筋緩不
能自扶持五搘損於骨骨痿不能起於牀反此者至於收病從
上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死
損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適
其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精氣也

凡脈一息再至爲平無病也一息三至名離經離失也經常也
其人榮衛已虧將欲病也

一息四至爲奪精其人已病也一息五至爲經命有大有小爲難治一息六至爲將滅一息七至爲命盡一息八至爲無氣息九至爲無魄一息十至爲今死

一息一至其人雖行當著牀其人血脉已病諸氣皆不足也一息一至爲危二息一至爲困四息一至爲行戶將死五息一至爲定死