

卷七

痘

疳

吐瀉

吐

咳嗽

癰瘍

蠱

赤白濁

虫

痞塊

集方

膈

中風

便閉

補益

風寒濕痺

勞

針灸

盜汗

增補臨證指南醫案

上海文益書

局印行



古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲同較

肝腎  
疽毒  
門症

**龔** 初起腰足俱痺。肝腎蘊毒不得外越。日泛口舌。繼增喘促是緊悶不治之症。諸醫僉用石膏大黃等。然則此藥僅通陽明胃腑之經。未能搜逐肝腎至陰之臟。讀宋醫錢仲陽真訣。毒伏於陰。亦有下奪之法。其製方曰棗燮百祥丸。乃百中望一二生全者。

**紅芽大戟** 或紅東枝 水煮至熟去核及大戟湯。但用棗肉研化開水送水。煮至熟去核及大戟湯。但用棗肉研化開水送水。

**某** 毒伏不肯宣透。氣滯血凝。焉能起癥成漿。七八陰關。診視肉腫滑枯。神躁不安。議疎利內壅。佐活血透肌法。

**○星肉**

**柴草炒查**

**鮮生地酒浸大黃紅花青皮丹皮連翹牛蒡茅根竹尖湯代水**

**俞** 發熱五六日。宋神煩不寧。腹脹欲逆。詢知二三日前眉間見點數粒。狀如楚瘡。隨即隱伏不見。方毒重壅遏。高點雖繁密。根脚縱立。寒涼藥不宜太重。可以維持收功。

**龐** 二 神倦腹痛。點粒繁瑣。地界不清。是時邪毒火兼重。急進雙解法。使大便稍通。六腑氣宣。則痘毒外透再商。

**犀角連翹牛蒡酒大黃紫草青皮桃仁炒查木通生石膏荆芥筍尖**

**程**

成片不立。頂焦黑滯。肝肺毒重。不能起脹。焉得化毒。今咳喘交加。九朝難過。

**羚羊角元參連翹天蠅土貢紫草丹皮炒查銀花地丁湯代水**

**錢** 三 雖未發齊。其點形繁密。色澤不潤。重險何疑。今痧未全退。尚宜清解。

**犀角生石膏炒查紫草連翹牛蒡赤芍桔梗木通**

**程** 三 身小氣弱。佈痘繁稠。用藥不宜寒冷。五日後受得補托。可冀有成。

**毛身小氣弱。繕發鷩鼠屬虛。人參炒歸身炙草廣皮炒白芍炒黃芩**

**童** 鞭痘形粘着肌肉。不肯起綻高立。兼之繁紅殼薄。乃時火毒火交熾。而元氣素虧體質。自今六日前。時癟未徹。宜先清解沽血提項。希冀毒氣分成地界。再究。犀角 羚羊 元參 丹皮 炒查 泰皮 紫草草 銀花 錄 痘發猶然身熱咳嗽。乃風溫入肺未解。診其點粒粘着不爽。溫邪鬱滯。氣血更體質虛。誼開肺氣。養之活

安再商  
紫雪丹一分

血以疎動之。冀其形色充長。若一進沉降。恐無好音。

連翹 桔梗 紅花 牛蒡 甘草

炒查 冈皮 雜冠血

夢金

又昨進輕揚提頂活血。痘形頗長。所嫌色不光潤。逢鬆緩處。有乾塌無漿之處。今明時氣將解。氣血用事。況正欲

納殺。告寒不但冰伏毒氣。更防太傷胃口。古人於重症。更加詳慎者為此。

川芎 菖歸 天蟲 桔梗 甘草

當歸 川芎 天蟲 桔梗 甘草

夢金

又朝進和氣血法。形色畧潤。究不肥綻。馬得起脹成癰。議進十宣散法。

人參 川芎 桔梗 紅花 白芷 甘草

天蟲 桔梗 紅花 白芷 甘草

張四朝船小重載難。奔全功。勉議進雞鳴散一分。

陸五點雖不密。色滯形緩。疫多倉逆如嘶。是痘雖發出。毒猶在內。上冲心肺。故有喘咳不甯之象。進涼血透毒法。

朱朝炒黃芩 炒山楂 紅花

甘草 茶葉 丹皮 川貝 連翹 元參 射干 天蟲 西牛黃

甘草 茶葉 丹皮 川貝 連翹 元參 射干 天蟲 西牛黃

又五身小痘。多元氣熏薄。冒腑未納穀。味湯藥太過。須慮嘔泄。宜少少與藥。候過八九風波。方得平安。

朱朝炒黃芩 炒當歸 桔梗 甘草 黃米 雜冠血

川芎 炒查 土月母 紫草

丹皮 川貝 紫草 丹皮 天蟲 桔梗 甘草 雜冠血

又六薄嫩無漿。仍宜內托。黃芪 防風 歸身 川芎 紫草 丹皮 天蟲 桔梗 甘草 雜冠血

宋補顧頰形似紅沙。餘痘乾枯不潤。昨進清毒活血續發點子盈千。仲仁謂毒重壅閉。氣血久乾焦退縮。今五朝形象僅似初齊。痘似十二日為常數。已經壅遏未發三日矣。當此資津神弱。恐難延多日。即或望其堆沙發臭。然必在旬日以外。目下總以解毒清涼。入九波濤洶湧。恐難人力穩全。

朱朝犀角 犀牛角 川連 炒查 土月母 紫草

丹皮 連翹 炒查 紫草 丹皮 天蟲 生地 雜冠血

甘草 丹皮 連翹 炒查 紫草 丹皮 天蟲 生地 雜冠血

吳半朝痘子分頭。原屬純正。所嫌色滯乾枯。防八九癟塌。涼藥兼以活血。是為平準方法。看守勿懈為上。

朱朝羚羊角 丹皮 連翹 炒查 紫草 丹皮 天蟲 生地 雜冠血

甘草 丹皮 連翹 炒查 紫草 丹皮 天蟲 生地 雜冠血

甘草 丹皮 連翹 炒查 紫草 丹皮 天蟲 生地 雜冠血

孫肌柔白嫩。體質是虛。但佈痘必由時癟感觸。地中六氣咸從火化。癟固客氣相混。氣血若非清解。何以速達。今視色油紅。按形鬆軟。再視面部。肌肉先腫。痘形未具。起服之。象體症未為全局。慮進銳退速。清涼解毒。佐以提項。在五六日之法。然險症變遷不一。未可以經常定論。

朱朝羚羊角 連翹 丹皮 天蟲 生地 甘草

朱朝紫草 丹皮 連翹 丹皮 天蟲 生地 甘草

朱朝紫草 丹皮 連翹 丹皮 天蟲 生地 甘草

朱朝紫草 丹皮 連翹 丹皮 天蟲 生地 甘草

汪朝痘形繁瑣成片。色紫滯乃火毒重陰症。藉身大氣旺。扶持十日陰開。冀其發真堆沙庶幾可以圖全。

犀角 獅牛角 桔梗 炒查 連翹 天蠅

紫草草

又雖血熱毒重。猶幸入肺體堅。急清解活血。莫令痘阻廢食。扶持堆沙可望向安。

照前方去石膏地丁天蠅牛蒡加川連元參土貝

查痘子成漿。濕氣蘊於皮毛。與熱氣相蒸。內應乎肺。發出草痘。炒宜忌。草腥輕清理肺。淡滲消其濕熱。驗其體質。最薄慎勿過劑。○以仁 茶芩 遼翹 地骨皮 通草 桑葉 白沙參 甘草

顧痘發由絡。其毒不化而轉陷。亦歸於滯。當世暮晚攻補而已。讀古人書。辛香溫煦。乃治毒陷太法。

人參 肉桂 炙草 丁香 厚朴 蘭子皮 廣皮 木香 前胡 茶芩

徐未納穀食。但以湯藥。所以滑泄不止。頭仰胸突。擁瘦身熱。肺熱未清。不可驟補。翁仲仁有泄漏安神大虛少毒之議。姑以和中清咽。再商桔梗 甘草 炒歸 川芎 廣皮 炒查 炒黃米湯煎。冲雞冠血。又臥身小痘。因氣弱難任。雖清漿三四。防護宜慎。八九日不致損破。可以有成。

人參 黃芪 炙草 紫草 天蠅 廣皮 川芎 歸身 厚朴 炒查 加炒冬米

孫朝色矯皮薄。漿汁未灌。緣身小痘多。氣血交虧。不能運毒化漿。八九日期。最有癰塌之慮。扶過十二朝無變。庶幾可望有成。進參歸鹿真湯法。人參 歸身 鹿茸 生黃芪 炙草 廣皮 厚朴 煙木香

又臥照前方加肉梘炒爻米。

又漿清四五。不能充灌。因元氣微弱不振。不能煅煉毒氣成漿。恐有內陷之慮。再進補托。冀其堆沙。或可回春。人參 黃芪 廣皮 炙草 木香 鹿茸 歸身 肉梘 桃仁 官桂

又臘三盤。瘡甚薄。中凝血跡。兼之瘡逆帶嘔。食入便有不化之形。此虛中有毒。非純補。純清之症。

炒川貝 炒銀花 茶芩 甘草 地骨皮 方太輕耳

歸身 木香

楊柳根。闊端瘻陷。漿色白滯。不營。謂之氣衰毒陷。所冀堆沙加食一線機耳。

人參 黃芪 炙草 廣皮

桂心

又十一朝已滿。堆沙四肢圓綻。但氣弱恐其不肯收。必實脾利水為法。人參 冬木 炙草 茶芩

新會皮 白芍

又十三朝已經堆沙加食。都是向安之象。便滑膩。宜寒涼傷裏。腸中脂垢自下。當脾胃藥中。少佐固陽。以久延不已。

尚胎癰症

人參 焦術 訶子 廣皮 肉果 白芍 木香 炙草 茯苓

又

射六

納食不化

腹脹

便黃白色

要之

胃滯

蓄弱

宜補

古稱

痞滿

屬氣

氣行滯

但痘後虛體

純消

猶恐變症

○人參

焦術

炒查

木香

佳麥芽

廣皮

茯苓

澤瀉

鮑朝榮

不外達

毒欲內陷

已經交牙

滑瀉嘔惡

內症諸

敷皆屬深畏

十二四總屬險關

痘子毒氣

必氣元旺

冀其

托出

議以陳氏木香散

救裏托毒

人參

木香

丁香

官桂

炒歸身

厚朴

廣皮

肉菓

訶子皮

孫

面腫

目泛

頭搖微嘔

肝風離體

乘上逼攻

此乃變驚

故厥之象

夫相火寄於肝膽

氣歛痘加

宜進涼解清毒

倘得微熱

緩仍進穀

方有佳音

羚羊角

川連

鉤藤

石菖蒲

惠山施

膽星

天麻

連翹

又

肝風熱定

疳瘡亦緩

仍宜清熱解毒

但不可犯胃

羚羊角

連翹

膽星

丹皮

炒銀花

金石斛

茯苓

白芍

百合

生苡仁

百合

白芍參

炒麥冬

某

已經回加不宜再進補劑

恐氣血壅滯致有餘毒變幻

宗翁仲仁清涼以助結痂之法

黃芩

銀花

川貝

甘草

地骨皮

桔梗

連翹

沙仁

炒麥冬

白芍

川貝

炒銀花

地骨皮

某

痘瘡

忽然乾涸

即是倒壓咬牙寒戰

元氣大虧

非峻補難挽

人參

鹿茸

炒當歸

仍當加托藥

一味

沈朝

十三敷未允滿

忽然乾涸即是倒壓咬牙寒戰

元氣大虧

非峻補難挽

桂心

桂圓

煨木香

程

回加太早

餘毒流走四肢

臂腿腫痛

議治血解毒

連翹

小生地

當歸

赤芍

刺蒺藜

丹皮

夏枯草

吳鞠

十四

瘡瘍回加

毒氣未化

已有疳瘡之患

理進清解餘毒

吳朝

薄漿回加

毒氣未化

已有疳瘡之患

理進清解餘毒

但勉進稀粥

瀉瀉未罷

胃未吐

相脾氣積弱

議以滲利

分消散古痘毒

當利小便意

桑皮

地骨皮

連翹

茯苓

川貝

苡仁

銀花

某

痘瘡退癰

火內逼為喘

川連

犀角

連翹

銀花

查

痴後發痧

係肺熱未清

宜辛涼佐以解餘毒

連翹

杏仁

桑皮

地骨皮

黃芩

木通

銀花

牛蒡

夏枯草

桑白皮

大腹皮

茱萸皮

茯苓

大腹皮

銀花

丹皮

地骨皮

連翹

銀花

丹皮

地骨皮

毒則外發

內陷

人參

焦術

炒查

木香

佳麥芽

廣皮

茯苓

澤瀉

茯苓

澤瀉

甘草梢

生甘草梢

炒銀石

生甘草梢

炒當歸

人參鹿茸

桂圓

煨木香

炒當歸

桂圓

炒當歸

夏枯草

桑白皮

炒當歸



而見灰白濕爛泄瀉嘔惡等症者。用平和溫煦如陳文仲之法為要。氣血極虛而聚清塌痒。全無實症相兼者。當峻補氣血。用參歸鹿茸湯及坎元湯之類。氣虛莫外乎保元及四君子。血虛不離於四物及補血湯。又於氣虛血熱者。補氣之中兼涼血血虛氣滯者。補氣之中佐平和。用攻法須分分部位經營。用補法當辨寒熱燥溼。過清則有水伏之處。偏熱則有液涸之處。此皆先生擇先賢之法。因人見症而施治。可謂善法古者矣。夫痘雖以形色辨其吉凶。然內症尤為緊要。如痘點既起。或不慎風寒而營衛凝滯。或縱飲食而氣機呆鈍。以致身熱不食。腹脹嘔惡泄瀉。漿水不行。不完治其病。因執清寒膩補。常有凶危之變。亦有痘形雖重。若神甯安靜。飲食二便如常。聲音清亮。調理得其亦可轉危為安。大凡形老而色鮮明者。雖甚密。變幻恒少。形嫩而色晦滞者。雖稀疏。變幻恒多。表裏相參。審症的確。然後設法處治。方無貽悞。至於逆症條款已現。雖自昔名醫亦莫能挽救。小兒天枉者不可勝數。深可憐憫。邇年以來。幸有種痘一法。盛行於世。實可挽回造化。凡有小兒者。俟週歲後即可選用種痘之苗。引而發之。百不失一。此誠補痘科之未備。而為最上一乘之法也。正痘有先賢諸成法。避險有種痘之良方。痘症於是乎大全矣。陸履安痘之發也。一由平胎毒內伏。一由於外感時邪之氣引導而出。其逆之順逆。若內毒輕而外感之氣亦輕者。痘必稀疎。此為順症。若內毒重而外感之氣重者。慮其遏鬱不齊。不易灌漿。若能至灌漿時。邪漸退後易收功。此為先重後輕症。若內毒重而外感之氣輕者。慮其灌漿已後。毒難盡淨。不易收斂結痂。恐發痘毒疳蝕之患。此為先輕後重症。若內毒重而外感之氣亦重者。痘必稠密。色不鮮澤。發熱。見點之後。一路蹭蹬。難以收功。此為逆症。然胎毒之輕重。人皆易明。若外感之氣人莫能曉。天地間祇有六氣。氣平則為和。氣不平則有勝。復至極則為病。氣為病。為癰瘍。氣為瘡瘍。氣更有一道生中機濁氣。人若感之。不拘老幼俱病。今出痘所感之氣。則異乎是。此氣獨與未洩胎毒之小兒兩相感觸。未聞痘症盛行之時。已出過痘之兒。亦染病患也。考是氣自古迄今。從未有人申說明白。雖定為何氣。故前賢於痘症一科。未嘗不殫心專慮。立論者。方因不明其氣之源。不無偏執之弊。有喜於寒瀉者。有喜於溫托者。有先用寒瀉而後用溫補者。有先用溫托而後用清火解毒者。更有不審見體之虛實寒熱。俱宗費建中救偏。瑣言每於發熱見點時。繫用大黃石膏黃連犀角羚羊茅根蘆根等。不知費氏之書。名為救偏。乃救偏用熱藥。

通達人  
人能知之  
人能行  
信而為之  
全活不少  
其利溥哉  
然有命焉  
造化之大  
終不信也

此等嗜利  
之徒害人  
不少升今  
世人追種  
痘法亦不  
信矣

之偏耳。若本不偏而宗其法則不偏者反生偏矣。嬰兒之命其何以堪。古有種痘良法相傳矣。人其法簡易靈驗至穩至當。蓋正痘因外感時邪而發種痘則種於無病之時。故所出稀疎輕者不過幾十粒。此豈非避危就安之妙法乎。倘愚人不信。何不將自出與種出彼此相較。其理自明。假使一村之中有百兒出天花未嘗不甚醫服約。若能入九十收功。人咸稱為太平痘矣。甚有竭力調治而損傷幾及一半者。不聞其歸咎於醫生惟有委命於天而已。今若種百兒之痘。設或損傷四五個。則必責罰種師。并不容其托足於此一村矣。人何萬信醫生而不相信種師耶。與其委命於天。孰若以人功挽之。以此相較。則當種與不當種自決矣。至於種法。全在半好苗。夫苗者即取他兒之痘痂也。必要用種出之痘落下的痂。謂之種苗。此苗之中毫無天行時毒之氣在內。故放心可用。若自出天花之痂。謂之時苗。此苗之中。有時行之氣。若不辨而用之。名雖為種寶。與傳染他兒天行時痘之氣無異。此時苗之不可用也。然種苗之內尚要擇擇。必取痘粒稀少。其色紅潤灌漿濃厚所結之痂。厚實光澤尖圓者。此氣血充足陰陽合德。上好之苗也。俟痂落。下用紙包好。記明何日收得。收貯新磁瓶內。緊護其口。置清涼之處。勿觸。穢熱之氣。且苗在北方。天氣涼。春月之苗。一月之內尚可種。冬月之苗。四五十日尚可種。南方氣溫。夏月之苗。四五日。春月之苗。二十日。冬月之苗。三十日。若延日久。則氣薄無力。恐種不出矣。砍愈此等種苗。先訪有人家正在種痘之際。向彼明言其故。懇求四五粒。即可源源而種。或平日於同道種師內相與一二位志誠老實者。議明彼此互信。則苗亦可不斷。亦有膽大種師。於五六月中。見家貧壯實之兒。種之。不惟不索酬謝。反育津貼銀錢。次遞傳種三四箇兒。延生七月。則苗亦可以不斷矣。近有種師因種苗已斷。權取時苗種之。往往有種出稠密。棘手重痘者。皆時苗之過也。不知時苗之性。即選上好者。亦必要傳種過四五兒。俱各順當者。其苗性始和平。方能與種苗相等。至於下手種法。尤須詳慎。凡種一兒。用痘痂三四粒。兩兒則用六七粒。放於乾淨茶杯中。傾入清水四五茶匙。用小指尖在內三四攬。則痂已溼急。將水傾去。用柳木杆研其杆。約長四寸。粗如筆管。兩頭要光圓。研十數轉足矣。如痂太乾。加入清水一二滴。切不可太潮。只要研如乾漿糊狀。用彈熟新棉花。捏一小團。如棗核大。兩頭要圓。其長短粗細量兒鼻孔之大小為之。共綿團不可太鬆軟。鬆則苗氣易往外洩。且見涕則縮。小易於脫出。漿棉團只用一頭蘸痂末糊於上塞兒鼻。

男左女右塞不可太進。太進則兒不適。意亦不可太出。太出則易於脫落。瀉要月墜淺深適中為妙。寒後勿效小兒用手拈出。若被青宣打出。急將苗仍塞入鼻下。苗後以六個時辰為度。天氣熱早。取出數刻。天氣寒多。留數刻。痘苗取出之後。其苗氣漸少。傳遍五臟。至七日或八九日始發熱。發熱三日而見點矣。此誠至穩。生當之種法也。種痘之苗。不過痘痂一味。今各處種師。貌稱痘加之外。尚要加他藥為引導者。此係惑人謬語。切勿信之。既種後。將發熱時。小兒頸項內。男左女右。必發一小塊。狀如痘核。此乃毒氣凝聚於此。故痘發必稀疎。此塊不必腫治。待落加後。則塊亦漸消失矣。若用時苗種者。項中無塊。當以此辨之。又間有驚癇。於發熱時。小兒忽然驚搖。手足踴。不語。目上視。有片時即平復者。有發一二個時辰者。有發一次者。有發兩次者。總屬不妨。斯時切不可擾動呼喚之。待其自平。即已不必服藥。預對痘家說明。免其憂慮。以上諸論。皆時下種師之秘訣也。若大辨兒之可種與不可種。須察兒體之虛實。及有無宿病。若調治之法。當節飲食。適寒溫。防驚嚇。此皆種師俱各明悉。茲不重贅。鄭望頤。

(痘)

沈 稗半歇乳進穀。脾胃氣餒少運。腹脹目翳。是為五疳。夏日中土司令。久病投以補氣。恰令調其脾胃。近日嘔吐世漏。身熱。乃寒暄失和。致食不易化。小溲既少。腑氣不和。余幼科父疎憶錢氏每以調中為主。而驅邪都主輕法。深慮脾土傷則甚驚癇耳。益智仁 與目翳  
不甚切 佳术 茶芩 廣皮 雜香梗 厚朴 炒杏仁 半夏 湯瀉

張四五疳腹脹數月。法當疎補。人參 茶芩 炒杏仁 廣皮 半夏 湯瀉

又 照前方去半夏。湖瀉加澤瀉。

內傷  
夾滯  
亟精

陳五官人。自汗短氣。咳嗽。風溫見症。肌腠有瘡癰之形。與疹瘡病不同。但幼稚生陽尤肺。春深入夏。形質皆減。色脈是虛。而補脾辛甘不應。腹滿按之自堅。一便原得通利。腹痛時發時止。痛已即能飲食。考幼科五疳。與大方五勞相類。疳必因脾熱為積。為蟲。此飲食不充。肌膚也。病來非暴攻之由。漸再論痘熱蟲積。古人治肝治胃。恒多而潔。古東垣於內傷夾滯。每製丸劑以緩治。取善乎渣質有形。與湯飲異。或刻下溫邪。或攘之餘聊以甘涼之屬。清養胃陰。以化肺熱。其辛氣泄表不宜進。

脾胃  
虛腑  
不氣  
知

做治疳熱羸瘦從陽明厥陰疏通消補兼施

食  
脾  
胃

桔

人參 黃連 蘆薈 川連子 使君子 茯苓 白芍 廣皮 胡黃連 南山楂

炮  
薑

吳九歲能食色枯形瘦暮熱泄瀉此皆口腹不慎

焦朮

茯苓

廣皮

益智仁

大腹皮

木瓜

炒神曲

青蒿梗 枳實炭 胡黃連 炒穀芽 炒白芍 炒山楂 廣皮

茯苓

澤瀉

王五

疳已

久

脾胃受傷

食物不運

腹脹瀉瀉

此積聚未清

中焦先餽完穀不化

腹脹脅脛呈難治之症

七香餅

吳身

熱

吐乳

自利

溫邪

內擾

脾胃

禦年防驚

藿香葉

飛滑石

病者乾也。小兒腸胃柔嫩若乳食失調甘肥不節運化不及停積發熱久津乾此因積成疳者也或五臟偏

熱

或因病後

或醫藥誤下

致亡失津液

脾不輸化

積滯不行

此因乾致積者也故五疳不離乎脾胃其治法胃

滯當消

脾弱宜補

熱者用苦寒清火

冷者宜辛溫健運

有蟲者氣用殺蟲之品

其虛者

各隨本臟補其母總宜

丸劑緩調

不能旦夕速功

或用雞肝納入

治療藥燉食最為有效

陸履安

此老幼科症症不憚名家

可稱大家矣敬服敬服

吐瀉

吳暑

傷

胃陽

暑濕

傷

某

夏邪犯肺

交土

王用事

脾胃素弱

不運

暑溼

腹鳴泄瀉

惡心

頭暈

怕冷

身熱

吐乳

自利

溫邪

內擾

脾胃

禦年防驚

藿香葉

飛滑石

吳人參

藿香

炒厚朴

木瓜

川連

茯苓

澤瀉

吳章

傷食

一症

考古用

五積散

之義

取緩便

其腐熟也

既上湧頻吐

大便瀉瀉

胃氣益傷

陽氣坐困日甚

清不升

濁不降

痰潮

腹鳴

便遺

睡則露睛

頭黑昏紫

小溲竟無

陽不流行

津液自耗

有慢虛

而勞之危

議通胃陽

謂

錢氏薛氏之書

能知此意

人參

鬱金

炒半夏

炒白附子

茯苓

菖蒲

炒膚皮

炒粳米

又

陽明胃陽受傷

腑病以通為補

若與守中

必致壅逆

昨日用方

通勝於補獲安

幼稚非真虛寒之病

人參

茯苓

益智

廣皮

炒荷葉

炒粳米

上海文益書局石印

又 鼻漏汗出。雖血陽明虛胃氣未和。不宜涼降。六神湯加炒廣皮。

處 面色痿黃。脈形弦遲。湯水食物入咽吐出。神氣慘慘。欲如昏寐。此胃陽大之風木來乘。斂虛。傷脾陰也。

又 昨用泄木救胃土法。安受不見嘔吐。然中焦陽氣太虛。濁氣上僭。則為昏厥。津液不升。昏厥乾燥。豈可苦寒再伐。生氣今如寐。神倦。陽陷於陰。何疑。仲景通陽理虛。後賢錢氏辨。人皆宗其義。

蘇 周歲幼小。強食腥羶。身不大熱。神氣呆鈍。晚上吐下漏。最防變出慢疾。此乃食傷脾胃。為有餘。因吐漏多極。動正氣致傷耳。

廣皮 厚朴 炒苓 廣藿香 生益智 木瓜

人參 沙半夏 茯苓 廣皮

火石 烏藥 南星 此方偏於溫補

陳 涼風外受。內鬱。執伏。身發瘡痍。便解血膩。煩渴得汗。僅解外風。在裏熱滯未和。秋卿似痛。大便仍有積滯。清裏極是。但半歲未啖殺食。胃弱易蠶。瘡痍。少與樂。藿香梗 川連 黃芩

生白芍 淡竹葉 廣皮

余 形神衰弱。瘕泄純白。而癰瘍疽癰。未罷。氣喘痰升。總是損極。今胃虛納減。倘內風微動。驚恐立至。孰不知因虛變病也。

人參 炒梗米 炒神 炒廣皮 炒荷葉蒂

呂十 痰中帶血。食已嘔吐。因驚仆氣逆。令胃不和。與黃連溫膽湯。因年弱質怯。以金石斛代之。

溫膽湯去甘草 加金石斛蜜汁煎服

大忌

溫熱 某久嘔少食。人參 半夏 炒苓 廣皮

某 某久嘔少腹痛。欲嘔。半夏 炒苓 廣皮

某 某久嘔少腹痛。欲嘔。半夏 炒苓 廣皮

王九 久嘔兼發瘡痍。是溼勝熱鬱。舌蹇。必佐風藥。合乎東垣脾宜升胃宜降之旨。

人參 川連 黃柏 夏草 廣皮 白朮 神麴 麥芽 柴胡 升麻 先沽 防風

何十 夏病入冬。仍腹痛下積。揮年不慎食物。腸胃虛滯。痢久陰傷。身熱發瘧。先與理陰。疎肺滯濁。

熟地炭 當歸炭 山查 炮薑 夏草 麥芽

朱子本無急病。若急  
醫必當用善質牛黃等物。  
等物生人等物。

世俗所稱慢驚。只要治法不誤。案中亦有慢驚證治。而不治者也。風者不知起於何代。創是名者。其遺禍於嬰孩已不啻萬億矣。蓋就其所指之病而論。如吐瀉兼作。氣怯神倦。虛煩惱寐。喘不食。脈虛無神。睡則露睛等症。乃與病名毫不相關。其所指之症。是或由外感未清。或諸病誤治。或飲食失調。或由病後而成。以致吐則傷胃。

瀉則傷脾。土衰則不生金。中虛未必乘魁。是皆肝脾肺胃之病。治宜急顧本原。扶土生金。安胃和肝。溫養腎陽。猶盾弗及。若就其名而治之。醫家胸中先執慢驚風三字之名。概用重墜之藥。鎮驚定怯。或散風清火。豁痰破氣。其遺稿可勝言哉。蓋是症因中土已虛。風木已動。是以必現出似驚之狀耳。實則並非因驚而起也。奈何竟以慢驚風名之。豈非指鹿為馬乎。要之慢字。若以急慢而論。則凡病之緩者。皆可稱為慢。惟驚乃屬急症。不可以慢字加之。若以傲慢肆慢而講於病名上。又甚荒唐。惟願觀方科書者。當知其背謬不通。勿為其所惑。則幸甚。今觀先生案中。並未嘗用及驚藥風藥。是明徵也。此症更當兼參東垣立齋景岳諸法。則無遺憾矣。辛山岫雲

(癇瘇)

周 稚年癇瘇。病發迅速。醒來一便自通。此係陽氣拂逆。阻其靈竅。姑與清熱宣通方法。

犀角 遠志 膽星 黑山梔 元參 蒼蒲 連翹

唐附子。青脈濡濕。呆舌縮不伸。諸叔寂然。癇症四肢皆震。口吐涎沫。此陰風已入脾絡矣。

人參 生木 蟠蛇 全蝎 姜汁炒南星 薑汁炒白附

吳 某 伏邪經旬。發熱不解。昏焦舌渴。暮夜抽搐。不清。慮其邪陷心胞。有癇瘇之變。

化熱液枯 生地 竹葉心 丹皮 元參 麥冬 生白芍

不知胃汁再劫。肝風倣動。變幻煙厥危症。診視舌絡鼻竇黑燥。肌膚甲錯乾燥。渴欲飲水。心中疫熱。何一非肝腎陰液之盡。引水自救。風陽內燦。躁亂如狂。皆緣醫者未曾曉得溫邪從陰。裏熱為病。清熱必以存陰為務耳。今雖及一月。五液告涸。病情未為穩當。所恃童真食穀多歲。錢氏謂幼科易虛易實。望其尚有生機而已。

阿膠 生地 天冬 川石斛 雞子黃 元參心

又 鹹潤頗安。其熱邪深入至陰之地。古云熱深厥深。內涸若此。陰液何以上承。慮其治融阻咽。故以解毒佐之。

元參心 真阿膠 真金汁 細生地 天冬 銀花露

又 胃未得敷。風陽再熾。入暮煩躁。防其復厥。生地 白芍 麥冬 金汁 阿膠 牡蠣 金銀花露

又 神識昏迷。常欲煩躁。皆是陰液受傷。肝風不息。議減陰和陽。生地 牡蠣 阿膠 麥冬 木瓜 生白芍。

小兒癇症。本屬陰症。十中每死二三。奈今之患者。十中常死六七。其故何也。蓋該醫者。不察病情。概以芩連鉤藤菖蒲橘紅等火金石之藥投之。以冀清火降痰而已。此醫之不善治也。而最可惡者。尤在病家之父母。失於調治。有名為愛之寶。以殺之之故。何也。小兒諸症。如發熱無汗。煩躁神昏。譫語之項。或戰汗大汗將止之時。或嘔吐泄瀉之後。或瘦廩漸甦。或便久閉而通然大便。或灌藥之後。斯時正元氣與病邪交戰之際。若能養得元氣一分。即退一分病邪。此際小兒必有昏昏欲睡。懶於言語。氣怯神弱。身不轉動之狀。此正當養其元神。冀其邪退正復。乃病家父母。偏於此際張惶驚恐。因其不語而呼之喚之。因其鼾睡而頻叫醒之。因其不動而搖之抱之。或因微有苔垢。而必詳詰之。或急欲以湯飲進之。或屢問其痛癢之處。唯曉不已。使其無片刻安甯。如此。必輕變為重。重變為死矣。更有豪富之家。延醫數人。問候者多人。房中聚集者多人。或互談病情病狀。夜則多燃燈燭以照之。或對之哭泣不已。或信巫不信醫。祈禱疊興。舉家紛擾。此非愛之寶以殺之也。試以大人之病情體貼之。抑好安然寂靜乎。抑好喧譁動擾乎。此理概可知也。予曾見一孩兒患暑溼初瘥。半月有餘。病勢甚重。醫者投以蒼朮白虎湯。夜半發汗。至寅時身體漸涼。冷汗不止。默默倦睡。口不言。氣息甚微。醫云六脈安靜。並不煩躁。此病退之象也。因戒其父母。切勿擾動。直至申時汗止。聲出而病已霍然矣。可見大人與小兒諸病。總宜安然寂靜為主。其調養之法。有非草率所能養者。惟在病家能細心體會。醫者能詳諳告戒。勿以余之言為迂拘。則幸甚。更有幼孩發熱昏迷。手足厥冷。較絡阻塞。哭不出聲。藥難下咽。斯時惟有請善於推拿者。可使立時甦醒。然後再議用藥。至於治法。癇症本屬三症。與大方相類。茲不重贅。華岫雲。

功中略覽

小兒無病症不火另立一門  
即痘瘡亦僅病中之一症耳

(蟲)

陳歲溫傷脾胃失調。下注小腸。蟲從溺竅而出。蟻滲元散不可溫補。

蟲自小便而出。經月瀉皆粘膩。及不欲食物。此非虛寒。皆溫濕內蘊。運化失司。當苦藥勝溼。兼理幼稚疳積。

黃連

黃柏 苦木 厚朴 澤瀉 槐角子 木通 使君子 淡竹葉

三服後續  
進肥兒丸

龜殼

溼熱生蟲腹痛便溏惡食 川連 胡連 生白芍 烏梅 枳實 川椒 炒查 青皮 水法丸

生研末猪肚腸一條牽繩者丸

許

腸有濕熱生蟲蟲用苦寒引導小腸 苦棟皮 北秦皮 槐角子 胡粉 黃柏 牡蠣

生研末猪肚腸一條牽繩者丸

張三丹溪云小兒盜汗不須醫以體屬純陽

以溫藥承遏之耳 汗乃陽泄故也 至於瘡多溼熱浮腫脹滿得攻下而

消此六腑以通為補也 其小腹痛屢發亦由溼熱生蟲生積當以酸苦泄熱

川連

胡連 生白芍 雞肫皮 炒查肉 蘆薈 枳實 苦棟皮 烏梅肉搗丸

小川連 茯苓  
炒地榆 蒸餅為丸

汪十六

肛漏時腫瀉過白蟲 手足陽明熱甚 槐角子 黃柏 椒子肉 生茅术 檉根白皮

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救

蟲類雖多其由皆有飲食停滯濕熱鬱蒸化變而成者也 凡面色痿黃飲食不為肌膚起伏作痛聚散不定痛

止即能飲食者皆有蟲積或從嘔或從小便或從大便而出治法當觀其微甚若蟲勢驟急者當用攻逐之劑

如黑豆橘梗大黃胡粉山楂散之類蟲去則調其脾胃緩者用酸苦泄熱躁溼急以相制相畏之品如川連

胡連蘆薈苦梗烏梅川椒雷丸無夷史君榧肉之類脾胃弱者兼運其脾胃滯者兼消其滯蟲症治法大略如此

陸續安

治蟲有緩治之法其病甚輕而日久當用膏丸等藥兼補兼消之若病勢危急者必另有峻厲之方并奇藥秘方可殺蟲去積否則元氣消乏不可補救矣

案中所用諸方開載於後以便初學之士查閱

桂枝湯

桂枝 白芍 炙草 生薑 大棗 桂枝加附子湯 即桂枝湯加附子 芎桂术甘湯 徒苓 白

术

桂枝 炙草 小建中湯 白芍 桂枝 炙草 生姜 大棗 酥糖 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救

逆湯

桂枝 炙草 生姜 大棗 蜀漆 龍骨 牡蠣○生姜瀉心湯 生姜 乾姜 半夏 黃芩 黃連

甘草 人參 大棗 甘草瀉心湯 甘草 乾姜 半夏 黃芩 黃連 大棗 半夏瀉心湯 半夏 黃

芩 黃連 人參 炙草 乾薑 大棗 附子瀉心湯 附子 黃芩 黃連 大棗 黃芩湯 黃芩 白芍

甘草 太棗○黃連阿膠湯 黃芩 黃連 白芍 阿膠 雞子黃○旋覆花代赭石湯 旋覆花 代赭石

人參 半夏 甘草 生姜 大棗○炙甘草湯又名復脉湯 甘草 桂枝 人參 麻仁 生地 阿膠

麥冬 生姜 大棗 烏梅丸 烏梅 人參 當歸 黃連 黃柏 桂枝 乾姜 蜀椒 附子 細辛○○曰



董庭白白酒湯

瓜萎實 雜白 白酒○赤石脂丸

蜀椒 烏頭 附子 炮薑 赤石脂○附子梗米湯

附子 半夏 甘草

粳米 大棗○當歸生薑羊肉湯

當歸 生薑 羊肉 甘遂半夏湯

甘遂 半夏

外臺伏苓散

芍藥 甘草

一本無○木防己湯

木防己 石膏 桂枝 人參○小半夏湯

半夏 生薑

甘遂半夏湯 甘遂 半夏

侏苓 人參

白朮 枳實 橘皮 生薑○桂苓五味甘草湯

桂枝 侏苓 五味 甘草○越婢湯

麻黃

石膏 甘草

生薑 大棗○防己伏苓湯

防己 黃芩 桂枝 侏苓 甘草○大半夏湯

半夏 人參

甘草○大半夏湯 半夏 人參

白朮○天黃牡丹湯

大黃 丹皮 桃仁 子芒硝○當湯建中湯

即小建中湯加當歸○甘草小麥

太棗湯 甘草

小麥 太棗○旋覆花湯

旋覆花 蔓新絳○腎氣丸

與崔氏八味丸同

右金匱要略中方

六味地黃丸

即八味去桂附 煎服名六味地黃湯○都氣丸

即六味丸加北味 再加附子名附都氣丸○

還少丹

熟地 山藥 牛膝 柏杞 山茱 蔴苓

遠志 杜仲 五味子 楠實 小茴 巴戟

梔子

石菖蒲

丹溪滋 大補丸

即還少丹去楮實○黑地黃丸

蒼朮 熟地 五味 乾姜○虎潛丸

熟地 虎

膾骨

龜板 黃柏 知母 琉陽

當歸 牛膝 白芍 陳皮

羯羊肉○天真丸

精羊肉 肉蓴蓉

藥

當歸 天冬 黃芪 人參

白朮○三才湯 天冬 熟地

人參○大造丸

紫河車 龜板 人參

熟地

天冬 麥冬 黃柏 牛膝

杜仲○人參固本丸

人參 天冬 麥冬

生地 熟地○天王補心丸

生地

人參 元參 丹參 肉桂

遠志 徒神

柏子仁 天冬 麥冬

當歸 五味 桔梗

辰砂

○孔聖枕中丹 龍骨 龜板 速志

菖蒲○大補陰丸

黃柏 知母

熟地 龜板 蕁脊髓○滋腎丸

黃柏

知母 肉桂○斑龍丸

鹿角膠

鹿角霜

熟地 茄綠子 柏子仁

半夏

羌汁糊丸○宋復丹 玄精石 硫黃 硝石

五靈脂 青皮 陳皮

半夏 硫黃○黑

錫丹

黑鉛 硫黃

此方藥味尚多○二至九

冬青子

冬至○早蓮草

甘草

山藥 扁豆 沙仁 桔梗

陳皮○玉屏風散

黃芪 防風

白朮○四君子湯

人參

茯苓 白朮

甘草○六君子湯

即四君子加陳皮半夏○異功散

即四君子湯加陳皮○四獸飲

即六君子湯加烏梅草果生薑大棗○六補散 即四君子湯加山藥扁豆薑棗煎○補中益氣湯 人參 黃芪  
白朮 甘草 陳皮 當歸 升麻 柴胡 生薑 大棗○三拗湯 麻黃 杏仁 甘草○葛根湯 葛白  
淡豆豉○川芎茶調散 川芎 薄荷 荆芥 羌活 白芷 甘草 防風 細辛 為末茶調服○霍天膏  
牛膝散膏加麵○防風通聖散 防風 荆芥 麻黃 連翹 薄荷 川芎 當歸 白芍 白朮 山梔  
大黃 芒硝 黃芩 石膏 桔梗 甘草 滑石 薑○溫膽湯 陳皮 半夏 茯苓 甘草 枳實  
竹茹○十味溫膽湯 即溫膽湯加入參遠志棗仁熟地○逍遙散 柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓 甘草  
煨薑 薑膏 本方加丹皮山梔名加味道逍遙散○六和湯 砂仁 薑香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜  
人參 赤茯苓 白朮 甘草 薑 東○養胃正氣散 蕤香 柴胡 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 白朮 陳  
皮 半夏曲 厚朴 桔梗 甘草 薑 肉桂車丸 黃連 阿膠 乾薑 當歸○越鞠丸 香附 蒼朮  
川芎 神曲 山梔○四物湯 生地 當歸 白芍 川芎○張子和玉燭散 歸尾 生地 川芎 赤芍  
大黃 芒硝 甘草○歸脾湯 人參 白朮 茯神 棗仁 龍眼肉 黃芪 當歸 遠志 木香 炙草  
生薑 大棗○人參養榮湯 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 白芍 熟地 黃芪 肉桂 五味 遠  
志 陳皮 加薑東○犀角地黃湯 犀角 生地 白芍 丹皮○地黃散子 熟地 巴戟 山萸 茶客  
附子 官桂 石斛 茯苓 葛蒲 遠志 麻冬 五味 活絡丹 川芎 草烏此後世之活絡丹也 膽星 地龍  
乳香 没藥○附子理中湯 即理中湯加附子○理中安蛇丸 即理中湯去甘草加茯苓川椒烏梅○連理湯  
即理中湯加黃連茯苓○治中湯 即理中湯加青皮陳皮○四神丸 破故紙 五味 肉蓆 吳萸○清暑  
益氣湯 人參 黃芪 白朮 蒼朮 青皮 陳皮 神曲 甘草 麥冬 五味 當歸 青柏 澤瀉 升  
麻 葛根 加薑東○生脈散 人參 麥冬 五味○益元散 滑石 甘草 長砂○大順散 乾薑 肉桂  
杏仁 甘草○四苓散 茯苓 茯苓 澤瀉 白朮○桂苓丸 肉桂 茯苓 蜜丸○胃苓散 即平胃散  
合五苓散○加味腎氣丸 即六味丸加附子肉桂重煎牛膝○瀉川散 黑牽牛 大黃 甘遂 芒硝 郁李  
仁 輕粉○蕷薢分清散 川萆薢 石菖蒲 烏藥 益智仁 甘草梢 食鹽 茯苓○禹功散 黑牽牛

茴香 薑汁調 或加木香 瓊玉膏 地黃 茯苓 人參 白蜜 腾仙加琥珀沉香○通幽湯 當歸升  
麻 桃仁 紅花 甘草 生地 熟地 白朮加蒼朮湯 即白朮湯加蒼朮○涼膈散 連翹 大黃 川硝  
甘草 山梔 黃芩 薄荷○薦歸龍香丸 當歸 龍膳草 山梔 黃連 黃柏 黃芩 大黃 青黛  
蘆薈 木香 麻香 蘆薈湯○左金丸 茯苓 吳萸 水泛丸○戊己湯 黃連 吳萸 白芍○甘露  
飲 生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 蕤味 黃芩 枳殼 杞杞葉 甘草 一方加桂芩名桂芩甘露散  
河間桂苓甘露散滑石石膏寒水石甘草白朮茯苓澤瀉猪苓桂肉每服五錢 張子和去猪苓減三石一半加  
人參乾葛雀香木香亦名桂苓甘露散○瀉白散 桑皮 地骨皮 甘草 稗米○導赤散 生地 木通 甘  
草梢 淡竹葉 柴胡 黃金 寒水石 石膏 滑石 磁石 升麻 元參 甘草 犀角 沉香  
木香 丁香 朴硝 硝石 辰砂 麻香○清骨散 銀柴胡 胡黃連 泰丸 蟬甲 地骨皮 青蒿  
知母 甘草○陳湯 牛夏 陳皮 茯苓 甘草 生薑○賢散 陳皮 甘草○控涎丹 甘遂 大戟  
白芥子○滾痰丸 青礞石 沉香 大黃 黃芩 炙硝 白金丸 白礬 鐵金○平胃散 蒼朮 厚朴  
陳皮 甘草○橘半枳尤丸 白朮 枳實 橘皮 半夏 保和丸 山楂 神曲 茯苓 半夏 陳皮  
荀子 連翹○水陸二仙丹 金櫻膏 艾實○桑螵蛸散 人參 茯神 遠志 石菖蒲 桑螵蛸 龍骨  
龜板 當歸○蠅蠶丸 黃蠅 白蟬○膠艾四物湯 即四物湯加阿膠艾葉○柏子仁丸 柏仁 牛膝 卷  
柏 澤蘭 繢斷 熟地 右汪訥菴醫方集解中所載古方○補陰益氣煎 人參 當歸 山藥 熟地  
陳皮 炙草 升麻 柴胡 生薑○兩儀膏 人參 熟地 敷膏白蜜收○貢元飲 熟地 炙草 當歸○  
玉女煎 生石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝○理陰煎 熟地 當歸 炙甘草 乾薑 或加肉桂○何人  
何首烏 人參 當歸 陳皮 煙薑○參附湯 人參 製附子 艮附湯 黃芪 製附子 加生薑○青囊  
斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 柏子仁 茄絲子 熟地 茯苓 補骨脂○斑龍二至百補丸 鹿角 黃精  
杞子 熟地 茄絲子 金櫻子 天冬 麥冬 牛膝 肥實子 龍眼肉 已上藥同鹿角熬成膏加入煉蜜  
調入後藥末杵合為丸 鹿角霜 人參 黃芪 茄實 茯苓 山藥 知母 熟地 莪朮 五味子 十味

為細末和前膏為丸○秫米半夏湯 穀米 半夏錢氏益黃散 陳皮 青皮 詞子肉 炙草 丁香○和中丸 白朮 厚朴 陳皮 半夏 檉橘 枳實 炙草 木香○東垣和中丸 人參 白朮 炮薑 炙草  
陳皮 木瓜○神保丸 木香 胡椒 乾竭 巴豆不成方○子和導水丸 大黃 黃芩 滑石 黑丑○脾約丸 大黃 杏仁 厚朴 麻仁 枳實○華蓋散 麻黃 蘇子 桑皮 杏仁 赤苓 橘紅 甘草○石刻安腎丸 附子 肉桂 川烏 川椒 巴戟 茄絲子 破故 赤石脂 遠志 蔡神 蔡苓 蒼朮 山茱萸 杜仲 胡蘆巴 石斛 蕾子 小茴 蔴蓉 鹿茸 柏子仁 川棟子 青鹽 山藥○王荆公妙香散 人參 龍骨 益智仁 蔡苓 蔡神 遠志 甘草 碎砂○猪肚丸 白朮 苦參 牡蠣 猪肚一具  
草根 劉松石方 威喜丸 蔡苓 猪苓 青蠟○交加散 生地 生薑○烏鰲魚骨丸 烏鰲魚骨 蘆茹即茜草 雞卵 鮑魚湯下○三豆散 大黑豆 赤小豆 綠豆 甘草 水煮 萬代牛黃清心丸 蔡蓮  
黃芩 山梔 櫟金 石砂 西半黃

右景岳全書中所載古方及自定之方

已上四部書。諒業醫者必備。故但開藥。品其分量炮製加減服法。以及治症。俱未載明。并內有峻利之方。所服不過幾釐幾粒者。須按方查閱。切勿草率臆度。且不遵古法。不惟無效。反有遺悞慎之。

清燥救肺湯

經霜桑葉錢杏仁黃炒尖

三分去皮二分去心

石膏

二錢

人參

分

阿膠

八錢

胡麻

一錢

甘草錢

一斤去毛筋

水

一碗煎六分食

速服

進退黃連湯

川黃連錢半汁炒乾薑半

人參

乳半

桂枝錢

半夏錢半

大棗

當歸桂枝湯

即桂枝加當歸

蔡苓桂枝湯

即桂枝湯加蔡苓

參歸桂枝湯

即桂枝湯加入參黃氏

人參建中湯

即建中湯加入參

吳萸理中湯

即理中湯加吳萸

人參溫胆湯

即溫胆湯加入參

黃連溫膽湯

即溫膽湯加黃連

星附六君子湯

即六君子湯加製南星

生脈四君子湯

即生脈散合四君子湯

生脈六味湯

即生脈散合六味湯

養榮湯

即人參養榮湯

六神湯

即陳擇六神散即四君子加山藥扁豆

戊己湯

即四君子湯加陳皮白芍

與前戊己湯各別

苓薑尤桂湯

只此四味

五子五皮湯

即五皮飲加杏仁蘇子葶苈白芥子葛子

加桂理中湯

即理中湯加桂

子和桂苓湯

即子和桂苓飲

山藥

橘紅兩

扁豆 莲肉 厚朴各一

資生丸 人參

白朮 土炒 汝仁各三

山楂肉

神曲

橘紅兩

扁豆 莲肉 厚朴各一

淡芩 麥芽

桔梗

甘草炙

藿香各五

澤瀉

川黃連

白朮各三

右製為末煉蜜丸每丸重二錢每服一丸醉飽後二丸細嚼淡薑湯下

聚精丸

黃魚膘膠蛤粉炒碎

炒苑疾藜八兩馬乳浸隔者三兩暗煅透

右為末煉蜜丸每服八十九白湯下

禹餘糧丸

蛇含石本草名蛇黃大者三兩暗煅透

禹餘糧石者佳醋煅透

鈿鍼砂五兩醋

三物各研極細配入下項藥

羌活 川芎

三稜

蓬朮

白朮 白芍 陳皮 青皮 木香 大茴

炒 牛膝 菖蒲 炮朮 附子

炮 肉桂各五

右製為末入前約拌勻神曲糊為丸如桐子大食前或溫酒或白湯送下三十九至五十九

最忌鹽一毫不可入口否則病發愈甚日二服兼用溫和調補藥助之

此方又名大鍼砂丸此方去附子蓬朮青皮加淡芩葉名鍼砂丸

小溫中丸

白朮二 茯苓一

並無熟藥而名溫中

陳皮一 熟半夏一 甘草三

神曲炒一 生耆附半 苦參

沙五

黃連丸

鐵砂醋炒紅研如

為末醋水各半打神曲糊為丸桐子大每服七八十九白朮六錢陳皮一錢生

薑一片煎湯下虛甚者加入參一錢本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕服至六七兩小便長其香服一劑始長

繆仲濬脾腎雙補丸 人參 蓼肉炒山萸炮山藥一兩五味子

蜜丸各一錢各研細各一錢生

戰肉甘草汁煮肉豆蔻十

兩補骨脂鹽水浸二

日炒一筋

右為末煉蜜丸如虛而有火者或火盛肺熱者去人參肉豆蔻巴戟補骨脂忌羊肉羊血

阿魏丸 阿魏鐵 鱔甲二兩 黃芪 廣及 枳實 柴胡 白朮各一  
青皮 草果 黃芩 當歸

茯苓

各八錢

白豆蔻

七錢

山楂

兩

神曲

一錢

延胡

水法丸

又方

阿魏連翹

黃連山楂

青皮

皮

桔梗

蓬

蓬

各一錢

白芍

五錢

陳皮

半夏

麥芽

各二錢

厚朴

一分

更衣丸

硃砂

五錢

蘆薈

研

好酒

和九

每服一錢

二分

濟生腎氣丸

即八味丸加車前子

膝葉氏用

茯苓

八兩

熟地

四兩

白芍

三兩

當歸

川芎

枳殼

厚朴

青皮

神曲

麥芽

各一錢

桂枝

三錢

海粉丸

蛤粉

金盞實

杏仁

各一兩

廣皮

紫蘇各二兩

白朮

土貢母

各四兩

紫苑

三兩

木香

威靈草五錢

煉蜜丸

各一錢

葱白丸

熟地

四兩

白芍

當歸

川棟子

茯苓各二兩

川芎

枳殼

厚朴

青皮

神曲

麥芽

各一錢

桂枝

三兩

桂心

研

蓬术丸

乾薑

大茴

木香

桂枝之肉桂

桂心

桂枝用

葱白汁丸

又方

人參

阿膠

川芎

當歸

厚朴

用葱白汁丸

安胃丸

烏梅

川椒

附子

桂枝

乾薑各一兩

廣皮

青皮

各二兩

黃柏

二兩

黃連

五錢

川棟子肉

二兩

白芍

三兩

人參

量加如有邪

再用川椒

烏梅湯法丸

一方無廣皮

有當歸細年

妙香丸

巴豆

三百十五粒去皮

牛黃

研

龍膽

研

麝香

研

研各

三兩

硃砂

研飛

輕粉

三兩

研各

九兩

右合研勻

煉黃蠅

六兩入白盃

三分同煉

引為丸

每兩作三十九

海蛤丸

天冬

瓜萎霜

海浮石

蛤粉

風化硝

桔梗

橘紅

研

香附

研

竹瀝

研

薑汁

研

尤危丸

白朮

羌活

又景岳新方

苓朮菟絲丸

研

局方龍脣丸

即當歸龍脣丸

白蒺藜丸

即一味用山梔湯製為丸

用大豆黃卷湯送下

禹餘糧石脂丸

即二味為丸

○橘尤丸

即味為丸

真武丸

即真武湯作丸

歸脾丸

即歸脾湯料作丸

桑麻丸

桑葉

黑芝麻

蜜丸

即濬川散

禹功丸

即禹功散

生脈六味丸

即六味丸合生脈散

肥兒丸

景岳全書中有四方

益母丸

此方不一總用

益母草膏為君

有加四物膏附山查者

有去山查加阿膠者

有加八珍香附砂仁查肉者

東垣清心涼膈散

連翹薄荷

黃芩山梔

桔梗甘草

竹葉水煎服

鉢子附川梗子  
主核一兩

延胡索兩為末每服三錢酒調服

水煎服亦可

膝根汁二三兩古方本用虎杖草汁今人當門子處香研

右粉麝香入汁中和勻隔湯燉溫服

不識此草故以土牛膝根汁代之

石散花蕊石

煅存性研如粉以童便一盞男人入酒少許女人入醋少許煎溫食後調服三錢甚

能使瘀血化為黃水後用獨參湯補之

其功散即異功散加當歸白芍

雞鳴散牛蒡子炒香研細臨服加入雄雞冠血五匙狀元紅酒少許調匀以炒荆芥三分煎湯送

聖散即防風通聖散

歸芪異功散即異功散加當歸黃芪

香砂異功散即異功散加木香砂仁

正氣散即藿香正氣散

玉壺丹即扁鵲玉壺丸

治命門火衰陽氣暴絕寒水虧脹却有神效。古吳王晉三先生得里投製法。當崇之好。

硫黃八兩配真麻油八兩以硫打碎入冷油內。熾爐上炭火宜微勿烈。以桑條徐調候。硫溶盡即傾入大水內急

撈去上面油水。其色如金。取缺底淨硫稱見若干兩。仍配香麻油若干兩。照前大候再溶再傾。連前共三轉。第四

轉用直綿花核油配硫若干兩。照前伏候。再溶再傾。入大水內。撈去上面油水。其色如綠。第五轉用肥皂四兩。水

中同煮六時。第六轉用皂莢四兩。水中同煮六時。拔淨製硫之油。撈去其水。其色如硫火之紫。第七轉用爐中炭

灰淋陳水製六時。第八轉用水豆腐製六時。拔淨皂莢之性。第九轉用田字草出水芥稻田中其搗汁和水煮六

時。臨用研如飛麪。凡淨硫一兩配炒糯米粉二兩或水法或溼搗為丸。每服以硫三分為準。漸加至一錢止。開水溫下

回生丹大黑豆

三升用水浸取殼用絹袋盛放同豆煮熟去豆不用將殼晒乾其汁留用

紅花三兩炒黃色入好酒四兩葉如田字八九月採搗汁和水煮六

三筋熬之又加醋三筋次第加畢然後下黑豆汁三碗次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆盛之大

黃鍋焦亦罐下入後約同磨

人參兩川芎當歸熟地茯苓香附延胡蒼朮米泔炒桃仁

渝黃芩一兩烏藥二兩

牛膝地榆橘紅白芍羌活炙草五靈脂山萸

三棱各五錢良薑各三錢

木香各四兩木瓜青皮白术各三錢益母草二兩乳香沒藥各二錢馬鞭草五錢秋葵子三錢

右三十味并前黑豆殼共晒乾

末入石臼內下大黃膏再下煉就蜜一筋共搗千搗為丸每丸重二錢七分

明以前無  
水安息若  
可熱膏

靜室陰乾二十餘日不可烘晒乾後止重二錢外以蠟作殼護之用時去蠟調服一方無益母草馬鞭草秋葵子三味并不用蜜醋止用八碗

至寶丹 犀角鑄 碎砂研水 雄黃研水 琥珀研

飛一兩

水安息香

一兩無及酒熬成膏如無以旱安息香代之

西牛黃

五錢

麝香

錢一

龍腦

錢一

金銀箔

各五

為極細末

將安息香

重湯煮入

諸藥浸和分作百九塊

護臨服剖用參湯化下

紫金丹

牛黃

水片

狗寶

鴉片

分六

廣木香

二兩右

為末人乳九重五釐

金箔為衣

震靈丹

禹糧石

赤石脂

紫石英

代赭石

各四兩

上四味作小塊入淨鍋中

鹽泥封固候乾用炭十粒燒炭盡

為度入地出火氣必得

二晝夜研細末

乳香

兩一

沒藥

兩一

硃砂

水飛一兩

五靈脂

兩一

為末同前四味和勻糯米飯九宜堅絳

四順清涼飲

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

水煎服

露蓋飲

人參

生姜

水煎露一宿空心

陽湯燉溫服

子和桂令飲

即桂苓甘露飲

七杳餅

杏附

一錢丁香皮一錢

甘松

錢益智仁六錢

砂仁二錢

蓬冰

廣皮

阿膠雞子黃湯

阿膠湯

河間中滿分消湯

清阿膠丸

蠲痛丹

香連飲

已上五方候考

按先生雖善用古方然但取其法而並不膠柱觀其加減之妙如復脈建中瀉心等類至用牡蠣澤瀉散、取此二味故案中有但書用某方而不開明約味者決非盡用板方必有加減之處觀者以意會之可也

論中所述諸方開列於後以便查閱

麻黃人參芍藥湯

桂枝

麻黃

黃芩

炙草

白芍

人參

麥冬

五味

當歸

甘草湯

生甘草

生姜甘草湯

人參

甘草

太東大棗

調中益氣湯

即補中益氣湯去

當歸白朮加木香蒼朮

升陽益胃湯

羌活

防風

獨活

白芍

葛根

黃芩

人参半夏

柴胡

黃連

白朮

甘草各五錢

柴胡

黃連各二錢

白朮

甘草各三錢

柴胡

桂枝黃連湯

即仲景黃連湯

黃連

桂枝

乾薑

人參

半夏

炙草

枳實

厚朴

各二兩

大黃

鐵

用一兩水煎服

溫脾湯

乾薑

肉桂心

熟附子

炙草

枳實

厚朴

各二兩

大黃

鐵



蘇合香丸

蘇合香

安息香

犀角 水牛

射香 香附

木香

薰陸香

沉香

丁香

白朮

陳靈丸 砥砂為衣外作蠟丸

五癩丸

硃砂

真珠

雄黃

水銀

黑鉛

陳靈丸

如麻子大每服三四丸

硃砂安神丸

硃砂

黃連

生地

當歸

甘草

人參丸

人參

茯苓

茯神

棗仁

遠志

益智仁

牡蠣

硃砂

棗肉丸

茯苓丸

茯苓

菟絲子

建蓮

酒糊丸或加五味子

濟生固精丸

杜鵑

菟絲子

韭子

龍骨

北五味

桑螵蛸

白石脂

茯苓

家韭子丸

家韭子

鹿茸

肉蓯蓉

牛膝

菟絲子

熟地

當歸

巴戟

烏雞煎丸

烏骨雄雞

一隻烏鵲

蛇床子

丹皮

白朮

人參

黃芪各一兩半

杜仲

肉桂

石斛

白芍

肉桂

附子

川烏炮炙去川烏炮炙

陳皮略二熟地洗去延胡

木香

肉荳

熟地

當歸

肉桂

白芍

肉桂

附子

川烏炮炙去川烏炮炙

陳皮略二熟地洗去延胡

木香

肉荳

熟地

當歸

肉桂

右細剉以烏雞湯燙去毛及腸雜將上藥納雞肚內用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油罩盛焙乾

為末煉蜜和丸如桐子大每服三十九隨症用湯引下

安蛇丸

即理中安蛇丸

侯氏黑散

菊花

白朮

防風

桔梗

黃芩

細辛

茯苓

杜鵑

人參

礬石

當歸

雞金散

雞內金

沉香

砂仁

陳香櫟皮

天水散

即六一散

本事方神效散

白海浮石

蛤粉

蟬蛻

為細末用大鯽魚膽七箇調服三錢

人參敗毒散

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

桔梗

茯苓

桂枝

甘草

為散酒服

蒼耳散

白芷

薄荷

辛夷

蒼耳

為末葱茶湯調服

聖濟透闕散

雄黃

猪牙皂莢

藜蘆

等分研末先含水一口用藥吹鼻即吐去水

有白藥等分

花蕊石散

花蕊石

四兩硫黃

一兩研細泥封煅赤服

一錢童便下

大秦散

蒲黃

五靈脂

備急如聖散

五精散

白芷

陳皮

厚朴

當歸

川芎

茯苓

桔梗

蒼朮

芍藥

枳殼

半夏

麻黃

乾薑

肉桂

甘草

薑

葱

牛黃膏

牛黃

二歲牛

礫砂

鬱金

丹皮

鱗

水片

錢甘草

錢

煉蜜丸如桐子大每服一丸新水化下

三才封髓丹

天冬

熟地

人參

黃柏

砂仁

甘草

一先丹

河車

具人乳粉

秋石

紅鉛

盜九每丸重七釐

琥珀黑龍丹

即黑龍丹

當歸

五靈脂

川芎

良薑

熟地

各二兩剉碎入砂鍋內

百草霜

硫黃

乳香

琥珀

花蕊石

鱗一

右為細末

醋糊丸如彈子大每用一二丸炭火煅

紅投入生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌下

左歸散

熟地

山藥

枸杞

炙草

茯苓

山萸

右歸散

即左歸散去茯苓加杜仲肉桂附子

溫胃散

人參

白朮

炮薑

扁豆

當歸

陳皮

炙草

歸氣散

熟地

茯苓

扁豆

炮薑

丁香

藿香

炙草

陳皮

大和中散

陳皮

枳實

砂仁

麥芽

當歸

陳皮

炙草

陳皮

四柱飲

人參

附子

茯苓

木香

六柱飲

即四柱飲加肉豆蔻子

山楂

澤鴻

五磨飲子

烏藥

沉香

枳榔

枳實

木香

白酒磨服

生鐵落散

生鐵落

清水浸研澄飲水

普濟消毒飲

黃芩

黃連

陳皮

甘草

元參

連翹

板藍根

牛蒡

薄荷

殼桑

桔梗

馬勃

或加入參

便開加大黃

清心蓮子飲

石蓮肉

人參

黃芪

茯苓

柴胡

黃芩

七福散

人參

熟地

當歸

白朮

山藥

扁豆

炮薑

吳萸

炙草

胃關煎

熟地

白朮

山藥

扁豆

炮薑

吳萸

炙草

甘草

升麻

柴胡

二陰煎

生地

麥冬

棗仁

甘草

元參

茯苓

黃芩

木通

秋元煎

人參

熟地

白朮

炙草

山藥

遠志

艾實

五味

遠志

金櫻子

固陰煎

人參

熟地

山藥

萸草

山藥

川斷

黃芩

甘草

杏實

菟絲子

保陰煎

生地

熟地

白芍

當歸

山藥

黃芩

甘柏

建蓮肉

遠志

壽脾煎

人參

白朮

炙草

當歸

山藥

東仁

炮薑

建蓮肉

遠志

玉鑰匙

馬牙硝

硼砂錢

白僵蚕

冰片錢

山藥

東仁

炮薑

建蓮肉

遠志

蒲黃酒

蒲黃

一兩炒

清酒十爵次之溫服

當歸

山藥

東仁

炮薑

建蓮肉

遠志

### 種福堂公選溫熱論醫案

#### 〔溫熱論〕

溫邪上受。首先犯肺。逆傳心胞。肺主氣屬衛。心主血屬營。辨營衛氣血。雖與傷寒同。若論治法。則與傷寒大異。蓋傷寒之邪。留戀在表。然後化熱入裏。溫邪則執變最速。未傳心胞。邪尚在肺。肺主氣。其合皮毛。故云在表。在表初用涼輕劑。挾風則加入薄荷半夏之屬。挾濕加蘆根滑石之流。或透濕於熱外。或涼濕於熱下。不與執相搏。勢必孤矣。不爾。風從溫熱而燥。生清竅必乾。謂水主之氣。不能上榮。兩陽相劫也。溫與溫合。蒸鬱而炎燒於上。清竅為之壅塞。濁邪害清也。其病有類傷寒。其驗之之法。傷寒多有變症。溫熱雖久。在一經不移。以此為辨。

前言平涼散風。甘淡驅溼。若病仍不解。是漸欲入營也。營分受熱。則血液受劫。心神不安。夜甚無寐。或班點隱隱。即撤去氣藥。如從風熱陷入者。用犀角竹葉之屬。如從溼熱陷入者。犀角花露之品。參入涼血清熱方中。若加煩躁大便不通。金汁亦可加入。老年或平素有寒者。以人中黃代之。急急退班為要。若班出熱不解者。胃津亡也。主以甘寒。重則如玉女煎。輕則如梨皮葛根之類。或其人腎水素虧。雖未及下焦。先自傍徨矣。必驗之於舌。如甘寒之中。加入鹹寒。務在先安未受邪之地。恐其陷入易易。且若其邪始伏在氣分流連者。可冀其戰汗透邪。法宜益胃。令水與汗併熱。達腠開邪。從汗出解。後胃氣空虛。當膚冷一晝夜。待氣還自溫暖如常矣。戰汗而解。邪退正虛。陽從寒泄。故漸膚冷。未必即成脫症。此時宜令病者安舒靜卧。以養陽氣。米復旁人切勿驚惶。頻頻呼喚。擾其元神。使其煩躁僵

辛涼明肺  
便是汗劑  
非如傷寒  
之用麻桂  
辛溫也

診其脈若虛軟和緩雖倦卧不語。汗出膚冷。却非脫症。若脈急疾躁擾不卧。膚汗大出。便為氣脫之症矣。更有邪盛正虛。不能一戰而解。停一二日再戰汗而愈者。不可不知。再論濕病有不傳血分。而邪留三焦。亦如傷寒中少陽病也。彼則和解表裏之半。此則分消上下之勢。隨症變法。如近時杏朴苓等類。或如溫胆湯之走泄。因其仍在氣分。猶可望其戰汗之門戶。轉瘧之機括。大凡看法。衛之後方言。氣營之後方言。在衛汗之可也。到氣籠可清氣入營。猶可透勢轉氣。如犀角之參羚羊等物。入血就恐耗血動血。直須涼血散血。如生地丹皮阿膠赤芍等物。否則前後不循緩急之法。慮其動手便錯。反至慌張矣。且吾吳溼邪害人最廣。如面色白者。須要顧其陽氣溼勝則陽微也。法應清涼。然到十分之六七。即不可過於寒涼。恐成功反棄。何以故耶。溼熱一去。陽息亦衰微也。面色蒼者。須要顧其津液清涼。到十分之六七。往往熱減身寒者。不可就云虛寒。而投補劑。恐爐煙雖灰中有火也。須細察精詳。方少少與之慎。不可真辛而往也。又有酒客裡溼素盛。外邪入裡。裡溼為合。在陽旺之軀。胃溼恒多。在陰盛之體。脾溼亦不少然其化熱則一。熱病救陰則易。通陽最難。救陰不在血而在津與汗。通陽不在溫而在利小便。然較之雜症。則有不同也。

再論三焦。不得從外解。必致成裡結。裡結於何。在陽明與胃腸也。亦須用下法。不可以氣血之分就不可下也。但傷寒熱邪在裡。却燼津液下之而猛。此多濕邪內搏。下之宜輕。傷寒大便溏為邪已盡。不可再下。濕濕病大便溏為邪未盡。必大便硬。慎不可再攻也。以屎燥為無濕矣。再入之體。脫在腹上。其地位處於中。按之痛。或自痛。或痞脹。當用苦泄。以其入腹近也。必驗之於舌。或黃或濁。可與小陷胸湯。或瀉心湯。隨症治之。或白不燥。或黃白相兼。或灰白不渴。慎不可亂投苦泄。其中有外邪未解。裡先結者。或邪鬱未伸。或素屬中冷者。雖有脘中痞痛。宜從開泄。宣通氣滯。以達歸於肺。如近俗之杏蔻橘桔等。是輕苦微辛。具流動之品可耳。

再前云。古黃或濁。須要有地之黃。若光滑者。乃無形溼熱中已虛象。大忌前法。其臍以上為大腹。或滿或脹或痛。此必邪已入裡矣。表症必無。或十之存一。亦要驗之於舌。或黃甚。或如沉香色。或如反黃色。或者黃。或中有斷紋。皆當下之。如小承氣湯。用枳榔青皮枳實玄明粉生首烏等。若未現此等舌。不宜用此等法。恐其中有溼聚太陰為溼。或寒溼錯雜為痛。或氣壅為脹。又當以別法治之。

再黃胎不甚厚而滑者。熱未傷津。揩可清熱透表。若雖薄而乾者。邪雖去而津受傷也。苦重之藥當推宜甘寒輕劑可也。

再論其孰傳營舌色必絳縫深紅色也。初傳絡色中兼黃白色。此氣分之邪未盡也。泄衛透營兩可也。純絳鮮澤者。胞絡受病也。宜犀角鮮生地連翹鬱金石菖蒲等。延之數日。或平素心虛有痰。外熱一陷裡絡就開。非菖蒲鬱金等所能開。須用牛黃丸至寶丹之類以開其閉。恐其昏厥為症也。

再色絳而舌中心乾者。乃心胃火燔。劫爍津液。即黃蓮石膏亦可加入。若煩渴煩熱。古心乾四邊色紅。中心或黃或白者。此非血分也。乃上焦氣熱爍津急。用涼膈散。散其無形之熱。再看其後轉變可也。慎勿用血藥。以滋膩難散。至舌絳望之若乾手捗之原有津液。此津虧溼熱黃案。將成濁痰蒙閉心胞也。

再有熱傳營血。其人素有瘀傷宿血在胸膈中。挾熱而補。其舌色必紫而暗。捗之溼。當加入散血之品。如琥珀丹參桃仁丹皮等。不爾。於血與熱為伍。阻遏止氣。遂變如狂發狂之症。若紫而腫大者。乃酒毒衝心。若紫而乾晦者。腎肝色泛也。難治。古色絳而上有粘膩似苔。非苔者。中挾穢濁之氣。急加芳香逐之。古絳若伸出口而抵齒難舉。伸者疾阻舌根有內風也。舌絳而光亮。胃陰亡也。急用甘涼濡潤之品。若舌絳而乾燥者。火邪劫營。涼血清火為要。舌絳而有碎點白者。當生疳也。天紅點者。熱毒乘心也。用黃連金汁。其有雖絳而不鮮。乾枯而痿者。此腎陰涸。急以阿膠雞子黃地黃天冬等救之。緩則恐涸極而無救也。其有舌獨中心絳乾者。此胃熱心營受灼也。當於清胃方中。加入清心之品。否則延及於尖。為津乾火盛。舌尖絳獨乾。此心火上炎。用導赤散瀉其腑。

再舌胎白厚而乾燥者。此胃燥氣傷也。滋腎藥中加甘草。令甘守津還之意。舌白而薄者。外感風寒也。當疏散之。若白乾薄者。肺津傷也。加麥冬花露。蘆根汁等輕清之品。為上者上之也。若白胎絳底者。溼遏熱伏也。當先泄溼透熱。防其就乾也。勿憂也。再從裡透於外。則變潤矣。初病古就乾。神不昏者。急養正微加透邪之藥。若神已昏。其內陷矣。不可救藥。又不拘何色舌。上生芒刺者。皆是上焦熱極也。當用青布拭之。薄荷水揩之。即去者輕旋即生者險矣。舌胎不燥。自覺悶極者。屬脾溼盛也。或有傷痕血跡者。必問曾輕搔挖否。不可以有血而便為枯症。仍從溼治可也。再有神情清爽。舌脹大不能出口者。此脾溼胃熱鬱極化風而毒延口也。用大黃磨入當用劑內。則舌脹自消矣。

論舌淡  
無色  
論舌白如

再古上白苔粘膩。吐出濁厚延沫者。口又酣味也。為脾癰病。乃溼熱氣聚。與穀氣相搏。土有餘也。盈滿則上泛。當用醒頭草。芳香平散以逐之。則退。若舌上苔加鹹者。胃中宿滯。挾濁穢鬱伏。當急急開泄。否則閉結中焦。不能從募原達矣。

若舌無胎。而有如烟煤隱者。不渴。肢寒。知少陰病。如口渴煩熱。平時胃燥舌也。不可攻之。若燥者。甘寒。益胃。若潤者。甘溫扶中。此何故。外露而裡無也。

若舌黑而滑者。水未旺火為陰。當溫之。若見短縮。此腎氣竭也。為難治。欲救之。加入參。五味子。芍。黃精。一舌黑而乾者。津枯火熾。急瀉南補北。若燥而中心厚瘡者。土燥水竭。急以鹹苦下之。

論舌淡  
無色  
論舌白如

論舌白如

舌淡紅無色者。或乾而色不榮者。當是胃津傷而氣無化液也。當用炙甘草湯。不可用寒涼藥。若色白如粉而滑。四邊色紫縫者。溫疫病初入募原。未歸胃腑。急急透解。莫待博陷而入為險惡之病。且見此舌者。病必見凶。須要小心。凡斑疹初見。須用紙燃照看。胸背兩脇點大而在皮膚之上者為斑。或雲頭隱隱。或瑣碎小粒者為疹。又宜見而不宜見多。按方書謂斑色紅者屬胃熱。紫者熱極。黑者胃爛。然亦必看外症所合方可斷之。然而春夏之間。溼病俱發。疹為甚。且其齒要辨。如淡紅色。四肢清口。不甚渴。脈不洪數。非虛斑。即陰斑。或胸微見數點。面赤足冷。或下利清穀。此陰盛格陽於上而月。當溫之。若斑色紫小點者。可熱也。點大而紫。胃中熱也。黑斑而光亮者。熱勝毒盛。雖膚不治。若其人氣血充者。或依法治之。尚可救。若黑而晦者。必死。若黑而隱隱四旁赤色。火鬱內伏。大用清涼透發。間有轉紅成可救者。若火斑帶疹。皆是邪之不一。各隨其部而泄。然斑屬血者恒多。疹屬氣者不少。斑疹皆是邪氣外露之象。發出宜神情清爽。為外解裡和之意。如斑疹出而昏者。正不勝邪。內陷為患。或胃津內涸之故。

再有一種白苔。小粒如水晶色者。此溼熱傷肺。邪雖出而氣液枯也。必得甘藥補之。或未至。久延傷及氣液。乃濕鬱衛分。汗出不徹之故。當理氣分之邪。或白枯如骨者。多因為氣液竭也。

再溫熱之病。看舌之後。亦須驗齒。齒為腎之餘。齦為胃之絡。熱邪不燥胃津。必耗腎液。且二經之血。皆走其地。病深動血。結辨於上。陽血者色必紫。紫如乾漆。陰血者色必黃。黃如晝辨。陽血若見妄胃為主。陰血若見。救腎為要。然豆

論舌白如

論齒

辨色者多陰。若症還不速者尚可治。否則難治矣。何以故耶。蓋陰液竭。陽上炎也。

齒若光燥如石者。胃熱甚也。若無汗惡寒。衛偏勝也。平涼泄胃透汗為要。若如枯骨色者。胃液竭也。為難治。若上半截潤水不上承心火炎上也。急急清水救水。俟枯處轉潤為安。若咬牙斷齒者。濕熱化風。經病也。咬牙者。胃熱氣走其筋也。若咬牙而脈症皆衰者。胃虛無設以內榮。亦咬牙也。何以故耶。虛則喜實也。舌本不縮而硬。而牙關咬定難開者。此非風痰阻絡。即欲作瘧症。用酸物擦之。即開。酸走筋。木采泄土故也。

若齒垢如灰糕樣者。胃氣無權。津亡。溼渴用事。多危。而初病齒縫清流血痛者。胃火衝激也。不痛者。龍火內燔也。齒焦無垢者。犯齒焦有垢者。腎熱胃劫也。當微下之。或玉女煎清胃救腎可也。再婦人病溫與男子同。但多胎前產後。以及經水適來適斷。大凡胎前病。古人皆以四物加減用之。謂護胎為要。恐來害胎。如執權用井底泥。監布浸冷。覆蓋腹上。寧皆是保護之意。但亦要看其邪之可解。處用血膩之藥不靈。又當審察。不可認板法。然須步步保護胎元。恐損正邪陷也。至於產後之法。按方書謂慎用苦寒藥。恐傷其已亡之陰也。然亦要辨其邪。能從上中解者。稍從症用之。亦無妨也。不過勿犯下焦。且屬虛體。當如虛怯人病邪而治。無之母犯實體。虛盈之際。况產後當氣血沸騰之候。最多空竇。邪勢必乘虛而陷。虛處受邪為難治也。如經水適來適斷。邪將陷血室。少陽傷寒言之詳悉。不必多贅。但數動與正俱寒不同。仲景立小柴胡湯。提出所陷熱邪。參棗扶胃氣。以衝脉隸屬陽明也。此與虛者為合治。若邪熱陷入與血相結者。當用閻氏小柴胡湯。去參棗。加生地。桃仁。杏仁。皮。肉桂。心氣滯者。加香附。陳皮。枳殼等。然熱陷血室之證者。刺期門。重者小柴胡湯。去甘藥。加延胡。歸尾。桃仁。快寒加肉桂。心氣滯者。加香附。陳皮。枳殼等。然熱陷血室之症。多有譙語如狂之象。防是陽明胃。當辨之。血結者。身體必重。非若陽明之輕旋便捷者。何以故耶。陰主重濁。絡脈被阻。側旁氣壅。連胸背。皆拘束不遂。故去邪通絡。正合其病。往往延久。上逆心胞。胸中痛。即陶氏所謂血結胸也。王海藏出一桂枝紅花湯。加海蛤桃仁。原為表裡上下一齊盡解之理。看此方大有巧手。故錄出以備學者。有用。曹六述去冬因惱怒時食厚未遂致不飢。瘦氣脫瘦。食物不下。視舌上佈苔如粉。不渴飲。大便通調。議從太陰脾陽。為寒痰濁氣凝遏。半溫定法。厚朴 草果仁 薑汁 草機 生益智仁 廣皮白

又 前因陽結濁聚。舌胎白厚。不渴飲。用姜草半溫得效。近日食物不慎。水穀氣凝。清陽再呈為嘔。舌胎猶未便。

不寒不熱  
痢

利

不

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

血

督

腎

便

姚一述四月患瘧。嘔痺必係溫熱犯上。溫不盡解。肺津劫爍。燥痒嗰。防有氣損熱失血之累。甘寒潤劑。不致傷胃。

荳豆殼

麥冬

生甘草

連翹

南花粉

金銀花

蔗漿半杯

又

浮熱上炎。精走泄於下。致陰液陽精不肯上供。望色萎瘦。納食不旺。攝陰恐妨胃口。况初夏曾患嘔症。大暑熱

泄陰難生復

光議水陸二仙丹。攝固精關。

人參

秋石

艾實

金櫻子膏丸

古營陰虛

濕暑熱

古營陰虛

濕暑熱

顧操持無有不動心神。心陽上引相火交升。燔灼營液。舌為心苗。遂起沸源。病由情志不適。非湯藥莫資直降可

治。議天王補心丹。制伏躉陽道路。營液得以升降自如。然必心境怡悅。方能却病。

李三長夏時令。溫熱內阻氣分。宗內經溼淫於內。治以淡滲。佐以苦溫。

飛滑石

川通草

淡竹葉

杏仁

厚朴

頭痛肝脾

筋骨

茹五向來無病。因服地黃丸。反左脇腰中臍旁氣攻作痛。間有遺精。目暗虛花。或起浮翳。據述用細辛桂枝等退。遂加頭痛。此體質陽虛。誤用陰寒藥濶所致。夫肝主疏泄。腎主藏固。肝宜涼。腎宜溫。納腎佐以通肝。溫下仍佐腎陰

以制木火。是為復方。

當歸

小茴

補骨脂

胡桃肉

茯苓

穿山甲

炒黃柏

青鹽

虛勞羸弱

筋骨

林八色蒼形瘦。稟質陰虛火亢。津液不充。喜冷飲。夏季熱蒸。須培生氣順天時以調理。

麥冬

知母

川貝

地骨皮

丹皮

荳豆皮

淋帶陰虛

筋骨

項八心熱。顛空。爻寅卯帶下。向宋陰不足。少陽陽動。中虛食減。靜養至秋涼可望陰充。

人參

柏子仁

丹參

天冬

茯苓

建蓮

龍骨

白薇

病肝火

筋骨

曹叶笑則癆。破病發。晝少夜多。惡二月起病。春木正旺。內應厥陰肝臟。木火乃陽極之化。其來迅速。由內而升。神明

遂亂。口吐涎沫。四肢寒冷。肝病何疑。由春病及長夏。醒則如無。納食如昔。法以純苦直泄厥陰。

蘆薈

青黛

龍胆草

川棟子

黑山梔

白芍

青皮

歸尾

豬膽汁

又

前方用純苦。真清肝胆。初服即渴。病久陰分已虛。

議陰和陽。入酸以約束之。

生雞子黃

阿膠

川連

黃柏

生白芍

米醋

徐六胃減痰血頻發。上年誤服玄參山梔。致便溏瀉。此受苦滑寒涼之累。

人參建中湯

吐衄單陽

虛陽反胃  
氣滯血瘀

浮陰虛陽

卿五酒客食管下臨回有脫痛多食即反留氣阻日久必致瘀凝。食物宜淡薄。以上中二焦宣通氣血治。  
桃仁 蒲黃 降香末 蘇梗 香附 橘紅  
程六形瘦肌削。夏月偏熱。夏秋病甚。是陰虧不耐暑熱發泄之氣耳。霜降收肅令行。浮陽潛伏。陰得自安。病覺稍退。  
述食平疎熱燥不安。其臟陰丘液為陽症變疫。非如疫飲可用陽藥溫通者。

人參 菟肉 川石斛 磁石 淡秋石 胡桃肉 女貞子 旱蓮草

和 痰血 上午偏多 氣分熱熾 金石斛 川貝母 桑葉 南花粉 大沙參 知母

單七為母喪悲哀。泣澆淹不食。面黃唇淡。情志不適。生陽鬱室。內經謂思為心疾。鬱必傷脾。病屬無形。非傷食惡食之

比。稱年調理後天脾胃為要。佐以開益心氣。○人參、茯苓、炙甘草、淮小麥、益智仁、石菖蒲。

于 馳騎習武。百脈震動。動則絡逆為痛。血沸出口。納食起居無異平日。非虛損也。凡氣為血帥。氣順血自循。經不

必因血用。沉降重藥。杞杞葉 炒蘇子 生苡仁 金石斛 炒桃仁 降香末

王四望五年歲真陽已衰。納食逾二三日反胃湧吐。仍有不化之形。痰涎濁水俱出。大便漸秘。此閼格大症。陰枯陽

結使然。人參 半夏 茯苓 泡淡吳萸 生淡乾薑 夜另服半硫丸一錢五分

蔣三晨瀉數年。跗腫足冷。長夏土旺初交。知飢惡間妨食。述兩三次半產不育。下焦氣微不固。任督交空。本病當以  
肝腎奇脈設法。今議先以胃藥。以近日雨後暑溼乘陽侵犯耳。

人參 茯苓 益智仁 砂仁殼 炒扁豆 木瓜

又 連年半產不育。瘕泄。足跗浮腫。前用養胃和肝。非治本病。因暑溼傷而設。議固下焦之陰。益中宮之陽。

人參 禹糧石 紫石英 五味子 茄絲餅 砂仁 用蒸餅為丸

邢 暴怒傷肝。白帶下注。繼而間血。人身衝任督帶諸脈皆麗身半已下。醫用上中二焦涼藥。焉能圖倖。自言月事

來而漏帶急。初起火少腹腰痛。此內熱。是血絡陰液損傷耳。性嗜酒。酒力先入肝胆。急當禁止。議固脈以攝下。

枸杞 炒黑當歸 白薇 桑螵蛸 青花龍骨 生紫石英 前藥送靈丹

陸二腰冷膝骨痺。寒濕。溺後坐中空痛。少年未婚。此是勃強勞傷精闘。且臥床必要執脊腰背。虛象太著。又冬病

虛勞羸虛

淋帶瘧

熱

陰陽並盛

陰陽並盛

吐血氣分

吐血氣分

熱心脾

熱心脾

土血勞傷

土血勞傷

浮陰虛陽

浮陰虛陽

加問食少胃弱。非地黃膩滯知柏湯陽可投。

菟絲子 覆盆子 茄實 沙苑 家韭子 補骨脂 舟茴香 金櫻子 線魚膠丸

遺精勞心  
損神  
泄渴降陽  
夜

王六 過用心思。營氣日滯。心悸眩暉。遺精。腰膝下部畏冷。陰陽造偏。心腎交損。謙鎮法以固攝溫納。

桑螵蛸 人參 茯神 青花龍骨 金箔 薄陽 密丸

顧 痘已半年。夜寐易醒。汗泄自覺元海震動。腹鳴晨瀉。年歲望六。不僅經營煩勞傷陽。腎真亦漸散越。仍議固下一法。人參 赤石脂 禹餘糧 五味子 泡淡乾薑

徐九月事將至。尻骨脊椎痺痛。此督脈猶行之位。况經水之下。必由衝脈產育頻多。奇脈失固。議治陰中之陽。

麋耳 人參 歸身 炒黑小茴 茯苓 川斛

唐二經來一日。偶食冷物。經水即止。遂痞悶不食。乳旁堅腫痛脹。此是肝氣鬱結。蓋經水由衝脈而下。衝隸陽明。胃中受冷。而衝脈血凝。理從肝胃同治。青橘葉 香附汁 漏蘆 蒲公英 厚朴 杏仁

徐八產後未經旬。長途馳驅以勞形神。歸值母喪。悲哀哭泣。傷及情志。遂肉瞞陽驚恐少寐。產傷陽分起。見肌肉恙熟如焚。乃陰不攝陽。熟地炭 茯肉 龍骨 茯神 淮小參 南棗肉

何十述無病時形瘦。病發時形尤古稱入水之物。無物不長。陰寒侵入右股內。膍筋惕而痛。指不屈伸。法雷通瘡寒

以逐留者。川烏一錢 全蝎一兩 蜂房五錢 自然銅五錢 膜香油 炒熟大黑豆淋酒汁為丸。每服一錢。陳酒下。

汪 肺熱膈消熱灼。迅速如火。臟真之陰日削。先議清肺以平氣太法。當苦降以輕。鹹補以重。繼此再茵蕪養血液。

孫二行走間挫左腿。肢筋弛無力。亂藥雜技。五六不愈。延及精血內損。不可束筋充骨矣。暫半年。壯冀其生真續。

枯黃芩一錢 溶入阿膠錢

施旺藥用平補。然火絕於戒勞。庶克臻效。虎潛去瑣陽。加從容精羊肉膠丸。

趙 納食不充。肌膚陽傷。背痛。陰寒水冷。經營作勞。勞則氣乏。經言勞者溫之。甘溫益氣以養之。歸脾建中湯

李中陽 方傷  
中陽

秦精血損  
中陽

肝火下垂  
不攝

卷木乘土

陳五操勞動怒耳。鳴頭脹暉眩肢麻內起火風皆厥陽之化。中年以後男子下元先虛。慮其仆中。議填鍼固攝以資下合乎上病治下之旨。熟地 玄武版 靈磁石 五味子 山萸肉 炒杞子 天冬 牛膝 青鹽 程八標梅過期病由情志鬱傷。庸醫不究病因。朝暮更方。病延日久。內經謂二陽之病發心脾。蓋因傷心鬱傷脾。二臟有病。不可統血。笄牛莫重於經水通調。今懶閉半載。嘔吐清涎。腹痛泄瀉。心熱皮寒。顯是木鬱乘土。胃口漸敗。生氣易振。病成乾血勞怯。考古通經等九難施於胃餌之穀之體。姑議安胃和肝。俟秋深時再議。

人參

白芍

川棟子

生淡乾薑

川連

烏梅

粗桂枝

炒焦歸身

溫兼風溫

痰氣火不  
降

董四風溫溼上受。痺阻氣分。上則咳嗽不得卧息。下則溺少便溏。夫肺主一身之氣化。邪壅則升降不得自如。做經旨溼淫於內。主以淡滲。佐以苦溫為治。飛滑石 袂苓皮 白蔻仁 竹葉 厚朴 杏仁 薤根 陳三煩勞氣火多升少降。喉中梗阻。痰出噫氣。凡酒肉皆助熱。痰凝氣分上焦。壅塞。

枇杷葉

水蓮皮

降香末

杜蘇子

黑柏皮

苡仁

虛勢陰虛

陽浮

宋四精壯年歲。面色萎黃。氣逆必心悸。眩暉。問足跗易冷。間有遺洟。此皆煩勞辨事。心陽過用。暗吸腎陰。下元日虛。虛風挾陽。旋動不息。全是內損之病。治法取質味。疑厚以填之。甘酸以緩之。重以鎮怯。補以理虛。方是培本尋源之治。熟地四兩 莪肉二兩 琉陽二兩 茯神四兩 五味半 龜甲心二兩 秋石一兩

青龍骨二兩

金櫻膏二兩

艾實四兩

蜜丸

陽痿淫熱

夏三陰柔曰宗筋。肝主之。冷則筋縮。熱則弛長。少壯營養。起於長夏。天氣已熱。地中濕蒸。內經病機一十九條例。謂因溼者大筋更短。小筋弛長更短為拘。弛長為痿。此雖統論痿症而言。非指坐瘓立論。然理亦相通。今逾年不愈。大暑時令。証得脈象。非下焦陽衰。兩目紅赤。想經營煩冗之勞。陽氣久集於上。與暑熱內迫。加以水穀之溼。溼蘊化熱。而燔筋致痿矣。法當以苦堅陰。燥以勝溼。介以潛陽。溼去執清。自有愈期。

鍾五未及五卯。內消食減。此未老已衰。身動喘急。足跗至晚必腫。皆是腎真不司收攝納氣。根本先機。草木微功。難以恢復。坎矢 人乳粉 五味子 胡桃肉 蜜丸人參湯送下

益分清宜  
不攝

增名醫古今錄 卷之二  
公選醫案  
增名醫古今錄 卷之二  
上海文益書局石印

吐血勞傷  
心神

漏痛醫薰  
虛火

漏痛醫薰  
虛火

王三煩勞曲運神田。形與神交傷。陽氣旋動。絡血何以甯靜。甘以緩熱。補以益虛。必佐甯神鎮怯。以攝之固之。  
人參 柏子仁 炒枸杞 焦歸身 桂圓肉 炙甘草 龍骨肉 蓉神 金箔

單 因悶連脇痛。久則倉血絡血。氣熱內迫。新血瘀逆。 鮮生地 蘭節 生桃仁 新

宋 暑熱入營。舌絳煩渴。形脈皆不足。怕邪陷神昏。

犀角尖 南花粉 連翹心 益元散 淡竹葉 細葉菖蒲汁

虛勞陰虛

虛勞陰虛

程五 男子思念未遂。陰火內燔。五液日奪。孤陽升騰。薰蒸上竅。已失交泰之義。此非外來之症。凡陰精殘廢。務在胃旺納穀生陰。今咽喉鼻耳諸竅。久遭陰火之迫。寒涼清解。僅調六氣中之火。而臟真陰火力閥雷迅速。莫過消寒。必不却病。良由精血內空。草木藥石不能生精充液耳。

細生地 清阿膠 天冬

痰飲中陽

虛

姜四 久患胸右有形。形瘦畏風怕冷。卧則吸嗆痰沫。凡治痰飲。須辨飲食。食少已極。議治中宮之陽。苓桂术甘湯。徐 孤疝氣墜。鹿茸 大茴 寶歸 沙苑 乾蓴客 生薑 肉桂 平因丸

徐七 經水未來。春末夏初。痰血形瘦。耳鳴。食過如飢。飢不納食。肝陰不生。熱自內灼。漸成乾血勞症。必要經來可愈。但女工繡針。凝眸端視。即動陽生火大忌。

曹 辛溫芳香。開氣解鬱。嘔出血餅。嘔吐頓減。蓋氣阻血凝。堵塞脘中升降之路而痛。自服药以來。微微欲飲。而大

便結燥。知不耑於辛溫矣。 青葱 桃仁 歸尾 麻仁 郁李仁 冬葵子

虛勞中陽

虛

又 療盡喉氣間嘔。此陳腐未掃。乃無形之聚。用辛芳涼滑治之。鮮首頭草頭。滾水泡湯。和入竹瀝。分作三

孫八達腰近劑。久痛若空。焚添屬冬。四肢不暖。此由幼年精未充旺。早洩既損難復。八脈司失。是陰損及陽。灼煩達及奇經。可冀漸效。

吳四 精濁已行。步久無力。食冷口吐酸水。陽氣微弱。治在脾腎。

益智仁 家韭子 蕤盆子 胡蘆巴 遠志 小茴 兔絲子 金櫻膏丸

虛

王五 陽結於上。陰泄於下。晨汗多。因腎虛陽傷及陽。胃口自備。舌畏辛竦。不受桂附之猛烈。虛腫虛脹。先宜固劑。淋渴。脾腎陽衰。

虛勞奇脉

虛益腰痛



肺萎勞傷  
理虛酸收其散大忌苦降辛開。桂圓肉 枸杞子 炙黑甘草 五味子 山萸肉 菊花炭  
愈。一父歎失音。飲食仍進。自覺淹淹無力。此是內傷勞倦。夏月泄利。是暑溼氣感。不在本病之例。食減肉消。治嗽無  
益。以肺痿論。白芨 生黃芪 炙甘草 汗仁 黃精

產後勞傷  
溼溫陽陽氣  
周二暮勞下元先空。咳音不轉。必致嘔吐。是衝脈虛。氣逆上攻。薰蒸肺臟。延及不飢減食。腹痛便溏。乃清內熱泄肺。  
醫嗽之保。炒薑歸 生白芍 炙草 南茱萸 肉

咽喉陰火  
瘡瘍歸 滋腎丸  
曹三陰火候藥

吳立平昔飲酒。夏令再受地溼之感。內外溼邪傷陽。阻遏氣機流行。遂致一身盡腫。針刺出水。消癰復腫。皆由陽氣  
已衰。水溼無以分逐。苟非氣雄通陽。陰凝何以走泄。所服八味湯。僅溫煦腎陰。與陽維不合。

川烏 附子 生白朮 茯苓 木香 黑荳皮

咽喉陰火  
瘡瘍歸 滋腎丸  
咽候陰火  
瘡瘍歸 滋腎丸

李四口勞必疝墜。按之有聲而解。是虛而氣乘。非因寒也。閭所服之药。半屬辛熱。不知質偏精血內空。法當溫固。不必  
偏熱偏寒。熟地 茯神 炒遠志 鹽魚膠 柏子仁 五味子 紫胡桃肉 沙苑子

管七少腹有形。六七十漸加脹滿。述臨暮納食。夜久腹鳴。寢泄。蓋老年坎陽日衰。坤土不運。濁陰下聚。凡冷滯肥膩  
食物宜忌。勿預家務。怡悅情懷。以為却病之計。若徒恃醫藥。非養生之法矣。人參 兔絲子 茯苓 胡蘆巴

舶茴香 上肉桂 補骨脂 砂仁 金鈴子 肉果山藥糊橘丸

吳七脇中刺痛血逆。心中湧滿。隨吐而出。兼有嘔惡腹痛。此猝年情志鬱勃。陽氣多升。絡血逆行。經水不下。忍延乾  
血重症。山楂 桃仁 桃仁仁 丹皮 延胡 益母草

張十暑入心胞。煩熱。多驚。舌胎黃而不渴。連翹 犀角尖 益元散 大竹葉 石菖蒲 川貝

周十四天稟薄。壯精氣不足。形神勞動。陽乃浮越。精血皆有形。非旦夕可生。培養無形元炁。可生有形之精血。勿

誦讀煩心。勿操精勤。督脈百日。壯年可以生復。兩儀煎

孔十六頭風傷目。是內起之風。屢投發散清涼。药不對症。先傷胃口。做內經辛苦。急食甘以緩之。

枸杞子 桂圓肉 茯苓 炒熟半夏

清涼散傷  
胃

楊西一肝風化燥犯胃。惡心痰悶。食入作脹。口渴。識養胃制肝。人參。金石斛。烏梅肉。麥冬。新會皮。施坐不得卧。胸滿氣喘。暑風溼氣。漫處三焦。太陰膀胱不開。邪鬱生熱。氣壅生腫。先議開三焦。氣分之室。

杏仁。白蔻仁。滑石。寒水石。猪苓。廣皮。厚朴。茯苓皮。

王六桔梗勞形。擇持勞神。男子何老。下元精血先虧。陽失交護。浮越上胃。致耳目清空。諸竅不爽。凡下虛者必上實。此風火非由陰不配陽使然。虎潛丸。

李少肌柔色白。形氣不足。當知識年歲。龍雷突起無制。乾倉咳嗽。連情不明。不透。有夢追精。月熱理嗽。清熱胃減。墮入虛勢。能知命靜養。莫其漸次充復。三方湯加蓮肉芡實茯神柏子仁。

姜三痢已八月。久痢自必傷腎。下失收納。據述泄氣真通稍夷。非寒膿固滯所宜。用景岳理陰煎。

唐一陽浮汗泄衄。血皆下焦。真陰不充。適值乘龍之喜。與病相悖。議填寶下元之陰。制伏浮陽。

熟地。萸肉。五味。女貞子。早蓮草。茯神。秋石。黑殼建蓮。蜜丸。

王三瘡邪流入肝絡。蓋舉寐中夢擾。熱逼筋骨。波傷腹痛。正虛邪伏。滋養不效。

生鱉甲。生地。胡黃連。丹皮。黑山梔。青黛。

計四酒客內有溼熱。腸膿初愈。精神未復。小暑泛潮。外溼與內溼併合。致傷脾胃之路。便血繼以止血。久延肉消神

倦然脈絡之溼蒸熱虛仍在此病邪為本虛為標。非補滻藥所宜。

茵陳。茯苓皮。厚朴。廣皮。海金沙。雞肫皮。大腹皮。杏仁。砂仁殼。

王六日患其來甚。嘔吐發風熱。寒涼漸起。翳肉欲遺。木泄已見淋濁。陰虛弱質。暑溼熱氣。直入於陰經。非欲速易愈之症。石蟹。苦丁茶。金石斛。桑白皮。飛滑石。乾荷葉。夏枯草。

顧叔稟質聰慧。當此已有知識。勤讀夜坐。陽升則上熱下冷。真陰不能生旺。長夏變幻腹疾。以泄濁療熱論之。乃虛人暑伏脾胃。議用東垣法。人參。煨葛根。廣皮。黃柏。生穀芽。澤瀉。茯苓。川連。

胡三形質偉然。吸氣不入。是腎病。自言心緒少適。六七年夕藥無效。近來納食不運。夜必驚惕而醒。先以兩安心腎。鎮法理虛。人參。茯苓。龍骨。小麥。炙草。金箔。

曾子

公選醫案

小麥

金箔

上海文益書局石印

瘡溼熱

嘔膈反舌

氣逆  
痰癰寒凝

顧八凡寒溼癥。久則變熱。六氣客邪。悉從火化。邪客驅殼節骱。熱氣還蒸諸竅。脅脇癰疹搔痒。已食酒肉方可向愈。

羚羊角

犀角

僵蠶

粗桂枝

花粉

白蒺藜

桑根皮

錢一五中年食入涎沫上壅吐食。此屬反胃。姑以淡薄滋味。清肅上氣。平昔飲酒惡甜。約不宜重以損胃。

鮮杞子葉

杜駢子

降香

橘紅

蘆根

苡仁

張四二上年產後。至今夏經轉。寒涼遂結氣瘕。自少腹攻至胃脘。脫痛氣結。宜開先用金鈴子散。

廷胡

金鈴子

青葱管

山楂

生香附

蓬莪木

沈十平素飲食少用。已見脾胃不和。暑溼熱氣從口鼻入。募原受邪。邪氣蒸搏。口舌疳蝕。脾營胃衛。異氣混變。遂為

瘡溼熱。極質純陽。微冷熱勝。當以廓清三焦。蘊伏而脾胃最為衝要。

飛滑石 大竹葉 杏仁 厚朴 廣皮白 茄苓皮 白蔻仁

方三正。在壯年。交四月。陽氣升舉。忽然跌仆無知。頭搖肢搐。越旬又發。問病因忿怒所致。大凡病來迅速。莫如風火。

鬱怒由肝膽木火生風。從此而發癇厥。若僅謂痰火。用辛香燥劑。劫痰利氣宣竅。致陽不留。病更甚減。

龍骨丸

每服二錢。四服

胃痛溫藥  
血瘀

寒厥溼溫  
邪閉

寒溼過陽

陳六酒溼熱。氣氣先入胆。溼著胃係。疫聚氣室。絡血瘀癥。痛在脘。忽映少腹。氣血交病。先和少陽。陽明之陽。酒客惡甜。治以苦辛寒。土裏反 半夏 枳實 川連 生薑

周丘陰虛質弱。風溫溼溫皆邪在氣分。汗散陽液。邪入心營。神識昏昧。肢節微痙。仲景疫溼竭萃於一門。小溲不利。有三焦阻閉之危。飛滑石 鮮菖蒲根 茯苓皮 川通草 寒水石 廣皮 煎藥化服。牛黃丸。許四暑溼化氣。寒成瘞。初起舌白嘔吐。乃太陰脾病。誤用寒涼滋柔陰約。助其溼邪。引邪入營。舌亦不喜聚。何從氣分開其結。遂其溼。做古賢治瘞粉在通陽。

淡芩

雨

圓柏厚朴

草果仁

半夏

新會皮

高良薑

沖入薑汁五分

蔣 上年久暖少寒。冬不收藏。固花甲已外。腎真既虧。水不涵木。肝陽之風勃然上泛。遂令眩暉。經云下虛上實為厥。刀欲朴中之根芽也。此非外來之氣所感。由操持勞思。五志之陽刻升。煩動在裏。營血肢液暗耗。診脈左尺空弦。

中風陰虛  
陽浮

望色浮紅光亮。欲使用力。汗渴漿氣。偶爾立起。則足附骨。瘡色脈見症。顯明彰著。問所服藥。參內典。聖訓。皆

劉河間內經。與百凡上實下虛。耳鳴足痿。便溺不利。證每以濁熱清。投名曰飲子。宗是議主治。

便血肝胃  
不和

泄瀉寒溼

製熟地

肉蓯蓉

炒遠志

柏子仁

川斛

天冬

五味

淮牛膝

泄瀉寒溼

生芽木

生於术

炒香兔絲子

茯苓

澤瀉

火草

生薑

南棗

泄瀉寒溼

生於术

炒香兔絲子

茯苓

澤瀉

火草

生薑

南棗

泄瀉寒溼

生芽木

生於术

炒香兔絲子

茯苓

澤瀉

火草

生薑

南棗

泄瀉寒溼

生芽木

生於术

炒香兔絲子

茯苓

澤瀉

火草

生薑

南棗

泄瀉寒溼

生芽木

生於术

炒香兔絲子

茯苓

澤瀉

火草

生薑

上海文益書局石印

便血肝腫  
虛

嘔吐胃陽  
虛  
瘀勞傷氣  
血癥

體冒發風訖。此屬血液內奪。陽動化風以和肝清熱得安。今血氣失統。固在肝脾。必得陽明脈絡充旺。斯海流行。稱職讓。甘補佐以兩和方意。

人參 炙黑甘草 歸身 赤白製首烏 茅蔚子 酒炒白芍 桂圓肉 小黑櫻草皮  
潘下血純用苦寒。幸得補陽救正。陰陽造偏。浮腫咳嗽。此藏聚失司。當春升發洩之候。宜通補攝納。治其肝腎。若益木呆補。恐助濁凝。有脹滿之變。

人參 五味 伏苓 車前 熟地炭 炒歸身 巴戟肉

袁 脉濡面赤。呃嘔吐自利。此太陰脾陽受傷。濁陰逆侮。高年不可純消。擬用理中法。

又 中下陽微嘔。呃下利。溫中不應。恐延衰脫。夫陽宜通。陰宜守。此關閘不致。清散。春回寒谷。生氣有以把握。候王

先生主識。人參

附子

炮薑

炒梗米

赤石脂

生白芍

炙芍

伏苓

宋七脈帶濶。減食不運。脘中常痛。薑後血下如線。按經云。陰絡傷則血下。溢閨前方。補陰不應。反滋脈閨。蓋因不明

經營操持。多有勞鬱。五志過動。多令化熱。氣鬱血熱。三焦失於宣暢。若非條達氣熱。焉望血止。

於术炭

枳實炭

薑皮

炒焦桃仁

炒白芍

炙芍

伏苓

褚 晨起未納飲食。吐痰致嘔。減緩。胃陽傷也。由冬進知柏所致。其苦寒。胃先受傷矣。先用小半夏湯加桑葉。

席 精勞。氣血凝遏。脘閨助痘食減。治以宣通脈絡。

桃仁

當歸鬚

柏子仁

小胡麻

桑葉

桑芽骨丸

施立忽然神迷。逾時自醒。病起一年。頻發漸近。今診脈細弱。必未實熱。此因憂慮。情志受傷。手厥陰腎中之清真。為

濁淤所阻。內因之病理難速攻。姑以宣通神明。氣理痰氣為治。

于 賓 鮮菖蒲根

天南星

遠志

竹節附子

茯苓

薑汁

夜服白金丸

徐三聲苦不宣。痰出鼻竇上焦。肺氣空寒。經營有急。傷肺。酒熟薰蒸。亦主傷肺。宜平涼以宣之。薄味以清之。每日

吃淡荳腐花一杯

杞杷葉

蕪荷葉

桑葉

杏仁

牛蒡子

甘草

午前服

便血陰傷  
及陽肝風

動

徐仁久病氣血膠結。中不和。攻補皆不去根。仿古五積治例。每以疏通緩遂為法。不必峻劑。

雞內金

海浮石

蛤粉

歸鬚

桃仁

半夏

瓜萎實

枳實

山楂

呂

肢動如數。按之不鼓。便血自去。秋大發。今春頻發不已。凡夜寐夢泄。便血隨至。平時身動吸促如喘。氣衝咳嗆。心悸耳鳴。足肢痿弱。不耐步趨。種種見症。顯然肝腎真陰大傷。八脈無以攝固。陰既虧損。陽無有不傷。此滋補原得安受。嘗讀仲景少陰病治例。有填塞陽明一法。意謂胸液太去。關閉皆絕。而內風虛陽得以散旋。內擾屢投補陽。暗風隨至。聖人每以填塞其空似與內經腑通為補之義相左。然關門不固焉有平期。既驗之後。再以血肉有情。另佐東垣升陽之法。安養調補。自有成驗。先用方。

禹糧石

赤石脂

人參

五味

萸肉

木瓜

蒸餅為丸

燙肺胃津

李先知曰。下焦有病人難愈。須用餘糧赤石脂。以土屬外剛內柔。味酸質厚。能填陽明空漏。人參益氣生津。合木

瓜以入胃。更味酸收斂。液固陰以迫肝風。蓋陽明陽土。宜濟以柔。不用剛燥。慮其劫液耳。前方用二十日後換服。

溫肺膾

鹿茸

家韭子

補骨脂

生兔絲子粉

赤白茯苓

暮夜兼進東垣升陽法

人參

黃芪

熟朮

廣皮

炙草

炒歸身

防風

羌活

獨活

肝風脾虛

吳

辛泄太過

肺胃津傷

咽喉乾涸

出納氣阻

蓋肺為出氣之臟

姑進滋養上焦。以充化源。

生雞子白

玉竹

麥冬

甜杏仁

生甘草

嚴

填陰則陽和風熄。雖已獲效。春分後。診左脈垂尺已減。右脈弦。恐其熱氣泄。有減食神煩之意。早上仍用前方。

進戊己法。倣仲景肝病實脾之意。

人參

熟朮

茯苓

炙草

廣皮

方

飢不欲食。氣衝咽嗌。頭眩寒熱。汗泄皆肝陽升動太過。若加怒勞。恐有暴厥之虞。

川連

烏梅

人參

牡蠣

生白芍

炙草

包

熱灼耳鼻。諸竅皆痒。浮陽化風上擾。汗多不渴。此非氣分實火。鎮固不應。法當攝補。

上升

燙肺胃津

勞傷風

燙肺胃津

葉三鬱怒致病。心胸悶脹。甚至氣阻咽喉。呼吸有音。吐涎沫。又不熱渴。由肝病蔓延。所傷非一經矣。光理上焦。與

中焦。下焦。並治。

公選醫案

上海文益書局印

益火

培土

健陽

陰虛

肝火

胃

苦辛輕劑。鮮枇杷葉。杏仁。苦杏仁。懋金。金華皮。黑山楂。  
何一時流穢水。咳嗽腹痛欲渴。詢知勞動太過。陽氣受傷。三年久患。大忌清寒治嗽法。當甘溫以治之。

黃芪建中湯去薑

陸五服腎氣湯得效。是下焦陽微。致神氣昏昧。吸不得入為喘。溫補收納。一定成法。

人參

熟附

茯苓

東前

紫衣胡桃肉

姚脈左弦。肝風犯胃。水穀下咽即嘔。經月不愈。胃氣太虛。泄木必兼安胃。

人參

川連

黃柏

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

壅波濶氣

陰虛

肝陽

動

潘眉心痛。心中熱。腰脊痠痛。五心煩熱。自產後半載。形消食減。乃下焦陰液大耗。而肝風挾陽客動矣。病自內損固當補益。然閱所服方藥。雖曰養陰。半投苦寒辛散。是昧於根蒂已虛。雜用升泄。恐咳嗽躁厥至矣。

生地

阿膠

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

風溫外損

胃陽虛

動

腫

伍崩淋已久。少腹結瘕。液涸氣墮。幸甘溫潤之補冀得宣通。勿謂崩症徒以濁藥。

淡竹茹

杞子

柏子仁

郁李仁

冬葵子

歸身

脾溼熱內

使難

動

壅

任脉風溫及乎太陰肺病。與傷寒足經不同。輕劑恰合治上。無如辛散消冠。苦寒清火。劫損胃汁。致矯柔臟肺。一傷於邪。再傷於藥。氣鬱不行。壅塞喘咳。不飢不飽。此胃氣已逆。旬日以外。當甘涼生胃津。少佐宣降。不宜重劑。

玉竹

霜桑葉

大沙參

生甘草

甜杏仁

甘庶汁

肺陽不通

便難

動

壅

錢腑陽不通。肝失疏泄。至腹痛便難。因阻目赤。此酸苦泄熱。以通陽氣。仿前賢龍虎遺意。陽和風化腸垢始下。脉雖小安。而舌乾少津。陽明胃汁未充。仍宜甘寒為主。以性躁。肝急脾胃易虧也。

洪

勞心營耗

風火交熾

飲啖酒肉

溼熱內

壅絡虛脈實

肉腫如廻

當此小滿

陽氣大泄

一陰未復。致內風挾陽上

暴

動

壅

生地

阿膠

麻仁

炒麥冬

生白芍

茯神

暴

動

壅



陽曆附之光復兵

人參錢半

扶神三

真阿膠

麥冬一錢

生杜蠟

龍骨錢

生白芍錢

細甘草

炙黑一錢

陽傷便結

又

己酉歲正月初九日診。蒙縣欲遣丸方。

人參二

熟地四兩

河車膠

五味半

靈芝子半

菟絲子半

扶神二

湖蓮肉二

遠志一

山藥粉和丸

蜜橘子半

辰星子半

寒肺失降

鐵清濁混亂所服之藥。半條平定。不充陽傷。致誤編逾月。先用火復丹。每服一百粒。薑湯送下。

周 痘小愈即食腥滯粘膩之物。胃陽尚弱。鐵濁病結。中焦不運。腸氣不行。大便七八日不更。舌苔淡薄。算覺氣之體。妄不受溫。前云鐵瘡上入肺位。最高客最先。因失治而漫泝中下。內經色診。謂從上病有治其上。斯源清流潔矣。水蘆根 白通草 山茵陳 生苡仁似浙伏苓 桑皮 研入白蔻仁末 卧時服威靈丸一錢。又 濁阻經絡為痛。初在虛里穴。漸延肋背附骨。日來背部發現溼症。微微紅色。此溼邪由氣及於血分。久約攻滯。僅走腸中。未能引經宣通。所用氣分肺熱。咳喘濁痰已緩。今經絡久痛。當以三因瘧症參看。

製瘧散

通草

木防己

炒焦半夏

生苡仁

浙伏苓

炒熟石膏

蜜橘子

茯苓

接服斑龍丸加參

中惡發穢

腹

寒風陽上

逆

潮溼下痢

陽傷

馬有三五日休息而至。蓋脈絡空乏。須填補孔隙。區區滋清之補。與產後奇脈之病迥殊。故不獲效。

人參 柴石英 炒歸身 鹿角霜 炒杞子 茯苓

大針砂丸

每服一錢二分

金銀少腹癰癤不和。據述因寒溼而起。緣產後精米不復。衝任已空。躋維不攝。經言陽微為病。苦寒熱矣。若云瘧邪

人

張少時營火不食不便。狀如神附。頭面肌浮。舌強唇腫。寤不能寐。夜多妄言。經少柴裏。此五志之厥。屬陽上逆。倣

俞氏治楊季登女例。用龍骨丸二錢。

辰星子半

吳

厥陰頭痛舌乾消渴。下煩疾無寐多寐少腹脹滿。小溲澀滴時時症搐。最怕厥竭。

阿膠

鮮生地

雞子黃

小黑櫻豆皮

前半盜滋腎丸一錢

顧幼稚喉端由外來風寒必從肺治。因過食甘膩必兼理胃。久發不已病氣蔓延不獨在肺胃間矣。故因勞致發遇冷而發乃衛陽已虛。煩動火升。面赤皆腎陰內怯。雖非已感之損。然因病致虛也。須知病是有餘體屬不足。不可徒用攻痰逐氣取快一時。當未發之時。病機潛伏。只宜培土以運痰。土旺則肺氣充。壯水納氣以益腎。子氣尤長母氣自強。此為子母相生之治。守之日久發作自緩。況宿病無急攻之法。或寓攻於補。或攻補互施。然寒暄飲食之調攝。於此症尤當加慎。早上服補納腎氣方。

薑汁製熟地

生白芍

懷山藥

丹皮

雲苓

紫衣胡桃肉

酸秋石

澤瀉

密丸

桐子大

午後服健中連溼方

人參

熟半夏

新會皮

茯苓

枳實

地栗粉

金石斛湯法九

王濕鬱執熱必陽氣鼓運。溼邪乃解。是寒蟄後身痛已緩。蓋溼從戰而氣舒。戰後陽氣通和為身執汗出耳。但脉濡神倦餘邪未盡。正氣已虛。有轉寒之象。用大半夏湯通補陽明。人參半夏茯苓薑汁

蘇早食暮吐大便不爽。病在中下。初因勞傷脾胃。疾癥有形之阻。

桃仁

半夏

韭汁

枳實

姚老年伏氣溫邪五十日不解。脘痞不饑。心中脅內獨熱。熱下咽則嘔。痰多呃逆。舌焦微渴。四末微冷。此胃傷已極。久之穀氣致津液不復。氣機鬱悶。用藥須忌苦燥辛溫妨胃。先議方有輕清兼以穀氣開醒上中。

香梗露

香綠露

玫瑰露

銀花露

木漿

劉痕聚攻觸中脘。心痛映背。嘔吐涎沫。凡久病。病必在絡。絡空必成脹滿。已經旦食苟安。晝食痛嘔。其胃中清陽久失旋遲之司。飲食尚助嘔脹。焉能承受湯藥。病退無期。頗為棘手。閱古人書。於久病有形通劑。是議先擬通陽。

改投小丸。一味阿魏丸。殊砂為衣服五分。

張形寒手足痛。肌肉漸瘦。勞力行走。陽氣受傷。客邪內侵。營衛失和。倣局方漚在四肢。汗出陽虛者。與葛根五物湯。

湯。黃芪桂枝

茯苓

炙草

當歸

煨茲

南東

胡胸臆不適。食入內服。冀後便血。病已二年。診脈左小澀。右微弦。食減形瘦。是內傷混鬱。初病在氣。久延血絡。而

便血惡勞。血滯

脾

津出陽

虛

血

陽



蔣 病已三載仍然能寢能食。非肺臟虛損。自述冷氣或聚胸膈。或貫肋脇。水飲下咽。汨汨有聲。氣得下降。宛若病去。此必支脈結硬。久又阻遏。氣隧流行。決非重墜攻逐。以及溫補臟濁可治。蓋絡脈為病。非半身。以開鬱議。

宣通氣血方法 降香 桃杷葉 麝金 橘紅 蘆子 桔梗 沉仁 桑葉 滷酒

金 動風濕有遺精。已是下焦陰陽虛損。况父病欲進溫養。必須通攝。桂附氣雄而剛。非下。損藥也。

淡黃芩 蒼骨脂 胡桃肉 生菟絲子 覆盆子 家韭子 船回香 筍苓

安 脈小數召蒼心痛引背。脇皆脹。早上牙宣頭血。夜寐常有遺洟。此形質本屬木火。加以情性動躁。風火內燃。

營陰受劫。故痛能進食。歷來醫藥治癆。每用平溫香散。破泄真氣。不知熱勝涼傷。適令助其躁熱。蓋年未能全期。議以柔制。熄其風。緩其急。與體質病情。必有合致之機。

細生地 阿膠 杜鵑 玄參 丹參 白芍 小麥 南棗

季 秋運愈未復原。冬季感觸溫邪。老年平素有痰嗽。本志溫動燭肺氣。劫胃汁。致痰多。甚破滯。脉散條熱。

右腸常痛。大色升於右頰。由胃津漸傷。肺不主降。而升騰莫制。古稱肺乃柔金。胃為陽土。已經百日纏綿。開提半屬苦辛。辛泄肺氣。苦再傷胃。致不思納食。議甘藥濡胃潤肺。胃汁自充。肺氣自降。土旺生金。古賢之定法。

玉竹 雪冬 花粉 甜桔仁 橘紅 薑藥

秦 老年腫脹。四肢俱冷。皆陽氣衰憊。濁陰僭踞。蓋脾陽主運。腎陽司納。今食入愈脹。二便不爽。中下之陽消乏。豈

尤 由肝氣升舉犯胃。胃逆不降。幽門不通。旁趨為脹。數月久延。氣分已入血分。可小視此病。

炮黑附子 淡乾薑 生白朮 生厚朴 茯苓 澤瀉

嚴 兩寸脈獨搏。不飢不食。上焦氣分之阻。時當仲夏。必有溼熱客氣內伏。

半夏曲 瓜萎皮 滑石 黃芩 通草 杏仁

(中風)

牛黃清心丸 此藥專治痰厥。嘔吐不醒。口噤痰喘。及小兒驚風發搐。五癇等症。極效。

膽星一兩  
汁炒

白附子一兩  
根

樹金錢一兩  
川烏一兩  
僵蚕一兩  
頭

半夏一兩  
皮硝湯泡五次足矣湯泡  
五次藥湯一次曬乾為末用之

右五味共為

細末。用臘月黃牛膽三個，取汁和藥，仍入膽內，紫口掛風簷下。至次年取膽內藥一兩四錢，加度過芒硝水飛長砂硼砂各一錢，水斤麝香各一分研極細末，和在一處，稀糊為丸，如芡實大，金箔為衣，置湯化下。

治暴仆瘓，涎壅塞，竹沥一盞，薑汁五匙，調入白礬末一錢，灌下。

治筋骨疼痛，如夾板狀，不可忍者，用驃子修下蹄爪甲燒灰存性研末，或黃酒或湯調服立愈。

治癰瘍秘方，熟牛骨髓一

熟白薑一兩半  
淹過

炒白麵一

炮薑末

右四味和勻

如彈丸大

每日三四丸

細

嚼黃酒下

大致

又威靈仙

蒼木

牛膝

桂枝

木通各一

右為末

黃酒五

觔煮一炷

草晚服

治雞腳風

手足及指

拳攣如雞腳狀

疼痛不時發者

當從鬼眼灸之

左右膝骨蓋下

兩邊各有小窩

共四穴

謂之

鬼眼各將艾灸三次即愈。愚謂以驅寒溼雷火針，針四穴亦效。

(補益)

奇想補心丸

柏子仁二錢去來

白朮一兩  
炒

生地一兩  
培

紅棗肉三兩  
蒸熟

右煉蜜為丸

蜜子大

每日三服

百日後

(百病消除)

棉子丸

烏鵲黑髮，煖腎裨子，陽虛人宜服此藥。

用棉花子十數觔，用滾水泡過，放蒲包內，閑一炷香，取出曬裂

壳，取仁并去外皮，用淨仁三觔，壓去油，用火酒三觔泡一夜，取起蒸，三炷香曬乾。

故紙一兩

杜仲一兩  
皮晒乾

杞子一兩

黃酒

兔絲子一兩

酒煮

此為細末蜜丸

桐子大

每服一錢

養元固本暖腰方

廣木香、真川椒、大茴、升麻各一

杜仲一兩  
皮晒乾

故紙一兩

升麻各一  
川附子一兩

丁香一錢

上肉桂

川棟子一兩

先將艾梗軟，次以各藥為末，和勻，用綾絹做暖腰袋，塞行腰上，著肉者神妙。

腰痛神方

雄豬腰子一付，銅刀破開去中周血膜及外邊油膩

青鹽一錢

大茴半錢

當歸半錢

杜仲去絲

右為末

入腰子內，放

磁器中過一宿，明日早用韭菜上下鋪蒸熟，用火酒洗去藥末，將腰子用銅刀切片，好陳酒空心送下。多年者吃

五六付，乍起者一二付即愈。

又杜仲一兩

補骨脂、牛膝、香附各三錢

青鹽半錢

將雄豬腰二對，竹刀剖開

去筋絲，每個內、外并藥用溼草紙包灰，火燶熟，去藥酒下，一醉即愈。

治下部無力 雄豬肚一個 紅棗肉助半兩 蓮肉兩 茄仁四兩 將糯米半升填入肚內好酒一鍾。醬油少許煮熟。每

日切幾斤空心好酒下。

長春方 治腎虛精冷之症

魚鱠一肋哈粉炒

棉花子一粒取仁去

白蓮鬚八兩 金櫻子去毛

川石

斛八兩 沙蒺藜四兩

杞子六兩 兔絲子四兩

五味子四兩

將鹿肉五助鋸薄片河水煮三盡。夜去角取汁熬膏

和藥末為丸桐子大每服三錢

歸園酒方

甘菊花八兩

杞子助當歸八兩

龍眼肉助右藥

將大酒三助酒釀十助泡二十日用。

二仙酒方

燒酒一鍾十助入龍眼肉一助桂花四兩白糖八兩。將泥封固愈久愈佳。

### (癆)

治吐血癆症

桂圓個紅棗十四個

蓮子二十個小黑豆四十粒

水二碗煎一碗空心早服連果吃完為妙。

治虛勞咳嗽吐血肺痿肺癰吐膿血垂危者服之即愈。

用艾白細根約三四兩搗碎將真陳酒煮絞汁每日服一

二次至二十日即愈。

治咯血吐血癆久不止

雪梨六十隻取汁二十杯生地茅根藕各取汁十杯蘿蔔麥冬各取汁五杯將六汁煎。

煉入蜜一助飴糖八兩。薑汁半杯再熬如稀糊則成膏矣。每日用一二匙。

治酒癆吐血

用雞距子一兩水二鍾煎一鍾不拘時服渣再煎服至數十日愈。

### (盜汗)

治盜汗方 蓼子根黑棗個浮麥合

馬料豆合用水一大碗煎八分服三劑愈。

又方 黃芩

馬料豆二味煎服半月愈。

又 五倍子去蛀末。另乾研末。男用女唾。女用男唾。調厚烟塗臍中。外用舊膏藥貼之勿令泄氣。兩次即愈。

止汗方 里宣錢浮參錢烏梅一

前湯服。

### (咳嗽)

治療嗽諸虛竒驗方 蘭汁

梨汁

蘿蔔汁

人乳

薑汁

白糖

沙糖

童便各四

將八味放磁瓶內用。

炭火熬煎。只剩一肋為止。每日空心白滾湯送下四錢。服完即愈。如能常服。則精神強健。永無虛損。  
治小兒吼噏。併大人咳嗽。屢驗方。致冬花錢。晶糖錢。將二味放茶壺內泡湯。當茶吃。自然漸愈。  
治小兒天哮。一切風溼燥熱。咳嗽痰喘。兼治大人。

海浮石淨末 四錢 飛滑石淨末 四錢 甜杏仁淨末 四錢 薄荷淨末 四錢 右為極細末。每服二錢。用百步煎湯下。

治痰火骨蒸。吐血不止之症。重者十服八服即愈。

人參 天冬 麥冬二味去心各錢半

茯苓分 杏仁二粒去皮尖

紅棗二枚去核

蓮肉六粒

人乳二匙

白蜜三匙

大甜梨一枚去心 將前藥製碎。納梨內。仍以梨蓋蓋之。用綿紙封固。飯上蒸熟。日間吃其梨。臨卧吃此梨。

治痰火方

咳嗽。吐痰。面鼻發紅者。一服即愈。

青黛水飛極細曬乾再研用三四錢 哈粉三錢

二味煉蜜為丸。如指頭大。臨卧口噙三丸。其效如神。

治痰火神水方

一名玄霜。黑鉛一肋。杵成一薄餅。中穿一洞。以繩繫之。將好米醋半盞。即以鉛餅懸掛甕中。離

醋約一寸許。甕口用皮紙塞子。繫緊。再以磚石壓之。勿使泄氣。於屋下陰處。待數日。取起鉛餅。上有白霜拭下。每鉛一肋。取白霜二兩為止。其霜治噎膈。每服五分。噙口內。以白湯送下。若治痰火咳嗽。每服三分。照前法服。

治痰火方 枇杷葉五十葉。去淨毛。水五十杯。煎至五六杯。再重湯煎至三四杯。每藥三茶匙。用蜜一茶匙調下。立治老人上氣喘急。嗽不得卧。生薑汁五兩。黑砂糖四兩。用水煎二十沸時。服半匙。漸漸嚥之。治喘。小姜一個。明礬棗大一塊。同燒存性。研末。以熟蘿蔔蘸食。療盡病除。

[吐血]

治吐血不止。用碗盛清水。吐血在內。浮者肺血也。沉者肝血也。牛浮半沉心血也。各隨所見。以生肺肝心者。或煎白

芨末。日日吃之。或只用白芨為末。來飲調服亦效。

治吐血方 吐血者。偶吐一二口。或不時吐之。側柏葉濃煎。和童便常服之。

又 用鴉頭為末。入炒蒲黃血餘灰等分。調服之。奇效。

又 用雞子一個。打開。和三七末一錢。鴉頭汁一小杯。陳酒半小杯。隔湯燉熟食之。不過兩三枚。自愈。

〔赤白二濁〕

治赤白濁 蕎治夢遺 名將軍蛋 生大黃三分 將雞子頂尖上敲損一孔入大黃末在內紙糊煮熟空心吃之四五朝即愈神奇秘方。

治色慾過度精濁白濁小水長而不痛者并治婦人虛寒淋帶崩漏等症 生龍骨飛水 生牡蠣水 生免絲粉

生薑菜子粉

右四味各等分

不見火研末生乾麵冷水調漿為丸每服一錢六七服即愈

治白濁

用頭生雞蛋五枚開一小孔每個入生白藥肉二枚飯上蒸熟每日吃一個即愈

治遺精滑失

白龍骨 研末 並薑菜子炒一兩

右為末空心陳酒調服二錢

小免絲丸

治女勞夜及遺精白濁崩中帶下諸症 石蓮肉二兩

白茯苓二兩

菟絲子五兩酒

右為細末山

藥糊為丸桐子大每服五十九加至百丸

或溫酒或鹽湯下空心服如腳膝無力木介湯下晚食前再服此方治

遺精之聖藥屢用屢效但石蓮子陳久者難得

治精氣虛滑遺不禁

龍骨 蓼殼 茜實 烏梅肉

各等分用山藥丸如小豆大每服三十九空心米飲下

治遺精方

文蛤研細末以文兒津調貼臍內立止

治一切淋閉白濁因火結莖中澀痛

新鮮苡仁根搗爛绞汁一碗或蜜酒或滾水冲入空心服二三次必效

思仙丹

治陰虛火動夢遺神方

蓮鬚兩石蓮肉十兩去內青

艾實十兩

右為末再以金櫻子三粒去毛

子水淘淨入大鍋內水煎濾過再煎加飴糖和匀煎藥丸如桐子大每服七八十九

〔蠱〕

治五藏神方

薤白子四兩用巴豆十六粒同炒

牙皂兩去渣

沉香一錢

枳壳四兩大酒切片炒

大黃一兩酒焙

琥珀一兩

右共為

末每服一錢隨病輕重加減

雞鳴時熱酒送下

薑皮湯亦可後服金匱腎氣丸調理收功

治水臌腫脹

輕粉一錢巴豆四錢去油

生硫黃一錢

右研末做成餅先以新棉一片鋪臍上次以藥餅當臍按之外

以帛縛之如人行五六里自然瀉下候五六次除去藥餅以溫粥補之久患者隔日方取去藥餅一餅可救二十人其效如神愈後忌飲涼水

治水臌方 陳皮桂、橘皮去筋肉五分

十金子去油壳二分半

滑石二

共為細末以腐皮色滾水送下十服全愈

治水臌氣臌方 治黑魚一尾重七八兩去鱗甲將肚剖開去盡腸入好黑礬五分松蘿茶三錢男子用蒜八瓣。

用七瓣共入魚腹內放在磁器中蒸熟令病人吃魚連茶蒜吃更妙此藥從頭吃起病從頭上消起如從尾上吃

起即從脚上消起立效之仙方也

治氣臌方 將大蝦蟇一隻破開用大砂仁填滿腹中黃泥封固炭灰煅紅冷定去泥研末陳皮湯調服放屁即愈

治氣臌氣服方 蘿蔔子二兩搗研以水濾汁用砂仁一兩浸一夜炒乾又浸又曬凡七次為末每米湯送下一錢

立效

治臌脹方 四五月將黃牛糞陰乾微炒黃耆為末每服一兩煎半時濾清服之不過三服即愈

解脹散脣方 治一切臌肚飽發虛大田螺一個雄黃一錢甘遂末一錢麝香一分

先將藥末用田螺搗如泥以麝置臍放藥臍上以物覆之東好待小便大通去之重者用此相兼小便大通病即解矣

治中滿脹 蔡胡蘆一個要三五年者佳以糯米一斗作酒待熟用葫蘆於炭火上炙熟入酒浸之如此五六次將瓢燒存性為末每服三錢酒下神效

治臌脹方 雄豬壯子一個入大蒜頭四兩加小核柳砂仁末三錢木香二錢砂鍋內河水煮熟空心服豬肚立效又取舊葫蘆一個浸鹽坑內一月取起掛長流水中三日炒黑為末每兩加木香末二錢每日空心砂仁湯送下二錢

治肝氣方 烏梅二錢橘皮三錢青鹽三分

真川椒錢右藥空心服

(痞塊)

治痞塊方 不問男女左右癥瘕積聚瘡瘍收取水紅花

即水邊蓼半老穗頭連葉蒂子曬乾不拘多少量用者蒜頭去皮膜同放石臼內打爛捏成餅曬乾為末每丸入蚶子壳煅灰研粉四兩再將老蒜搗膏為丸桐子大每服百丸

空心食後白湯下一日三服效

治大人小兒痞積 將水紅花子為細末以麵和作一處少加麝一錢放唇上以熨斗烙之數次即愈

又 水紅花子敷膏。入麝少許。貼之亦效。

治瘡塊 用水紅花新鮮者同老蒜打爛。量入皮硝一二兩。捏成餅。比瘡塊大一圍。放瘡上。用紙緊緊。待乾再瘡。則瘡亦消。

又 紅芥菜子即猶血芥不拘多少。生薑汁浸一宿。大約芥子一酒杯。加麝香一錢。阿魏三錢。同搗極爛。如膏藥攤青布上。貼患處。外用汗巾紮緊。一宵貼過。斷無不消。

又 名藥猪泡。麝香錢一。阿魏錢三。水紅花子。大黃。歸尾。甘遂。急性子。甘草錢五。右為細末。用豬水胞一個。量瘡塊大小。用尿胞大小裝入乾燒酒牛胞。將前藥末放入胞內。緊紮住口。用白布將胞兜紮於患處。俟塊化盡即去之。不可遲也。

治瘡塊八反膏 蟬頭。蕓菜。葱。蜜。甘草。甘遂。芫花。海藻。阿魏。鱉甲。水紅花子。右應為末者為末。應搗糊者搗糊。入末再搗如和不勻。加燒酒調之。先以水調白麵作圈。圍瘡上大六七分厚。其藥敷在瘡上。外用錫注一匣。放燒酒在內。熨瘡上。冷則更換至瘡內動痛方止。明日大便下臘血。即除根。

治氣瘡在小腹上攻衝。痛。用牙山甲片。土炒脆為末。砂糖調陳酒送下。每服三錢。止痛如神。如不能飲糖。酒調亦可。

化瘡膏 治塊如活蠍能行動。諸藥不效者。每日空心將旋花三四五匙。沖熱陳酒內服。至十日。即不動。服一二月即消盡矣。外用敷之。

治大人小兒瘡塊方 甘草。甘遂各三。硇砂錢一。

木蠶子四個。去壳。蕓菜錢三。

鱉肉一。葱頭個。

右加蜜少許。

搗成膏。以狗皮攤貼。如藥乾用葱。蓋潤之。二次即消。

治瘡塊方 腹中攻痛。面黃肌瘦者。愈有應驗。

真陳阿膠

一兩。蛤粉。步蘋研細。

九製陳膽星五錢人乳浸

川貝母一兩。去心。

麝香一分急。大研。

以上五味共為細末。用無腥直梢油二兩。火鎔開後。入前藥末在

內攪和。每服用乾膚衣溫水溫軟。取乳膚大一塊。包藥約一分五厘。不拘滾湯飯湯茶酒送下。清晨服三包。飯後服三包。不必多服。柏油用三兩亦可。極重者兩料必愈。

治傷寒結胸停食方 陳香糟茶 生薑兩 水菖蒲根兩 鹽二 右炒熱為餅敷胸前以火熨之內嚮即去。如口渴任吃茶水待大便利下惡物即愈。

治腹內虫痛方 烏梅個 老薑片 檸子樹 花椒粒十四 右加黑糖少許煎服虫盡出矣。

(膈)

治膈食脹效方 五六月用老生薑二三肋或四五肋放在竹簍內或麻布袋浸在糞缸內七日取出洗淨竹刀刮去皮切片空中吊著陰乾為末每服三錢火酒調下不過三服即愈。

治一切痰膈食膈效方 黑砂糖一連皮老生薑一將二味共搗如泥成膏入磁罐內封固埋乾燥淨黃土地

內七日取出每日和滾水服之。

繆仲清秋傳膈噎膏 人乳 半乳 莢蓼 梨汁 薑根汁 龍眼肉湯汁 薑汁 人參濃汁 右七味俱等

分。惟薑汁少許開湯熬成膏子下煉蜜發益煩服之其效如仙丹更須心安氣平勿求速效。

又 好陳酒一斤 米糖半斤 貝母錢 砂仁錢 膽木香錢 廣陳皮二錢 右咀片入磁瓶內箬葉緊密上放木

一微。置湯煮以米熟為度每日清晨服一大杯樂完病痊。

又 糖坊內上好糟糟一斤加水薑四兩先將糟打爛和薑再搗做小餅。陰乾放磁瓶內置竈煙檻上每日清晨

將餅一枚泡滾水內少停燙湯已經屢試屢驗。

治噎食 生薑汁 生薑汁 雪梨汁 雜菊汁 甘蔗汁 蜂蜜 白藥汁 竹沥 右各一盞和勻飯上蒸熟

任意食之。

治翻胃膈氣 此症必起於腸枯無濕大便三四日一次糞如馬屎若如羊屎者不治。口嘯吐白沫者不治。

牛乳 羊乳 人乳 不拘分量總宜常服生血潤腸之妙藥。

又 青州柿餅五六枚飯上蒸熟食之不用湯水常服即愈。

治噎膈氣不通方 用雞喙燒研入木香丁香沉香紅棗丸服。

治膈氣皆開闊方 用荔枝一個去核將蠅蟬一條放在荔枝肉內將冰片三四釐摻在蠅蟬上即將荔枝肉裹好。

仍放在荔枝壳內。紫好即令病人含在口內有冷涎水滲出。可徐徐咽下。俟一時許。蟻蜂即化完亦無水滲出。令病人連壳吐去。只服一次可以立進飲食。逾四五月。但不可病人知之。恐其穢。不肯吃也。

(便開)

五子丸 治老人大腸燥結等症 火麻仁 紫蘇子 松子肉 药仁炒去皮尖 炙麻炒 共研如泥。磁器收貯。每服一丸。彈子大盜水化下。

治大便不通 皮硝三錢水 香油一錢 皂角末五分 右三味入豬胆內。在用竹管一頭入胆口內。用線繫緊。一頭入穀道內。用力將豬胆一擠。其藥入臟立通。治大便燥結。用雞子白一二枚。生食即愈。

治老人大便艱澀方 熟地錢三錢 山藥四錢 山萸肉一錢 蔡苓錢一錢 丹皮錢一錢 澤瀉錢一錢 人乳根半個 白蜜蠻先將六味煎湯去渣。後入人乳蜜煎一沸。空心溫服一二劑愈。

治小便不通 獨裏大蒜一個 梅子一個 鹽一錢 共搗敷臍中。良久即開。若不通。敷陰囊上立愈。

治中暑大小便不通 用田螺三枚。搗爛入青鹽三分。攤成膏。貼在臍下一寸即愈。

(風寒溼痺)

治太陽風寒頭痛及半邊頭痛 生薑三片。將桑皮紙好水溼。入反火中煨熟。乘熱將印堂兩太陽各貼一片。以帶纏之。立愈。

治牛邊頭痛 因風寒而起者更效。肉桂心一分 麝香二厘 人言釐一北細辛分 半夏分 胡椒粒共為末

用棗肉搗丸如豌豆大一粒。放膏藥中心。貼准太陽穴內。一日見效。如壯年火盛者。愈後服黃芩大黃湯即日自愈

又 白芷 細辛 石膏 乳香去油 沒藥去右等分。為末。吹入鼻中。左痛吹右。右痛吹左。此治暑天甚怕風。亦欲綿裏頭極重之症。用鷺兒不食草陰乾。將上好燒酒浸一宿。日間曬乾。晚間又浸。如此七次。若右邊痛。將此草塞右鼻。左痛塞左鼻。約一時許。鼻流冷水。盡即愈。

治箭風方 俗名鬼箭打。或頭項手足筋骨疼痛。半身不遂等疾。照方一服即愈。真仙方也。

山甲一錢 炒研 白薇錢二錢 澤蘭錢三錢 照分量好酒煎服

治一切麻木痺症痛風麻節。虎骨木通煎湯頻頻多吃即愈。

治痛風。歷節四肢疼痛用醋磨研細之。或用葱白杵爛炒熟熨之。

又紅花、白芷、防風各五錢。威靈仙三錢。酒煎服。取汗三服全愈。

治脚氣。足疾腫痛拘攣。川牛膝。

治癆方。真茅山谷木五筋。洗淨泥垢。先以米泔水浸三宿。用蜜酒浸一宿去皮。用黑豆一層。拌入米一層。蒸二次。冉用蜜酒蒸一次。用河水在砂鍋內熬濃汁。去渣。隔湯燉滴水成珠為度。每膏一觔。和煉蜜一觔。白湯調服。一老

人專用此方。壽至八十餘年。輕體健甚於少年。

治風寒溼痺藥酒方。川羌錢一錢。川桂枝錢一錢。歸身半錢。秦艽一錢。金毛狗脊半錢。虎骨半錢。防風錢一錢。杜仲錢二錢。

川斷錢一錢。川芎錢八錢。晚蠶沙錢一錢。熟附子一錢。加桑枝三錢。生薑一大片。大棗二枚。陳酒二觔。浸煎服。

治溼氣初起法。嫩松枝一小枝。小松秧多少。將二味入石臼內搗爛。傾入陳酒絞取濃汁。燉熱隨量飲醉。醒時痛即止。多飲幾次更妙。

七製松香膏。治溼氣第一神方。松香三觔。第一次薑汁煮。第二次葱汁煮。第三次白鳳仙汁煮。第四次燒酒煮。第五次

五次鬧楊花汁煮。第六次商陸根汁煮。第七次紅醋煮。桐油三錢。川烏。草烏。蒼朮。官桂。乾薑。白芥子。

子。草麻子。以上各四兩。血餘八兩。右八味共入桐油熬至藥枯髮消滴水成珠。濾去渣入牛皮膏四兩拌化用煎。

製過松香漸漸收之。離火加樟腦一兩。好麝香三錢。厚紙襯貼患處。神效。

九製松香膏。一名九汁膏。上好松片香三觔。用清水煮烊。拉拔過傾去水。再換水者。再拉拔換水。如此以十編為

度。將松香研末。用薑汁葱汁白鳳仙汁燒酒鬧楊花汁商陸根汁韭菜汁童便。挨次將松香拌浸透。乾作八次。製過其第九次將好醋少許。不可多。再拌松香曬乾。研極細末。川烏。草烏。蒼朮。上茴桂。白芥子。乾薑。草麻子。以上各四兩。血餘八兩。另用桐油三觔。浸藥。春夏三秋七十日。熬枯濾去渣。再熬。先入麝香四兩。

俟溶化後。將製過松香末筛入。收之。離火入樟油一兩。待冷。入麝香二錢。攪勻收貯。貼神效。

見晚膏。專治風寒溼氣。骨節痙攣。痛風。癰瘍。麻木不仁。鶴膝風。偏頭風。漏肩風等症。並治跌撲閼剄等損傷。

陰症無名腫毒已破爛者勿貼。小兒孕婦勿貼。治短頭髮。臘乾二兩。用壯年入膏下者。大黃。靈仙。雄蠅頭各一。川

烏草烏

劉寄叔各八兩

土鳖虫大者三十四個

羌活

獨活

紅花

蛇牀子

蒼术

當歸

夏白芥子

桃仁錢各五錢

右十八味俱切碎

樟木一兩

甘松

山奈

花椒

豬牙皂

山甲礬

華橘

沒藥

以上各三錢不必去油同乳香炭化研細

乳香五錢

白芷錢五錢

右十味極細末

新鮮烟葉汁一兩收晚乾

新鮮商陸

根汁

一兩助松香六兩收

新鮮開楊花汁半助松香三兩收

新鮮艾葉汁半助松香三兩收

白鳳仙花汁半助松香三兩收

老生薑汁半助松香三兩收

新鮮商陸

松香二兩收

葱汁半助松香三兩收

並汁半助松香三兩收

大蒜汁四兩助松香二兩收

用足秤秤麻油

二助四兩

先將頭髮入油熬

牛虻香

再將前藥入油熬至焦黃色

不可太枯即濾去渣

入前松香熬化再將絲棉濾去渣

再熬至油面起核桃

花紋先加入極細蜜陀僧四兩

再徐徐加入好西硫黃半助投此二味

時務須慢慢灑入不可太多太緊以滴水成珠離火待溫然後捲入細藥攪勻磁器收貯時煩用桑枝不住手攢青布襯貼每張淨藥重四錢臨時加

肉桂末五釐

細車末二釐

集膏療瘧膏

川烏草烏南星半夏當歸紅花羌活獨活大黃桃仁

錢各四錢

山甲一兩白芷

或肉桂一兩

麻油一助

葱汁一助

薤汁一助

松香助

院僧二助

硫黃助

右收煎好加乳香沒藥血竭胡椒

樟水細草牙皂末各二錢

若加商陸根鳳仙開楊花鮮烟葉鮮蒜鮮布鬱等汁更妙

摩腰膏治老人虛人腰痛婦人帶下清水不臭者虛寒者宜之

附子川烏南星錢半助

硫黃助

右收煎好加乳香沒藥血竭胡椒

樟腦丁香各錢

乾薑錢一助

麝香分

右為木蜜九殼子大

用生薑自然汁化開如麝薰手掌上烘熱摩腰中

痛處即以緩帛熱之少頃其熱如火每日飯後用一丸

摩風膏治風毒攻注筋骨疼痛

草麻子一兩清肉研

川烏頭生去皮

乳香錢半助

右以豬油研成膏烘熱塗患

處以手心摩之覺熱如火效

(針火)雷火針治風寒溼毒留住經絡痛腫不散者

蒼耳子肉桂乳香沒藥錢三

羌活川烏穿山甲土

丁香麝香淡芩黑附子猪苓澤瀉大茴香白芷獨活廣木香肉桂錢一助

右共研細末

治寒溼氣方真白芥子研細陳晉醋調攤厚雙皮紙上做夾紙膏以針刺孔先將新棉花薄薄鋪一層放在

患處然後將夾膏貼在棉花上片時即似火燃熱過即揭去棉花以薄為妙

此膏不可預製須要臨時調合攏

此膏不可預製須要臨時調合攏

此膏不可預製須要臨時調合攏

此膏不可預製須要臨時調合攏

此膏不可預製須要臨時調合攏

和勻。先將斬艾枝綿用紙二層鋪於上，捍薄以藥末捲上。要極密。外用烏金紙捲緊，粘固兩頭。用線繫繫，用時以手擦患處。用黑點記。將針在火上燒者，用紅布三層，鋪於痛處針之。

又

斬艾

兩錢

辰砂

乳香

沒藥

雄黃

桃樹皮

川烏

草烏

礪黃

山甲

麝香

右為細末，作針，按穴針之。忌尻諸神值日。

三氣合牌針

乳香

沒藥

牙皂

羌活

獨活

川烏

草烏

白芷

細辛

五桂

肉桂

雄黃

硫黃

山甲

樟木

麝香

父誠

作針

百發神針

治偏正頭風

漏肩鵝膝寒溼

氣半身不遂

手足癱瘓

痞塊腰痛

小腸疝氣

癰疽發背

對口瘡核

初起不破爛俱可用。各按穴針之。

破爛俱可用。各按穴針之。

蜈蚣

一條

木鱉

五靈脂

雄黃

乳香

沒藥

生川附子

血竭

川烏

草

烏

檀香木

降香木

大貝母

麝香

各三錢

母丁香

九粒

浮斬父綿

或一兩

作針

消脾補火針

蜈蚣一條

木鱉

五靈脂

雄黃

乳香

沒藥

阿魏

三棱

蓬木

甘草

皮硝

鬧陽

花

硫黃

山甲

牙皂

各二錢

甘遂

分五錢

父誠

兩

作針

陰症散

針

乳香

沒藥

羌活

獨活

川烏

草烏

白芷

細辛

牙皂

各五錢

作針

五靈脂

肉桂

雄黃

各三錢

蟾酥

分

父誠

兩

作針

香硫餅

治寒溼氣

麝香

辰砂

四錢

硼砂

二錢

細辛

四錢以上

根為細末

角刺錢

川烏尖

二味俱用黃酒

六兩

四錢

右先用硫黃角刺川烏入桐杓內

火上化開

再入前四味末

攪匀

浸在乾淨土地上

候冷取起

打碎成黃

荳大用時

以乾麵捏成錢大

比鐵薄些

先放在患處

置藥一塊在上

以香火點着

連灸三火即愈

蒸法

腿膝疼痛

風寒溼三氣傷

於足膝