特1
473

宮内省圖書寮印

增廣太平和劑局方

指南總論

国立国会図書館　　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』

ガラス使用

增廣太平惠民和劑局方指南總論卷上

前典藥頭　橘　親顯
官醫　細川桃菴
官醫　望月三英　校正
官醫　丹羽正伯

勅授大醫助教前差充四川總領所撿察惠民局許洪編

論處方法

夫處方療疾當先診知病源察其盈虛而行補瀉辨土地寒暑觀男女盛衰深明草石甘辛細委君臣冷熱或正經自病或外邪所傷或在陰在陽或在表在裏當須審其形候各異虛實不同尋彼邪由知疾所起表實則瀉表裏實則瀉裏在陽則治陽在陰則治陰以五臟所納

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多使
使審而用之則百不失一矣

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以蠱毒藥癰腫瘡瘤以瘡瘤藥風濕以風濕藥各隨其宜雷公云藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒温亦異夫重熱腻醋鹹藥石并飲食等於風病為治餘病非對輕熱辛苦淡藥飲食等於冷病為治餘病非對其大綱略顯其源流其餘覩其病狀可知臨事制宜當識斯要矣

論合和法

凡合和湯藥務在精專甄別新陳辨明州土修製合度分之藥於四時所用之宜加減得中利汗無誤則病無瘥矣若不洞明損益率自胸襟畏忌不分反惡同用或病在表而却瀉裏病在裏而却宜表在陰則瀉陽在陽則瀉陰不能曉了自昧端由病既不瘳遂傷患者深可戒也故為醫者必須澄心用意窮幽造微審疾狀之淺深明藥性之緩製方有據與病相扶要妙之端其在於此凡療諸病當先以湯蕩除五臟六腑開通諸脉理順陰陽令中破邪潤澤枯朽悅人皮膚益人氣力永能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處散當平之次當用圓圓藥者能逐風冷破積聚消諸堅癥進美飲食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也大

斤者即拾陸兩為壹斤也凡言等分者非分兩之分即
諸藥斤兩多少皆同為等分也凡煮湯云用水大盞者
約壹升也壹中盞者約五合也壹小盞者約參合也務
從簡易庶免參差俾修合煎調臨病濟急不更冗繁易
為曉了也凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮
甲頭足尾骨之屬有須燒炮炙生熟有定壹如其法順
方者福逆方則殃或須肉去皮或須皮去肉或須根莖
或須花實依方揀鍊事祷理削極令淨潔然後秤定分
兩勿得參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相使
若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不
依方分兩使諸藥石強弱相欺入人腹中不能治病更
相攻擊草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得意雖

兩無差用得其宜病無不愈若真假非類冷熱相乖草
石昧其甘辛炮炙失其體性飾罪羅麁惡分劑差殊雖有
療病之名永無愈之效是以醫者必須殷勤注意再
四留心不得委以他人令其修合非但多少不等兼以
失本方意搗和之後妍醜難明衆口嘗之衆鼻嗅之精
氣一切都盡而將療病固難得效此蓋是合和之盈虛
不得各醫方之淺拙宜加審察又古方藥味多以銖兩
及用水皆言升數年代綿歷浸遠傳寫轉見乖訛或分
兩少多而水數多或水數多而分兩少輕重不等器量全
殊若不別其精麁何以明其取捨今則加減合度分兩
得中削舊方之參差合今時之行用其方中凡言分者
即貳錢半為壹分也凡言兩者即肆分為壹兩也凡言

未能去病猶得安和五臟於病無所增劇也

凡煮湯當以井花水極令淨潔其水數多少不得參差常令文火小沸令藥味出煮之調和必須用意然則利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取用新布絞之服湯寧小熱即易消下若冷即令人嘔逆云分再服參

凡擣羅圓藥用重密絹令細於蜜中和則易熟若羅草藥為散以輕細絹於酒中調服則不泥其石藥亦用細絹羅然後研理數百過視色理和同為佳也

凡湯酒中用諸石藥皆細擣羅之如粟米亦可以葛篩令調並新綿裹內湯酒中同煎凡合圓散藥先細切曝燥

乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤澤藥如天門冬乾地黃之類並細切曝獨搗令徧碎更出細擘曝乾若逢陰雨亦以微火烘之既燥小停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得眉乃秤之為正其湯酒中不須如此也

凡清酒藥皆須細剉用生絹盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待服至酒盡也淬可曝燥微擣更漬飲之亦可為散服

凡合膏藥初以酒或醋漬令淹浹不用多汁密覆勿洩從今旦至明旦亦有止一宿者微火煎之令三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使市市沸乃下之使沸靜良久乃止寧欲小小生其中有雞白者以兩頭微焦黃

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

為度有白芷附子者亦令小黃色也猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏以新布絞之若是可服之膏膏淳亦可酒煮飲之可摩之膏膏淳則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也膏中用雄黃朱砂麝香乳香鉛丹之輩皆別研如粉候膏畢乃可投中以物疾攪至於凝強勿使沉聚在下不調有氷銀胡粉者於膏中研令極細

凡修煉神仙延年圓散皆須先淨其室燒香掃洒勿令浪語當使童子擣之務令細熟杵數可至千萬過以多為佳勿令婦女小兒喪孝產婦及痼疾六根不具之人及六畜見之皆不效也其逐急諸小湯藥則不在此例

凡修事諸藥物等一一並須令專心勿令交雜使用或先煮後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合圓藥用蜜只得用蜜餳只得用餳用糖只得用糖勿令交雜用必宜瀉人也

凡㕮咀者擣之如大豆使去其細末此殊未允當藥有易碎難碎多末少末秤兩不得均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒俱均也

凡方云巴豆若干枚者去皮心乃秤之以壹分准拾陸枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准壹枚枳實若干枚者去穰畢以壹分准貳枚橘皮壹分准叁枚棗有大小叁枚准壹兩云乾薑壹累者以重壹兩為正

凡方云半夏壹升者洗畢秤伍兩為正蜀椒壹升者三兩為正吳茱萸壹升者伍兩為正兎絲子壹升玖兩為正

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

菴閭子壹升肆兩為正蛇床子壹升叁兩半為正地膚子壹升肆兩為正此其不同也云某子壹升者其子各有虛實輕重不可通以秤准皆取平升為正

凡方云用桂壹尺者削去皮要重半兩為正甘草壹尺者重貳兩為正云某草壹束者以重叁兩為正云壹把者重貳兩為正云蜜壹斤者有漆合猪膏壹斤者有壹升貳合也

凡散藥有云刀圭者拾分方寸匕之壹准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方壹寸抄散取不落為度錢匕者今伍銖錢邊伍字者以抄之亦令不落為度壹撮者肆刀圭也拾撮為壹勺拾勺為壹合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑壹寸下徑陸分深捌分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡圓藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁徂令較略大小相稱爾如黍粟亦然以拾陸黍為壹大豆也如大麻子者准叁細麻也如胡豆者即今青班豆是也以貳大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以叁大麻子准之如大豆者以貳小豆准之如梧子者以貳大豆准之壹方寸匕散蜜和得如梧子准之如梧子准圓為度如彈圓及鷄子黃者以拾梧子准之

壹枚若雞子黃者准肆拾圓今彈丸同雞子黃此甚不等今云方一寸匕散為圓如梧子得拾陸圓如彈圓

凡煉蜜用火煎掠去沫每壹升只煉得拾貳兩半若火少若火過並用不得須令色微黃則圓經久不壞也

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

凡圓藥用蠟者蓋取其能固護藥之氣味勢力全備以過關膈而作效也若投蜜相和雖易為圓劑然下咽亦易消散如何得到藏中若其間更有毒則便令作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意

凡方云圓如細麻子許者取重肆兩鯉魚目比之 云如大麻子許者取重陸兩鯉魚目比之 云如小豆許者取重捌兩鯉魚目比之 云如大豆許者取重拾兩鯉魚目比之 云如兎蕈俗云兎屎許者取重拾貳兩鯉魚目比之 云如梧桐子許者取重拾肆兩鯉魚目比之 云如彈子許者取重拾陸兩鯉魚目比之壹拾伍箇白珠為准是壹彈圓也

論服餌法

夫藥有君臣佐使人有強弱虛實服餌之法輕重不同必長殊途強羸各異或宜補宜瀉或可湯可圓加減不失其宜藥病相投必愈若病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在骨髓者宜飽滿而在夜凡藥勢與食氣不欲相逢食氣消即進藥藥氣散則進食如此消息即得五臟安和非但藥性之多方其節適早晚復須調理今所云先食後食蓋此義也

凡服湯欲得稍熱服之則易消下若冷則嘔吐不下若太熱則傷人咽喉務在用意湯必須澄清若濁則令人心悶不解中間相去如步行十里久即再服若太促者前湯未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散否

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

乃更進服

凡服圓藥補者皆如梧桐子大以貳拾圓為始從壹服漸加至肆拾圓為限過多亦損人云一日再服者欲得引日多時不關藥力漸積薰蒸五藏彌久為佳不須頓服為善徒餌名藥護益甚少也

凡服浸酒藥欲得使酒氣相接無得斷絶斷絶則不得藥力多少皆隨性飲之以知為度不可令大醉至吐大損人也

凡服毒藥治病先起如黍粟病去而止不去倍之不去拾之取去為度今藥中單行壹兩種有毒之藥只如巴豆甘遂之輩不可令至盡劑爾如經所說壹味壹毒服壹圓如細麻貳味壹毒服貳圓如大麻參味壹毒服參圓如胡豆肆味壹毒服肆圓如小豆伍味壹毒服伍圓如大豆陸味壹毒服陸圓如梧桐子以數為圓而毒中又有輕重只如狼毒鉤吻豈同附子芫花之輩耶凡此之類皆須量用也

凡餌湯藥後其粥食肉菜皆須大熟大熟則易消與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜於藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得苦心用力及於喜怒是以療病用藥力為首若在食治將息得力太半於藥所以病者務在將息攝養之至可以長生豈止愈病而已哉

論用藥法

夫濟時之道莫大於醫去疾之功無先於藥人居五行四氣病生暑濕風寒藥分參品七情性有温平冷熱凡於

行用不得差殊庶欲立方使須憑據療之合理病無不
痊若自昧新陳莫分真僞用之偏僻使之稀踈者以別
名求於齊異未諳體性妄說功能率自胸襟深為造次
是以醫不二世不服其藥斯言信有之矣豈不深思者
哉又不得用土地所無貴價難市珠珍諸寶稀罕所聞
縱富貴而無處搜求設貧下而寡財不及或於遠邦求
藥或則確執古方不能變通稽於致辨病既深矣藥何
療焉繇是醫者必須捨短從長去繁就簡卷舒自有盈
縮隨機斟酌其宜增減允當察病輕重用藥精微則可
謂上工矣

凡藥有君臣佐使以相宜攝合和宜用壹君貳臣參佐伍
使又可壹君參臣玖佐使又有陰陽配合 掌禹錫等按蜀本李註云凡

天地萬物皆有陰陽大小各有二類尋究其理並有法
象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於
陰而屬於陽所以空青法丹砂火故色赤而主心雲母
法金故色白而主肺礜石法水故色黑而主腎餘皆以此推之例可知也 若榆皮為毋厚朴為子之類是也 根莖花實草木骨肉又有單行者有
相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相
殺者凡此七情合和之時留意視之當用相須相使者
良勿用相惡相反者若有毒者宜制可用相畏相殺者
不爾勿合用也 掌禹錫等謹按蜀本李註云凡參佰陸拾伍
種有單行者柒拾壹種相須者拾貳種相使者柒拾捌種相惡者陸拾種相
反者拾種相畏者叁拾陸種相殺者拾種凡此七情合和視之

又有酸鹹甘苦辛伍味又有寒熱溫涼肆氣又有有毒
無毒陰乾曝乾採造時月生熟土地所出真僞新陳並
各有法也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根
物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢
力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗
之春宜早秋宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾歲
月亦有早晏不必都依本文也
凡本草說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子
旬陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露
日暴於陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也今按本草採藥
陰乾者皆多惡至如鹿茸經稱陰乾易得且良草木根苗陰之
乾日乾十月已後採者陰乾乃好若幸可兩用前
凡用藥材務在選擇州土所產者甄別新陳辨明眞僞如
上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛既識眞僞去
其陳舊藥力兼全效驗甚速若不推究厥理治病徒費
其功終不能活人也
藥性有宜圓宜散者宜水煮者宜酒浸者宜膏煎者亦有
一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越
論三品藥畏惡相反
尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針琥
珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂
而枯戎鹽累卵懶瞻分盃其氣爽有相關感多如此類
其理不可得而思之至於諸藥尤能遞為利害先聖既
明有所說何可不詳而避之時人為方皆多濫略若舊
方已有此病亦應改除假如兩種相當就輕重擇而
除之傷寒赤散吾常不用藜蘆斷下黃連圓亦去其乾

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

薑而施之無不效何忽強以相憎苟令共事乎相反為害深於相惡相惡者謂彼雖惡我我無忿心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制伏故也相反者則彼我交鬬必不宜合今畫家用雌黃胡粉相近便自黯茹粉得黃即黑黃得粉亦變此蓋相反之証也藥理既昧所以不效人多輕之今按方處治必恐卒難尋究本草更復抄出其事在此覽略看之易可知驗而本經有直云某使某門冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其條人有亂誤處譬如海蛤之與鮫甲畏惡正同又有諸芝使薯蕷薯蕷復使紫芝之計無應如此不知何者是非亦且併記當更廣驗正之又神農本經相使正各壹種兼以藥對參之乃有兩三於事亦無嫌其有云相得共療其病者既非妨避之禁不復疏出

上藥壹佰貳拾種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者其上品藥性亦皆能遣疾但其勢大和厚不為急卒之効然而歲月常服必護太益病愈矣命亦兼申天道仁育故云應天壹佰貳拾種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也

中藥壹佰貳拾種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者其中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於服之者祛患當速而延齡為緩人懷性情故云應人壹佰貳拾種者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也

下藥壹佰貳拾伍種為佐使主治病以應地多毒不可久

服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者其下品藥性專主攻擊毒烈之氣傎損中和不可常服疾愈即止地體收殺故云應地壹陌貳拾伍種者當謂戌亥子丑之月法萬物枯藏時也　兼以閏之盈數加之神農本經三品合叁陌陸拾伍種法叁陌陸拾伍度一度應一日以成一歲也今所舉其綱目以明藥之品數其本草中唐之所附名醫當用加添之藥不在此例

論服藥食忌

有忌勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物

有甘草勿食菘菜（又云勿食海藻）

有黎蘆勿食狸肉

有巴豆勿食蘆笋羹及野猪肉

有地黃勿食無羙

有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉

有細辛勿食生菜

有商陸勿食犬肉

有茯苓勿食醋物

有鼈甲勿食莧菜

有牡丹勿食生胡荽

服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羙魚鱠腥臊等物

有空青朱砂勿食諸生血物

有常山勿食生葱生菜

有黃連桔梗勿食猪肉

有天門冬勿食鯉魚

服藥通忌見死尸及產婦厭穢事

增廣太平惠民和劑局方指南總論卷中

前典藥頭　橘　親顯
官醫　細川桃菴
官醫　望月三英　校正
官醫　丹羽正伯

論諸風證候

中風總論夫風爲天地浩蕩之氣正順則能生長萬物偏邪則能傷害品類人或中風固鮮有不致斃者故入臟腑則難愈如其經絡空虛而中傷者爲半身不遂手脚癱瘓涎潮昏塞口眼喎斜肌膚不仁痺痛攣僻隨其臟氣所爲不同或左或右邪氣反緩正氣反急正氣引邪喎僻不遂蓋風性緊暴善行數變其中人也卒其賅人也

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

暈激人涎浮胷人神亂故推為百病長聖人先以此示教太醫編集所以首論中風也

夫中風者皆因陰陽不調藏腑氣偏榮衛失度血氣錯亂喜怒過傷飲食無度嗜慾情致於經道或虛或塞體虛而勝理不密風邪之氣中於人也其狀奄忽不省人事涎潮昏塞舌强不能言者可先與通關散搐鼻次服至寶丹牛黃清心圓此藥性涼稍壯人可與服氣虛及年高人不可與服只宜與後藥卒中風筋急頭胳者可與七寶丹中風半身不遂口眼喎斜筋攣骨痛者可與小續命湯追風應痛圓中風邪氣入藏狂言恍惚與排風湯中風手足癱瘓者多與青州白圓子中風手足戰掉項背拘強牙關緊急者可與活絡丹三五七散中風腳弱者可與高腳弱者可與七寶丹黃芪圓

中風半身不遂者皆因風邪中於經絡氣血行遲機關縱緩故手足不遂口眼喎邪可與七寶丹偏風語言蹇澁可與小續命湯偏風走注脚手痛或攣伸屈不得者可與活絡丹偏風恍惚不定可與排風湯偏風痰盛者可與青州白圓子拘急脚弱口噤可與龍虎丹癱瘓手足不遂可與透水丹偏風筋脉攣痛拘急者可與驅風丹乳香趙痛散乳香圓七寶丹

諸風骨節疼痛者皆因風氣入於筋絡及骨節疼痛或攻注脚手痛或攣伸屈不得者可與乳香趙痛散追風應痛圓活絡丹乳香沒藥圓太岳活血丹先用五香散淋漉次用活血丹抹之

風濕證候者皆因腠理虛風與寒濕氣傷之每遇夜間或三四更以來腰背倦痛轉側不得或身體倦痛者為有寒濕也可與小續命湯大便秘或身體痠疼足脛緩弱者可與追風應痛圓黃者圓腰痛甚者可與青娥圓

諸風大便不通者皆因風邪熱滯腸胃津液乾燥秘澁可與麻仁圓三和散不通即與皂角圓如通即止之不可久服如氣虛及老人不可與皂角圓只與麻仁圓三和散四物湯加去白青皮等分同煎服甚者可與神功圓不可與虛老人服

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

諸風小便不通者皆因小腸積熱膀胱壅滯不利者可與導赤圓鶏蘇圓三黄圓三和散秘訣者與神功圓五苓散

風濕脚氣者皆因風濕毒氣入脚膝之間其狀或赤腫或冷痛或麻木不仁或脚軟而緩或增寒壯熱作渴筋脉拘急可與俞山人降氣湯痛者與石南圓軟不能行者可與黄耆圓五淋散三和散槍腰痛者可與導赤圓木瓜圓小便秘澁可與導赤圓大烏沉湯不以輕重

諸風頭目昏眩者皆因痰壅上盛可與青州白圓子痰厥目昏眩多痰可與辰砂化痰圓痰盛昏眩者可與川芎圓心胸不利口苦舌乾可與透氷丹羌活圓痰甚渴嘔者可與天南星圓

諸風瘙痒癮疹者皆因血氣不順面如蟲行瞤動血氣凝滯者可與排風湯胡麻散消風散川芎圓大陽穴痛與消風散追風散痰熱頭痛者可與防風圓牛高虚弱人風寒入腦頭痛發眩者與术附湯羌活圓三五七散偏正頭風兩太陽穴及眉稜骨痛牽引兩眼昏暗者可服有效與遇仙散

諸風熱上攻面生熱瘡者可與驅風圓龍虎丹排風湯胡麻散何首烏散羌活圓川芎圓白龍圓芎犀圓或如蟲行可與追風散

諸風恍惚驚悸者皆因體虚受風邪心氣不足入於心經者可與定志圓茯神散有熱者可與牛黄清心丹平補鎮心丹辰砂

諸風挫枕轉筋者皆因氣虚項筋轉側不得筋絡不順疼痛可與通關或追風散消風散大三五七散或追風散消風散疼逆盛與白圓子

諸風痰逆嘔吐者諸風初發時痰逆嘔吐者可與温中化痰圓橘

皮半夏湯薑香湯半夏散
嘔吐者立止可常與服散

諸風脚膝緩弱者皆因風虛氣
黃耆圓木瓜圓金人降氣湯不赤
不腫而痛者與洗風散淋沃洗之

破傷風者皆因打撲傷破風入
藥貼患處內損者與大岳活
血丹血不止者與花蕊石散

纏喉風證者皆因積熱痰涎上攻咽喉口開不得漿水不
下者可與碧雪竹管子吹入喉中甚者
與雄黃解毒圓玉屑無憂散

諸風氣中證候者此病多生於驕貴之人因事激挫忿怒
盛氣不得宣泄逆氣上行忽然仆倒昏迷不省人事牙
關緊急手足拘攣其狀與中風無異但口內無涎聲此
證只是氣中不可妄投取涎發汗等藥而反生他病但
可與七氣湯分解其氣散其壅結其氣自止
七氣湯連進效速更可與蘇合香圓

論傷寒證候

傷寒總論活人書云傷寒正名有二十六條○傷寒傷風
傷寒兼風傷風見寒風濕中濕風溫濕溫溫毒中暍熱
病溫病痓病溫瘧晚發疫癘瘴癘脚氣與傷寒相似而實非
傷寒此證人不曉皆言即傷寒也若不仔細分辨證候
虛實用藥則誤人性命在反掌之間不可不知也
傷寒得病之由者凡傷寒初得病便不進飲食發熱一向
不止頭痛或渾身痛或自汗惡風增寒壯熱者乃是傷
風傷寒証也便須問病得幾日有汗無汗惡風不惡風
或渴或不渴或嘔逆或不嘔小便通或不通得幾日
須用仔細審問方可用藥傷寒一證與雜病不同若不

對證妄投藥餌罪犯非輕誤人多矣

傷寒傷風證候凡傷風者皆因脫衣感冒被風吹雲着則洒然骨寒毛起惡風自汗者乃是傷風證也凡風吹則體自寒惡風無汗者是傷寒也

傷寒表證凡傷寒初得病一二日頭痛身體痛惡寒或微喘者體虛及老人可與五積散聖散子此二藥病多日間亦不可輕服緣中暑似傷寒若中暑人誤服此二藥其害非輕切宜審實仔細用藥少壯者夏秋之交用金沸草散來蘇散人參輕骨散葱白散和解散之類可服也初得病一二日頭痛發熱身體痛惡寒無汗者可與葱白散八解散金沸草散人參輕骨散初得病一二日或三日自汗頭痛惡風或嘔者可與升麻葛根湯敗毒散香蘇散人參輕骨散和解散之類皆可用若發汗後熱已退了可與和解氣散正氣散

傷寒裏證者病人四五日至六七日不惡風寒反發熱煩渴嘔逆手掌中及腋下微汗出大便不通小便赤得三四日腹中滿微喘狂言譫語者切不可妄投熱藥只可與小柴胡湯一貼先進一服以大便可更進一服如人行十餘里未通倭半貼煎渴者與五苓散或手足冷服參苓白朮散四君子湯之屬如調理通後恐虛老人須用平補藥了與嘉禾散四君子湯參苓白朮散和解證候者傷寒風往來寒熱胸脇間痛乾嘔及大便秘者可與小柴胡湯一貼病重者再服半貼方效或言渴者或小便澀兼服五苓散傷風四五日身發熱惡寒項強而手足溫及大便不通者多用小柴胡湯敗毒散亦佳用小柴胡湯兼服之或和解散之類已上和解証也

傷寒陽證者凡傷寒陽證面赤作熱發渴至五七日不止

或服熱藥過多熱甚發強煩躁或瀉赤汁膿血者可與三黃圓洗心散四順飲或大便秘結與小柴胡湯之類

傷寒陰證者凡傷寒三兩日五七日身體疼痛不可轉側自汗四肢厥冷瀉而不渴或吐逆泄瀉臍腹痛或有咽嗌痛者可與理中圓理中湯四肢冷甚腹痛氣急者與更重者法煉黑錫丹二兩附子一兩炮去皮臍乾姜炮甘草各一兩為末酒煮粳米飯和丸如梧子大每服三十丸加至五十丸熱湯下或薑汁少許入湯中化下亦得瀉止四肢暖有汗則解不然則微汗則解不然則寒熱再復難治也

傷寒陰陽二證者有陰厥有陽厥有陰陽厥審問傷寒陽證熱氣深則反厥若只認四肢厥冷便投熱藥此害人性命在頃刻間發藥極用仔細審問如是自疑寧不發藥教他更請醫者看視不可亂發藥也

傷寒陰厥證者若初得病四肢厥冷身上起粟大便不通或瀉或嘔此是寒厥也可與理中圓理中湯之類

傷寒陽厥者若初得病身便熱頭痛大便不通至六七日渴甚狂言揭衣被不定疊脚手厥冷此乃熱極而發厥冷必竟少時又却温熱切不可便投熱藥且與小柴胡湯之類

昔有國醫孫用和壹法探之須子細察審外證方可用藥凡傷寒四肢厥冷當察問病之因若證不明未辨陰陽者且與四味理中圓加甘草再和勻作四服探之若是陰厥則服藥了形靜不熱不渴件理中圓了如煩燥不定疊當漸加前小柴胡湯之類

傷寒潮熱者傷寒五七日至十日已上早晨稍惺惺至申酉前後發熱不惡寒微有汗大便不通三兩日或譫語而渴者可與小柴胡湯參伍一服重者伍柒服以大便微及熟未退者宜加七寶洗心散有渴者可與五苓散猶有煩躁或與蓼花醬甲散調理也

傷寒頭痛者傷寒雖退而頭痛不止者諸陽所聚熱毒氣上攻頭痛不止者可與龍腦芍藥圓太陽丹白龍腦圓川芎圓之類

傷寒發渴者傷寒至五七日渴甚或發熱不惡寒大便常小便赤是胃中虛燥可與五苓散甚者與竹葉湯發渴者與柴胡湯仍加芦薑煎

傷寒嘔逆者胃寒吐而身涼或服冷藥太多而不渴大便如常或自利或吐蚘虫者此胃中寒也可與人參丁香朮散四君子湯理中圓人參圓嘉禾散

傷寒熱腹痛者因三四日大便不通邊膀腹痛或發熱不惡寒或渴者此是腸胃中有燥糞故發痛也切不可用熱藥且如正氣散理中湯及諸推積性熱藥皆不可用誤人性命只可與小柴胡湯如柴胡湯加芍藥少許同煎壹貳服可至叁肆服以大便通利為度

傷寒喘急者皆因風寒邪乘於肺經氣上盛發喘者可與麻黃湯華蓋散款冬花散人參潤肺圓養肺圓或潤金散款肺散皆可服也

傷寒欬嗽者皆因寒邪乘虛入於肺經或飲水過多停飲咳嗽微喘發熱而渴或不渴或寒熱脇下痛者可與小青龍湯貳叁服如脇下痛甚者必有停飲於小青龍湯內加入醋炒芫花少許同煎不可多用多則瀉人如發寒熱咳嗽未盡更進小柴胡湯每服加五味子貳拾粒同煎或與葶苈丸散申散

傷寒五七日發黃如或吐血切不可妄投熱藥可與雞蘇圓薄荷煎煎茅根湯或茅花汁冷送下甚者可與三黃圓

度傷寒腹痛有寒證因下服冷藥過多大便自利腹中痛手足冷者可與理中圓甚者與附子理中圓理中湯未效用姜附湯多加甘草煎服諸熱藥即止氣虛及老人傷寒後腹痛大便如常無熱只是腹痛者可與黃耆建中湯多服乃效

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

傷寒咽喉痛者皆因內熱氣秘陽毒上熏則咽喉痛痰盛者可與如聖湯甚者可與四順飲犀角飲七寶洗心散皆可服之傷寒大便秘者可與麻仁圓未遍者與四順清涼飲利後以嘉禾散參苓白朮散補之傷寒小便秘者可與五苓散導赤圓五一
傷寒後自汗者可與牡蠣散皆可與之兼嘉禾散黃耆建中湯加人參煎服又人參當歸散加小麥煎服同
傷寒大便自利者傷寒腹痛有二證不可不知腹痛大便自利手足冷者可與理中圓之類腹痛係內
傷寒後黃疸者傷寒後眼睛及遍身發黃疸小便不利或頭上汗出者可與五苓散以山茵蔯山梔子各少許對碎二錢煎湯調多服立效
傷寒後腹滿者不思飲食或食後不消化腹脇脹滿者可與匀氣散沉香降氣湯送煎圓思食圓參苓白朮散甚者與青木香圓兼嘉禾散四君子湯木香分氣圓及木香散木香流氣飲看虛實用之
傷寒後患痢者多是熱證或下純膿或下純血者可與服黃連阿膠圓駐車圓血多者與地榆散胃風湯兼服之
傷痰證候者有痰在胃膈之間亦能增寒壯熱惡風自汗困倦不利只是頭不痛身體不疼者可與服金沸草散如神化痰圓及倍术圓之類皆可服消飲圓辰
傷食證候者病有頭痛發熱惡寒或腹滿吐逆身體不痛只是四肢倦怠其證非傷寒也此是傷食在腸胃之間可與感應圓獨聖圓遂煎圓嘉禾散思食圓諸傷食藥皆可服氣虛老人可服五積散吞下青木香圓順氣散之類
傷暑證候者夏月傷暑亦云伏暑謂其人從熱中來便從

凉處坐卧不知被外凉冷之氣閉暑熱氣伏在腠理中不能發泄故曰伏暑其證自汗惡寒或背惡寒而渴或面垢如未洗面人或枝齒燥渴當門二齒乾是伏暑也嘔逆而渴者及卧不及席者是傷暑也可與五苓散發熱盛者可與香薷散竹葉湯及枇杷葉散小柴胡湯冷服立效

傷暑吐瀉者中暑嘔吐發熱悶亂或霍亂吐瀉可與消暑五苓散桂苓圓香薷散之類

中濕證候者傷寒一身盡痛轉側不得骨節煩疼小便不利大便反快額上汗出此中濕氣也可與五苓散利小便次用木附湯服之

傷寒後調理者傷寒本無補法不可用大温藥補之若補甚則再發熱但可用微温藥調理只與嘉禾散參苓白术散之類調理

傷寒頭痛又身熱便是陽證不可服熱藥傷寒傳三陰三陽其六經內有頭痛病有頭不痛病有頭痛而無發熱即是陽證若醫者妄投熱藥決致死亡矣

傷寒當直攻毒氣不可補益邪氣在經絡中若隨證攻之正氣却行補益使毒氣流爍必多致殺人

傷寒不思飲食不可服温脾胃藥傷寒中圓之類不可輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救

傷寒腹痛亦有熱證不可輕服温暖藥難經云痛為實故之證有曰痛甚者加大黄夫痛甚也唯身冷厥逆而腹痛者方是陰證須消息之每見醫者多緣腹痛便投熱藥而殺人

傷寒自利當看陰陽證不可例服補暖及止瀉藥自利身不熱惟

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

手足温者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰外兼餘
熱下利皆是陽證常隨証候仲景法治之每見醫者
及止瀉藥而殺人

傷寒胸脇痛及腹滿不可妄用艾灸

毒氣隨火而盛膨脹發喘而欲
蜀少陽腹脹滿者屬太陰此外推陰證可灸
自

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證治有陽厥有
能分辨陽厥而投熱藥殺人速於用刃蓋陽病不至於
極熱不能發厥仲景所謂熱深則厥深而更與熱藥寧有復活之理但看初得病而身熱至三四日
後熱氣已深大便秘小便赤或譫語昏憒及別有熱證
而反發厥者必是陽厥也宜急用承氣湯下之若初得
身不熱大便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不
見熱證而厥逆者即是陰厥其脉皆沉
厥所以使人疑者緣其脉時復指爪却温
陰厥常冷此為可別

傷寒病已在裏即不可用藥發汗傷寒病須看表裏如發
汗如不惡寒反惡熱即是裏證若醫者一例發汗則
所出之汗不是邪氣皆是眞氣邪氣未除而眞氣先
泄

傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度病人大渴當與
故仲景以飲水為欲愈人見而為嘔為喘為欬逆為下利為
不利者多矣且如病人欲飲飲之常令不足為善
只可與半盌飲之壹盌為善

傷寒病初瘥不可過飽及勞動或食羊肉行房事與食諸
骨汁及飲酒病方愈脾胃尚弱食而過飽不能消化病
太早病即再來謂之食復病方愈血氣尚虛勞動
行房事者並死食諸羊肉
傷寒食羊肉
飲酒者再病

論癰瘡證候

凡癰瘡病雖是時行之疾然老少虛實受病有淺深大率
不同有發熱不寒渾身似火頭痛煩渴譫語者有發寒
不熱嘿嘿昏倦四肢厥冷臍腹疼痛有外寒內熱有外
熱內寒有寒熱相半有啞不能言者有吐有瀉有吐瀉

俱作當隨證用藥若只言瘴病一槩治之萬一不能取效也

若發時熱多寒少或內熱外寒但熱不寒渾身如火頭痛煩渴心胸躁悶譫語亂言大小便秘澁發作無時者可與小柴胡湯敗毒散升麻葛根湯來蘇散葱白散神朮散五苓散竹葉湯譫語心悶者與五苓散入辰砂細研和勻冷熟水調服兼與大至寶丹及小兒金箔圓兩參圓作壹服頭痛與太陽丹白龍圓茶調散之類

或熱少寒多或內寒外熱或寒熱相半或骨節痠疼臍腹作痛者與不換金正氣散人參輕骨散正氣散聖散子五積散香蘇散建中散草果飲嘉禾散或來蘇散之類

或不熱只是寒或吐或瀉或吐瀉俱作四肢厥冷汗出如雨嘿嘿昏倦者可與朮附湯四柱散嘉禾散或藿朴圓十棗散若服前藥吐瀉不止四肢厥冷自汗如雨小便頻數者與參苓白朮散吞丹參拾圓至伍拾圓甚者薑附湯拌合和五苓散復來煎服瀉者與參苓白朮散多有之餘處無此一證二廣及漳州界上用誤人性命切記

不可輕發熱藥

若發作有時或連日或隔日或一二三五日一發發則熱多寒少或但熱不寒者於發日前先與小柴胡湯敗毒散之類至發日五更初却服常山飲消暑圓之類有效如神

若熱少寒多或只寒不熱或寒熱相半者於未發前可與不換金正氣散建中湯正氣散平胃散和胃散和脾散嘉禾散之類至發日五更初却服常山飲草果飲之類發久者尅效餅子靈癗丹老者及怯弱者不可服自宜斟酌

孕婦患瘴疾難為用藥但只可與草果飲兼用平胃散入鹽少許溫酒調服

瘴癘瘥後喫粥或爛飯更宜調理脾胃可與黃耆建中湯四君子湯嘉禾散和氣散及參苓白朮散曹脾散孤脾散建脾湯平胃散和氣散思食圓大小養脾圓切忌生冷酒果房色洗浴半

月或一月更須
子細可視之

增廣太平惠民和劑局方指南總論卷中

增廣太平惠民和劑局方指南總論卷下

前典藥頭　橘　親顯
官醫　細川桃菴
官醫　望月三英　校正
官醫　丹羽正伯

論諸氣證候　附脾胃　積聚

一切氣疾者皆由憂戚中或盛怒中動傷眞氣致陰陽不和結氣於胸膈之間壅滯不快飲食不下遂成膈噎之疾可與匀氣散五膈寬中散膈氣散沉香降氣湯分氣降氣湯紫蘇飲七氣湯嘉禾散香煮散分心氣飲小

氣虛腫滿者因脾氣停滯脾經受濕氣不流行致頭面虛浮四肢腫滿腹肚膨脹如鼓上喘氣急者可與茯苓散五苓散

三和散 分氣紫蘇飲木香分氣圓 俞山人降氣湯 小降氣湯蘇子降氣湯曹脾散嘉禾散 喘甚者可與潤金散款肺散大便秘者與三和散小便不通五苓散

乾濕腳氣者腳氣有數種痛不可忍者語之寒煩悶發渴者謂之熱腫而重者謂之濕用隨證治之不可一槩論也濕腫者可與黃耆建中湯熱而發渴者可與紫雪衝心悶

小腸氣膀胱奔豚疝氣等疾皆因腎氣虛弱膀胱久冷風濕乘之傷於腎經氣滯不散小腹刺痛腎經偏吊來可

癥積氣塊者皆因氣虛及寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣

憁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食用藥漸漸消磨不能宣利可與七氣湯下香圓青木香圓木香不換積氣圓揀積圓蓬煎圓積氣圓蓬煎圓三稜煎圓心下堅硬結塊衝散腹脇膨脹可與積氣圓三稜煎圓心下堅硬結塊衝散腹脇膨脹可與溫白圓脹滿不思食者與養脾圓消食圓嘉禾

脾胃諸疾者久病脾泄腸滑不禁日夜無度羸者可與平胃散空心送下茴香湯兼服訶黎勒圓丁香豆蔻散服諸藥不效者可多與人參豆蔻散有驗更有下一種大便如故只是每日早晨水瀉一兩行日間無事可服金鎖正元丹瀉止即住服

婦人心脾疼及血氣刺痛者可與蓬煎圓其效如得見沉寒痼冷之端的二方可用之蓬煎圓性熱不可輕用如得沉香圓皆可撰用若痛連腰背或小腸氣刺痛及虛弱婦人老人宜大沉香圓兩圓作壹服空心送下茴香湯兼服文蛤散調和胃氣散調和脾胃之劑更可與和氣散下如不喫酒薑湯下更可與醋湯下如不喫酒薑湯下

脾胃痛甚嘔逆不納食者或加喘急者可與七氣湯吐者忽暴心痛者與大沉香圓人參豆蔻散建中湯與人參蘆香圓撞氣沉香圓

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

心脾腹痛多有積或有寒積者先可與温白圓或保安圓此貳藥只與木香推氣圓或感應圓小獨聖圓理痛圓洗消去積次與平氣散嘉未散曹胛散人參煮散藿香散拭胛散蘆根散檳榔散蓽澄茄散嘉未散曹胛散人參煮散華澄茄散與大沉香圓兩圓作壹服次與達中散有寒者與達煎圓温中良薑圓丁香煮散四柱散

胸膈不快氣滯者可與沉香降氣湯烏沉湯青木香圓及小理中圓撞氣沉香圓丁沉圓順氣散或人參圓紅圓子逢煎圓若煩悶甚大便秘者與青木香圓脾痛者與達煎圓

脾虛飜胃不納食及湯藥不下者可與膈氣散人參木香散參苓白朮散及五膈寬中散噫氣吞酸脾痛者可與如意圓思食圓之類

宿患心腹痛者有積塊氣塊癥癖日久發歇不常者不可取轉宜漸次消磨可與感應圓小理中圓温白圓挨積圓達煎圓消磨更與和胛散嘉禾散參苓白朮散四君子湯思食圓常服漸漸建胛湯建中散平胃散嘉禾散參苓白朮散四君子湯思食圓常服漸漸助其脾胃久而去其根

腹脹心膨者若因傷寒或寒熱瘴瘧或瀉痢太病之後只是噎食後便腹脹心膨不美飲食噫酸縱食些少亦覺膨脹者切不可用消食尅化之藥若用藥動下轉加困重去生便遠也但可與正氣散嘉禾散參苓白朮散四君子湯曹胛散人參煮散大小養脾圓華澄茄散曹胛散人參煮散與人參豆蔻散丁香散但得氣壯自能飲食加倍膨脹自愈

論痰飲咳嗽

若痛有休止或往來上下胸中憎悶時吐冷涎中脘不快噯逆惡心者恐是蟲痛可與集效圓或九痛圓其九痛圓有利性不可多服若卒然心腹暴痛膨急不得息往來攻衝悶絶惡心者恐是疰忤鬼氣可與蘇合香圓若虛弱藏寒人可將蘇合香圓捏作餅子用火熨斗上燔令藥極熱以去其脳子性依此法之將藥餅安熨胸膈寒悶噯吐不定不下者可與服之若痛不休胸膈寒悶噯吐如無順氣散送下青木香圓上如無順氣散送下亦得

痰飲證候者諸痰飲不化聚胸膈脘令頭目昏眩嘔惡不快腹中漉漉有聲可與消飲圓倍木圓五苓散有寒者與理中圓青州白圓子俞山人降氣湯中酒渴及停飲嘔逆惡心者及頭痛或有飲食可思飲食可與服新法半夏湯及消飲圓倍木圓辰砂化痰圓生氣湯快氣湯半夏湯小降氣湯之類腰痛連臀痛不思飲食可與服新法半夏湯及天南星圓大養脾圓橘皮半夏湯小降氣湯之類

欬嗽喘急者太抵欬嗽皆從肺出醫家細論發藥太略有三有因寒者有風者有熱者風寒則從外至熱則從內起風寒則諸經自受其邪熱則諸經腑臟或薰蒸而為病風則散之寒則溫之熱則調之瀉肺經非瀉腑臟也當用葶藶桑白皮之類是也因風者遇風則嗽甚因寒者值寒則嗽劇因熱者遇熱則嗽即發更有一驗甚的但問遇夜飲酒時夜間如何若喫酒後嗽甚則有熱也喫酒了嗽減則有寒也涎青白者有寒稠黃者有

熱隨證發藥感風寒暴嗽咳唾稠粘胸膈不利者可與金沸草散半夏圓欬花膏華蓋散五嗽圓潤肺圓欬肺散青金圓小兒潤肺散欬冬花散論寒嗽及復冷嗽或吐青痰遇夜嗽甚者可與俞山人降氣湯中酒及停飲嘔逆惡心者及頭痛或有飲食可思飲食可與服新法半夏湯及消飲圓倍木圓五苓散有寒者與理中圓青州白圓子俞山人參蘇飲圓生氣湯快氣湯半夏湯小降氣湯之類半夏圓

諸虛不足者皆因腎氣虛憊下元積冷腰脊疼痛肢體倦怠面無光澤精神不爽昏昏欲睡口乾燥眼暗耳鳴小便滑數夜多異夢盜汗失精不思飲食日漸羸弱可與安腎八味圓

兎絲子圓 無比山藥圓 黃耆湯 建中湯 茴香圓 脾胃虛弱并服壯胃藥 虛損甚者可與麝香鹿茸圓 沉香鹿茸圓 法煉黑錫丹 金鎖正元丹 張走馬王霜圓 正元散 沉香鼈甲散 椒附圓 下虛洞泄者四柱散 正元散 丁香豆蔻散 治心氣不足神思恍惚物言語錯繆悚悸不定夜多異夢可與定志圓 人參黃耆散 妙香散 滑精虛憊精遺夢泄精虛憊喜怒悲恐心神不定者可與平補鎮心丹 威喜圓 定志圓 金鎖正元丹 腰痛者與青娥圓 追風應痛圓 甚者與神應圓 黃耆圓 乳香圓 活絡丹 安腎圓 追風應痛圓 甚者與神應圓 黃耆圓 乳香圓 立効圓 虛勞發熱至午後甚者空心服安腎圓 八味圓 山藥圓 沉香鼈甲散 白朮散 嘉禾散 食後服人參養肺圓 因虛勞用力大參或小降氣湯多加人參黃耆當歸散 短者可與壯人參黃耆建中湯 大山藥圓 人參黃耆散 遺精虛憊精滑不定夜多小便白濁夢泄遺精虛憊精滑不定夜多小便白濁夢泄遺精虛憊精滑不定夜多小便白濁夢泄

亦熱氣使然也咽喉懸癰關要所係病不急療皆能殺
人也喉閉纏喉風者可與解毒圓洗心散
玉屑無憂散碧雪甚者解毒雄黃圓

牙齒疼痛者其證不一有熱痛者滿口齒浮因上膈有熱
而痛者有虛痛者皆因腎經虛憊虛熱之氣上攻而痛
有風蚛牙痛者須用仔細詳證方可服藥齒齦浮腫口
內氣熱滿口齒浮而動此熱證也可與四順飲甘露飲
清心飲子八正散次煎升麻葛根湯灌漱吐去蕪荑些
小不妨腎經虛憊虛熱之氣上攻齒痛及老弱人齒痛
者可與黃耆圓安腎圓鹿茸圓八味圓次用赴筵散揩擦
之以升麻葛根湯灌漱風疰牙齒疼痛後生脏實者可
與細辛散赴筵散揩擦去風吐出痰良久以升麻葛根
湯灌漱即吐次與黑神圓乳香圓白龍圓飲酒齒痛者
以井水洗漱或百藥煎泡湯含嗽或縮砂香傳通用

眼目諸證者眼目昏暗視物不明不腫不痛不赤亦無翳
膜此內障證候也或見黑花或有冷淚者是肝腎俱虛
不可使服涼藥只可與明眼圓黃菊睛圓駐景圓還
睛圓錦鴈圓決明圓尋常肝有風熱眼痒澀昏暗有淚視物
散遲睛圓撥雲散菊花散密蒙花散蒺藜散決明
泰皮散湯泡散紫金膏洗春雪膏點外障翳膜侵睛努
肉久病者空心可與駐景圓菊睛圓食後服決明圓撥
雲散菩薩蠻散密蒙花散秘傳羊肝圓點剝膜膏良久用
紫金膏洗或春雪膏暴赤眼昏澁疼痛羞明下熱淚不
可點亦不可洗只可與駐景圓還睛圓洗心散洗肝散八正散
甘露飲菩薩蠻散撥雲散還睛圓還睛圓還睛痛不可忍者與羌活圓
圓兩圓只作一服立止并治頭風痛神效肝有風熱一服
澁痒痛瞼皆赤爛視物不見只可與菩薩蠻散決明
次明散遲睛圓洗肝散菊花散蜜蒙花散撥雲散菊花散密蒙
花散撥雲散紫金膏洗之春雪膏點

諸血熱妄行凡吐血衄血不止昏眩目黃可與龍腦雞蘇
圓薄荷煎四物湯加荊芥煎

論瀉痢證候

瀉痢證候者暴瀉水瀉此貳證秋夏間多有之皆因飲食
所傷及食生冷之物暴瀉不止須用子細詢問若噫氣

吞酸乾嘔氣臭者此是傷食也可先與感應圓壹貳服次與理中圓人參豆蔻散子中金圓來復丹者與附子理中圓理中圓四柱散已寒圓温中良姜圓二萸圓火輪散朝真丹正元散金液丹二氣丹已上藥性皆熱丁香豆蔻散微熱泄固須用二子細審實無食傷者不可與感應圓便用止瀉藥吐瀉有腹痛者可與感應圓久病虛弱年高及氣香推氣圓沉香丹丁香圓感應圓久病虛弱年高及氣弱人藏有泄瀉久不止者可與人參豆蔻散厚腸同參苓白朮散不換金正氣散四君子湯之類

痢疾證候者皆因飲食失節動傷脾胃水穀相伴運化失宜留而不利冷熱相搏遂成痢疾冷氣相搏其色白熱氣相搏其色赤治之法皆用温藥調和脾胃次隨證治之大抵人說證須用仔細詢問有裏急後重者腹痛或不痛者頻頻登厠一日三五次至五七次無物者又說大便不通既裏急後重臍腹痛不止不問老幼孕婦皆是痢也非無物出不識此證只言大便不通可仔細辨之病人登厠纔有壹兩點物或赤或白或如魚腦者此皆痢證也

積痢證者痢下赤白或純膿或夥濇若先臍腹撮痛遇痛即痢下下後痛止者此為積痢可與木香推氣圓感應圓各進三兩服次隨顏色治之下痢赤者可與駐車圓黃連阿膠圓厚腸圓胃風湯鼈粟湯不二圓之類下痢純赤或鮮血者可與黃連阿膠圓地榆散萬金飲加麥門冬子煎下無紅純白滑泄者此是冷證可與下香豆蔻散訶黎勒圓駐車圓固腸圓下痢紫黑色及赤白連綿日久愈而復發腹中時痛服諸藥不瘥者可與木香推氣圓不二圓感應圓之類

霍亂吐瀉有冷熱二證寒多不渴者可與理中圓薑附參苓白朮散四君子湯霍亂吐瀉有熱煩燥而渴者可服香薷散五苓散嘉禾散參苓白朮散嘉禾散五苓散四君子湯調氣散之類

腸風痔瘻者腸風下血臟毒下血或秘有熱者可與服

三黃圓黃連阿膠圓濃煎木香湯吞下有熱者與雞鳴圓腸風黑散金胥丹萬應圓四物湯加荊芥并防風煎諸瘡發作與釣腸圓未破者驅毒散叅更用猪膽汁塗之

論癰疽諸證 附瘡癬

癰疽發背者諸赤腫毒不問四肢手足頭面初發便可與渴蘆湯三仙散托裹散保安膏乳香內消膏道赤圓及四順飲通氣散癰疽發背大便不通可與麻仁圓三黃圓壯實者與神功圓須用通利叅伍行方得毒氣退也已破膿血出不快者可與三仙散漏蘆湯托裹散保安膏乳香內消膏貼之膏口久不合者可與桃仁散麒麟散

惡瘡疥癬者一切無名惡瘡漏瘡臁瘡冷瘡久年不愈者可下與桃仁散麒麟散保安膏乳香內消膏貼之風毒熱瘡壹名腎藏胡麻散四順飲大便秘者與皂角煎圓桃仁散以滑肌散傳之遍身生瘡瘙癢或生瘡疹者先服通大便藥可與皂角煎圓何首烏散四順飲四生圓消風散胡麻散滑肌散黃耆湯火燒成瘡者與佛手散疥瘡頑癬與摩風膏摩風膏白龍圓滑肌散清心圓

論婦人諸疾

婦人諸疾者皆因月經不調或前或後或多或少或淋瀝不止或閉塞不通肢體倦怠困乏少力飲食無味常服補者可與四物湯熟乾地黃圓內補當歸圓琥珀圓當歸建中湯沉香麝甲散活血丹澤蘭圓益陰丹血海冷憊者可與暖宮圓大聖散小白薇圓黑錫丹麝香鹿茸圓內補當歸圓經血過多淋瀝不止者與膠艾湯溫經湯小白薇圓烏金散益陰丹澤蘭圓內補當歸圓熟乾地黃圓赤白帶下服諸藥不瘥者可服澤蘭圓兼服平補鎮心丹速效大聖散溫經湯澤蘭散小白薇圓烏金散益陰丹澤蘭圓白帶不止腹常冷痛者可與暖宮圓香鹿茸圓法煉黑錫丹滋血湯伏龍肝散崩漏下血過多頭目昏眩者可與芎菊湯膠艾湯烏金散琥珀圓暖宮圓大聖散內補當歸圓崩中敗血連日不止與滋血湯血氣虛憊久冷崩漏下血五色不定或如豉汁可與溫經湯伏龍肝散四物湯加減方治諸般血病赤白帶下月經不通及室女月脈不行者可與蒲黃散逍遙散四物湯地黃圓活血丹四物湯地黃圓黑神散琥珀圓澤蘭煎通真圓活血丹四物湯加減方治諸般血病大聖散黑神散琥珀圓澤蘭煎通真圓活血丹四物湯加減方治諸般血病心悸者可與參苓白朮散勞宮腑不利經脈澁滯四肢煩痛

槐子　牽牛并皂角　欖根　砒砂與乾漆　礬麥簡　茹蟹爪甲　馬刀石蠶衣魚等　乾薑　蒜雞及鴨子　切忌婦人產前用

桃子　蟾蜍　紀菊根　亭長　溲疏　閭草　中蜚皮　鬼箭　赤頭紅　半夏　南星　通草同　驢馬兎肉　不須供此時宜記在心胸

產前諸疾者　娠娠三兩月日心中煩憒頭目眩重顛倒不安嘔吐煩悶此惡阻病只可與人參丁香散半夏茯苓湯茯苓圓小七香圓藥名丁香　娠下血胎動不安名曰漏胎可與安胎飲四物湯膠艾湯保生圓蘭圓臨產月常服滑胎飲保生圓琥珀圓澤蘭圓臨產難或橫或逆或三兩日不產者及胎死腹中或胞衣不下可與花蕊石散或用保安膏壹貼作壹服圓如梧桐子大溫酒吞下如未下再服產婦生理不順橫生逆生者可與服兎髓圓產兒已出但胞衣不下臍腹堅脹急痛者可與服牛膝湯

產後諸疾者皆因新產去血過多津液燥少陰陽俱虛臟腑枯弱切不可發汗及轉積令吐瀉藥亦不可服太燥熱藥補之只可用溫和藥漸次加減調理不可取目前

產前藥忌者產前所忌損動胎氣藥物盧醫周鼎集以為歌曰

乾地黃　蛤蚧　類牛膝　黃水銀　并巴豆　牛膝藜蘆　加蔓荊　苡仁　牙朴　芒消　牡丹　煎代赭　蜈蚣　胡麝

烏頭　附子　及天雄　烏喙　側子　與生蠍　及虻蟲　大戟　蛇蛻　及蜈蚣　金石　錫粉　對雄黃　飛生礬　更入蜥蜴　蒺藜花　薇銜　草三稜

前產後頭旋者可與保生圓四物湯膠艾湯虛勞發熱及寒熱俱發者可與黃耆鼈甲散逍遙散地黃圓澤蘭荊芥　散極妙氣壯者與逍遙散參苓白朮散熱未退者與人參當歸養脾圓氣壯年少女人骨中有熱者可與熟乾地黃圓食後服人參養榮湯食前服人參黃耆散疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣血閉無子者可與熟乾地黃圓鍾乳澤蘭圓杜丹煎圓婦人無子或諸虛上熱下冷百病皆生者可與小白薇圓禹餘糧圓陽起石圓先有寒下痢不止及少氣者可與吳茱萸湯或發赤腫可與人參消毒飲加荊芥煎逍遙散甚者可服青木香圓疏通開導

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

之急亂投湯藥反生他疾罪稱非輕切宜戒之新產血氣俱虛不可太補恐增寒熱常令惡露去盡為佳可與黑神散大聖散澤蘭散蒲黃散產後去血過多昏迷問精神錯亂皆因去血過多氣血無所生可與芎藭散大聖散飲調下不效者與芎藭石散保安膏產婦常用閻醋炭氣為佳產後忽然發熱渾身拘急者皆由惡露未盡新血與敗血相搏可與黑神散忽然蒲黃末逐瘀血產後腹中堛上下作痛四逆散忽然發熱渾身拘急者可與四物湯加生地黃當歸芍藥川芎熟地黃甘草白朮陳皮茯苓白芍藥人參黃芪白薇桔梗半夏麥門冬五味子烏梅柴胡地骨皮知母秦艽青蒿鱉甲地榆牡丹皮生薑大棗水煎服產後血風頻增昏沈不省身如中惡或偏身虛腫者可與龍虎丹參圓作一壹丹產後煩渴欲飲冷者皆因去血過多陰氣衰少客陽浮越於心渾身壯熱上膈壅滯心神不止可與五苓散熟湯調服產後驚風狂言亂語如見鬼神狀此熱入胸膈作痛皆因敗毒攻於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定者可與芎藭石散保安膏產婦常用四物湯加柴胡黃芩桔梗甘草烏梅陳皮生薑大棗水煎服產後發熱渾身拘急者可與四物湯加柴胡黃芩桔梗甘草烏梅陳皮生薑大棗水煎服產後血風頻增昏沈不省身如中惡或偏身虛腫者可與龍虎丹參圓作一壹丹產後煩渴欲飲冷者皆因去血過多陰氣衰少客陽浮越於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定者可與芎藭石散保安膏產婦常用四物湯加柴胡黃芩桔梗甘草烏梅陳皮生薑大棗水煎服產後血風頻增昏沈不省身如中惡或偏身虛腫者可與龍虎丹參圓作一壹丹產後煩渴欲飲冷者皆因去血過多陰氣衰少客陽浮越於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定者可與芎藭石散保安膏產婦常用四物湯加柴胡黃芩桔梗甘草烏梅陳皮生薑大棗水煎服產後血風頻增昏沈不省身如中惡或偏身虛腫者可與龍虎丹參圓作一壹丹產後煩渴欲飲冷者皆因去血過多陰氣衰少客陽浮越於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定者可與芎藭石散保安膏產婦常用四物湯加柴胡黃芩桔梗甘草烏梅陳皮生薑大棗水煎服產後血風頻增昏沈不省身如中惡或偏身虛腫者可與龍虎丹參圓作一壹丹產後煩渴欲飲冷者皆因去血過多陰氣衰少客陽浮越於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定者可與芎藭石散保安膏產婦常用四物湯加柴胡黃芩桔梗甘草烏梅陳皮生薑大棗水煎服產後血風頻增昏沈不省身如中惡或偏身虛腫者可與龍虎丹參圓作一壹丹產後煩渴欲飲冷者皆因去血過多陰氣衰少客陽浮越於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定者可與芎藭石散保安膏產婦常用四物湯加柴胡黃芩桔梗甘草烏梅陳皮生薑大棗水煎服

温酒調下兼服琥珀圓產後血風頻增昏沈不省身如針刺髮隨抗落或偏身虛腫者可與龍虎丹參圓作一壹服用當歸煎酒嚼下如痰痒者無服人參荊芥散產後乳汁不行者不可服諸行血藥致生他病只可服滋養血氣藥自然血脈壯盛乳汁自調可與四物湯熟乾地黃圓白薇圓內補當歸圓益陰丹大順散澤蘭散之類產後大便不通或秘澁者緣內無津液腸胃乾燥切不可用猛烈藥下之恐生他疾可與四物湯加青皮去白芍藥每服半錢拌勻同煎服更不通者可與麻仁圓三和散產後轉胞小便不通者可與八味圓產後吹乳急宜治之不爾結成膿血可與大岳活血丹及食後服消毒犀角飲以手按患處緩緩揉之次用三仙散抹患處乳頭上不可揉藥恐小兒食乳誤喫其藥極辣服前藥又方若夏秋只用芙蓉葉搗研爛入新井水調稀得所塗患處乳頭周圍亦不可塗藥患

論小兒諸疾

小兒急驚者皆因風邪干於心渾身壯熱上膈壅滯心神不定忽然驚搐渾身拘急筋脈抽掣若有此候須先問曾瀉不曾瀉曾吐不吐如不吐瀉忽然發熱手足抽搐

目睛上視面赤口乾此急驚證也可與天麻防風圓蛇黃膏睡驚圓至寶丹金箔鎮心圓感風傷寒作熱氣急痰涎欬嗽或日間發搐或睡中發搐此乃夾驚證也當先發表可與人參羌活散惺惺散少出汗如驚未退更服天麻防風圓隆痰傷食發急驚者其證作熱面赤煩渴亦當先發表可與惺惺散人參羌活散次服前件防風圓之類消積圓感應圓消散積氣次服紫霜圓挨之類

小兒慢驚者皆因乳哺不調或食黏膩臟腑壅滯及積熱為風邪所傳入於臟腑乍冷乍熱心神不定脾胃感冷或時嘔逆身體溫壯手足不定睡中強亂頭目乍赤乍黃此乃慢驚或吐瀉俱作忽然發驚而手足不甚抽搐搐時瘈瘲及睡中露睛脣白手足冷口中氣亦冷切不可與急驚藥誤人多矣但可與金液丹肆粒青州白圓子如稍惺惺減金液丹加白圓子更與人參羌活散參苓白木散乳食後可與鎮心圓煎令熟服令乳母忌生冷動風毒物之類

小兒胎驚風者皆因乳母觸冒寒暑邪氣傷於胎中生兒之後洗浴當風冷觸於臍邪氣不除變成胎驚之候百日之內頻頻煩躁啼哭無時目睛上視睡中搐搦或身冷頭面赤糞如青黃水者可與珀圓調理乳母更用和氣藥調理

小兒諸疳者腹肚脹滿小便白濁糞下酸臭此是疳證可與五疳保童圓蘆薈圓六神丹口疳可與甘露飲清涼飲玉屑無憂散口疳暴赤爛齒縫出血出齦肉臭爛者名走馬疳可與五福化毒丹用生地黃汁調使雞翼毛刷患處小兒腹中有堆癖結硬面黃脣白肌瘦腹大寒熱往來如瘧或作朝熱者可與紫霜圓候積進食圓開胃圓以意用之每夜少服微挨次服參苓白术散及益黃散調理緣小兒腸胃怯弱只可漸漸消磨不可大段瀉下

小兒吐乳瀉青者是傷冷也可與益黃散異功散參苓白术散挨積圓小香連圓駐車圓可二遍服吐乳瀉青者是傷熱也或小便赤澁者可與五苓散香薷散參苓白术散之類可通服泄瀉糞

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

白或酸臭米穀不化者是傷食也可與感應圓祛積圓異功散之類泄瀉作腸鳴小便白濁者是疳瀉證可與紫霜圓五疳保童圓六神丹蘆薈圓參苓白朮散及蝦蟆散之類久瀉不止頃引飲乳食不絕者可與參苓白朮散嘉禾散並氣散吐瀉不止或發驚搐甚者可與四聖丸香朮散及老活丹金液丹研碎米飲調灌之

小兒赤白痢或泄瀉者可與小駐車圓連圓久不止者黃散胃風湯香連圓久不止者每遇欲下痢先須腹痛次下痢了其腹痛漸止者忍有冷積先服參苓白朮散人參散不能飲食者先與異功散助胃風湯小香連圓久不止者有積欲下痢時先腹痛次下痢可與感應圓挨積圓紫霜圓之類次服前件痢藥次服治痢藥血痢者可與地榆散次服黃連阿膠圓

小兒變蒸證者變蒸作熱或汗出咳嗽或吐逆不欲食或眼睛上視上脣有白珠子起乃變蒸候也不可作傷寒治之但可與四君子湯參苓白朮散之類或熱盛可與紫霜圓少許切不可多服

小兒顋項結核或赤眼瘡癤者可與消毒犀角飲清心飲五福化毒丹甚者與

服四順清涼飲微下之或腫硬用保安膏貼之

小兒傷寒證者傷寒疑貳其證渾身壯熱欬嗽乍涼乍熱又似瘡疹又似傷寒又似傷風疑貳之間只可與服惺惺散升麻葛根湯小柴胡湯切不可與下利藥傷寒傷風其證渾身發熱口中氣熱頭痛鼻塞或鼻流清涕可與惺惺散升麻葛根湯人參羌活散

小兒痰涎壅塞欬嗽者可與人參半夏圓潤肺圓辰砂化作水雞聲者可與人參定喘湯辰砂半夏圓傷風欬嗽可與惺惺散發散風痰次服潤肺散細辛五味子湯人參補肺湯之類主之

小兒寒瘧證者瘧疾寒熱往來連日發或兩日或三日壹次發小兒三四歲已上者可與感應圓參蘇飲如吃乳小兒只令乳母更有小兒潮熱似瘧非瘧不可用瘧藥服前件瘧藥治之

小兒患瘡疹豆證其證乍熱乍涼呵欠煩悶欬嗽噴嚏耳

鼻冷及脚冷但只惡熱不惡風渾身熱甚者或發驚搐或不搐一向發熱者此乃瘄疹證也可與升麻葛根湯犀角飲已瀉者不可與他藥只服惺惺散

小兒渾身疥癩瘡濕癬癬頭瘡等疾可與清心飲消毒飲次用葱鹽湯洗拭乾以無比散摻之

小兒雀目日間都無事遇夜不見物者是雀目也可時常與五福化毒丹臨臥用粟米飲調下

增廣太平惠民和劑局方指南總論卷下

增廣太平惠民和劑局方諸品藥石炮製總論

玉石部

丹砂雄黃雌黃凡使先打碎研細水飛過入藥用如別有煅煉各依本方

石鍾乳凡使先依法煮候一日數足研細不入滲方可入藥服食

白礬凡使用光明者先於鐵銚子內或刀上火中煅過方研細入藥用如生用者各依本方

赤石脂白石脂凡使須於炭火中煅過方入藥用如急用則研令極細不得飛亦得

硫黃凡使先細研水飛過方入藥用如別有煅煉各依本方

陽起石好酒內淬柒遍如只以水飛過方入藥用玖遍搗碎羅過細研水飛過好酒煮半日亦得並研細醋內淬玖遍搗碎羅過細即拌水淘去赤汁使盡取出瀉於新瓦上攤去淬各依本方

磁石凡使先以炭火燒通赤醋淬玖遍搗碎羅過細研水飛方入藥用如入湯劑二即拌水淘去赤汁使盡取出瀉於新瓦上攤去淬各依本方

黑鉛凡使先以鐵銚炭火鎔開取出瀉於新瓦上攤去淬各依本方如此壹兩次取淨鉛一秤用如或結砂子

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

黃丹 凡使先炒令色變研令極細再羅過方入藥用
硝石 凡使先研令極細以鷄子盛於炭火中煅令通赤方入藥用如急用只炒過研細亦得
食鹽 凡使先須炒過研細方入藥用
石灰 凡使須用風化為末者佳先以醋浸壹宿漉出候乾用火煅令腥臊氣盡候冷研細方入藥用
伏龍肝 即竈中對釜月下上也水飛令極細方入藥用
百草霜 村庄者良凡使須研令極細再羅過方入藥用
滑石 凡使先以刀刮下以牡丹皮同煮一伏時取出用東流水研飛過日中曝乾方入藥用
禹餘糧紫石英石膏寒水石代赭石蘗等 凡使先火燒赤研細水飛令極細方入藥用
太陰玄精石 凡使用搗碎細研水飛過曝乾方入藥用
白堊 即白善土也凡使每修事壹兩用鹽壹分投於斗水中用銅器中煮十餘沸然後用此沸了水飛過方入

藥用免結灑人腸也
自然銅 凡使用火燒令通赤以醋淬玖遍細研羅過用
花蘂石 凡使當以大火煅過如急用不煅亦得

草部

菖蒲 用石上生節密者佳凡使須刮碎微炒用或只焙乾亦得
菊花 凡使須去枝梗焙乾方入藥用
人參 凡使先去蘆頭劈焙乾秤方入藥用不去蘆令人吐慎之
天門冬麥門冬 抽去心焙乾秤用
甘草 用大者凡使先破開火上炙黃赤色方入藥用如稍多只燃炒亦得或生用亦依本方
熟乾地黃 焙乾方入藥用如急用只以酒洗過以酒浸壹日夜漉出蒸令兩次或生用亦得不若酒浸蒸過為佳
蒼朮 凡使先以米泔浸春去皮焙乾方入藥用如急用只以酒浸蒸過使不蒸

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

兎絲子 凡ソ使先以レ水ヲ洗ヒ澄テ去ン沙土ヲ一ト升ヲ却以テ好キ酒ヲ浸ス一壹晝夜ヲ漉出シ蒸ス過熟ヲ杵テ為ニ粗末ト焙乾然後入レ藥同搗
川牛膝 凡ソ使先ニ去レ蘆ヲ頭ヲ洗ヒ切ニ用ユ如レ急ニ須ク盡熱ヲ即チ易レ碎ヲ以テ酒浸壹日一夜焙乾
紫胡前胡等 凡ソ使先ニ去レ蘆ヲ頭ヲ洗ヒ蒸過便チ使不レ蒸亦得
白朮獨活羌活等 凡ソ使須ク坐シ焙乾方ニ入レ藥ニ用ユ
車前子 凡ソ使須ク微妙焙乾亦得
木香 凡ソ使不レ見レ火須ク細剉日乾用ユ如レ為ニ細末ニ薄切微火焙乾使亦不レ妨然不レ若ニ臨乾之為ニ妙也
山藥川芎白芷等 凡ソ使須ク剉碎焙乾方ニ入レ藥ニ用ユ
薏苡仁 凡ソ使米ヲ同ニ焙乾ニ以テ糯ヲ用ユ
遠志 凡ソ使先須ク去レ心ヲ問ヒ更ニ能以テ甘草湯ヲ浸壹宿漉出焙乾用ユ如レ不レ去レ心ヲ令人煩
草龍膽 凡ソ使先去レ蘆ヲ剉如レ急ニ用不レ浸
澤瀉 凡ソ使用レ酒ヲ浸壹宿漉出焙乾用ユ如レ急ニ用不レ浸
不レ浸亦得或有ニ炮製各依ニ本方ニ

石斛 凡ソ使先洗去根土ヲ用レ酒ヲ浸壹宿漉出蒸過熟杵テ為ニ末ト焙乾然後入レ藥同搗
巴戟天 凡ソ使先去レ心ヲ以レ酒ヲ浸壹宿漉出蒸過曝乾方ニ
劉寄奴 凡ソ使先ツ淨ク去レ鬚剉碎用レ蜜ヲ炒乾方ニ入レ藥用ユ
黃連 凡ソ使ニ先ツ慢火ニ炒乾ス令ニ香テ令ニ刺ヲ盡ク用レ酒ヲ拌再蒸乃ち焙乾ス
萸梨子 凡ソ使ニ先須ク用レ擘開塗レ蜜ヲ炙リ微赤
黃耆 凡ソ使ニ去ク蘆ヲ薄切焙乾秤方ニ入レ藥用ユ
肉蓯蓉 凡ソ使ニ先須ク以テ温湯ニ洗刮去上ノ粗鱗皮ヲ切碎以テ酒ニ浸ス一宿漉出焙乾或ハ焙乾使亦得
防風 凡ソ使先須ク去レ蘆及ヒ叉頭ノ者ヲ洗剉乾方ニ入レ藥用ユ
續斷 凡ソ使先剉碎用レ酒ヲ浸壹伏時漉出焙乾方ニ入レ藥用ユ如レ急ニ用ハ不レ浸亦得
細辛 凡ソ使先去レ土ヲ并ニ苗ヲ焙乾方ニ入レ藥用ユ
蒲黃 參重紙ニ焙令ニ色黃蒸半日即チ是蒲上黃花須ニ子細ニ認ム勿レ誤ニ用ス松黃一ト名ニ腫即チ生ス蒲ノ補レ血ヲ止レ血即チ炒用レ之ヲ
防風 凡ソ使先須ク去レ蘆及ヒ叉頭ノ者ヲ洗剉乾方ニ入レ藥用ユ令人發狂ス又尾ノ者令人發ニ癇疾ヲ切ニ宜レク慎レ之ヲ

高良薑 凡使先剉碎以麻油少許拌勻炒過用

百部根 凡使用竹刀劈開去心浸壹宿漉出細剉焙乾用

茴香 凡使用船上者淘洗令淨却用酒浸壹宿漉出曝乾炒過用

牡丹皮 凡使須淨揀酒拌蒸曝乾用

京三稜蓬莪朮 凡使先以醋煮剉焙乾用

補骨脂 性本大燥毒熱凡使用炮熟用

烏頭 凡使先炮裂去皮臍方入藥用

半夏 凡使先以沸湯浸候温洗去滑如此漆遍方用如入藥用或陰製以東流水浸漿日夜去皮臍半切片焙乾用亦得

縮砂 凡使先和皮慢火炒令熟透去皮取仁入藥用

附子天雄等 凡使先炮裂令熟去皮臍方入藥用

大黄 凡使或蒸過用或煻灰中炮用若取猛利即生焙乾用

旋覆花 一名金沸草凡使須蒸過入藥用急用不蒸亦得

常山 凡使剉碎酒浸壹晝夜蒸過方入藥用

天南星白附子 凡使炙熟灰中炮裂用或別有製度各依本方

馬兜鈴 凡使須微炙過方入藥用

骨碎補 凡使用刀刮去上黄皮毛令盡細剉用酒拌蒸壹日取出曝乾用急用只焙乾不蒸亦得

葫蘆巴 凡使微炒過入藥用

使君子 凡使先於熱灰中和皮炮去皮取仁焙乾入藥用

梔子 並微炒過方入藥用

胡索 葶藶子 牽牛子

桔梗大戟延

木部

肉桂 凡使不見火去麁皮令見心中有味處剉方入藥用如婦人雜藥中仍微炒用為佳

茯苓 豬苓 凡使須先去黑皮剉碎焙乾用

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

茯神凡使先去皮并中心所抱木刮碎焙乾入藥用

酸棗仁十分香熟方凡使先以慢火炒令香熟研破用

黄蘗凡塗炙方凡使先去粗皮炙令黑入藥用

乾漆凡使須搗碎炒熟入藥用不爾損人腸胃

蔓荆實凡使用酒浸蒸壹伏時取出焙乾用

杜仲凡使先去上粗皮令淨以生薑汁塗炙令香熟為度或只刮碎以薑汁拌炒令絲絶亦得

沉香檀香為細末方入藥用

桑白皮凡炒使先刮碎微炒過方入藥用

吳茱萸凡使須取布袋盛入藥用若治外病不入丸口者不洗亦得

檳榔細切勿經火恐無力若用甘草水煮壹伏時出焙乾以麪炒焦候香熟為度

梔子凡使先去皮鬚子浸壹宿漉出焙乾入藥用

枳實枳殻凡使要陳者先以湯浸磨去穰焙乾以麪炒焦候香熟為度

厚朴凡使先去麁皮見赤心以生薑汁炙令香熟為度或只刮碎焙乾入藥用

山茱萸凡使先須搗碎焙乾亦得

大腹皮凡使先須以酒洗再以大豆

巴豆凡使先去殻并心膜爛搗以紙裹壓去油取霜入藥又一法去殻心膜了以水煮伍度換水各煮壹沸

蜀椒凡使先去枝梗并目及閉口者微炒過隔紙鋪在地上以盞蓋令出汗方入藥用

皂角凡使要棟肥長不蛀者削去皮弁子塗酥炙令焦黄方入藥用

訶梨勒凡使先於塘灰中炮去核取肉酒浸蒸壹伏時取出焙乾方入藥用

楝實凡使先以酒浸潤待上皮軟剥去虚皮焙乾以麪炒令黄内杵為粗末羅過去核方入藥用

蕪荑子凡使先炒過方可用

龍腦麒麟竭乳香松脂等凡使極細研並須別研令勻方可入藥用

禽獸部

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

龍骨 凡使要二粘舌一者先以レ酒浸了以レ水飛過參度曰中黠乾用レ之如急用只以レ酒煮炮製各依二本方一

麝香 牛黃 凡使用別研令細然後入レ藥用

阿膠及諸膠 凡使先搗碎炒令脆方用或用レ酥塗炙各依二本方一炮製

鹿茸 凡使用下茹茸連二項骨一者生截斷酒浸壹日慢火炙令乾細搗羅研如レ粉

虎骨 凡使先研開取二肉中一髓及酥等一瓦覆炙令黃赤色一方用

腽肭臍 凡使先用酒浸慢火炙令熟方入レ藥用

夜明砂 即伏翼屎也凡使須微炒過方入レ藥用

魚蟲部

白蜜 凡使先以レ火煎掠去浮沫令色微黃精粗隨二蜜色一則經レ久不レ壞掠之多少隨レ意使用

牡蠣 凡使先以レ火煅令通赤候冷細研如レ粉方可レ用

眞珠 凡使要二新淨未一曾傷破一及鑽透者一於臼中搗令細羅重重篩過却更研壹壹貳萬下了任レ用之

桑螵蛸 或燕窠過亦得 凡使先用炙過

鼈甲龜甲 凡使先用醋浸三日去裙慢火中炙覆炙令黃赤色方用為度如急用只醋炙候黃色便可用

露蜂房 凡使先炙過方可用或炒亦得

蟬脫 凡使先去二嘴足一湯浸潤洗去泥土一却曝乾微炒過任用之

白殭蠶 凡使要二白色條直者一去二絲嘴一微炒過方用或看二只生一用

原蠶蛾 凡使去二翅足一微炒過方入レ藥用

蝦蟆 為度或燒灰存性用他有二炮製一各依二本方一或燒

蛇蛻 凡使先須炙過方可用或炒灰入レ藥用各依二本方一炮製

烏蛇白花蛇 凡使先以レ酒浸一宿去レ骨炙令二黃赤一乾燥去二皮骨一耳入レ藥用

地龍 凡使微炒過方用

蜈蚣 凡使先要二炙一過方可二入レ藥用

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

班猫 凡使先去足翼用糯米同炒熟方可入藥用生即吐瀉人
天漿子 凡使須微炒過可用之
蜣螂 凡使先去頭翅足炙過用之
五靈脂 凡使先以酒研飛鍊淘去沙石曬乾方入藥用

果菜部

草豆蔻 凡使須去皮取仁焙乾用或只和皮燈火中炮熟去皮用亦得
陳皮青皮 凡使先以湯浸磨去穰曝乾炒入藥用或急用只焙乾亦得
烏梅 凡使先洗搥去核取肉微炒過用之
木瓜 凡使先去穰并硬子剉碎焙乾入藥用
杏仁桃仁 凡使先以湯浸去皮尖及雙仁者控乾用麩炒令黃赤色為度
胡桃 凡使去殼以湯浸去皮却研入藥用之
韭子 凡使先須微炒過用之亦有生用者

胡麻 即黑油麻也凡使先炒過用或以蒸以曝用亦得
黑豆赤小豆大豆黃卷麥麩神麴白豬豆蔲等 凡使並用炒過

右凡有修合先須依法炮製事治令十分乾燥方秤入藥用庶得分兩無虧藥力亦不致偏勝也

解百藥及金石等毒例

解蛇虺百蟲毒 雄黄 巴豆 麝香 丹砂 乾姜

解蜈蚣蟲毒 桑汁及桑根汁 煮

解蜘蛛毒 藍青汁 麝香

解蜂毒 藍青汁 蜂房

解狗毒 杏仁 礬石 人屎汁 韭根

解惡氣瘴毒 犀角 麝香 雄黄 羚羊角

解喉痺腫邪氣惡毒入腹者 射干 升麻 犀角

解風腫毒腫 沉香 麝香 薰陸香 紫檀香 雞舌香 木香

解百藥毒 甘草 藍實 齊苨 大小豆汁 藍汁 貝齒屑 大小豆汁 大麻子汁 六畜血 蜥蜴屎

解射罔毒 藍汁澄 當根汁 竹藕支汁

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

解野葛毒 猪膏 鵝子清 葛根汁
鴨頭熱血 甘草汁
兩脅及臍上二暖小輒易之口須臾開則
內藥藥入口便活已用薑荂汁介之
解班猫芫青毒 巴豆 戎鹽 藍汁 大豆汁
解狼毒毒 杏仁 猪膏 藍汁 大豆汁
鹽汁 白斂
解鄧躅毒 梔子汁
解巴豆毒 煮黄連汁 大豆汁
解雄黄毒 煮菖蒲屑汁 煮寒水石汁
解蔥蘆毒 雄黄 煮葱汁
温湯
解甘遂毒 大豆汁
解蜀椒毒 柱汁 豉汁 人溺
葵子汁 冷水 雞毛
解半夏毒 煮乾姜汁 土漿 食苏
生薑汁 燒吸烟及水調服
解礬石毒 大豆汁
白鵝膏

解芫花毒 防己 甘草 防風 桂汁 蚕汁 麝香 甘草汁
解莨菪毒 犀角 甘草汁
解烏頭天雄附子毒 粟肌 防風 遠志 飴糖 大豆汁
解馬毒 清水
解大戟毒 菖蒲汁
解杏仁毒 藍青汁
解桔梗毒 白粥
解諸菌毒 掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之名曰地漿
解防葵毒 葵根汁 葵根汁 應是解狼毒之
浮者爾 按防葵本經無毒試用亦無毒今用
臣禹錫等謹按
解野芋毒 人糞汁
解鷄子毒 醋

解食金銀毒雞子汁水淋雞屎汁
解食諸肉馬肝漏脯中毒服水銀數兩即出
亦佳
解鐵毒磨石生韭汁
解食諸魚中毒煮橘皮馬鞭草汁大豆汁
燒末鮫魚皮煮朴消汁生蘆葦根汁
解食蟹中毒燒乾蒜汁生藕汁
解食諸菜毒甘草貝齒胡粉參種末水和服貳升佳
冬瓜汁
解飲食中毒心煩滿煮苦參汁小兒漱乳汁即止
令吐出即地漿藍汁豉汁
解服藥過劑悶亂者飲
粳米粉汁水和菖蒲粉飲
乾薑蘘荷汁白鴨屎汁
解服石藥中毒飴糖黃連骨氷和犀胡粉吞雞子黃
人參汁

論諸藥不宜入湯酒者

石類

朱砂熟湯入陽起石孔公孽
礬石鹵鹽石灰
銀屑白堊胡粉
雲母鉛丹

草木類

朝藿皂角貫衆
薇銜石南羊桃
槐子各宜酒野葛狼毒
莽草巴豆鬼臼
簡茹狼牙藜蘆蠶蠋
蕪荑雷丸蔦尾
葵藜紫葳
蛇床子狼跋
毒公藜蘆
萑菌鵝尾

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

女菀　菜耳　白及
蛇銜　占斯　辛夷
蘆根　麻勃　苦瓠
雲實　地膚子　青箱子
蒴藿子　兔絲子　王不留行

蟲獸類
蜂子　蜜蠟　白馬莖　牡蒙　飛廉
鷄子　雄鵲　伏翼　虎掌　枳實
螢火　蠐螬　殭蠶　瓜蒂　陟厘
斑猫　芫青　葶長　虎杖 入酒單浸　菥蓂子
蜚蠊　螻蛄　馬刀
蝸牛　生鼈 入酒　狗陰莖　雀卵
生鼠　諸鳥獸　鼠婦　樗雞
蜈蚣　蜥蜴
地膽　蚕蟲
赭魁　蝦蟆

蟲魚骨骨髓膽血屎溺

大觀書林
京都書林
京兆堀川通

增廣太平惠民和劑局方諸品藥石炮製總論

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

特1
473

享保七年壬子孟春原版
寛政紀元己酉仲冬再版

京都書林　林伊兵衛
浅野彌兵衛
大阪書林　泉本八兵衛

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』

ガラス使用