国立国会図書館所蔵



靜嘉堂文庫所藏

新雕孫真人千金方目

第一卷

習業第一
理病第二
處方第三
合和第四
婦人上

第二卷

求子方轉女爲男
養胎易產
難產
逆生

第三卷

婦人產後婦人下

精誠第二
診候第四
用藥第六
服餌第八

婦人有病
婦人有病心腹痛
子死腹中
胞衣不出 下乳

靜嘉堂文庫所藏

風
惡露
小便 婦人下
第四卷 補益第一
崩中第三
第五卷 小兒
序例第一
驚癎第三
癰疽第五
欬嗽方第七
雜病方第九
第六卷
面方第一
心腹
下痢
雜方
不通第二
月水不調第四
初生出腹第一
客忤方第四
傷寒第六
瘕結方第八

匸方第三
子
胷方第五
齒方第六
喉方第七
耳方第八
第七卷
論風毒狀第一 次第有十八章
湯方第二
散方第三
洒方第四
膏方第五
第八卷
雜風狀第一
癮節風第二
風痺第三
口喎第四
尸厥失音第五
口喋
大風第七
角弓反張第六
第九卷 傷寒上
辨温方第二
傷寒例第一

靜嘉堂文庫所藏

傷寒書第二
發汗湯第五
發汗後不醒醒第六
第十卷 傷寒下
傷寒宜吐方第一 嗜嘔吐咽
雜治方第三 口瘡咽痛
黃疸黃汗方第五 附圖
狐惑病第七
溫瘧第九
第十一卷
肝藏脉論第一
肝勞第三 并治眼疾
癥結癖氣第五 婦人血癖十二種
第十二卷
發汗散第四
發汗先第六
傷寒宜下方第一
手足腫方第四
百合病第六
江南溪證第
肝虛實第二
肝筋極第四
膽府脉論第一
咽門論第三
補虛前方第五
萬病方第七
第十三卷
心藏脉論第一
心勞方第三
脉虛實第五
胷痺方第七
頭風方第八 髮落 白禿 頭眩 面風 髮
第十四卷
小腸腑脉論第一
舌論第三
風顫方第五
膽
髓虛
吐血方第六
心虛實第二
脉極大第四
心腹痛第六 患
小腸虛實第二
風眩方第四
鷲悸方第六

靜嘉堂文庫所藏

好志方第七

第十五卷
脾藏脉論第一　脾虛實第二 消食
脾勞第三　肉極第四 秘澁
肉虛實第五　熱痢第六
冷痢第七

第十六卷
胃府脉論第一　胃虛實第二
喉嚨論第三　反胃論第四 今附 骨蒸
嘔逆吐第五　食噎第六
疳痢第七　小兒下痢方第八

第十七卷
肺藏脉論第一　肺虛實第二
肺勞方第三　氣極方第四
治積氣第五　肺痿方第六
肺癰方第七　飛尸疰第八

第十八卷
大腸腑脉論第一　大腸虛實第二
肛門論第三　皮虛實第四
欬嗽方第五　痰飲方第六
蚘蟲方第七 小兒病寸白虫附

第十九卷
腎藏脉論第一　腎虛實第二
腎勞第三　精極第四
骨極第五　骨虛實第六
腰痛第七　補腎第八

第二十卷
膀胱脉論第一　膀胱虛實第二

靜嘉堂文庫所藏

臟腑經絡論第一
三焦虛實第二
雜補方第七
第十一卷
消渴方第一
淋閉方第二
水腫方第五
第十二卷
序論第一
菜蔬第三
鳥獸第五
第十三卷
丁腫方第一
發背方第三
三焦脉論第四
霍乱第六
耳方第八
虛悶不得眠第一
尿血方第四
菓實第二
穀米第四
癰節方第二
卉毒方第四
癮疹方第五
第十四卷
九漏方第一
腸痔方第二
惡疾方第五
第十五卷雜方
解食毒第一
五石毒第三
胡臭方第五
婦嬰方第七
第十六卷備急
卒死第一
蛇毒第二
瘧疾方第六
腸癰方第二 奶乳 乳癰
癬疥方第四 白殺伐拍癬
百藥毒第三
蟲毒方第四
脫肛方第六
癩病方第八癬

靜嘉堂文庫所藏

火灸第四 [illegible]

第二十七卷 平脉經

平脉大法第一

五藏脉輕重第二

指下形狀第三

五藏脉所屬第四

分別病狀第五

三關對治法第六

五藏積聚第七

陰陽表裏虛實第八

何時得病第九

扁鵲華佗察色第十

五藏六腑氣絶候第十一

四時相反第十二

死期年月第十三

扁鵲診諸反逆死脉第十四

診百病死生第十五

三部死生訣第十六

第二十八卷

養性序第一　道引養性第二

黄帝雜忌第三　按摩法第四

調氣法第五　居處法第六

房中補益第七　服食法第八

第二十九卷 針灸

明堂三人圖第一

三陰三陽流注第二

針灸禁忌法第三

五藏六腑傍通法第四

靜嘉堂文庫所藏

用針略例第五
灸例第六
第三十卷 玉函方附
孔穴主對法
頭病第一 頭面目鼻耳
舌病第二 齒咽喉臂手胷肩背
脇病第三 四肢腹心腸脹鳴不食嘔吐血
風病第四 失音溫大小便淋利黃疸
癲病第五 驚癲水痔癰癭貴脉霍乱尸注
雜病第六 婦人玉函方附

新雕孫真人千金方目録終

新雕孫真人千金方卷第一 并序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行滋落萬物淳朴無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化伏犧氏因之而畫卦乃立庖厨滋味既興病患萌起大聖祖農氏啓黎元疾爲嘗百藥以救療之猶未盡善黃帝受命創制九針雷公岐伯之倫備論經脉傍通問難詳究義理以爲經世可得依而暢焉春秋之際良醫和緩六國之時則有扁鵲公華他仲景叔和皆採賾索隱窮幽洞微用藥灸炷不過七八而疾無不愈者晉宋已來雖復名醫間出方十不能愈五六良由今人嗜慾泰甚立心不常故嫵縱逸有關病誠所致耳余緬尋聖人設教欲使家家自學人人自曉君親自疾不能理療者非忠孝也末俗小人多行詭詐倚傍聖教而爲欺紿遂令朝野士庶咸共尫羸

靜嘉堂文庫所藏

求出身之道醫治之術關而勿論可怪也嗟乎深乖聖賢之本意也吾幼遭風冷屢造醫門湯藥資須罄盡家產所以青襟之歲高尚茲業白首之年未嘗釋卷至於切脉診候採藥合和服餌節度將息避慎一事長於己者必不遠千里伏膺取決至於弱冠頗覺有悟是以親鄰中外有疾厄者多所濟益之患斷絕醫門故知方藥本草不可不學吾見諸方部遇倉卒求檢至難比得方立記疾已不救嗚呼痛天枉之學之昏愚乃博採群經刪裁煩重務存簡易以爲備急方一部凡三十卷雖未盡病源但使留意於斯者亦思過爲人命至重有貴千金二方濟之德踰於此故以名也未可備於士族庶以貽諸於私門張仲景曰當今居世之士未能留神道精究醫術上以奉尊長下以救卑幼保身長全以安其生而競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲唯利是務崇飭其末欲華其表而悴其中皮之不存毛將安附進不能愛人知物退不能愛躬知己忽逢風邪之氣嬰倉卒之疾患及禍至而後震慄身居危地蒙蒙昧昧贛若遊魂降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受斃齎百年之壽命將至貴之重器委付庸醫恣其錯謬咄嗟喑嗚厥身以斃神明消滅變爲異物幽潛重泉號咷相泣舉世知亡能覺悟自弃若是夫何榮勢之云哉此之謂也

習業第一　精誠第二
理病第三　診候第四
處方第五　用藥第六
合和第七　服餌第八

習業第一

凡欲爲大醫必須諳甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經脉三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河南范東陽張苗靳邵等諸部經方又須妙解五行陰陽祿命諸家相法及灼龜五兆周易六壬並宜精熟如此乃得爲大醫不爾無目

靜嘉堂文庫所藏

夜遊動致顛殞須熟讀此方[illegible]思妙理留意鑽研始
可與言於醫道者矣又須涉獵群書何者若不讀五經不知仁義
禮智信之道不讀三史不知古今有分義之事不讀諸子覩事則
不能默而識之不讀內經則不知有慈悲喜捨之德不讀莊老不
能任真體運不能任真體運則吉凶拘忌觸塗而生若能具而學
之則於醫道盡善盡美無所滯礙

精誠第二

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異亦有
而外同故五藏六腑之盈虛血脉榮衛之通塞固非耳目之
必診候以審之脉有浮沉絃緊之亂俞穴流注有高下淺深
肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可言於茲矣
以至精至微之事求之於至麤至淺之思其不殆哉若盈而益
之虛而損之通而徹之塞而擁之寒而冷之熱而溫之是重其疾
而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精者也既非神

授何以得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下無病可治及治
病三年乃知天下無方可療故學者必須博極醫源精勤不倦
不得道聽途說而言醫道已了深自誤哉
凡大醫治病必當安神定志無欲無求先發大慈惻隱之心誓
普救含靈之疾若有病厄來求救者不得問其貴賤貧富長幼
怨親善友華夷愚智普同一等皆如至親之想亦不瞻前顧
慮吉凶護惜身命見彼苦惱若己有之深心悽愴勿避
夜寒暑飢渴疲勞一心赴救無作功夫形迹之心如此可
生大醫反此則是含靈巨賊自古名賢治病多用生命以
雖曰賤畜貴人至於愛命人畜一也損彼益己物情同患況聖人
乎夫殺生求生去生更遠吾今此方以不用生命為藥良由此也
其蝱蟲水蛭之屬市有死者則市而用之不在此例雞卵一物以
其混沌未分必有大夫惡急之處不得已隱忍而用之能不用者
斯為大哲亦所不及也其有患瘡痍下痢臭穢不可瞻視人所

靜嘉堂文庫所藏

惡見者俱發慚愧悽憐憂恤之意不得起一念蔕芥之心是吾
之志也
夫為醫之體欲得澄神內視望之儼然寬裕汪汪不撓不昧省疾
診候至意深心詳察形候纖毫勿失處判針藥無得參差雖曰
病宜速救要須臨事不惑唯當審諦覃思不得於性命之上率爾
自逞俊快邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺羅滿目勿
眄絲竹湊耳無得似有所娛珍羞迭薦食如無味醽醁
所失所以爾者夫一人向隅滿堂不樂而況病人苦楚不離
而醫者安然歡娛自得茲乃人神之所共恥至人之所不為斯
方之本意也
夫為醫之法不得多語調笑談謔諠譁道說是非議論人物衒
燿聲色訾毀諸醫自務己德偶然治差一病則昂頭戴面而有
自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老子曰人行陽德人自
報之人行陰德鬼神報之人行陽惡人自報之人行陰惡鬼神報

之尋此二途陰施陽報豈誣也哉所以醫人不得恃己所長專心
經略財物但作救苦之心於冥運道中自感多福者爾又不得以
彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衒功能諒非忠恕之道

理病第三

方論曰夫天布五行以植萬類人稟五常以為五藏經絡腑俞
陽會通玄冥幽微變化難極易曰非天下之至賾其孰能與
觀今名醫未能深思經旨以演其智各承家技始終順舊
疾衡人以口給呼吸斯須便處湯藥案寸未及尺握手不
御趺陽三部不參動數未發息不滿五十診其九候曾無
堂闕庭盡不見察欲知死別生固亦難矣此皆醫之深戒病者
不可不謹以察之而自防慮也
古來醫人相嫉扁鵲為秦太醫令所害即其事也一醫處方不得
使別醫和合脫或私加毒藥令人增疾漸以致困如此者非一特
須慎之乃可不服其藥以任天真不得使愚醫相嫉賊人性命

靜嘉堂文庫所藏

甚可哀傷
夫百病之本有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下
痢大小便不通賁豚上氣咳逆嘔吐黃疸消渴留飲宿癖堅積癥
瘕驚邪癲癇鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踒折癰腫惡瘡痔
瘻瘤癭男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲
虵蠱毒所傷此皆大略其間變動枝葉各依端緒以取之
熱勞損傷飽房勞驚悸恐懼憂恚怵惕有產乳落胎
有貪餌五石以求房中藥此皆爲病之根源爲患生之枝
不知其本末但向醫說男女長幼之病有半與病源相附會
可服藥也男子者衆陽所歸常居於燥陽氣遊動強力施泄
便成勞損損傷之病亦以衆矣若比之女人則十倍易治凡
子十四已上則有月病月病來日得風冷溫熱四時之病相協者
皆應自說之不爾與治相觸動更增困也處方者亦應問之
凡用藥皆隨土地所宜江南嶺表其地暑濕肌膚薄脆腠理

開疎用藥輕省關中河北土地堅燥其人皮膚堅硬腠理閉實用
藥重復世有少盛之人不避風濕觸犯禁忌暴竭精液雖得微疾
皆不可輕以利藥下之一利大重竭其精液困滯著牀動經年月
也凡長宿病宜服利湯不須盡劑候利之足則止病源未除者更
合耳氣力堪盡劑則不論也病源須服利湯取除者服湯後宜
丸散時時服助湯丸散也凡病服利湯得差者此後慎不
補湯也得補病勢還復成也更重瀉之則其人重受弊也
差氣力未甚是平復者但消息之須服藥者當以平藥和
患之人不妨行走氣力未衰欲將補益冷熱隨宜丸散者可
服利湯瀉除胷腹中壅積痰實然後可將補藥也夫極虛勞應
服補湯者不過三劑即止風病應服治風湯者皆非五劑可知也
自有滞風虛積服十分劑乃至百餘劑乃可差也故曰實即瀉之
虛則補之夫二儀之内唯人最貴禀天地中和之氣法律禮樂莫
不由人人始生先成其精精成而腦髓生頭圓法天足方法地目

靜嘉堂文庫所藏

應日月五藏法五臟六腑法大腸長二丈二尺
法十二時小腸長二丈四尺法二十四氣身有三百六十絡以應
一歲人有九竅以應九州天有異暑人有盛賓天有刑德人有
喜怒天有陰陽人有大小人有長短所以服五穀不能
將節冷熱鹹若更相攻擊變成疾病凡醫診候固是
不易又曰問而知之別疾深淺名為巧醫仲景曰凡欲和湯
對灸之法宜應精思十二經脉三百六十孔穴榮衛氣行知
在不可不通宮有上醫相色色脉與形不得相失黑乘赤者
乘白者死赤乘青者生中醫聽聲病聽聲合五音火得水
煩悶干躁木得金聲恐畏相形者生也生育萬物迴旋四仕
善者不見死者歸之太過四肢不舉令人九竅不通六腑閉塞猶
如醉人診候之醫知病源由流轉移動四時逆順相害相生審知
腑藏此乃為妙也

診候第四

凡欲理病先察其源候其病機五藏未虛六腑未竭血脉未亂精
神未散食藥必治若病已成可得半愈病勢已過命將難全
夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進血脉未亂
經絡調和精取其脉知其逆順非其時不用也深察三部九候
明告之古之善為醫者上醫醫國中醫醫人下醫醫病又有
醫聽聲中醫察色下醫診脉又有上醫醫未病之病中醫
病之病下醫醫已病之病若不加心用意於事混濁混濁
難以救之矣三部者上部為天也中部為人也下部為
九候部各有三合為九候上部天兩額動脉主頭角之氣也中部
地兩頰動脉口齒之氣也下部人耳前動脉耳目之氣也中部天
手太陰脉也鼻肺之氣也中部地手陽明也胃中之氣也中部人
手少陰也心之氣也下部天足厥陰肝之氣也下部地足少陰腎
之氣也下部人足太陰脾胃之氣也合為九候也形盛脉細少氣
不足以息者死形瘦脉大多氣少者死形氣相得者生參五不

靜嘉堂文庫所藏

調者病三部九候皆相[illegible]人不通三部九候及以四時之
經或用湯藥倒錯鍼灸失度順方治病更增他疾唯致滅亡哀
哉烝民枉死者半世無良醫爲其解釋經說地水火風和合成人
凡火氣不調舉身蒸熱風氣不調全身強直諸毛孔閉塞水氣不
調身體浮腫氣滿喘麤土氣不調四肢不舉言無音聲火去身
冷風止氣絕水竭則無血土散則身裂然愚醫不思脈道反
其病使藏中金木水火土相剋切如火盛燃重加其油
凡四氣合德四神安和一氣不調百病發生四神動作四
同時俱發又云一百一病不治自愈一百一病須治而愈
病難治難愈一百一病真死不治
仲景曰欲療諸病當先以湯蕩除五藏六腑開通諸脈治陰
中破邪潤澤枯朽悅人皮膚益人氣力水能淨萬物故用湯也
若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣濕痺表裏移
走居無常處散當平之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸

堅癥進飲食調和榮衛能熟合而行之者可謂上工故曰意者醫
也又曰不須汗而強汗者出其津液枯竭而死須汗而不汗者使
諸毛孔閉塞令人悶絕而死又須下而不與下者使人心內脹滿
煩亂浮腫而死不須下而強下者開腸洞泄不禁而死又不須
而強與灸者令人火邪入腹干錯五藏重加其煩而死須灸
而不灸之者令人冷結重凝久而彌固氣上衝心無地消散病
死黃帝曰願聞淫邪泮衍奈何岐伯曰正邪從外襲內而未
舍也又淫於藏與榮衛俱行俱與魂魄飛揚使人臥不得
喜夢氣淫於腑則有餘於外不足於內氣淫於藏則有餘於內不
足於外陰氣盛則夢涉江河大水而恐懼陽氣盛則夢見蹈大火
而燔灼陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墮甚飽則夢
與甚飢則夢取肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣飛揚心氣
盛則夢喜笑恐畏脾氣盛則夢歌樂體重手不舉腎氣盛則夢腰
脊兩解不屬厥氣客於心則夢見丘山煙火客於肺則夢飛見金

靜嘉堂文庫所藏

鐵之器奇物客於肝則夢見山林樹木客於脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨客於腎則夢見臨淵没居水客膀胱則夢見遊行客於胃則夢見飲食客於大腸則夢見田野客於小腸則夢見聚邑街衢客於膽則夢見鬪訟自刺客於陰則夢見接內客於頭則夢斬首客於跨則夢見行走而不能進前及地渠穽中居客於股則夢禮節拜跪客於胞則夢溲便書診候者亦可深思此意乃盡

史記曰病六不治驕恣不論治一也輕身重財二也衣食三也陰陽并藏氣不定四也形羸不能服藥五也信巫不六也生候已見形色未改病未入腠理針藥及時能將調節以良醫病無不愈

處方第五

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼注蠱毒以蠱毒藥癰腫瘡瘤以瘡瘤藥風濕以風濕藥各隨其所宜當公云藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒温亦異重熟膩酢鹹藥石并飲食等於風病為治餘病非對輕冷甘苦澁藥草石飲食等於熱病為治餘病非對輕熱辛苦淡藥飲食等於冷病為治餘病非對其大綱略顯其源流自餘觀此可知臨事制宜當識斯要

夫虛生百病積者五藏之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多以舊方不改增損虛而勞者其藥萬端宜應隨增減古之善者自審採藥料其早晚必具其早則藥氣未成如其晚也則者自審採藥料其早晚必具其早則藥氣未成如其晚也則勢已歇今人為醫則不然也又不知冷熱消息多少共相拌和以為藥徒有療病之名永無愈之實將不惑哉聊復審其冷熱託增損之主耳虛勞而苦頭痛復熱加枸杞姜雜虛而欲吐加人參虛而不安定亦加人參虛而多夢紛紜加菖蒲骨虛多熱加地黃牡礪地黃子虛而冷加當歸苦蔕乾薑虛而損加鍾乳辣刺肉蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯苓伏神遠志虛而驚悸不安加龍齒紫石小草冷則用紫石小草若客

靜嘉堂文庫所藏

熱即用沙參龍齒不冷不熱無用之虛而口乾加麥門冬知母虛
而吸吸加胡麻覆盆栢實虛而多氣兼微欬加五味大棗虛而身
強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛
而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮黃耆虛而冷用隴西黃
耆虛而痰復有氣用生薑半夏枳殼虛而尿利加桑螵蛸龍骨雞
肶胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而溺白加厚朴諸藥無有歷
體冷熱的相主對聊叙增損之一隅夫處方者宜準此

用藥第六

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不人
欲輕身益氣不老延年者本上經
中藥一百二十種為臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜
遏病補虛羸者本中經
下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除
寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經三品合三百六十五種法三百
六十五度度應一日以成歲倍有其數合七百三十名
也藥有君臣佐使以相宣攝合和者宜用一君二臣五佐又可一
君三臣九佐也又有陰陽配合子母兄弟根葉花實草石骨
肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有
者有相殺者凡此七情合和之時用意視之當用相須相
良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺不爾勿
也又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒
陰乾曝乾採治時月生熟土地所出真偽陳新並各有法
其相使相畏七情列之如左處方之日宜善究之

玉石上部

玉泉 畏款冬花　玉屑 惡鹿角　丹砂 惡慈石 畏鹹水　曾青 畏菟絲子
石膽 水英為使 畏牡桂菌桂芫花辛夷白微　鍾乳 蛇床為使 惡牡丹玄石牡蒙 畏紫石英蘘草

靜嘉堂文庫所藏

雲母澤瀉為使畏鮀甲及流水　朴消畏麥句薑　消石火為使惡苦參苦菜畏女菀
芒消石韋為使惡麥句薑　白礬甘草為使惡牡蠣　滑石石韋為使惡曾青
紫石英長石為使畏扁青附子不欲蛇甲黃連麥句薑　白石英惡鬼臼　赤石脂惡大黃畏芫花
黃石脂曾青為使惡細辛畏蜚蠊　白石脂燕糞為使惡松脂畏黃芩　太一餘粮杜仲為使畏鐵落菖蒲貝母

玉石中部

水銀畏慈石　殷孽惡防己畏朮　孔公孽木蘭為使惡細辛
陽起石桑螵蛸為使惡澤瀉菌音郡桂雷丸蛇蛻皮畏兔絲子　凝水石畏地榆解巴豆毒
石膏雞子為使惡莽草鬼臼　慈石柴胡為使畏黃石脂惡牡丹莽草殺鐵毒
玄石惡松脂柏子仁菌桂　理石滑石為使畏麻黃

玉石下部

青琅玕得水銀良畏雞骨殺錫毒　礜石得火良棘針為使惡虎掌毒公鶩屎細辛畏水　特生礜石得火良畏水
方解石惡巴豆　代赭畏天雄　大鹽漏蘆為使

草藥上部

六芝薯蕷為使得髮良惡常山畏扁青茵陳　天門冬垣衣地黃為使畏曾青
麥門冬地黃車前為使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘　朮防風地榆為使　女萎萎蕤畏鹵鹹
乾地黃得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑　菖蒲秦艽秦皮為使惡地膽麻黃
遠志得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤　甘草朮乾漆苦參為使惡遠志反甘遂大戟芫花海藻
人參茯苓為使惡溲疏反藜蘆　石斛陸英為使惡凝水石巴豆畏白殭蠶雷丸　牛膝惡[illegible]陸英畏[illegible]
澤瀉畏海蛤文蛤　薯蕷紫芝為使惡甘遂　菊花朮枸杞根桑根白皮為使
細辛曾青棗根為使惡狼毒山茱萸黃耆畏滑石消石反藜蘆　獨活蠡實為使　柴胡半夏為使惡皂莢畏女菀藜蘆
菴蕳子荊子薏苡人為使　菥蓂子得荊子細辛良惡乾薑苦參　龍膽貫眾為使惡防葵地黃
菟絲子宜丸不宜煮得酒良薯蕷松脂為使惡雚菌　巴戟覆盆子為使惡朝生雷丸丹參
蒺藜子烏頭為使　防風惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒　絡石杜仲牡丹為使惡鐵落畏菖蒲貝母
黃連黃芩龍骨理石為使惡菊花芫花玄參白鮮畏款冬勝烏頭巴豆毒　沙參惡防己反藜蘆

靜嘉堂文庫所藏

丹參畏鹹水反藜蘆 天名精垣衣為使 決明子蓍實為使惡大麻子 芎藭白芷為使
續斷地黃為使惡雷丸 黃耆惡龜甲 杜若得辛夷細辛良惡柴胡前胡 蛇牀子惡牡丹巴豆貝母
茜根畏鼠姑 蜚蠊得烏頭良惡麻黃 薇銜得秦皮良 五味子蓯蓉為使惡萎蕤勝烏頭

草藥中部

當歸惡蔄茹畏菖蒲海藻牡蒙 秦艽菖蒲為使 黃芩山茱萸龍骨為使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆
芍藥雷丸為使惡石斛芒消畏消石鱉甲小薊反藜蘆 乾薑秦椒為使惡黃連黃芩天鼠糞殺半夏莨菪毒
麻黃厚朴為使惡辛夷石韋 槀本惡蔄茹 貝母厚朴白薇為使惡桃花畏秦艽礜石莽草反烏頭
菰𤬪枸杞為使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭 葛根殺野葛巴豆百藥毒 玄參惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆
苦參玄參為使惡貝母漏蘆菟絲子反藜蘆 前胡半夏為使惡皂莢畏藜蘆 石龍芮大戟為使畏蛇蛻吳茱萸
石韋滑石杏人為使得菖蒲良 狗脊萆薢為使惡敗醬 萆薢薏苡為使畏葵根大黃柴胡牡蠣前胡
蘧麥蘘草牡丹為使惡桑螵蛸 白芷當歸為使惡旋復花 紫菀款冬為使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯
白鮮皮惡桑螵蛸桔梗茯苓萆薢 白薇惡黃耆乾薑乾漆大棗山茱萸 紫參畏辛夷

仙靈脾薯蕷為使 款冬花杏人為使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青葙
牡丹畏菟絲子 漢防己殷孽為使惡細辛畏萆薢殺雄黃毒 女菀畏鹵鹹
澤蘭防己為使 地榆得髮良惡麥門冬 海藻反甘草

草藥下部

大黃黃芩為使 桔梗節皮為使畏白及龍膽龍眼 甘遂瓜蔕為使惡遠志反甘草
葶藶榆皮為使得酒良惡殭蠶石龍芮 芫花決明為使反甘草 澤漆小豆為使惡薯蕷
大戟反甘草 鈎吻半夏為使惡黃芩 藜蘆黃連為使反細辛芍藥五參惡大黃
烏頭烏喙莽草為使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆 天雄遠志為使惡腐婢
附子地膽為使惡蜈蚣畏防風甘草黃耆人參烏韭大豆 貫眾雚菌為使
半夏射干為使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭 虎掌蜀漆為使畏莽草
蜀漆栝樓為使惡貫眾 常山畏玉札 狼牙蕪荑為使惡棗肌莽草
白斂代赭為使反烏頭 白及紫石英為使惡理石李核人杏人 雚菌得酒良畏雞子 蔄茹甘草為使惡麥門冬

靜嘉堂文庫所藏

藎草 畏鼠婦 夏枯草 土瓜為使 狼毒 大豆為使惡麥句薑 鬼臼 畏垣衣

木藥上部

茯苓茯神 馬蘭為使惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲 柏子人 牡蠣桂心瓜子為使畏菊花羊蹄諸石麪麴

杜仲 惡蛇蛻玄參 乾漆 半夏為使畏雞子 蔓荊子 惡烏頭石膏

五加皮 遠志為使畏蛇皮玄參 黃蘗 惡乾漆 辛夷 芎藭為使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環

酸棗人 惡防巳 槐子 景天為使 牡荊實 防風為使惡石膏

木藥中部

厚朴 乾薑為使惡澤瀉寒水石消石 山茱萸 蓼實為使惡桔梗防風防巳

吳茱萸 蓼實為使惡丹參消石白堊畏紫石英 秦皮 大戟為使惡吳茱萸 占斯 解狼毒毒

梔子 解躑躅毒 桑根白皮 續斷桂心麻子為使 秦椒 惡栝樓防葵畏雌黃

木藥下部

黃環 鳶尾為使惡茯苓防巳 石南 五加皮為使 巴豆 芫花為使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆殺斑猫毒

蜀椒 杏人為使畏款冬 欒華 決明為使 雷丸 荔實厚朴為使惡葛根

溲疏 漏蘆為使 皂莢 柏子為使惡麥門冬畏空青人參苦參

獸上部

龍骨 得人參牛黃良畏石膏 龍角 畏乾漆蜀椒理石 牛黃 人參為使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝

白膠 得火良畏大黃 阿膠 得火良畏大黃

獸中部

犀角 松脂為使惡雚菌雷丸 羖羊角 兔絲子為使 鹿茸 麻 鹿角 杜仲為使

獸下部

麋脂 畏大黃

蟲魚上部

蠟蜜 惡芫花齊蛤 蜂子 畏黃芩芍藥牡蠣 牡蠣 貝母為使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷

桑螵蛸 得龍骨療洩精畏旋覆花 海蛤 蜀漆為使畏狗膽甘遂芫花 龜甲 惡沙參蜚蠊

靜嘉堂文庫所藏

蟲魚中部

伏翼 莧實雲實為使 蝟皮 得酒良畏桔梗麥門冬 蚱蜢 惡硫黃班猫蕪荑 露蜂房 惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣 䗪蟲 畏皁莢菖蒲 蠐螬 蜚蠊為使惡附子 鼈甲 惡礬石 鮀魚甲 蜀漆為使畏狗膽甘遂芫花

烏賊魚骨 惡白斂白薇 蟹 殺莨菪毒漆毒 天鼠糞 惡白斂白薇

蟲魚下部

蛇蛻 畏磁石及酒 蜣蜋 畏羊角石膏 班猫 馬刀為使畏巴豆丹參空青惡膚青 地膽 惡甘草 馬刀 得水良

果上部

大棗 殺烏頭毒

果下部

杏人 得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏蘘草

菜上部

冬葵子 黃芩為使

菜中部

葱實 解藜蘆毒

米上部

麻蕡麻子 畏牡蠣白薇惡茯苓

米中部

大豆及黃卷 惡五參龍膽得前胡烏喙杏人牡蠣良殺烏頭毒 大麥 食蜜

右一百九十九種有相制使其餘皆無故不備錄

或曰古人用藥至少分兩亦輕差病極多觀君處方非不煩重分兩多而差病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中生養經久氣味真實百姓少欲稟氣中和感病輕微易為醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以為醫病輕藥須少痾重用藥即多此則醫之一隅何足怪也又古之醫者自解採取陰乾曝乾皆悉如法用藥必依土地所宜治十得九今之醫者但診脉處方不知採藥時節至於出處土地虛實皆不委

靜嘉堂文庫所藏

所以治十不能愈五六者宜古於此天廚方常須如意重復用藥
藥乃有力若學古人依自誤可將來學者須熟詳之。凡紫石
白石光明映徹色理雖靜為住不然令人身體乾燥發惡熱口乾
而死凡草石藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾治病又愈古秤唯
有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十
六兩為一斤此則神農之稱今人二兩為一兩晴人以三兩為一
兩今依四分為一兩稱為定方有云分等者正是一斤兩多少皆同
等耳。凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準梧桐子大也方
寸匕者正方一寸抄散取不落為度錢五匕者今五銖錢邊五字
者以抄亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一
合以藥外分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩以外平之藥
外方作上徑一寸下徑六分深八分內散勿按抑之正爾微動令
平調耳今人分藥亦復用此
凡丸藥有云細如麻者即胡麻也如黍粟者亦然以十六黍
為一大豆也如麻子者則今大麻子準三細麻也如胡豆者今青
班豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒如大小以三
大麻準之如大豆者以二小豆準之如梧桐子者以二大豆準之
一方寸匕散蜜和得梧子十九為定如彈丸及雞子黃者以十梧
子準之。凡方云巴豆若干枚者粒有大小當去心皮竟乃秤之
以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮竟乃以半兩準一枚
拟實若干枚者去穰竟以一分準十二枚橘皮一分準三枚棗有大
小以三枚準一兩云乾薑一兩為正凡方云半夏一升
者煮洗竟秤五兩為正椒一升者三兩為正葉黃一升者五兩
為正云甘子一升者其子各有虛實輕重不可通以稱準取平外
為正兎絲子一升九兩菴蕳子一升亦九兩蜘蛛子一升三兩半
地膚子一升四兩此其不同也凡方云桂一尺者削去皮了重半
兩甘草一尺者重二兩凡方云某草一斤不重三兩一把者重二兩
凡云蜜一斤者有七合猪膏一斤二合　問曰凡和合湯

靜嘉堂文庫所藏

藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何荅曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須洗煉炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方修鍊事𥪡治削極令淨潔然後入分合秤兩勿得參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相使若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸草石強弱相欺入人腹中不能治病更相鬭諍草石相反使人迷亂力甚刀劒若調和得所雖未能治病猶安利五藏於病[illegible]所增劇翔曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆脚注之今方則然於此篇具條之更不煩方下別注○凡橘皮吳茱萸椒等入湯不㕮咀凡礬石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之凡諸藥子仁皆去尖頭去皮及雙仁者仍切之○凡枳殼厚朴甘草及諸毛羽齒牙蹄甲鼈龜鯪鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙皂莢炙去皮子凡烏梅皆去核入丸散熬之

大棗擘去核凡用麥蘖麴末大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微炒○凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之○凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥唯赤者凡石蟹皆以碎搥極打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝石斛等入湯酒擘碎用之○凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉暖酒漬經一宿漉出曝微乾擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須臾微乾悉盡極易碎○凡斑猫等諸蟲皆去足翅微炙用桑螵蛸破炙牡蠣熬令黃○凡石南茵芋藜蘆皆去頭微炙乃入藥○凡生麥門冬生薑入湯皆切三擣三絞取汁湯成去滓下之煮五六沸依如升數不可用藥煮之一法薄切用石韋辛夷去毛凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤○凡諸湯用酒者皆臨熟下之茱萸去木朴消礬石燒令汁盡乃入梔子去皮○凡用銀屑以水銀和成泥○凡用乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊須令極細○凡麻黃去節先

靜嘉堂文庫所藏

別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不尒令人煩寸
斬之小草瞿麥五分斬之細辛白前三分斬之膏中細剉也
凡湯中用完物擘破乾棗梔子栝蔞子之類是也用細核之物
亦打碎山茱萸五味子蕤核决明子之類是也細花子物正以完
用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麦豆輩亦完用之
芒消飴糖阿膠皆須絞湯竟內汁中更上火兩三沸烊盡乃服
凡用鬼箭削取羽皮椒去實微熬令汁出則有勢力。凡湯丸
散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰炮令微坼削去黑皮乃秤
之唯薑附湯及膏酒中生用亦削去皮乃秤直理破作七八片
凡半夏熱湯洗去滑一云十洗四破乃秤以入湯若膏酒丸散
皆煻灰炮之。凡散丸用膠先炙使通體沸起燥乃可擣有不
沸處皆炙之斷下湯直用之勿炙。凡丸中用蠟烊投少蜜中攪
調以和藥用熟艾先細擘合諸藥擣令細散不可篩者內散
和之。凡用蜜先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞掠
之多少隨蜜精麤遂至大稠於丸弥佳。凡巴豆熬紫色桃杏
人葶藶胡麻諸有脂膏藥皆熬黃黑別擣令如膏脂攪視泯
泯尒乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散乃復都以輕絹簁
之須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中亦有熬之者雖生用
並擣破。凡用桂厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟取裏
有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹麥門冬巴戟天遠志野葛
等皆搥破去心紫菀洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草
石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛蜀
椒去閉口者及目。凡狼毒枳殼橘皮半夏麻黃吳茱萸皆
欲得陳久者其餘唯須精新

藥藏貯擬宜法

論曰存不忘亡安不忘危大聖之至教求民之瘼恤民之隱賢人
之用心所以神農鳩集百藥黃帝纂錄鍼經皆備預之常道也
且人疴瘵多起倉卒不与人期一朝嬰已豈遑知救想諸好事者

靜嘉堂文庫所藏

可立藥藏用備不虞所謂起心雖微所救唯廣

論曰見諸世祿之家有善養馬者尚貯馬藥數十斤不見養家口者有貯人藥一錙銖以此類之極可愧矣傷人乎不問馬此言安用哉至如人或有公私使命行邁邊隅地既不毛藥物焉出忽逢瘴癘素不資貯無以救療遂拱手待斃以致夭殁者斯爲職當豈是枉横何者既不能深心以自衛一朝至此何歎惜之晚哉故置藥藏法以防危殆云尔

石藥灰土藥根藥莖藥葉藥花藥子藥齒牙骨角蹄甲皮毛尿屎等藥酥乳酪醍醐石蜜沙糖米糖酒醋膠麴蘗等藥

右件藥依時採收藏

秤斗升合杵臼絹羅紗羅馬尾羅刀砧玉槌瓷鉢大小銅銚

右合藥所須極須預貯

凡藥皆不欲數數曬曝多見風日氣力即薄歇無用宜熟知之

諸藥未即用者候天大晴列日曝之令大乾以新瓦瓮貯之泥頭密封須用開取即急封之勿令中風濕雖經年亦如新也其丸散以瓷器貯蠟封之勿泄則三十年不壞諸杏人及子等藥瓦器貯之則鼠不能得之也凡貯藥法皆須去地四尺則土濕之氣不中之也

合和法第七

凡煮湯當取井花水極令淨絜升斗分量勿使多少煮之調和候火用心一如鍊法也藥有宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得違越其不宜湯酒者列之如左

朱砂熟入 雌黃 雲母 陽起石 礬石入酒 流黃

鍾乳入酒 孔公孽入酒 礜石 銀屑 白堊

銅鏡鼻 胡粉 鉛丹 鹵鹹 石灰入酒

右石類

野葛 狼毒 毒公 鬼臼 莽草 蒴藋入酒

巴豆 躑躅 皁莢 雚菌 藜蘆 蔄茹

静嘉堂文庫所藏

貫衆入酒　蕪荑　雷丸　狼牙　鳶尾　蒺梨
女苑　枲耳　紫威　微銜　白及　牡蒙
蜚蠊　蛇銜　占斯　辛夷　石南入酒　練實
虎杖入酒單煮　虎掌　蓄根　羊桃　麻勃　苦瓠
瓜蒂　陟釐　狼跋子　雲實　槐子　地膚子
蛇床子　青葙子　茺蔚子　王不留行　菥蓂子
右草木之類
蜂子　蜜蠟　白馬莖　狗陰　雀卵　雞子
雄鵲　伏翼　鼠姑　樗雞　螢火　蠮螉
殭蠶　蜈蚣　蜥蜴　斑猫　芫青　亭長
地膽　虻蟲　蜚蠊　螻蛄　馬刀　赭魁
蝦蟇　蝟皮　生鼠　生龜　蝸牛
諸鳥獸蟲魚膏髓膽血屎溺
右蟲獸之類

凡丸散先細切曝燥乃擣之有各擣者有合擣者隨方所言其潤濕如天門冬乾地黃皆先切之獨擣令偏碎更出細擘曝乾值陰雨微火烘之既燥小停冷乃擣之。凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤為正其酒湯者不須如此。凡篩丸藥用重密絹篩令細於蜜丸易熟若篩草藥用輕疎絹於酒服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥者。凡篩丸散竟皆更合於臼中以杵研者治數百過視色理和同為佳。凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調并新綿別裹內中其雄黃朱砂細末如粉。凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以為準然則利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽濁紙覆令密溫湯勿令鎗器中有水氣於熟湯上煮令暖亦好服湯寧令小沸熱易下冷即嘔涌凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以為進

靜嘉堂文庫所藏

退增減之不必悉依方說○凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之
乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒尽
也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可散服凡建中腎瀝諸補湯滓
合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先
暴令燥也○凡合膏初以苦酒漬令淹不用多汁密覆勿泄云晬
時周時也從今旦至明旦亦有止一宿煮膏當三上三下以泄其
熱勢令藥味得出上之使匝匝沸乃下之取沸靜良久乃止寧
欲小小生其中有薤白者以兩頭微焦黃為候有白芷附子者
亦令小黃色也豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布
若是可服之膏膏滓亦堪酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以
傅病上此盖貧野人欲尽其力也○凡膏中有雄黃朱砂輩皆別
擣細研如麵須絞膏竟乃投中以物疾攪至于凝強勿使沈聚
在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦尔○凡擣
藥法燒香灑掃淨潔不得雜語當使童子擣之細熟杵數可

至千万杵過多為佳和合已訖置於佛前擎上啓告十方三寶藥
王藥上耆婆醫王喻附扁鵲一心求請呪願具述本心所有神
助八方生氣咸充四體當以四時王相日造所求皆得攘災滅惡
病者得差死者更生表針內藥与之令服可謂千金之藥內消
無量之病如此不得者命也○凡合腎氣薯蕷及諸大補五石
大麝香丸金牙散大酒煎膏等合時煎時並勿令婦人小兒產
母喪孝痼疾六根不具足人及雞犬六畜等見之凶其續命湯麻
黃等諸小湯不在禁限比来田野下里家因市得藥隨便市上雇
人擣合非止諸不如法至於石斛等難擣之藥費人功力作
者悉尽盜棄之又為塵埃穢氣入藥中羅篩麤惡隨風飄
揚眾口嘗之眾鼻齅之藥之精氣一切都尽与朽木不殊又復
服餌不能尽如法服尽之後反加虛損遂謗醫者處方不効夫
如此者非醫之咎宜熟思之也

服餌法第八

靜嘉堂文庫所藏

若毒藥治病先起黍粟不病去即止不去倍之不去十之取去為度病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜鷄鳴而在夜病在胃脘已上者先食後服藥病在心腹已下者先服藥後食凡服瀉湯欲得稍熱服之即易消下不吐若冷則吐嘔不下若太熱即破人咽喉務在用意湯必須澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里又再服若大促數前湯未消後湯未衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散死乃可進服凡服湯法大約皆分為三服取三升煮後承病人穀氣強進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即甚安穩所以病人於後氣力漸微故須湯漸少凡服補湯欲得服三升半旦三夜一中間間食良則氣澈灌 已脉易得藥力若如此則大大須緩不得速急也又須左右衛護後卧各一食頃即湯勢偏行腹中又於室中行百二百步許一日勿出外太益凡服湯三日常忌酒湯忌酒故也 凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不尒令人無力更益虛羸。凡丸藥皆如梧子補者十丸為始從一服漸加不過四十九過亦損人云一日再度服欲得引日多時不關藥氣漸漬熏蒸五藏積久為佳不必頓服早尽為善徒棄名藥獲益甚少。凡人四十以下有病可服瀉藥不甚須服補藥必有所損不在此限四十以上則不可服瀉湯藥五十以上四時勿闕補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二十八卷具之素問曰實即瀉之虛即補之不虛不實以經取之此其大經也必有藏腑積聚無問少長須瀉則瀉必有虛損無問少長須補即補必意重而用之。凡服瀉藥雞蟲等藥皆填胸雞魚脯油等至老。凡服瀉藥不過以利為度慎勿過多令人下利無度大損人也。凡諸惡若差後皆百日慎口不尒即發發也。凡服酒藥欲得使酒氣相接無得漸絕絕則不得藥力多少皆以知為度不可令至醉吐則大損人也凡服藥皆新生冷酢滑臭雞油麪蕨其大補丸散填陳臭。半

靜嘉堂文庫所藏

夏忌羊血常山桂忌生葱桔梗黃連忌猪血朱砂巳忌血食椶子
人忌麪油細辛忌生菜○凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟
熟即消易與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜於
藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得苦心用力及房室喜怒是以
治病用藥力者為首若在食治將息節慎節慎之至可以長生當具愈病而已
凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先与一口冷醋飯
須臾乃進食為佳○凡人忽遇風發身心煩惡或不能言有如此
者當服大小續命湯及西州續命排風越婢等湯於無風處密
室之中夜四五服勿計劑數多少亦勿慮盡常使頭面手足膜
膜汗不絕佳服湯消即食粥粥消即服湯亦得少與羊肉臛將
補若風大重者相續五日夜服湯不絕即經二日停湯以羹臛
自補將息四體若小差當即停藥漸漸將息如其不差當更湯
改之以差為度○凡患風服湯非得大汗其風不去所以諸風方
中皆有麻黃至如西州續命即用八兩越婢六兩大小續命或
用一兩三兩四兩故知非汗不差所以治風非密室不得輒護
服湯藥徒自悞耳雖更加增未見損減者矣

孫真人千金方卷第



靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


134
24
4 9

靜嘉堂文庫所藏

求子方 轉女爲男　妊娠有病　養胎易產

妊身有病心腰痛　難產

逆生　　胞衣不出下乳

子死腹中

求子方第一

論曰夫婦人所以別有方者以其血氣未調胎姙產生崩傷之異故也所以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十五歲已上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿顏月水去流前後交互疾無得凝中道斷絕其中傷墮不可具論生則三藏虛實交錯惡血內漏氣脉損竭或飲水充度損傷非一或寒濕未能而合陰陽或值利於慰則之正風從下入便成十二固疾若是四時節氣為病虛實參差執為患害故與丈夫同也惟懷胎姙孕即挾病者避其毒藥耳所以婦人別立方也其雜病与丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜欲多於丈夫感病

靜嘉堂文庫所藏

則倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所
以為病根深療之難差故養生之家特須教子女學此三卷婦人
方令其精曉即於倉卒之際竟何憂畏也夫四德者女子立身之
樞機産育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免其夭
横者哉故傳母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防
不虞也

論曰人之情性皆頗賢已而疾不及人至於學問則隨性逐物墮
於實業詎肯專一推求至理莫不虚棄光陰沒齒無益婚姻養育
者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事
之日昏爾若愚是則徒頗賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢
已之趣而妄徇虛聲以終无用今具述求子之法以貽後嗣同志
之志或可覽焉夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德
合并本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行
相尅及与刑殺衝破并在休廢墓中生者則求子了不可得慎无
措意縱或得者於後必有所妨若至相生并遇福德者仍須依法
如方避乎禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣

禁忌法

凡欲令兒子吉良者交會之日常避丙丁日及弦望晦朔大風大
雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日
月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖瘂聾聵頑愚癲
狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月大光星辰之下神廟
佛寺之中井竈圊厠之側塚墓屍柩之旁皆悉不可夫婦交會如
法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合
家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎
中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長
家國滅亡夫禍福之徵有如影響此乃必然之理何不思之

男女受胎時日法

凡男女受胎法皆以女人經絶後一日三日五日為男仍遇月宿

貴宿日又以夜半後生氣時為精子皆男必主壽而賢明高爵也
以經後二日四日六日為精者有子皆妖過六日皆不成子又遇
王相日尤吉

推王相日法　秋庚辛　冬壬癸
春甲乙　夏丙丁

推貴宿日法

正月	一六	九十	十二	十四	二十一	二十四					
二月	四七	八十	十一	十三	十九	二十二	二十七				
三月	二五	六七	八十	十七	二十	二十五					
四月	三四	五六	八十	十五	十八	二十三	二十八				
五月	一二	三十	十二	十五	二十	二十五	二十八				
六月	一三	十二	十八	二十三	二十六	二十七	二十八	二十九			
七月	一十	十六	二十	二十五	二十六	二十七	二十九				
八月	五	八十	十三	二十二	二十三	二十四	二十八				

九月	三六	十一	十六	十九	二十一	二十二	二十四				
十月	一四	九十	十四	十七	十八	十九	二十	二十二	二十九		
十一月	一六	十二	十四	十五	十六	十七	十九	二十六	二十九		
十二月	四九	十三	十四	十七	二十四						

若春合甲寅乙卯
秋合庚申辛酉
巳上日宿合者尤佳
夏合壬子癸亥
冬合壬子癸亥

凡人無子為夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所致故有絕嗣之
狀治之法男服七子散女服紫石門冬丸及坐藥湯盥胞湯無
不有子

七子散療丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子　杜衡子　車前子　菲薢子
石斛　署預　乾地黃　杜仲　鹿茸
遠志去心　附子炮　蛇床子　肉蓯蓉　山茱萸

靜嘉堂文庫所藏

天雄　人參　茯苓　黃芪　牛膝　已上各
桂心　十分　戟天　附　薤白　八分　鍾乳　貳兩

右二十四味為末酒服方寸匕日三不知增至二匕以知為度
禁如常法不能酒者蜜和丸服亦得行房法依素女經月水
斷一日後為男二日為女以外无子每日
日午前每夜夜半後陽時為男丁精欲得去玉門入半寸不
爾過一宮一方加覆盆子八分

二朴消盟胞湯

治婦人立身已來全不產及斷續久不產三十年者方

朴消　牡丹　當歸　大黃　桃人去皮尖各參兩
細辛三兩　厚朴炙　桔梗　芍藥赤　人參
茯苓　桂心　甘草　牛膝　橘皮已上各貳兩
蚱蟲微炒　水蛭六十枚炙　附子一兩半炮

右件十八味以清酒五升水六合煮取三升分四服日三夜

一每相去三辰少時更服如常覆被少時取汗汗不出冬月
著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有
此惡物冷然或天陰腹下痛或月水不調為有冷血不受胎若
斟酌下盡氣力弱大困六堪更服亦可三服即止如大悶不
堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力
若能忍服盡大好一日後仍著導藥

三療全不產及斷續服前朴消湯後者坐導藥方

艮炙　山茱萸　當歸已上各一兩　細辛　五味子
乾薑各三　大黃　礬石燒　戎鹽醋　蜀椒汗兩
右十味擣篩以乾絹袋盛大如指長三寸盛藥令滿內婦人
陰中坐卧任意勿行走小便時去之更安新者一日一度必病
下青黃汁出二日中便止即可幸御自有子未見病出亦可至
十日安之此藥為服朴消恐一不去冷惡物不出盡以導藥
之值天陰不爽不瀉者導藥亦有著鹽為導藥亦得然不如

靜嘉堂文庫所藏

此藥真服朴消湯後即安道要經一日外服紫石門冬丸

紫石門冬丸方

紫石英七日研之得上降陽熱　天門冬酌三　當歸　苦參
紫威　卷柏　桂心　烏賊　乾地黃
牡蒙　禹餘粮　石斛　辛夷分八　人參
桑寄生　續斷　細辛　厚朴　乾薑
石茱萸　牡丹　牛膝洛五　栝人分四　署預
烏賊骨　甘草洛六分炙

右二十六味蜜丸酒服如梧桐子大十九三日漸增至三十九以腹中熱為度不禁房室夫行不在忌可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠

療婦人令有子白微丸

白微　細辛　防風　人參　秦椒
白斂　桂心　牛膝　秦膠　蕪荑

沙參　芍藥　蠐螬洛四分　乾漆　栝子人
乾薑　卷柏　附子　苦鼓洛四分五味子
白堊蚕　牡丹洛四分　鍾乳　乾地黃　白石英洛八分
紫石英　桃人洛六分　鼠婦五分　水蛭　蚕蛾洛五十個

吳茱萸洛三分　麻布叩幔頭盡尺燒

右三十二味蜜丸酒服十五丸如梧子大日再稍加至三十丸若有所去小覺有異即停

論曰古者求子多用麥雲散承澤丸今代人絕不用此雖未試驗其法可重故述之

六麥雲散主丈夫陽氣不足不能施化無成方

覆盆子　五味子洛一兩　天雄炮一兩　石斛　白朮酌三
桑寄生　天門冬九兩　兎絲子洗　紫石英烝兩

右九味為散酒服方寸匕先食日三素不加冷者去寄生加細辛曰兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十五枚

承澤丸婦人下焦三十六疾不孕絶產方

梅核人 辛荑人各一升 葛上亭長七枚去足翅熬 澤蘭子五合

溲疏 藁本各一兩

右六味蜜和先食服如大豆二丸日三不知稍增若腹中無堅積聚者去亭長加通草一兩味甘者和藥先以苦酒溲散乃內蜜也酒服

大黃丸主帶下百病無子服藥十四日下血二十四日下長蟲及清黃汁出三十日病除五十日肥白

大黃破如米豆熬令黑 柴胡熬令黑 朴消熬令沸止上各一升 芎藭五兩

乾薑切一升 蜀椒去目汗二兩 茯苓如雞子大一枚

右七味蜜丸如梧子大先食服七丸米飲下加至十丸以知為度五日微下

消石大黃丸療十二瘕及婦人帶下絶產無子并服寒食藥而腹中瘕癖當先服大黃丸下之乃服寒食藥耳大黃丸見下

藥不下水穀但下病耳不令人虛極

消石六兩 大黃一斤八兩 人參 甘草炙各四兩

右件四味皆異擣篩以三年好苦酒三升置銅器中以竹筯拄器中一升作刻三升刻三以置火上先內大黃使微沸盡刻三乃內餘藥盡刻三有餘刻三極微火使可丸乃令如雞子中黃欲合藥當先齋戒一宿勿令小兒婦女奴婢見之欲服者二丸若不能服大丸者可分作小丸可不過四丸大不欲令細能不分為善人羸者可少食人強者不須食酒半日乃下若婦人服之下者或如雞肝或如米汁正黑赤或半升或三升下後慎風寒作一杯粥食之然後作羹臛自養食如產婦六月則有子禁生冷魚猪肉辛菜若寒食藥者自如藥法不與此同日一服

療月水不利閉塞絶產十八年服此藥二十八日有子金城太守白薇丸方

白薇五兩 人參 杜衡 牡蒙各三分 牛膝二分 細辛五兩

靜嘉堂文庫所藏

厚朴　半夏各三分　沙參貳分　乾薑貳分　白殭蚕三分　秦膠貳分
蜀椒六分　當歸三分　附子六分　防風六分　紫苑三分
右件一十七味蜜和丸先食飲服梧子大三丸不知稍增至四五
此藥不長服特覺有姙則止用大驗
療無子或斷續上執下冷皆治之方
紫石英五分　澤蘭　太一禹餘粮各八分一白微三分一
當歸四分　赤石脂八分　白芷六分　萇蒿四分　藁本
石膏　菴蕳子　卷栢五分　蛇牀四分　桂心十分
細辛十六分　覆盆子　桃仁各六分　乾地黄　乾薑
椒各三分　車前子三分　蒲黄十分　人參六分　白龍骨
遠志皮　麥門冬去心　茯苓各八分　橘皮貳分
右三十八味蜜和酒服十五丸如梧子大日再漸增以知為度
六可至五十丸愼猪雞生冷酢滑魚蒜馬驢肉等覺有娠即
停三月正禪食時可食肝及心至四月五月不須不可故殺令

子短壽遇得者大良
療婦人絕產生來未產盪沐腑藏使玉門受子精奏方
秦椒　天雄各參分　玄參　人參　白斂
鼠婦　白芷　苗耆　桔梗　露蜂房
白殭蚕　桃仁　蠐螬熬　白微　細辛
茵蕪各四分　牡蒙　沙參　防風　甘草
牡丹皮　牛膝　卷栢　五味子　芍藥
桂心　大黄　石斛　木各伍分　梔子仁
茯苓　當歸　乾薑各六分　澤蘭　乾地黄
芎藭各七分　乾漆　白石英　紫石英　附子各八分
鍾乳十分　水蛭七十枚　蚕蟲伯枚　麻布門幔頭七寸燒
右四十四味蜜丸酒服十九如梧子日再稍加至二十九若有
所去如豆汁鼻衄此是病出竟有異則停
求子灸法

靜嘉堂文庫所藏

婦人絶子灸然谷五十壯在内踝前直下一寸婦人絶嗣不生胞
門塞灸關元三十壯報之
婦人姙子不成若墮落腹痛胞見赤灸胞門五十壯在關元左
邊二寸是也右邊二寸名子戶
婦人絶嗣不生灸氣門穴在關元旁三寸灸百壯
婦人子藏閉塞不受精疼灸胞門五十壯
婦人絶嗣不生漏赤白灸泉門十壯報穴在橫骨當陰上際

療婦人始覺有娠養胎并轉女為男丹參丸
　轉女為男
丹參　續斷　芍藥　白膠　朮
栢子仁八分　人參　芎藭　乾薑伍分　當歸
橘皮　吳茱萸七分　白芷　冠纓四分　蕪荑各三分
乾地黃六分　甘草八分　犬卵乾一具　東門上雄雞頭一枚
右十九味蜜丸酒服十丸日再稍加至二十丸

又方　取弓弦一枚絳囊盛帶婦人左臂
又方　取雄黃一兩絳囊盛帶之
又方　取原蠶屎一枚井花水服之日三

婦人有胎候惡阻方第二

凡姙娠欲知有娠無娠及男女法脉平而虛者乳子法尺中脉
按之不絶法有娠
姙娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女左右俱疾為生二子
又法　左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實生二男
俱浮大生二女　又尺左大為男右大為女　又左右俱浮生二
男不爾女作男生俱浮為二女不爾男作女生
又法　左尺浮大者男右尺沉細者女
凡婦人虛羸血氣不足腎氣弱或當風取涼太過心下有淡水
者欲有胎喜病阻何謂欲有胎其人月水尚來顏色肌膚如常而
沉重憒悶不用食飲不知患所在脉理順時平和則是欲有娠如

靜嘉堂文庫所藏

此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憒々頭重眼眩四肢沉重惡墮不欲執作亞聞食氣欲嘔喜酸果實多卧少起世謂惡食甚至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也覺如前候者便宜服半夏茯苓湯散數劑後將茯苓丸淡水消除便飲食也既得食力體強氣盛力足養胎母便健矣方說如左

半夏茯苓湯療妊娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩四肢百節疼煩沉重多卧少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏伍分　茯苓　乾地黃三兩　橘皮　細辛
人參　芍藥　旋復花　芎藭　桔梗
甘草二兩　生薑伍兩

右十二味以水一斗煮取三升分三服若病阻積日月不得治及服藥冷熱失候病變多熱煩渴口生瘡者除橘皮細辛用前胡知母各二兩若變冬十一月者除乾地黃用桂心二兩若食少胃中虛生熱大行閉塞小便赤少者宜加大黃三兩除地黃加黃芩一兩依方服一劑得下後消息看氣力冷熱更加增損方調定更加服一劑湯便氣將茯苓丸能令食便強健

茯苓丸療妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢熱苦自勝持服之即効要先服半夏茯苓湯兩劑後可服丸藥

茯苓　人參　桂心　乾薑　半夏
橘皮各壹兩　白朮　葛根肉　甘草　枳實各貳兩

右十味蜜丸如梧子飲服二十丸漸加至三十丸日三療妊娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹　橘皮各三兩　茯苓　生薑各四兩　半夏伍兩

右五味切以水二升煮取二升半分三服不差頻作厚朴瞋　橘皮　竹茹　人參　木略各三　生薑　肆兩

靜嘉堂文庫所藏

右六味以水七升煮取二升半分三服不差重作

養胎方第三

論曰舊說凡受胎三月逐物化稟未定故姙娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜欲庶事清淨生子皆長壽忠孝仁義聰惠無疾斯蓋文王胎教也

姙娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

姙娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

姙娠食雀肉并豆醬令子滿面多䵟

姙娠食兎肉犬肉令子無音聲并缺脣

姙娠食椹并鴨子令子倒出

姙娠食雀肉飲酒令子心婬情亂不畏羞恥

姙娠勿向非常之地大小便必半產殺人

姙娠勿食羊肝令子多厄

姙娠勿食鼈令子項短

姙娠勿食鴨子并犬肉令子無音聲

若曾傷一月胎者當預服補筋湯

細辛一兩 乾地黃 白朮各三兩 生薑四兩 大麥

吳茱萸各五合 烏梅一升 防風二兩

右八味以水七升煮取二升半分三服寒多者倍細辛茱萸若渴者去細辛加括蔞二兩若有所思去大麥加柏子人三合

姙娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是爲始藏

姙娠二月足少陽脉養不可針灸其經足少陽內屬於膽當護驚動

姙娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾葉湯主之

靜嘉堂文庫所藏

丹參　當歸　麻黃　艾葉各貳兩　人參
阿膠各參兩　甘草四分　生薑壹兩　大棗拾貳枚
右九味以三升酒水一升內藥煮減半去滓內膠煎取三
升分三服
若曾傷二月胎者預服黃連湯
黃連　人參各四兩　吳茱萸伍合　生薑參兩　生地黃伍兩
右五味酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一作若覺
不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳
妊娠三月手心主脉養不可針灸其經手心主內屬於心無悲哀
思慮驚動
妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚
恐憂愁瞋恚頓仆動於經脈腹滿遶臍苦痛或腰背痛卒有所下
湯方　甘草　人參　茯苓　阿膠各貳兩　黃芩四分
朮壹兩　麥門冬伍合　芍藥四兩　大棗十二枚　生薑壹兩

右一十味以水一斗煮取五升內清酒三升并膠煎取三升
分三服許當溫卧
若曾傷三月胎者當預服茯神湯
茯苓參兩　伏神　丹參　龍骨各壹兩　阿膠
當歸　甘草　人參各參兩　赤小豆貳拾壹箇　大棗貳拾壹箇
右一十味酢漿一斗煮取三升分四服七日復服一劑腰背痛者
加桑寄生二兩
妊娠四月始受水精以成血脉其食宜稻秔其羹宜魚鴈是謂盛血
氣以通耳目而行經絡
妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經手少陽內輸三焦靜形
體和心志節飲食
妊娠四月為離經有寒心下溫溫欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便
難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身
脊腹痛往來有時胎上迫胸煩不得安卒有所下菊花湯

靜嘉堂文庫所藏

菊花如雞子大一枚 麥門冬一升 麻黃 阿膠各三兩 人參一兩
甘草 當歸各二兩 生薑五兩 半夏四兩 大棗十二枚
右一十味以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升
分三服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日
若曾傷四月胎者當預服調中湯
白芍藥四兩 續斷 芎藭 甘草各一兩 朮
柴胡各三兩 當歸一兩半 烏梅一升 生薑四兩 厚朴
枳實 生李根白皮各三兩
右十二味以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日後復服
一劑
妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚其衣
裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五
味是謂養氣以定五藏
妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸於脾無大飢
無甚飽無食乾燥毋自炙熱無大勞倦
妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿小便數
卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆有所下
旋復湯主之
阿膠四兩 人參一兩 麥門冬一升 吳茱萸七合 生薑六兩
當歸 芍藥 甘草 黃芩 旋復花各二兩
右一十味清酒三升水九升煮減半內酒并膠微火煎取三升
半分四服日三夜一先食再服便愈不差再服
曾傷五月胎者當服安中湯
黃芩一兩 當歸 芎藭 人參
乾地黃 甘草 芍藥各三兩 生薑六兩
麥門冬一升 五味子五合 大棗三十五枚
右十一味以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一
七日服一劑

靜嘉堂文庫所藏

妊娠六月始受金精以成筋勞身無處出遊於野數觀走犬馬食鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂

妊娠六月足陽明脉養不可針灸其經足陽明內屬於胃調五味食甘和無大飽

妊娠六月卒動不安寒熱往來腹內滿身體腫驚怖有所下腹痛如欲產手足煩麥門冬湯

麥門冬壹升　人參　甘草　黃芩各貳兩　乾地黃叁兩

阿膠肆兩　生薑陸兩　大棗拾伍箇

右八味以水七升煮取減半內清酒二升并膠煎取三升分三服中間進糜粥

若曾傷六月胎者當預服調中湯

柴胡肆兩　朮　芍藥　甘草各貳兩　蓯蓉壹兩

芎藭貳兩　麥門冬叁兩　乾地黃伍兩　大棗叁拾箇　生薑陸兩

右十味以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進糜粥

食冷硬之物七日更服一劑

妊娠七月始受木精以成骨無使身勞動作屈伸自此以後居處必燥飲食避寒常食稻秔以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰內屬於肺無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛有所下手足厥冷若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頭項腰背強蔥白湯主之

蔥白長叁肆寸拾肆莖　半夏壹升　生薑捌兩　甘草

當歸　黃芪各叁兩　麥門冬壹升　阿膠肆兩

人參壹兩半　黃芩壹兩　旋覆花壹把

右十一味內三升清酒水八升煮減半內膠煎得四升服一升日三溫臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮復如前法天行時疫勿強出汗

若曾傷七月胎當預服杏仁湯

靜嘉堂文庫所藏

杏仁　甘草各貳兩　麥門冬一升　吳茱萸　鍾乳
乾薑各貳兩　五味子伍合　紫菀壹兩　粳米伍合
右九味以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七
日服一劑
妊娠八月始受土精以成膚革存心靜息無使氣極是謂密理
光澤顏色
妊娠八月手陽明脉養不可針灸其經手陽明屬於大腸無食
燥物無輒失食
妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常
苦頭眩痛繞臍下寒時時便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷而
痛目䀮䀮芍藥湯主之
厚朴　甘草　當歸　朮各參兩　芍藥
人參　生薑各四兩　薤白切壹升
右八味以水八升清酒四升合煮取三升分三服日再夜一服

曾傷八月胎者當預服葵子湯
葵子貳升　生薑陸兩　甘草貳兩　芍藥肆兩　朮
柴胡參兩　大棗貳拾箇　厚朴貳兩
右八味以水九升煮取三升分三服十日一劑
妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩
帶自持是謂養毛髮多才力
妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經足少陰內屬於腎無處
濕冷
妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側
短氣半夏湯
半夏　麥門冬各伍兩　吳茱萸　當歸
阿膠各壹兩　乾薑壹兩　大棗拾貳兩
右七味以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫分四
服痢即止

靜嘉堂文庫所藏

曾傷九月胎若當預服豬腎湯

猪腎壹具　朮四両　茯苓　桑寄生　乾薑

乾地黄　芎藭三両　麥門冬壹升　附子中者壹箇　大豆參合

右十味以水一斗煮腎令熟去腎内諸藥煎取三升半分

四服日三夜一十日一劑

易産方

治妊娠養胎令易産蒸大黄丸

大黄三両　枳實　芎藭　朮　杏仁各參分

芍藥　乾薑　厚朴各壹両　呉茱萸壹両

右十味末之蜜丸如梧桐子大酒服二丸日三不知稍加

養胎臨月服令易産丹參膏

丹參半斤　芎藭　當歸各參両　椒伍合有熱者以大麻仁伍合代

右四味細切清酒溲濕停一宿以見煎猪膏四升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓取如棗許内酒中服之不可逆

服至臨月乃可服舊用常驗

易産方

車前子壹升　阿膠捌両　滑石參両

右三味為散飲服方寸匕日再至生月乃服藥利九竅不可

先服

預服散方令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步動

作如故兒生墮地皆不自覺甘草散方

甘草八分炙　大豆黄卷　黄芩　乾薑　桂心

麻子仁　粳米　呉茱萸

右八味各擣篩酒服方寸匕日三

千金丸主養胎及産難顛倒胞不出服一丸傷毀不下産餘病

汗不出煩滿不止氣逆滿以酒服一丸良

甘草　貝母　秦椒　乾薑　桂心

黄芩　石斛　石膏　粳米　大豆黄卷各一分

静嘉堂文庫所蔵

搏　當歸各一兩　麻子叁合熬

右十二味下篩酒服如彈子大九日三用棗汁和丸

妊娠病方第四此篇有九章

胎動諸方第一五首

治妊娠三三月上至八月九月胎動不安腰痛已有所見方

艾葉　阿膠　芎藭　當歸各叁兩　甘草壹兩半

右五味以水八升煮取三升去滓內膠俏分三服日三服

治妊娠動胎去血腹痛方

芎藭　當歸　生地黃各叁兩　阿膠弐兩

右四味以水一斗半煮取二斤取六升去銀內餘藥煎取二升半分三服不差重作

治妊娠胎動不安腹痛葱白湯

葱白切弐斤　阿膠二兩　當歸　續斷

芎藭各叁兩　銀隨多少

右六味以水一斗先煮銀取七升去銀內諸藥煎取二升半分三服不差重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口禁唇搴及下重劑不息方

艾葉伍兩

一味以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升服口閉者灌之藥下即差

治妊娠六月胎動不安常處旋復花湯

旋復花　厚朴　术　生薑　半夏　茯苓　枳實炙略　黃芩　芍藥

右九味以水一斗煮取二升半分五服日三夜二

治妊娠下血如故名曰漏胞、乾便死方第二

生地黃半斤

一味清酒一斗煮三兩沸絞去滓服之无時能多服佳

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

靜嘉堂文庫所藏

乾地黃擣末以三指撮酒服不過三服

又方

右以清酒四合煮三四沸頓服之不止頓服

生地黃汁壹升

又方

乾地黃四兩 乾薑二兩

右二味擣下篩酒服一寸匕日再三服

治妊娠常苦煩悶此是子煩竹瀝湯方第三

竹瀝壹升 防風 黃芩 麥門冬各三兩 茯苓四兩

右五味以水四升合竹瀝煮取二升半分三服不差再作

又方

時時服竹瀝无多少

妊娠忽心腹痛方第四

治妊娠腹中痛方 生地黃參斤

擣絞取汁用酒壹升合煎減半頓服

又方

頓服一升蜜良

治妊娠心痛 青竹皮壹升

以酒二升煮三兩沸頓服之

又方

破生雞子一枚和酒服之

治妊娠腰痛

十五三升以酒二升煮取二升頓服之

治此胞落胎後腹痛

此壹非半

鹿角末壹兩

右二味水三升煮三沸去滓故入角攪和一服須臾下血

又方

文半斤酒四升煮取一升服之方佳

又方

麻子三升以水五升煮取汁五升分五服

又方

白榆皮三兩 敗二兩

右二味擣丸如梧桐子大飲服二十丸熟擣敗為丸

又方

燒牛棗焦末水服方寸匕日三服

又方

地黃汁八合酒五合煎分三服

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸方

靜嘉堂文庫所藏

鄭魚一枚燒末苦酒服三指撮覆取汗

治妊娠中蟲

燒一枚皮末酒服方寸匕酒吏自呼蟲主姓名

治妊娠心痛　青竹如一指大羊脂八兩　白蜜三兩

右二味合煎食頃服如棗核大三枚日三

又方　蜜一升和井底泥如心下

又方　燒棗二七枚末泉服之立愈

治妊娠中惡痛方

燒生雞子二枚破著杯中以糯米粉和茹粥頓服

又方　水三升洗夫鞋剔汁溫服

治妊娠脹滿　服秤錘酒良

治妊娠咳嗽　服車缸酒大長

治妊娠忽苦心痛腹脹

燒鹽令赤熱三指撮酒服之立差

治妊娠腹中脹滿又心中煩不得飲食方

芍藥　末各四兩　黃芩參兩

右三味水六升煮取二升半分三服此下水令生髮月飲一劑

為善

治妊娠傷寒頭痛支節痛壯熱方第五

石膏八兩　前胡　梔子人　知母各四兩

大青　黃芩各參兩　葱白一升

右七味以水七升煮取二升半分三服

治妊娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方

生薑根切一升　知母肆兩　青竹茹參　粳米伍合

右四味水六升煮取二升半稍飲盡更作差止

治服湯後頭痛壯熱不散宜用此拭湯

麻黃半斤　竹葉切一升　石膏末弍升

右三味水五升煮取一升冷用以拭身躰治故布以揄頭額

靜嘉堂文庫所藏

胷心燥則易之患瘧者加常山五兩

治婬娠傷寒方

葱白拾枝　生薑式兩切

右二味以水三升煮取二升頓服取汗

又方　鯽魚一頭燒作末酒服方寸匕令出汗

治婬娠遭時疾令子不落方

取竈中黃土水和涂臍方寸匕乾復涂之

又方　和酒涂之方五寸　又方　治清和塗之並佳

又方　大泉泥塗腹勿令乾

治婬娠熱病方　車轄脂酒服大良

又方　葱白　以水三升煮令熱服之取汗食葱令盡

又方　艾葉（如雞子大）以酒四升煮取二升分二服

又方　水服伏龍肝一雞子大

又方　井下泥泥心三寸立愈　又方青羊泉塗腹上

又方大熱煩悶者　葛根汁一升分二服如人行五里頃一服

又方　視寶燒水服方寸匕

又方　燒乾棗七枚去洹服

治婬娠患瘧湯方第六二首

常山二兩　甘草一兩　黃芩二兩　烏梅十四枚　石膏八兩

右五味以酒一斗半合漬藥一宿煮三四沸初服六合以後四合後服二合凡三服

又方　常山　竹葉各三　石膏八兩　粳米一伯粒

右四味水六升煮取二升半分二服第一服未發前一食久服之第二取臨欲發餘一服用以塗頭額及胷前五心藥燥置頭邊當一日勿近水及進飲食過發後乃進飲粥

治婬娠忽暴下血數升胎堕不動方第七

榆白皮　當歸各三　乾地黃四兩　葵子一升

右五味水五升煮取二升分再服不差更作服之甚良

靜嘉堂文庫所藏

治姙娠卒驚奔走或從高墮下暴去血數升馬通湯方

乾地黃四兩　當歸三兩　阿膠四兩　艾葉三兩　馬通汁一升

右五味以水五升合馬通汁煑取二升半去滓內膠令烊分三服不差重作

治姙娠二三月上至七月其人頓仆失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾湯方

阿膠　芎窮　芍藥　甘草各八　當歸

艾葉各三　乾地黃四兩

右七味以水五升好酒三升合煑取三升去滓內膠更上火令膠消盡分三服日三不差復作

治姙娠血不止方　丹參十二兩

一味清酒五升煑取三升溫服一升日三

治半產血不盡苦煩滿欲死方

香豉一升半

一味以水三升煑三沸漉去滓內成末鹿角一方寸匕頓服之須臾自下

治姙娠卒下血方

葵子一升

一味以水五升煑取二升分三服瘥

又方　生艾葉一斤

一味酒五升煑取二升分三服冬用莖

又方

燒秤鎚令赤內酒中沸定出吸之

又方　生地黃切一升

一味酒五升煑取二升分三服

治姙娠尿血方　黍穰燒灰酒服方寸匕日三

治姙娠僵仆失踞胎動轉上搶心甚者血從口出逆不得息或注下血一斗五升胎不出死則寒熨人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶反覆服藥每即得臥下血亦止其當產立生蟹爪湯方

蟹爪一升　甘草　桂心各二尺　阿膠二兩

右四味以東流水一斗煑取三升去滓內膠令烊盡能一服

靜嘉堂文庫所藏

佳不能者含填再服若困急不能飲者擘口灌之藥下便活也
與母俱生胎已死獨母活也若不僵仆平安任身無所見下血
服此湯即止或云桂不安胎亦未必爾

婦人無故尿血方
龍骨五兩 一味以為散酒服方寸匕空肚日三久者二十服愈

又方
鹿角屑 大豆黃卷 桂心各一兩
右三味為散酒服方寸匕日三服

婦人遺尿不知出時方
白薇 芍藥各一兩 二味為散酒服方寸匕日三

又方
胡燕巢中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

又方
礬石 牡蠣各二兩
二味為散酒服方寸匕亦治丈夫

又方
灸橫骨當陰門七壯

姙娠小便不利方
葵子壹升 榆白皮一把
二味水五升煑五沸服一升日三

又方
葵子 茯苓各一兩
二味為散水服方寸匕日三小便通利

治姙娠患子淋方
葵子一升 以水三升煑取二升分再服

又方
葵子根一把 以水三升煑取二升分再服

治姙娠小便不通方
蕪菁子七合 爲末和水服方寸匕日三服

治姙娠下痢方第八
酸石榴皮 黃芩 人參各三兩 榉皮四兩 粳米三合
右五味以水七升煑取二升半分三服

治姙娠患滯痢赤白魚腦因絞臍痛不可忍方

靜嘉堂文庫所藏

薤白物一　酸石榴皮三两　阿胶二两　黄蘗三两
地榆皮四两
右五味以水七升煮取二升半分三服不差更作
治妊娠下痢方
白楊皮一斤　以水一斗煮取二升分三服
又方
烧中衣带三寸大酒服
又方
羊脂苷子大十枚酒一升投中顿服之日三
治妊娠注下不止方
阿胶　艾叶　酸石榴皮各三两
右三味以水六升煮取二升去滓内胶令洋分三服
治妊娠及产已寒热下痢方
苗连一斤　梔子二十枚　黄蘗一斤
右三味以水五升渍一宿煮取二升分三服
若加榆皮二两生苗一两亦治丈夫常痢

治妊娠躰腫有水氣腹心急氣滿湯方第九
茯苓　术四两　黄芩三两　旋復花三两　杏仁三两
右五味以水六升煮取二升分三服
治妊娠漐大胎間有水氣生苗湯方
生鯉魚二頭重　术五两　茯苓四两
當歸各三　生薑五两　芍藥
右六味以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升内藥煎取三升
分作三服
治妊娠及男女生毒腫方
薤葉月根淨洗去皮
一味擣酢和如薄泥勿令有汁猛火煮令二沸適性薄腫帛
急裹之日再易寒時温服非根時用子若腫在咽中取汁含咽
之　又方　烧奉皮杂酢和傳上乾易之亦可服寸匕日三
治妊娠手脚皆腫攣急方

靜嘉堂文庫所藏

赤小豆五升　商陸根一斤

右二件水三升煮取一升常稍〻飲之盡更作

又方加澤瀉一斤

産難第五

論曰婦人産難是藏惡笑將痛之時及未産已産並不得令死喪汚穢家人来視之則生難若已産者則傷兒也婦人産乳忌反与月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著地則後人及浣濯皆以器盛過此忌月乃止

凡生産不依圖說有犯觸於後母子皆死若不允即母子俱病廢事皆不稱心若能依圖无犯觸母子即得无病子即易養

凡欲産時特忌多人瞻視唯得三又在傍待揔了訖乃可告語諸人也若人衆看之无不難耳

凡産婦第一不得怒〻忙迫傍人極須穩審人皆不得預緩預急憂〻悒〻則難産若腰痛眼中火生此兒迴轉未即生也

兒出訖一切人及母皆忌問是男女兒落地与新吸井水五咽忌与暖湯物也勿令母看視穢汚可服四順理中丸方

甘草炙　人參　白朮　乾薑各壹兩

右以味為散蜜和酒或飲煎如棗核大一丸稍增加至二十一丸

新生藏虛此所以養生藏穢食常識此飲食當如人飢

凡産婦慎熱食羹熱麪凡欲臨産時必先脫常所著衣以綿裹頭及二頭口令人交當陰易産神驗

治難産當針三宥井入一寸瀉之須臾即下

治難産取前已用草二七枝燒作灰水調服之

又方産難三日不出取男頭燒作灰井花水服

又方　生雞取槐子十四枚　蒲黃一合〻內酒中溫服須臾即生不生再服之

又方治産難及日月未至而故産者　母亭三兩

靜嘉堂文庫所藏

一味蜜丸如兎屎酒服一丸痛不止更服一丸
又生難或兒橫及側或手足先出以手持刀鋒刺兒手入二分及足得痛兒得痛驚即縮迴則順
又生難令夫唾婦口中二七過立出
又生難吞皁莢子二枚
治産難或半生或胎不下或子死腹中或著脊及坐草數日不産血氣上湯心母面无顏色氣欲絶方
成煎猪膏一升 白蜜一升 醇酒二升
右三味煎取二升半分再服不能隨所能服之
治難産方
槐白皮 瞿麦 通草各三兩 牛膝四兩 榆白皮 大麻人各一升
右六味以水九升煮取二升分三服
又方
生地黄汁半升 生薑汁半升
已上合煎熟頓服

又方 燒刀鐶以酒一杯沃之頓服即出
又方 車軸脂吞大豆許二丸
又方 燒藥杵令赤内酒中飲之
治産難子但趍穀道方 熬鹽熨之立産
治心悶法 産後心悶眼不得開即當頭頂上取髮如兩指大強牽之即眼開
又方 羖羊角壹枚燒作灰
下篩以東流水服方寸匕若不差須臾再服取悶差乃止
又方 羖羊角燒作灰 温酒服方寸匕不差須臾再服
又方 生赤豆杵為散東流水服方寸匕不差更服
治産乳運絶方 半夏壹兩
一味擣篩蜜丸如大豆内鼻孔中即愈
又方 神麴末水服方寸匕産訖如未再服之易産也
又方 含釅醋噀面即愈忽无悶則噀之愈

靜嘉堂文庫所藏

治動胎及産難子死腹中又姙兩兒死腹中一兒生腹中死者出生者安此方神驗萬不失一

蟹爪壹升　甘草貳尺　阿膠叁兩

右三味以東流水一斗先煑二物得三升内膠々洋頓服之不能分再服若人困絞口内藥即活作東向竈用葦薪煑之

治産子死腹中不出以牛糞塗腹上立出

治子死腹中

取竈下黄土三指撮以酒服之立出土當着兒頭上出来

又方

榆樹白皮切壹升　熟赤朱壹兩

右二味苦酒三升煑取一升頓服死兒立出

又方

服水銀三兩立出

又方

塩一合雞子一箇合和服之

又方

取夫尿二升煑令沸飲

又方

呑槐子二七枚

又方

酢二升拗口開灌之即出

治産子死腹中

瞿麥一斤以水一升煑取一升分再服不出再服

又方

葵子壹兩　阿膠伍兩

以水五升煑取二升頓服未出再煑服

治姙娠未死兒卒足不出其母欲死方

大豆一斗苦酒煑取三升服之死兒立出不能頓服再服

又方

醇酒一升燒秤鎚投中飲之即下

治姙娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背痛方

甘草壹尺　蒲黄貳合　筒桂肆寸　香豉貳升　雞子一枚

右五味水六升煑取一升頓服之胎胞穢悪盡去大良

産難死生候

母面赤舌青者兒死母活

静嘉堂文庫所藏

母唇青門口青口兩邊沫涕出者母子俱死
母面赤舌青沫出者母死兒活

逆生第七

治逆生以臨塗兒足底又可急搔爪之
又方　以拇撮塩著兒足下即順
又方　服梁上塵末飲服
又方　逆生及橫生不出手足先見燒蛇之皮末服一刀圭酒服
又方　取蝉殼二枚為末三指撮溫酒服
又方　取夫陰毛二七並燒以猪膏和如豆吞之兒手持免出

神驗

又方　蛇蛻皮燒灰猪膏和左東向飲服
又方　以手中央拇取金底黑麥畫兒足下即順生
又方　以三指撮伏龍肝酒服之十著兒頭生出
又方　取其父名書兒足下即順生

又方　治橫生及足先出取梁上塵三指撮服酒下
又方　蹤橫生不可出者用兎絲子酒若米汁服方寸匕即生
又方　車前子赤好服如上法
又方　水服禽鼠糞塵
又方　吞棁子二七枚

胞衣不出方第八

胞衣不出　取瓜瓣二七枚燒末酒服之立出良
治產難累日氣盡不能生此是病方
赤小豆弍升　以水九升煮令熟去滓內阿膠三兩豆汁中洋服五合不瘳更服不過再服即出
治逆生胞不出　取竈屋上墨酒服方寸匕良
治胞衣不出方　取小麥小豆　煮令濃飲其汁立出
治胞衣不出方　取水煮乞麻弦飲其汁五合即出
治胎死腹中方　醇酒一斗煮大豆一升取三升分三服亦

靜嘉堂文庫所藏

治胎死及胞衣不出積聚成癥者

又胞死若母病下之方

取榆白皮細切煮汁二升服即下難生亦佳

治產難胞衣不出兒死腹中欲絶方

半夏　白斂各貳兩

右二味治下篩酒服方寸匕小難一服橫生三服倒生三服兒死四服亦可代赭鼈爪各二兩為佳

治胞衣不出方

取宅中所埋柱掬出取故底當柱下土大如雞子酒和服之良

又方

耳雞子中黃以井花水和黃土服之立出

又方

取井中黃土丸如梧子吞之又治兒不出

又方

生男吞小豆七枚　女者十四枚即出

治子死腹中若衣不出欲上湯心方

急救讀室玉三升熬熱囊盛搗心下令胎衣得搶心忘食

治產兒胎衣不出令胞爛牛漆湯方

牛膝　瞿麥各肆兩　滑石搗兩　當歸三兩

通草陸兩　葵子壹升

右六味以水九升煮三升分三服

又方

牛膝半斤　葵子參升

以水三升煮取一升分再服

又方

取炊甑當戶前燒飲服之又服蒲黃如棗許者

又方

生地黃汁一升苦酒三合合暖服之三服亦得

又方

澤蘭葉陸兩　滑石屑伍合　生麻油求合

右三味以水一升半煮取七合去滓內油滑石頓服之

又方

末雹龍窠中土三指撮以水服之良

又方

取夫單衣蓋井上立出

又方

苦酒服真珠壹兩

靜嘉堂文庫所藏

治婦人乳无汁下鍾乳湯方
石鍾乳　白石脂各盡　通草斌分　生桔梗斌分　消石盡
右五味以水五升煮二沸三上三下餘一升去滓內消石令洋
服无多少若汁出不能乳大人嘲之
治婦人乳无汁漏盧湯方
漏盧　通草略搗　鍾乳肆分　黍米壹升
右四味米泔宿漬指撻取汁一升煮漏盧通草鍾乳黍米三沸去滓作飲飲之
日三
又方　石膏肆兩　以水二升煮三沸稍服一日令盡
又方　通草　石鍾乳
右二味等分麥粥服方寸匕日三後可兼養兩兒
勿取羊乳根色黃无益
又方治婦人下乳汁麥門冬散方
麥門於　鍾乳　通草　理石
右四味擣篩先食搪水服方寸匕日三
又方
麥門冬　通草　鍾乳　理石　土瓜根
乾棗　蟒蟓
右七味等分杵篩食竟用酒服方寸匕日三
又方治乳无汁方
鍾乳碎　甘草炙　漏盧盡　通草酌　栝蔞肆兩
右五味以水一斗煮取三升分三服一云用栝蔞實一枚
又方　豬蹄二具麁切以水三升煮孰炙搥碎　通草八兩細切
右以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作
右四味各等分治下篩先食酒服方寸匕日三
又方治婦人下乳汁漏盧散方
漏盧盡炙　鍾乳　栝蔞各伍　蟒蟓三分
右四味擣篩先食搪水服方寸匕日三
又方

靜嘉堂文庫所藏

又方　括蔞根切升酒四升煮三沸去滓分三服

又方　取括蔞子當青色大者一枚熟杵以白酒一升煮取四升去滓溫服一升日三黃色小者用二枚亦好

又方　鍾乳　通草各捌兩　括蔞　甘草各壹分　瓜蔞貳分　桂

右六味酒服方寸匕日三最驗

又方　瓜蔞　通草各捌兩　鍾乳肆分　秫米壹升

右四味漬米汁為末水淋之取汁煮藥飲汁

又方　鍾乳　瓜蔞略貳　右二味為散飲服方寸匕即下

又方　土瓜根飲服半錢匕日二服乳如流水

又方　猪肺一具以水二升煮熟以米篩瀝取汁飲之

又方　燒鯉魚頭末酒服三指撮

又方　燒死鼠酒服方寸匕日三立下

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏




134
24
4 9

靜嘉堂文庫所藏

虛損　煩悶　中風　心腹
惡露　下痢　小便　雜方

治產後虛損第一

凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之三甘在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病廣於嵩岱何則產之後病難治於餘病也婦人產訖五藏虛羸唯得將補不可輕瀉若其有病即須駃療若行駃轉更增虛弊中更虛向生路稍遠所以大凡婦人產後百日已來極須愼勤憂畏勿浪犯觸房事彌深若有所犯必身返強直如角弓反張名曰振風則是其犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之在微不脅戲笑作病一朝困卧控告無所忘財寶遍處求醫醫者亦未必解此縱得醫來大命已去何處追尋者於此一方大須精熟不得同於常方耳特忌上風則便利宜室中銅盆上佳凡產後薄百日

靜嘉堂文庫所藏

乃可行房不爾至死虛羸百病滋長慎之凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房也凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭充比至滿月充盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭充補服法必七日外不得早服也婦人因產取涼太多得風冷腹中積聚百病竟起迄至於老百方治不能差桃人煎主之出褥後服之婦人縱令無疾每至秋冬須服一兩劑以至年終恒將服之桃人煎治方

病婦人產後百疾諸氣方

右一味搗篩令細熟以上上酒一斗五升研三四百遍如作麥粥法以極細為佳內小長頸瓶中令滿密塞以麪封務取大寒內湯中煮一晬時不停火使瓶口常出在湯上勿令沒之熟訖出溫酒服一合日再服丈夫亦須服之

凡產婦未產前一月當黃釀地黃酒產訖褥中服之主治百病方

地黃汁壹升　好麴貳斤　好米貳升

右先以地黃汁漬麴令發進家法醞之熟封七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絕慎葱蒜生冷酢滑豬雞魚一切婦人皆須服之迄夏三月熟不可合春秋冬並得合服地黃并淳內米中炊合用之一石十五斗準一斛為率先服羊肉當歸湯三劑乃服之佳

羊肉湯治產後腹中心下切痛不食往來寒熱若中風之氣方

羊肉叁斤　當歸　黃芩　芎藭　甘草

防風已上各貳兩　芍藥叁兩　生薑肆兩

右八味以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥取三升分三服治產後虛羸喘之白汗出絞痛羊肉湯方

肥羊肉叁斤去脂　當歸叁兩　桂貳兩　芍藥肆兩

甘草貳兩　生薑肆兩　芎藭肆兩　乾地黃伍兩

右八味以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘藥煮取二升半

靜嘉堂文庫所藏

分三服不差重作

治產後虛羸喘之或一寒或一熱狀如瘧名為勞損猪腎湯方

猪腎一具去脂研先用羊腎代　香豉　白粳米　葱白各壹升切

右四味以水二斗煮取五升去滓任情服之不差更作

羊肉黃耆湯治產後虛之補益方

羊肉參斤　大棗拾枚擘　黃耆　伏苓　甘草

當歸　桂心　芍藥　麥門冬　乾地黃各壹兩

右十味以水二斗煮取一斗去肉內諸藥煎取三升分三服日三

鹿肉湯治產後虛勞損補之方

鹿肉肆斤　甘草　芎藭各參兩　人參

當歸各貳兩　黃芪　芍藥　麥門冬　茯苓各叁兩

半夏壹升　生地黃　大棗貳拾枚

右十三味以水二斗五升去肉內藥煎取三升分四服日三夜

治虛之五勞七傷虛損不足藏腑冷熱不調麝香骨湯方

麝香骨一具　遠志　黃芪　芍藥　乾薑

防風　茯苓　厚朴　當歸　橘皮

甘草　獨活　芎藭各肆兩　桂心

右十五味以水二斗煮麝香骨取一斗去滓內藥取三升分四服

當歸芍藥湯治產後虛患逆害飲食方

芍藥　人參　桂心　生薑　甘草各壹兩

大棗拾枚擘　當歸壹兩半　乾地黃貳兩

右八味以水七升煮取三升分三服日三

治產後虛氣杏人湯方

杏人　獨皮　白前　人參各叁兩　桂心肆兩

蘇葉壹升半夏洗壹升　生薑肆兩　麥門冬去心壹兩

右九味以水九升煮取一升半分三服

治產後上氣方厚朴湯治婦人貫氣積勞藏氣不足胸中煩燥

靜嘉堂文庫所藏

關元以下如懷五千錢狀

桂心　厚朴　當歸　細辛　芍藥
石膏碎各叁兩　甘草　黃芩　澤瀉碎貳兩　吳茱萸湯洗
桔梗叁兩　乾薑壹兩　乾地黃肆兩

右十三味以水一斗煮取三升分三服服三劑
產後虛煩悶方第二

雞白湯治產後胷中煩熱逆氣方

雞白　半夏　甘草　人參　知母貳兩
石膏碎，括蔞叁兩　麥門冬半升

右八味以水一斗三升煮取四升分五服日三夜二熱甚即加
石膏知母各一兩

竹根湯治虛煩方　竹根細切一斗五升

右一味以水二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗二十枚復
煮麥熟三四沸入甘草一兩麥門冬一升煮成服五合不差更
服取差短氣亦服之

人參湯治煩悶不安補方

人參　當歸　麥門冬　桂心　乾地黃碎壹兩
乾棗貳拾枚　生米壹升　淡竹葉叁把　芍藥壹兩

右九味以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內藥煮取
三升分三服湯若煩悶不安者當作破一升以水三升煮取
一升盡服之甚良

甘竹茹湯治內虛煩熱短氣方

甘竹茹　茯苓　甘草碎壹兩　黃芩　人參各壹分

右五味以水六升煮取二升分三服日三服

知母湯治產後下寒冷熱通連胷心煩悶方

知母　芍藥　黃芩碎貳兩　桂心　甘草各壹分

右五味以水五升煮取二升半分三服

竹葉湯治心悶不解方

靜嘉堂文庫所藏

麥門冬 壹兩 甘草 貳兩 生薑 茯苓 各參兩
乾棗 拾枚 生淡竹葉 壹把
右六味以水一斗煮麥門冬取八升內諸藥煮取三升
分三服若有人參可入一二兩若其人食少無穀氣者可入
粳米五合
淡竹茹湯治虛煩短氣欲死心中悶亂不解方
生淡竹茹 壹把 麥門冬 壹合 甘草 貳兩 小麥 壹合
生薑 如雞子大 大棗 擘 拾枚
右六味水八升煮竹如小麥減一升乃內諸藥煮取二升分二
服贏人分作三服若有人參入一兩若無參入茯苓二兩半亦
佳參苓皆治心悶心悸定精神一劑不差更作若氣逆者加半
夏二兩
赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方
赤小豆三七枚 右一味燒作屑篩以冷水和頓服之

治苦煩悶方 蒲黃 壹分
治婦人墮身血不盡去苦煩
香豉 壹升 鹿角屑 壹兩
右二味以水三升煮令三沸
漉出滓內鹿角屑攪令調頓服之須臾必下血
治產後中風方第三
甘草湯治在褥中風昔治不得動名曰風痙方
甘草 乾地黃 麥門冬 麻黃 各貳兩 苦蒿 壹兩
黃芩 括蔞根 各二兩 葛根 半斤
右九味以水一斗五升煮麻黃葛根取八升去滓內諸
藥煮取三升合煮葛根取八升去滓內諸
獨活湯治產後中風口噤不能言方
防己 壹兩 防風 秦艽 桂心 术 甘草
當歸 附子 各貳兩 葛根 獨活 生薑 各陸兩
右十一味水八升煮取三升分三服

靜嘉堂文庫所藏

雞糞酒主產後百病及男子一切諸中風神効方

雞糞壹升熬令黃
烏豆壹斗炒令絕煙

以清酒三升半先沐雞糞次沐豆取一升温服取汗病重者
日一服凡三四日令平復無不愈

凡產後角弓反張及諸風疾不得用毒藥唯宜單行一味二味
乃至不得大發汗時忌輒瀉吐利必死無疑大豆紫湯產後大善治
產後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身昏重或身痒
此皆因虛冷濕中風所為紫湯主之方在次下惡露篇中治產後
中風發熱面赤喘氣頭痛煩悶竹葉湯方

淡竹葉 葛根 防風 桔梗 甘草 各壹兩
人參貳兩 大附子壹枚炮去皮 生薑 大棗拾伍枚 桂心壹兩

右十味水一斗煮取二升半分三服日三夕使得汗若嘔者加
半夏二兩洗用

防風湯治產後中風昔急短氣方

當歸 芍藥 人參 甘草 乾薑 各壹兩
獨活 葛根 防風各任兩

右八味水九升煮取三升分三服日三
鹿肉湯治產後風虛頭痛壯熱言語時僻方

鹿肉叁斤 芍藥肆兩 半夏壹升洗 乾地黃貳兩 獨活叁兩
生薑陸兩 桂心 甘草貳兩 人參

伏神 阿膠 黃耆 各叁兩

右十四味水二斗煮肉得一斗三升去肉內藥取三升內膠令
洋分四服日三夜

治產後中風獨活酒方

獨活叁兩 桂心叁兩 秦艽伍兩

右三味以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能隨性
大豆湯主婦人產後卒中風發疾倒不知人及婦身俠風喎治在草
褥諸病皆主之

靜嘉堂文庫所藏

大豆伍升炒令煙絕　葛根　獨活各捌兩　防已陸兩

右四味以酒一斗二升煮豆取八升去滓內藥煮取四升分六服日四夜二

五石湯主產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘈瘲眩冒不和人及濕痺緩弱身體痙妊娠百病方

白石英　鍾乳　赤石脂　石膏　牡蠣熬　人參

黃芩　白朮　甘草　栝蔞　芎藭　桂心

防已　當歸　乾薑各壹兩　紫石英　獨活各參兩　葛根四兩

右十八味水一斗四升煮取三升半分五服日三夜二又一方有滑石寒水石各二兩棗二十枚

產後七傷虛損少氣不足并主腎勞寒冷補益氣乳蜜湯方

乳牛者柒升　白蜜壹升半　當歸　人參　獨活各參兩

棗貳拾枚　甘草　桂心各貳兩

右八味以乳蜜中煮取三升分四服

產後絕虛冷七傷時寒熱體痛乏協勞補腎并治百病五石湯方

紫石英　鍾乳　白石英　赤石脂　石膏

茯苓　白朮　桂心　芎藭　甘草各參兩

薤白陸兩　人參壹兩　當歸伍兩　生薑捌兩　大棗貳拾枚

右十五味五石並末之水一斗二升煮取三升六合分六服中風加葛根獨活各二兩下痢加龍骨

三石湯主病如前

紫石英　生薑　當歸　人參　甘草各貳兩　鍾乳

白石英　茯苓　乾地黃　桂心各參　半夏伍兩　大棗拾伍枚

右十二味以水一斗二升煮取三升分四服風加葛根四兩

治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱皆自發露所為頭痛與小柴胡湯頭不痛但煩熱與三物黃芩湯方

黃芩　苦參各貳兩　乾地黃肆兩

右三味以水八升煮取二升適寒溫服一升日二多吐下蟲

靜嘉堂文庫所藏

治産後[illegible]中風[illegible]見鬼此病中風内絶虚所為甘草湯

通草 [illegible] 甘草 各[illegible] 羊肉 三斤

右四味以水一斗六升煮羊肉取一斗去肉内藥煮取六升分為五

服日三夜二

四石湯所主對與前同方

紫石英 白石英 各二兩 石膏 赤石脂 各三兩 獨活

[illegible] 葛根 各四兩 桂心 芎藭 甘草

芍藥 黄芩 各[illegible]兩

右十二味以水一斗二升煮取三升半入分五服日三夜二

羊肉湯主産後中風久絶不産月水不利乍赤乍白及男子虚勞

冷盛方

羊肉 [illegible] 成擇大蒜 去皮切三升 香豉 三升

右三味以水一斗三升煮取五升去滓内酥一升更煮取三

升分三服溫卧

葛根湯治婦人産後中風口噤痙痺氣息迫急眩冒困頓并

治産婦諸疾方

葛根 生薑 各六兩 獨活 四兩 當歸 三兩 甘草 桂心

伏苓 石膏 人參 术 芎藭 防風 各二兩

右十二味切以水一斗二升煮取三升半分六服日三

治産後中風防風酒方

防風 獨活 各一斤 女萎 桂 各二兩 茵芋 一兩 石斛 五兩

右六味以酒二斗漬三宿初服一合稍加至三四合日三

治産後中風木防已膏方

木防已 半斤 茵芋 五兩

右二味以苦酒一升漬一宿猪膏四升煎取三上三下成膏炙手

摩千遍

伏[illegible]治[illegible]心驚悸或恚意不定恍恍惚惚言語

錯謬心虚[illegible]方

人參 茯苓三兩 茯神四兩 芍藥 甘草

當歸 桂心各二兩 生薑八兩 棗參拾枚

右十味以水一斗煮取三升三服日三甚良

遠志湯治産後忽苦心中驚悸不定志意不安言語錯誤惚惚

憒憒不自覺方

遠志去皮 人參 甘草 芎藭 桂心

麥門冬 芍藥各三兩 伏苓五兩 生薑陸兩 大棗貳拾枚

右十味以水一斗煮取三升分三服日三羸者分四服産後得

此是心虚所致無當歸用芎藭若其人心胷中逆氣用半

夏三兩洗入

伏苓湯治産後暴苦心悸不定言語謬錯恍恍惚惚心中憒憒此

皆心虚所致方與前方同

伏苓五兩 甘草 芍藥 桂心各三兩 生薑陸兩

當歸二兩 麥門冬壹升 大棗參拾枚

右八味以水一斗煮取三升分三服日三若苦心不定加人參

三兩 亦可內遠志二兩 若苦煩悶短氣者加生竹葉一升先以水

一斗三升煮竹葉取一斗內藥無當歸用芎藭若有風加獨

活三兩用水一斗五升加桂心二兩若頸項苦急背膊強者加獨活

葛根二兩 麻黃 桂心各三兩 生薑八兩用水一斗半煮取三升半

分四服日三夜一

又方

遠志八兩 甘草各二兩 人參 伏神 當歸

芍藥各三兩 麥門冬壹升去心 大棗參拾枚

右八味以水一斗煮取三升分三服日三若有苦虛煩短氣者

加生淡竹葉一升水二升煮竹葉取一升內藥若胷中少氣者

加甘草二兩三服差

治婦人汗血吐血下血竹皮湯方

竹皮一升 乾地黃四兩 人參一兩半 芍藥 桔梗

芎藭三分 甘草二分 當歸 桂心各壹兩

靜嘉堂文庫所藏

右九味以水一斗煮取三升分三服
治産後虛羸盜汗時時惡寒吳茱萸湯方
吳茱萸 如鷄子大
右一味以酒三升漬半日煮如魚目沸
減得二升所中分頓服一升日再間飲
治産後躰虛寒熱白汗出猪膏煎方
猪膏一升 生薑汁 白蜜 各壹升
右四味煎令調和五上五下成膏隨意以酒服方寸匕
蜀漆湯治産後虛熱往來心胷中煩滿骨節疼痛壯熱晡時輒
甚又如微瘧方
黄耆 酒五 蜀漆葉 桂 甘草 各壹兩
知母 芍藥 各二 生地黄 壹斤
右七味以水七升煮取二升半分三服湯治寒熱不傷損人極良
神効
芍藥湯治産後虛熱頭痛方

白芍藥 乾地黄 牡蠣 各五 桂心 各兩
右四味以水五升煮取二升半分三服日三此湯不傷損人無
毒亦治腹虫急痛苦通身發熱更加黄芩二兩此熱即除
蜀椒湯治産後心腹痛方第四
蜀椒二合 芍藥 當歸 半夏 桂心
人參 各二兩 生薑汁 各壹合
右九味以水九升煮椒令沸絞後內諸藥煮取二升半去滓
內薑汁又煎取三升服五合漸至六合盡勿令飲食
大黄蜜湯治産後心痛方
乾地黄 當歸 獨活 甘草 芍藥
桂心 細辛 小草 各二兩 吳茱萸二升 乾薑 各兩
右十味以水九升煮取二升內蜜五合重煮分三服日三
乾地黄湯治兩胷滿百病方

靜嘉堂文庫所藏

乾地黃　芍藥各參兩　當歸　蒲黃各二兩　生薑伍兩
桂心陸兩　甘草壹兩　大棗貳拾枚
右八味以水一斗煑取二升半分三服日三
治產後苦少腹痛芍藥湯方
芍藥陸兩　桂參兩　甘草貳兩　膠飴八兩　生薑四兩　大棗拾箇
右六味以水七升煑取四升去滓內飴消三兩沸分三服日三
當歸湯治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方
當歸二兩　生薑五兩　一方用芍藥貳兩
右三味以羊肉一斤以水八升煑取三升適寒溫頓服七合日三
羊肉湯治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風方
伏苓　黃耆　乾薑各參兩　甘草　獨活　桂心　人參各貳兩
肥羊肉三斤新死羊肉或用獐鹿肉　麥門冬柒合　生地黃五兩　大棗拾貳枚
右十一味以水三斗煑肉取一斗去滓入藥煑取三升半分四服日三夜一

羊肉杜仲湯治產後腰痛咳嗽方
羊肉四斤　杜仲　紫菀各參兩　五味子　細辛　款冬　人參
厚朴　芎藭　附子　萆薢　甘草　黃耆各二兩
當歸　桂　術各參兩　生薑八兩　棗參拾枚
右十八味以水二斗半煑肉取汁一斗三升去肉內藥煎取三升分三服日三
羊肉生地黃湯方理產後三日補中益藏氣消血方
桂心　當歸　甘草　芎　人參各貳兩　芍藥參兩
生地黃切壹升　羊肉參斤
右八味以水二斗煑肉取一斗去肉內藥煎取三升分四服日三夜一
內補當歸湯達中治產後虛羸不足腹中疞痛不止吸吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五劑為善令人力壯方
當歸肆兩　芍藥五兩　甘草二兩　生薑陸兩　桂參兩　棗拾捌枚

靜嘉堂文庫所藏

右六味以水一斗煮取三升分三服一日令盡若大虛內餘
六兩作湯成內之於火上煎令消若無生薑乾薑代三兩若其
人去血過多時崩傷內竭不止加地黃六兩阿膠三兩合八種
作湯或去滓內阿膠若先嘗歸芎藭代之
內補地黃湯治婦人產後虛之氣血竭絕精神恍惚腹中時痛
不能下食方

乾地黃人參 附子 當歸酌 黃耆 桂心 杜仲
五味子 細辛 芎藭 芍藥 茯苓 茸薤 乾薑各壹兩

右十二味以水一斗煮取四升去滓分四服日三夜一若因下血
困極加阿膠二兩餉糖四兩內湯中煎令膠洋餉消分作五服
日三夜二滓服若乾支之酒服方寸匕或服一刀圭大良
內補芎藭湯治婦人產後虛羸交崩傷過多虛竭腹中痛方

芎藭 乾地黃 當歸 芍藥 桂心
兩 兩 兩 兩 兩

甘草 乾薑 乾薑各壹兩

右七味以水一斗二升煮取三升分三服大麥復作至三劑若
有寒若微下加附子三兩正治婦人虛羸七傷絕嗇腹中拘急
痛崩傷虛竭面目無色吸唾吐血甚良
大補中當歸湯治產後虛不足腹中拘急斷絕或漏血小腹若
痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服之方

當歸 續斷 桂心 芎藭
麥門冬 芍藥 乾薑
甘草 白芷 吳茱萸 乾地黃
右十二味以酒五升漬藥一宿明旦以水四升合煮取三升去
滓分三服日三止可益水一升得更入黃耆二兩為痙
茱萸酒治腹中疼痛方

吳茱萸壹升

右一味以酒三升漬一宿煎取半升頓服亦再服
桂酒方治產後疼痛又辛心腹痛方

桂心 右一味以酒三升煮取二升分三服日三

靜嘉堂文庫所藏

生牛膝酒治產後腹中苦痛方

生牛膝根 五兩

右一味以酒五升煮取二升分二服乾牛膝根以酒漬之一宿然可煮也

吳茱萸湯治先有寒冷嘗飲痛或心腹痛或嘔吐食少或腫生後益劇或下痢氣息綿綿欲絶方皆治之

吳茱萸 二兩 防風 桔梗 乾薑 甘草 各一兩 當歸 乾地黃 各二兩 細辛 一兩

右八味以水四升煮取二升半分再服

蒲黃湯治產後餘疾腹中少氣腹痛餘血未盡除腹中滿欲死方

蒲黃 五兩 桂心 芎藭 各三兩 芒消 二分 生薑 生地黃 各伍兩 桃仁 貳拾枚 大棗 拾伍箇

右八味以水九升煮取二升半去滓內芒消分三服日三

敗醬湯治產後疾痛引腰腹如錐刀所刺方

敗醬 三兩 桂心 芎藭 各半兩 當歸 壹兩

右四味以清酒二升水四升微火煮取二升適寒溫服七合分三服食前服之

芎藭湯治產後腹痛方

芎藭 甘草 各八分 當歸 桂心 各叁分 蒲黃 芍藥 各陸分 大黃 貳兩 桃人 前胡 各四分 生地黃 切一升

右十二味以水一斗酒二升合煮取三升分四服日三夜一

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活 當歸 甘草 各二兩 桂心 芍藥 生薑 各叁兩 大棗 貳拾箇

右七味以水八升煮取二升分三服日三服之相去行十里芍藥黃耆湯治產後止痛方

芍藥 四兩 黃耆 白芷 桂心 生薑 各二兩 乾地黃 甘草 各一兩 伏苓 三兩 棗 拾枚 人參 芎藭 當歸 乾薑 各五分

右十二味以酒水各五升合煮取三升食前分三服

靜嘉堂文庫所藏

產後中風及餘百疾方

獨活八兩　當歸四兩

右二味切中分取藥以水八升煮取四升日三夜一取微汗上氣加桂心二兩不差更作服

產後百病理血氣并中風痙痱痛背強口噤但煩熱苦渴頭身皆重劇者喘逆此皆因風冷濕及婬傷胃大豆紫湯

大豆四升　清酒捌升

右以二味鐵鐺炒熬焦烟出以酒沃之去滓服一斗日夜數回服之盡更合獨活湯所以爾者產後多虛著風以獨活消風去血也重者十劑

產後百病并中風痙口噤不開并諸病理血氣痛勞補腎獨活紫湯方　獨活壹斤

大豆壹斗　酒壹斗叁升

右三味先以酒漬一宿若急須微火煮之令減二升去滓別敖大豆極熟使青煙出以獨活酒洗大豆即去豆服一升日三夜再

又方　獨活八兩　葛根陸兩　甘草二兩　生薑陸兩

右四味以水九升煮取三升分四服

產後卒中風發疾口噤牽掣閉不知人又治緩急諸風毒悍身脉痙強并俠胎中風婦人百病四石湯

紫石英　白石英　黃芩　芎藭　獨活陸兩　葛根陸兩　甘草　石膏　赤石脂各叁兩　桂心壹兩　生薑陸兩

右十二味以水一斗二升煮取三升半分為五服日三夜再

治產後惡露不盡除諸疾補不足乾地黃湯方

乾地黃三兩　芎藭　桂心　黃耆　當歸各二兩　人參　防風　伏苓　細辛　芍藥　甘草各壹兩

右十一味水九升煮取三升分三服日再夜一

桃人湯治產後往來寒熱惡露不盡方

桃人伍兩　茱萸貳升　黃耆　當歸

靜嘉堂文庫所藏

芍藥 酪叁兩　生薑 八兩　醍醐 八兩 百鍊酥

右七味以酒一斗水一升合煮取三升適寒温先食服一升日三

澤蘭湯治未產及產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛引腰脊

少氣力方

澤蘭　當歸 酪貳　甘草 炙　生地黃 二兩　芍藥 一兩半　生薑 叁兩

右七味以水九升煮取三升分三服日三漸有欲死服亦差

治產乳餘血不盡逆搶心胷中手足逆冷唇乾腹脹湯方

甘草 炙　芍藥　桂心 酪叁　大黃 肆兩

右四味以東流水一斗煮取三升去滓細剉膠三兩投湯中攪

令洋分三服一服入腹中面即有色一日一夜盡此三升即下

腹中惡血多少立差當養如新產者

治產後惡露不盡大黃湯方

大黃　當歸　甘草　生薑

右七味以水一斗煮取四升分四服一日令盡

治產後來往寒熱惡露不盡柴胡湯方

柴胡 八兩　桃仁 伍拾個　當歸　黃耆　芍藥 各叁兩

生薑 八兩　牡丹皮 三兩　吳茱萸 壹升

右八味以水一斗煮取四升分四服一日令盡

蒲黃湯治產後餘疾有積血不去腹大短氣不得食上衝胷脇時

時煩悶逆滿主定痛疫胃中結熱方

大黃　甘草 黃芩 各叁兩　蒲黃 肆　棗 叁拾枚

右六味切以水三升煮取一升清朝服云百中下若不止進冷

粥半升即止若不下與少熱飲自下人羸者半

治產後餘疾惡露不除血氣結搏心腹疼痛銅鏡鼻湯方

銅鏡鼻 拾八銖　大黃 拾兩　乾地黃　芍藥　芎

乾漆　芒消 各二兩

靜嘉堂文庫所藏

右件以水七升煮取二升一合去滓內髮灰分三服
又方或作治遁尸心腹痛并主三十六尸疾小銅鏡鼻方
銅鏡鼻綿裹燒大黃　甘草　黃芩
芒消　乾地黃酪二　桃人伍拾枚
右件以酒六升煮取三升分三服鏡鼻燒末去滓內末服之
治產後兒生塊空流血不盡小腹絞痛梔子湯方
梔子三拾枚　右一味以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二兩
蜜五合生薑五兩半㕮咀一兩梔子汁中煎取二升分二服日三
產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不生方
生地黃五兩　大黃　芍藥　伏苓　細辛
桂心　當歸　甘草　黃芩各貳兩半　大棗貳拾枚
右十一味水八升煮取二升分三服
治新產後有血腹中切痛大黃乾漆湯方
大黃　乾漆　乾地黃　桂心　乾薑各貳兩

右五味水三升清酒五升煮取三升血當下若不差明旦服一
升滿三服病無不差
治產後血不去麻子酒湯方
麻子酪　右一味酒一斗漬一宿明旦去滓溫服一升先
食不差夜復服一升不吐下除忌房事如產一月日
治產後惡物不盡或經一月半歲一歲方
升麻叁兩
右一味清酒五升煮取二升分再服當吐下惡物莫怪良
治產後惡血不盡腹中絞痛刺不可忍方
大黃　黃芩　桃人各叁兩　桂心　甘草　當歸各貳兩
芍藥　生地黃各壹兩半　右八味以水九升煮取二升半食前分三服
產後漏血不止方
露蜂房　敗鼠如
右二味等分作灰取酪漿服方寸匕日三　又方
大黃叁兩　芒消壹兩　桃人　水蛭　蚤蟲各叁拾枚

靜嘉堂文庫所藏

甘草　當歸各貳兩　䗪蟲肆拾枚
右八味以水三升酒二升合煑取三升分三服當上血
又方　桂心　蠐螬各二兩　栝蔞　牡丹各壹兩　豉壹升
右五味以水四升煑取八合分三服
產後中風流腫方
鹽五升燒令赤　雞毛一把燒作灰
右二味水一石煑作湯內藥著湯中適冷暖以浴大良凡風
腫面欲裂裂破者以紫湯一服差神効紫湯是炒黑豆作
又方　產婦腹脹痛不可忍煑鼠粘根為飲一服即愈
治產後血不可止者方
乾菖蒲三兩　以淸酒漬五升煑取三升分再服即止
治產後面手臂通滿方　大豆三升
右一味以水六升煑取一升半去豆澄清更煎取一升內朮
八兩附子三兩炮獨活三兩生薑八兩添水一斗煎取五升內

好酒五升煎取五升分五服日三夜二間粥頻服三劑
療產後惡血不除四體並惡方
續骨木貳拾兩破如筭子大
右一味以水一斗煑取三升分三服相去如人行十里間食粥或
小便數或惡血無即差此木得三遍煑其力氣一種起死人
治產後血不盡煩悶腹痛方
羚羊角炭火燒成炭刮取三兩　芍藥貳兩熬令黃　枳實二兩細切熬令黃
右三味煑水作湯水七升煑三升分三服滓末之以服方寸匕
日再夜一稍加至二匕　又方
鹿角燒成炭擣篩煑豉取汁服方寸匕日三夜再稍稍
加至二匕不能用豉清煑水作湯用之
又方　擣生藕取汁飲二升甚驗
又方　生地黃汁酒三合和溫溫頓服之
又方　生赤小豆擣散取東流水和服方寸匕不差更服

靜嘉堂文庫所藏

治婦人血瘕痛方

乾薑壹兩　烏賊魚骨壹兩

右二味治篩爲散酒服方寸匕日三

療產後血瘕痛方

古鐵一斤秤鎚亦得炭火燒令赤內酒五升中稍稍服之神效

治產後下痢方第六

膠蠟湯療產後下痢方

陳廩米壹升　蠟壹兩　當歸　阿膠　黃連

黃檗參兩　右六味以水八升煮取米熟目沸去米內

藥煮取二升內蠟令洋分四服一日令盡痢止

治產後餘實下痢便膿血赤白日數十行有餘柱蜜湯方

附子壹兩炮　桂　當歸參兩　赤芍藥拾兩　乾薑　甘草參兩　蜜壹升

右七味以水六升煮取三升內蜜一升煎一沸分三服日三

治產後下血赤白腹中絞痛湯方

芍藥　乾地黃甘草　阿膠　艾葉　當歸各貳兩

右六味以水七升煮取二升半分三服

治產後痢赤白不斷身躰面皆腫方

大豆壹升微熬　小麥壹升　吳朱萸拌　蒲黃壹升

右四味以水九升煮取三升分爲三服此方神驗

治產後痢赤白腹痛方

雞白壹副　當歸壹兩　酸石榴皮參兩　地榆根肆兩　粳米伍合

右五味以水六升煮取二升半分爲三服神驗

療產後下痢赤白腹痛當歸湯方

當歸參兩　乾薑　芍藥各貳兩　芎藭貳兩半

甘草　白朮　附子壹兩炮　龍骨參兩

右八味以水六升煮取二升分三服一日內令盡

治產後下痢兼虛極白頭翁湯方

靜嘉堂文庫所藏

白頭翁　阿膠　秦皮　黃連　甘草各二兩　黃蘗參兩
右六味以水七升煮取二升半去滓內膠令洋分三服
治產後早起中風治泄痢及
鼈甲貳兩炙分　當歸　黃連　乾薑各叁兩　黃蘗長壹尺廣等
十三五味以水七升煮取二升分三服日三
龍骨九治產後虛冷下血及數遍下晝夜无數兼產後悪露不
斷方　龍骨肆兩　乾薑　甘草　桂心各貳兩
右四味搗篩為散蜜和煖酒服二十九如梧子日三方用人
參地黃各二兩
阿膠丸治產後虛冷腸絞痛兼轉瀉不止方
阿膠肆兩　龍骨　桂心
人參　甘草　乾地黃　術　黃連　當歸　附子各貳兩
右十味合和下篩蜜為丸如梧子溫酒服二十九
治婦人產後下痢身腫茱萸湯方

吳茱萸　大五　小麥　薄黃各一升
右四味以水五升清酒一升煮取四升分四服日三夜一
澤蘭湯治婦人產後餘疹
血寒熱小便赤黃大便不
澤蘭四分　石膏四兩
厚朴三兩　甘草
桔梗　乾地黃三兩　遠志五枚　甘草
防風　山茱萸　人參　乾薑　人參
右二十一味以水一斗五升
諸藥煮取三升五合分三服
治產後下痢乾地黃
乾地黃二兩　白頭翁
右六味水五升煮取二升半去滓內膠令消生地黃湯方
治產後忽著寒熱下痢生地黃湯方

靜嘉堂文庫所藏

生地黃五兩 甘草炙 黃連 桂心各壹兩
大棗二十枚 淡竹葉一升 赤石脂二兩
右七味以水一斗煮竹葉取七升去滓内藥煮取二升半分三服
治產後下痢藍青丸方
藍青 附子炮 鬼臼 厚朴
阿膠炙 甘草各二兩 艾葉 龍骨 黃連
當歸各三兩 黃蘗 茯苓 人參各壹兩
右十四味擣篩蜜和如梧子大空腹服以飲下二十丸又一方
用赤石脂四兩
治產後虛冷下痢下赤白臍痛方
當歸 朮 鼈甲 附子炮 黃連
乾薑 秦皮 甘草炙各二兩 赤石脂三兩
右九味擣篩蜜和丸如梧子大空腹米飲服二十丸日三服
治產後下赤痢散方
赤石脂三兩 桂心一兩 代赭三兩
右三味下篩酒服方寸匕日三服十日愈
治產後下痢黑散方
麻黃去節 貫衆 桂心各一兩 甘草炙
乾漆熬 細辛各二兩
右六味下篩麥粥飲服五分撮一服再服五日愈
治產後黑黃散方
黃連二兩 黃芩 䗪蟲熬 乾地黃各壹兩
右四味擣篩為散酒服方寸匕日三服十日即愈
產後痢龍骨散方
五色龍骨 黃蘗根皮蜜炙 代赭 艾各一兩半
黃連去毛二兩
右六味為散飲服方寸匕日二服
治產後小便數方第十七
止淋渴栝蔞湯方

靜嘉堂文庫所藏

括蔞　黃連　人參三兩　乾棗十五枚
甘草二兩　麥門冬三兩　桑螵蛸二十七枚　生薑三兩
右八味以水七升煮取二升半分三服
治產後小便數雞𦛗胵湯方
雞𦛗胵二十具　雞腸三具　乾地黃　當歸　甘草
麻黃去節　厚朴　人參各二兩　乾棗二十枚
右十味以水一斗煮雞𦛗胵及腸、乾棗取七升，去滓內諸藥煮
取三升半分三服
婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飴每
發欲死食不生肌面黃瘦不能食方
貝齒四枚　葵子一升　石葦二兩　滑石二兩
右四味以水七升煮取二升去滓內豬脂一合更煎三沸分三
服日三不差再合服
治產後卒淋血石淋湯方

石葦去毛貳兩　榆皮陸兩　黃芩貳兩　乾棗叁拾枚
通草貳兩　甘草壹兩　葵子貳升　朮　生薑各叁兩
右九味以水一斗煮取二升半分三服
治產後淋澀葵根湯方
車前子壹升　亂髮燒　大黃壹兩　冬瓜練汁七合
通草叁兩　桂心　滑石各壹兩　生薑陸兩
右八味以水七升煮取二升半分三服
治產後淋茅根湯方
白茅根壹斤　瞿麥肆兩　地脉貳兩　桃膠　甘草各壹兩
鯉魚齒壹伯枚　人參貳兩　伏苓肆兩　生薑叁兩
右九味以水一斗煮取二升半分三服
治產後淋滑石散方
滑石伍兩　通草　車前子　葵子各肆兩
右四味下篩酢漿水服方寸匕稍加至二匕

靜嘉堂文庫所藏

治產後虛渴少氣力竹葉湯方
竹葉 切參 外 甘草 炙 伏苓 人參各壹 小麥 伍合
生薑 乾棗 擘 半夏 洗 貳兩 麥門冬 伍兩 去心
右九味以水九升煮竹葉小麥取七升去滓內諸藥更煎取
二升半一服一五合日三夜一
治產後渴括蔞湯方
括蔞 人參 甘草 麥門冬 參兩 去心
乾棗 擘 貳拾 瓜根 乾地黃 貳兩
右七味以水八升煮取二升半分三服
雜方第八
療婦人無故尿血方 取夫爪甲燒作灰酒服之
又方 取故船竹茹曝乾搗末為散酒服一寸匕日三
治婦人汗血吐血尿血竹茹湯方
竹茹 貳 乾地黃 貳兩 人參 芍藥 桔梗
苦蘘 當歸 甘草 桂心各壹兩
右九味以水一斗煮取三升分三服
婦人遺尿方
礜石 參兩燒 牡蠣 肉貳兩 黃
右二味研酒服方寸匕日三
治婦人自少患風頭眩眼疼方
石南 細辛 天雄 茵芋 麝香 山茱萸 乾薑 各參兩
署預 防風 貫衆 獨活 藁本 各肆兩
右十一味酒三升漬五日初飲二合日三稍稍加
治婦人經脉流黃左忽患頭冷冷歇又心胸煩熱眉骨眼皆疼
疼有時生瘡喉中乾燥四體痛痒方
括蔞 麥門冬 龍膽 各參兩
天黃 貳 土瓜根 搗兩 杏人 貳拾伍枚去尖皮雙人
右六味搗篩蜜丸飲服如梧子十九日三服漸加之
治婦人陰欲痛腫先心痛腹脹滿日夜五十行方

靜嘉堂文庫所藏

麴　一石　榴皮醃捌　黃蘗　烏梅　黃連
艾葉陳乾　阿膠　乾薑　附子伍兩
右十味揭篩蜜和丸飲服如梧子大二十丸日三漸加至三十丸

婦人患癌發時如有三五箇而作聲殊不得寢食常心悶方
韋生子參外

右一味揭末飲服方寸匕日一服服過三十服後可服好硫黃二兩

治婦人忽與鬼交通方
松脂貳　雄黃壹兩
右二味先洋松脂乃內雄黃末以虎爪絞令相得藥成取雞子中黃夜三以苦薑龍中燒令病人取鼻向其上以被自覆唯出頭勿令過熱及冷氣得泄出

婦人下焦勞冷膀胱虛氣損弱白汁與小便俱出方
厚朴如手大捌
右一味以酒五升煮兩沸去滓取桂一尺搗篩為末內汁中調和一銖勿食且頻服之
温經湯主婦人小腹痛方
伏苓陸兩　芍藥參兩　薏苡仁半升　土瓜根叁兩
右四味以酒三升漬一宿且加水煎取二升分再服

治婦人咽中如有炙肉臠吐不出咽不下半夏湯方
半夏壹升　厚朴參兩　伏苓肆兩　生薑伍兩　蘇葉貳兩
右五味以水七升煮取四升分四服日三夜一不差頻服一方無蘇葉生薑亦不同

治婦人氣常平旦服烏生泵一日止

治婦人心痛方　布裹鹽如彈丸燒作灰酒服之愈

又方　燒秤錘酒亦佳　又炒大豆投酒中亦佳

治胷中伏氣昆布丸方
昆布　海藻　芍藥　桂心　人參
白石英　紫菀　桑白皮各捌分　伏苓　鍾乳

靜嘉堂文庫所藏

梔子人各拾分　紫苑　甘草各肆分　乾薑伍分　吳茱
五味子　細辛各陸分　杏人百枚　橘皮　蘇子各伍合

右二十味搗篩蜜和酒服二十丸如梧子日再加至四十丸
治婦人無故憂恚鬱中迫塞氣不下如憂思方

芍藥　滑石　黃連　石膏　前胡　山茱萸各伍分
大黃　細辛　麥門冬各肆分　半夏叁分　桂心貳分

右十一味搗篩蜜丸和梧子酒服二十丸加至三十丸日三服忌羊肉
治勞損產後無子陰中冷溢出子門閉積月體寒冷方

防風陸分　桔梗伍分　人參肆分　菖蒲　半夏洗
卅參　厚朴炙　乾薑　紫苑　杜衡各叁分
秦膠　白斂　牛膝　沙參各貳分

右十四味搗篩白蜜丸如小豆食後服十五丸日三服不知增至二十九有身止夫不在勿服之服藥後七日方合陰陽酒服
治產後癖瘦玉門冷五加酒方

五加皮切　枸杞皮各貳升　乾地黃　卅參各搗　杜仲壹斤
乾薑壹兩叁　天門冬二兩肆　蛇床子壹升　乳床半斤

右九味絹袋盛以酒三斗漬三宿一服五合日再稍加至十合佳
治子門閉血聚腹中生肉瘕藏寒所致方

生地黃汁叁升　生牛膝汁壹升　乾漆半斤熬

右三味先搗漆為散內汁中攪微火煎為丸如梧子酒服三丸日再若覺腹中痛食後服之
治產勞玉門開而不閉方

硫黃肆兩　兎絲子伍分　蛇床子肆分
吳茱萸陸分

右四味搗篩為散以水一升煎方寸匕下湯中洗玉門日再
產後陰道開不閉方

石灰一斗熬之令能燒草

右一味以水二斗投中坐漬之須臾復易常若此已效千金不傳
治婦人陰脫黃芩散方

黃芩　蜱皮毛炙　當歸各貳分　芍藥貳分

靜嘉堂文庫所藏

牡蠣　竹皮各拾分　狐蒌壹具炙

右七味治下篩揭為散酒服方寸匕日三禁房勞勿冷食

治陰脫硫黃散方

硫黃　烏賊骨各貳銖　五味子叁銖

右三味治下篩為散以粉其上艮日再三粉

治陰脫當歸散方

當歸　黃芩各貳兩　芎藭伍分　蝟皮貳分炙　牡蠣拾分

右五味治下篩酒服方寸匕日三禁牽重艮

治產後陰下脫方

蚯床子布裹蒸熨之亦治產後陰中痛

治脫肛若陰下脫方　羊脂煎黃訖適冷暖以塗上

又方　用以鐵精傳肛上多少令調以火炙布暖以熨肛上漸推內之末穩石酒服方寸匕日三服

治產後陰下脫方　燒人矢赤下篩為散酒服方寸匕日三服

又方　燒瓦鬲頭為灰酒服方寸匕

又方　炙臍下橫文中二七壯　又方

皂莢貳分　半夏　大黃　細辛各叁分

右四味揭篩為散以囊盛大如指內陰中即差

又方　鼈頭燋敝　右一味以井花水服方寸匕日三服

又方　搗　吳茱萸絡青　戎鹽如雞子大

右三味皆熬令變色治末以綿裹如半雞子大內陰中旦易二十日差

治陰下挺出方　蜀椒　烏頭　白及各貳分

右三味揭篩以寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱易之日一度明旦乃復著

治產後藏中風陰腫痛洗湯方

當歸　獨活　白芷　地榆根酪叁　敗醬　礬石酪貳

右六味水一斗半煮取五升適冷煖稍稍洗陰日三度

靜嘉堂文庫所藏

療產後陰腫痛方　熟搗桃人傅之良日三度

治男女陰瘡膏方

米粉㕮　芍藥　黃芩　牡蠣　附子　白芷各叁分

右六味以不中水豬膏一斤煎之於微火上三下三上候白芷黃膏成絞去滓內白粉和令相得傅瘡上并治口瘡

治陰中痛生瘡方

羊脂㕮　杏人㕮　當歸　白芷　芎藭各壹兩

右五味細切以羊脂和諸藥內鉢中置甑中蒸之三升米頃藥成取如大豆綿裹藥內陰中一日

治陰中痒如蟲行狀方

礬石叁分燒　芎藭　鼠床各半兩　眞丹砂少許

右三味搗篩以綿裹藥著陰中蟲自死

治男女陰蝕瘡盡方

蝦蟇　兎屎　右三味等分搗篩以傅瘡上

治產後腹中如弦常堅痛無情願方

當歸骨二方寸匕內蜜一升煎之適旦頓服

治童女交接陰陽違理及為他物所傷血流不止方

取釜底墨摩之以塗　又燒髮并青布末傅之立愈

治男女陰中瘡濕痒方

黃連　梔子　甘草　黃蘗㕮壹兩　蛇床子貳兩

右五味散以粉之瘡上无汁以猪脂和塗之深者用綿裹內瘡中日三度

治婦人斷產方　灸右踝上一寸三壯即斷

又方　蠶子故布方一尺燒為末酒服之

治妊娠隨憶胎方　妊娠三月灸膝下一寸七壯

又方　小豆末酒服方寸匕日二亦主妊娠數月水來者

又方　艾如彈丸酒煮一升外服之

治妊娠得病事須去胎方

靜嘉堂文庫所藏

雞子一枚去黃　鹽三指撮和服之立下

又方　麥蘗一升末和蜜一升服之立下神驗

又方　七月七日法麴三升酢一升煮兩沸頓不食旦頓服即下

治妊身傷胎結血心腹痛方

服小兒尿二升日服之立差止大良

治欲去胎方　大麴㕮咀酒一斗煮三沸去滓令盡當頓勿食

日再服必子如藥令母肥盛无疾苦千金不傳

治妊娠落胞胎衣不出方

雞子一枚鹽一撮和攪服之

又方　炙夫靴底令熱熨陰下二七下

治陰痒入骨困方

大黃　黃芩　黃芪各一分　芍藥貳分

玄參　丹參各參分　菜萸伍分

右七味為散酒服方寸匕日三服

治陰瘡方　蕪荑　黃芩　黃連　牛膝　甘草各四分

右九味各一大分以猪膏四兩合煎傳之

治女人交接輒血出方

右二味酒服方寸匕立止

治合陰陽輒痛不可忍方

右三味以水四升煮取二升洗之日四度

治陰蝕瘡方

當歸　芍藥各一　地榆皮三兩　甘草　蛇床子各一兩

右五味以水五升煮取二升洗之日三夜二

大內補黃耆湯主婦人七傷骨躰痠痛小腹急痛面黃黑不

能食飲并諸虛不足少氣心悸不安方

黃耆　當歸　芍藥　乾地黃　半夏各三兩

伏苓　人參　桂心　遠志　麥門冬

五味子　白朮　澤瀉各　乾薑四兩

靜嘉堂文庫所藏

棗三十枚　右十六味水一斗半煑取三升一服五合日三夜一服

鯉魚湯主婦人躰虛流汗不止或眠中盜汗方

鯉魚貳斤　葱白一斤　豉一升　乾薑　桂心各貳兩

右五味以水一斗煑魚取六升去魚内諸藥微火煑取二升分再服取微汗即愈

治女人傷於丈夫四體沉重虛吸頭痛方

生地黃八兩　芍藥伍兩　香豉

葱白一升切　生薑一升切各　甘草貳兩

右六味水七升煑取二升半分三服不差重作慎房事

治因其夫陰陽過度玉門疼痛小便不通白玉湯方

白玉二兩半　朮五兩　澤瀉　蓯蓉各二兩　當歸伍兩

右五味先以水一斗煎玉五十沸去玉内諸藥煎取二升分三服服相去一炊頃

療傷丈夫動肛出血腰痛小腹烈月水不通陰中腫痛方

菖蒲二兩　葱白一斤　當歸二兩　吳茱萸　阿膠各一兩

右五味以水九升煑取二升半内膠投令烊分三服

治傷丈夫苦頭痛欲嘔悶桑根白皮湯方

桑白皮半斤　乾薑二兩　桂心五寸　大棗二十個

右四味以酒一斗煑取三升去滓服適衣無令汗出

治嫁痛單行方

大黃三分　右一味以好酒一升煑三沸頓服之良

治小戶嫁痛連日方

甘草二兩　芍藥半兩　生薑十八銖　桂心壹分

右四味以酒二升煑令三沸去滓盡服神効

又方　牛膝伍兩

右一味以酒三升煑取半去滓分三服重煎滓

治妊娠爲夫所動欲死單行竹瀝汁方

取淡竹斷兩頭節火燒中央器承兩頭得汁飲之立効

靜嘉堂文庫所藏

治小户嫁痛方
烏賊魚骨　右一味燒為屑酒服方寸匕日三服
治陰寬大令窄小方
兎屎　乾漆各貳　鼠頭骨貳枚　雌雞肝二箇陰乾百日
右四味擣為丸如小豆七月七日合時著一丸陰頭令徐徐內之三日知十日小五十日如十五歲童女身
治陰冷令熱方
內食茱萸於牛膽中令滿陰乾百日每取二七枚綿裹之齒嚼令碎內陰中良久熱如火
灸法　俠丹田兩邊相去各一寸名四滿主月水不利賁血上
下并无子灸三十壯丹田在臍下三寸是也
治婦人胞落頹灸臍中三百壯　婦人水洩利灸氣海百壯三報
治婦人胞落頹灸身交五十壯三報是臍下橫文中又灸背脊當臍五十壯

婦人胞落頹灸玉泉五十壯三報
婦人胞落灸龍門二十壯三報在玉泉下女人入陰內外之際
此穴卑今廢不針灸
婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年壯三報
婦人陰冷腫痛灸歸來三十壯三報俠玉泉五寸是其穴矣

孫真人千金方卷第三

靜嘉堂文庫所藏

補益第一

不通第二

月水不調第四

補益第一



靜嘉堂文庫所藏

害飲食手足冷多夢紛紜目視茫茫痛無常處大通不能動揺方

澤蘭六分　石膏　白芷八分　蜀椒　乾薑各捌分

當歸　桂心　芎藭各二分　厚朴　柏子仁

禹餘糧　乾地黃　細辛　鍾乳　茯苓

五味子　龍骨各四分　蕪荑二分　人參　石斛各五分

甘草　黃耆各四分　遠志　續斷　白朮

防風　烏頭各三分　山茱萸八分　紫菀各二分　白芷

藁本　蕪荑各一分

右三十二味蜜丸如梧桐子大酒服二十丸加至三十丸

小五石澤蘭丸治婦人勞冷虛損飲食減少面无光色腹中痛經候不調吸吸少氣無力補益溫中方

澤蘭六分　乾薑　石膏　陽起石各捌分　當歸

甘草　赤石脂各七分　白石英　蓯蓉　龍骨

白礬石　桂心　紫石英　鍾乳各陸分　朮

芍藥　厚朴　人參　蜀椒　山茱萸各伍分

藁本　柏子仁各肆分　蕪荑叁分

右二十三味蜜丸如梧桐子大酒服二十丸加至三十丸

內補大當歸丸治產後虛羸不足胸中少氣腹中拘急疼痛或引腰背痛或產後所下過多血不止虛竭乏氣晝夜不得眠及崩中面脫色口乾燥腹中攣急亦治男子傷絕或從高墮下內有斷傷藏虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸　芎藭　續斷　乾薑　阿膠

甘草各肆分　朮　吳茱萸　附子　白芷各叁分

桂心　芍藥各貳分　乾地黃各拾分

右十三味蜜丸如梧桐子大酒服二十丸加至四十丸加蒲黃一兩絕妙

治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫色腹中痛白芷丸方

白芷　乾地黃拾伍分　續斷　乾薑　當歸

靜嘉堂文庫所藏

阿膠各參兩 附子壹兩

右七味蜜丸如梧桐子大酒服二十丸日四五服無當歸者芎藭代入蒲黃一兩妙無續斷大薊根代

紫石栢子丸治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱頭痛熱毒差後風仍停在胸脉使人頭重虛耗赤白黑或飲食而頭眩心悸酸痛恍惚不能起方

紫石英 栢子仁各參兩 烏頭 桂心 當歸

山茱萸 澤瀉 芎藭 石斛 遠志

寄生 蓯蓉 乾薑 甘草各貳兩 蜀椒

杜衡 辛夷各壹兩 細辛壹兩半

右十八味蜜丸酒服二十丸漸至三十丸日三服

論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭

鍾乳澤蘭丸主婦人久虛羸四肢百體煩疼臍下冷不能食面目瘀黑憂恚不樂百病方

澤蘭貳分 防風柒分 人參 栢子仁 麥門冬

乾地黃 石斛各陸分 芎藭 甘草 白芷

牛膝 山茱萸 署預 當歸 藁本各伍分

細辛 桂心各肆分 鍾乳拾貳分

右十八味蜜丸如梧子大酒服二十丸加至四十丸日二服

大澤蘭丸治婦人產後內衄中風餘病癥瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子血上遊風去來目淚多出涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止泄痢淋瀝或五藏六腑寒冷心中急邪氣咳嗽或偏下赤白陰中腫胸脇或身體皮膚中澀如麻豆癢痰癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目眩無見或上氣惡寒灑灑如瘧或喉痺鼻齆風癇癲疾或月水不通魂魄不定飲食無味無所不治服之令人有子方

澤蘭玖分 赤石脂 石膏各捌分 藁本 當歸

靜嘉堂文庫所藏

甘草各柒分　芎藭
五味子各壹分　桂
薤蓉　厚朴
乾薑　細辛
杜仲　牛膝
燕薁各叁分　紫石　捨貳分
右三十二味蜜丸梧桐子大酒服二十丸至三十丸久赤白痢
去乾地黃石膏甘草各柒分冬栢子仁加大麥蘗陳橘龍骨阿膠黃
連各壹分有蟲氣加檳榔貳分

小澤蘭丸主產後虛羸勞冷身體疼悩方

澤蘭　當歸
栢子仁　防風
葉本　細辛
人參　茱萸

乾地黃　栢子人　禹餘粮
石斛　木各伍分　白芷
防風　署預　茯苓
卷栢各肆分　烏賊　人參
蛇床子　續斷　艾葉

石十八味蜜丸如梧子酒服二十丸日三服加至三十丸無疾
者依此方春秋二時常服一劑有病虛羸者依服
紫石門冬丸止風冷在子宮有子常落或始為婦便患心痛仍
成心疾月水都未曾來服之肥悦令有子方

甘草各柒分　芎藭
茯苓各肆分　白芷
白朮　桂心
燕薁　厚朴各叁分

紫石英　天門冬酪各叁　辛夷心　烏頭　薤蓉
桂心　甘草　五味子　栢子仁　石斛
人參　澤瀉　遠志　杜仲兩各貳　禹餘粮
蜀椒　卷栢　寄生　石南　雲母
當歸　烏賊骨各肆分

右二十二味蜜丸酒服梧桐子大二十丸日二服加三十丸
三石澤蘭丸主風虛不足通血脉補寒冷方

澤蘭玖分　石斛　石膏各捌分　甘草
紫石英　當歸　芎藭各柒分　白朮
人參　乾地黃各壹分　桂心
獨活　乾薑　防風

靜嘉堂文庫所藏

藁本 茯神各伍分 白芷 桔梗 細辛
栢子仁 白石英 鍾乳 蜀椒 五味子
黄芩 蓯蓉 芍藥 秦膠 防風各肆分
厚朴參分 蕪荑貳分

右三十二味蜜丸酒服如梧子二十丸至三十丸日二三服

太平澤蘭丸主男子女人五勞七傷諸不足定志意除煩滿手足虚冷羸瘦及月節不調百病方

澤蘭 鍾乳 細辛 黄耆各參兩 栢子仁貳兩半
紫石英 大黄 前胡 遠志各貳兩 芎藭
白朮 蜀椒各壹兩半 白芷 丹參 葹子
芍藥 桔梗 秦膠 沙參 桂心
厚朴 石斛 苦參 人參 麥門冬
乾地黄貳兩半 附子壹兩 乾薑壹兩 吳茱萸伍分 麥蘖各壹伍分
陳麴壹升 大棗伍拾枚作膏

右三十二味蜜丸酒服如梧子二十丸加至三十丸令人肥悅

月水不通方第二

治婦人月水不通湯方

桃仁 牡丹皮 夜干 土瓜根 黄芩
朴消各參兩 芍藥 大黄 柴胡各肆兩 牛膝
桂各貳兩 水蛭 䖟蟲各柒拾枚

右十三味以水九升煑取二升半分三服

治生產及墮身後月水不調或淋瀝不斷後復更來狀如漏水四體虛吸吸不能食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不采舉體重惟欲眠多思酸物桃仁湯方

桃仁伍拾枚 澤蘭 甘草 芎藭 人參各貳兩
牛膝 桂心 當歸 牡丹皮各參兩 芍藥
生薑 半夏各肆兩 地黄捌兩 蒲黄柒合

右一十四味以水九升煑取二升半分三服

靜嘉堂文庫所藏

治月水不通小腹堅痛不調乾漆湯方

蜀椒　芍藥　細辛　甘草　附子炮各一兩
桂　當歸　芒消　乾漆　黃芩各貳兩
大黃參兩

右剉以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓內消分為三服

療月經不通芒消湯方

當歸　芍藥　土瓜根　芒消　丹砂末研之
水蛭各貳　大黃酸棗

右水九升煮取三升去滓內丹砂芒消分三服

療月經不通心腹絞痛欲死通血止痛方

當歸貳兩半　大黃　芍藥酢參　吳茱萸　乾地黃
蜜蠟　芎藭　水蛭各貳兩　細辛
苦葶藶　桂心酢一枚　桃子枚擘　桃人壹斗

右以水八升煮取二升半分為三服

療月經不通桃人湯方

當歸　土瓜根　大黃　芒消貳兩
蜜蠟各貳兩煎　桃仁壹升　桂心　蘇子仁各參

右以水九升煮取三升半去滓內消分為三服

療女人盛寒月有熱在腹月經來得熱不通方

前胡　芍藥　茯苓　大黃　枳實各參兩
牡丹　玄參　桃人　黃芩　夜干
旋復花　括蔞　甘草各貳兩

右以水一斗煮取三升分為三服

療欲眠而欲食酸物虛乏黃瘦有宿乾血在腹方

乾地黃捻貳　甘草各參分炙　芒消　芍藥
乾薑　當歸　牡丹各伍分　用參
蜀椒　澤蘭　桑耳　桂心各肆分
黃芩　白芷

靜嘉堂文庫所藏

䗪蟲肆拾枚　芎藭陸兩　桃人陸兩　水蛭　蝱蟲各拾枚

蒲黃貳合

右擣篩蜜丸如梧子每日空心酒下十五丸日加至三十丸為度

療女人諸病後經閉絕不通及從小來不通及產後瘀血不消服諸湯利血後仍未差除之牡丹丸方

牡丹參兩　芍藥　玄參　桃人　當歸

桂心各貳兩　蝱蟲伍拾枚　蠐螬貳拾枚　瞿麥　芎藭各壹兩

海藻壹兩　水蛭伍拾枚

右擣篩蜜丸桐子大酒下十五丸加至二十丸血盛者作散服方寸匕腹中常轉沸血自化成水去如小便赤少除桂心用地膚子

療女人從小至大月經未嘗顏色萎黃氣力衰少食飲無味方

黃芩　牡丹　桃仁　瞿麥　芎藭各貳兩

芍藥　枳殼炙　夜干　海藻　大黃各參兩

蝱蟲柒拾枚　水蛭伍拾枚　蠐螬拾枚

右以水一斗煮取三升分三服服兩劑後灸乳下一寸黑員際各五十壯

治月經不通方

右取葶藶一升擣蜜丸丸如彈子大綿裹內陰中入三寸每丸一宿

療月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷或來而腰腹痛噓吸不能食心腹痛或青黃黑色或如水舉體沉重白堊丸方

白堊　白石脂　牡蠣　禹餘糧　烏賊魚骨

龍骨　細辛各壹兩　當歸　芍藥　黃連各一兩

茯苓　乾薑　桂心　人參　瞿麥

石韋　白芷　白斂　附子炮　甘草炙各二分　椒汗壹分

右擣篩蜜丸如梧子大空心酒下二十丸日三至月候來時日四五服為佳

療月經不通百醫不差乾漆丸方

靜嘉堂文庫所藏

乾漆 炒 夜干 芎藭 土瓜根 牛膝
黃芩 桂心 吳茱萸 大黃 柴胡
桃人 水蛭 蠐螬二十枚 大麻人 蠐螬
右以蜜為丸如梧子空心酒下十五丸加至三十丸為度
勿用後浸酒服前丸方
大麻子 蜚蠊 牛膝
桃人 桂心 土瓜根
右剉用清酒三升漬取盞藥浸五宿以盞下前丸甚良或單服之
療女人臍下有瘕結刺痛如蟲嚙雖刺或下赤白膠膏痰痛或在月前或在月後當歸丸方
當歸 芎藭 附子
黃芩 桂心 芍藥
乾薑 牡丹 吳茱萸
柴胡 厚朴 牡蠣

甘草 十重蟲
右搗篩蜜丸如梧子空心酒下五丸日再加至十九有胎勿服之
療女人小腹積聚大如拳面上下周流痛不可忍手足冷噦咳
腥臭羽脇熱如火炙五門冷如風六經不通或在月前或在月
服之三十日便差此是河內魏夫人方
蠐螬 桂心 蜂窠 玄參 椒
細辛 人參 苦參 丹參 沙參
吳茱萸 乾薑 牡丹
附子 水蛭 蠐螬貳拾 大黃
甘草 防葵 當歸 芍藥
右搗蜜為丸如梧子大酒下七丸日三稍加之以知為度
療女人因產後血冷堅結在腹內月經往來不時腹脹滿絞
臍下痛手足熱心中煩不欲食方
龜甲 乾薑 丹參 禹餘粮 當歸

靜嘉堂文庫所藏

白芷　乾地黃各伍分　代赭　甘草　鹿茸　烏賊骨各叄分

桂心　細辛　蜀椒　附子各肆分炮　殭蠶熬

右搗篩蜜為丸如梧桐子大空心酒下十五丸加至二十五丸

忌猪雞犬兎肉生菜蒜

療婦人産後消瘀堅僻禹餘粮丸方

禹餘粮　烏頭　吳茱萸　桂心　蜀椒各拾分

當歸　白朮　細辛　乾地黃　人參各八分

芍藥　芎藭　前胡各五分　乾薑拾分　礬石六分

白薇　紫菀　黃芩各肆分　䗪蟲肆分熬

右搗為末蜜丸如梧子空心酒下二丸日二不知加十丸為度

療婦人産後十二癥病帶下無子皆是風寒熱或産後未滿百日胞胳惡血未盡便立廁上久坐寒熱入胞絡在小腹積聚如雞子大之跳隱隱然如蟲嚙或如針刺兩脇支滿不能飲食不消化上下通流或在曾胃痛連玉門背膂疼嘔逆短氣汗出小腹寒

胞中有瘡欬引陰痛小便自出腰胯疼痛四肢沉重淫躍一身盡腫乍來乍去大便不利淋瀝或月經下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥牡蒙丸方

大黃拾分　附子伍分炮　當歸　厚朴炙　消石

前胡　牡蒙　乾薑　䗪蟲　牡丹

蜀椒　黃芩　桔梗　茯苓　細辛

葶藶　人參　芎藭　桂心　吳茱萸各叄分

右搗篩蜜和更杵萬杵丸之如梧桐子大空心酒服三丸日三不知加之六丸下赤白青黃如魚子者病根出矣

療月經不通結成癥瘕如石留立宜此破血癥方

大黃陸兩　蜀椒壹兩去目口汗　代赭　柴胡　水蛭熬

丹砂　土瓜根各叄兩　乾漆熬　芎藭　乾薑

䗪蟲熬　茯苓各捌分　消石陸兩　巴豆叄拾枚去心皮

右擣篩巴豆別研蜜丸如梧子空心酒服三丸未知加至五丸

靜嘉堂文庫所藏

日再服

療月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹瘕瘕宜服此方神効

蟅蟲熬壹升　乾地黃　牡丹　乾漆熬　芍藥
牛膝　土瓜根　桂心各肆兩　桃人　黃芩
牡蠣各叁兩　茯苓　海藻各伍兩　東蠭肆伯箇　水蛭叁伯箇熬
芒消壹兩　人參陸分　葶藶伍合熬　葵莧貳兩

右擣篩蜜丸如梧桐子大每日空心酒下七丸不知加之為度

療月經不通桂心酒煎方

桂心　牡丹　芍藥　牛膝　乾漆
土瓜根　牡蠣各肆兩　吳茱萸壹升　大黃叁兩　黃芩
乾薑叁兩　蠐螬各拾伍箇　水蛭貳伯箇
細辛　亂髮灰各壹合　蠭房壹枚　大麻人叁升　蠭子貳升
乾地黃陸兩　敝蚘甲　虎杖根各伍兩　蕪菁子貳升

右細剉修持之酒四斗分兩甕浸之七日併一甕盛攪調

還內丙甕內初每服二合日三加至三四合

療小腹積聚虛脹雷鳴四肢沉重月經不通方

取高地虎杖根細剉二斛以水二石煮取一六斗半去滓澄濾令淨即取好酒五升和前令勻煮每服一合消息為度不知加之

療齊下結堅塊大如升月經不通發寒熱往來下痢羸瘦此為氣瘕可治若生肉癰不可治

乾漆壹兩熬　牛地黃叁兩切

右搗篩以漆末內地黃中微火煎令可丸每酒服三丸不知加之食後服丸如梧子大

療月經不通甚極閉塞方

牛膝壹斤　麻子叁升熬之去皮

右細剉好酒一斗五升浸五宿一服五合加至二升日三服

療產婦風冷留血不去傳經閉塞方

土瓜根肆兩　桃人貳升熬之

靜嘉堂文庫所藏

菴閭子壹升 桃人貳升去皮碎 麻子人壹升碎

右三味用好酒三升浸五宿每服五合日三加至二升

療月經積聚閉塞不通結成聚大如缸欲死方

虎杖根細切去頭曝乾 土瓜根汁貳升 牛膝汁貳升

右細剉以水一斛浸虎杖根一宿明旦煎取一大斗去滓澄濾乃內別器中和土瓜牛膝汁湯上煎令如餳每酒服一合日再夜一宿血當下

療帶下赤白經閉不通方

大黃陸兩 朴消伍兩 桃人壹升熬 䗪蟲壹升熬

右搗篩桃人別研以醇苦酒四升內銅鐺中炭火煎取二升下大黃桃人䗪蟲等攪勿住手當欲可丸下朴消更攪勿住手良久出之可丸乃止取一丸如鷄子投酒中須一宿勿食服之至晡時下如大豆汁也

療崩中赤白帶下諸方第三

療婦人忽暴崩中去血不斷或如鷄子肝鷄鴨肝方

小薊根陸兩 當歸 阿膠 續斷各叁兩 青竹茹貳兩

生地黃捌兩 地榆 釜月下土各肆兩綿裹 馬通壹升赤帶用赤馬白帶用白馬

右以水八升和馬通汁煮取二升半分三服不止頻服三四劑

馬通是糞汁也

次服丸方

續斷 甘草 地榆根 鹿茸 小薊根

丹砂各伍分 乾地黃拾分 芎藭陸分 阿膠 赤石脂

當歸各陸分 柏子人肆分 龜甲拾貳分炙 秦牛角䚡拾貳分炙令黃

療婦人漏下方

鹿茸炙 阿膠叁兩炙 當歸貳兩 烏賊骨貳兩炙 蒲黃壹兩

右搗為散每日空心酒服方寸匕日三夜一

療女人血漏不止或劇常漏不止四體羸瘦食飲減少或赤或白或黃或黑方

伏龍肝 赤石脂 白龍骨 牡蠣 烏賊骨 禹餘粮

右擣末空心酒服方寸匕日二服白多者加牡蠣龍骨烏賊骨亦多者加禹餘粮黃多者加伏龍肝桂心隨病加之

療婦人及女子白帶等五色方

禹餘粮 當歸 苦參各四分 赤石脂 白石脂
阿膠 龍骨各四分 烏賊骨 黃蘗
桑耳 牡蠣各四分 白斂
黃芩 續斷 石韋各五分

右擣篩蜜丸如梧子空心以飲服十五丸日再加至三十丸

療女人崩中赤白方

白馬蹄燔 白馬髮毛 莆黃 鹿茸 禹餘粮
白芷 續斷 小蘭根各四分 人參 乾地黃
栢子仁 黃耆 茯苓 當歸 烏賊骨各三分
伏龍肝 艾葉 各二兩

右擣篩蜜丸如梧子空心飲服二十丸日再加至四十丸

療女人身體羸瘦心神不定意欲投水中百節尽痛心下常懸時冀時塞惡心從唾每愛鹹酸甜苦之物身上或似雞皮月經不通六小便苦難食不生肌方

柴胡 芍藥 人參 大黃 當歸各四分 乾薑
芎藭 茯苓各三分 消石 杏人 蜀椒
蜚蠊 桃人各二十枚 水蛭各用壹合

右各修持擣為末蜜丸如梧子空心飲下三丸不知加之十丸

療女人三十六疾一十二癥九痛七害五傷三徧不通方

何謂十二癥

一曰狀如清血 二曰如黑血 三曰如紫汁
四曰如赤肉 五曰如膿痂 六曰如豆汁
七曰如葵羹 八曰如凝血 九曰如清水血
十曰如米泔 十一曰經不應期 十二曰經一不應期

何謂九痛

靜嘉堂文庫所藏

一曰陰中傷痛　二曰陰中淋瀝痛　三曰小便辛苦痛
四曰寒冷痛　五曰經來即腹中痛　六曰氣滿腫痛
七曰汗出陰中如有蟲行痛　八曰脇下分痛
九曰腰胯痛

何謂七害

一曰竅孔不利痛　二曰寒熱痛　三曰小腹急堅連
四曰藏不仁痛　五曰子門不端痛　六曰浣乍多乍少痛
七曰喜吐

何謂五傷

一曰兩脇胠滿痛　二曰心痛引脇　三曰氣不通
四曰邪思洩痢　五曰前後痼寒

何謂三痼

一曰羸瘦不生肌膚　二曰絶產乳　三曰經閉

病各異同具治之方

白堊　龍骨各等分　芎藭
黃芩　鼈甲炙　白斂　當歸　茯苓
細辛　附子炮　禹餘粮　白石脂　人參　烏賊骨
蓇蓉本　甘皮　大黃已上各等分

右擣篩蜜丸丸如梧子大空腹飲服十丸日二不知加之二十日
知一月日百病除若十二癥倍牡丹禹餘粮烏賊骨白石脂龍
骨若九痛倍黃連白斂甘草當歸若七害倍細辛蓇蓉本甘皮
加椒葉黃各四分若五傷邪者倍大黃石葦鼈甲若三痼倍人
參加赤石脂白蘞若戰天各二分合藥時隨病增減之

療女人三十六疾胞中痛漏下赤白方

牡蠣　禹餘粮各等分　白石脂　乾薑
龍骨　桂心　附子炮　芎藭
黃連　當歸　白斂　細辛
赤石脂　乾地黃　白芷　黃芩　蜀椒
蓇蓉　附子炮　赤石脂　乾薑　鍾乳
乾地黃　當歸　黃芩　芎藭
白芷　甘草炙各等分

靜嘉堂文庫所藏

右擣篩蜜丸如梧子大每日空心酒下一十五丸日再服

療女人腹中十二疾

一曰經水不時　二曰經来清水　三曰經不通
四曰不周時　五曰生不乳　六曰絶緒
七曰陰陽減少　八曰腹苦痛奔豚　九曰腹中冷熱不調
十曰子門相引痛　十一曰經来寒如葵汁　十二曰腰背痛

右此十二病得之時因與夫卧起月經不去或卧濕冷地但水洗陰冷水便治當時取快而生百疾或瘡痍未差便合陰陽及至病起早作勞倦衣單席薄寒從下来致此宜用此方

半夏　赤石脂各四銖　蜀椒　乾薑　吳茱萸　當歸
桂心　丹參　白斂　防風各等　藭藭各貳分即藭藁也
白斂　艾葉　蒲黃　白芷各貳兩

療女人白崩及痔病方

頁者　茯苓
橘皮　牛角鰓炙　白馬蹄肆兩燒酒浸一宿炙　乾地黃各參兩
右擣篩蜜丸如梧子每日空心酒下二十九日三服

療女人新産後漏下及痔下血方

好檗若石膏兩燒半日　蜀附子壹箇炮
右蜜丸如梧桐子每日空心酒下二九日三數日差能百

療女人帶下臍下諸病方

大黃在外不炒上蒸　附子炮　茯苓　牡蠣
厚朴　芎藭　柴胡　桔梗　蜀椒
吳茱萸　柴胡　桂心各貳分　細辛拾分
右擣篩蜜丸如梧子空心酒服二九加之以腹中温温為度

療帶下方

枸杞根壹斤　生地黃伍斤

靜嘉堂文庫所藏

右二味細切以酒一斗煮取五升分為五服

療崩中單方八首

燒牛角末以酒服方寸匕日二服

又方

桑耳燒黒末酒服方寸匕日二服

又方

作豉酒每服一大盞日二服

又方

以大豆紫湯日三服

又方

燒馬左蹄末以酒服方寸匕日三服

又方

燒狗頭和毛皮骨末酒服方寸匕

又方

煮甑帶汁服一盞日四五服

又方

燒馬蹄底護肝末以酒服方寸匕日三服

療帶下漏血不止方

當歸 乾薑各叁兩 芎藭 黃耆 芍藥

吳茱萸 甘草 乾地黃各貳兩

右水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白除地黃吳茱萸加杜仲人參各二兩

療崩中下血虛羸瘦方

當歸 芎藭 黃芩 甘草各貳兩 竹茹貳升

右以水六升煮竹茹取三升去滓內諸藥取一升半分三服

忌勞動嗔怒

療崩中晝夜十行衆醫不差方

芎藭捌兩 酒五升煮取三升分三服

療崩中極重者方

牡丹 乾地黃各叁兩 艾葉 禹餘粮 龍骨

柏葉 厚朴炙 白芷 伏龍肝 青竹茹

芎 地榆各叁兩 阿膠壹兩炙 斛葉脉叁兩 芍藥肆兩

右以水八升煮取一升三合分二服相去十里久

療崩中單方 生薊根一斤半擣取汁溫服之亦可酒煮服之

又方 羊胰一具以醋煮去血服之便差忌豬魚醋滑物犯之便死

療崩中下血方出血一斛服之當差或月經來過期不止服之差

吳茱萸 當歸各二兩 芎藭 人參 芍藥 牡丹
桂心 阿膠 生薑 甘草各壹兩 半夏貳兩 麥門冬壹升
右以水一斗煮取三升為三服
夫漏血不止或新傷胎及產後餘血不消作堅使子宮門不
閉淋瀝出血經數日不止者日未可以諸斷血湯宜與牡丹丸散
等待血積消者所去淋瀝便當亦漸斷消也此後有餘傷毀不
復處此乃可作諸主治耳婦人產乳去血多傷胎去血多崩中去
血多金瘡去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛悶眩頭重目暗
耳聾舉頭便悶欲倒且宜一煮當歸芎藭各三兩以水四升煮取
二升去滓分二服即定轉續續第諸湯治之
療女人下焦冷成帶下去浣馬蹄丸方
白馬蹄炙 鱉甲 鯉魚甲 龜甲炙 蜀椒各壹兩
磁石 甘草 杜仲 萆薢 當歸
續斷 芎藭 附子 馬餘糧 桑耳各貳兩
右為末蜜丸如梧子每以酒服十丸加至三十丸日三服
療帶下白馬𩨶散方下白者取白馬𩨶下赤者取赤馬𩨶隨色取之
白馬𩨶貳兩 龜甲肆分 鱉甲參分 牡礪柒分
右為散每日空心酒服方寸匕日三服加至二匕
療女人下帶每出血方
燒亂髮末每酒調服方寸匕日三服
療暴崩中血不止方
牡礪拾分熬 兔骨參分熬
右為末酒服方寸匕日三服
療尿血方
爪甲 亂髮各等分
右三味並燒末酒服方寸匕日三服飲服亦得
又方 取水蛭壹大兩生熬末酒服一錢許日二服血消盡
又方 漏下背取槐子燒末酒服方寸匕日三服立差
又漏下黑血方

靜嘉堂文庫所藏

乾漆（熬） 麻黃 細辛 桂心（各壹兩） 甘草（貳分炙）
右擣篩末，米汁一盞服方寸匕，日三服。
又漏下赤血方
白术（拾兩） 白薇（貳分） 黃蘗（拾分）
右並為末，空心酒服方寸匕，日三服。
又漏下出黃血方
黃連 大黃 桂心（各壹分） 黃芩 乾地黃 䗪蟲（熬各壹分）
右六味為末，每日空心以酒服方寸匕，日三服。
又漏下青血方
大黃 黃芩 白薇（各壹分） 桂心 牡蠣（各壹分）
右並為末，空心以酒下方寸匕，日三服。
又漏下白血方
䗪蟲（肆分） 白斂（參分） 狗脊（貳分）
右為末，空心米汁服方寸匕，日三服。
療女人漏下積年不斷困篤方
取鵲重巢柴燒作灰，飲服方寸匕，日三服，三十日愈。
鵲去年作巢產，今年又在上作重巢產者是也。
療女人勞損積日成崩中，狀如月經來，渴斷，起止數日復發，不耐動搖，小勞轉劇，日宜與湯，湯未即與丸，發時服湯，減退即與此丸，若是疾久，亦可長與此丸方
禹餘粮 龍骨 人參 桂心 遠志（各貳兩）
紫石英 烏頭（炮） 寄生 杜仲 五味子
澤瀉 當歸 石斛 蓯蓉 乾薑（各參兩）
蜀椒 牡蠣 甘草（各壹兩）
右為末，蜜丸如梧子大，空心酒下十丸，漸加三十丸，日三服。
療女人白崩方
乾地黃（肆兩） 芎藭 桂心 阿膠 赤石脂
小薊根（各貳兩） 伏龍肝（捌兩）
右以酒六升，水四升，煮取二升，去滓，內膠待烊，攪令和，分三服，日三。
療崩中去或如豆汁方

伏龍肝（兩劑） 生薑（伍兩） 甘草 艾葉 赤石脂
桂心（各貳兩） 生地黃（肆升）
右以水一斗煮取三升分四服日三夜一數試有驗

療漏下血積日不止方
馬通汁（赤馬新出者以水漬絞取汁） 當歸 乾薑（各貳兩）
生艾葉（參兩） 好墨半丸（如彈） 阿膠（炙）
右以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去十里

療白漏不絕方
白馬蹄（末） 禹餘粮 龍骨 烏賊骨 牡蠣（各參兩）
乾地黃 附子（炮） 當歸（各參兩） 白殭蠶（壹兩）
赤石脂（伍兩） 甘草（貳兩）
右以水一斗六升煮取三升半分四服日三夜一

療女人三十六疾胞中漏下不絕白堊丸方
牡蠣 烏賊骨（各參分） 禹餘粮 白堊 白石脂
乾薑 龍骨 桂心 瞿麥 大黃
石韋 白斂 細辛 芍藥 甘草
黃連 附子（炮） 當歸 伏苓 鍾乳
蜀椒（汗） 黃芩 邯鄲白堊（各貳分）
右為末蜜丸如梧子大每日空心酒服五丸日再服加至十丸

療白漏不絕馬蹄丸方
白馬蹄（肆兩炙） 禹餘粮 龍骨（各參兩） 烏賊骨 白殭蠶
赤石脂（各貳兩）
右蜜丸如桐子酒服十丸不知加之三十丸為度

療崩中白崩不絕困篤方
禹餘粮（伍兩） 白馬蹄（拾兩炙令焦黃） 龍骨（貳兩）
鹿茸（貳兩） 烏賊魚骨（拾兩）
右為末蜜丸如梧子大每服酒下二十丸再服加之以知為度

療腹冷崩中出血不止腰背痛四肢沉重方

靜嘉堂文庫所藏

牛角䚡燒壹枚 乾地黄 桑耳 續斷 白朮
赤石脂 礬石燒 乾薑 附子炮 龍骨
當歸各參兩 人參壹兩 蒲黄 防風 禹餘粮各貳兩
右爲末，每以温酒服方寸匕，日三。
療漏下方
阿膠各肆兩 慎火草各兩 當歸 鹿茸 龍骨
右爲散，酒服方寸匕，日三。
療崩中下赤白青黑，腐臭不可近，令人面黑皮骨相連，月經失度，小腹弦急，或兩脇脹，食不生肌膚，背痛不能久立，每嗜卧方
薔薇根皮肆兩 慎火草 白石脂 龜甲炙 乾薑
桂心 細辛 當歸 芎藭 石斛 芍藥
禹餘粮 牡蠣各二兩 黄連 乾地黄各一兩 熟艾壹兩
右擣爲末，空腹酒下方寸匕，日三，加之。若寒多者加附子、椒；熱多者加知母、黄芩；白多者加乾薑、白石脂；赤多者加桂心、代赭。此衛公方，秘之。

衛公方療五崩，身瘦欬逆，煩滿少氣，心下痛，面生瘡，腰痛不可俛仰，陰中腫如有瘡狀，毛中癢，時痛與子藏相通，大便不利，頭眩項頸急痛，手足熱，氣逆衝急，煩悶不得卧，腹中急，上下腸鳴，漏下赤白青黄汁，皆是內傷所致。中寒即下赤，多飲即下黑，多食下黄，食藥即下青，或喜或怒，心中常恐，或憂勞便發動，大惡風寒，雲母散
雲母煉 芎藭 代赭 東門邊木燒各肆分
白殭蠶熬 白堊 烏賊骨 蝟皮熬各壹分 龜甲炙
桂心 生鯉魚頭燒 伏龍肝各叁分
右爲末，酒下方寸匕，日三夜一。
療墮身落胎，血下不止方
丹參捨貳兩 右以酒五升，煮取三升，分爲三服。
療崩中出血，積時不止，起死方
肥羊肉參斤 乾薑 當歸各參兩 地黄汁貳升
右以水二斗，煮羊肉取一斗三升，去肉，下地黄汁及諸藥，煮

靜嘉堂文庫所藏

取三升分四服羸瘦人服便差

療崩中下血數升方　生地黃十斤　細辛三兩

右以水六升煮取三升分為三服宜服三五劑

療崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲炙三兩　牡蠣熬三兩　右為散酒服之方寸匕日三服

又漏下方　桑耳　鹿茸三分

右以醋五升浸之炙之盡度擣末酒服方寸匕日三服

又方　燒鹿角作散酒服方寸匕日三服

又方　燒桃核為散酒服方寸匕

又方　地榆莖各指大長一尺者切以醋三升東向竈中煎極濃去滓服之

療落身後血不止方

生地黃汁一升　代赭末一匙　右地黃汁和服之分五六服

又方　桑樹中蝎蟲屎燒灰酒服之方寸匕

療漏下赤白黃不定浣衣汁方

茯苓二兩　鱉甲炙四兩　牡蠣熬六分　馬尾燒灰分

右為散空腹酒下方寸匕不知加之馬尾隨其病色

療帶下五賁方一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脈未斷爲房事則血四曰經未斷過度行步下血五曰產後藏開經利不斷

五賁之病外實內虛牛角䚡散治之方

牛角䚡燒令赤　鹿茸炙　當歸　禹餘粮

阿膠炙　乾薑　續斷各二兩　烏賊骨　赤小豆熬各一升

右擣為散以酒服方寸匕日三服

療婦人腹下十二病令絕產方一曰白帶二曰赤帶三曰經不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰藏癖七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹冷十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼交宜服此方

龍骨三兩　黃蘗　半夏　白堊　滑石各一兩

右為散酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨僵蠶赤多者加代赭小腹冷加黃蘗子藏堅加乾薑熱心已上各隨病增減

靜嘉堂文庫所藏

服藥旬日即有子也一年藥過多生兩子當審方服藥寡易
婦室廿不可妄服必作婚泆之怪也
療五崩身瘦氣痺欬逆煩滿少氣心痛面瘡腰痛不可俛仰陰中
瘡腫毛中痒時痛與子藏相通小便不利拘急頭痛手足熱氣煩
不可臥腸中鳴乃一赤白大如膠汁等之狀勞即下赤寒即下
白多飲即下黑多食即下黃多藥即下青心中常恐仍惡風寒宜
服此方
龜甲炙各參分　芎藭　雲母　代赭各肆分　白朮
生鯉魚頭炙　龍骨　桂心各貳分　白殭蠶各半兩
伏龍肝貳分　白堊　蝟皮各貳分　烏賊骨貳分
右為末每日空心酒下方寸匕日三一久病者十日差新病
者六日差頭風小腹急加芎藭桂心所加皆一倍忌生冷豬
雞毒魚肉
療崩中下血羸瘦少氣調中補益止血方
澤蘭分　藁本　厚朴　柏子人各參分　乾地黃

牡蠣各壹分　代赭　桂心　細辛　乾薑各二兩分
蜀椒汗分　甘草　當歸　芎藭各柒分　山茱萸參分
防風　蕪荑各貳分
右擣末空心溫酒服方寸匕日三神效一方加白芷龍骨各三
分人參加七分都二十味
療崩中出血及產後餘疾宜服此丹參酒方
艾葉　丹參　地黃　忍冬草　地榆各伍斤
右㕮咀搗之以水浸三宿出之去滓煮之取汁以黍米一斛炊
如釀飯法以釀酒酒熟搾之每服初且服四合已後漸添之
灸五崩法
白崩灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸內踝上三寸百壯
灸女人漏胞下血不可禁止宜灸關元兩旁相去三寸女人陰中
痛引心下及小腹絞痛灸腹儀二穴在膝外邊上一寸宛宛中
女人下漏赤白及血灸足太陰五十壯穴在內踝上三寸是

靜嘉堂文庫所藏

女人漏下赤白經月不調灸交儀二穴穴在内踝上五寸
女人漏下赤白灸營池四穴穴在内踝前後兩邊池中脉上是也
女人漏下赤白四肢酸疼灸漏陰穴在内踝下五分微動脚脉上
女人漏下赤白泄注灸陰陵四十壯穴在足毋指下屈文頭白肉際

療女人月經不調方第四

療月經不調一月二來兩月三月不來或前後閉塞不通方
杏人壹兩去尖 桃人壹兩研 水蛭叁拾枚 大黄叁兩 䖟蟲叁拾枚熬
右以水六升煑取二升分三服當有物隨大小便下多者止之少者勿止

療經年經不來爲脆中風冷所致宜下之方
牡丹 甘草 紫葳 朴消各叁兩 大黄伍兩
代赭壹兩 桃人貳兩去尖 䖟蟲 水蛭 乾薑
細辛 芒消各貳兩 牛膝伍兩 麻人伍合
右以水一斗煑取三升内芒消良久去滓分三服五更爲首相去炊頃下之將息忌入風

療久寒月經不利或多或少方
吴茱萸叁升 生薑一分 乾棗二十枚 人參 牛膝各二兩
桂心肆兩 小麥 半夏各一升 牡丹肆兩 桃人伍十枚
甘草一兩半 芍藥二兩 水蛭 䖟蟲 䗪蟲各一兩
右以酒五升水一斗煑取三升去滓適寒温一服一升日二不能飲酒人以水代之湯成乃内諸蟲不耐藥者飲七合

療月經不利腹中滿或來或少膀胱急等方
大黄二兩 桃人三十枚碎 水蛭二十枚 虎杖一兩
右以水三升煑取一升盡服之當下惡血爲度

療月經不利手足煩熱默默不欲寐心煩方
大黄六分 前胡 芒消熬 葶藶各五分熬 乾薑
芎藭各三分 蜀椒一分汗 茯苓二分 杏人一分半熬 桃人二十个熬
䖟蟲熬 水蛭各半合熬

静嘉堂文庫所藏

右爲末蜜丸飲服七丸如梧子日三加之一倍

療月經来繞臍痛上衝心胷往来寒如瘧疰方

薏苡人 牛膝 岱赭各二兩 大黄八兩 桂心八分

桃人二十个去皮尖熬 䗪蟲熬 茯苓各一兩

右八味冶篩勿宿食温酒服一錢匕日三服

療月經往来腫急腹痛方

䗪蟲四枚熬 蜀椒汗 乾薑各一分 大黄 女青

桂心 芎藭各二分 右爲散每食前酒服二七日三

療月經来不調或月頭月後如豆汁腰如折兩脚疼胞中風寒方

大黄 朴消各四兩 牡丹三兩 桃人一升去尖 人參

陽起石 茯苓 甘草 水蛭 䖟虫各二兩

右十味水九升煮取三升内朴消令烊分三服相去一食頃

治月水不調或前或後或多或少乍赤乍白陽起石湯方

陽起石 甘草 續斷 乾薑 人參

疰心各二兩 附子一兩 赤石脂一兩 伏龍肝一兩 生地黄一斤

右七味水一斗煮取三升分四服日三夜一

療月經不通方 燒月經衣井花水服之

又方 飲人乳汁三合

又方 鹿角末燒服之方寸匕

又方 生地黄三十斤搗絞汁二升服之

又方 燒白狗糞焦作末酒服方寸匕日三服

又方 白馬尿服之一升

月經不斷灸内踝下白肉際青脈上隨年壯

又方 船茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服

又方 服大豆酒亦佳

又方 服地黄酒

又方 燒鐵箕令赤投酒服之

靜嘉堂文庫所藏

第貳次十會方案第四

京都大学文学部所蔵

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


184
24
4 9

靜嘉堂文庫所藏

序例第一 乳母 初生出腹第二 變蒸驚癎第三
客忤方第四 癮疹方第五 傷寒第六
咳嗽方第七 癰結方第八 雜病方第九

序例第一

論曰夫生人之道莫不養小為大若無於小卒不成大故易云積小以成高大詩有厥初生人傳云聲子生隱公此之二義耳是從微至著自少及長人情共見不待經史設今斯方先婦人小兒而後丈夫耆老者則是崇卒之義小兒氣勢微弱醫工欲留心救療立功差難今之學者多不信意良由嬰兒在於襁褓之內乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視退而言之可為大息者矣小品方云黃帝曰人生六歲已上為小二十已上為少三十已上為壯五十已上為老其六歲已下經所不載以乳下嬰兒有病難治皆為無識據也中古有巫妨者立小兒顱顖經以占吉凶尋判疾病死生

靜嘉堂文庫所藏

世相傳受雖有小兒方焉遠于晉宋江左推諸蘇家傳集有驗流
於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今學者頗得傳授然徐
氏位望隆重何暇有留心於少小詳其方意不甚深細少有可採
未為至秘今博撰諸家及自經用有效者以為此篇凡百居家皆
宜達茲養小之術則無橫夭之禍也
論曰小兒病與大人不唯用藥有多少為異其驚癇客忤解顱不
行等八九篇合為此卷下利等餘方並散在諸篇中可披而得之
乳母者血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生也乳兒者皆
宜慎喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可悉得全但不胡臭癭
瘻氣嗽瘑疥癬瘙白禿癧瘍瀋脣耳聾齆鼻癲眩無此疾者
便可飲兒也師曰見其故灸瘢便知其先疾之源也

新生孩兒初出腹方第二　變蒸法附

凡新生出腹以指擿兒口中惡血去使洗浴斷臍〻〻竟襁
抱畢未可與朱蜜也可取甘草如中指一節許打碎以水二合煮
取一合以綿纏沾取與兒吮之如朱蜜法連吮汁可得一蜆殼入
腹兒當快吐吐去胷中惡汁也吐後消息計如飢渴須復更與之
若前服及更與並不得吐者但稍与盡此一合止如得吐去惡汁
令兒心神智惠无病也飲一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿
服與甘草乃可與朱蜜也真朱鎮心神魂魄也新生小兒慎不可
逆灸忍痛動五脉喜自成癇也河洛關中土地多寒兒喜痙其生
兒三日喜逆灸以防之又灸頰以防噤也有噤者舌下脉急牙輔
解急其土地皆決舌下去血灸頰以防噤也吳蜀地濕無此疾也
古方既傳之今人不詳南北之殊便按用之是以害於小兒也所
以田舍小兒任自然皆得無有夭橫也凡兒新生三日與朱蜜宜
與朱蜜法不宜多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癇氣急變噤痙
而死也新生與朱砂蜜法以精練真朱砂如大豆許以赤蜜以
蜆殼和之以綿纏指沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆
許取作三日以之則用三豆許也勿過此則傷兒也三日與朱

靜嘉堂文庫所藏

砂蜜竟可與牛黄如朱蜜多少也牛黄益膽除熱定驚辟惡
氣也。新生三日應開腸助穀神可研米作厚飲如乳酪厚
抄如豆大許与兒咽之頻咽三豆許止日三與滿七日可與哺飲
小兒出腹有鵝口者其舌上有白屑如米甚劇者鼻外亦有之
此由兒在胞胎中受穀氣盛故也或妊娠時嗜糯米使之然治
之法以髮纏筯頭沾井花水撩拭之三旦如此便脫去也如不脫
可煑栗蒲汁令濃以綿筯頭拭之若春夏无栗蒲可煑栗樹
白皮也依用井花水法也小兒出腹有連舌舌下有膜如石榴子
中隔連其舌下後言令兒言語不發不轉也可以爪摘斷之微有
血出無害若血出不止可燒髮作灰末傅之血便止也小兒出腹六
七日後收斂成肉則口舌喉頰裏令淨也若喉舌上有物如蘆籜
成水狀者名懸癰有氣脹起也可以綿纏長針留刃處如粟米
大以刺決之令氣泄去青黄血汁也刺之止消息一日未消又刺
之不過三日自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有著

舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭有著齒齗上者名重齗皆
刺去血汁也小兒初出腹骨肉未斂肌肉由是血也血凝乃堅成
肌肉耳其血阻敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黄也面
黄而不啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉
不斂也喜不育如此者皆宜與龍膽湯

新生浴兒法　以猪膽一枚取汁投浴湯中以浴兒終身不生瘡疥

又三日浴兒法　桃根　李根　梅根各劉分枝亦得使

右以水八升煑二十沸去滓浴兒去不祥令兒終身無瘡瘍

小兒驚辟惡浴方

金壹斤　大蟲頭骨壹枚

右以水二斗煑作湯浴但須浴煑用之

新生小兒一月內常飲猪乳大佳

養小兒法

凡兒在胎一月胚二月胎三月血脉四月頭顱骨成五月動
六月具骨七月毛髮生八月形體成九月穀氣入胃十月生六

靜嘉堂文庫所藏

十日童子成能咳笑應和人百日任脉生能自反覆百八十
日尻骨成能獨坐二百十日掌骨成能匍匐三百日臏骨成能
倚地三百六十日膝骨成能行

凡初生斷兒臍令長六寸傷風肌短則傷藏不以時斷臍若
揣汁不盡者則生寒令兒風臍

裹臍法

椎治白布令柔軟方四寸新綿厚半寸與布等令之調其緩急々
令兒吐哯兒生二十日乃解視臍若十日許兒怒啼似衣中有刺
此或臍燥還刺其腹當閉戸下帳中溫暖衣亦時令溫粉々之
此謂冬時寒也若不愈燒絳帛灰作末粉之若過一月臍汁不愈乳
兒大飽令風臍也兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如
彈丸百日如棗若乳汁少不適此法當用意小增之可二十日乃
哺令兒無疾兒早哺之多者頭面身體喜生瘡愈復發令兒
尫難養々乳兒不欲大飽々則吐 凡候兒吐者乳不飽也以空

乳乳之即消息不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒欬利毋新
房以乳兒羸瘦交脛不能行毋有熱以乳兒令變黃不能食毋
怒以乳兒令喜發驚氣疝又令上氣顛狂毋新吐下以乳令兒
虛羸也毋醉以乳兒身熱腹滿兒初生不可溫衣傷皮膚害血脉
發雜瘡而黃 凡兒冬不可浴浴則傷寒夏不可不浴々々則傷
熱小兒皆微驚以長血脉但不欲大驚々々乃灸驚脉五六十日
灸脉隨重生百日後灸驚脉乃差兒有熱不欲哺乳臥不安又欲
驚癇此之初也服紫雙丸便愈不愈復與之兒立夏後有病治之
慎不欲妄灸不欲吐下但當除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏
摩之又以膏塗之令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之

兒生落地不作聲法 取冷水一盆灌浴之須臾即作声 兒生枕
骨不成者能言而死尻骨不成者能倨而死掌骨不成者能扶伏
而死踵骨不成者能行而死臏骨不成者能立而死 兒生落地
口中有血即當去之者兒即吞之或啼病兒生身不收者死魚

靜嘉堂文庫所藏

卵者死股間無生肉者死頸下破者死陰不起者死陰囊
下白者死赤者死
小兒生死治之法　常候視兒口中懸癰前上腭有赤胞者以指
取少溫揩取頭決潰勿令血入咽入咽殺兒急急慎之小兒始
生當即舉之舉之遲晚則令中寒腹中雷鳴先浴之然後乃斷臍斷
臍當令長至足夫短則中寒令腹中不調常利若先斷臍乃浴之
則臍中水中水則發腹痛若臍中冷也臍上與中水同病
臍中水若中冷則腹絞痛夭紏啼呼面目青黑此是中水之過當
灸粉絮以熨之不時治護臍至腫者當臍中隨輕重重者便灸
之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者當搗
當歸散粉末傅之灸絮日熨之耳熨之或至百日乃愈以啼呼止
為候又不當數數浴背冷則發癇若不浴小兒毛落也凡浴小
兒湯水冷熱調冷熱失所令驚亦致五藏疾也小兒滿三十日乃當
哺若早哺之兒不勝穀氣令之生疾病食多更耗三十日後雖

哺勿多若不嗜食勿強與之強與之不消復生疾病哺乳不進腹
中有痰癖也以四物紫丸微下之節乳哺數日便自愈小微寒熱
亦當將利之下然後乃差　凡小兒之癇有三種
有風癇　有食癇　有驚癇也然風癇驚癇時時有耳十
人之中有一兩是風癇驚者　凡寒發熱癇者皆是食癇也
驚癇當按圖灸之風癇當與豬心湯食癇當下乃愈紫雙丸
佳　凡小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱不見
日則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣之勿新綿也天和
暖無風之時令母將於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢
密堪耐風寒不致疾病若藏在帳中重衣溫暖譬猶陰地之草
不見風日軟脆不堪風寒也　凡兒不能乳哺當與紫雙丸下之小
兒氣盛有病但下之必無所損若不時下則將成病固難治矣下
四味雙丸最善雖下不損人足以去疾耳若四味不時下者當以
赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍

靜嘉堂文庫所藏

骨湯稍〻服之幷摩赤膏風癇亦當下之然當以猪心湯〻驚癇
但灸之及摩生膏不可大下也驚癇心氣不定下之內虛益令甚爾驚
癇甚者特為難治故養小兒常慎驚勿令聞大聲抱持之間
當安徐〻勿令怖也又天雷時當塞兒耳并作餘細聲以亂之也
凡小兒所以風者衣暖汗出風因而入也風癇者初得之先屈指如
數乃發作者〻風癇也起於驚怖大啼乃發作此驚癇也驚癇
微者勿急持復驚之或自止其先不哺乳吐變熱後發癇〻此食
食癇〻〻早下則差四味紫丸逐癖飲最良去病速而不虛人
赤丸差駃病重者當用之小兒衣甚薄則腹中乳食不消〻〻大
便皆醋臭〻〻此欲癖之漸也便將紫丸以微消之服法先
從小起常令大便稀勿大下也稀後便漸減之不醋臭乃止藥
也　凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不下〻
後腹中常似小脹滿故當節哺乳數日不可妄下〻又乳哺小兒常
令多少有常劑兒〻大當稍增之乃減者此腹中已有小不調也便

小服藥停哺與乳甚者十日許微者五六日止哺若不肯而欲乳
者此癖為重要當下之無不差也不差則致寒熱或吐而發癇或
更致下利此皆病重不早下之所為也即難治療矣但先治其輕
時兒不耗損而病速愈矣凡小兒屎黃而臭者此腹中有熱宜微
將服龍膽湯若白而醋者此挾寒不消也當服紫丸微者少與藥令
內消甚者小增令小下皆須節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺
則病易復〻下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過此傷
矣
凡小兒有癖其脉大必發癇此為食癇下之便愈當審候掌
中與三脉不可令起而不時下致於發癇則難療矣若早下之
此脉終不起也脉在掌中尚可早療若至指則病增也凡小兒腹
中有疾生則身寒熱〻〻則血脉動〻〻則心不定〻〻則易驚〻〻則
癇發速也

小兒變蒸候　凡兒生三十二日始變〻者身熱也至六十四日
再變〻且蒸其狀卧端正也至九十六日三變者候丹孔出

靜嘉堂文庫所藏

而咄至一百二十八日四變〻且蒸能咳笑也至一百六十日
五變以成機關也至一百九十二日六變髕骨成也至二百二十
四日七變以能匍匐至二百五十六日八變〻又蒸以欲學語至二
百八十八日九變以亭〻然也凡小兒生至二百八十八日凡
九變三蒸也當其變之日慎不可妄治之即加其病變且蒸者是
兒逆迎月也蒸者甚熱而脈亂汗出是也近者五日歇遠者八九
日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也　神農本草經云小兒驚
癇有一百二十種其證候微異於常便是癇候也初出腹血脈
不斂五藏未成本非為病也時不成人身其經變蒸之候有驗
發並覓啼中風最為卒也小兒四肢六驚氣息小異欲作癇
及變蒸日滿不解者並宜龍膽湯也　小兒驚啼眠中四肢掣動
變蒸未解慎不可針灸爪之動其百脉仍因驚成癇也唯陰癇
噤痙可針灸爪之耳小兒未能冒涉霜雪者乃不病傷寒也大
人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦往〻之有

時行疫癘之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大
人法但用藥分劑少異藥小冷耳

療驚癇病方第三

少小所以有癇病及痙病者皆由藏氣不平故也新生即癇者
是其五藏不收斂血氣不聚五脈不流故也多不全育其一月四
十日已上至期歲而癇者亦由五脈不流骨怯不成亦由乳養失
所為風邪所中也病先身熱掣瘲驚啼叫喚而後發癇成病脈
浮者為陽癇內在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣
不啼喚而成病發時脈沈者為陰癇內在五藏及在骨髓極難
治也病發身軟時醒者謂之癇也身強直反張如弓不時醒
者謂之痙也凡脈浮之與沈以判其病在陰陽表裏耳其浮沈
復有大小滑濇虛實遲快諸證各依脈為治

候癇法　夫癇病小兒之惡病也或有不及求醫而致困者也
然氣發於內必先有候常宜審察其精候也手白肉魚際

靜嘉堂文庫所藏

脉黑者癎候魚際脉赤者熱脉青大者寒脉青細為平也鼻口乾燥大小便不利是癎候眼不明上視喜陽是癎候耳後完骨上有青絡盛臥不靜是癎候青脉刺之令血出也小兒髮逆上啼笑而脂色不變是癎候也鼻口青時小驚是癎候鼻熱小便難面黃而目閉青時小驚是癎候身熱頭常汗出是癎候身熱吐哯而喘是癎候身熱目時直視是癎候臥惕惕而驚手足振搖是癎候臥夢笑手足動搖是癎候意氣下而妄怒是癎候咽乳不利是癎候目瞳子卒大黑於常是癎候喜欠目上視是癎候身熱小便難是癎候身熱目視不精是癎候吐利不止厥痛時起是癎候已上諸候二十條皆癎之初也見其候便爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足絕脉亦依方與湯　直視瞳子動腹滿轉鳴口噤不得乳反張脊強下血身熱瘈汗出發熱為臥不悟手足掣瘲喜驚凡八條癎之劇者也如此非復湯爪所能救便當時灸之

灸法　凡反張大人脊下容側手小兒容三指者不可復治也若目反上視眸子動當灸囟中取之法橫度口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口為度從額上髮際上行度之灸頭一處三十日兒可五壯兒小大以意增減正在囟上未合骨中隨手動者是也最要處也次灸當額上入髮二分許直望鼻為正灸五壯次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分許各五壯次灸頂上迴毛中次灸客主人客主人在眉後際動脉是次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷是也次灸兩耳上一捲耳取之當捲耳上頭是也　一法大人當耳上橫三指小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脉亦可以針刺令血出玉枕項後高骨是也次灸風府當項中央髮際陷中是也次灸兩風池在項後兩轅動筋外髮際陷中是也風府亦可與風池三處高下相等次灸頭兩角兩角當迴毛兩邊起骨是也右頭部凡十三處兒生十日可灸三壯三十日可灸五壯五十日

可壯七壯重者可灸之輕者唯灸纏中風池玉枕也艾使熟壯令
平正著肉火勢乃至病所也艾若生壯不平正者不著肉徒灸多壯故無
益也　若腹滿堂氣轉鳴灸太倉兩募募在兩乳上第二肋間宛
宛中懸繩取之當瞳子是次灸亶中次灸胃堂次灸太倉息く
在兩乳下第一肋間宛く中是也次灸巨闕く大人去鳩尾下
一寸小兒去臍作六分分之去心亦鳩尾下一寸是也并灸兩邊
次灸金門金門在谷道前囊之後當中央是也從陰囊下度至大
便孔前中分之[illegible]次灸臍上一百壯
右腹部十四処胃堂巨闕胃管十日兒可至三壯一月兒已上可五
壯陰下從縫中可五壯或云隨年壯若脊強反張灸大椎并灸諸
藏俞及督脊上當中從大椎度至窮骨中屈更從大椎度之灸下
頭是督脊也　若手足掣瘲驚者灸天澤次灸陽明次灸勞宮
次灸心主次灸合谷次灸三間次灸少陽次灸少商
右手部十六処其要者陽明少商心主天澤合谷少陽也壯數

如上　又灸伏兎次灸三里次灸鹿谿次灸陽明次灸鉄谷次灸
少陽　右足部十四處皆要可灸手足陽明謂人四指凡小兒驚
皆灸之若風病不動手足瘈瘲者灸手足十端又灸本節後
癇有五藏之癇六畜之癇或在四肢或在腹内審察其候隨病所
在灸之雖少必差即若失其要則為害也癇發平旦者在足少陽
日中發者在手太陽暮發者在足陽明黃昏發者在足太陽半
夜發者在足少陽日辰伏發者在足厥陰　右癇發時病所在視
其發早晩灸其所也　肝藏癇之為病面青目反視手足搖當灸
陽明太陰灸之三壯心癇之為病面赤心下有熱短氣微數灸心
下第二肋端宛宛中此為巨闕又灸手心主及少陰各三壯脾癇
之為病面黃腹大喜利灸胃管旁灸二壯足太陰各二壯肺癇之
為病面目白口沫出灸肺俞三壯又灸肺中二壯太陰二壯腎癇
之為病面黑直視不搖如尸狀灸心下二寸三分三壯灸肘中動脉
各三壯鬲癇之為病目反四肢不舉灸風府又灸項上鼻人中下

靜嘉堂文庫所藏

唇承漿皆隨年壯腹癇之為病不動指灸兩承山又灸足心兩
勞宮又灸兩耳後完骨隨年壯又灸臍中可五十壯

右五藏癇證之候　馬癇之為病張口搖頭如驚鳴欲反折灸
項風府齊中三壯病在腹中燒馬蹄眼之良　牛癇之為病目
正直視腹脹灸鳩尾骨及大椎各三壯燒牛蹄末眼之　鶏癇之
為病搖頭反折喜驚自搔灸足諸陽各三壯　羊癇之為病喜吐
塌目吐舌灸大椎上三壯　猪癇之為病手屈兩足攣灸手心三壯足太陽三壯
灸肋尸一壯聊頭兩室各三壯　灸小兒癇者兩乳頭女兒灸
乳下二分　治小兒癇者身軀正直如死人及腹中雷鳴灸六倉
及臍中上下兩旁各一寸凡六處又灸當度腹取臍以繩繞頭下
至齊中竭便轉繩回背脊下行盡繩頭灸兩旁各一寸凡一在壯
右六畜癇形候若面白啼色不變灸足陽明太陰
論曰凡灸癇當先下兒使虛乃承虛灸之未下有實而灸者風邪

前後不通殺人訴候小兒法
若病家發始便來請師〻可訴候所解為法作次序治語甚節度
首尾取差證也病家以經雜治無次序不得制疾病則變異其本
候後師便不知其前證虛實真依其後候治亦不得差也應安精
問察之為前師所配依取其前蹤續以為治乃先逆耳前師處湯
本應數劑乃差而病家服一兩劑未效便謂不驗耳復更問他師
師不尋前人為治寒溫次序而更為治而不次前師治則弊也或
前已下之後須平和接之而得差者或前人未下之或不去者或
前治寒溫失度者後人應調治之是為治敗病皆須邀射然後免
耳不可依次第及重弊也
龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒溫壯熱四肢躁鸣制毒發熱大
吐哯者良若已能匍匐食實不消壯熱乃變蒸不解中客人
癘氣諸雜癇方悉主之十歲已下小兒皆服之小兒龍膽湯第一
此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次此為例若必知客忤及

靜嘉堂文庫所藏

有賊氣者可加人參當歸各如龍膽分多少也百日兒加半分三百日兒加一分一歲兒二分餘藥皆同

龍膽　芍藥　柴胡　黃芩　桔梗
甘草炙各一分　蜣螂熬二枚　大黃四分
右以水一升煮取五合為劑也服之如後節度藥有虛實賁虛藥賁足數合水也兒生一日至七日分取一合為三服兒生十六日便停也兒生八日至十五日分取一合半為三服兒生十六日至二十日分二合為三服得下餘便停兒生三十餘日至三十日者分取三合為三服得下便止兒生三十日盡四十日盡以五合為三服十歲亦準此

調中湯治小兒春夏秋月晨夕中暴冷之氣折其血熱氣不得泄則壯熱後氣入腹變下利或有赤白滯起數矢小腹脹痛拘急氣脉洪大或急數者服之熱便散下亦差也但壯熱不已下者方亦主之其兒百日二百日加藥一如前方

黃芩　茯苓　桔梗　芍藥
白朮　葉本作書　大黃貳分　甘草壹分炙

右以水二升煮取五合服如後法

兒生一日至七日取一合三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二十日至三十日取三合分三服生三十日至四十日以五合分三服恐五合未得自斟酌

右此二方準一日已上四十日已來兒方法具此後欲處方者宜一準此為率八至五六歲皆節級加減之不煩重述

治少小中風手足拘急二物石膏湯方

石膏碎雞子大壹塊
真珠壹兩

右以水二升煮石膏伍陸沸內取真珠煮取一升稍稍分服之

治少小中風脉浮中熱白汗出項強鼻鳴乾嘔五物桂湯方

桂心　甘草　芍藥　乾棗拾箇　大黃壹分

右以水三升煮取一升分三服
治少小新生中風二物鹽毛敷方
鹽毛取前胥交脊十莖
麝香如二豆大二味以乳和銅器中火煎令燋熟出末之小兒
不能飲以乳汁和之著筒射寫著咽中然後飲乳令入腹
茵芋治少小有風癎疾至長不除天陰節變便發動食飲堅強
亦發百脉攣縮行步不言正語不便服之永不發方
茵芋葉　鉤毗　秦膠　弟藤　石膏　杜衡
防葵各四兩　黃芩各陸兩　松羅貳分　蜣螂拾枚　甘草十四分
右揭末蜜丸如小豆大三歲已上服五六丸五歲已上服十丸
十歲已上可至十五丸漸加
療客忤方第四
少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是為客忤
迫雖是家人或別房異宅雖是乳人父母或從外還衣服經履鬼
神觸惡悪鼻氣牛馬之氣皆為忤也熱作喘息乳氣未定者皆客
忤之其乳母遇醉及房士喘後即乳兒最劇能殺兒也
小兒客忤慎忌法　凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮復中亦
爾白衣青帶皆令中忤若吐不止可用粉丸如豉法並用唾之呪
如左呪曰摩家公摩家母摩家子兒苦客縱我始翁鵲雖良不如
善唾良唾訖棄之道中　又方取一刀橫著竈上解兒衣發其
心腹訖取刀持向兒呪之唾輒以刀擬向心腹咄咄咄曰煌煌日出
東方背陰向陽葛公葛公不知何公子來不視去不顧過與主人
逆梁上壓天之神戶下鬼所經大刀鍛石斬竈君二七唾客愈兒
驚唾咄咄如此二七咄咄每唾以刀擬之呪當三遍乃畢用豉
丸如上法五六遍訖取此丸破視其中有毛棄丸道中客即愈矣
小兒卒客忤方　銅鑼鼻燒令赤著少許酒中大兒飲之小
兒不能飲者含之即愈　又方
馬尿三升燒令煙絕以洒三升煮三沸去滓浴小兒愈

靜嘉堂文庫所藏

少小兒所有鬼病者是褱身人惡神導其腹中胞胎妬嫉小兒也
姙娠婦人不必悉招魃魅又時有此身魃之為嫉喜微微下寒熱
或有去來毫毛髮鬢鬇鬡不悅是其證也
小兒中客有為病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病者
豈是一切小兒悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋夏多病者秋
夏小兒陽氣在外血脉嫩弱秋初夏末晨夕時有暴冷小兒嫩弱
其外則易傷寒冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢是故夏末秋
初小兒多熱而痢下是也未必悉是中客及魃也若治少小法夏
末秋初常宜服天氣温涼也有暴寒卒冷者其少小則多患壯熱
而下利也慎不可先下之皆先殺毒後下之耳
凡中客之為病類皆吐下青黃白色水穀解離腹痛夭矯面色變
易其常候似癇但眼不止看耳其脉急數者是也宜與龍膽湯下
之加人參當歸各依如龍膽秤分等多少也小兒中客急視其
口中懸癰左右當有青黑腫脉核如麻豆大或赤或白或青如此
便宜用針速刺潰去之亦可以爪摘決之并以綿纏釵頭拭去血也
玄中記云天下有女鳥名曰姑獲又名鈎星鬼也喜以陰雨夜過
飛鳴徘徊人村里喚得來者是也鳥淳雌無雄不產陰氣毒化
生喜毛羽落人中庭置人兒衣中便兒作癎病必死便化為其兒
也是以兒年至十歲衣被不可露七月八月尤忌之
治小兒寒熱及赤氣中人二物猪蹄散方
猪後懸蹄燒末以乳汁飲一撮立効
治少小客忤不知人
取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下便愈
治少小兒人來卒不佳腹中作聲者二物燒髮散方
用向來者人頭髮十莖斷兒衣帶少許合燒細末飲兒即愈
治少小夜啼一物前胡丸方
前胡隨多少搗末蜜和丸如大豆服一丸日三薄荷湯下
又方
以姙娠時食飲偏有所思物以哺兒則愈
凡小兒未能行而母有娠小兒有不佳者名為魃亦以伏翼熱嚼哺之

靜嘉堂文庫所藏

又方 燒伏翼末飲服之 又方 水二升煑冬瓜壹箇取一升浴之
治小兒驚啼方 取雞屎白二飲服之
又 燒蝟皮服以意服之 又 臘月纏猪繩灰服之
又 燒蝟皮灰參寸末著乳頭飲之 又書驢脂內口中及齊中
治小兒夜啼法 交道中土伏龍肝各一把末和少許飲服
又 取馬骨灰付乳上飲之
治小兒夜啼不已醫所不治方
取狼屎中骨燒末以水服如黍米粒大一枚即定
龍角丸主小兒五驚夜啼方
龍角 壹分 牡蠣 壹分 黃芩 貳分 蚱蟬 貳枚炙
牛黃如小豆大伍枚 川大黃 壹分
右搗蜜丸褥裹兒服二丸丸如麻子粒大乳下
治少小夜啼至明即安寐芎藭散方
芎藭 白朮 防巳 各貳

右爲散二十日未能服散以乳汁和之服如麻子一丸兒大能
服散者以意酌之
治少小中客忤之爲病吐下青黃白汁腹中痛及外劇偃喘似
癇但目不上搖身面變五色脉之急若失時不治小兒難治也
以豉數合杪溫熟搗丸如雞子大以摩兒顖上手足心各五六遍
畢以摩兒心及齊上下行轉摩之食頃破視其中當有細白
毛棄擲道中痛即止 凡諸乘馬行得馬汗氣臭不與洗
易衣裳而便在兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及鳴驚小兒及
馬上物馬氣皆令小兒中馬客忤慎護之特重一歲兒也
凡非常人及物從外來亦驚小兒欲防之法謂有從外來人及有
異物入當持兒避之勿令見也若不避者中之燒牛屎令常有氣
署之立前差
治少小中客忤強項欲死方
取衣中白魚拾枚爲末以傅母乳頭上令兒飲之入咽立愈一

靜嘉堂文庫所藏

末三枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦以塗兒頂及脊強
處

治少小客忤二物黄土塗頭方

竈中黄土 蚯蚓屎等分搗合水和如雞子黄大塗兒頭上及五心良

又方 吞麝香如大豆許立愈

治少小卒客忤臨發作者方 以母月衣覆兒頭上大良

治少小客忤驚啼壯熱白鮮皮湯方

大黄 白鮮皮 甘草各四銖 芍藥 茯苓 細辛 桂心各三銖

右八味以水二升煮取九合分三服

治小兒卒中忤方

剪取驢前膊胛上旋毛大如彈子以乳汁煎之令毛消藥成著乳頭飲之下喉即愈

又 燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

又 取牛鼻汁服之

又 取牛口沫付乳頭飲之

治小兒疰方 竈突中灰 三指撮鹽等分服之乳下

療癰疽瘰癧方第五

漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡氣瘰癧方

漏蘆 連翹 白歛 芒消 甘草炙各六銖 大黄一兩 升麻 枳實 麻黄去節 黄芩各十八銖

右十味以水一升煎取五合兒生一日至七日取一合分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分三服三十日至四十日取五合分三服

五香連翹湯治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不擧白丹走竟身中白疹瘙不已方

青木香 薰陸香 雞舌香 沉香 麻黄 黄芩各六銖 大黄八分 麝香半分 連翹 海藻 射干 升麻 枳實各六銖 竹瀝三合

右十二味以水四升煮藥半內竹瀝煮取一升二合兒生百日至二百日

靜嘉堂文庫所藏

日一服二合二百餘日至廿四五歲一服二五合
五香枳實湯治小兒苦風熱瘡癰堅如麻豆粒者痒搔之皮
剝汁出或竟身頭面年年常發方
青木香二兩半 麝香壹分 雞舌香 薰陸香 沈香各二分
升麻 黃芩 白斂 麻黃各四分 漏蘆
防風 秦膠各八分 枳實六分 大黃廿分
右以水三升煮取一升八合兒一五六歲者一服四五合七八歲
者一服六合十四五者加大黃二分足水煮取二升半分三服
連翹丸治小兒無寒熱強健如故而身體頸項結核瘰癧及心胸脹皆
裏有堅核不痛名為結風氣腫方
連翹 白及 白頭公 牡丹 防風 黃蘗
桂心 豉 獨活 秦膠各四分 海藻貳分
右搗蜜丸如大豆三歲兒飲服二丸五加至十丸五歲已上者以
意加之

枳實丸治小兒病風瘙痒痛如疥瘙之汁出身瘔瘟如麻豆粒年
年喜發面目腫起手足乾枯毛髮細黃及肌膚不澤先生鼻氣不
利此則少時熱盛體極當風中風熱相薄所得也不早治成
大風疾方
枳實一兩 菊花 蛇床子 防風 白微
蒺藜子各四分 天雄 麻黃 漏蘆各二分 浮萍四分
右搗蜜丸如大豆大五歲飲服十丸加至二十丸日二五歲已
上者隨意加減之兒大者可作散服
小兒一切頭瘡久即疽痒不生痂藜蘆膏方
藜蘆 黃連 雄黃 黃芩
松脂各二兩 豬膏半斤 白礬三兩燒令汁盡
右煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗之訖傅之赤龍皮槲樹皮是也
治小兒疽極月初新生蕎黃水出方
酢和油煎令如粥及熱傅之三日一易欲重傅則以皂莢湯

靜嘉堂文庫所藏

洗瘡乃傳之

小兒瘻瘡方　冢中石灰傳之厚著

又方　桑葉并燒灰三白作灰相和傳之

治傷寒方第六

治小兒滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆麥門冬湯方

麥門冬　石膏　寒水石各十二分　甘草各貳分　桂心壹分

右以水二升半煮取一升一服一合日三

治少小傷寒芍藥四物解肌湯方

芍藥　黃芩　升麻　葛根各貳分

右以水三升煮取九合分四服期歲已上分三服

治少小傷寒未發熱咳嗽頭面熱者麻黃湯方

麻黃　生薑　黃芩各三　甘草

石膏　芍藥各貳　杏人拾箇　桂心貳分

右以水四升煮取一升半分二服兒若小以意加減之

治小兒肉中久宿癖瘦瘠熱進退休作無時大黃湯方

大黃　甘草　芒消各貳分　桂心捌分　石膏壹兩　棗伍枚

右以水三升煮取一升每服一合

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀不化方

大黃　黃芩　甘草　芒消　麥門冬各貳分　石膏壹兩

桂心八銖　右以水三升半煮取一升半三服期兒五服

治少小兒傷寒方

葛根汁六合　淡竹瀝陸合　右二味相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服之然服佳若得汗氣桃葉三兩搗以水五升煮十沸取汁日五六遍淋之若復發燒雄鼠屎二七枚服

治小兒傷寒發黃方

搗土瓜根汁三合服又搗青麥汁服之

小兒身黃　搗韭根汁澄清滴兒鼻中如大豆許

治小兒久病不除復極瘦瘠骨立五味湯方

靜嘉堂文庫所藏

五味子拾銖 甘草 當歸各貳分 大黄陸分 芒消伍分
麦門冬壹分 黄芩壹分 前胡壹分 石膏壹两
右以水三升煮取一升半分服二合再服得下便止隨兒加減之
升麻湯治小兒傷寒变熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急大小
便不利或口瘡者或因壯熱便四肢攣掣驚乃成癇疾發醒身
熱如火者悉主之方
升麻 白薇 麻黄 萎蕤 柴胡
甘草各貳分 黄芩肆分 朴消 大黄 鈎藤各壹分
右以水三升先煮麻黄去上沫内諸藥煮取一升兒生三十日
至六十日一服二合六十日至百日一服二合半百日至二百
日一服三合
治小兒夏月患腹中伏熱壯温有來往或患下利色或黄三
焦不利竹葉湯方
竹葉切伍合 小麦伍合 柴胡貳分 黄芩伍合

茯苓參分 人參 麦門冬各貳分 甘草貳分
右以水四升煮竹葉小麦取三升去葉麦下諸藥取一升半分
三服 若小兒夏月忽壯熱燒人手洞下黄溏氣力惙然脉
極洪數用此方加大黄八分再服得下即差
治少小傷寒茵草浴湯方
茵草伴 牡蠣四兩 大黄壹兩 雷丸參十枚 蛇床子壹升
右以水三斗煮取一斗半適寒温以浴兒避眼及陰處忌之
治小兒卒寒熱不休不能服藥茵草浴湯方
茵草 丹參 桂心各參兩 菖蒲伴 蛇床子貳兩 雷丸壹升
右以水二斗煮之三五沸適寒温以浴兒避目及陰二處
治小兒忽寒熱雷丸湯浴之
雷丸貳拾枚 大黄四兩 苦參三兩 黄芩壹兩 丹參貳兩 石膏參两
右以水二斗煮取一斗半浴兒訖以粉粉之勿厚衣一宿更避目
治少小身熱李葉湯浴方

靜嘉堂文庫所藏

李葉无多少皆咀以水煮去滓浴兒良
治少小兒中人忤一物猪通浴方
猴猪通二升以熟湯灌之汁適寒温浴兒
治少小兒中人忤馬通浴兒方
馬通三升火燒令烟盡以酒三升煮三五沸止以浴兒便愈
治小兒暴有熱得之三日李根湯浴方
李根　桂心　芒消各貳　甘草肆　麥門冬肆分
右以水三升煮取一升分五服
治小兒寒熱進退啼呼腹痛生地黄湯方
生地黄　桂心各捌分
右以水二升煮取一升半暮歲已下服二合已上三合
治少小身體壯熱十二物寒水石粉方
寒水石　芒消　滑石　石膏　赤石脂　青木香
大黄　甘草　黄芩　防風　芎藭　麻黄根各等分

右搗粉一升藥末三合和復以篩之粉兒曰三七
治少小有熱不汗二物雷丸通汗散方
雷丸肆兩　粉半升　搗和下篩以粉兒身
治少小頭汗二物茯苓粉散方
茯苓　牡蠣各肆兩　兒有頭汗輒以粉粉之
治少小盜汗黄連粉方
黄連　牡蠣　貝母各參　右搗為粉以粉兒身
治少小心腹熱丼參赤茯方
丼參　雷丸　芒消　戎鹽　大黄各貳兩
右以苦酒半斗浸四味一宿以猪肪一斤煎三下乃消絞去滓以摩心下冬月可用一方但用丼參雷丸佳也
治少小所生肌膚初弱喜為風所中身壯熱或中一風手足驚引五物甘草一摩膏方
甘草　防風各壹兩　白朮　桔梗貳拾銖　雷丸叁兩

靜嘉堂文庫所藏

右擣下細篩以水中猪肪一斤煎令膏合藥微火煎之消
息視剛濯之和丸如彈丸大一枚用以摩兒百徧寒者
更熱之熱者更寒小兒雖無病早起常以少膏摩身上及手足
辟寒風

地膚湯小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澁痛不
出出少如血須臾復出方

地膚草 瞿麥 知母 黄芩 枳實 升麻
葵子 猪苓各二兩 海藻 通草各一兩半 大黄三兩

右水一升半煑取五合一日至七日兒分一合為三服八日至十
五日以一合半為三服十六日至二十日兒以二合為三服乃上
四十日兒以五合為準餘長兒以意加減其藥及益水分數

常山湯治温瘧方

常山一兩 小麥三合 淡竹葉切一升

右水三升煑取一升外四十日兒至六十日兒以六合為三服六
十日至百日兒一服二合半百日至二百日兒一服三合其一
歳至七八歳益藥以此為率

又方 生麋角末發時便服一刀圭
又方 燒鼈甲酒服方寸匕發時三匕
又方 燒雞肶胵中黄皮末乳服男雄女雌
又方 灸兩乳下一指三壯

治小兒一月至五月乍寒乍熱方

細切柳枝煑取汁洗兒若渴絞冬瓜汁服之

療咳嗽方第七

論曰小兒生出三百日頭身患小小瘡治護小差復發五月中
忽小小咳嗽復温和治之並差瘤一日二十過發四肢縮動背脊
躭躭眼反須臾氣絶良久復蘇已與常治瘤 勿得快吐下經日
不間尔後單與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小歇明
日與此竹瀝湯吐下後便大折其間稍稍與竹瀝後經一日次

靜嘉堂文庫所藏

與後方得吐便都不復發方

竹瀝伍合　黄芩伍分　木防已　羚羊角各壹分　大黄八分

茵芋半分　麻黄　白微　桑寄生各參分

右以水二升半煮取一升三合內瀝煮一沸分服二三合相去一食久

紫菀湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣喉咽鳴氣逆者或惡

寒清水出者良方

紫菀　杏人各貳分　麻黄　桂心　橘皮

青木香各一分　黄芩　當歸　甘草各二分　大黄陸分

右以水三升煮取九合六十日至百日兒一服二合半二百日

兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣逆不得喘息面青喘迫方

五味子　當歸各二分　麻黄　乾薑　桂心　人參

紫菀　甘草各二分　細辛　款冬各半分　大黄六分

右水二升半煮取九合兒六十日已上至百日服二合半二百

日一服三合其大黄別浸一宿下

治少小嗽方

生薑七兩　乾薑二兩　桂心二兩　甘草三兩

杏人一升　款冬三兩　紫菀三兩　蜜壹升

右合諸藥火上煎取使如飴餔含如棗大一枚咽汁日四

五小兒減百日者如半棗甚有効

治小兒嗽日中差夜甚初不能復啼款冬丸方

款冬花　紫菀各六分　桂心半兩　伏龍肝一分

右蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令兒飲之日三傅之漸漸令

兒飲之

治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴菖蒲丸方

菖蒲　烏頭　杏人　礬石　細辛　白英各四分

款冬　乾薑　桂心　紫菀各三分　蜀椒伍分　吳茱萸六分

右蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十丸日三兒小以意減

靜嘉堂文庫所藏

之兒大以意加之暴嗽數服便差

桂心 甘草十分 紫菀三分 麥門冬去皮七分
右以水三升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過与之節乳哺

治少小風入肺嗽晝夜不息小差夜則甚食則吐不下五味湯方

五味子 甘草 人參 當歸 麻黃
桂心 紫菀各三分 細辛 乾薑各一分 大棗伍枚
右水三升煮取一升分二合百日小兒可服一合神妙亦可內款冬花三分

治少小卒肩息上氣不得安此惡風忽入肺麻黃湯方

甘草壹兩 麻黃四兩 桂心伍分 五味子半升 半夏二兩洗 生薑貳兩
右水五升煮取二升百日兒服一合三年大小節度服之梗愈

療癥結方第八

治妊娠氣吐下逆乳哺霍香湯方

霍香去兩 生薑叁兩 青竹茹三分 甘草貳兩
右水二升煮取八合每服一合日三有熱如升麻貳分

治小兒五六日不食氣逆橘皮湯方

橘皮三兩 薤白伍兩 黍米任合 桂心半兩 人參半兩
右水七升先煮薤米次下藥煎取二升稍稍服

治少小胷下有氣內痛喘逆氣息難往來寒熱不食馬通粟方

馬通中粟叁分 杏人 紫菀 細辛各貳分 石膏
秦膠 半夏 茯苓各壹分 五味子各壹分
右蜜丸服如小豆十九日三服不知加至三十丸飲服

治少小腹脹滿方

韭根汁和豬脂煎細細服之

又方

車轂下脂和輪下土如小彈丸吞之立愈

又方

米粉和鹽等分炒變色腹上粉之

靜嘉堂文庫所藏

治小兒胎寒嗢啼腹中痛舌上黒青涎下當歸丸方
當歸 吴茱萸 蜀椒各貳分 細辛 乾薑
附子各三分 狼毒壹分半 豉柒合 巴豆拾箇熬
右擣末捶藥末令等去豉末巴豆如膏以蜜旋旋内治令相得丸極盛蒸五升米飲下出擣一千杵一月兒服如黍米一丸日二不知稍加之
治小兒異嗄滴欲死半夏丸方
半夏隨多少微火炮擣末酒和服如粟米粒大五丸日三服
治小兒宿乳不消腹痛驚啼牛黄丸方
牛黄三銖 大附子貳枚 真珠壹兩 巴豆壹兩 杏人壹分
右擣附子真珠為末巴豆杏人治如泥内藥及牛黄擣一千二百杵藥成如未成丸加蜜擣百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服三取兩上下悉當微轉藥完出有病愈散出者更服以藥完出為度

治小兒宿食癖痰往来寒熱不欲食芒消丸方
芒消熬 大黄各四兩 半夏貳兩 代赭壹兩
甘遂貳兩 巴豆二百枚去心皮熬 杏人一百二十枚
右七味擣為末巴豆杏人治如膏旋内藥末擣三千杵令相和強者内少蜜百日兒服如麻子一丸過百日至一歲每服二丸隨兒大小以意斟酌量度當候兒大便中出藥為愈若不出更服如初
治八歲巳上兒熱結痰實不能食自下方
芍藥 支子各肆分 柴胡肆分 升麻 黄連 黄芩各十分
竹葉切一升半 桔梗六分 細辛二分半 知母 大黄各十二分
右水六升煮取一升八合分四服十歲兒三服
治十三四至十五巳上熱結多痰食飲少自下方
大黄 柴胡 黄芩各十分 枳殻 升麻 芍藥
知母 支子各八分 生薑十二分 杏人八分 竹葉切壹升半

靜嘉堂文庫所藏

右水六升煮取二升十歲至十五歲者分三服
治小兒結實乳食不消心腹痛紫雙丸方
牛黃　太山甘遂各二分熬　真珠壹分　杏人
芍藥　黃芩各肆分　巴豆叁分去心皮熬
右搗篩蜜丸一歲兒服如麻子三丸但隨兒大小加減之茶下
治小兒霍亂吐利方
人參四分　厚朴　甘草　白朮各二分　右水一升二合煮取
半升六十日兒服一合百日兒及朞歲分三服三歲分二服
治小兒痰實結聚麥門冬紫雙丸方
甜人二百　麥門冬肆分　巴豆四拾枚　丹砂叁分
右蜜丸朞歲兒服二丸如小豆大三百日兒服如麻子二丸荊芥湯下
治小兒羸瘦㦖㦖宜常服不妨乳方　甘草伍兩一半炙
右蜜丸一歲兒服如小豆十丸日三服盡即更合飲服
紫雙丸治小兒身熱頭痛食不消腹脹滿或心腹絞痛大小便不
利或重下數起小兒無異疾唯飲食過度不能自止哺乳失節或
驚悸寒熱唯此丸治之不差更可重服小兒欲下其是蒸候哺
食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他
別藥數用神驗千金不傳方
巴豆十八銖用別研　麥門冬十銖　甘草五銖　甘遂貳銖
真珠壹銖　蠟如豆大七　蕤核十八銖　牡蠣八銖
右八味以湯洗巴豆研新布絞去油別搗甘草甘遂牡蠣麥門冬
下篩訖治巴豆蕤核合搗極熟乃內散更搗二千杵藥訖更
入少蜜半歲兒服如荏子一雙一歲兒服如半麻子一雙二歲
服如麻子一枚分一雙三四歲者服如麻子二丸五六歲者服
如大麻子二丸七八歲者服如小豆二丸十歲微大於小豆二
丸常以雞鳴時服至日出時不下者熱粥飲服數合即下丸
皆雙出也下甚以冷粥飲便止
治小兒胎中宿熱乳母飲食麤惡辛苦乳汁不下兒乳哺不為

静嘉堂文庫所藏

肌膚心腹不和泰黃瘡瘦四肢痿癖繚戾服之得悅方

芍藥拾分　大黃肆分　柴胡捌分
甘草二兩　乾薑二兩　人參肆分
鱉甲

右蜜丸如大豆服之一丸一歲已上乳服三丸七歲兒服十丸米飲服

孩兒雜方第九

治孩兒解顱方　熬蛇蛻皮和豬頰又中髓傳肉上日三四度

又方　豬牙頰又髓傳肉上日三四度

治小兒肉陷方　灸臍上下各半寸鳩骨端又足太陰各一壯

治小兒脇長解顱不合羸瘦色黃至四五歲不能行半夏熬藥方

半夏　生薑　芎藭　桂　細辛各三兩　烏頭炮去皮

右咬咀以淳苦酒伍外漬之須臾煮三沸絞去滓以綿一片浸藥中適寒溫以熨顱上冷更溫之復熨如前法十四熨乃止如二十日愈

治小兒解顱生蟹骨傳方

生蟹骨肆分　白斂肆分　右搗末以乳汁和傳顱上立愈

治小兒解顱細辛傳藥方

細辛　桂心各肆分　乾薑參分

右搗末以乳汁和傳顱上乾復傳之兒面赤即愈

治少小頭不生髮一物揪葉方

揪葉中心無多少搗取汁傳頭上立生

治小兒頭禿瘡方　葶藶子細末先洗傳之

又方　不中水漬青葉燒作灰和豬脂傳之

治小兒濕癬方　枸杞根搗作末和臘月豬膏傳之日三

又方　桃樹青皮搗和醋傳之日三

又方　取牛鼻上津汁傳之

治小兒身上生赤斑取馬尿洗之日四五度

治小兒身上生赤黑斑方　針父腳中取血帖斑上即消

又方　取豬熟屎傳之皮自卷落

靜嘉堂文庫所藏

治小兒臍中生瘡方　桑汁傳乳上使兒飲之
又方　飲羖羊乳及血
治小兒臍風遂作惡瘡歷年不差方
以乾蝦蟇燒末傳之日三四
又　取東壁上土傳大佳若汁不止燒蒼耳子粉之
又　乾蠐螬蟲末粉之不過三四度差
小兒臍不合方　大車轄脂燒灰日一傳之
又　燒蜂房灰末傳之
小兒臍中生瘡方　燒甑帶灰和膏傳之
小兒生過月臍汁出方　燒絳帛灰粉臍中
小兒臍赤腫方　杏人半分去皮熬令黃　猪頰車髓叁分
右先研杏人如脂髓和傳臍中腫之上
又方　以白石脂細研熬令微煖粉臍中日三四度
小兒脫肛方　灸頂上旋毛中即入

又　灸尾翠骨七十壯　又灸臍中隨年壯
治大便竟出血方　炙鼈頭一枚令黃黑末飲下五錢匕日三服
又　燒車缸壹枚令赤內一升外中分二服
又　燒甑帶末傳乳頭上令兒飲之
治小兒顇方　蜥蜴一枚燒末酒服之
又　灸足厥陰大敦左灸右右灸左
又方　三月上除日白頭公末傳之一宿作瘡二十日愈
治小兒四五歲不語方　灸足兩踝各三壯
又方　末赤豆酒和傳舌下
治小兒蠼螋咬遶腹匝即死方　搗蒺藜葉傳之
又方　取鷰窠中土醋猪脂和傳之乾即易之
治小兒疵目方
以針及小刀子決目四面令似血欲出取患瘡人汁黃膿
傳之莫近水三日即膿潰根動自脫落

靜嘉堂文庫所藏

治小兒霍亂方　研屎滓乳上服之　又牛涎灌口中一合
治少小吐利方　亂髮燔灰分　犀角　壹分
一右作末米汁服之刀圭日三服　又熟牛屎汁含之
又　燒牡猪屎水和取汁少少服之
治小兒食不知飢飽方
治小兒噦方　生薑汁　牛乳各五　鼠屎貳枚燒為末服之
又　取牛乳壹升煎取五合分五服　右煎取三五合分為二服
治小兒吐血方　燒蛇蛻末乳服之并治重舌
又　取油三分酒一分和之分再服
治小兒不能乳方　雀屎四枚末之著乳頭飲兒入大口枚
又　炒喪角末如小豆大著舌下數十遍之一云燒之
治小兒癇癖　灸兩乳下一寸各三壯
治小兒不利腹大且堅方
以故衣帶多拓者切一升水三升煮取一升分三服

治小兒疘方　燒竹葉末雞子白和傳之日三度
又　乱髮灰和臘月猪脂付之
治小兒疾月蝕月生日死方　以胡粉和酥傳之五日差
治小兒瘡方　燒馬骨為末付之
治小兒月蝕九竅皆有首方
燒蚯蚓屎末和猪膏傳之　又水和粉傳之
治小兒浸淫瘡方　竈中黃土　髮灰各一方
右搗為末以猪脂和付之
又　燒牛屎傅之
治小兒瘡初起瘭瘡似火瘡名曰煙瘡一名爛瘡治之方
右以桃人熟搗以面脂和付之
治小兒陰瘡方　以人屎灰和粉傳之
又　狗屎灰付之　又馬骨灰付之
治小兒歧腹閒連陰囊生瘡汁出先痛後痛十日五日自差

靜嘉堂文庫所藏

一月或半月復生連年不差方

痒灸瘡搔去痂綿裹令乾以蜜傳更灸瀆熠燒作餅熟以治餘塗餅熨三冷即再度差

治小兒陰腫方　灸大敦七壯　又狐並灸搗末酒服之

又　搗薤菁傳上　又猪屎五升水煮煎布裹安腫上

又　書中白魚衣中白魚傳之　又研桑樹汁付之

治小兒大溫甘方　第十五椎灸脊骨兩傍灸七壯不差加七壯

又鐵衣着下部曲即差

治小兒大利膿濕匿方　艾葉五升以水一斗煮一升半分為三服

治小兒疳瘡方　以油脂粉和付五六度

又爵麻子付七度　又羊膽二枚和醬汁於下部灌之

治小兒頭上惡毒腫痙郎瘡方

男子屎尖燒灰和膢月猪脂先以酢油漬淨洗干傳

治小兒數歲不行方

取菲家未開户盜食來以哺之日三便起行

治小兒齒落久不生方

以牛屎中生大豆二十七枚小開豆頭以注齒處便即生

又取雌鼠屎二七枚以屎拭一齒處盡二枚止二十日即生

治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰寒不肯乳哺但啼哭叫喚蒲黃湯方

蒲黃　大黃　黃芩各十銖　甘草八銖

麥門冬十銖　芒消七銖　黃連十二銖

右以水二升煮取一升分三服消息視兒羸瘦半之忌冷食冷等生治小兒陰偏大又卵核堅頑方

黃蘗　香豉　牡丹　防風　桂心各二兩

右蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十丸兒小以意斟量著乳頭上服之

齲頭齒治小兒積冷下痢後餘脫肛不差腹中冷肛中疼痛不已者方

靜嘉堂文庫所藏

死鼈頭弐枚炙令焦　小蝟皮一枚炙令焦　慈石青色四兩　桂心三兩
右蜜丸如大豆兒三歳至五歳服十丸日三兒大意加之飲服
治小兒热瘡水銀膏方　水銀　胡粉　松脂各二兩
右以猪脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令勻不見水銀以傅之
治小兒上下偏身生瘡方
苦參八兩　大黄弐兩　蛇床子一升　黄蘗五兩　蒺藜一斤　芍藥
黄連　黄芩各三兩　右水五升煮取三升以浸洛兒
治濕瘡方　濃煮地榆汁洗浴每日十度
治小兒丹方　擣慎火草絞取汁塗之良
治小兒頭瘡經年不差方
松脂　苦參　黄連　大黄　胡粉各四分
黄芩五分　水銀十二分　礬石二分　蛇床三分
右擣末以臘月猪脂和研水銀不見付之
又　取屋塵末和油餅下滓和皂莢湯洗傅之

治小兒頭瘡方　胡粉一兩　黄連弐兩
右為末洗瘡去痂拭乾傅之即差更發如前
又方　胡粉　白松脂各弐兩　水銀一兩　猪脂四兩
右四味合煎去滓内水銀粉調傅之大人患同此方
治白禿瘡方　取雄雞屎白陳醬汁若酒和洗瘡了傅之
又方　芫花臘月猪脂調和泥洗去痂傅之日一度
治小兒頭不生髮方　燒鯽魚灰末以醬汁和傅之
治小兒陰瘡方　狼牙濃煮汁洗之
又　黄連胡粉等分以脂和傅之
治小兒火灼瘡一身盡有如麻子小豆者膿汁乍痛乍痒方
甘草　芍藥　白斂　黄芩　黄連　黄蘗
人參[illegible]　右擣末蜜和傅之日三夜一可作湯洗之
治小兒丹數非一皆主之搨湯方
大黄　甘草　當歸　芎藭　白芷　獨活　黄芩

静嘉堂文庫所藏

芍藥　升麻　沈香　青木香　木蘭皮各一　芒消三兩

右以水一斗二升煮取四升去滓内消以綿搵湯中適寒溫搨之乾則易差止

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方　牛膝　甘草

右細剉各取五升水煮取二升三兩沸去滓洗之滓和伏龍肝塗傅之

澤蘭湯主丹及癮胗入腹殺人方

澤蘭　芎藭　附子　茵芋　藁本　莽草　細辛各弍

右水二升煮取一升分三服先服此湯然後作餘治

升麻湯主小兒喉痛若熱毒哽咽并大人毒攻咽喉方

升麻　生薑　夜乾各弍　橘皮一兩

右以水六升煮取二升去滓分為三服

治小兒悞吞針方　取磁石如棗核吞之及含之立出

治重舌舌腫不能收唾方　鹿角末如大豆許安舌下日三四度

又

取蛇蛻燒末以醇酢以雞毛醮掠舌下愈

竹葉切一升　小麥一升　甘草　黃芩　括蔞

澤瀉　茯苓　知母　白朮　大黃各四分

桂心各弍　生薑六分　人參　麥門冬　半夏各八分　當歸三分

右水七升煮竹葉小麥取四升下藥煎取一升六合分四服

小兒壯熱氣實沸不去寒熱往來微驚悸方

大黃四分　黃芩　括蔞　甘草各三　桂心　滑石各八分

牡蠣　人參　龍骨　凝水石　白石脂　消石各弍

右水四升煮取一升半服之一日一夜令盡雖吐亦與之

馬齒礬丸主小兒傷寒嚏啼驚癇腹脹不食大便青黃并治大人虛冷內冷或有實不可吐下方

馬齒礬一斤燒半日棗膏和大人服如梧子二丸日三小兒以意加減以腹內溫暖為度有實實去神妙飲服

千金湯主小兒暴驚啼絕死或有人從外來邪氣逐來令兒得疾衆醫不治

靜嘉堂文庫所藏

蜀漆貳 石膏 牡蠣熬 右切以水一升煮取四合一服一合

療小兒孩壯熱有實方

甘遂 青木香 石膏各三 麝香三銖

大黃 前胡各四 黃芩 甘草各貳分

右水七升煮取一升九合每服三合日四服夜三服

治小兒風瘙癮疹方

蒴藋 防風 羊桃 石南 茵芋 芫花 蒺藜

礬石七味 一石以苦酒一斗煮取五升去滓內礬石令見消之

治三百日兒頭面瘡起身體大熱方

升麻 柴胡 石膏各一 甘草 大黃 當歸

黃芩各三 右水二升煮取八合以四歲百三十日兒一服

治小兒身頭面患瘡方

以乾白榆皮末和酢傳綿覆上蟲出即差

治小兒患瘡方

熬豉令黃末傳瘡上不過三愈

又取大蟲脂傳之亦治白禿又髮中生瘡頂白者皆以熊白傳之

治小兒疽瘻方

丹砂伍分 雄黃四分 礬石三分熬 雌黃四分

大黃五分 黃連六分 茼草三分 䕡茹四分 柴胡者

右以豬脂一斤三合微火煎三上三下膏成去滓下雄黃等末

知調傳之

治丹毒大腫身壯熱百治不折方

寒水石六分 乾藍青四分 竹瀝各壹升 犀角 柴胡

杏人各八分去皮尖熬研 生葛汁四合 知母 升麻 甘草 羚羊角各六分

芍藥十分 支子十分 黃芩十分 蜜一升 石膏十三分

右水五升并竹瀝煮取二升三合去滓內杏人脂葛汁蜜微火煎

二升三歲兒服三合以大者量加一歲兒分小大嬰兒服未得

治小兒赤遊腫方 其丹毒方見上第二十三卷中

凡小兒赤遊腫若遍身入心腹即死方

靜嘉堂文庫所藏

右以伏龍肝為末雞子白和傅乾易之
又 白豆末和水傅之二三乾
治小兒喔啼面青腹強是客忤氣方
以新馬矢三丸一升絞取汁灌之一合
又 燒猪矢沸湯淋取汁浴之并服半合飲
治小兒忽患腹痛夭矯汗出名曰鳥寒方
以蔾葉濃煮汁服七合可三四度飲之
治小兒玄腹皮青黑方
灸臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各三壯
又 以酒和胡粉傅上若不急治須臾便死
治小兒身赤腫者 熬米粉令黑以唾和傅之
又以伏龍肝亂髮灰作膏傅之 又搗[illegible]和面脂傅之
竹葉湯主五六歲兒溫壯又主腹中急滿息不利不能食微腫極
羸瘦不下食腹堅痛主之延年方

治小兒鼻塞息肉方 通草 細辛各二兩
右搗末綿裹藥如棗核大內鼻中日二亦可定安之
治聤耳方 末石流黃以粉耳中日一度
治小兒狐疝傷損出頹方
桂心三分 地膚子十分 白朮五分 右末以蜜和丸服如小豆
七丸日三亦治大人酒服 又方
芍藥 伏苓各三分 防葵 大黃各二分 半夏 桂心
椒各一分 右蜜丸服如大豆大十丸日五服酒服
治小兒頭禿瘡無髮苦痒方 野葛末 猪脂
羊脂各一分 右合煎令凝傅之不過三上
治小兒喉痺方 桂心 杏人各二分
右末以綿裹如棗大含咽汁
治小兒手足身腫 以小便溫煖漬之良
又方并治癮胗

静嘉堂文庫所蔵

巴豆伍拾枚去心皮水三升煮取一升以綿内湯中拭病上

治小兒遺尿方

雚麥　龍膽　皂莢　桂心各貳兩

雞腸草四分　車前子伍分　雞腹十三人參壹兩

右蜜丸每食後服如小豆大五九日三加至六七丸酒服

小兒食方

取肉壹斤繩繫曳地行數里勿洗火炙與喫之

治小兒頗開不合方　防風　柏子人各貳分

右為末以乳和傅頗上十日知二十日愈日一上

又　取猪牙車煎取髓膏傅頗上愈

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏





国立国会図書館所蔵

靜嘉堂文庫所藏

目病第一論一首 附法一首

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後不可瀉肝明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉肝中有疾可傳石膽散藥等無病不可輒傳散但補肝而已自有肝中有風熱令人眼昏暗者當灸肝輸及服除風瀉圓散數十劑當愈

生令五辛　接熱飲食　熱飲麪食　飲酒不已
房室無節　極目遠視　夜視星火　數看日月
夜讀細書　月下看書　抄寫多年　雕鏤細作
博弈不休　久處煙火　泣淚過多　刺頭出血

右十六件並是喪明之本養性之士宜愼焉又有勞

靜嘉堂文庫所藏

騶田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之
媒也恣一時之浮意爲百年之痼疾可不慎歟凡人少
時不自將愼年至四十即漸眼昏若能依此愼護可得
白首無他所以人年四十已去常須瞑目勿顧他視非
有要事不宜輒開此一術護愼之極也其讀書博弈等
過度患目者名曰肝勞若欲治之非三年閉目不視不
可得瘥徒自瀉肝及作諸治終是無效人有風疹必多
眼暗先攻其風其暗自瘥

足太陽陽明手少陽脉動發目病黃帝問曰余嘗上清泠
之臺中陛而顧眴目而前余私異之竊內怪之或獨冥視
安心定氣久而不解被髮長跪俛而視復久之又不已卒
然自止何氣使然岐伯對曰五藏六腑之精氣皆上注於

目而爲之睛睛之果者爲眼眶骨之精爲瞳子筋之精爲黑
眼血之精爲其脉果氣之精爲白眼肌肉之精爲約束果
契筋骨血氣之精而與脉并爲系系上屬於腦後出於項
中故邪中於項因逢身之虛其入深則隨眼系以入於腦
入於腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪中其睛
則其睛所中者不相比則睛散睛散則歧故見兩物目者
五藏六腑之精也營衛氣之所生也故神勞則氣散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉
法於陽故陰陽合揣(盡振反)俱(俱轉)而精明矣目者心之使也心
者神之舍也故神分精亂而不專(盡振反作轉)卒然見非常之處
精神氣散不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之
東莞未嘗不惑去之則復余惟獨爲東莞勞神乎何其異

靜嘉堂文庫所藏

也岐伯曰不然夫心有所喜神有所悪卒然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故閒者爲迷甚者爲惑

目者外決於面者爲关髆在內近鼻者卜爲外髆下爲內

目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黄色者病在脾黒色者病在腎黄色不可名者病在胃中

診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病

夫鼻洞鼻洞者濶下不止傳爲衄膏瞑目故得之氣厥足陽明有俠鼻入於面者名曰懸顱顱口對入係目本視有過者取之損有餘益不足反者甚甚者甚足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目固痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交於兵髆陽氣盛則眼目陰氣絕則眼

神麴圓 主明目百歲可讀注書方

神麴 肆兩　礜石貳兩　光明砂壹兩

右三味爲末鍊蜜爲丸如梧子飲服三丸日三不拘常服益眼力衆方不及學者宜知此方神驗不可言當秘之

瓜子散 補肝治眼漠漠不明亦名十子散方

冬瓜子　青葙子　芫蔚子　枸杞子

牡荆子　蒺藜子　菟絲子　蕪菁子

決明子　地膚子　柏子人各貳合　牡桂

薺薁根各貳兩　雞人壹合一作二合貳兩　細辛半兩一云壹兩半　車前子壹兩

右十六味治下篩食後以酒服方寸匕日二神驗

靜嘉堂文庫所藏

補肝圓治眼暗方

青葙子　桂心　葶藶子　杏人
細辛　茺蔚子　枸杞子　五味子各壹兩
茯苓　黃芩　防風　地膚子
澤瀉　決明子　麥門冬　蕤人各壹兩陸銖
車前子　菟絲子各貳合　乾地黃叁兩　兎肝壹具

右二十味爲末蜜丸飲下二十丸如梧子日再加至三十丸

又方治眼暗䀮䀮不明寒則淚出肝痺所損方

兎肝貳具　柏子人　乾地黃　茯苓　細辛
蕤人　枸杞子各壹兩陸銖　防風　芎藭
薯蕷各壹兩　車前子貳合　五味子拾捌銖　甘草半兩
菟絲子壹合

目病

右十四味爲末蜜丸酒服如梧子二十丸日再服加至四十丸

補肝散治目失明漠漠方

青羊肝壹具去上膜薄切之以新瓦瓶子未用者淨拭內肝於中炭火上炙之令極乾汁盡末之
決明子半升　蓼子壹合熬令香

右三味合治下篩以粥飲食後服方寸匕日二稍加至三匕不過兩劑能一歲服之可夜讀細書

又方治三十年失明方

鍾乳粉　雲母粉各鍊成者　細辛
茯苓　遠志　五味子等分

右六味治下篩以酒服五分匕日三加至一錢匕

補肝蕪菁子散常服明目方

靜嘉堂文庫所藏

蕪菁子二升淨淘以清酒二升煮令熟曝乾治下篩
以井花水和服方寸匕稍加至二匕無所忌可少少
作服之令人充肥明目洞視水煮酒服亦可千金翼同用水

又方 胡麻一斗蒸三十徧治下篩每日酒服一升
羹三易水

又方 服小黑豆每日空心吞二七粒

又方 三月三日採蔓菁花陰乾治下篩空心井花水服方
寸匕久服長生明目可夜讀細書

補肝散 治男子五勞七傷明目方

地膚子 壹斗陰乾爲末 生地黃拾斤擣取汁

右二味以地黃汁和散曝乾更爲末以酒服方寸匕日
三服漸加至二匕以知爲度

又方 白瓜子七升絹袋盛攪湯湯中三徧曝乾以酢五升
浸一宿曝乾治下篩酒服方寸匕日三服之百日可
夜寫細書

梔子人湯 治肝實熱目赤痛痺痛如刺方

梔子人 決明子 雞人各壹兩 車前葉 秦皮各壹兩 陰乾

石膏貳兩碎如小豆大 苦竹葉貳合 細辛半兩 赤蜜叁合

右九味咬咀以井花水二升煮取七合去滓下蜜更煎
取四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以藥汁
細細仰卧以傳目中

瀉肝湯 治眼赤漠漠不見物息肉生方

柴胡 芍藥 大黃各肆兩 決明子

澤瀉 黃芩 杏人各叁兩 升麻

枳實 梔子人 竹葉各貳兩

靜嘉堂文庫所藏

右十一味㕮咀水九升煮取二升七合分三服熱多嘔
壯加大黃一兩羸老去大黃加梔子人五兩

又方治眼風赤暗方

前胡 芍藥 各肆兩 生地黃 拾兩 芒消 薰參
枳實 各參兩 人參 白朮
茯苓 白芷
梔子人 澤瀉 各貳兩 甘草 細辛 各壹兩 竹葉 伍升

右十五味㕮咀以水一斗二升先煎竹葉取九升去滓
下諸藥煮取三升半分三服

洗肝熱眼方治肝熱不止衝眼眼皆赤赤脉息肉痛閉不
開熱勢彭彭彭不歇及目睛黃方

乾藍 車前葉 苦竹葉 各參升 細辛
秦皮 雞人 梔子人 芍藥 各參兩

決明子 肆兩 升麻 貳兩

右十味㕮咀以水二斗先煮乾藍車前竹葉取一斗去
滓澄清取八升內藥煮取三升分三服須利加芒消二兩

大黃煎治目熱皆赤生赤脉侵睛息肉急痛閉不開如芥
在眼磣痛方

大棗 柒枝去皮核 黃連 貳兩 編裹碎 淡竹葉 切伍合

右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內棗肉
黃連煎取四合去滓令淨細細以傅目皆中

治目中息肉方

鹽脂 石鹽末

右二味和合令調注目兩皆頭日三夜一瘥

又方五加不聞水聲者根去土取皮擣末一升和上酒二

靜嘉堂文庫所藏

升浸七日外一日兩時服之禁醋二七日徧身生瘡
若不出未得藥力以生熟湯浴之取毒瘡出瘥

治熟上出攻目生瞳腎目熟痛汁出方

秦皮　黃蘗　決明子　黃連
黃芩　雞人各拾捌銖　梔子柒枚　大棗伍枚

右八味㕮咀以水二升浸煮取六合澄清仰臥洗日一

治目生腎方

貝子十枚燒灰治下篩取如胡粉著腎上日二正仰
卧令人傳之炊久乃拭之息肉者加真珠如貝子等分

治目赤及腎方

烏賊骨　鉛丹大小等分

右二味合研細和白蜜如泥蒸之半食久冷著眼四臨

白羊髓傳之　熟羊眼睛曝乾治下篩傳目兩角
新生孩子胞衣曝乾燒末傳目皆中
古錢壹枚　臨方寸匕

右二味合治下篩傳目皆中

治目風淚出浮腫多膿爛眥方

乾薑　決明子　礬石　雞人
細辛　黃連　戎鹽各陸銖　銅青叁銖

右八味㕮咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜八合和
之著銅器中綿蓋器上蒸著甑中以三斗麥脅蒸之飯熟
藥成絞去滓以新死大雄鯉魚膽二枚和內藥中又以
大錢七枚常著藥底兼常著銅器中竹簪綿裹頭以注
目皆頭壹夜二四不避寒暑數著藥乾又以魚膽和好

靜嘉堂文庫所藏

覆蓋藥器頭勿令氣歇

治熱翳漫睛方

以羊筋漱口熟嚼夜臥開目內之即閉目睡去膜明日即瘥 千金翼以治眯目不明

治風翳方

取死豬鼻燒灰治下篩日一向日水服方寸匕

治目熱生膚赤白膜方

取雄雀屎細直者人乳和敖熱研以傅之當漸消爛

又方 以蛔蟲燒爲末傅

治人馬白膜漫睛方

以雞翎截之近黑睛及當白睛嘲之膜自聚鉤針鉤挽之割去即見物以綿當眼上著血斷三日瘥

治風散 治目白膚風淚下方 刪繁方一方名眞朱散

光明朱砂半兩 貝齒伍枚炭火上熟燒爲末 衣中白魚柒枚

乾薑叁兩 一方用生薑自然汁澄粉代乾薑

右四味於新磁鉢內研之厚帛三下爲散仰臥令人取小指爪挑少許傅目中取瘥爲度 千金翼名眞朱散主目翳覆瞳睛不見物

治目中生息肉膚翳稍長欲滿目閉瞳子及生珠管方

貝齒柒枚燒爲末 眞珠等分

右二味合治如粉以注翳肉上日三度甚良亦治目中眯不出

治目生珠管方

滑石 一作砂石 手爪甲燒 龍骨 貝齒 丹砂各等分

右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良

治毒病後目赤痛有翳方
以青布搥目上以冷水漬青布數易之
治熱病後生翳方
豉二七枚燒爲末內管中以吹目中
治熱病後眼暗失明方
以羊膽傳之旦暮各一
治風眼爛瞼方
竹葉　黃連各壹兩　柏白皮壹兩半
右三味㕮咀以水二升煮取五合稍用滿目兩瞼日三四度
治胎赤眼方
取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅鉢
中日使童子以木研之至暝止夜臥時洗目傳瞼上

治目爛赤方
取三指撮鹽置古文錢上重重火燒赤投少醋中足
漬錢以綿沾汁注目瞼上日中
乳汁煎　治目中風冷淚出瞼赤癢方
黃連拾捌銖　雞人半兩　乾薑壹兩
右三味㕮咀以人乳汁一升浸藥一宿明旦以微火煎
取二合綿絞去滓取如黍米許內目瞼頭日再張文仲方二味等分
治目中風腫痛除熱揉眼方
礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上下食
頃日二止
洗眼湯　治目赤痛方

靜嘉堂文庫所藏

甘竹葉 茶枝 烏梅 古錢各叁枝
右三味以水一升漬藥半日東向竈煮三沸三上三下
得一合臨欲眠注目眥
治目卒腫方
以酢漿水作鹽湯洗之日四五度
治目卒癢痛方
削乾薑令圓滑內眥中有汁拭却復內薑味盡易之
治五藏客熱上衝眼內外受風冷目痛不明方
地膚子 瓜子人 青葙子 蒺藜子 菟絲子
藍子 莧實子 雞人千金翼作車前子各貳合 柏子人半合
決明子伍合細辛壹兩陸銖 桂心壹兩拾銖 大黃壹兩半
螢火陸銖 黃連壹兩半

右十五味爲末蜜丸如梧子每服三十丸食後服日三
千金翼無梔子人

治目赤痛方
雄黃壹銖 細辛 黃連 乾薑各貳銖
右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大眥
頭急閉目目中淚出須臾止勿將手近勿將手裹勿洗
又方 雄黃 乾薑 黃連 礬石各陸銖
右四味合治並如前方一方加細辛六銖
治眼赤暗方
古青錢叁枚 青鹽壹兩陸銖 杏人未熬時取人擣汁壹合
右三味合內埳器中封頭勿泄氣百日後出著目四眥
頭日二三避風冷

靜嘉堂文庫所藏

治眼暗赤冷淚方

蟹人　波斯鹽

右二味等分治下篩以驢生脂和每夜傳目四角以一粟大密室中將息一月日瘥忌五辛失明者三十日瘥

治目痛及淚出不止方

削附子作蚕屎大內目中卧良

治目不明淚出方

以烏雞膽臨臥傳之

治雀盲方

地膚子伍兩決明子壹升

右二味爲末以米飲汁和丸食後服二十丸至三十丸日二盡即更合瘥止

治雀目術

令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛不見曰紫公紫公我還汝盲汝還我明如此日日瞑三過作之眼即明嘗試有驗

治肝氣虛寒眼青瞤瞤不見物方

真珠壹兩研白蜜貳合　鯉魚膽　鯉魚腦各壹

右四味和合微火煎兩沸綿裹內目中當汁出藥歇更之

治目瞤瞤無所見方

青羊肝一具細切以水一斗內銅器中煮以麴餅覆上上鑽兩孔如人眼正以目向就熏目不過再熏即瘥千金翼若眼暮無所見不用麴餅

治眼暗方

靜嘉堂文庫所藏

以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅青
一合以三月杏白人一升取汁和銅青傳之日不過
三四度大良

(又方) 古錢 柒枚 銅青 石鹽 乾薑 胡粉
蒴藿子 各中棗大 烏賊骨 黃連 各拾銖 細辛 伍銖
鼢人 壹伯 參拾枚 酢 貳合 清酒 伍合 楸葉 壹把 取汁
右十三味治下篩合煎取三分去一盛瓷器中若燥取
人乳和傳目慎風冷

(又方) 每朝含黃蘗一爪甲許使津液掌中拭目訖以水洗
之至百日眼明此法乃可終身行之永除眼疾神良
決明子 拾捌銖

(又方) 柴胡 陸銖
右二味治下篩人乳汁和傳目可夜書見五色

治眼瞤方
七月七日生苦瓠中白絞取汁一合以酢一升浸古
文錢七枚微火煎減半以米許大內眥中

治眼漠漠無所見方
鼢人 秦皮
右五味㕮咀以水八合微火煎取三合冷以綿注洗目
日三度

(無青子) 常服主輕身益氣明目方
蕪菁子一升以水四升煮令汁盡出曝乾復以水四
升煮如前法三煮三曝治下篩飲服方寸匕千金翼云百日
身熱勞出不久自瘥

明目令髮不落方

靜嘉堂文庫所藏

十月上巳日收槐子內新淨甕中以盆密封口三七
日發封洗去皮取子從月一日服一枚二日二枚日
別加計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚
一年服一千九百八十枚小月減六十枚此藥主補
腦早服之髮不白好顏色長生益壽先病冷人勿服
之肘後云兩龍方

又方 牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕三
十日白髮再黑至百日通神

治目中眯不出方
以蚕砂一粒吞下即出

治稻麥芒等入目中方
取生蠐螬以新布覆目上將蠐螬從布上摩之芒出

治沙石草木入目中不出方
以雞肝注之

又方 以書中白魚和乳汁注目中

治目中眯法
旦起對門戶跪拜云戶門狹小不足宿客乃便瘥

治目爲物所傷觸青黑方
羖羊肉令熟熨勿令過熟豬肝亦得

治目痛不得睡方
蓐灸新青布熨并煮大豆袋盛枕之夜常令熱

目中赤痛從內眥始取之陰蹻

目中痛不能視上星主之先取譩譆後取天牖風池

靜嘉堂文庫所藏

青盲遠視不明承光主之　目瞑遠視瞋瞼目窻主之
目瞑瞋痛天柱主之
目眩無所見偏頭痛引目外眥而急顧厥主之
目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩瞢內眥赤痛遠視
瞋瞋無見皆癢痛淫瞢白翳精明主之
青盲無所見遠視瞋瞋目中淫瞢白膜覆瞳子巨窌主之
目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視瞋瞋皆夜無見目瞤動
與項口參相引喎僻口不能言刺承泣
目痛僻戾不明四白主之　目赤目黃攢竹主之
目痛不明斷交主之
目瞑身汗出承漿主之
青盲瞶目惡風寒上關主之
瞶目瞋瞋偏歷主之

眼痛下廉主之
目痛泣出甚者如脫前谷主之
白翳覆珠子無所見解谿主之
灸法餘穴見前

瞶目瞋瞋少氣灸五里右取左左取右
眼暗灸大推下數節第十當脊中安灸二百壯惟多至數千
肝勞邪氣眼赤灸當容百壯兩邊各爾究在眼小骨近後
當耳前三陽三陰之會處以兩手按之有上下橫脈則是
與耳門相對是也
眼急痛不可遠視灸當瞳子上入髮際一寸隨年壯究名當陽
風腎患右目灸右手中指本節頭骨上五壯如小麥大左
手亦如之

靜嘉堂文庫所藏

風癢赤痛灸人中近鼻柱二壯仰臥灸之
目卒生翳灸大指節橫文二壯在左灸右在右灸左良
鼻病第二 論一 灸法大指 方五十五首
治鼻塞腦冷清涕出方
通草 辛夷各半兩 細辛
桂心 芎藭 附子各壹兩
右七味爲末蜜丸綿裹內鼻中密封塞勿令氣洩丸如
大麻子稍加微覺小痛擣薑爲丸即愈用白狗膽汁和
之更佳
治鼻塞常有清涕出方
細辛 蜀椒 乾薑 芎藭 吳茱萸
附子 各拾銖 桂心 壹兩 皂莢炙 半兩 猪膏 半斤

右九味㕮咀以綿裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子色
黃爲度去滓綿裹內鼻孔中并摩鼻上
治涕出不止方
灸鼻兩孔與柱齊七壯
膏 治鼻塞空空方
白芷 芎藭 通草 各拾銖 當歸 細辛
莽草 小品并翼作薰草 辛夷 各叁拾銖
右七味㕮咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三
上三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核大內鼻中
日三 小品加桂心拾銖鉄
膏 治鼻不利方
當歸 薰草 古今錄驗用木香 通草 細辛

靜嘉堂文庫所藏

雞人路鎦銖拾芎藭　白芷各兩　羊髓肆兩猪脂亦得

右八味㕮咀以微火合煎三上三下白芷色黄膏成去滓取如小豆大内鼻中日二先患熱後鼻中生赤爛瘡者以黄芩梔子代當歸細辛

治鼻窒氣息不通方

小薊一把㕮咀以水三升煮取一升分二服

又方　瓜蔕末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

又方　槐葉五升　葱白切壹升　豉壹合

右三味以水五升煮取三升分温三服

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車輾過蒺藜一把擣以水三升煎取熟先仰卧使人滿口含取一合汁灌鼻中使入不過再度大嚏必出一兩箇息肉似赤蛹一方有黄連等分同煎

治鼻齆方

通草　細辛　附子

右三味各等分爲末以蜜和綿裹少許内鼻中

又方　甘遂　通草　細辛　附子等分

右四味爲末以白雄犬膽和爲丸如棗核大綿裹内鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治息肉

又方　炙皂莢爲末如小豆大以竹管吹鼻中

又方　乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳

又方　鐵鏁磨石取末以猪脂和綿裹内之經日肉出瘥

又方　以馬新屎汁仰頭含之滿口灌鼻中

又方　伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後以瓜蔕末綿

靜嘉堂文庫所藏

裹塞之

治齆鼻有息肉不聞香臭方

瓜丁　細辛

右二味各等分爲末以綿裹如豆大許塞鼻中須臾

隨息散　治鼻中息肉不通利方

通草半兩　礬石　真朱各壹兩

右三味爲末揾綿如棗核取藥如小豆著綿頭內鼻中

日三易之一方有桂心細辛各一兩同前擣末和使之

治齆鼻鼻中息肉不得息方

礬石　藜蘆各陰乾　瓜蒂貳七枚　附子拾貳銖

右四味各擣篩合和以小竹管吹藥如小豆許於鼻孔

中以綿絮塞鼻中日再以瘥爲度

治鼻中息肉方

炙蜱皮爲末綿裹塞之三日

又方　細篩釜底墨水服之三五日

治鼻中息肉不聞香臭方

又方　末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此三四度

又方　細辛　釜底墨

右二味爲末水和服方寸匕

又方　綿裹瓜蒂末塞鼻中

羊肺散　治鼻中息肉梁起方

羊肺壹具乾之　白术　蔥白

通草　乾薑　芎藭各貳兩

右六味爲末食後以米飲服五分匕加至方寸匕

又方 通草拾貳銖 真朱陸銖 細辛 各壹兩

右四味爲末撚綿如棗核沾藥如小豆并綿內鼻中

治鼻中息肉方

炙上星二百壯穴在直鼻入髮際一寸

治鼻中生瘜方

燒祀竈飯末以傅鼻中 又方 偷孝子臍以拭之

又方 燒故馬絆末傅鼻中 又方 少牛鼻津傳之

又方 烏牛耳垢傅之 又方 燒核桃 取油傳之

又方 搗杏人乳傅之亦燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傳之

治鼻蟲蝕鼻生瘜方

燒鋼筋頭以酢漿之數遍取醋傳之又以人參末

吹之

治鼻痛方

常以油塗鼻內外脈亦得

治孕食物從鼻中縮入腦中令痛不出方

牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂須臾脂消則物還脂俱出也

論曰鼻頭黴白者亡血設令黴赤非時者死病人色白者皆亡血也凡特行衄不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即以龍骨末吹之九竅出血者皆用吹之

治大便出血及口鼻皆出血血上奔心氣急此是勞熱

生地黃搗研 蒲黃壹升 地骨皮伍兩

靜嘉堂文庫所藏

黃芩　芍藥　生竹茹各叁兩

右六味咬咀以水八升煮取二升七合分溫三服

凡吐血衄血溺血皆藏氣虛隔氣傷或却驚悸治之方

生竹皮壹升芍藥　黃芩各貳兩　甘草各壹兩

當歸　桂心

右七味咬咀以水一斗煮竹皮減二升下藥煎取二升

分三服

治衄血方

伏龍肝貳枝如雞子大　生地黃陸兩　芎藭壹兩

細辛陸錢　桂心　白蘞　乾薑

芍藥　甘草　吳茱萸各叁兩

右十味咬咀以水二升酒七升煮取三升分三服

治鼻衄方

生地黃剛黃芩壹兩阿膠　甘草各貳柏葉壹把

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取二升

半分三服

又方　生地黃叁斤切阿膠貳兩　蒲黃陸合

右三味以水五升煮取三升分二服

又方　地黃汁五合妄煮取四合空腹服之忌酒炙肉且服粳

米飲

又方　飲小薊汁

又方　以冷水淨漱口含水以盡管吹二孔

又方　取亂髮二兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益吹

之以血斷止并水服方寸匕日三甚者夜二匕困不

識人者服亦佳

靜嘉堂文庫所藏

又方 取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止
又方 五月五日取人屎燒作灰冷水服五分匕
又方 以膠帖鼻頭上至頂及髮際三寸止
又方 新馬屎汁灌鼻中及飲之
又方 以濕布薄胷止 又方 淳酢和土塗陰囊上乾易之
又方 韭根葱根取汁懸頭著一棗大內鼻中少時更著
三度瘥葱白擣汁亦得

治鼻出血不止方

乾地黃　梔子　甘草等分

右三味治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合
鼻有風熱者以葱涕和服如梧子五丸

又方 擣楮葉汁飲三升大良

又方 [illegible]弓令弦向上病者仰卧挽弦放四體如常卧法
衄時癢癢便灸足大指節横理三毛中十壯劇者百壯衄
不止灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

入灸涌泉二穴各百壯

口病第三 論一首 灸法一首 方五十九首

論曰凡患口瘡及齒禁油麪酒醬酸酢鹹膩乾棗瘥後仍須慎之若不久慎尋手再發發即難瘥薔薇根角蒿為口瘡之神藥人不知之

治口中面上息肉轉大方

以刀決潰去膿血即愈

治口中瘡久不瘥入胃中並生瘡三十年已上不瘥者方

靜嘉堂文庫所藏

濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日二夜一冬用根
夏用苗葉

治口瘡不歇方

牛膝　生蓑荷根各叁兩　黃蘗壹兩

右三味咬咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細
細含之

治脣脫熟不已口舌生瘡咽腫方

升麻　玄參　薔薇根白皮

射干各肆兩　大青　黃蘗各叁兩　蜜柒合

右七味咬咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎
兩沸細細含咽之

治口數生瘡潰年不瘥方

薔薇根　黃芩　當歸　桔梗

黃耆　白鮝　大黃　鼠李根皮

芍藥　續斷　黃蘗　葛根各壹兩

右十二味爲末以酒服方寸匕日二亦可漿水服之

治胃中客熱腎口乾燥生瘡方

茯苓　黃芩　甘草　大黃

薔薇根各叁拾銖　枳實　杏人

黃連各壹兩　桂心半兩　栝蔞根拾八銖

右十味爲末食前漿水服方寸匕日二

治口熟生瘡方

升麻叁拾銖　黃連拾八銖古今録驗作黃蘗

靜嘉堂文庫所藏

右二味爲末綿裹含咽汁亦可去之

治口瘡方

黃蘗貳兩　升麻參兩　生地黃伍兩　薔薇根皮貳兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓含之瘥止含漱吐却更含

治口中瘡爛痛不得食方

甘草壹寸　黃連陸銖　杏人貳拾枚

右三味爲末合和綿裹杏人大含之勿咽日三夜

薔薇圓　治口中瘡身體有執氣瘥方

薔薇根　黃芩　鼠李根　當歸

葛根　白斂　石龍芻　黃蘗

芍藥　續斷　黃耆各壹兩　栝蔞根貳兩

右十二味爲末蜜和丸如梧子服十丸日三夜一千金翼方

治口吻瘡方

以楸白皮及濕帖之三四度瘥

又方　取經年葵根欲腐者嚼作汁及熟煮以漬口向鼎上熏之二七下

又方　以新炊飯了熟以漬口向鼎上熏之二七下

三兩上瘥止

又方　梔子　甘草　胡粉　細辛各拾銖　桂心拾銖　豉壹兩

右五味爲末蜜丸食後服七丸日再服瘥止

又方　薏苡　白芷　橘皮　桂心　棗肉各壹兩半

右五味爲末蜜和爲丸食後服十五丸又含之以瘥爲度此方甚驗

治口肥瘡方

靜嘉堂文庫所藏

熬龜上飯令焦末傳之

治鷰吻瘡方

白楊枯枝鐵上燒取灰及熟傳之

又方 以木獲尾內燼灰中令熟取拄兩吻各二七遍

治口傍惡瘡方

亂髮灰　故絮灰　黃連末　乾薑末

右四味等分合和為散以粉瘡上不過三遍

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏大

豬膏　白蜜各一合　黃連一兩

右二味合煎去滓攪令相得令如半棗大日四五夜一

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸　升麻各一兩　附子一兩炮　白蜜一升

右五味㕮咀以豬脂四兩先煎令成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色黃藥成絞去滓內蜜煎上火一兩沸令相得置器中令凝取如杏人大含之日四五遍輒咽之

治失灸頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出其指恐誤嚙傷人指也

失灸頰車蹉方

消蠟和水傳之

灸訖第五椎一日二十七壯滿三日未瘥灸氣衝二百壯會前喉下甲骨中是亦名氣堂

又灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯二報

靜嘉堂文庫所藏

此二陰交穴也

治卒口噤不開方

以附子擣末內管中強開口吹口中

甘草圓 治口中熱乾方

甘草　人參　半夏

生薑　烏梅肉各壹　棗膏貳兩半

右六味爲末蜜丸如彈子大旋含咽日三

治口乾方

羊脂若猪脂雞子大擘之內半升酢中漬一宿絞取汁含之

治口乾除熱下氣方

石膏伍合碎　蜜貳升

右二味以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含已之

治虛勞口乾方

麥門冬貳兩末大棗卷參拾枚內

右二味以蜜一升和令調煮五升米下烝之任性服

又方 羊脂如雞子大醇酒半升棗七枚擘令漬七日取棗食之立愈

又方 酸棗壹升　酸石榴子　烏梅各伍合枯萎實　葛根　甘草各參兩　麥門冬肆兩覆盆子參合

右八味爲末以蜜丸含如棗大以潤爲度

五香圓 治口及身臭令香止煩散氣方

豆蔻　丁香　藿香　零陵香

靜嘉堂文庫所藏

青木香　白芷　桂心各壹兩　香附子貳兩
甘松香　當歸各半兩　檳榔貳枚
右十一味爲末蜜和丸常含一丸如大豆許咽汁日三
夜一亦可常含咽之五日口香十日遍體香二七日衣
被香三七日下風人聞香四七日洗手水落地香五七
日把他手亦香愼五辛下氣去臭

含香圓　治口氣臭穢宜常服之方
丁香半兩　甘草炙兩半　壹兩　細辛　桂心各壹
右五味爲末蜜和丸如彈子大臨卧服二丸

又方　常以月旦日未出時從東壁取步七步回頭向坦立
含水嚼壁七遍口即香

又方　桂心　甘草　細辛　橘皮

右四味等分治下篩以酒服一錢匕瘥止

又方　棗肉搗丸　苦參
右五味爲末次內棗肉乾則加蜜和丸如大豆許日服
十丸食前食後常含之或吞之七日大香

治口中臭方
桂心古今錄用細辛　甘草各等分
右二味爲末臨卧以三指撮許酒服二十日香

又方　細辛豆豉含之甚良

又方　蜀椒　桂心各等分
右二味爲末酒服三指撮許

主口香去臭方一
甘草炙二拾銖　白芷拾捌銖　苦參貳拾肆銖

靜嘉堂文庫所藏

右二味治下篩以酒服方寸匕日二服三十日口香

又方 大棗

右二味治下篩以酒服方寸匕日二服一百日衣被香

又方 瓜子人 松根白皮

杜蘅各陸銖 細辛半兩 防風貳兩

右七味治下篩食後飲服方寸匕日三服五日口香十日身香二十日肉香三十日衣被香五十日遠聞香一方加白芷十八銖

又方 橘皮貳拃銖 桂心拾銖 木蘭皮壹兩 大棗貳拾枚

右四味治下篩酒服方寸匕日三又服身香亦可以熬肉丸之服二十九如梧子大稍加至三十九一方有薯蕷壹兩

第十八銖

口病

治口臭細辛汁含之又乃吐之

又方 井花水三升漱口吐厠中良

又方 香需一把水一斗煎取二升稍稍含之

又方 甜瓜子作末蜜和丸如棗核大每日空心洗漱訖含一丸亦傳齒

又方 熬大豆令焦及熱酢沃取汁含之

治七孔臭氣皆令香方

沈香伍兩 藁本叁兩 白瓜瓣半升丁香伍合

甘草 當歸 麝香各貳兩

右八味為末蜜丸如小豆大食後服五丸日二又服令舉身體臭皆香

治身體臭令香方

靜嘉堂文庫所藏

甘子皮　白芷各壹兩半　瓜子人貳兩　藁本
當歸　細辛　桂心各壹兩
右七味治下篩酒服方寸匕日三服五日口香二七日
身香

又方　甘草　松根皮　大棗　甜瓜子各等分
右四味治下篩食後服方寸匕日三七日知百日大香

薰衣香方
零陵香　丁香　青桂皮　青木香　雞骨煎香
麝金香　楓香各叁兩　薰陸香　蘇合香　甘松香
甲香兩各貳　沈水香兩伍　雀頭香　白檀香　安息香
艾納香　麝香各壹兩　麝香半兩
右十八味爲末蜜二升半熬肥棗肉十枚令爛熟以

痛搦令爛如粥以生布絞去滓用和香乾濕如漆熟搗
五百杵成丸密封七日乃用之以微火燒之以盆水內
籠下以殺火氣不爾必有焦氣也

又方　沈香　煎香兩各伍　雀頭香　丁子香　麝香兩各壹
右五味治下篩內麝香末半兩粗羅臨薰衣時蜜和用

又方　薰陸香　沈香　檀香　甘松香　丁香　零陵香　麝香各壹兩
煎香　零陵香　藿香各壹兩
右十一味粗下篩合棗肉丼擣量加蜜和用之

澡豆方
沈香貳兩　玖銖　甘松　檀香　雀頭香　麝香作
雞骨煎香　甲香　零陵香　丁香各叁兩　玖銖

靜嘉堂文庫所藏

麝香貳兩 玖銖　薰陸香叁兩陸銖

右十味爲末臨用時以蜜和若預和味歇不中用

又方 沈香叁兩 零陵香 藿香各半兩 甲香 煎香 麝香酪壹丁子香 檀香酪叁 薰陸香 甘松香酪壹

右十味粗下篩蜜和用熏衣時餅盛埋之久窖佳

薰香

百和香 通道俗用者方

沈水香伍兩 丁子香 雞骨香 捷婁婆香 甲香酪各叁 薰陸香 白檀香 熟捷香 炭末酪壹 零陵香 青桂皮 青木香 甘松香 白漸香 藿香酪各壹 雀頭香 蘇合香 安息香 麝香

燕香各半兩

右二十味爲末酒灑令潤更用宿酒氣歇以白蜜和內甕

衣香方

丁子香壹兩 甘松香 苜蓿香 藿香各叁兩 零陵香各肆兩

右六味各擣加澤蘭葉四兩粗下篩用之極美

又方 零陵香貳兩 藿香 甘松香 苜蓿香 煎香 白檀香 沈水香各壹兩

右七味合擣加麝香半兩粗下篩用如前法

又方 藿香肆兩 丁香 甘松香 麝香 沈香 煎香

右六味粗下篩和爲乾香取裹衣大佳

舌病第四方十一首

靜嘉堂文庫所藏

(又方)舌主心藏熱即應舌生瘡裂破引胷揭赤服之洩熱方

蜀升麻　射干各叁兩　柏葉切壹升　大青貳兩
苦竹葉切　地黃汁各伍合　生玄參汁叁合赤蜜捌合
生薑根　黃薇根白皮各伍兩

右十味㕮咀以水四升煮取一升去滓下玄參汁令兩沸次下地黃汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿惹取汁安舌上含細細咽之

治舌上瘡不得食舌本強頸兩邊痛此是心虛熱所致

柴胡　升麻　芍藥　梔子人　通草各貳兩
黃芩　大青　杏人各壹兩半　生薑　石膏各貳兩

右十味㕮咀以水一斗九升煮取二升半分四服日三夜一滓可一晝前服之

治舌卒腫滿口溢出如吹猪胞氣息不得通須臾不治殺人方

急以指刮破舌兩邊去汁即愈亦可以鈹刀決兩邊破之以瘡膏傳之

(又方)刺舌下兩邊大脉血出勿使刺著舌下中央脉血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篦比令赤熨瘡數過以絶血也

(又方)平夏十一枚洗熟以酢一升煮取八合稍稍含嗽之吐出加生薑一兩佳

治舌腫起如猪胞方

釜下墨末以酢厚傳舌上下脫去更傳須臾即消若

靜嘉堂文庫所藏

先決出血汁覓傳之彌佳凡此患人皆不識或錯治
益困殺人甚急但看其舌下白有噤蟲形狀或如蠶
蛄或如卧蚕子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙
頭上使熟即自消

治舌腫強滿口方

滿口含糖酢少許時執通即止

治舌脹滿口不得語方

鹽壹升　蜜蟲參拾枚

右二味以水三升煮三沸含之稍稍咽之日三

治舌強不得語方

礬石　桂心

右二味等分爲末安舌下立瘥

舌上黑有數孔大如箸出血如湧泉此心藏病治之之方

戎鹽　黄芩一作葵子　黄蘗　大黄各伍兩
人參　桂心　甘草各貳兩

右七味末蜜丸梧子大以飲服十九日三亦燒鐵烙之

治舌上出血如泉方

燒鐵鎚熟爛孔中良

腎病第五神煎法一首　方一十首

潤脾膏　治脾熟腎焦枯無潤方

生天門冬切　生地黄汁　生麥門冬　菱雞各肆兩
猪膏叁升　細辛　甘草　芎藭
白朮各貳兩　黄耆　升麻各叁兩

右十一味㕮咀諸藥若酒淹一宿綿裹藥臨前平下生地

靜嘉堂文庫所藏

黃汁與猪膏共前取膏鳴水氣盡去滓取細細含之

甲煎膏塗治脊裂口臭方

先以麻擣泥泥兩口好龔餅容一斗已上各厚半寸曝令乾

甘松香伍兩　艾納香　首烏香

茅香各壹兩　薰香參兩　零陵香肆兩

右六味先以酒一升水五升相和作湯洗香令淨切碎又以酒水各一升浸一宿明旦取一斗五升烏麻油六味內其中微火煎三上三下去滓內上件一口餅中令少許不漏然後取

上色沈香參斤　雀頭香　蘇合香各參兩

白膠香　白檀各伍兩　丁香　麝香　甲香酪壹

右八味先酒水相和作湯洗香令淨各別擣碎不用絕細以蜜二升酒一升和香內上件龔餅中令實滿以綿裹餅口又以竹篾交橫約之勿令香出先掘地埋上件油餅令口與地平以香瓶合覆滿餅上令兩口相當以麻擣泥泥兩餅口際令牢密可厚半寸許用糠雜薤上厚五寸燒之火欲盡即加糠二日二夜勿令火絕計糠十二石訖停三日令冷出之別鍊蠟八斤煮數沸內紫草十二兩煎數十沸取一兩棄草向爪甲上研看紫草骨白出之又以綿濾過與前煎相和令調乃內朱砂粉六兩攪令相得少冷未凝之間傾置竹筒中筒上用紙裹麻纏之待凝冷解開任意用之計此可得五十挺

甲煎口脂治脣白無血色及口臭方

靜嘉堂文庫所藏

燒香澤法

沈香　甲香　丁香　麝香
檀香　蘇合香　薰陸香　零陵香
白膠香　藿香　甘松香　澤蘭

右十二味各六兩胡麻油五升先煎油令熟乃下白膠香藿香甘松澤蘭少時下火綿濾內麝餅中餘八種香擣作末以蜜和勿過濕內著一小麝餅中令滿以綿蓋口竹十字絡之以小餅覆大餅上兩口相合密泥泥之乃掘地埋油餅令口與地平乃聚乾牛糞燒之一方用糠火燒之七日七夜不須急滿十二日火尤佳待冷出之即成其餅並須熟泥勾厚一寸曝乾乃可用

煉蠟合甲煎法

蠟　紫草各斷兩

右先煉蠟令消乃內紫草煮少時候看以紫草向指甲上研之紫草心白即出之下蠟勿令凝即傾弱一合甲煎於蠟中均攪之訖灌筒中勿觸動候冷凝乃取之便成好口脂也傳口面日三

治緊脣方

纏白布作大燈炷如指安斧刃上燃炷令刃汗出拭取傳脣上日二三度或故青布亦佳并治瘡脣

灸自死螻蛄灰傳之灸炙松脂帖上取瘥

灸取蛇皮拭淨燒為灰傳之灸以火炙蠟帖脣取瘥

灸水服螵蟲灰良灸青布灰以酒服之脂和塗亦可

灸炙虎口男左女右灸炙承漿二壯

靜嘉堂文庫所藏

治瘭瘡方

以乾蠐螬燒末和猪脂臨卧傅之

治瘭生瘡方

以頭垢傅之日二度

又方 以胡粉傅之

治瘭瘡生瘡連年不瘥方

以八月藍葉十斤絞取汁洗不過三日瘥

治瘭舌忽生瘡方

燒雞粟白為末以布裹著病上含之

治瘭生核方

猪粟平量一升投水絞取汁温服之

治瘭黑腫痛癢不可忍方

取大錢四文於石上以臘月猪脂磨取汁塗之

又方 以竹弓弹出惡血取瘥

又方 燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和傅之亦治瘭瘭

治冬月瘭乾拆血出方

擣桃人以猪脂和傅之

治遠行瘭口面皴裂方

熟煎猪脂將行夜常取傅面沒行萬里野宿不損

靜嘉堂文庫所藏

重刊孫真人備急千金要方卷之六上

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


134
24
4 9

靜嘉堂文庫所藏

齒病第六論一首　方二十八首

論曰凡齒齒斷宣露多是疳蟲及月蝕以角蒿灰夜傳齦間使漏勿食油不過二三夜嚼食油及乾棗即發所以忌酒者忌油乾棗及桂心每日以一捻鹽內口中以暖水含揩齒及叩齒百遍爲之不絕不過五日口齒即牢密凡人齒齒不能食果菜者皆由齒根露也爲此藍湯揩齒叩齒法無不愈也神良凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深宜愼之所以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

治齲齒及蟲痛方

白附子　細辛　各陸錢

知母

芎藭　高良薑各拾貳銖

右五味爲末以綿裹少許著齒上有汁吐出一日兩度含之亦治口氣

又方　切白馬懸蹄如米許以綿裹著痛處孔中不過三度治蟲齒蟲齒積年不瘥從少至老方

雀麥草一名杜姥草似牛毛草以苦瓠葉四十枚淨洗露一宿平旦取草莖長二寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛之作五六十裹子取三年醯醋浸之至日中取兩裹內火中炮令極熱內口中齒外邊熨之冷則易之取銅器以水內中解裹於水中洗之得蟲長三分老者黃赤有色小者白色多者得三四十枚少者得一二十枚

萇荂子三合如煎葱子並得以青錢七文燒令赤取小口甕子令可口含得者將錢內甕子中取一撮許萇荂子安錢上令炮燒聲仍與半合許水淋令氣上從甕出將口含甕口令氣莫出用熏齒冷復更作取三合藥盡爲劑非止蟲齒得瘥或風齒齲齒齒中病悉主之口中多津即吐之

又方　白楊葉切一升水三升煮取一升取半升含之蟲立出

又方　大醋一升煮枸杞根白皮一升取半升含之蟲立出

又方　取桃人少許以釵頭穿向燈上燒之煙出經少時吹滅即內入口安蟲齒上咬之不過五六度一方作胡桃人

靜嘉堂文庫所藏

治齒蟲蝕齒根方

地龍置石上著一撮鹽須臾化爲水以麪展取却待凝厚取以內病上又以皂莢去皮塗上蟲即出

又方 純麻子燭燼研以井花水塗之

又方 黑羖羊脂煎若子各等分先燒鐵鋤斧銼令赤內其中烟出以布單覆頭令煙氣入口熏之

治齒斷腫痛及蟲痛方

黃芩　甘草　桂心　當歸　細辛　蛇床子各壹兩

右六味咬咀以醋漿水七升煮取二升去滓含之良久吐却

治齒有孔不得食面腫方

莽草七葉　豬椒附根皮長肆寸者杀搥

右二味咬咀以漿水三升煮取一升漸口含僕即吐却

口二三度

治齒根腫方

松葉壹把切　鹽壹合

右二味以酒二升煮取一升含之

治齒根動欲脫落方

生地黃綿裹著齒上咬之又咬咀以汁漬齒根日四五度著之并咽汁十日大佳

治齒根動且痛方

生地黃　獨活各叁兩

右二味咬咀以水一升漬一宿取含之

治齒斷間津液血出不止方

靜嘉堂文庫所藏

生竹茹二兩醋煮令含之

又方 細辛貳兩 甘草壹兩

右二味㕮咀以醋二升煎取一升日夜漱含之

又方 礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之已後不用朽人牙根齒落不用之可也

治齒間血出方

以苦竹葉濃煮與鹽少許甚溫得所含之冷即吐

又方 溫童子小便半升取三合含之其血即止

治齒出血不止方

刮生竹皮二兩浸之令其人解衣坐使人含嚼其背上三過仍取竹刮濃煮汁勿與鹽適甚溫含嗽之竟日為度

治酒醉牙齒漏血出方

當歸貳兩 礬石陸銖 桂心 細辛 甘草 酸各壹兩

右五味㕮咀以漿水五升煮取三升含之日五六夜三

又方 燒釘令赤注血孔中止

治頭面風口齒疼痛不可忍方

蜀椒貳合 莽草 搗藥 雀李根 獨活各貳兩

細辛 苦參 防風各壹兩

右七味㕮咀以酒二升半煮二五沸去滓含之冷吐更含之勿咽汁張文仲有白木貳兩

又方 雞粟白燒灰以綿裹置齒痛上咬咋之

又方 煮枸杞汁含之

又方 生地黃壹節 蒜壹瓣 雞粟白以醋漬煮稍稍含之

靜嘉堂文庫所藏

右二味熟擣綿裹著痛上咬之勿咽汁出吐之日日爲之瘥止

又方 含鹽泉須臾止

治風齒疼痛方

灸外踝上高骨前交脉二壯

又以線量手中指至掌後橫文折爲四分量橫文從當脊中灸二壯愈灸之當隨左右

含漱湯 治齒痛方

獨活 當歸各三兩 藁本 細辛

芎藭 華撥各二兩 丁香一兩

右七味咬咀以水五升煮取二升半去滓含漱須臾閉乃吐更含之古今錄驗同有甘草一兩

又白馬泉隨左右含之不過三五口

漱湯 治齒痛方

腐棘刺二百枚以水二升煮取一升旋旋含之日四五度以瘥止

又方 芎藭 細辛 防風 礬石

附子 藜蘆 莽草

右七味各等分作末綿裹如彈丸大酒浸安所患處含之勿咽日三刺破極佳

又方 蛞蝓糞水和作稠泥團以火燒令極赤如粉以臘月豬膏和傳齒斷上日三兩度永瘥

又方 取自死蛞蝓乾者擣末著痛處即止

治齒斷痛不可食生果方

靜嘉堂文庫所藏

生地黃　桂心

右二味合嚼令味相得咽之

又方　馬齒一把嚼之即瘥

治牙癰塞口噤不開方

附子大者壹枚　黃連拾捌銖　礬石壹兩

右三味爲末內管中強開口吹之入喉間細細吹之

喉病第七　論一條　方五十首　針灸法一首

小續命湯　加杏人一兩治卒喉痺不得語方見第八卷中

烏翣膏　喉嚨者脾胃之候若藏熱喉則腫塞神氣不通[illegible]之

生烏翣拾兩　升麻叁兩　羚羊角

通草　芍藥各貳兩　薔薇根切壹升

生地黃切伍合　豬脂貳斤　艾葉陸銖生者[illegible]

右九味㕮咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內豬脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴爲度去滓薄綿裹膏似大杏人內喉中細細吞之

治喉腫痛風毒衝心胸方

豉壹升半　犀角　射干　杏人　甘草各貳兩

芍藥叁兩　梔子柒枚　升麻肆兩　羚羊角壹兩半

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一沸分三服

治喉腫胸脅支滿方

灸尺澤百壯

治風毒咽水不下及瘰癧腫方

升麻　芍藥各肆兩　射干　杏人

楓香　葛根　麻黃各叁兩　甘草貳兩

靜嘉堂文庫所藏

右八味咬咀以水八升煮取二升半分三服

治喉痺方

又方 燒牛角末酒服之

又方 含雞粟白

又方 巴豆去皮針線穿咽入牽出

又方 馬蘭子半升水二升煮取一升半服之

又方 煮桃皮汁三升服之

又方 燒荊汁服之又水三升煮荊一握取一升分二服

又方 剖手小指爪文中出三大豆許血逐左右剌皆須愼酒麴毒物

又方 臘月猪尾燒末水服之

又方 灸舌人令黑含咸末服之

治喉痺及毒氣方

桔梗二兩水三升煮取一升頓服之

又方 牛薑二斤擣取汁蜜五合微火煎稍和服一合日五

又方 附子一枚破作大片蜜塗炙令黃含咽汁甘盡更塗炙如前法

又方 剥大蒜塞耳鼻日二易

治喉痺卒不得語方

濃煮桂汁服一升亦可末桂者舌下漸咽之良

又方 煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方 以酒五合和人乳汁半升分二服

又方 燒炊箅作灰二指撮水服之

又方 灸蚯蚓末水和薄之乾則易

靜嘉堂文庫所藏

又方 商陸苦酒熬令濃熟傳之冷則易
又方 末桂心如棗核大綿裹著舌下須臾破
治喉卒腫不下食方
以韭一把擣熬薄之冷則易
又方 含上好醋口舌有瘡亦佳
治懸癰雞卵熟暴腫長方
乾薑半夏等分末以少少著舌上
又方 鹽末以筋頭張口使婦人用左裙裾拄其頭上七
治懸癰咽中生息肉舌腫方
日初出時向日張口拄之日五
下瘥
又方 羊蹄草煮取汁口含之

凡喉痺卒深腫連頰吐氣數者名馬喉痺治之之方
馬嚼一貝水二升煮取一升分二服
又方 亂中蒼耳三七枚燒末水服之
又方 馬鞭草根一握勿中風截去兩頭擣取汁服
又方 燒穀奴灰酒服之立破
咽喉藏熱咽門則閉而氣塞若腑
咽喉藏酒 咽門若肝膽之候若藏熱咽門則閉而氣塞若腑
寒咽門則破而聲嘶此證宜服之
牛髓 油各壹升 桂心
母薑汁煎酥
蔥椒各壹兩 芎藭 獨活各壹兩 防風壹兩半
右九味爲末內薑汁中煎取相淹漉下髓酥油等令調
微火三上三下前平旦溫清酒一升下二合膏即細細

靜嘉堂文庫所藏

吞之日三夜一

又方 冊參　升麻　雄黃　杏人
鬼臼　甘草　射干　各壹兩　麝香半兩
右八味爲末以蜜丸如梧子飲下一丸加至五丸日三
酒服亦佳咽痛失聲不利用之良

治咽傷語聲不徹方
酥　各壹升　乾薑貳兩半末
酒　通草　桂心　石菖蒲　各貳兩
右六味合和服一七日三

又方
酒　酥　各壹升　乾薑末拾兩
右三味以酒二合酥一合酥一七薑末二七相和服日三
服亦治肺痛

治咽塞數噫方
桂心　陳皮　杏人　拾別錄
右二味爲末蜜丸如杏人大含之細細咽汁日夜勿絕

治咽痛逆氣不能食方
麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升
漸至二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理產婦及丈
夫中風如角弓反張口噤不開大驗與紫湯氣力同

治卒咽痛方
懸末枸橘末水服方寸匕日三

又方 燒炊箅一枚熬水服方寸匕
治卒風咽腫面腫方
杏人末和雞子黃更擣傳上乾復易之七八度若腫

靜嘉堂文庫所藏

汁出煮醋和伏龍肝傳乾更易之

治尸咽方

燒後鼻纔爲灰暖水服之

又方 燒麻子脫服之

治咽喉不利下氣方

射干　杏人　人參　附子　桂心各壹

右五味末蜜丸如指大含一丸稍稍咽之令藥味相

治咽喉中痛瀉吐之不出咽之不入似得蠱毒方

含生薑方寸十日揾

又方 以青布裹麻黃燒以竹筒盛煙熏咽中

耳聾第八方五十五首

治腎熱背急攣痛耳腫血出或生肉塞之不聞人聲方

磁石　白朮　牡蠣各伍兩

甘草壹兩　葱白　生地黃汁各壹升

芍藥貳兩　大棗卷伍枚　生麥門冬陸兩

右九味㕮咀以水九升煮取二升分二服

治腎熱面黑目白腎氣內傷耳鳴吼閉短氣四肢疼痛腰背相引小便黃赤方

白朮伍兩　生薑陸兩　羊腎一具治如食法

玄參貳兩　澤瀉貳兩　淡竹葉切貳升

芍藥　茯苓各叁兩　生地黃切壹升

右九味㕮咀以水二斗煮羊腎竹葉取一斗去滓澄之下藥煮取三升分三服不已三日更服一劑

治腎熱耳腫血出溺日夜不止方

靜嘉堂文庫所藏

鯉魚腦壹枚　鯉魚腸一具洗細切
鯉魚鮓冬二斤　烏麻子熬令香壹升
右四味先擣麻子碎次下餘藥擣爲一家內器中微火
熬暖布裹薄耳得兩食頃開之有白蟲出更作藥若兩
耳並膿出用此爲一劑以薄兩耳若止一耳分藥爲兩
劑不過三薄便瘥愼風冷
治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴焦枯方
生地黃汁一升　生天門冬汁　白蜜各叁
羊腎一具炙　白朮　麥麪各壹斤　甘草
乾薑　地骨皮各二兩　桂心　杜仲
黃耆酪雞當歸　五味子各叁兩
右十四味爲末內銚中取前二物汁和研微火上暖然

服熟更研日曝乾當研令離盆酒服方寸匕日再
治聾鴟汁出皆由腎寒或一二十年不瘥方
柘根三十片　葛浦切五斗各用水壹石煮取伍斗去滓澄清
故鐵二十斤燒赤水伍斗浸參宿去鐵澄清
右三味合一石五斗用米二碩并麴二斗釀如常法酒
熟一月封頭開清用礪石嗡鐵者三斤擣爲末內酒中
浸三宿飲之日夜飲常取小醉而眠取聞人語乃止藥
服天門冬酒百日瘥方見第十四卷中
礬石少許以生葛浦根汁和點入耳中
治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴方
山茱萸　乾薑　芫絲子　巴戟天　芍藥　澤瀉
桂心　黃耆　乾地黃　遠志

靜嘉堂文庫所藏

蛇牀子　石斛　當歸　細辛　菟絲
牡丹　人參　甘草　附子　茯苓各貳
菖蒲壹兩　羊腎貳枚　防風壹兩半

右二十二味爲末蜜丸如梧子食後服十五丸日二加至三四十丸止皆緣腎虛耳故作補腎方又作薄利九竅藥即瘥

治耳聾方

巴豆　杏人各柒枚　生地黃搥粗者長壹寸半
印成鹽兩顆　頭髮如雞子大燒灰

右五味治下篩以綿薄裹內耳中一日一夜若小損即去之直以物塞耳耳中黃水及膿出漸漸有效不得更著一宿後更內一日一夜還去之依前

治耳聾方

葶藶人伍合　杏人　桃人　石鹽　礜石
附子貳分　薰陸香　菖蒲　通草各叁分　巴豆壹分
松脂各拾分　蠟捌分

右十二味先擣草石令細別研諸人如脂內松脂蠟合擣數千杵令可丸乃止以如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻不過三四日易之

礜石肆兩　天門冬　地骨皮　生薑各叁兩　山茱萸
土瓜根　牡荊子　菖蒲　芎藭
枳實　白芷　橘皮　甘草各貳兩　竹瀝貳升

右十五味㕮咀以水八升煮減半內瀝煮取二升五合分三服五日一劑三日乃著散內耳中如後方

礜石肆兩　石菖蒲　白斂　牡丹

靜嘉堂文庫所藏

山茱萸　牛膝　土瓜根各貳兩

右七味治下篩綿裹塞耳日一易之仍服大三五七散

佳方見第十三卷

又方　蠟　松脂　薰陸香

草麻　石鹽　亂髮灰

右六味等分為末作丸綿裹塞耳時易之瘥止

又方　巴豆拾肆枚　成鍊松脂半兩

右二味合治丸如黍米大綿裹以簪頭著耳中日一易

藥如硬微火炙之以汁出乃愈大效

又方　防風　菖蒲　細辛

附子　芎藭各陸銖　雄鯉魚腦貳兩

右六味㕮咀以魚腦合煎三上三下以膏香為成濾去

滓密以一棗核灌耳中以綿塞之古今錄驗用療耳中鳴者以[illegible]歸代防風以白芷代芎藭

又方　竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之冷烊注耳中

又方　菖蒲附子各等分為末以麻油和以綿裹內耳中廣濟方以療耳卒痛欲死者崔氏以苦酒和塞耳

又方　燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜

去之旦別著

又方　草麻一百顆去皮　大棗十五枚去皮核

右二味熟擣丸如杏人大內耳中二十日瘥

又方　芥子擣碎以男兒乳和綿裹內之

又方　取柴胡苗汁灌耳中再度瘥

又方　作一坑可容二升許著炭火其中坑似窖形以塼覆

靜嘉堂文庫所藏

口上塼上作一孔子容小指塼孔上著地黃一升以
木盆覆之以泥泥盆下勿漫盆底上鑽一小孔可容
筯其孔上著二重布以耳孔當盆上薰久若悶去黃
水髮裹塩塞之不過二三度神效

又方 擣豉作餅填耳內以地黃長五六分削一頭令尖內
耳中與豉餅底齊餅上著楸葉蓋之剜一孔如筯頭
透餅於上灸二壯

又方 作泥餅子厚薄如餛飩及覆耳上四邊勿令泄氣當
耳孔上以草刺泥餅穿作一小孔於上以艾灸之百
壯候耳中痛不可忍即止側耳瀉却黃水出盡即差
當灸時若泥乾數易之

又方 酒二升碎牡荊子二升浸七日去滓任性服

十年久聾亦瘥

又方 截箭幹二寸內耳中以麪擁四畔勿令泄氣灸筒上
七壯

又方 硫黃雄黃各等分為末綿裹內耳中數日聞人語聲

又方 以綿裹蛇膏塞耳神良

又方 溏酢微火煎附子一宿削令可入耳以綿裹塞之

又方 礬石 葛蒲 當歸
細辛 甘草 防風 芎藭 白芷
烏賊骨 附子 皂莢各半兩巴豆拾肆枚

右十二味薄切二升酢漬一宿以不中水雞膏九合煎
三上三下以巴豆黃膏成去滓內雄黃末攪調取棗核
大瀝耳中綿塞之日二易

靜嘉堂文庫所藏

又方 桂心 拾捌銖 野葛 陸銖 成煎雞肪 伍兩

右三味㕮咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙令少熱欹卧傾耳灌之如此十日盯聹自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞莫使泄氣五日乃出之 千金翼云治二十年耳聾

治耳聾乾盯聹不可出方

擣自死白項蚯蚓安葱葉中用麪封頭蒸令熟並化為水以汁滴入耳中滿即止不過數度即挑易出瘥後髮裹鹽塞之 用後以療蚰蜒入耳立效

又方 取酢三年者灌之最良次用綿塞半日許必有物出

亦書 治耳聾齒痛方

桂心 大黃 白朮 細辛 芎藭 各[illegible]

乾薑 貳兩 丹參 伍兩 蜀椒 壹升 巴豆 拾枚 大附子 壹枚

右十味㕮咀以苦酒二升浸一宿内成煎猪肪三斤火上煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹内耳中齒冷痛則著齒間諸痛皆摩若腹中有病以酒和服如棗許大咽喉痛取棗核大吞之

治卒耳聾方

細辛 菖蒲 各陸銖 杏人 麴末 各拾銖

右四味和擣為丸乾即著少猪脂取如棗核大綿裹内耳中日一易小瘥二日一易夜去旦塞之

治三十年久聾方

故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入麴釀米七斗如常造酒法候熟取磁石一斤研末浸酒中三日乃

靜嘉堂文庫所藏

可飲取醉以綿裹礪石內耳中好覆頭卧酒醒去礪
石即瘥

治耳聾有膿散方

附子壹兩　禹餘粮陸錢　伏龍肝
龍骨　　金屑墨　烏賊骨各半兩

右六味爲末取如皂莢子大綿裹內耳中日一易取瘥
不瘥者有蟲加麝香一豆大

治耳聾有膿不瘥有蟲方

酢叁合　鯉魚腸壹具切

右二味和擣帛裹內耳中兩食頃當悶痛有白蟲著藥
去之更入新者蟲盡乃止其藥去蟲還可用

又方　先以紙纏去耳中汁次以礬石末粉耳中次以石鹽末粉其上食久乃起不過卅度求瘥

治耳鳴聾方

擣桂和鯉魚腦內耳中不過三四度瘥

當歸　細辛
防風　附子

右六味爲末以鯉魚腦八兩合煎二上三下膏成去滓
取棗核大灌耳中旦以綿塞耳孔

治耳鳴水入方

附子　礬石各拾陸銖　當歸
細辛　桂心各拾銖　萬浦壹兩　甘草各拾銖通草
　　貳兩半　獨活壹兩半

右九味爲末以白鵝脂半合稍稍和取如棗核大綿裹
內耳中日三旋旋和用一本用葱涕半合

靜嘉堂文庫所藏

治耳鳴如流水聲不治久成聾者
搖生烏頭乘濕削如棗核大內耳中日一易不過三日愈亦療聾及卒風聾病

治聤耳出膿汁方
礬石　黃連　烏賊骨　赤石脂
右四味各等分爲末以綿裹如棗核大內耳中日二叫不用赤石脂姚氏加龍骨壹兩千金翼同姚氏

治聤耳痛膿血出方
取釜月下灸薄耳中日二次易換每換以篦子去之再著取瘥止

治聤耳方
取桃人熟擣以舊絲綿裹內耳中日二易以瘥爲度

治底耳方
取黃礬燒綿裹內耳中不過三二日愈或以葦管吹耳中肘後以療耳卒腫痛膿

治百蟲入耳方
末蜀椒一撮以酢半升調灌耳中行二十步即出

又方
火熨桃葉捲之取塞耳立出

又方
取車轄脂傅耳孔蟲自出肘後以療聤耳膿血

又方
以蔥涕灌耳中虫即出亦治耳聾

治蜈蚣入耳方
炙豬肉令香掩耳即出

治蚰蜒入耳方
燃胡麻擣碎以蒁袋盛傾耳枕之即出

靜嘉堂文庫所藏

以牛酪灌之漏耳即出出當半消若入腹中空腹食好酪一二升即化為黃水而出不盡更服手用神效（千金翼作牛乳）

治耳中有物不可出方

以弓弦從一頭令散傳好膠柱耳中物上停之令相著徐徐引出

面藥第九方八十一首

五香散　治黡皰黧黯黑運赤氣令人白光潤方

黃耆　白茯苓　姜黃　杜若　商陸

大豆黃卷（各二兩）　白芷　當歸　白附子

冬瓜人　杜衡　白殭蠶　辛夷人　香附子

丁子香　蜀水花　旋覆花　防風　木蘭

芎藭　藁本　皂莢　白膠　杏人

天門冬　土瓜根　白朮　梅肉　酸漿

水萍（各三兩）　畢豆（四兩）　猪脈（二具暴乾）

右三十二味治下篩取洗面二七日白一年與衆別洗手面令白淨悅澤澡豆方

白豆麪一升　三升浸猪脈為麪餅暴乾擣篩

猪脈兩具大者細切　冬瓜人（四合）

枯蓼子　白朮　白茯苓　白芷　白蘞皮

土瓜根　羌活　白附子　白斂　菟絲子

商陸　芎藭（各一兩）　姜黃　桃人　杏人

右十九味合擣篩入麪猪脈拌勻更擣每日常用以漿水洗甚良

靜嘉堂文庫所藏

又方 畢豆麪一升 枯萎實三兩 一方不用 猪脬五具 細切
土瓜根 白茯苓 萎蕤各五兩 皂莢三挺
右七味擣篩將猪脬拌和更擣令勻每旦取洗手面百
日白淨

又方 白芷 白斂 白朮 桃人
冬瓜人 杏人 萎蕤各等分 皂莢倍其數
右八味為末絹篩洗手面時即用

又方 畢豆麪三升 大豆黃麪亦得 白芷 青木香 甘松香
零陵香 藿香各二兩 冬葵子一本用冬葵子 枯萎人四兩
右八味擣篩用如常法
令人面白淨悅澤方

白斂 白朮 白附子
白芷各二兩 藁本三兩 猪脬三具以漬去汁盡所
右六味為末先以蕪菁子半升又酒水各半升相和煮
數沸研如泥合諸藥內酒水中以麁器貯封三日每夜
取傅面且以漿水洗之
令人面潔白悅澤顏色紅潤方

猪脬五具 蕪菁子二兩 枯萎子伍兩 桃人三兩
右四味以酒和熟擣傅之慎風日

又方 採三株桃花陰乾為末空心飲服方寸匕日三并細
腰身

又方 以酒漬桃花服之好顏色治百病三月三日收

澡豆治手乾燥以潤方

大豆黃五升 赤小豆去皮 苜蓿 零陵香子各一升

靜嘉堂文庫所藏

冬瓜人　茅香各六合　丁香五合　麝香一兩　猪脬五具細切

右九味細擣羅與猪脬相合和暴乾再擣篩取洗手面

又方　大豆未二升絹篩　猪脬五具乾之　瓜蔕灰一兩　甘松香

零陵香二兩　白芨苓

右九味為末調和訖與猪脬相和更擣令勻欲用稍稍取以洗手面八九月合岑處貯之三月已後勿用神良

面脂　主悅澤人面耐老方

冬瓜人　白芷　商陸　芍藥各三兩　當歸

藁本　蘼蕪　土瓜根去皮　桃人各一兩　萎蕤

細辛　防風各一兩半　木蘭皮　辛夷　甘松香

麝香　白殭蠶　白附子　梔子花　零陵香半兩

猪脬三具切水漬六日欲用時以酒投取汁漬藥

右二十一味薄切綿裹以猪脬汁漬一宿平旦以煎猪脂六升微火三上三下白芷色黃膏成去滓入麝汁及

麝器中取塗面

又方　治面上皴黑凡是面上疾皆主之方

丁香　零陵香　梔子花　桃人　白斂

茯苓　土瓜根　蒴藋子　防風　沈香

辛夷　當歸　麝香　藁本　商陸

芎藭各三兩　萎蕤一作白及　蘼蕪一本無　白芷　甘松香

白殭蠶　木蘭皮各二兩半　蜀水花　青木香

冬瓜人四兩　羊腎脂　鵝脂各一斤半　羊髓一片　生猪脂三斤

右二十九味咬咀先以美酒五升投諸脬六具取汁漬藥一宿於猪脂中微火極煎三上三下白芷色黃以綿

靜嘉堂文庫所藏

一大兩內生布中絞去滓入麝香末以白木篦攪至凝
乃止任性用之良

面膏 去風寒令人面光悅却老去皺方

青木香 白附子 白芷 芍藥
零陵香 香附子二兩 茯苓 甘松 各一兩 羊髓一斤 半鍊

右十味咬咀以酒水各半升浸藥經宿次日煎三上三
下候酒水盡膏成去滓取摶面如妝若有黑黯皆落

玉肩面膏 治面無光澤皮肉皴黑久用令人潔白光潤方

玉肩細研土瓜根 白附子 商陸 芍藥
萎蕤 冬瓜人 桃人 白芷 木蘭
辛夷 各一兩 菟絲子 青木香 藁本 當歸
黃耆 白殭蠶 藿香 細辛 各十八銖 麝香

防風 兩各半 鷹粟白 蜀水花 一合 猪脈三具 細切 白犬脂
鵝脂 雄脂 猪肪脂 各一斤

右二十八味先以水浸猪鵝犬雄脂數易水浸冷血脈
盡乃可用咬咀諸藥清酒一斗漬一宿明旦生擘猪鵝
等脂安藥中取銅鎒於炭火上微微煎至暮時乃熟以
綿濾置甕器中仍以鍊繫白芷斤看色黃即膏成其猪
脈取浸藥酒授取汁安鎒中其玉肩蜀水花鷹粟白麝
香為末膏成安藥中攪令勻旋取傳面

玉肩面脂方

玉肩 白附子 白芷 青木香 萎蕤
白朮 白殭蠶 密陀僧 甘松香 烏頭
商陸 石膏 胡粉 芍藥
黃耆

靜嘉堂文庫所藏

葉本　防風　芒硝　白礬各一兩　當歸
土瓜根　桃人　芎藭各二兩　辛夷　桃花
白頭翁　零陵香　細辛　知母各半兩　猪脂一斤
羊腎脂一具　白犬脂　鵝脂各一合
右三十三味切以酒水各一升合漬一宿絞之用銅器
微火煎令水氣盡候白芷色黃去滓停一宿且以枝枝
攪白乃用之

令黑者皆白老者皆少方

玉肾　寒水石　木蘭皮　旋覆花　珊瑚
丁香　土瓜根　蜀水花　白茯苓　芎藭
菟絲子　辛夷人　冬瓜人　白頭翁　當歸
藁本　白殭蠶　青木香　蕪菁子　梔子花
細辛　菱雞　商陸　白芷　防風
黃耆　桃人　藿香　前胡　桂心
半夏　白斂　杏人　蘼蕪　芒消
杜衡　麝香　秦椒　礬石　秦皮
杜若　升麻　蜀椒　黃芩　白薇各六銖
括蔞人一兩　雄脂　鵝脂　羊髓　牛髓
白狗脂五合　鷰屎白一合　清酒　猪肪脂各一升
右五十四味咬咀酒漬一宿內脂等合煎三上三下酒
氣盡膏成絞去滓下麝香末攪至凝色變乃止甕器密
貯勿洩氣

鍊脂法

凡合面脂先須知鍊脂法以十二月買極肥大猪脂

靜嘉堂文庫所藏

水漬七八日日一易水煎取清脂沒水中鍊鵝雄脂
皆如此法

治外壹主面黯黶方

白笠　白蠟各二兩　白附子　辛夷
防風　烏頭　零陵香　藿香
婆䴬各半兩　藁本一兩　商陸　麝香各六銖
麻油二合　羊脂五合　牛脂　鵝脂各一斤

右十六味薄切酐漬浹洽經一宿旦合煎候白芷色黃
膏成以皂莢湯洗面傳之日三

又方雞子三枚　胡粉細研　丁香各一兩

右三味先以醋一升漬七日後取雞子白調香粉令勻
以漿水洗面傳之

又方白礬　石硫黃　白附子各六銖

右二味為末以酢一盞漬三日夜淨洗面傳之莫見風
日慎三七日可白如雪

白面方

牡蠣三兩　土瓜根一兩

右二味為末白蜜和取塗面即白如玉旦以溫漿水洗
之宜慎風日

豬蹄湯洗手面令光潤方

豬蹄一具　桑白皮　芎藭　萎䴬
白芷　白茯苓各三兩　商陸一作當歸　白朮酪二
白芷

右八味㕮咀以水三斗煎豬蹄及藥取一斗去滓每服
一盞洗手面大佳

靜嘉堂文庫所藏

猪蹄漿 急面皮去老皺主光澤方

大猪蹄一具淨治如食法以水二升清漿水一升不
渝盆中煮成膠用洗手面又以此藥和澡豆夜塗面
旦用漿水洗面皮即急

鹿角散 令百歲老人面如少年待主光澤潔白方

鹿角長一握牛乳三升 芎藭 細辛
天門冬 白芷 白朮 白歛
白附子 酥各三兩 杏人五七枚

右十一味咬咀先以水漬鹿角一百日出之與諸藥內
牛乳中緩火煎令汁盡出角以白練袋盛餘藥勿收至
夜取牛乳石上磨鹿角取塗面旦以漿洗之無乳小便
研亦得

治面黑不淨洗手面澡豆方

白豆屑二升 白附子 甘松香 丁子香 白芷
白礬灰 白檀香 白朮 木香一用藁木
皂莢 鷰屎白 大棗 杏人各三十枚
芎藭 白鮮皮各三兩
麝香二兩 白梅肉三七枚 麪三升 冬瓜人五合
猪腦三具 雞子白七枚 土瓜根一兩一本用併瓜子

右二十一味先以猪腦和麪曝乾然後合諸藥擣末又
以白豆屑二升為散每日用盥洗十日色白如雪三十
日如凝脂神驗附千金翼無白礬皂莢芎藭白
附子大棗有柱心三兩

鉛丹散 治面黑令人面白如雪方

鉛丹三十銖 真女菟六十銖

右二味治下篩酒服一刀圭日三男十日女二十日知

靜嘉堂文庫所藏

知則止黑色皆從大便出面白如雪

治面黑令光澤潔白方

白楊皮十八銖一方用吉皮　桃花一兩　白瓜子人三十銖

右三味治下篩温酒服方寸匕日三欲白加瓜子欲赤加桃花三十日面白五十日手足俱白

治面黑生黡皰方

白斂十二銖　生礬石敎急方無　白石脂六銖　杏人三銖

右四味研和雞子白夜卧塗面上旦用井花水洗之

治面黡皰令人悅白方

枯蕪子六合　白石脂五合　雀屎二合去黑　麝香半兩

右四味擣篩別研麝香雀屎白石脂和合取生菟絲苗汁和之如薄泥先用澡豆洗去面上垢膩次以藥塗黡上日夜三四度平旦温漿水洗之

治黡黯烏鼾令面潔白方

馬珂二兩　白附子　鷰屎白　珊瑚各一兩

右四味研成粉和勻用人乳調每用取傳面明旦温漿水洗之

去面上鼾子黑誌方

夜以暖漿水洗面以生布揩鼾子令赤肩水研白旋擣取濃汁塗鼾子上旦復以暖漿水洗之次以鷰屎白傅其上

洗面去黡黯主悅白方

猪胰兩具去脂豆麪四升冬瓜入汁半升皂莢五挺細辛白朮各一兩　防風　白斂　白並各二兩　商陸三兩

靜嘉堂文庫所藏

右十味和土瓜根一兩擣絹羅取大豬蹄一具煮令爛作汁和散為餅曝乾再擣為末羅取豉洗不過一年白悅人澡豆主悅澤去黯黯方

桃花九 治面黑黯令人潔白光悅方

桃人 燕菁子 一兩 畢豆麪二升 白朮六合 土瓜根七合 桃花二升 桂心 烏喙 甘草 各一兩

右五味和合擣篩以酢漿水洗手面

右四味為末白蜜丸如大豆許每服十丸日二服十日易形一方有白附子 酥瓜子杏人各一兩為七味

治面黯內外兼治方

成鍊松脂為末溫酒服三合日三服盡三升無不瘥

治面黯方

李子人為末和雞子白傅一宿即落

又方 甘草二兩末 白羊乳二升 羊脬二具水浸去汁小切

右三味相和一宿先以酢漿洗面生布拭之夜傅藥兩遍明旦以猪蹄湯洗却每夜洗之

又方 白附子為末酒和傅之即落

又方 桂心 蜜 石鹽 各等分

右三味為末相和

又方 以上朱砂研細如粉和白蜜塗之旦以酢漿洗却大驗

又方 白附子 香附子 白檀 馬珂 紫檀 各一兩

右五味為末白蜜和如杏人大陰乾臨用以水研塗面旦以溫水洗却忌風油七日面色如蓮花

又方 水和丹砂末服方寸匕男七日女二七日色白如雪

靜嘉堂文庫所藏

治人面黑黯黑膚色粗陋皮厚狀醜方

殺羊脛骨為末以雞子白和傳之旦以白淨梁米泔洗之三日白如雪

又方 白蜜和茯苓粉傳之七日愈

又方 杏人酒浸皮脫擣碎綿裹盛夜取拭面

又方 酒浸雞子三枚密封四七日成傳面白如雪

又方 杏人為末 雞子白

右二味相和夜塗面明旦以米泔洗之

治面多黑黯皮因粗澁令人不老皆主之方

朱砂 雄黃各三兩 水銀霜半兩 黃礬糞一升上胡粉二兩

右五味並細研胡粉以面脂和淨洗面夜塗之以手細摩令熱明旦不發作皴然須五日一洗面一塗不過三

所有惡物一切皆除數倍火燉令悅澤光白潤好及手皴方

猪蹄兩具治如食法 白梁米一升洗令淨

右一味以水五斗合煮猪蹄爛取清汁三斗用煮後藥

白茯苓 商陸各五兩 菱雞三兩 白芷 葉本各二兩

右五味咬咀用前藥汁三斗并研杏人一升合煮取一斗五升去滓甕瓶盛貯內甘松零陵香末各一兩入膏中攪令勻綿幕之每夜取塗手面

治面黑黯黑皮皺皴皮散方

白附子 蜜陀僧 牡蠣 茯苓 芎藭各二兩

右五味為末和以殺羊乳夜塗面以手摩之旦用漿水洗不過五六度一重皮脫黯瘥矣

靜嘉堂文庫所藏

治面黑䵟方

沈香　牛黃　薰陸香　雌黃

鷹屎　丁香　玉屑各十二銖　水銀六銖

右八味為細末蜜和以傅

白瓜子丸 治面黑䵟令色白方

白瓜子二兩　遠志　藁本　杜衡　雲母粉

車前子　白芷　當歸各一兩　細辛　柏子人

栝蔞人　橘皮　白石脂　鉛丹各半兩　天門冬三兩

右十五味為末蜜和丸如梧子大空腹服二十丸日三

治粉滓黑䵟方

白斂十二銖　白石脂六銖

右二味擣篩以雞子白和夜卧塗面旦用井花水洗却

去粉滓黑䵟皯皰及茸毛令面悅澤光潤如十四五時方

黃耆　白朮　白斂　萎蕤　土瓜根

商陸　蜀水花　鷹屎白一兩　防風一兩半　白芷

細辛　青木香　白附子　芎藭　杏人各二兩

右十五味為末以雞子白和作挺陰乾石上研取漿水塗面夜用旦以水洗之細絹羅如粉佳

治面粉滓方

熬礬石以清酒和傅之不過三上

又方 擣生菟絲苗汁塗不過三上

治年少氣盛面生皰瘡方

胡粉半兩　水銀一兩一方有真珠

右二味以臘月豬脂和熟研令水銀消向暝以傅面日

靜嘉堂文庫所藏

起布拭之慎勿水洗至暝又取傅面不過三上瘡

治面瘡疱疥癰惡瘡方

附子十五枚　蜀椒一升　野葛一尺五寸

右三味吙咀以酢漬一宿猪膏一斤煎令附子色黃去滓塗之日三上

治面瘡疱方

鸜鵒屎一升為末以臘月猪脂和令勻夜傅之

治面瘡方

木蘭皮一斤以三年酢漬令沒百日曝乾為末溫酒服方寸匕日三

治面皰方

淳酒二升　牛膽　羖羊膽各一具

右三味合煮三五沸傅之

又方　薺苨　肉桂各二兩

皴去黑誌

又方　冬葵子　柏子仁　冬瓜子　茯苓各等分

右四味為末酒服方寸匕食後服日三治面皰甚者

又方　生地黃三斤　枸杞根一十斤

右二味先擣枸杞次擣地黃曝乾合篩空腹酒服方寸匕日三久服顏如童子此祕方也

梔子丸　治酒皶鼻皰方

梔子仁　大黃六兩

木蘭皮半兩　甘草各四兩

豉各三升　芎藭

靜嘉堂文庫所藏

右六味為末蜜和丸如梧桐子初服十九日三稍加至十五九

治鼻齆方

漢藥子 搥子人 豉各一升 木蘭皮半斤

右四味為末以酢漿水和如泥夜傳之日未出時暖水洗却亦主滅皶痕

治面上風毒方

玉屑 蜜陀僧 珊瑚各二兩 白附子三兩

右四味為末以酥和夜傳且洗之亦滅皶痕

治面有熱毒惡瘡方

胡粉熬 黃蘗炙 黃連各等分

右三味為末取傳上瘡止若瘡乾以面脂調塗之日三

滅皶痕方

以猪脂三斤飼烏雞一隻三日令盡後取白朶內白苣當歸各一兩煎白芷色黃去滓內鷹粟白半兩攪令調傳之日三

又方 禹餘糧半夏等分為末以雞子黃和先以新布拭瘢處令赤後用藥傳之勿見風日二十日瘥十年者亦滅

又方 以人精和鷹粟白傳之日二 白蜜亦得無問新舊必除

又方 白附子 杜若 細辛各半兩 辛夷一兩 鷹粟白一合

治皶痕凸出方

鷹粟白一兩

右二味為末蜜和以傳日三五度良

衣白魚二七枚

靜嘉堂文庫所藏

又方 鷹屎白二兩 白殭蠶一兩半
右二味為末以白蜜和傳上日三慎五辛生菜

又方 春夏以大麥麨秋冬以小麥麨好細絹下篩以酥和封上

又方 臘月猪脂四斤煎大鼠一枚令消盡以生布揩拭瘢處令赤塗之不過四五上

又方 以熱艾熨之 又方 以凍凌熨之

治身及面上印文疵
針刺字上破以醋調赤土薄之乾又易以黑滅即

又方 以水滿月小兒屎傳上一月即沒

重刊孫真人備急千金要方卷之六下

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏



國家圖書館藏

靜嘉堂文庫所藏

論風毒狀第一

論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師師道人述法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不慤勤徐王撰録未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以関西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物

靜嘉堂文庫所藏

類齊等所致之耳然此病發初得先從脚起因即脛膞時
人號爲脚氣深師云脚弱者即其義也深師述支法存所
用求平山數施連范祖耀黃素等諸脚弱方凡八十餘條
皆是精要然學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急
莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不
復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫人
有五藏心肺二藏經絡所起在手十指肝腎與脾三藏經
絡所起在足十趾夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕
皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中脚久而
不瘥遍及四肢腹背頭項也徵時不覺痼滯乃知經云法

脾傳是也

論得病便令人覺不

凡脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因
他病一度乃始發動或卒然大悶經三兩日不起方乃覺
之諸小庸醫皆不識此疾漫作餘病治之莫不盡斃故此
病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起
脚弱不能動有此爲異耳黃帝云緩風濕痺是也

論風毒相貌

夫有脚未覺異而頭項臂脾已有所苦有諸處皆悉未知
而心腹五內已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎
聞食臭或有腹痛下痢或大小便秘澀不通或胷中衝悶
不欲見光明或精神惛憒或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭

靜嘉堂文庫所藏

痛或身體酸冷疼煩或覺轉筋或腫不腫或脛頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人產後春夏取涼多中此毒深宜慎之其熱悶掣癈驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞幅幅然不快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛爲濕痺

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣靴韈當風取涼皆成脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸入經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若

人坐人立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酸冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸勃鬱動痛漸向頭凡常之日忽欲暴熱人皆不能忍得者當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一心注意於事久坐行立於濕地不時動轉冷風來擊入於經絡不覺成病故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疏通風如急箭或先中足跌或先中膝已下腨脛表裏者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處三二十壯因此即愈不復發也黃帝云當風取涼醉已入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陰

靜嘉堂文庫所藏

所患必冷暑中二陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者治以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒痺

論因脚氣續生諸病

雖患脚氣不妨乳石動發皆須服壓石藥療之夫因患脚氣續生諸病者則以諸藥對之或小便不利則以猪苓茯苓及諸利小便藥治之大便極堅者則以五柔麻人丸等治之遍體腫滿成水病者則取治水方中諸治水之藥治之餘皆倣此更無拘忌五柔麻人見第十五卷

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之傷緩氣上入腹或腫或不腫胸膈逆滿氣上看息急者死不旋踵實者出或不寒不熱其脉促但看心下急氣喘不停或胸汗出

必死不可不急也

論虛實可服藥不可服藥

凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂詮曰實可服藥不可服藥實而數嘔吐不止者皆死

故脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故讀止湯不服也如此者皆死不治也

論看病問疾人

世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人嘗不經一事未讀一方自騁了了詮作明能談說異端或言是虛或道是實或云是風或云是痰紛紜謬說種種不同破壞病人心意不知軌是遷延未定時不待人歟然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識病深淺

靜嘉堂文庫所藏

探賾方書博覽古今是事明解者看病不爾大誤人事竊
悲其如此者衆故一一顯析具述病之由狀令來世病者
讀之以自防備也但有一狀相應則須依方急治勿取外
人言議自貽憂悔但詳方意人死不難莫信他言以自悞
也余嘗爲人撰門冬煎此方治脚氣大有驗病者須用之
方見第十二卷

論脈候法

凡脚氣雖復診候多塗而二部之脉要須不違四時者爲
吉其逆四時者勿治餘如脉經所說此中不復具載其人
本患瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕亦不
耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難愈也

凡人久患脚氣不自知別於後因有他病發動治之腫痛
後直患嘔吐而後脚弱余爲詮之乃告爲脚氣病者曰素
平生不患脚腫何因名爲脚氣不肯服湯餘醫以爲石發
疑之閒不過一旬而死故脚氣不得一向以腫爲候亦
有腫者有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹
頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死
在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

論須慎不慎

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜鼈菜菘菜蕈
蚪子滑麪酥油乳糜豬雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等並切
禁不得犯之并忌大怒惟得食粳粱粟米醬豉葱韭薤薇
薑橘皮又不得食諸生果子酸酢之食犯者皆不可瘥又

靜嘉堂文庫所藏

大宜生牛乳生栗子
論差能治者幾日可瘥
凡脚氣病枉死者幾略而言之有三種一覺之傷晩二驕
很恣傲三狐疑不決此三種正當枉死之邑故世間誠無
良醫雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復尠少故雖
有駿驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其爲枉橫亦
猶此也今有病者有受入性依法使余治之不過十日可
得永瘥矣若無受入性者亦不須爲治縱令治之恐無瘥
日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人
必服法爲信者施不爲疑者說

論灸法

凡脚氣初得脚弱使速灸之并服竹瀝湯灸訖可服八風

散無不瘥者惟急速治之若人但灸而不能服散服散而
不灸如此者半瘥半死雖得瘥者或至一二年復更發動
覺得便依此法速灸之及服散者治十十愈此病輕者登
時雖不即悉治之不當根源不除久久期於殺人不可不
精以爲意

次灸犢鼻　初灸風市　次灸伏兎
次灸上廉　次灸膝兩眼　次灸三里
次灸下廉　次灸絕骨

凡灸八處第一風市穴病人起正身平立垂兩臂直
下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是灸
之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六
百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兎穴令病人累夫端坐
以病人手夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際

靜嘉堂文庫所藏

當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得蹇解是灸之五十壯可至一百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一云在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯第八絶骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯數爲佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸二里及絶骨各一壯

氣毒脚氣

兩脚熱者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可滅百壯不瘥速以灸之多多益佳一說灸絶骨最要人有患此脚弱不即治及入腹腹脹大上氣於是乃須大法灸隨諸輸及諸管關節腹背盡灸之并服八風散往往得甚者諸管輸節解法並在第二十九卷中覺病入腹若病人不甚痛不能盡作大灸但灸臍心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量一夫之法覆手併舒四指對度四指上中節上橫過爲一夫夫有兩種有三指爲一夫者此脚弱灸以四指爲一夫也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絶骨崑侖陰陵泉三陰交足大陰伏溜然谷涌泉承山東骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五藏六腑輸募頃來灸者乘覺引氣向上所以不

靜嘉堂文庫所藏

取其法氣不止者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其足十趾去指奇一分兩足凡八穴曹氏名曰八衝下氣有效其足十趾端名曰氣端日灸三壯氣大神要其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相委悉慎勿爲人灸之慎之慎之凡灸八衝須小作艾炷

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脉有二品內外證候相似但脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應瘥若風盛宜作越婢湯加白朮四兩若脉浮大緊轉駛宜作竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯此人脉多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駛此是二品之中最惡脉

或沈細而駛者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沈細者病在內治亦不異當消息以意耳其形尫可而手脚未容至弱數日之中氣上即便命終如此之脉往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹汁多服之若不極熱輒停在胃心更爲人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝湯病及脉勢未折而若脹滿可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下可以圓藥助湯令下下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理便停服三十二物八風散佳凡初得病便摩野葛膏日再頓痺脚弱都愈乃止若服竹瀝湯脉勢折如未病時氣力轉勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者瘥後半

靜嘉堂文庫所藏

年始能扶人行耳既覺脉及體內瘥但當勤服八風散勿
以脚未能行輕加餘治餘治未必全得益更生諸惡矣此
諸治也猥人邊亦勿行野爲賓有人聞竹瀝湯云恐傷腰
脚者即勿與治宜知此法此皆人無受入性不可與醫教
也不爲疑者說此之謂也竹瀝湯有二首輕者服前方重
者以次第服後方此風毒乃相注易病人宜將空缺服小
金牙散以少許塗鼻孔耳門病困人及新亡人喜易入強
健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亡人及視疾者縫
囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒服宜從少爲始全
牙散方見第十二卷病人惟宜飲赤小豆飲冬服側子金
牙酒續命湯治風毒病初得似時行毒病而脉浮緩終不
缺此不治或數日而死或十日而死或得便不識人或

發熱或發瘡或目赤或下部穿爛者此最急得之即先服
續命湯一劑須服葛根湯麻黃湯下之若故不折更與續
命湯兩三劑必瘥此病大急當令湯勢相接不可使半日

闕湯即便殺人續命湯方見第八卷

湯液第二方二十八首 裴贈方附

第一 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫
按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝伍升 甘草 秦艽 葛根 黃芩
麻黃 防己 細辛 桂心 乾薑兩各壹
防風 升麻兩半 附子貳枚 杏人伍拾枚

右十五味㕮咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取
汗千金翼云無杏人有白朮壹兩

靜嘉堂文庫所藏

第二大竹瀝湯 治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五臟恍惚煩怒無常手足不隨方

竹瀝壹斗 防風 芎藭 甘草 白朮 葛根 細辛 黃芩 芍藥 防己 人參 石膏 麻黃 桂心 各貳兩 生薑 烏頭壹枚 茯苓 各參兩

右十九味㕮咀以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服

第三竹瀝湯 治風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

竹瀝壹斗 秫米 茯苓 秦艽 各參兩 當歸 防己 芎藭 麻黃 桂心 各貳兩 附子 貳枚 蜀椒壹兩 葛根 伍兩 生薑 拇兩

右十八味㕮咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須摩膏日再痺定小

麻黃湯 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此第一服次服第二第三第四方

麻黃壹兩 大棗貳拾枚 茯苓 參兩 杏人 參拾枚 防風 白朮 當歸 升麻 芎藭 麥門冬 甘草 各貳兩 黃芩 桂心

右十四味㕮咀以水九升清酒二升合煮取二升半分

細辛 桂心 麻黃 白朮 各貳兩 甘草 升麻 千金翼作通草 生薑 拇兩

右十八味㕮咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須

靜嘉堂文庫所藏

四服日二夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活 肆兩　乾地黃 參兩　生薑 伍兩　葛根　桂心
麻黃 各貳兩　甘草　芍藥

右八味㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜一脚弱持忌食熟子蕺菜犯之一世治不愈

第三服兼補湯并治諸氣欬嗽逆氣嘔吐方

厚朴　芍藥　當歸　人參 各貳兩　黃耆
甘草 各叁兩　吳茱萸 貳升　半夏 柒兩　生薑 壹斤

右十二味㕮咀以水二斗煮得一斗取汁一斗二升去下脚內清酒二升合煮取三升分四服相去如人行二十里久

第四服獨活湯兼補方

獨活 肆兩　甘草 各叁兩　升麻 壹兩半　人參
桂心　防風　芍藥　當歸　黃耆
乾薑　附子 兩各貳　大豆 貳升

右十三味㕮咀以水九升清酒三升合煮取三升半分四服相去如人行二十里久更進服

防風散治脚痺并治毒氣上衝心胸嘔逆宿癖積氣亦氣病相當即服之方

防風　芍藥　人參　芍藥
麻黃　半夏　甘草　橘皮 各壹兩
當歸　茯苓　桂心 各貳兩　杏人 壹兩半　赤小豆 壹升
生薑
鼈甲

靜嘉堂文庫所藏

貝子　烏梅各伍枚　大棗貳拾枚　吳茱萸伍合　犀角
羚羊角各半兩　雞白拾肆枚

右二十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服一日令盡一方用水一斗二升閒食糜一方半夏三兩隨時用

獨活湯 治脚痺方

獨活肆兩　當歸　防風　茯苓
芍藥　黃耆　葛根　人參
甘草各貳兩　大豆貳升　附子壹枚　乾薑叁兩

右十二味㕮咀以水一斗清酒二升合煮取三升分三服

大脾湯 治風痺脚弱方

麻黃陸兩　石膏半斤　白朮肆兩　大附子壹枚
生薑叁兩　甘草貳兩　大棗拾伍枚

右七味㕮咀以水七升先煮麻黃再沸掠去沫入諸藥煮取三升分三服覆取汗（胡若加八五味若惡風者加附子壹枚多淡水者加朮肆兩）

治脚弱神驗方

防己　蜀椒　細辛　桂心　麻黃
石膏　獨活　防風　黃芩　茵芋
葛根　芎藭　芍藥　甘草兩各壹　生薑
茯苓各叁兩　烏頭貳枚

右十七味㕮咀以竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得力又云脉沈細一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先服常用竹瀝一斗煮取四升分六服令一日

靜嘉堂文庫所藏

駃風在內者作此湯也

風引湯 治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行方

麻黃 石膏 獨活 茯苓各兩 吳茱萸
附子 秦艽 細辛 桂心 人參
防風 苦參 防己 甘草各壹兩 乾薑壹兩半
白朮參兩 杏人陸拾枚

右十七味㕮咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗

大鼈甲湯 治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風溫毒山水瘴氣熱毒四肢痺弱方

鼈甲貳兩 防風 麻黃 白朮 石膏
知母 升麻 茯苓 橘皮 芎藭
杏人 人參 半夏 當歸 芍藥

蒸雞 甘草 麥門冬各壹兩 羚羊角
大黃壹兩半 犀角 青木香 雄黃各半兩 大棗壹拾枚
貝齒 烏頭 紫枝生薑參兩 雞白拾肆枚 鹿射香參銖
赤小豆參合 吳茱萸伍合

右三十一味㕮咀以水二斗煮取四升分六服相去十里久得下止一方用大黃半兩畏下可止用六銖一方用羚羊角半兩毒盛可用十八銖胡洽有此茱萸半升無知母升朔橘皮芍弱人參當歸姜雞引千金翼

小鼈甲湯 治身體虛脹如微腫胸心痞滿有氣壯熱小腹厚重兩脚弱方

鼈甲 黃芩 升麻 麻黃 羚羊角
柱心 杏人陸拾枚 前胡肆兩 烏梅貳拾枚 雞白參拾

右十味㕮咀以水一斗煮取二升七合分三服此常用若體強壯欲須利者加大黃二兩

食即嘔吐方

治脚弱舉體痺不仁熱毒氣入藏胃中滿塞不通

獨活　麻黃　犀角各叁兩　一方　半夏壹升
大棗　烏梅貳拾枝　桂心　鼈甲　升麻
橘皮　枳實　甘草　吳茱萸　大黃各壹兩
生薑　石膏各陸兩　貝齒柒枚

右十七味㕮咀以水一斗四升煮取四升分五服日三夜二不瘥至三劑必瘥

治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼者方

取蜱麻葉切擣絞濃汁塗之日二三易即消蜱麻子似牛蝨故名蜱麻也若冬月無蜱麻取葫蘿根擣汁和酒糟三分根一分合蒸熱又熱封裹腫上如前法日二即消亦治不仁頑痺前後二方俱出蘇長史庫不分出

若腫已入脞至小腹脹小便澀少者方

取烏特牛尿一升二服日二取消乃止千金翼二五貳

壹分牛乳合煮乳淨結乃服之

若腫已消仍有此候者急服此湯方蘇長史方神驗

麻黃　射干　茯苓　防己
前胡　枳實各貳兩半夏　犀角　羚羊角
青木香　橘皮　杏人　升麻各壹兩　生薑伍兩
獨活叁兩　吳茱萸壹升

靜嘉堂文庫所藏

右十七味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服相去二十里久中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣退乃止以意消息之若熟盛喘煩者加石膏六兩

生麥門冬一升去心葉黃若心下堅加鼈甲一兩

夫脚氣之疾先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痹或兩脛腫滿或行起澁弱或上入腹不仁或時冷熱小便澁喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也若覺此證先與

犀角湯旋復花湯方

犀角　旋復花 名貫兩　橘皮　茯苓

生薑 各參兩　大棗 柒枚　香豉壹升　紫蘇葉壹把

右八味㕮咀以水八升煮取二升七合分二服相去十里久服之以氣下小便利為度崔氏名小犀角湯亦下服後以煳角湯

療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶絕欲死方

犀角　旋復花　白朮　防己

黃芩　生薑　桂心　橘皮　茯苓 各貳兩

桑白皮　前胡 各肆兩　紫蘇葉壹把

右十四味㕮咀以水九升煮取二升七合分二服相去十里久取下氣為度若得氣下小便利脚腫即消能食若服湯竟不下氣急不定仍服後犀角麻黃湯崔氏又代白朮無防己黃芩桑白皮名旋復花湯

犀角麻黃湯方

犀角　麻黃　防風　獨活崔氏用茯苓

防己　芎藭　白朮　羚羊角崔氏用附子

靜嘉堂文庫所藏

當歸　黃芩各貳兩　石膏肆兩　生薑　甘草
杏人　崔氏用細辛　桂心各叁兩

右十五味㕮咀以水二斗煮麻黃去沫取汁八升下藥煎取三升分三服相去十里久服訖覆取汗若不瘥五日後更一劑取汗同前

芎藭湯 治脚氣入腹困悶欲死腹脹方藥長史方

芎藭　吳茱萸　防風各叁兩　當歸　人參各貳兩　獨活　茯苓　甘草　乾薑　胡治作桂心　石斛各貳兩　胡治作黃耆　木瓜兩顆切

右二味以水一斗二升煮取三升分二服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即瘥此胡病回作方

小風引湯 治中風腰脚疼痛弱者方　胡治名大風引湯

附子　實按大豆貳升

右十味㕮咀以水九升酒二升煮取二升分四服服別相去如人行十里久行十里久胡治㕮咀此別用升味本只有十味減當歸石斛以療肉極雙肌肉變胡治名小風引湯剛藥方無

四物附子湯 治風濕相薄骨節煩疼四肢拘急不可屈伸近之則痛白汗出而短氣小便不利惡風不欲去衣或頭面手足時時浮腫方

附子　貳枚　桂心肆兩　白朮叁兩　甘草貳兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升分二服微汗愈大汗煩者一服五合體腫者加防己四兩悸氣小便不利加茯苓二兩既有附子今加生薑三兩

治脚弱風毒實及嶺南瘴氣面腫乍寒乍熱似瘧狀脚腫

靜嘉堂文庫所藏

氣上心悶欬嗽癱緩頑痺方

麻人　升麻　麻黄　射干　菖蒲

芒消　甘草　大黄各半兩　豉三合

右九味㕮咀以水六升煮取二升半内芒消又煎三沸分三服微利一二行解毒熱有腫滓薄之凡覺氣滿輒服一劑佳

道人深師增損腎瀝湯治風虚勞損挾毒脚弱疼痺或不隨下焦虚冷胸中微有客熱心虚驚悸不得眠食少失氣味日夜數過心煩迫不得卧小便不利又時復下湘東王至江州王在嶺南病悪如此極困篤余作此湯令服即得力病似此者服無不瘥隨宜增損之方

黄耆　甘草　芍藥　麥門冬　人參

肉蓯蓉　乾地黄　赤石脂　茯神　地骨白皮

當歸　遠志　磁石　枳實　防風

龍骨各壹兩　桂心　芎藭各貳兩　生薑肆兩　五味子參合

半夏壹升　大棗叁拾枚　白羊腎壹具

右二十三味㕮咀以水二斗煮羊腎取汁一斗二升内諸藥煮取四升分為五服不利下者除龍骨赤石脂小便澁以赤茯苓代茯神加白朮三兩多熱加黄芩一兩遺溺加桑螵蛸二十枚胡洽方無黄耆蓯蓉赤石脂地骨皮磁石枳實防風龍骨半夏有黄芩為十五味

石膏湯治脚氣風毒熱氣上衝頭面面赤矜急鼻塞去來來時令人昏憒心胸恍惚或苦驚悸身體戰掉手足緩縦或酸痺頭目眩重眼反鼻辛熱氣出口中或患味甜諸悪

静嘉堂文庫所藏

不可名狀者方

石膏　龍膽　升麻　芍藥
貝齒　甘草　鼈甲　黃芩
羚羊角各壹兩　橘皮　當歸各貳兩

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分爲三服

半夏湯　治脚氣上入腹腹急上衝胸氣急欲絶方

半夏壹升　桂心　捌兩　乾薑伍兩　甘草
人參　細辛　附子各貳兩　蜀椒貳合
右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服初稍稍進恐
氣衝上格塞不得下小小服通人氣耳

烏頭湯　治風冷脚痺疼痛攣弱不可屈伸方

烏頭　細辛　蜀椒各壹兩　甘草
附子　桂心　芍藥各貳兩　乾薑　茯苓
防風　當歸各叁兩　獨活肆兩　大棗貳拾枚
右十四味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服若熱
毒多服益佳

薏苡湯　治脚弱風熱上入心腹煩悶欲絶方

半夏　生薑各肆兩　乾薑　茯苓
人參　厚朴　甘草　當歸
麻黃　乾地黃　獨活　橘皮各壹兩
大棗貳拾枚　芍藥各貳兩　桂心叁兩　貝子柒枚
右十六味㕮咀以水一斗二升煮取三升六合分四服
日三夜一

風緩湯　治脚弱體癉不仁毒氣上入藏胃中滿塞不通食

靜嘉堂文庫所藏

鞕吐失味方

獨活　甘草
麻黃　防風
吳茱萸　桂心
生薑陸兩　大棗貳拾枚

右十九味㕮咀以水一斗四升煮取四升一服一升若有少虛熱者加乾地黃二兩

薯蕷丸　治脚弱上氣苦宋湘東王在南州患脚氣困篤服此湯大得力方

紫蘇子　半夏各壹升　厚朴　甘草
當歸　酸棗壹斛　橘皮　前胡
大棗貳拾枚　生薑壹斤　桂心肆兩

右十味㕮咀以水一斗三升煮取二升半分爲五服日

石膏各叁兩　羚羊角　犀角各半兩
當歸　升麻　橘皮
半夏　鼈甲各貳兩　杜實壹兩

附子湯　治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺刀割方

附子叁枚　芍藥
茯苓　人參各叁兩　桂心
甘草　白朮肆兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服

防風湯　治肢體虛風微痺發無肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟南方支法存所用多得力温和不損人爲勝於續命越婢風引等湯羅落州一門南州士人常用亦治脚弱甚良方

防風　麻黃　秦艽　獨活　生薑
半夏　酪貳合　當歸　遠志　甘草　防己
升麻　芍藥各壹兩　石膏半斤

靜嘉堂文庫所藏

麝香陸銖 一方用白木壹兩

右十六味咬咀以水一斗三升煮取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當兩三行下其間相去如人行十里久更服有熱加大黃二兩先右冷心痛疾者倍用當歸加桂心三兩不用大黃

甘草湯 治脚弱舉身洪腫胃反呑穀吐逆胸中氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此漸即益亦服女麴散散利便腫消服大散摩膏有驗方

甘草 人參 各壹兩半夏壹拾枚 桂心 蜀椒 各參兩 小麥 捌合 大棗貳拾枚 生薑 捌兩 吳茱萸貳升

右九味咬咀以水一斗三升煮小麥取一斗去小麥下諸藥煮取三升分為六服 女麴散見第十五卷第八篇中

恒山 參兩 甘草壹兩半

右二味咬咀以水四升煮取一升服此方

丹參牛膝煮散 治脚痺弱氣滿腫方

丹參 牛膝 桑白皮 各四兩 杏人 升麻 豬苓 茯苓 各四兩 犀角 黃芩 橘皮 防己 白前 澤瀉 桂心 秦艽 各參兩 生薑 李根白皮 各貳兩 大麻人壹升

右十八味擣麤篩以水一升半內散方寸匕煮取七合輕絹濾去滓頓服日再夏月熱不得服圓散此煮散須年常用大驗

治腰胳不隨兩脚攣腫方

蜀椒四升以水四斗煮二斗半攣盛下著火暖之
懸板爲橋去湯二寸許以脚蹋板柱脚坐以綿絮密
塞勿令泄氣若疲即出入被以粉摩之一食久更入
攣常令攣下火不絕勿令皮湯冷如此消息不過七日
得伸展并腫亦消

諸散第三方七首

例曰大法春秋宜服散

八風散 治風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱進飲
面青黑主腎不見日月光主肝宜補腎治肝方

菊花 參兩 石斛 天雄各壹兩半 人參 附子
甘草 各壹兩 陸續 蕙蓉 續斷

黃耆 澤瀉 麥門冬 遠志 細辛
龍膽 秦艽 茵蕳子 牛膝
菖蒲 杜仲 茯苓 乾地黃 柏子人
蛇牀子 防風 白朮 乾薑 車蘚
山茱萸 各壹兩 五味子 烏頭 兩半 蒐蓉 貳兩

右三十三味治下篩酒服方寸匕日三不效加至二匕

大八風散 治諸緩風濕痺脚弱方

巴戟天 黃耆 桂心 細辛 天雄
車蘚 蒐蓉 牡荊子 蕙蓉 菊花
萎蕤 山茱萸 秦艽 黃芩 石斛
白朮 磐石 龍膽 人參
蜀椒 各半 附子 五味子 各十八銖 葛蒲

靜嘉堂文庫所藏

茯苓　牛膝千金薑作乾薑　烏喙　遠志各壹兩
桔梗廿銖　芎藭　白斂　芍藥各陸銖
右三十二味治下篩酒服半寸匕日三未驗稍增令徵覺胡洽無桔梗

肉桂石斛秦艽散　治風虛脚弱手足拘攣疼痺不能行跌腫上膝小腹堅如繩約氣息常如憂恚不能食飲者由五勞七傷腎氣不足受風濕故也此方悉主之

石斛　附子　天雄　桂心　獨活
天門冬各壹兩　秦艽　烏頭　人參
乾薑　當歸　防風　杜仲各三銖　山茱萸
莽草　桔梗　細辛　麻黃　前胡
五味子各十八銖　蜀椒　白朮　白芷　白蘞

右二十三味治下篩酒服方寸匕日再服不知稍增至二匕虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本肉腎虛既得病後重氣外滿則炙洒其氣內滿則藥馳之當其救急理必如此至於風消退凶體虛弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極為良妙此既人情可解無可疑焉

秦艽散　治風無久新卒得不知人四肢不仁一身盡痛偏枯不隨不能屈伸洒洒寒熱頭目眩倒或口面喎僻方

秦艽　乾薑　桔梗　附子兩各壹兩　天雄
當歸　天門冬　人參　白朮　蜀椒各十銖
烏頭　細辛各八銖　甘草　白芷　山茱萸
麻黃　前胡　防風　五味子各半兩

靜嘉堂文庫所藏

右十九味治下篩酒服方寸匕日三若老人少服之胡洽
無天門冬前胡白芥草桂心防己萆薢白斂黃耆爲二十三味
單服松脂治一切風及大風脚弱風痺方薰陸法亦同
松脂三十斤以攣皮袋盛繫頭鐺底布竹木置袋於上以石三五顆壓之下水於鐺中令滿煑之膏浮出得盡以後量更二十沸接置於冷水中易袋洗鍋更煑如此九遍藥成擣篩爲散以麤羅下之用酒服一方寸匕日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥以知爲度如覺熱即減不減令人大小便秘澀若澀宜食蒸羹仍自不通宜服生地黃汁微取泄利除忌大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分蜜和爲圓但食淡麪餺飥日兩度食一食一小捝勿多食也作餺飥法硬和麪熟接煑五十沸漉出冷水淘更置湯中煑十餘沸然後漉出食之服松脂三十日後即覺有驗兩脚似有水流下是效如恐秘澀和一斤松脂茯苓與棗栗許大酥即不澀服經一百日後脚氣當愈仙經曰服松脂一年增壽一年服二年增壽二年及服之十年則增壽十年

淮南八公石斛萬病散治風濕疼腰脚不隨方

防風　茯苓　菊花　細辛　蜀椒
乾薑　雲母　蓯蓉　人參　乾地黃
附子　石斛　杜仲　遠志　菟絲子
天雄　萆薢　桂心　牛膝　蛇牀子
白朮　薯蕷　巴戟　菖蒲　續斷

靜嘉堂文庫所藏

山茱萸 各壹兩　五味子半兩

右二十七味治下篩酒服方寸匕日再

吳茱萸湯 治冷風脚跛偏枯半身不隨晝夜呻吟醫所不治

吳茱萸　乾薑　白斂　牡荊千金翼作牡桂

附子　天雄　狗脊　乾漆

薯蕷　秦艽　防風各半兩

右十一味治下篩先食服方寸匕日三藥入肌膚中淫淫然三日知一月瘥

酒體第四 凡一首方十六首

例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥內酒中密封頭春夏四五日秋冬七八日皆以味足爲度去滓服酒盡後其滓擣酒服方寸匕日三大法冬宜服酒至立春宜停

治風虛氣滿脚弱不能行方

石斛　丹參　五加皮各伍兩　側子

秦艽　杜仲　山茱萸　牛膝各肆兩　桂心

乾薑　菟絲　苁蓉　菥蓂

白前　蜀椒　橘皮　黃耆

防風貳兩　鍾乳捌兩擣碎別絹袋盛繫大藥末袋內　當歸各參兩　薏苡人壹升

右二十一味㕮咀以清酒四斗漬三日初服三合日再稍稍加以知爲度

烏麻酒 方

烏麻五升微熬擣碎以酒一斗漬一宿隨所能飲之盡更作甚良

鍾乳酒 治風虛勞損脚疼冷痺羸瘦攣弱不能行方

鍾乳捌兩　丹參陸兩　石斛
天門冬　酸各伍　牛膝
苓蘢　防風　黃耆
秦艽　乾薑各肆兩　附子　柱心
右十六味㕮咀以清酒三斗漬之三日初服三合日再
後稍加之以知爲度　各參兩　山茱萸　薏苡人各壹升
治緩急風四肢不隨行步不正口急及四體
不得屈伸方
枸杞根　青伯片　葛蒲伍斤
右二味細剉以水四石煮取一石六斗去滓釀二斛米
酒熟稍稍飲之
治骨髓疼痛風經五臟方

虎骨一具炙火炙令黃色　搥碎
酒六升浸五宿隨性多少稍飲之易之
吟雲起此亦有情與無情相感治風之效故亦無疑
治胃管冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬日脇
冷服此酒十日後目既精明體又充壯方
八月三日取蓼曝燥把之如五升大六十把水六石
煮取一石去滓以釀酒如常法隨多少飲之已用訖
效甚速
大治風虛痰癖四肢偏枯兩脚弱手不能上頭
或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜喜夢
悲愁不樂恍惚善忘此由風虛五臟受邪所致或久坐腰
痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體流腫疼痺飲食惡冷漐漐

靜嘉堂文庫所藏

惡寒脊中痰滿心下寒疝藥皆主之及婦人產後餘疾風虛積冷不除者方

黃耆　附子　蜀椒　防風　牛膝
細辛　桂心　獨活　白朮　芎藭
甘草各參兩　烏頭集驗用薯蕷參兩　秦艽　大黃
葛根　乾薑　山茱萸各貳兩　當歸貳兩半

右十八味咬咀少壯人無所褻練虛老人微褻之以綿袋中盛清酒二斗漬之春夏五日秋冬七日可先食服一合不知可至四五合日三服此藥攻痺甚佳亦不令人吐悶小熱宜冷飲食大虛加蒺藜二兩下利加女萎三兩多忘加石斛菖蒲紫石各二兩心下多水者加茯苓人參各二兩薯蕷三兩酒盡可更以酒二斗重漬淳服之不爾可曝滓擣下酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神良

續肘後治風虛腳疼痿弱氣悶不自收攝兼補方

黃耆　烏頭　附子　乾薑　秦艽
蜀椒　芎藭　獨活　白朮　牛膝
細辛　蒺藜　甘草各參兩　葛根　當歸
菖蒲各貳兩半　山茱萸　桂心　鍾乳　柏子人
天雄　石斛　防風各貳兩　大黃　石南兩各壹

右二十五味咬咀無所褻練清酒三斗漬之先食服一合不知可至五合日三以攻痺爲佳大虛加蒺藜下利加女萎多忘加菖蒲各三兩胡治有澤瀉參三兩茯苓貳兩人參茵芋半夏括蔞芎藥各壹兩無秦艽芎藭蒺藜甘草葛根當歸菖蒲鍾乳大黃爲二十二味名大黃耆湯

靜嘉堂文庫所藏

治大風頭眩重目瞀無所見或仆地氣絶半日乃蘇口喝噤不開半身偏死拘急痺痛不能動搖歷節腫痛骨中酸疼手不得上頭足不得屈伸不能躡履行欲傾跌皮中動搖如有蟲啄軫癢搔之生瘡甚者狂走有此諸病藥皆主之方

茵蕳　烏頭　石南　防風　蜀椒
女萎　附子　細辛　獨活　巻柏
桂心　天雄　秦艽　防己各壹兩　躑躅貳兩

右十五味㕮咀少壯人無所麥練虚老人薄麥之清酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五日初服一合不知加至二合寧從少起日再以微痺爲度胡洽無蜀椒獨活巻柏爲十二味

治瘴癘毒氣中人風冷濕痺偏枯半身遂手足拘攣歷節腫痛甚者小腹不仁名曰腸氣無所不治方

金牙壹斤　側子　附子　天雄　人參
茯苓　當歸　防風　黄耆
薯蕷　細辛　桂心　蜀椒　萎蕤
白芷　桔梗　蕤仁　遠志　牡荆子
芎藭　地骨皮　五加皮　杜仲　厚朴
枳實　白木　牛膝　丹參各叁兩　獨活半斤
茵芋　石南　狗脊各貳兩　礜石拾兩　薏苡人
麥門冬各壹升　生石斛拾兩　蒴藋肆兩
生地黄切貳升

右二十九味㕮咀以酒八斗漬七日温服一合日四五

靜嘉堂文庫所藏

夜一石藥細研別絹袋盛共藥同漬藥力和善主治極多凡是風虛四體小覺有風痾者皆須將服之無所不治也服者一依方脩合不得輒信人大言浪有加減

鍾乳酒 治虛損通順血脉極補下氣方

鍾乳　石斛　茯苓各伍兩　附子　甘菊各貳兩

右五味㕮咀以清酒三斗漬服二合日再稍增至一升

秦艽酒 治四肢風手臂不收髀脚疼弱或有拘急攣縮筋指偏枯萎躄瘨痺小不仁頑癡者悉主之方

秦艽　天門冬　五加皮　牛膝　附子　桂心各參兩　巴戟天　獨活各伍兩　薏苡人壹兩　杜仲　石南　細辛各貳兩

右十一味㕮咀以酒二斗漬之得氣味可服二合漸加至五六合日三夜一

大豨酒 治脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方

生白朮淨洗一石五斗　擣取汁參斗煎取半　濕荊二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑一寸燒取瀝參斗煎取半

青竹三十束束別三尺圍各長二尺五寸徑一寸燒取瀝參斗煎取半

生地黃根五大斗麤擣取汁參斗煎取半

生五加根參拾陸斤洗剉以大盆內以水肆石煎之去滓澄清取汁參斗以銅器中盛次釜內水十斗煎之取汁參斗伍升其煎藥法準五加例

右件白朮等五種藥總計得汁九斗五升好糯米一石五斗上小麥麴八斤曝乾爲末以藥汁六斗浸麴五日

靜嘉堂文庫所藏

待麴起第一投淨淘米七斗令得三十遍下米置淨席
上以生布拭之勿令不淨然後炊之下饋以餘藥汁澆
饋調強弱更蒸之待饋上痂生然後下於席上調強弱
冷熱如常釀酒法醞之甕中密蓋頭三日後第二投更
淘米四斗一如前法投之三日後即加藥如左

桂心　甘草　白芷　細辛　防風

當歸　麻黃　芎藭各陸兩　附子伍兩　牛膝玖兩

乾薑　五加皮各壹斤

右十二味㕮咀訖第三投以米四斗淨淘如前法還以
餘汁澆饋重蒸待上痂生下置席上調冷熱如常釀法
和上件藥投之三日外然後嘗甘苦得中訖密封頭二
七日乃壓取清酒一服四合日再服細細加以知為度

斷風

渴酒不得過熱慎生冷酢滑豬雞魚蒜牛肉等

松葉酒主脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及衆治
不得力服此一劑便能遠行不過兩劑方

松葉六十斤㕮咀以水四石煑取四斗九升以釀五
斗米如常法別煑松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭
七日發澄飲之取醉得此力者甚衆神妙

治脚氣方

好豉三斗蒸一石米下曝乾如是三上以酒五斗漬
七日去滓飲惟醉為佳酒盡更以二斗半漬之飲之
如初

側子酒治風濕痺不仁脚弱不能行方

側子　牛膝　丹參　山茱萸　蒴藋根

靜嘉堂文庫所藏

杜仲　石斛各肆兩　防風　乾薑　蜀椒
細辛　獨活　秦艽　桂心　苦參
當歸　白朮　茵芋各參兩　五加皮伍兩　薏苡仁貳升

右二十味㕮咀絹袋盛清酒四斗漬六宿初服三合加以知爲度患目昏頭眩者彌精

膏第五　劾一首　方八首

劾曰凡作膏常以破除日無令喪孝汚穢產婦下賤人雞犬禽獸見之病在外火炙摩之在內溫酒服如棗核許

神明白膏　治百病中風惡氣及頭面諸病青盲風目爛臂管腎耳聾鼻塞齲齒齦根挺痛及癰疽瘡癬疥等方

吳茱萸　蜀椒　苦參　白朮
白芷　前胡各壹升　崔氏作白前　附子參拾枝
桂心　當歸　細辛各貳兩
味無桂心

徹骨膏　治百病久風頭眩鼻塞清涕出霍亂吐逆傷寒咽痛脊背頭項強偏枯拘攣或緩或急或心腹久寒積聚疲痛欬逆上氣往來寒熱鼠瘺瘰癧腫節疼腫關節盡痛男子七傷臚脹腹滿癰瘻不能飲食婦人生產餘疾諸病癉疥惡瘡癰腫陰蝕黃瘕發背馬鞍牛領瘡腫方

靜嘉堂文庫所藏

當歸　枯蔓根　乾地黃　甘草各一　蜀椒各兩陸
半夏茶合　桂心　芎藭　細辛　附子各肆兩
黃芩　菊花　烏頭　天雄　藜蘆　皂莢各兩半
厚朴　莽草　乾薑　人參
黃連　寄生　續斷　戎鹽各參兩　黃野葛貳分
生竹茹升　巴豆攪拾　石南　杏人各壹合　豬脂參斗
苦酒壹斗陸升

右三十一味咬咀諸藥以苦酒漬一宿以豬脂微火上煎之三下三上膏成病在內以酒服如半棗在外摩之日三

神明膏　治鼻中干瀉之并摩服方

蜀椒　石南　黃芩　黃連

雄黃　桂心　藜蘆各參兩　白朮　芎藭
大黃　澤瀉各肆兩　烏頭　莽草　續斷
人參各伍兩　半夏　當歸各拾兩　附子各肆兩
秦艽　細辛各肆兩　戎鹽拾兩　乾地黃拾壹兩
戎鹽杏子大壹枚　桔梗各貳兩　乾薑陸兩

右二十五味咬咀以苦酒一斗漬之羊髓一斤為東南三隅竈內諸藥炊以葦新作三聚新好土藥沸即下置土聚上三沸三下訖藥成以新布絞去滓病在外火炙摩之在內溫酒服如棗核日三後稍益以知為度

大膏白膏　治百病傷寒咽喉不利頭項強痛腰脊兩脚疼有風痺濕腫難屈伸不能行步若風頭眩鼻塞有附息肉生瘡身體隱軫風搔鼠漏瘭瘡諸疽惡瘡馬鞍牛領腫癰

及久寒結堅在心腹痛胷痺煩滿不得眠飲食欵逆上氣往來寒熱婦人産後餘疾耳目鼻口諸疾悉主之亦曰大神膏方

蜀椒壹升　升麻切壹升　附子叁兩　巴豆　芎藭各叁兩拾銖

杏人伍合　狸骨　細辛各壹兩半　白芷半兩　甘草貳兩

白木陸兩　一方用當歸二兩

右十二味㕮咀苦酒淹漬一宿以猪脂四斤微火煎之先煎附子一枚以繩繫著膏中候色黃膏成去滓傷寒心腹積聚諸風腫疾頸項腰脊強偏枯不仁皆摩之日一癰腫惡瘡鼠瘻瘰癧疥癬手摩之耳聾取如大豆灌之目痛淚出縹白翳如珠當瞳子視無所見取如粉米傳白上令其人自以手捻之須臾即愈便以水洗視如平

徹旦勿當風三十日後乃可行鼻中痛取如大豆內鼻中并以摩之齲齒痛以綿裹如大豆著痛齒上咋之中風面目鼻口喎僻以摩之若晨夜行辟霜露冒臁落數數以鐵漿洗用膏摩之

曲直膏　治風濕疫癘四肢攣弱偏跛不仁并癰腫惡瘡方

大黃　黃芩　莽草　巴豆　野葛

牡丹　蠷蠷　芫花　蜀椒　皂莢

附子各壹兩

右十二味㕮咀以苦酒漬藥一宿以成前猪膏二斤微火煎三沸一下別內白芷一斤三上三下白芷色黃藥成去滓微火炙手摩病上日三

治惡風毒腫疫癘不仁癘瘧惡瘡癰疽腫脛腳弱

靜嘉堂文庫所藏

偏枯百病方

野葛　犀角　蛇銜　莽草（外臺作茵芋）

烏頭　桔梗　升麻　防風

蜀椒　乾薑　鼈甲　雄黃

巴豆（各壹兩）　丹參（叁兩）　躑躅花（壹升）

右十五味㕮咀以苦酒四升漬之一宿以成煎猪膏五斤微火煎三上三下藥色小黃去滓以摩病上此方不可施之猥人慎之（胡洽無丹參躑躅有細辛又蘇恭以白芷防已吳茱萸附子當歸代巴豆雄黃蛇銜防風鼈甲）

蒼梧道士陳元膏治一切風濕骨肉疼痺方

當歸　細辛　芎藭（各壹兩）　桂心（伍寸）　天雄（叁拾枚）

生地黃（叁斤）　白芷（壹兩半）　丹砂（貳兩）　乾薑（拾累）　烏頭（叁兩）

松脂（捌兩）　猪肪（拾斤）

右十二味㕮咀以地黃汁漬藥一宿煎猪肪去滓內藥煎十五沸去滓內丹砂末熟攪用火炙手摩病上日千徧瘥（胡洽有人參防風各叁兩附子叁拾枚雄黃貳兩爲十五味用後千金翼有附子貳拾貳銖雄黃貳兩半大酢叁升爲十五味崔氏與千金翼同）

裴公八毒膏治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入藏及魘寐不寤尸厥奄忽不知人宿食不消溫酒服如棗核大得下止若毒氣甚咽喉閉塞不能嚥者折齒內葱葉口中以膏灌葱葉中令下病腫者向火摩腫上若歲中多溫欲省病及行霧露中酒服之內鼻中亦得方

蜀椒　當歸　雄黃　丹砂（各貳兩）

烏頭　巴豆（各壹升）　薤白（壹斤）　莽草（肆兩）

靜嘉堂文庫所藏

右八味咬咀苦酒二升漬一宿用豬脂五斤東向竈竇
薪火煎之五上五下候雞白黃色絞去滓研雄黃丹砂
如粉內之攪至凝乃止膏成盛不津器中諸蜈蚣蛇蠍
等毒者以膏置蕕上病在外悉傳之摩之以破除日合
一方用礬石一兩蜈蚣二枚是名八毒膏肘後不用巴
豆莽草名五毒膏

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏

國立故宮博物院藏



靜嘉堂文庫所藏

論雜風狀第一

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風癱夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依輸穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也

偏枯者半身不隨肌肉偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫卧取汗溫卧取汗則已取之

風痱者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然漐漐隱隱然有聲舌強不能

言病在藏腑先入陰後入陽治之先補於陰後寫於陽發
其汗身轉輾者生汗不出身直者七日死（一本作眼下及鼻人中左右白者可治一黑一赤吐沫者不可治）
風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候
形如風狀得脉別也脉微澁其證身體不仁
凡風多從背五藏輸入諸藏受病肺病最急肺主氣息又
冒諸藏故也肺中風者其人偃卧而胷滿短氣冒悶汗出
者肺風之證也視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可
治急灸肺輸百壯服續命湯小兒減之若色黃者此為肺
已傷化為血矣不可復治其人當妄言撥空指地或自拈
衣尋縫如此數日死若為急風邪所中便迷漠恍惚狂言
妄語或少氣憒憒不能復言若不求師即治宿昔而死即

腎病灸肺輸及膈輸肝輸數十壯急服續命湯可救中蓄
涎唾出不收者既灸當竝與湯也諸陽受風亦恍惚妄語
與肺病相似然著緩可經久而死
肝中風者其人但踞坐不得低頭統兩目連額上色微有
青者肝風之證也若唇色青面黃尚可治急灸肝輸百壯
服續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復
治數日而死
心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂冒絶汗出者心
風之證也若唇正赤尚可治急灸心輸百壯服續命湯若
唇或青或白或黃或黑者此為心已壞為水面目亭亭時
悚動者不可復治五六日死一云旬日死
脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐穢汁出者尚可

靜嘉堂文庫所藏

治急灸脾輸百壯服續命湯若目下青手足青者不可
腎中風者其人踞坐而腰痛視瞻左右未有黃色如餅
大者尚可治急灸腎輸百壯服續命湯若齒黃赤鬢鬆
面土色者不可復治
大腸中風者臥而腸鳴不止灸大腸輸百壯可服續命湯
賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客於皮膚傳入於
孫脉係脉脉滿則入傳於絡絡脉絡脉滿則輸於大經中成病
歸於六腑則為熱不時臥止為啼哭其脉堅大為實鼽者
外堅充滿不可按之按之則痛也經絡諸脉傍支去者皆
為孫脉也
凡風之傷人或為寒中或為熱中或為厲風或為偏枯或
為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁傷於風
諸風

者為心風以四季戊己傷於風者為脾風以秋庚辛傷於
風者為肺風以冬壬癸傷於風者為腎風風中五臟六腑
之輸亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風風氣循
風府而上則為腦風風入頭則為目風眼寒飲酒中風則
為酒風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風久
風入房中風則為腸風外在腠理則為泄風故曰風者百
病之長也至其變化乃為他病無常方焉是知風者善行
而數變在人肌膚中內不得泄外不得散因人動靜乃變
其性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇
陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出肥人有風肌肉厚則難
泄喜為熱中目黃瘦人有風肌肉薄則常外汗身中寒目
淚出有風遇於虛腠理開則外出凄凄然如寒狀覺身中

靜嘉堂文庫所藏

有水淋狀時如竹管吹處此是其證也有風遇於實腠理閉則內伏令人熱悶是其證也

新食竟取風為胃風其狀惡風頸多汗腸下塞不通食飲不下脹滿形瘦腹大失衣則憒滿食寒即洞泄新熱食竟入水自漬及浴者令人大腹為水病

因醉取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜渴近衣則身如火燒臨食則汗流如雨胃節懈惰不欲自勞

新沐浴竟取風為首風其狀惡風而汗多頭痛

新房室竟取風為內風其狀惡風汗流沾衣

勞風之為病法在肺下使人彊上而目脫唾出如淨惡寒而振寒洒洒之三日及五日中不精明者是也七八日微有青黃膿淨如彈丸大從口鼻出為善若不出則傷肺

風邪客於肌膚虛蹇成風胗蹇風邪入深寒熱相搏則肉枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪客關機中即縱緩不中亦然邪淫於藏蒙藏大邪小淫於腑蒙藏小邪大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入藏寒氣客於中不能發則瘖痱喉痺舌緩不時服藥針灸風逐脈流入藏使人卒瘖縱緩縱噤痙致死風入陽經則狂入陰經則癲陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒

若因執食汗浴通腠理得開其風自出則覺肉中如針刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出也

夫目瞤動口脣動偏喎皆風入脈故須急服小續命湯將

宜解肌湯則善

靜嘉堂文庫所藏

八風散擊神明白膏肓參膏依經針灸之
諸痺中風寒濕二氣併客於分肉之間迫切而為沫得寒
則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱
則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在藏而
外未發於皮膚若分肉之間真氣不能周故為痺也其風
最多者不仁則腫為行痺走無常處其寒多者則為痛痺
其濕多者則為著痺冷汗濕但隨血脉上下不能左右去
者則為周痺也痺在肌中更發更止左以應左右以應右
者為偏痺也
夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多
而陰氣少者則痺且熱也
諸痺風勝者則易愈在筋骨則難除也又

痺入深令榮衛澁經絡時疎則不知痛
風痺病不可已者足如履冰時如入湯腹中股脛淫濕煩
心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷肝悲恐短
氣不樂傷肺不出三年死 一云三日
太陽中風重感於寒濕則變痙也痙者口噤不開背彊而
直如發癎之狀搖頭馬鳴腰反折須臾發氣息如絶汗
出如雨時有脫易得之者新產婦人及金瘡血脉虛竭小
兒臍風大人涼濕得痙風者皆死溫病熱盛入腎小兒癎
熱盛皆痙痙瘖敬顫皆相似故久厥成癲宜審察之其重
者患耳中築築痛皆風入腎經中也不治流入腎則喜卒
然體痙直如死皆宜服小續命湯兩三劑也若耳痛腫生
汁作膿瘡者乃無害也惟風宜防耳針耳前動脉及風府

靜嘉堂文庫所藏

神良

諸風第二方二十九首　炙法四十首

續命湯 治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗不令人虛方

麻黃　防己　桂心　甘草　杏人各壹兩　防風壹兩半　附子壹枚　生薑伍兩　芍藥　芎藭

右十二味㕮咀以水一斗二升先煮麻黃二沸去沫內諸藥煮取三升分三服甚良不瘥更合旦三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚弱服此方至六七劑得瘥有風疹家天陰節變輒合服之可以防瘡一本云恍惚者加茯神遠志如骨節煩疼本有熱者去附子倍芍藥小口吻干金翼同際節白今錄驗有白朮不用杏人救急無芎藭藭杏人止一味延年無防風

續命湯 治中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜產後失血并老小人

麻黃　桂心　人參　芎藭　甘草　各弍兩　生薑伍兩　白朮前方有　附子各壹兩　防風壹兩半　黃芩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服古今錄驗無桂心名續命湯胡治千金翼同

又方 治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所不及方

麻黃叁兩　人參　甘草　芍藥　芎藭　桂心　白朮各弍兩　防己　黃芩

靜嘉堂文庫所藏

右十味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服日三
取汗

大青龍湯 治肝厲風卒然瘖啞依古法用大小續命二
通治五藏偏枯賊風方
麻黃捌兩 石膏四兩 桂心 乾薑各壹兩 杏人叁拾枚 并瀝壹升
當歸 黃芩各壹兩 杏人叁拾枚 并瀝壹升
右九味咬咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥
煮取四升去滓又下荊瀝煮數沸分四服能言未癒後
服小續命湯舊無荊瀝今增之效如神千金翼有甘草
又方 治大風經藏在忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不能
獨活 麻黃各叁兩 防風
當歸 葛根
生薑 桂心

附子 細辛 甘草各壹兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升分乃服老小
半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方上氣
者加吳茱萸二兩若胷中吸吸少氣者加大棗十二枚心
下驚悸者加茯苓一兩若熟者可除生薑加葛根初得
風未須加減便且作三劑停四五日已後更候視病虛
實平論之行湯行針依次灸之

又方 治與前大續命湯同宜產婦及老小等方
麻黃 芎藭各叁兩 乾薑 石膏 人參
當歸 桂心 甘草各貳兩 杏人 烏拾枚
右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服外臺名續命湯范注同云

靜嘉堂文庫所藏

是張仲景方
本欠附味

西州續命湯 治中風癖入藏身體不知自收口不能言冒昧不識人拘急背痛不得轉側方

麻黃陸兩　石膏庫兩　桂心貳兩　甘草　芎藭
乾薑　黃芩　當歸各壹兩　杏人叁拾枚

右九味㕮咀以水一斗二升煮麻黃再沸掠去上沫後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿孰眠卧可厚覆小小汗出已漸減衣勿復大覆可孰眠矣前服不汗者後復一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常無禁忌勿見風并治上氣效逆若面目大腫但得卧服之大善凡服此湯不下者人口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服

此湯若虛羸人但當稍與五合為佳間有轍行此湯服產婦及羸人喜有死者皆為頻服三升傷多且湯濁不清故也但得清澄而稍稍服微取汗者皆無害也（胡洽方記）

今錄名大續命湯

大續命湯 治八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不得仲舀頭眩不能自舉起止顛倒或卧若驚如墮地狀盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五臟甚者恐怖見鬼來收攝或與鬼神交通悲愁哭泣忽忽欲走方

麻黃　防風　桂心　甘草
蜀椒　杏人　石膏　人參　芎藭
當歸　蘭茵（一作翼）　乾薑各壹兩

右十五味治下篩以酒服方寸匕日再後加以知（一作如）愈（一作瘥）

靜嘉堂文庫所藏

續命煑散治風無輕重皆主之方

麻黃　芎藭　獨活　防己　甘草

杏人各叁兩　桂心　附子　茯苓　升麻

細辛　人參　防風各弍兩　石膏伍兩　白朮肆兩

右十五味粗篩下以五方寸匕內小絹袋子中以水四升和生薑三兩煑取二升半分三服日日勿絶慎風冷大良吾嘗中風言語蹇澀四肢痑曳處此方日服四服十日十夜服之不絶得愈

排風湯治男子婦人風虛濕冷邪氣入藏狂言妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫脅滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧其心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒張目呼喚其脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨其肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極其腎風發則面黑手足不遂腰痛難以俛仰痺冷骨疼諸有此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目通藏府諸風悉主之

白鮮皮　白朮　芍藥　桂心　芎藭

當歸　杏人　防風　甘草各壹兩　獨活

麻黃　茯苓各叁兩　生薑肆兩

右十三味㕮咀以水一斗煑取三升每服一升覆取微汗可服三劑

大八風湯治毒風頑痺嚲曳手脚不遂身體偏枯或毒弱不任或風入五藏恍恍惚惚多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊彊直不得俛仰腹滿不食欬嗽或

靜嘉堂文庫所藏

始遇病時卒倒悶絕即不能語便失瘖半身不隨不仁沉
重皆由體虛恃少不避風冷所致治之之方

當歸貳兩半　五味子　升麻各壹兩半　烏頭　黃芩
芍藥　遠志　獨活　防風　芎藭
麻黃　秦艽　石斛　人參　茯苓
石膏　黃芪　紫菀各壹兩　杏人四拾枚　甘草
桂心　乾薑各貳兩　大豆壹升千金翼云貳合

右二十三味㕮咀以水一斗二升酒二升合煮取四升
強人分四服羸人分六服

[illegible]治八風十二痺[illegible]身不遂歷節疼痛肌肉枯
[illegible]風或形緩急痛不仁[illegible]一劇卒起目眩失心恍惚
[illegible]身上[illegible]出更相[illegible]

或濕顏色乍赤乍白或青或黑角弓反張乍寒乍熱方

麻黃　白朮各壹斤　羌活貳斤　黃芩壹斤伍兩　大黃半斤
栝蔞根　甘草　欒荊　天雄　白芷
防風　芍藥　天門冬　石膏各拾兩　山茱萸
食茱萸　躑躅各伍升　茵芋拾肆兩　附子參拾枚　細辛
乾薑　桂心各伍兩　雄黃　朱砂　丹參各六兩

右二十五味治下篩酒服方寸匕初每日一服三十日
後日再五十日知百日瘥一年平復長服不已佳先食服

小八風散治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼喜
怒悲憂煩滿顛倒邑邑短氣不得語語則失忘或心痛徹
背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復疼熱惡聞人聲不知
痛癢身悉振搖汗出猥退頭重浮腫爪不知痛頸項強直

靜嘉堂文庫所藏

口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣掣不得屈伸悉主之方

天雄　當歸　人參各伍分　附子　天門冬
防風　蜀椒　獨活各四分　烏頭　秦艽
細辛　白朮　乾薑各叁分　麻黃　山茱萸
五味子　桔梗　白芷　柴胡　莽草各貳分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸匕漸至一匕日三服以身中覺如針刺狀則藥行也

烏頭湯　治八風五尸惡氣遊走胷心流出四肢來往不住短氣欲死方

烏頭　芍藥　乾薑　桂心　細辛
乾地黃　當歸　吳茱萸　甘草各貳兩

右九味咬咀以水七升煮取二升半分二服

治諸風方

當以五月五日午時乾地刈取菓耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿服一方寸匕數巾風輕易治者日再九服十九準前計一方寸匕七日三作散若吐逆可蜜和為服若身體有風者皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也可以鈹針刺潰去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾之善大羹中稍取用之此草辟惡若欲看病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九皆可採用治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁攣急方

荊瀝　竹瀝各伍合　枸杞根白皮　生麥門冬各壹升

靜嘉堂文庫所藏

香豉叁合　人參　茯苓　梔子人　黄芩
芎藭　桂心　細辛　杏人　防風
白鮮皮各貳兩　生薑　石膏　甘草各叁兩
右十八味㕮咀以水二斗和竹瀝荆瀝煮取三升分四
服相去如人行六七里凡五劑間三日服一劑一用防已叁兩
治虛熱恍惚驚邪恐懼方
荆瀝叁升　竹瀝貳升　香豉叁合　牛黄拾捌銖
生麥門冬　人參各叁兩　升麻　鐵精
天門冬　龍齒　茯苓　梔子各貳兩
右十二味㕮咀以水二斗煮取三升去滓下牛黄[illegible]
更煎五六沸取二升七合分五服[illegible]
又方治熱風心煩悶及脾[illegible]

生地黄汁　枸杞根汁　生薑汁　酥各叁升
荆瀝　竹瀝各伍升　天門冬　人參各捌兩
茯苓陸兩　大黄　梔子人各肆兩
右十一味擣篩五物為散先煎地黄等汁成煎次內散
藥攪調每服一匕日再漸加至三匕覺利減之
又方　黄芩　乾藍　芍藥　鼠尾草各三兩
梔子人　生葛各六兩　羚羊角伍兩　豉壹升綿裹
右八味㕮咀以水七升煮取二升五合分三服
治積熱風方
地骨皮　萎蕤　丹參　黄芪　麥門冬
澤瀉各叁兩　清蜜　薑汁各壹合　生地黄汁壹升
右九味以水六升煮取二升去滓內地黄汁更緩火煮

靜嘉堂文庫所藏

減一升内蜜及薑汁又煑一沸藥成温服三合日再

大防風湯 治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利

防風　當歸　麻黄　白朮　甘草各拾捌銖

黄芩叁兩拾銖　乾地黄　山茱萸　茯苓　附子各壹兩

右十味㕮咀以水九升煑取二升半一服七合大小便不利内大黄人參各十八銖大棗三十枚生薑三兩煑取三升分三服深師加天門冬壹兩

大戟湯 治中風發熱方

大戟　苦參各等分

右二味爲末以藥半升白酢漿一斗煑三沸適寒温洗從上下寒乃止立瘥小兒三指撮許漿水四升煑洗之

金牙酒 療積年八風五疰舉身嚲曳不得轉側行步跛躄

不能收攝又暴口噤失音言語不正四肢背脊筋急腫痛流走不常勞冷積聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾胃不磨飲澼結實逆害飲食酢咽嘔吐食不生肌醫所不能治者

金牙碎如米粒用小絹袋盛　地膚子無子用莖葉一用蛇床子

乾地黄　蒴藋根　附子　防風

細辛　莽草各肆兩　蜀椒肆合　羌活壹斤胡洽用獨活

右十味㕮咀盛以絹袋用酒四斗於瓷罌中漬密閉頭勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服一合此酒無毒及可小醉常令酒氣相接不盡一劑病無不愈又令人肥健酒盡自可加諸藥各三兩惟蜀椒五兩用酒如前勿加金牙也冷加乾薑四兩服此酒勝灸刺起三十諸風嚲曳神驗肘後備急用升麻乾薑各四兩人參二兩石斛牛膝各五

靜嘉堂文庫所藏

兩不用蒴藋根爲十四味蘇恭不用地黃爲十三味一方用茯苓豫四兩黃芪三兩胡洽用續斷四兩爲十一味千金翼用防芊四兩无蒴藋

常山太守**馬灌酒**除風氣通血脉益精華定六腑聰明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢倍六十日志氣充盈八十日能夜書百日致神明房中強壯如三十時力能引弩年八十人服之亦當有子病在腰膝藥悉主之

天雄貳兩生用　商陸根　躑躅　蜀椒各壹兩　烏頭壹枚大者

附子伍枚　桂心　白斂　防芊　乾薑各參兩

右十味㕮咀以絹袋盛酒三斗漬春夏五日秋冬七日去滓初服半合稍加至兩三合擣滓爲散酒服方寸匕日三以知爲度夏日恐酒酸以油單覆之下井中近水令不酸也千金翼無商陸桂心爲八味

蠻夷酒治久風枯攣三十年著床及諸惡風眉毛墮落方

乾地黃　獨活　川參　礬石各壹兩　麥門冬

附子　甘遂各貳兩　赤石脂貳兩半　乾薑

蕪荑　芫花　柏子人各壹合　蘇子壹升

蓯蓉　茯神翼作茯苓　金牙　薯蕷　白朮

杜仲　石南　牡荊子　山茱萸　款冬各十八銖

白芷　烏喙　烏頭　人參　狼毒

蜀椒　防風　細辛　礬石　寒水石

牛膝　麻黃　芎藭　當歸　柴胡

芍藥　牡蠣　桔梗　狗脊翼作枸杞　天雄各半兩

石斛　桂心各陸銖

靜嘉堂文庫所藏

右四十五味㕮咀以酒二斗漬夏三日春秋六日冬九日一服半合密室中合藥勿令女人六畜見之三日清齋乃合千金翼無芎藭一云加大棗四十枚更佳

又方 治八風十二痺偏枯不隨宿食久寒虛冷五勞七傷及婦人産後餘疾月水不調皆主之方

礜石　桂心　白朮　狼毒　半夏

石南　白石脂　龍膽　續斷　芫花

白石英　代赭　閭茹　石韋　玄參

天雄　防風　山茱萸　桔梗　藜蘆

卷栢　細辛　寒水石　烏頭　躑躅

蜀椒　白芷　秦艽　菖蒲各壹兩　礬石

附子　遠志各貳兩　石膏貳兩半　蜈蚣壹枚

右三十四味㕮咀以酒二斗漬四日每服一合日再十日後去滓曝乾擣篩爲散酒服方寸匕日再以知爲度胡洽四十一味無桂心細辛烏頭躑躅蜀椒而有芎藭桁山黃芩黃連人參麻黃地黃前胡川芎蒴藋紫菀各一兩杏人一枚同擣篩絹袋盛用水一斗三斤黍米二斗作飯依釀酒法以藥袋置甕中春秋七日冬十日夏三日酒成服半雞子殻日三服以身體暖爲度

魯王酒 治風眩心亂耳聾目暗淚出鼻不聞香臭口爛生瘡風齒瘰癧喉下生瘡煩熱厥逆上氣胸脅肩胛痛手不能上頭不能帶衣腰脊不能俛仰脚酸不仁難以久立八風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽喉閉塞哽噎不利或如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久久不治入人五臟或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百

靜嘉堂文庫所藏

痲悉主之方

茵芋　烏頭　躑躅各叁拾銖　天雄　防己

石斛貳拾肆銖　細辛　牛膝　甘草　栢子人

通草　桂心　秦艽　茵蔯　山茱萸

黃芩胡洽作黃耆　附子　瞿麥　乾地黃

王不留行胡洽作天門冬千金翼作王孫　杜仲　澤瀉

石南　防風　遠志各拾捌銖

右二十五味㕮咀以酒四斗漬十日每服一合加至四五合以知為度千金翼云名曰烏頭六酒有乾薑胡洽無防己以絹囊盛藥用水二斗法麴一斤同漬三四宿出藥囊炊二斗黍米內汁釀之酒熟飲如雞子大日二服稍稍飲之以知為度

又方治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢不遂不能行步不自帶衣攣躄五緩六急婦人帶下產乳中風五勞

七傷

乾薑　躑躅　桂心　甘草　芎藭

續斷　細辛　附子　秦艽　天雄

石膏　紫菀各伍兩　葛根　通草　防風

栢子人　巴戟天　石斛　石南　山茱萸

石龍芮肆兩　天門冬　牛膝各捌兩　烏頭貳拾枚　蜀椒半升

右二十五味㕮咀以水五升漬三宿法麴一斤合漬秫米二斗合釀三宿去滓炊糯米一斗醞三宿藥成先食服半合日再待米極消盡乃去滓曝乾末服

獨活酒治八風十二痺方

獨活　石南各肆兩　防風叁兩　附子

烏頭　天雄　茵芋各貳兩

靜嘉堂文庫所藏

右七味咬咀以酒二斗漬七日每服半合日二以知愈
灸法
痛鼽二云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大趾下橫文
隨年壯立愈
若筋急不能行者內踝筋急灸內踝上四十壯外踝筋急
灸外踝上三十壯立愈
若眼戴精上挿灸目兩眥後二十壯
若不能語灸掌三椎上各百壯
若不識人灸季肋頭七壯
若眼反口噤腰中切痛灸陰囊下筭一橫理十四壯灸卒
死亦良
治久風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或

半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉動冷痛
或煩悶悚惕悲怒無常或昏冒目戴眼角弓反張欲發動即灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是○次灸
曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是○次灸上
關二處各七壯一名客主人穴在耳前起骨上廉陷者中
是○次灸下關二處各七壯穴在耳前下廉動脉陷者中
是○次灸頰車二穴各七壯穴在曲頰陷者中是○次灸
廉泉一處七壯穴在當頤直下骨後陷者中是○次灸凹
會一處七壯穴在神庭上二寸是○次灸百會一處七壯
穴在當頂上正中央是○次灸本神二處各七壯穴在耳
正直上入髮際二分是又俠○次灸天柱二處各七壯穴在
在項後兩大筋外入髮際陷者中是○次灸陶道一處七

靜嘉堂文庫所藏

壯穴在大椎節下間是○次灸風門二處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸半是○次灸心輸二處各七壯穴在第五椎下兩傍各一寸半是○次灸肝輸二處各七壯穴在第九椎下兩傍各一寸半是○次灸腎輸二處各七壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半是○次灸膀胱輸二處各七壯穴在第十九椎下兩傍各一寸半是○次灸曲池二處各七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之是○次灸肩髃二處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是○次灸支溝二處各七壯穴在手腕後臂外三寸兩骨間是○次灸合谷二處各七壯穴在手大指虎口兩骨間陷者中是○次灸間使二處各七壯穴在掌後三寸兩筋間是○次灸陽陵泉二處各七壯穴在膝下外尖骨前陷者中是○次灸陽輔二處各七壯穴在外踝上絕骨端陷者中是○次灸崑崙二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者中是

治風灸上星及百會各二百壯前頂二百四十壯腦戶及風府各二百壯 一云治大風灸百會七百壯

治百種風灸腦後項大椎平處兩相量一寸二分須取病人指寸量兩眼各灸百壯得瘥

治風耳鳴從耳後量入分半裏許有孔灸一切風得瘥狂者亦瘥兩耳門前後各灸一百壯

治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五椎名曰臟輸百五十壯多至二百壯便愈

心輸穴在第五節一云第七節對心橫二間寸半心風腹

靜嘉堂文庫所藏

脹滿食不消化吐血酸削四肢羸露不欲飲食鼻衄目䀮
䀮䀮不明肩頭脇下痛小腹急灸二三百壯
大腸輸在十六椎兩邊相去一寸半主風腹中雷鳴腸澼
泄利食不消化小腹絞痛腰脊疼強或大小便難不能飲
食灸百壯三日一報
掖門在掖下攢毛中一寸名太陽陰一名掖間灸五十壯
主風
絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩足脛疼

賊風第二 論一首 灸法六首 方二十一首

桂枝酒 治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所損方

桂枝 芎藭 獨活 牛膝 薯蕷
甘草炙叁兩 附子貳兩 防風 茯苓 天雄
茵芋 杜仲 蒴藋根 白朮各肆兩 乾薑伍兩
大棗肆拾枚 躑躅 豬椒葉根皮各壹升

右十八味㕮咀以酒四斗漬七日每服四合日二加至五六合

肝風占候其口不能言
當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝輸第九椎下是五十壯餘處隨年壯眼暗灸之得明二三百壯良

大定心湯 治心氣虛悸恍惚方 見第十四卷中

乾薑附子湯 治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪方

乾薑 附子各捌兩 桂心 麻黃各肆兩 芎藭叁兩

靜嘉堂文庫所藏

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服三日後服一
治心寒或笑或呻口歌方見第十七卷中
治卒中風四肢不仁善笑不息方
芎藭 石膏一朋 當歸 秦艽
麻黃 桂心 乾薑 甘草炙各壹兩 杏人壹拾枚
右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服
治心虛寒陰氣傷寒損心驚掣悸語聲覺急混濁
口喝冒昧好自笑厲風傷心方
荊瀝參升 母薑取汁壹升 麻黃 白朮 芎藭各壹兩
防風 桂心 升麻 茯苓 遠志
人參 芜活 當歸各參兩 防己 甘草各貳
右十五味㕮咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下

諸藥煮取二升去滓下荊瀝薑汁煎取四升分四服日
二夜一
補心志定氣治心虛寒氣性及常心手不隨語聲
冒昧其疾源傷風損心具如前方所說無窮
白朮切 地骨皮 荊實各伍斤 菊花參斤
右四味以水二斗煮取一斗五升去滓澄清取汁釀米
二石用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令至吐
治心風寒方
炙心輸各五十壯第五節兩邊各一寸半是
治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦語音沈澀如
破鼓聲舌強不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉身重如
山便利無度方 在第十卷中方本闕

靜嘉堂文庫所藏

溫中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮嗢噁無度
惛悶恍惚脹滿方

半夏　大麻人熬研爲脂生薑各喜升　芍藥
茯苓　五味子　桂心　橘皮各叁兩
白朮肆兩　附子伍兩　甘草貳兩　大棗叁拾枚

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓下大麻
人脂更上火一沸分三服

當歸湯　補脾安胃調氣止痛治脾虛寒身重不舉語音沈
鼓厲風傷痛便利煩燮方

當歸　酸棗人　乾薑陸兩　芎藭　乾地黃
天雄陸兩　地膚皮　黃耆陸兩　大棗貳拾枚　吳茱萸伍合
甘草　泰椒葉　停料　秦艽陸兩　桂心

防風　附子

右十八味爲末蜜丸如梧子酒服三十丸加至四十丸
日再服

白朮各伍兩

脾風之候聲不出或上下手

當灸手十指頭次灸人中次灸大椎次灸兩耳門前
脉去耳門上下行一寸是次灸兩大指節上下各七壯
治脾風方　脾風者惣呼爲八風

灸脾輸俠脊兩邊各五十壯凡人脾輸無定所隨四
季月應病即灸臟輸是脾穴此法甚妙

瀉脾湯　治肺虛冀風所中噓吸戰掉聲嘶塞
而散下氣息短備四肢痺弱面色青皃遺失便利冷汗出

麻黃陸兩　大棗伍拾枚去人

白朮

靜嘉堂文庫所藏

石膏 各肆兩 桂心 人參
於令 各叁兩 當歸
芎藭 各貳兩
右十一味㕮咀以水一斗二升煮麻黃去沫次下諸藥
煎取三升去滓分三服舊方無木於令今方無黃芩轉
以依經逐病增損

治肺寒虛傷語音嘶下拖氣用力戰掉緩弱
羸瘠厲風入肺方

防風 獨活
芎藭 秦椒 乾薑
黃耆 附子 肆枚炮去皮臍 天雄 麻黃 石膏
五味子 山茱萸 各叁兩 桂心
薯蕷 細辛 當歸 防己 人參
杜仲 各叁兩炙 甘草 各貳兩炙 貫衆 貳物 甘菊
紫菀 各壹兩

右二十四味治下篩每服方寸匕酒調進至兩匕門冊

治肺寒虛羸瘦緩弱戰掉噓吸胃滿肺痿方

生薑壹斤 桂心
橘皮 肆兩 甘草 府黃參 兩

右五味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服先煎麻黃
兩沸去沫然後入諸藥合煮

治肺寒方

炙肺蜘百枚

治腎寒虛為厲風所傷語音謇吃不轉偏枯腑脇
偏跛攣緩弱不能動口噤言音混濁便利仰人耳偏聾攣
腰背相引隨病用藥依源增損方

羊腎壹具 黃耆
人參 防風
芎藭 桂心 當歸
甘草 五味子 各叁兩 玄參

靜嘉堂文庫所藏

茯苓　芍藥各肆兩　磁石伍兩　地骨皮貳升　生薑捌兩

右十五味㕮咀以水一斗五升煮羊腎取七升下諸藥取三升去滓分三服可服三劑

肉[illegible]酒治耳聾口歙等病方見第七卷中

乾地黃圓治腎虛呻吟喜恚怒反常心性陽氣弱腰背彊急髓冷方

乾地黃　山茱萸　天門冬　桂心　續斷各壹兩半

柏子人　杜仲　牛膝　蓯蓉肆拾貳銖　茯苓

天雄　鍾乳各貳兩　松脂　遠志　乾薑各三十銖

菖蒲　薯蕷　甘草各壹兩

右十八味末蜜丸梧子大酒服二十九日二加至四十丸

治腎寒方

灸腎輸百壯

大巖蜜湯治賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作無時發即搶心脹滿脅下如錐刀刺并主少陰傷寒方

梔子拾伍枚　甘草　乾地黃　細辛

羊脂青羊角亦得　茯苓　吳茱萸　芍藥小品用芎藭

乾薑　當歸　桂心各壹兩

右十一味㕮咀以水八升煮取二升去滓內脂令烊分三服溫服相去如人行十里頃若痛甚者加羊脂三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黃三兩

胡洽不用梔子羊脂茯苓桂心名巖蜜湯

小巖蜜湯治惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絕往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方

靜嘉堂文庫所藏

大黃貳兩　雄黃　青羊脂酪各壹兩　當歸
乾薑　桂心
甘草　細辛各壹兩　吳茱萸參兩　乾地黃　芍藥

右十一味咬咀以水二斗煮取六升分六服重者加藥
用水二斗煮取九升分十服

洗風湯 治諸毒風邪氣所中口噤悶絶不識人及身體疼煩面目手足暴腫者方

皁角　貝子　升麻　羚羊角酪各壹

右四味治下篩爲粗散以水二升半內四方寸匕煮取一升去滓服五合殺藥者以意增之若腫和雞子傳上

烏頭湯 治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥逆方

烏頭炮伍枚要用伍枚大棗拾枚　甘草貳兩
芍藥肆兩　桂心陸兩　老薑壹斤

右六味咬咀以水七升煮五味取二升去滓別擣烏頭去皮四枚為一升微火煎令減五六合內湯中煮兩小沸去滓服一合日二間食彊者二合以如醉狀為知不知增之

治賊風所中腹內攣急方

麻黃肆兩　甘草壹尺　石膏　鬼箭羽各雞子大

右四味咬咀以東流水二升煮取一升頓服之

論曰夫歷節風者人久不治者令人骨節蹉跌變成癩病不可不知古今已來無問貴賤往往苦之此是風之毒害

靜嘉堂文庫所藏

者也治之雖有湯藥而竝不及松膏松節酒若羇旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不治但於痛處灸二七壯佳

防風湯治身體四肢節解如墮脫腫按之皮陷頭眩短氣溫溫悶亂欲吐者方

防風　白朮　知母　桂心各肆兩　芎藭

芍藥　杏人　甘草各叁兩　半夏　生薑各五兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一令占

録驗方無半夏杏人芎藭用附子貳枚爲八味

羌活湯治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產後中風方

羌活　桂心　芍藥　葛根

麻黃　乾地黃各叁兩　甘草貳兩　生薑伍兩

右八味㕮咀以清酒三升水五升煮取三升溫服五合

賊風

日三服

防己湯治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者方

防己　茯苓　白朮　桂心

生薑各肆兩　甘草叁兩　人參貳兩　烏頭柒枚

右八味㕮咀以苦酒一升水一斗煮取三升半一服八合日三夜一當覺焦熱痺忽忽然慎勿怪也若不覺復合服以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人宜慎之千金翼不用苦酒

治濕風體痛欲折肉如錐刀所刺方

附子　乾薑　芍藥　茯苓

人參　甘草　桂心各叁兩　白朮肆兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升日三服一方去桂用乾地黃貳兩

靜嘉堂文庫所藏

大棗湯治歷節疼痛方

大棗(十五枚) 附子(壹枚) 甘草(壹尺)

黄耆(肆兩) 生薑(貳兩) 麻黄(伍兩)

右六味㕮咀以水七升煑取三升每服一升日三服

犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角(貳兩) 羚羊角(壹兩) 前胡 黄芩 梔子人

射干(各參兩) 大黄 升麻(各肆兩) 豉(壹升)

右九味㕮咀以水九升煑取三升去滓分三服

治歷節諸風百節酸痛不可忍方

松脂三十斤鍊五十遍酒煑十遍不能五十遍二十遍亦可鍊酥三升温和松脂三升熟攪令極調勻旦空腹酒服方寸匕日三數數食麫粥為佳慎血腥生冷物酢果子百日已後瘥

松節酒治歷節風四肢疼痛猶如解落方

松節 猪椒葉(各參拾斤細剉各用水肆石煑取壹石)

右二味澄清合漬乾麴伍斤候發以糯米四石伍斗釀之依家醞法四酘勿令傷冷熱第一酘時下後諸藥

柏子人 天雄 萆薢 芎藭(各伍兩) 秦艽(陸兩)

人參 茵芋(各肆兩) 防風(拾兩) 磁石(拾貳兩末) 獨活(拾伍兩)

右十味㕮咀內飯中炊如常酘法酘足訖封頭四七日壓取清酒性服之勿至醉吐

石膏湯治風毒方

石膏(雞子大參枚) 杏人(肆拾枚) 雞子(貳枚) 甘草(壹尺) 麻黄(參兩)

右五味㕮咀以水三升破雞子內水中烊令相得內藥

靜嘉堂文庫所藏

煮取一升服之覆取汗汗不出燒石熨取汗出為佳

治歷節風方

松膏一升酒二升浸七日每服一合日再數劑愈

又方 松葉二十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五數

偏風第四 方十二首 針灸法五首

防風湯 治偏風甦權處療安平公方

防風 芎藭 白芷 牛膝

狗脊 蔓根 附子 人參 白朮 各壹兩 杏人 各貳兩 薏苡人

石膏 桂心 各叁兩 麻黃 肆兩 生薑 伍兩

右十六味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服服一劑覺好更進一劑即一度針九劑九針即瘥灸亦得

針風池一穴 肩髃一穴 曲池一穴

支溝一穴 五樞一穴

巨虛下廉一穴

凡針七穴即瘥

仁壽宮備身患脚奉物

針鍼銳銚一穴 陽陵泉一穴

陽輔一穴

大理通卿患風腰脚不隨不能跪起

針上窮一穴 鍼銳銚一穴

巨虛下廉一穴 陽陵泉一穴

凡針四穴即能跪起

車狄甄患偏風不得挽弓

針肩髃一穴即得挽弓甦權所行

治猥退風半身不遂失音不語者方

杏人去雙人及皮尖二斗洗入臼擣一斗令碎研如
寒食粥法取汁八升煎取四升口嘗看酒滑即熟未
及此則爲不熟惟熟爲妙停極冷然後內好麴一斗
六升煎取八升第一遍酸饋也次一炊復取杏人三
升研取一斗二升汁煎取六升第二酸也次一炊準
第二酸取杏人汁多少爲第三酸也若疑米不足別
更取二升杏人研取八升汁煎取四升更與酌炊米
酸之若猶不足更研杏人二升取八升汁煎取四升
更酸之以熟爲限一不米杏人三斗所以節次研杏
人者恐併煎汁酢故也若冬日任意併煎準計三斗
杏人取汁一石六斗煎取八斗四升漬麴以分之酸
饋酒熟封四七日開瀉取清然後壓糟糟可乾末和

酒服之大驗秘方

菓林子腦一升酒一斗銅鉢盛著酒中一日蒸之令
熟服之

灸百會次灸本神次灸承漿次灸風府次灸肩髃次
灸心輸次灸手五里次灸手髓孔次灸手少陽次灸
足五里次灸足髓孔次灸足陽明各五百壯

治大風半身不遂方

蠶沙兩石熟蒸分作布袋二枚各受七斗熟盛一袋
著患處如冷即取餘袋一依前法數數易換百不禁
瘥止須羊肚釀粳米葱白薑椒豉等爛煮熟哺日食
一具十日止此方千金不傳

蒸黑壤土袋盛熨之瘥即止

靜嘉堂文庫所藏

治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人産後中柔風及氣滿方

葛根　芍藥　桂心　乾地黃
羌活各叁兩　麻黃　甘草各貳兩　生薑肆兩

右八味以清酒二升水五升煮取三升温服五合日三

續命湯 治大風周身四肢攣急風行在皮膚勞疆服之不虛人又治精神蒙昧者方

秋麻子叁升淨擇　防風　桂心
生薑　石膏碎綿裹　橘皮各貳兩　麻黃叁兩
竹葉　葱白各壹把　香豉壹合

右十味以水二斗半煮麻子令極熟漉去滓取汁内諸藥汁中煮取二升去滓分三服須臾小汗出以粉塗身極重者不過三兩劑輕者一兩劑瘥有人患大風賊風刺風加獨活

仲景續命湯 治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂悶

淳分三服空腹服當微汗汗出以粉塗身極重者不過三兩劑輕者一兩劑瘥有人患大風賊風刺風加獨活三兩比之小續命湯準當六七劑

經日不欲飲食方

麻黃叁拾銖　黃芩拾銖　細辛貳拾銖　黃耆　桂心　甘草各貳兩　生薑壹兩

右五味以水五升煮取二升分二服一服小汗兩服大汗心中熱加大黃半兩脹滿加枳實六銖氣逆加人參十八銖心悸加牡蠣十八銖渴加栝蔞十八銖先有寒加八角附子一枚此方秘不傳

白散 治風拘攣不可屈伸方

白散　薏苡人　芍藥　桂心　皮蕉人

靜嘉堂文庫所藏

牛膝　乾薑　甘草炙各壹兩　附子叁枚

右九味㕮咀以淳酒一斗漬一宿微火煎三沸每服一升日三扶杖起行不耐酒服五合千金翼有車前子

獨活寄生湯 夫腰背痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風得之不時速治喜流入脚膝爲偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛攣脚重痺宜急服此方

獨活叁兩　寄生古今錄驗用續斷　杜仲

牛膝　細辛　秦艽　茯苓

桂心　防風　芎藭　乾地黄

人參　甘草　當歸　芍藥各貳兩

右十五味㕮咀以水一斗煑取三升分三服温身勿冷喜虛下利者除乾地黄服湯取蒴藋葉火燎厚安席上

及熱眠上冷復燎之冬月取根舂取莖熬卧之佳其餘薄熨不及蒴藋蒸爲愈也諸處風濕亦用此法新産竟或患腰痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯除風消血肘後有附子壹枚無寄生人參甘草當歸

菊花酒 治男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無顏色噓吸少氣去風冷補不足方

菊花　杜仲各壹斤　防風　附子　黄耆

乾薑　桂心　當歸　石斛各肆兩　紫石英

蓯蓉各伍兩　萆薢　獨活　鍾乳各捌兩　茯苓叁兩

右十五味㕮咀以酒七斗漬五日一服二合稍稍加至五合日三千金翼不用乾薑

杜仲酒 治腰脚疼痛不遂風虛方

靜嘉堂文庫所藏

杜仲捌兩　石南貳兩　羌活肆兩　大附子伍枚

右四味㕮咀以酒一斗漬二宿每服二合日再偏宜冷

病婦人服之

風痱第五論三首　方八首　灸法一首

論曰夫風痱者卒不能語口噤手足不遂而彊直者是也治之以伏龍肝五升為末冷水八升和攪取汁飲之能盡為善肘後此方治心煩悶極腹中痛滿絕而復蘇自此已下九方皆主此病用之次第宜細尋之

論曰凡欲醫此病當知先後次第不得漫投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂為痼疾已既得之當進三味竹瀝飲少似有勝於常更進湯也竹瀝飲子患熱風者必先用於此制其熱毒

竹瀝貳升　生薑汁壹升　生蘆汁叁合

右三味相和溫暖分三服平旦日晡夜合一服服訖覺四體有異似好次進後湯方

竹瀝壹升　生薑汁伍合　芎藭　防己

人參　芍藥　黃芩

附子　甘草　桂心各壹兩　生薑肆兩　羚羊角叁兩

石膏陸兩　杏人肆拾枚　麻黃　防風各壹兩半

右十六味㕮咀以水七升煮取二升五合分三服取汗間五日更服一劑頻與三劑漸覺少損仍進後方

竹瀝叁升　防風　升麻　羚羊角

防己　桂心　芎藭各貳兩　麻黃叁兩
右八味㕮咀以水四升合㕮漉煮取二升半分二服兩
日服一劑常用加獨活三兩最佳此方神良頻進三劑
若手足冷者加生薑五兩白朮二兩若未除更進後方
竹瀝壹升甘草一本作根貳兩　人參　芎藭
獨活　升麻各壹兩　防風　麻黃　芍藥各壹兩半
生薑　石膏　附子一本作杏仁肆枚　羚羊角
防己　桂心　黃芩　白朮各貳兩
右十七味㕮咀以水八升煮減半內瀝煮取二升半分
三服相去如人行十里又更服若有氣者加橘皮牛膝
五加皮各一兩
凡風藥服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

防風　防己　獨活　秦艽　薑蠶
芍藥　人參　茯神　芎藭
遠志　升麻　白朮
丹參　甘草　石斛　羚羊角
地骨皮　黃芩　厚朴　天門冬　五加皮
橘皮　生薑　桂心各壹兩一云各肆兩　乾地黃
杜仲　薑作麥門冬　檳榔壹作甘草　藁本　薑作附子
石膏　墮兩一云叁兩　烏犀角各貳兩千金壹作山朱黃　薏苡人壹升
右二十三味擣篩為粗散和攪令勻每服以水三升藥
三兩煮取一升綿濾去滓頓服之取汗日一服若覺心
中熱煩以竹瀝代水煮之
凡患風人多熱常宜服此方

靜嘉堂文庫所藏

荊瀝　竹瀝
右二味相和温暖爲一服每日日服煮散午後進此平復好瘥乃止

獨活寄生湯　治諸風痺方
獨活捌兩　芎藭　防風　防己　當歸　人參　石膏各肆兩　磁石拾兩　甘草參兩　芍藥　茯苓　葛根各陸兩　羚羊角　桂心　麥門冬　白朮各捌兩
右十六味各切剉分爲二十四分每分入生薑生地黃切一升杏人二七枚以水二升煮取七合或日晚或夜中或日一服或間日服無所忌

凡風服湯藥多患虛熱必須斟酌然後除熱方

防風　人參　茯苓　乾地黃　羚羊角
麥門冬　天門冬各壹兩半　芍藥　獨活
乾薑　白朮　食茱萸二云山茱萸
甘草　茯神　升麻　黃耆　甘菊花
地骨皮　石斛　牛膝　五加皮　薯蕷拾兩
秦艽　芎藭　桂心　防己　生薑耆
黃芩各壹兩　附子拾捌枚　石膏參兩　寒水石貳兩
右三十二味爲末白蜜和丸如梧子大生薑蜜湯服二十九丸忌油腻蒜生冷酢滑及猪羊雞魚等肉

論曰古人立方皆準病根冷熱制之今人臨急造次搜尋即用故多不驗所以欲用方者先定其冷熱乃可檢方用

靜嘉堂文庫所藏

無不效湯藥既爾丸散亦然凡此風之發也必由熱盛故
有竹瀝葛汁等諸冷藥焉後之學者不能仔細識其方意
故有茲論具而述之其人無密室者不可與療以彊人居
室不密尚中風邪況服藥之人乎

治風痱不能語手足不遂方

㝅病者手小指內岐間至指端爲㝅以置臍上直望
心下以丹注㝅上端畢又作兩㝅續所注上合其下
開其上取其本㝅橫置其開上令三合其狀如到作
厶字形男㝅左手女㝅右手嫌不分了故上丹注三
處同時起火灸之各一百壯愈

風懿第六 論二首 針灸法六首　方二十三首

續古今湯 治風懿不能言四肢不收手足嚲曳方

獨活肆兩　桂心　芍藥　栝蔞根
生葛各貳兩　生薑陸兩　甘草叁兩
右七味㕮咀以水五升煑取三升分三服日三

論曰脾脉絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今
心脾二臟受風邪故舌彊不得語也

治中風口噤不能言方

防己　桂心　麻黃各貳兩　葛根叁兩
甘草　防風　芍藥各壹兩　生薑肆兩
右八味㕮咀以水六升煑取二升半分三服瘖瘂不語
皆治之

石南湯 治六十四種風注走入皮膚中如蟲行腰脊彊直
五緩六急手足拘攣隱胗搔之則作瘡風尸身癢卒風面

靜嘉堂文庫所藏

目瞳起手不出頭口噤不能言方

一石南　乾薑　黄芩　細辛
人參各壹兩　桂心　麻黄　當歸
芎藭各壹兩半　甘草貳兩　乾地黄拾銖　食茱萸參拾銖

右十二味㕮咀以水六升酒三升煮取三升分三服大汗勿怪

治中風口噤不知人者方

芥子壹升　酢參升

右二味煮取一升薄頭以布裹之日一度（肘後以治卒不得語）

又方　豉伍升　吴茱萸壹升

右二味以水七升煮取三升漸飲之（肘後以治卒不能語）

又方　白朮四兩以酒三升煮取一升頓服

又方　服荊瀝一升

又方　服淡竹瀝一升

針灸法

卒中風口噤不得開灸機關（千金翼名頰車）二穴穴在耳下八分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右灸之

中風失瘖不能言語緩縱不隨先灸天窗五十壯息火仍移灸百會五十壯畢還灸天窗五十壯者始發先灸百會則風氣不得洩內攻五臟喜閉伏仍失音也所以先灸天窗次百會佳一灸五十壯悉洩火勢復灸之視病輕重重者一處三百壯大效凡中風服藥益劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神良決定勿疑惑也不至心者勿浪與灸

論曰風寒之氣客於中滯而不能發故瘖不能言及喉痺

靜嘉堂文庫所藏

失聲者風邪所爲也入臟皆能殺人故附之於治風方之末凡尸厥而死脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也針百會入三分補之灸熨斗熨兩臂下又灸突墨彈九大壯水和服之又針足中趾頭去甲如韭葉又刺足大趾甲下內側去甲三分

桂湯 治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗亦可末桂著舌下漸漸消

又方 濃煮大豆汁令亦佳無豆用豉

治卒不得語方

酒五合和人乳汁中半分爲二服

論曰夫眼瞤動口脣偏喎皆風入脉急與小續命湯附子散摩神明膏併參膏依究炙之喉痺舌緩亦然風入臟使人猝然卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者與伏龍肝散和雞冠血及鼈血塗乾復塗之并炙吻邊橫文亦自除逐左右隨年壯報之至三報三月不瘥更報之

附子散 治中風手臂不仁口面喎僻方

附子　桂心各伍兩　細辛

防風　人參　乾薑各貳兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三稍增之

甘草湯 治偏風積年不瘥手脚枯細面口喎僻精神不定言語倒錯方

甘草　桂心　芎藭　麻黃　當歸

芍藥　人參　附子各貳兩　側子枚各貳兩　獨活

防己　酸棗仁各壹兩　茯神　附各肆兩　白朮

石膏

靜嘉堂文庫所藏

黃芩　細辛各貳兩　秦艽　防風各壹兩半
菊花壹升　淡竹瀝肆升

右一十一味㕮咀以水一斗先煮麻黃去沫取七升內竹瀝及藥煮取三升分四服服二服訖開一服粥後更進一服待藥勢自汗愼生冷醋蒜麪乳酪魚等治中風面目相引口偏著耳牙車急舌不得轉方

獨活叁兩　竹瀝　生地黃汁各壹升

右三味合煎取一升頓服之即愈

又方

牡蠣　礬石

右四味各等分爲末取三年雄雞冠血和藥傳其上持鏡候纔欲復故便急洗去之不速去便過不復還也

防風　升麻　防己　升麻

桂心　芎藭各貳兩　麻黃肆兩　杏人參拾枚

右八味㕮咀以水四升合竹瀝煮取一升半分二服日服一劑常用效

又方

青松葉一斤擣令汁出清酒一斗漬一宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

又方

酒煮桂取汁以故布搦病上正則止左喎搦右右喎搦左此秘方不傳余常用大效

治口耳僻方

防風　附子　葛根各貳兩　柏實

麻黃各叁兩獨活　牛薑各肆兩　杏人參拾枚

右八味㕮咀以水一斗酒二升煮取三升分四服

靜嘉堂文庫所藏

治卒中風口喎不正方
取空青末如豆大一枚含之即愈
炒大豆三升令焦以酒二升淋取汁頓服(服後以治口噤不開)
又方 大皂莢一兩去皮子炙篩以三年大酢和左喎塗右
右喎塗左乾更塗之
又方 以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪密塞之
勿令泄氣一頭內大豆一顆并艾燒令然灸七壯即
瘥患右灸左患左灸右千金不傳耳病亦可灸之
又方 灸手交脉三壯左灸右右灸左其灶如鼠粟形橫安
之兩頭下火
救苑酒 主諸藥不能瘥者方
枳實十青刮取末欲至心止得苑九升微火炒令

氣以酒一斗漬微火暖令得藥味隨性飲之主口僻
眼急大驗治緩風急風並佳(服後以治身自不得強
角弓反張第七方六首
治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或
身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或欲得
食或不用食或大小便不利皆療之方(古今錄驗名八風續命湯)
人參 桂心 當歸 獨活 黃芩
乾薑 甘草(炙)各拾 石膏壹兩半 杏人肆拾枚
右九味㕮咀以井華水九升煮取三升分三服日一覆
取汗不汗更合加麻黃五兩合服
續命當歸湯 治賊風口喎角弓反張瘛者方
當歸 防風各拾(捌銖) 獨活壹兩半

靜嘉堂文庫所藏

附子 壹枚 細辛 半兩 麻黃 叁拾銖

右六味㕮咀以酒五升水二升煮取二升服一升日不開者格口內湯一服當蘇一服小汗三服大汗

又方 酒一斗膠二斤煮令烊得六升每服一升稍服得愈

單服荊瀝良

治半身不遂言語錯亂不喜笑悲傷皮膚風癢方

秦艽 獨活 胡治用烏頭 黃耆 人參

甘菊花 各貳兩胡治用蜀椒 茵芋 拾捌銖胡治用鬱草 防風

石斛 胡治用草藨 山茱萸 桂心 各壹兩半 附子

芎藭 胡治用桔梗 細辛 當歸 五味子

甘草 白朮 乾薑 白鮮皮 胡治用白鮮根 各叁拾銖

麻黃 天雄 遠志 各壹兩胡治用防己

右一十二味治下篩酒服方寸匕日再漸漸加至二匕

又云治風無新久并補

治風注入肢體百脉身腫角弓反張手足酸疼皮膚碧碧身體盡痛眉毛墮落耳聾驚悸心滿短氣魂志不定陰下濕癢大便有血小便赤黃五勞七傷萬病皆治

秦艽 蜀椒 人參 茯苓 牡蠣

細辛 括蔞根 麻黃 各拾捌銖 乾薑 附子

白朮 桔梗 桂心 獨活 當歸 各壹兩

黃芩 柴胡 牛膝 天雄 石南

杜仲 莽草 烏頭 兩 各半兩 甘草 芎藭

防風 各壹兩半

靜嘉堂文庫所藏

右二十六味治下篩盛以韋袋食前溫酒一升服方寸匕日三服急行七百步更飲酒一升忌如常法

風痺第八 論一首 方九首

論曰血痺病從何而得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛因疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之形如風狀（巢源云其狀如被微風所吹）但以脉自微濇濇在寸口關上緊宜針引陽氣令脉和緊去則愈

治風濕脉浮身重汗出惡風方

甘草貳兩　黃耆伍兩　漢防己肆兩

生薑　白术各叁兩　大棗拾貳枚

右六味㕮咀以水六升煮取三升分三服服了坐被中欲解如蟲行皮中臥取汗

[illegible]湯 治三陰三陽厥逆寒食胷脅支滿病不能言氣滿胷中急肩息四肢時寒熱不隨喘悸煩亂吸吸少氣言輒飛颺虛損方

黃鐵叁拾斤以流水八斗揚之三千遍　炭伍拾斤燒鐵令赤投冷水復燒七遍如此澄清取汁貳斗煮藥

白薇　黃芩　半夏　麥門冬各壹升

甘草　芍藥各肆兩　人參叁兩

石膏伍兩　生薑貳兩　大棗貳拾枚

右十味㕮咀內前汁中煮取六升服一升日三服（兩日令盡）

黃耆湯 治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀方

蜀黃耆　人參（要略無）　芍藥

桂心各貳兩　生薑陸兩　大棗拾貳枚

靜嘉堂文庫所藏

右六味㕮咀以水六升煮取二升服七合日三服令盡

治遊風行走無定腫或如盤大或如甌或著腹背或著臂或著脚悉主之方

海藻　茯苓　防風　獨活　附子

白朮各三兩　大黃五兩　鬼箭　當歸各二兩本作當陸

右九味㕮咀以酒二斗漬五日初服二合漸加以知為度

白斂散 治風痺腫筋急展轉易常處方

白斂半兩　附子六銖

右二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭身中熱行為候十日便覺

治風痺遊走無定處名曰血痺大易方

萆薢　薯蕷　牛膝　澤瀉各二兩　地膚子

白朮各半兩　乾漆　蠐螬　狗脊　車前子

天雄各拾銖　茵芋陸銖　山茱萸各三拾銖　乾地黃

右十四味為末蜜和丸如梧子酒下十丸日三後稍加

治諸風痺方

防風　甘草　黃芩　桂心

當歸　茯苓各壹兩　秦艽　葛根各貳兩

生薑五兩　大棗三十枚　杏人五十枚

右十一味㕮咀以酒水各四升煮取三升分三服取汗

附子酒 治大風冷痰癖脹滿諸痺方

大附子一枚重二兩者亦云貳枚酒五升漬春五日每服一合日再以瘥為度

麻子酒 治虛勞百病傷寒風濕及婦人帶下月水往來不

靜嘉堂文庫所藏

調手足疼痺著牀服之令人肥健方

麻子壹石　法麴壹斗

右二味先擣麻子成末以水兩石煮金中蒸麻子極熟
炊一石米頃出滓隨汁多少如家醞法候熟取清酒
性飲之

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


134
24
4 9

靜嘉堂文庫所藏

重刊孫真人備急千金要方卷之九 傷寒方上

傷寒例第一

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災出焉惟異四時八節種種施化不同七十二候日月運行各別終其影響度方得成年是謂歲功畢矣天地尚且如然在人安可無事故人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者即天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之而能以道御之其次有賢人善於

靜嘉堂文庫所藏

攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘還以
天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此
病也俗人謂之橫病多不解治皆曰日涌自差以此致枉
者天下太半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈湯食競
進折其毒勢自然而差必不可令病氣自在恣意攻人拱
手待斃斯為誤矣今博採羣經以為上下兩卷廣設備擬
好養者可得詳焉

小品曰古今相傳稱傷寒為難治之疾時行瘟疫是毒病
之氣而論治者不判傷寒與時行瘟疫為異氣耳云傷寒
是雅士之辭天行瘟疫是田舍間號耳不說病之異同也
考之衆經其實殊矣所宜不同方說宜辭是以畧說其要
經言春氣温和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凜冽此四時正
氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒或
觸冒之者乃為傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病而以
傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病名曰傷寒
不即病者其寒毒藏於肌骨中至春變為温病至夏變為
暑病暑病熱極重於温也是以辛苦之人春夏多温病熱
病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行
者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應凉
而反大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以
一歲之中病無長少多相似者此則時行之氣也傷寒之
病逐日深淺以施方治今世人得傷寒或始不早治或治
不去病或日數久淹困乃告師師苟依方次第而療則不
中病皆宜臨時消息制方乃有效耳

靜嘉堂文庫所藏

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸之即愈若不
解者二日在膚可依法針服解肌散發汗汗出即愈即不
解至三日在肌復一發汗即愈若不解者止勿復發汗也
至四日在胷宜服藜蘆圓微吐之則愈若病困藜蘆圓不
能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈也視病尚未醒醒者復
一法針之五日在腹六日入胃入胃乃可下也若熱毒在
外未入於胃而先下之者其熱乘虛入胃即爛胃也然熱
入胃須要下去之不可留於胃中也胃若實熱為病二死
一生皆不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五
死一生劇者黑斑出者此候十死一生但論人有強弱病
有難易得效相倍也得病無熱但狂言煩躁不安精彩言
語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕

服之當漏與新汲水一升若二升強飲之令以指刺喉中
吐之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下也
當更以餘藥吐之皆令相主不爾更致危矣若此病輩不
時以猪苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及
法針之尤佳夫飲膈實者此皆難治此則二死一生也病
者過日不以時下則熱不得泄亦胃爛斑出春夏無大吐
下秋冬無大發汗發汗法冬及始春大寒時宜服神丹圓
亦可摩膏火灸若春未及夏月始秋此熱月不宜火灸及
重覆宜服六物青散若崔文行度瘴散赤散雪煎亦善若
無圓散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服以發
汗至一升二發汗不解當與湯實者轉下之其脉朝夕駃者
為澼實者朝平夕駃者非澼也轉下湯為可早與但當少

靜嘉堂文庫所藏

與勿令大下耳少與當數其間也諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實不可下也如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈為可重與也此法數用甚有效驗傷寒後虛煩亦宜服此湯

王叔和曰夫陽盛陰虛（外臺作表和裏病）汗之則死下之則愈陽虛陰盛（外臺作裏和表病）汗之則愈下之則死汗之則愈夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治（外臺作表裏之病）相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽陽盛則斃（外臺作表病）斃承氣入胃陰盛以亡（外臺作裏病）若此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹不知

不識病者須沒自謂其分至大令免冤橫於曠野仁愛鑒此寧不傷楚夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛不得隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此非氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛胸中滿當吐之則愈五日以上氣沈結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當消息病之狀候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脉微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下也此醫之大禁也脉有沈浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云初覺視病已積日在身其疹瘵結成非復發汗解肌所除當於其脉隨時形勢救解求免也不可苟以次第為固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以

靜嘉堂文庫所藏

內發汗者謂當風解衣夜卧失覆寒温所中并時有疾疫賊風之氣相染易為邪惡所中也至於人自飲食生冷過多腹藏不消轉動稍難頭痛身温其脉實大者便可吐下之不可發汗也

凍凜丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何荅曰醫經云連發汗汗不出者死病也吾思之可蒸之如蒸中風法熱温之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出卧單簟中冷得病但苦寒倦諸醫與圓散湯四日之内凡八過發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅身使極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難汗者非惟病使其然也蒸之則無不汗出也諸病發熱惡寒脉浮洪者便宜發汗温粉粉之勿令遇風當發汗而其人適失血及下大利則不可大汗也數少與桂枝湯使體潤漐漐汗出連日當自解也

論曰凡人有少苦似不如平常即須早治慎忍不治冀望自差須臾之間以成固疾小兒女子益以滋甚若時氣不和當自戒謹若小有不和即須治療尋其邪由及在腠理以時早治鮮不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制止雖和緩亦無能為也醫師不須沿之也凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶若縱意違師不等早晚則易愈矣服藥當如方法覺痛須臾即宜便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法風寒入裏則不消矣未有温覆而當不消也凡得時氣病

靜嘉堂文庫所藏

五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更爲人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也言能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澁若喘若噦不可與之忽然大汗出者欲自愈也人得病能飲水欲愈也

凡温病可針刺五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之爲災

論曰夫尋方學之要以救速爲貴是以養生之家須遇合成熟藥以備倉卒之急今具之于左

辟温第二 方三十六首 温癘病證一條

辟疫氣令人不染温病及傷寒歲旦屠蘇酒方

大黄 拾伍銖 白朮 拾捌銖 桔梗 蜀椒 各拾伍銖 桂心 拾捌銖 烏頭 陸銖 菝葜 拾貳銖

右七味㕮咀絳袋盛以十二月晦日中懸沈井中令至泥正月朔日平曉出藥置酒中煎數沸於東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還滓置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆悉著藥辟温氣也○一方有防風壹兩

太乙流金散 辟温氣方

雄黄 參兩 雌黄 貳兩 礬石 壹兩半 鬼箭羽 壹兩半 羖羊角 燒貳兩

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之温病

人亦燒熏之

雄黃散辟温氣方

雄黃伍兩　朱砂水作赤　菖蒲　鬼臼各貳兩

右四味治下篩以塗五心額上鼻人中及耳門

頭痛一物相思散天氣不和疾病流行方

取南向社中柏東南枝暴令乾擣末酒服方寸匕神良

粉身散辟温病常用方

芎藭　白芷

右二味治下篩內米粉中以粉身

殺鬼燒藥方辟温氣

雄黃　丹砂

角亦得　蕪荑　雌黃各壹斤　羖羊角燒末

藁本各等分　虎骨　鬼臼

鬼箭羽　野丈人　石長生　假猪粟

馬懸蹄各如　青羊脂　菖蒲　白朮各半兩

蜜臘捌斤

右十六味末之以蜜臘和為圓如彈許大朝暮及夜中

戶前微火燒之

虎頭殺鬼圓辟温方

虎頭伍兩　朱砂　雄黃　雌黃半各壹兩

鬼臼　皂莢　蕪荑各壹兩

右七味末之以蜜臘和為圓如彈子大絳袋盛繫臂男

左女右懸屋四角晦望夜半中庭燒一圓

辟温殺鬼圓重首鬼惡氣方

雄黃　雌黃各貳兩　羖羊角　虎骨各兒末兩

靜嘉堂文庫所藏

龍骨　龜甲　鯪鯉甲　蝟皮各叁兩
攜雞拾伍枚空青壹兩　芎藭　真珠各五兩
東門上雞頭壹兩
右十三味末之烊蠟二十兩并手圓如梧子正旦門户
前燒一圓帶一圓男左女右辟百惡獨宿弔喪問病各
吞一圓小豆大天陰大霧日燒一圓於户牖前佳

雞黃圓　漢建炎二年太歲在
書生丁季廻從蜀青城山來東過南陽從西市門入見患
疫癘者頗多遂於囊中出藥人各惠之一圓靈藥露啓疾
無子廛市中疫鬼數百餘見書生施藥悉皆驚怖而走乃
有鬼王見書生謂有道法兼自施藥感衆鬼等奔走若是
遂請書生啟求受其道法書生曰吾無道法乃囊中之藥

旱於鬼王鬼王聽藥驚惶扣頭乞命而走此方藥帶之
山能辟虎狼蛇蟲入水能除水怪蛟蜃

雄黃　雌黃　曾青　鬼臼
真珠　丹砂　虎頭骨　桔梗
白朮　女青　芎藭　白芷
鬼督郵　蕪荑　鬼箭羽　藜蘆
葛蒲　皂莢各壹兩

右十八味末之蜜圓如彈子大絹袋盛男左女右帶之
卒中惡及時疫吞如梧子一圓燒一圓彈子户内

蘆薈　蹢躅花各壹兩　牡丹皮　皂莢各壹兩
附子　桂心　真珠各陸兩　細辛

靜嘉堂文庫所藏

乾薑各拾捌銖

右九味末之內眞珠合治之分一方寸匕置絳囊中帶之男左女右着臂自隨覺有病之時便以粟米大內著鼻中又酒服一錢匕覆取汗日三服當取一過汗耳

又方

正月旦取東行桑根如指長七寸以丹塗之懸門戶上又令人帶之

斷溫病令不相染著病人臥席下良

又方

以繩度所住戶中壁屈繩即斷之

治溫病不相染方

桃椎蠶屎末之水服方寸匕

又方

木豉等分酒漬服之妙

又方

正旦吞麻子赤小豆各二七粒又以二七粒投井中

又方

新布袋盛赤豆一升內井中三日舉家服二七枚

又方

松葉末之酒服方寸匕日三服

又方

常以七月七日合家吞赤小豆尚日吞二七枚

又方

靜嘉堂文庫所藏

常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚
又方
神仙教人立春後有庚子日溫盞雞汁合家大小並
服不限多少
斷溫疫轉相染着乃至滅門延及人無收視者方
赤小豆　鬼箭羽　鬼臼　雄黃各貳兩
右五味末之以蜜和服如小豆一圓可與病人同床傳
衣
治溫令不相染方
新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚
治溫疫方
藥子二枚末水服之

又方
白蜜和上色朱砂粉一兩以太歲日平旦大小勿食向
東方立吞服二七圓如麻子大勿令齒近之并吞赤小
豆七枚投井泉中終身勿忘此法
又方
凡時行疫癘常以月望日細剉雷引桃枝煮湯浴之
治瘴氣方
蒜五子并皮碎之　豉心壹升
右二味以三歲男兒尿二升煮五六沸去滓服之良
又方
青竹茹二升以水四升煮取二升分三服
治患霧氣者心內煩悶少氣頭痛項急起則眼眩欲倒身

靜嘉堂文庫所藏

微熱戰掉不安時復增寒心中欲吐吐時無物方
新猪呆二升半內好酒一升攪令散以生布絞取汁更
以綿濾頓服之取盡即地鋪暖卧覆蓋鋪前著火常汗
出若得汗當細細去上衣勿使心寒寒即不差看汗自
乾乃起愼風冷亦治瘧及風勞蠱毒
治肝府藏温病陰陽毒頸背雙筋牽引寒後熱腰強急縮
目中生花方
桂心壹兩　白朮　芒消　大青
梔子各叁兩柴胡伍兩　石膏　生薑各捌兩
生地黃　香豉各壹升
右十味㕮咀水九升煮取三升分二服
治肝府藏温病陰陽毒先寒後熱頸筋牽目赤黃身

中直强方
玄參壹兩　細辛貳兩　梔子　黃芩
升麻　芒消各叁兩　石膏捌兩　竹葉玖拾片
喜前草　暴勿貳升
右九味㕮咀以水一斗半煮竹葉車前取七升去滓下
諸藥煎至三升下芒消分三服
治心府藏温病陰陽毒戰掉不定驚動方
大青　黃芩　梔子　知母
芒消各叁兩　麻黃肆兩　玄參陸兩　石膏
生葛根洛捌生地黃玖兩
右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒消分二服
治脾府藏温病陰陽毒頭重頸直皮肉禪結核隱起方

靜嘉堂文庫所藏

大青　羚羊角
芒消各參兩　梔子肆兩　寒水石　兩玄參　搗碎
右八味咬咀以水七升煮取三升分三服
治肺府藏温病陰陽毒咳嗽連續聲不絶嘔逆方
麻黄　梔子　紫苑　大青
玄參　葛根各參兩　桂心　甘草各貳兩
杏仁　前胡各肆兩　石膏　搗兩
右十一味咬咀以水九升煮取三升分三服
治腎府藏温病身面如刺腰中欲折熱毒內傷方
茵蔯蒿　梔子　芒消各參兩　苦參
生葛各肆兩　生地黄　石膏各搗兩　葱白
豉各壹升

右九味咬咀以水九升煮取二升半下消分三服
温風之病脉陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形狀不仁
嘿嘿但欲眠下之者則小便難發其汗者必讝語加燒針
者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此疾者宜服
薑湯
姜黄　白薇
杏仁　芎藭
石膏各參兩
右九味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服取汗若
一寒一熱加朴消一分及大黄三兩下之如無木香可
用麝香一分小品方云養難
胃痛腰背
强亦治風温

麻黄　獨活
甘草　青木香各貳

大黽病與百合狐惑濕風溫病鬼魅皆相類宜精察節氣
其新故二氣相搏喜成此疾

傷寒膏第二方二首

治傷寒頭痛項強四肢煩疼 青膏方

當歸 芎藭 附子 烏頭 蜀椒 白芷
吳茱萸 芒草各叁兩

右八味咬咀以醇苦酒漬之再宿以豬脂四斤煎令藥
色黃絞去滓以溫酒服棗核大三枚日三服取汗不知
稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之
佳

治傷寒赤色頭痛項強賊風走風 黃膏方

大黃 附子 細辛 乾薑 桂心各半兩 巴豆伍拾枚

右十味咬咀以醇苦酒漬一宿以臘月豬脂一斤煎
調適其火三上三下藥成傷寒赤色發熱酒服梧子大
一枚又以火摩身數百過兼治賊風絕良風走肌膚遊
風所在摩之神效千金不傳此趙泉方也

白膏 治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚溫覆取
汗摩身當千過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍
皆治之先以鹽湯洗瘡以布拭之傳膏瘡腫火炙摩千過
日再自消者方

天雄 烏頭 莽草 羊躑躅各叁兩

右四味咬咀以苦酒三升漬一夕作東向竈竈又作十
二聚濕土各一升許大取成煎豬脂二斤著銅器中加

靜嘉堂文庫所藏

竈上炊以葦薪令釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡徧藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核一枚日三摩時令勿近目

發汗散第四方十一首

麥瘟發汗青散 治傷寒敷色惡寒發熱頭痛項強體疼方

麻黃參兩半 桔梗 吳茱萸
防風 白朮各壹兩 烏頭
蜀椒 桂心各壹兩陸銖

右十味治下篩溫酒服方寸匕溫覆取汗汗出止若不得汗汗少不解復服如法若得汗足如故頭痛發熱此爲內實當服駛致圓並羣氏圓如得便頭重者可以二大豆許內鼻孔中覺燥涕出一日可三四度必愈兼辟時行病

安荼散 主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言語不與人相主當者方

豬苓 茯苓各拾銖 桂心拾貳銖
澤瀉參兩拾銖 白朮

右五味治下篩水服方寸匕日三多飲水汗出即愈

崔文行解散 治時氣不和傷寒發熱者方

桔梗 細辛各肆兩 白朮捌兩 烏頭壹斤

右四味治下篩若中傷寒服錢五匕覆取汗解若不覺復小增之以知爲度若時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病服一服皆酒服

六物青散 治傷寒敷色惡寒方

靜嘉堂文庫所藏

附子　白朮各壹兩陸銖　防風
桔梗　烏頭各叁兩拾捌銖　細辛各壹兩拾捌銖

右六味治下篩以溫酒服五匕不知稍增之服後食頃不汗出者進溫粥一杯以發之溫覆汗漿漿可也勿令流離勿出手足也汗出止若汗大出不止者溫粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹圓方出下篇發汗圓門

青散　治春傷寒頭痛發熱方

苦參　厚朴
細辛各貳兩　麻黃伍兩　石膏各叁拾銖　大黃
右七味治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫粉粉之良

以一服不除宜重服之或當微下利者有大黃故也

諸青經汗白散　治傷寒三日不解者方

白薇拾貳銖　杏仁　貝母各拾捌銖　麻黃壹兩捌銖

右四味治下篩酒服方寸匕自覆汗出即愈

王侯赤散　治傷寒頭痛身熱腰背強引頸及風口噤瘧不絕婦人產後中風寒經氣腹大

丹砂拾貳銖　蜀椒　乾薑
細辛　黃芩　防己　桂心
茯苓　人參　沙參　桔梗
女萎　烏頭各拾捌銖　雄黃貳拾肆銖　吳茱萸叁拾銖
麻黃　代赭各貳拾肆銖半

右十八味治下篩酒服方寸匕日三尅藥者二匕覆令

靜嘉堂文庫所藏

汗出欲治瘧先發一時所服藥二七半以意消息之細
辛薑桂丹砂雄黃不熬餘皆熬之

疎散 治傷寒頭痛項強身熱腰脊痛往來有時
乾薑　防風　沙參　細辛
白朮　人參　蜀椒　茯苓
麻黃　黃芩　代赭　桔梗
吳茱萸各壹兩　附子貳兩

右十四味治下篩先食酒服一錢匕日三

烏頭赤散 治天行疫氣病方
烏頭壹兩半　雄黃　細辛
桔梗　大黃各壹兩　皂莢半兩

右六味治下篩清酒若井華水服一刀圭日二不知稍
增以知為度除時氣疫病若生馬六畜中水行疫亦可
與方寸匕人始得病一日時服一刀圭取兩大豆許吹
著兩鼻孔中

水解散 治時行頭痛壯熱一二日方
桂心　甘草　大黃各貳　麻黃肆兩

右四味治下篩患者以生熟湯浴訖以暖水服方寸匕
日三覆取汗或利便差丁強人服二方寸匕（延年秘錄有黃芩為藥各二兩古今錄驗無甘草有芍藥治天行熱病生苑陳皮痛解肌出汗）

治時病表裏大熱欲死方
大黃　寒水石　芒消　石膏
升麻　麻黃　葛根　紫菀

右八味等分治下篩水服方寸匕日二

靜嘉堂文庫所藏

發汗湯第五例一首　桂枝證十二首
例曰大法春夏宜發汗凡發汗欲令手足皆周至漐漐然
一時間許益佳但不可令如水流離霑漐漐若病不解當
更重發汗汗出多則亡陽陽虛不可重發汗也凡服湯藥
發汗中病便止不必盡劑也凡云可發汗而無湯者但散
亦可用要以汗出為解然不及湯隨證良驗凡病無故自
汗出復發其汗愈衛復和故也
夫脉浮者病在外可發汗宜桂枝湯
夫陽脉浮大而數者亦可發汗為宜桂枝湯
病常自汗出者此為榮氣和榮氣和而外不解此為衛氣
不和也榮行脉中衛行脉外復發其汗衛和則愈宜桂枝

病人藏無他病時時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和
故也先其時發汗則愈宜桂枝湯
太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故令汗出欲救邪風
宜桂枝湯
太陽病頭痛發熱汗出惡風寒宜桂枝湯
太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚朴杏仁湯
太陽病外證未解者不可下宜桂枝湯
大陽病先發其汗不解而下之其脉浮者不愈浮為在外
而反下之故令不愈今脉浮故在外當須解其表則愈宜
桂枝湯
太陽病下之氣上衝者可與桂枝湯不上衝不可與
凡桂枝本為解肌若脉浮緊發熱無汗者勿與之常知此

靜嘉堂文庫所藏

勿誤也
凡酒客勿與桂枝湯若服必嘔
凡服桂枝湯吐者後必吐膿血也

桂枝湯 治中風其脉陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出濇濇惡風淅淅惡寒嗌嗌欲嘔發熱鼻鳴乾嘔方

桂枝　芍藥　生薑各參兩　甘草貳兩
大棗拾貳枚

右五味咬咀三物切薑擊棗以水七升煮棗令爛去滓乃內諸藥水少者益之煮令微沸得二升去滓服一升日三小兒以意減之初服少多便得汗出者小隔其間不得汗者小促其間令藥勢相及汗出自護如法特須避風病若重宜夜服若服一劑不解病證不變者當復服之至有不肯汗出服兩三劑乃愈服此藥食頃飲粥以助藥力

麻黃湯 治傷寒頭及腰痛身體骨節疼發熱惡寒不汗而喘

麻黃參兩　桂心　甘草各貳兩
杏仁柒拾枚 喘不用伍拾枚

右四味咬咀以水九升煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取二升半紋去滓服八合覆令汗

大青龍湯 治中風傷寒脉浮緊發熱惡寒身體疼痛汗不出煩躁方

麻黃陸兩　桂心　甘草各貳兩　石膏如雞子大柒拾枚
生薑參兩　杏仁肆拾枚

靜嘉堂文庫所藏

右七味㕮咀以水九升煑麻黄去沫乃内諸藥煑取三升分服一升厚覆當大汗出温粉粉之即止不可再服服之則筋惕肉瞤此爲逆也不汗乃再服

陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陰毒或服藥吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下痢其脉浮大數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治至七日不可治宜服

升麻　甘草各半兩　當歸　蜀椒

雄黄　桂心各陸銖

右六味㕮咀以水五升煑取二升半分三服如人行五里進一服温覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服之得吐亦佳仲景無桂心有鱉甲手大一片附後更千金同古今錄驗有梔子陸銖鱉甲如手壹片

陰毒甘草湯治傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黒四肢厥冷其脉沉細緊數仲景云此陰毒之候身如被打五六日可治至七日不可治也

甘草　升麻各半兩　當歸　蜀椒各陸銖

鱉甲壹兩

右五味㕮咀以水五升煑取二升半分三服如人行五里頃更進一服温覆發汗毒當從汗出汗出則愈若不汗則不除重作服仲景方去蜀椒

陰旦湯治傷寒肢節疼痛内寒外熱虚煩方

芍藥　甘草各貳兩　乾薑　黄芩各叁兩

桂心肆兩　大棗拾伍枚

右六味㕮咀以水一斗煮取五升去滓溫服一升日三夜再服令小汗

陽旦湯　治傷寒中風脉浮發熱往來汗出惡風頭項強鼻鳴乾嘔桂枝湯主之隨病加減如左

以泉水一斗煮取四升分服一升日三百汗者去桂枝加附子一枚渴者去桂加栝蔞二兩利者去芍藥桂加乾薑三兩附子壹枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急正陽旦主之前得二升內膠飴半斤為再服若脉浮緊發熱者不可與之

六物解肌湯　治傷寒發熱頭項強痛方

葛根肆兩　茯苓參兩　麻黃　黃芩　芍藥

甘草各貳兩　大棗拾貳枚　生薑各貳兩　甘草壹兩

右六味㕮咀以水八升煮取三升分三服再服後汗通即止古今錄驗無生薑甘草

解肌湯　治傷寒溫病方

葛根肆兩　麻黃參兩　黃芩　芍藥

甘草各貳兩　大棗拾貳枚

右六味㕮咀水一斗煮取三升飲一升日三服三四日不解脉浮者宜重服發汗脉沈實者宜以馱跌圓下之延年秘錄有柱心壹兩

治傷寒時氣溫疫疼痛壯熱脉盛始得一二日者方

丹砂壹兩末之以水一斗煮取一升頓服之覆取汗

治疫氣傷寒三日已前不解者方

靜嘉堂文庫所藏

好豉壹升綿裹　葱白切壹升　小男兒尿叁升

右三味先熬豉葱令相得則投小便煑取二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻　芍藥　石膏　麻黃

甘草各壹兩　杏仁叁拾枚　貝齒叁枚一作貝母拾捌銖

右七味㕮咀以水三升煑取一升盡服溫覆發汗便愈

葛根龍膽湯治傷寒三四日不差身體煩毒而熱方

葛根捌兩　龍膽　大青各半兩　升麻

石膏　萎蕤各壹兩　甘草　桂心

芍藥　黃芩　麻黃各貳兩　生薑叁兩

右十二味㕮咀以水一斗煑葛根取八升內餘藥煑取三升分四服日三夜一

治傷寒四五日頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食方

梔子仁　黃連　黃蘗　大黃各半兩

好豉壹升　葱白七莖

右六味㕮咀以水八升煑上四物六七沸內後葱白豉煑得三升頓服一升日三服湯訖溫覆令汗出粉之得汗便止後服勿復取汗不得汗者復服重發此藥無忌特宜老小神良

七物黃連湯治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩

黃連　茯苓　黃芩各拾捌銖　芍藥

葛根各壹兩　甘草壹兩陸銖　小麥叁合

靜嘉堂文庫所藏

右各㕮咀以水七升煮取三升冷分三服不能一升者可稍稍服之湯勢安乃且藥主毒氣服湯之後胃中熱及咽喉痛皆差其明日復煮一劑如法服之此湯無毒但除熱下氣安病人小兒服者取三分之一以水四升莫得二升稍稍服

治傷寒中風得之三日至七八日不解胃胸痛四肢逆乾嘔水漿不下腹中宿食不消重下血一日數十行方

茯苓如雞子大　人參各叁兩　括蔞根肆兩
芒消　乾地黃各壹升　大黃　麻黃
寒水石各半斤

右九味擣篩令相得以散三方寸匕水一升煮令三沸絞去滓服之日三溫覆汗出即愈病劇與六七匕

治傷寒忽發腫或著四肢或在胷背虛腫浮如吹狀亦著頭面唇口頸項胷者偏著脚脛外如軸大而不痛不赤著四肢者乃欲不遂悉主之

麝香半兩　薰陸香　雞舌香各壹
沈香　青木香　麻黃
防風　獨活　秦艽
羌活　甘草各貳兩　白薇
枳實各貳

右十三味㕮咀以水九升煮取三升分三服覆取汗後外摩防己膏

治傷寒三日外與前藥不差脉勢仍數者陽氣猶在經絡

靜嘉堂文庫所藏

末入藏府方

桂枝　黃芩　甘草略貳　升麻
葛根　生薑略參　芍藥陸兩　石膏碎兩
栀子貳枚

右九味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服相去十里久若前兩服訖即得汗後服即停不得汗更進一服得汗即止不得汗者明日去栀子加麻黃二兩足水二升再依方服

雪煎治傷寒方

麻黃拾片　杏仁參斗
大黃壹斤（一作貳兩）

右三味㕮咀以雪水五斛四斗漬麻黃於東向竈金中

三沸內大黃攪令調炊以桑新煮得二斛汁去滓復內釜中攪杏仁內汁中復炊之可餘六七斗汁絞去滓貯銅器中又以雪水三斗合煎之攪令調得二斗四升藥成可圓冷凝圓如彈圓有病者以三沸白湯五合研一圓入湯中適寒溫之立汗出若不愈者復服一圓密盛藥勿令泄氣

發汗圓第六方二首

發汗圓治傷寒救濕惡寒發熱體疼者方

附子　烏頭各肆兩人參　茯苓
半夏略伍　朱砂壹兩

右六味末之蜜圓以眞丹爲色先食服如大豆二圓生薑湯下日三須臾進熱粥二升許重覆汗出止若不得

靜嘉堂文庫所藏

汗汗少不解復服如前法若得汗足應解而不解者當
服桂枝湯此藥多毒數者令飲水寒者温飲解之治瘧
先發服二圓要畧用細辛不用人參別有射干
桂枝去桂加茯苓白朮湯 治傷寒五六日以上不解熱在胸中口噤不能言
欲飲水為壞傷寒醫所不能治為成死人精竟已竭心
下纔温以杖發其口開灌藥咽中藥得下則愈麥奴圓一
曰黒奴圓二曰水解圓
釜底墨 寵突墨 梁上墨
麥奴 大黄
辛消各壹兩 麻黄 貳兩
右八味末之蜜圓如彈子大以新汲水五合研一圓破
漬置水中當藥消盡服之病者渴欲飲水極意不問并
數欲止復強飲能多飲為善不欲飲水當強飲之服藥
須臾當冀寒竟汗出便解若服藥日移五尺許不汗服
服如前法不過再三服佳麥黒勃名麥奴
宜吐第七例一首 諸五條 方五首
例曰大法春宜吐凡服吐藥中病便止不必盡劑也
病如桂枝證頭不痛項不強而脉寸口浮胷中鞕滿氣上
衝喉咽不得息者此以内有久痰宜吐之
病胷上諸寒胷中癖癖而痛不能食欲得使人按之按之
反有涎出不利日十餘行而其人脉遲寸脉微滑者此宜
吐之吐之利即止
少陰病飲食入口即吐心中愠愠然欲吐復不能吐者宜
吐之宿食在上管宜吐之

靜嘉堂文庫所藏

病手足逆冷脉不結者客氣在胷中心下滿而煩飢不能
食者以病在胷中宜吐之
瓜蒂散 病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胷中痞堅
氣上撞咽喉不得息者此爲胷有寒也宜吐之
瓜蒂 赤小豆各壹兩
右二味治下篩取一錢匕香豉一合熟湯七合煮作稀
粥去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃
止（張文仲以白湯二合和服）
水道散 治時氣病煩熱如火狂言妄語欲走方
甘遂半兩
白芷貳兩
大黃肆兩 厚朴捌兩 枳實伍枚 芒消叁合
右四味咬咀以水一斗先煮厚朴枳實取九升去滓內
大黃煎取二升去滓下芒消更煎一兩沸分再服得快
利止
抵兌圓 下血方
水蛭 蠐螬各貳 桃人貳拾枚 大黃叁兩
右四味爲末蜜和合勻爲四丸以水一升煮一丸取七
合頓服之睟時當下血不下更服
抵兌湯 治同前
水蛭 蠐螬各叁 桃人貳拾枚 大黃叁兩
右四味咬咀以水五升煮取三升去滓服一升不下更
服

靜嘉堂文庫所藏

承氣湯方

枳實伍枚　芒消半升　大黃肆兩

右四味㕮咀以水五升煮取二升去滓適寒溫分二服
如人行五里進一服取下利爲度若不得利盡服之

生地黃湯　治傷寒有熱症厥少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃參斤　大黃肆兩　甘草壹兩　芒消貳合　大棗貳拾枚

右五味合擣令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服

大柴胡湯　治傷寒七八日不解默默心煩腹中有乾粟讝語方

柴胡半斤　萎蕤　知母　大黃　甘草各貳兩
芍藥各參兩　生薑伍兩　半夏半升
人參　黃芩

右十味㕮咀以水一斗煮取二升去滓服一升日三服下爲效集驗用枳實錢枚不用芍藥

治傷寒頭痛壯熱百節皆疼痛方

柴胡　梔子人　芍藥　大青　知母各肆兩　升麻
黃芩　杏人兩各參兩　石膏捌兩　香豉壹升

右十味㕮咀以水九升煮取二升去滓服一升日三服若熱盛加大黃四兩

駐車圓　治傷寒留飲宿食不消方

豆豉壹升　巴豆去油參佰枚　杏人去皮尖參佰枚　黃芩
麻黃各肆兩　芒消　大黃　甘遂各參兩
黃連

右九味爲末以蜜和丸如大豆服一丸不得下者增之

靜嘉堂文庫所藏

發汗吐下後第九脉證七條　方十七首

傷寒已解半日許復心煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯

凡發汗後飲水者必喘宜愼也

竹葉湯　治發汗後表裏虛煩不可攻者宜與此方

竹葉貳把　半夏半升　麥門冬壹升人參
甘草各貳兩　生薑壹兩　石膏壹斤

右七味㕮咀以水一斗煮取六升去滓內粳米半升米熟去之一分服一升日二服文仲無生薑

桂枝湯大汗後脉洪大者與桂枝湯若形如瘧一日再發汗出便解者宜桂枝二麻黃一湯方

桂枝壹兩拍碎　麻黃拍碎　芍藥
甘草貳兩　生薑壹兩切　大棗伍枚

甘草壹兩貳銖　杏仁拾陸枚大棗伍枚

右七味㕮咀以水五升煮麻黃再沸去沫內諸藥煮取一升過寒溫分再服取微汗而已

小青龍湯　治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者方

桂心　麻黃　細辛各叁兩　五味子　半夏各半升
芍藥　甘草　乾薑

右八味㕮咀以水一斗煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升分三服相去十里頃復服之若渴者去半夏加栝蔞根二兩若微利去麻黃加芫花如一雞子大熬令赤色若噎加附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升數用神效

靜嘉堂文庫所藏

四物甘草湯 治傷寒發汗出而喘無大熱與此方
甘草 貳兩 麻黃 肆兩 石膏半斤 杏人伍拾枚
右四味咬咀以水七升先煮麻黃令減二升內諸藥
取二升分二服

梔子湯 治發汗若下後煩熱胷中窒氣逆搶心者方
梔子 拾肆枚 香豉 肆合 綿裹
右二味以水四升先煮梔子取二升半次內豉煮取一
升半分二服溫進一服得快吐止後服

厚朴湯 治發汗後腹脹滿方
厚朴半兩 人參 壹兩 甘草 貳兩 生薑 八兩 半夏半升
右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服

武湯 治太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭

眩身瞤動振振欲擗地方
茯苓 肆兩 芍藥 生薑 各叁兩 白朮 貳兩 附子 壹枚
右五味咬咀以水八升煮取三升溫服七合

葛根黃連湯 治太陽病反下之利遂不止脉促者表未解
喘而汗出者方
葛根 半斤 黃連 黃芩 各叁兩 甘草 貳兩
右四味咬咀以水八升先煮葛根減二升次內諸藥煮
取二升去滓分再服

茯苓湯 治傷寒發汗吐下後心下逆滿氣上衝胷起即頭
眩其脉沈緊發汗則動經身為振振搖者方
茯苓 肆兩 白朮 桂心 各叁兩 甘草 貳兩
右四味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服

靜嘉堂文庫所藏

凡寸口脉浮關上自沈爲結胷巢源作沈細
凡傷寒病發於陽而反下之熱入因作結胷

大陷胷圓 治結胷病項亦強如柔痙狀下之即和方

大黄 粉兩 芒消 杏人 葶藶各四合

右四味擣篩大黄葶藶取一味別研如脂和散取如彈丸大一枚甘遂末一錢匕白蜜一合水一升煮取八合温頓服之病乃自下如不下更服取下爲效

傷寒六七日結胷熱實其脉沈緊心下痛按之正堅者大陷胷湯方

大陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上乾而渴日晡有小潮熱心胷大煩從心下至小腹堅滿痛不可近者

甘遂末 宣錢匕 大黄 陸兩切 芒消 壹升

右三味以水六升先煮大黄取一升去滓次内芒消一沸次内甘遂分再服一服得快利止後服

甘草瀉心湯 治傷寒中風醫反下之其人下痢日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅結滿乾嘔心煩不能得安師見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虚客氣上逆使之然也宜治其胃氣

甘草 肆兩炙 黄芩 黄連 壹兩

右六味以水一斗煮取六升去滓分服一升日三

生薑瀉心湯 治傷寒發汗後胃中不和心下痞堅乾噫食

加人參叁兩

臭甚下有水氣腹中雷鳴下利者方

生薑肆兩　甘草
乾薑　黃連各壹兩半　夏半升　大棗拾貳枚
人參　黃芩各叁兩

右八味咬咀以水一斗煮取六升去滓分服一升日三
白虎湯　治傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱
時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者方

石膏青升　知母陸兩　甘草貳兩　粳米陸合

右四味咬咀以水一斗煮米熟去滓分服一升日三諸
亡血及虛家不可與白虎湯若立夏後至立秋前得用
之立秋後不可服春三月尚凜冷亦不可與之與之則
嘔利腹痛

無大熱而口乾渴心煩背微惡寒宜白虎湯

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯
無表證具白虎湯
若渴欲飲水口燥舌乾者亦宜白虎湯

青蒿子一圓　治傷寒後結熱在內煩渴者方

青蒿子伍兩　黃芩
黃蘗貳兩　龍膽
栝蔞根　苦參各壹兩
梔子人　黃連各叁兩

右八味為末蜜丸如梧桐子大先食服七丸日三不知
稍加一本云鴈和為丸

大青湯　治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸熱
不除及下利不止斑出皆治之方

大青貳兩　甘草
阿膠各貳兩　豉壹升

右四味咬咀以水八升煮取三升去滓煮三沸去豉內

靜嘉堂文庫所藏

阿膠令烊頓服一升日三服欲盡復作常使有餘渴者
當飲但除熱止吐下無毒深師治勞復時後有赤
治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方
知母貳兩　麻黃　甘草
芍藥　黃芩　桂心各壹兩
右六味咬咀以水七升煮取二升半服五合日三溫覆
令微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃
中和則愈
江南諸師秘仲景要文不傳
灸法
初得病或先頭痛身寒熱或滿滿欲吐火或腰背強直面
赤如飲酒狀此傷寒初得一二日但灸灸心下二處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心下二寸名胃管各灸五十壯然誠人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中至繩頭名胃管又中半繩更分為二分從胃管向上度一分即是上管又上度取一分即是巨闕大人可灸五十壯小兒可二壯亦隨其年灸之大小以意斟量也若病者三四日以上宜先灸胃上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中至繩頭名曰天聰又灸兩顳顬又灸肝輸百壯餘處各一十壯又灸太衝二十壯神驗

靜嘉堂文庫所藏

重刊孫真人備急千金要方卷之九

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏

国立国会図書館所蔵



靜嘉堂文庫所藏

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦參青箱艾梔子等蔥苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦酢物不解也熱在身中既不時治之又不用苦酢等藥此如救火不以水也必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甘簠柱人參之屬此皆貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參葶藶青箱艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按藥次也便以青箱苦參艾苦酒療之但稍與促其間無不解也扁鵲曰病在腠理湯劑之所及病在血脉針石之所及病在骨髓無可耐何而凡醫治病或言且待使病成乃頓去之

靜嘉堂文庫所藏

此為妄矣當預約束家中及所部曲具語辭此意使有病者知之為要

治溫氣病欲死方

苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之當吐則除諸毒病服之覆取汗皆愈張文仲及肘後云治熱毒無死殆陷千金湯

苦參湯 治熱病五六日已上方

苦參三兩　黃芩二兩　生地黃八兩

右三味㕮咀以水八升煎取二升適寒溫服一升日再

麥門湯 治時行毒病七八日熱積聚胃中煩亂欲死起死入湯湯方

芫花一升以水三升煮取一升半漬故布薄胃上不過三薄熱即除當溫暖四肢護厥逆也

柏葉湯 治傷寒中風五六日已上但胃中煩乾嘔者

柏葉實一枚　黃芩　甘草各三兩

生薑四兩　大棗十二枚　柴胡半斤

右六味㕮咀以水一斗二升煮取五升絞去滓適寒溫服一升日三

蘆根飲子 治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食方

生蘆根切　青竹茹各一升　粳米三合　生薑三兩

右四味以水七升先煮粳米千里糧底一隻取五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不瘥重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通草三兩　生蘆根切一升　橘皮一兩　粳米三合

右四味㕮咀以水五升煮取二升隨便稍飲不瘥更作

靜嘉堂文庫所藏

取瘥止

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏　麥門冬　半夏各一升　竹葉一把　人參二兩

右五味㕮咀以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮熟湯成飲一升日三服一方加生薑五兩

前卷汗後門中已有此方仍少甘草分兩不別

景正是仲景竹葉湯方

治熱毒攻手足赤腫燃熱疼痛欲脫方

黃馬屎若羊屎汁漬之日三度

又方　濃煮虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上一尺止

又方　稻穅灰汁漬之亦佳

又方　猪膏和羊屎塗之亦佳

又方　取酒煮苦參以漬之

又方　取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳

治時行熱毒變作赤色癰疽丹疹毒腫及服赤痛生障瞖方

漏蘆　連翹　黃芩　麻黃　白斂

升麻　甘草各三兩　枳實　大黃各四兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服相去如人行五里又更服熟盛者可加芒消二兩

猪膽湯　治傷寒五六日斑出方

猪膽　苦酒各三合　雞子青枝

右二味合煎三沸強者盡服之羸者須煎六七沸分爲一服汗出即愈

治人及六畜時氣熱病豌豆瘡方

濃煮桑穰汁洗之一茎是桑穰即不瘥瘡若黑者擣

靜嘉堂文庫所藏

蒜封之
又方煮芒鞋洗之
治熱病後發疿豆瘡方
黃連二兩以水二升煮取八合頓服之
又方眞波斯青黛大如棗水服之瘥
又方青木香二兩以水三升煮取一升頓服之
又方若赤黑發如疥大疾火作者煎羊脂摩傳之
又方小豆膏雞子白和傳 又方婦人月水帛拭之
又方小兒著取月水汁和水浴之
又方灸兩手腕親子骨尖上三壯男左女右
木香湯 治瘡煩疼者方
青木香 薰陸香 鬱石 丁香各壹兩 麝香半兩

右五味咬咀以水四升煮取一升半分再服熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代病輕者去鬱石神驗
又方芒消和猪膽塗上勿動痂落無痕仍引黃土末上良此病小便澀有血者內瘡瘡皆黑靡不出膿者死不治也
治內發瘡盛方
酢漿合 大猪膽壹具
右二味合煎三沸服一合日五服之良驗
治疱豆瘡初發覺欲作者方
煮大黃五兩服之愈
治時行病發瘡方
取好蜜傅身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數

靜嘉堂文庫所藏

食之

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上不止用此方

牡蠣貳兩半　石膏壹兩碎絹

右二味治下篩酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大用治大病瘥後小勞便鼻衄者

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方

生烏翎壹斤切　豬脂壹斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄綿裹之內喉中稍稍咽之取瘥

又方

升麻　芍藥　羚羊角各叁兩　射干貳兩　生薑根切壹升

通草肆兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏半升　蜜壹升

右二味以水二升先煮石膏取二升次內蜜復煎取如飴含如棗核許盡復含之大良

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗貳拾枚　烏梅拾枚

右二味合搗蜜和含如杏核大咽其汁甚驗

禹餘粮湯傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯竟復以他藥下之利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在下焦治之方

禹餘粮　赤石脂各壹斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若不止當利小便

靜嘉堂文庫所藏

治傷寒後下利膿血方

阿膠壹兩　黃連肆兩　梔子人拾肆枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內阿膠更煎令消分爲二服甲乙方無黃蘗有黃芩

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有蟲蟲在下部方

麝香　礬石　巴豆

附子　眞朱　雄黃各等分

右六味治合取桑條如箭幹長三寸以綿纏頭二寸唾濡綿裹取藥著綿上內穀道中半日復易之日再神效

麻黃升麻湯　治傷寒六七日其人大下後脉沈遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泊利不止爲難治者方

麻黃　知母　萎蕤一作蒲黃各兩　黃芩各參兩　升麻

芍藥　當歸　乾薑　石膏　茯苓各

白朮　桂心　甘草　麥門冬各貳兩

右十四味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫次內諸藥煮取二升分服一升微取汗愈

治溫毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱毒方

梔子貳拾枚　豉壹升　薤白壹握

右三味以水四升先煮梔子薤白令熟次內豉煮取二升半分爲三服頻服取瘥

治病後虛腫方

豉伍升　醇酒壹斗

右二味煮豉二沸及熱頻服不耐酒者隨性飲取汗

靜嘉堂文庫所藏

治汗不止方

地黃二斤切以水一斗煮取三升分三服

又方 白朮葉作飲飲之

治卒得汗不止方

溫酒服牛羊脂

又方 服桑亦止

治盜汗及汗無時方

韭根四十九枝水二升煮一升頓服

又方 豉一升以酒二升漬三日服不瘥更合服不過二劑

即止

又方 死人席緣燒灰煮汁洗身瘥

止汗方

牡蠣 牡蠣各等分

右二味治下篩臨夜卧以水服五錢匕

又方 牡蠣 雷丸 麻黃根各叁兩

乾薑 甘草各壹兩 米粉貳升

右六味治下篩隨汗處粉之

牡蠣散 治卧即盜汗風虛頭痛方

牡蠣 白朮 防風各叁兩

右三味治下篩酒服方寸匕日二止汗無出此方一切泄汗服之三日皆愈神驗

勞復第二論一方一首 食忌心丸條一首

論曰凡熱病新瘥及大病之後食豬肉及羊血肥魚油膩等必當大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌菜黍

靜嘉堂文庫所藏

飴哺鵝炙棗栗諸菓物脯脩及堅實難消之物胃氣尚虛
弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難
禁不下之必死下之復者皆難救也熱病及大病之後多
坐此死不可不慎也
病新瘥後但得食糜粥寧少食令飢慎勿飽不得他有所
食雖思之勿與之也引日轉久可漸食羊肉白糜若羹汁
雖兎鹿肉不可食　猪狗肉也新瘥後當靜卧慎勿早起
梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞煩凡此
皆令人勞復故瞥郵顧子獻得病已瘥未健詣華敷視脉
曰雖瘥尚虛未得復陽氣不足慎勿勞事餘勞尚可女勞
則死當吐舌數寸其婦聞其夫瘥從百餘里來省之經宿
交接中間二日發熱口噤臨死舌出數寸而死病新瘥未
滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有十蓋千人
瘥愈後六十日已能行射猶以房室即吐涎而死及熱病
房室名為陰陽易之病皆難治多死近者有一士大夫小
得傷寒瘥已十餘日能乘馬行來自謂平復以房室即小
腹急痛手足拘攣而死
時病瘥後未滿五日食一切肉麪者病更發大困
時病瘥後新起飲酒及非菜病更發
時病新瘥食生魚鮓下利必不止
時病新瘥食生菜令顏色終身不平復
時病新汗解飲冷水者損心胞令人虛補不復
時病新瘥食生棗及羊肉者必膈上作熱蒸
時病新瘥食犬羊等肉者作骨中蒸熱

靜嘉堂文庫所藏

時病新瘥食魚肉與瓜生菜令人身熱（熱一本作脛）

時病新瘥食蒜鱠者病發必致大困

黄龍湯治傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方（仲景名小柴胡湯）

柴胡（半斤）　半夏（半升）　黄芩（參兩）　人參
甘草（各貳兩）　生薑（肆兩）　大棗（拾貳枚）

右七味㕮咀以水一斗煑取五升去滓服五合日三不嘔而渴者去半夏加栝蔞根四兩

補大病後不足虚勞方（萬病虚勞同用）

取七歲已下五歲已上黄牛新生者乳一升以水四升煎取一升如人體温稍稍飲之不得過多十日服不絶爲佳

治傷寒温病後勞復或食或飲或動作方

梔子人（參拾柒枚）　石膏（伍兩）　鼠矢（尖頭大者貳拾枚）
香豉（壹升）

右四味㕮咀以水七升煑取三升分三服

治病後勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復方

取洗手足汁飲一合又取頭中垢如棗核大呑一枚

枳實梔子湯治大病已後勞復者方

枳實（參枚）　梔子（拾肆枚）　豉（壹升綿裹）

右三味㕮咀以酢漿七升先煎減三升次内枳實梔子煑取二升次内豉煑五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者内大黄如博棊子五六枚

治病新瘥過美飲食食過多食復者方

取所食餘燒爲末飲調服一錢匕日三服

靜嘉堂文庫所藏

治新瘥早起及食多勞復方
豉伍合　鼠矢貳拾壹枚尖頭者
右二味以水二升煑取一升盡服之温臥令小汗愈崔氏
加梔子柒枚尤良肘後有麻子人內壹升加水壹升亦可內枳實叄枚葱白壹虎口
治重病新瘥早起勞及飲食多致發欲死方
燒鼈甲末飲服方寸匕
治食大飽不消勞復脉實者方
豉壹升　鼠矢貳拾枚　梔子柒枚　大黃叄兩
右四味㕮咀以水六升煑取二升分三服微取汗應小
鴨溏者止不溏者復作
治勞復垂死方
暖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服即愈小
男兒亦得
麥門冬湯 治勞復氣欲絶起死人方
麥門冬壹兩　甘草貳兩　京棗二拾枚　竹葉切壹升
右四味㕮咀以水七升煑粳米一升令熟去米內諸藥
煎取三升分三服不能服者綿濡湯內口中用之有效
治食勞方
麴一升煑取汁服之
又方 杏人五十枚以酢二升煎取一升服之取汗
又方 燒人糞灰水服方寸匕
欲令病人不復方
燒頭垢如梧子大服之
治傷寒瘥後一年以下傷水不能食方

靜嘉堂文庫所藏

生地黃伍斤　白朮壹斤　好麪貳斤

右三味合擣令相得曝乾不篩酒服方寸匕日三加至二七

論曰婦人温病雖瘥未苦平復血脉未和尚有熱毒而與之交接得病者名爲陰易之病其人身體重熱上衝胷頭重不能舉眼中生眵膜脢四肢拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉百節解離經脉緩弱血氣虛竭髓竭便噓噓吸吸氣力轉少著牀不能動搖起止仰人或引歲月方死醫者張苗說有婢得病瘥後數日有六人姦之皆死治婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人方

取女人中裩近隱處燒服方寸匕日三小便即利陰頭微腫此爲負矣女人病可取男裩一如此法

治交接勞復陰外腫縮腹中絞痛便欲死方

取所交接婦人衣裳以覆男子立愈

令病人不復方

取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若米飲汁服之

治男子新病起近旁內復者方

取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹絞痛欲死

治病後髮亂不可理通頭法

生麻油二升將頭髮解開安銅沙羅中用油淹漬之細將刻子領髮斯須並自通

靜嘉堂文庫所藏

百合第二 論二首 方七首

論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病已後不平復變成斯病其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨其證以治之

百合之爲病令人意欲食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時如有寒其實無寒如有熱其實無熱常默默欲卧復不得眠至朝口苦小便赤澀欲行復不能行諸藥不能治治之即劇吐利如有神靈所爲也百合病身形如和其脉微數其候每溺時即頭覺痛者六十日乃愈百合病候之溺時頭不覺痛淅淅然寒者四十日愈百合病候之溺時覺快然但覺頭眩者二十日愈百合病證其人或未病而豫見其候者或已病四五日而出或病一月二十日後見其候者治之喜誤也依證治之

論曰百合病見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗爲逆也見在於陽而攻其陰則陽不能解也復下之其病不愈（要畧云見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法解之見陽攻陰復發其汗此爲逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦爲逆其病難治）

百合知母湯 治百合病已經發汗之後更發者方

百合（柒枚擘）　知母（參兩）

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明旦去水取百合更以泉水二升煑取一升汁置之復取知母切以泉水二升煑取一升汁合和百合汁中復煑取一

靜嘉堂文庫所藏

升半分再服不差更依法合服

百合滑石代赭湯 治百合病已經下之後更發者方

百合 滑石 各三兩 代赭壹兩

右二味先以泉水漬百合一宿明旦去水更以泉水二升煮餘一味取一升內百合汁如前法復煎取一升半分再服

百合雞子湯 治百合病已經吐之後更發者方

百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升雞子黃一枚內汁中攪令調分再服

百合地黃湯 治百合病始不經發汗吐下其病如初者方

百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升內生地黃汁一升復煎取一升半分再服大便當去瘀

沐忽候也

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先洗病人身洗身後食白湯餅勿與醋飲也渴不差可用栝蔞根末牡蠣等分爲散飲服方寸七日三

治百合病變而發熱者方

百合根壹斤乾之 滑石 各三兩

右一味治下篩飲服方寸七日三當微利利者止勿復服熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

治百合病變腹中痛者方

但取百合根隨多少熬令黃色搗篩爲散飲服方寸七日三痛止

靜嘉堂文庫所藏

傷寒不發汗變成狐惑病第四論一首

論曰狐惑之病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉起卧不安其毒在喉咽為惑病在陰肛者為狐病狐惑之病並惡食飲不欲食聞食臭其面目翕亦翕白翕黑毒食於上者則聲嗌也嗌嗌毒食下部者則乾咽也此由溫毒氣所為食於上者瀉心湯主之食於下者苦參湯淹洗之食於肛外者熏之并用雄黃二片稍置尾餅中炭火燒向肛熏之并服湯也

治狐惑湯方

黃連　薰草各等分

右一味咬咀白酢漿一斗漬一宿煮取一升分為二服

赤小豆當歸散　其人脉數無熱微煩默默但欲臥汗出初

初之三四日眼赤如鳩眼得之七八日其四肢黃黑能食者膿已成也治之方

以赤小豆三升漬之令生芽足乃復乾之加當歸二兩為末漿水服方寸匕日三即愈

瀉心湯　其病形不可灸因火為邪血散脉中傷脉尚可傷藏則處并輸谷胵黃汁出經令外爛肉腐為癰膿此為火狙醫所傷也夫脉數者不可灸因火為邪即為煩因虛逐實血走脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難後也雖在瀉心瀉心湯兼治下痢不止腹中痞堅而嘔吐湯鳴者方仲景名半夏瀉心要異名甘草瀉心

半夏　半升　黃芩

甘草　名參三兩　黃連　壹兩　大棗　拾枚　乾薑

人參　乾薑

靜嘉堂文庫所藏

右七味咬咀以水一斗煮取六升分服一升日三

傷寒發黃第五方二十四首　證九條　針灸圖二首

論曰黃有五種有黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸黃汗者身體四肢微腫胸滿不渴汗出如黃檗汁良由大汗出卒入水中所致黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱以冷水洗之熱因留胃中食生黃瓜熏上所致若成黑疸者多死穀疸者食畢頭眩心忪悸不安面發黃由失飢大食胃氣衝熏所致酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致女勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接竟入水所致但依後方治之

黃汗之為病身躰洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染

而色正黃如檗汁其脉自沈從何得之此病以汗出入水中浴水從汗孔入得之

黃耆芍藥桂酒湯　治黃汗方

黃耆伍兩　芍藥參兩　桂心參兩

右三味咬咀以苦酒一升水七升合煎取二升飲一升當小煩也至六七日稍自除心煩者苦酒阻故也

黃疸之病疸而渴者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱

桂枝黃耆湯　諸病黃疸宜利其小便假令脉浮當以汗解

桂枝　芍藥　生薑各參兩　甘草貳兩　黃耆伍兩　大棗拾貳枝

右六味咬咀以水八升煮火前取三升去滓温服一升

靜嘉堂文庫所藏

覆取微汗須臾不汗者飲稀粥以助湯若不汗更服湯

麻黃醇酒湯 治傷寒熱出表發黃疸方

麻黃二兩以醇酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗出即愈冬月寒時用清酒春月宜用水

治黃疸方

瓜蒂 秫米 赤小豆各貳柒枚

右三味治下篩病重者取如大豆一枚內著鼻孔中痛縮鼻須臾當出黃汁或從口中出汁升餘則愈病輕者如一豆不瘥間日復用又下里間以筒使人極吹鼻中無不死大慎之 刪繁療大行毒熱通貫藏腑沈伏胃髓黃等病悉息須臾不絕

大黃圓 治同前

大黃 葶藶子各貳兩

右二味為末蜜和丸如梧子大未食服十丸日二病瘥止

又方 大黃貳兩 黃連各叁兩 黃蘗各壹兩 麴衣伍合

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服二丸日二不知加至二五丸

茵蔯湯 治黃疸身體面目盡黃方

茵蔯 黃連各叁兩 黃芩貳兩 大黃

甘草 人參各壹兩 梔子貳拾柒枚

右七味㕮咀以水一斗煮取二升分二服日二亦治酒疸酒癖

三黃散 治同前

大黃　黃連　黃芩各等分

右二味治下篩先食服方寸匕日二亦可爲丸

茯苓澤瀉湯　治黃疸利小便方

豬苓　茯苓　澤瀉　白朮　桂心各等分

右五味擣篩爲散渴時水服方寸匕極飲水即利小便

及汗出愈此方與第九卷方相重以分兩不同故重出

麻黃醇酒湯　治黃疸飲少湯多方古今錄驗用治膏肓

秦椒陸錡　瓜蒂半兩

右二味治下篩水服方寸匕日三

小半夏湯　治黃疸小便色不異飲食如故腹滿而喘者不可除飲熟除必噦方

半夏　生薑各半斤

右二味咬咀以水七升煮取一升五合分再服有人積氣結而死其心上暖以此湯少許汁入口遂活

治黃疸方

取生小麥苗擣絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥積麥亦得用

治黃疸變成黑疸醫所不能治者方

土瓜根擣汁一小升頓服日一平旦服至食時病從小便出先須量病人氣力不得多服力衰則起不得

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃煮檗漿狀醫不能療者方

茵蔯　梔子各肆兩　黃芩　大黃

柴胡　升麻各叁兩　龍膽貳兩

靜嘉堂文庫所藏

右七味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服若身體
羸去大黃加梔子入五六兩生地黃一升延年秘錄無
肺兩梔實參三兩芒消貳兩近效方加枳實貳兩夫黃發已久變作桃皮色心下
有堅嘔逆不下飲食小便極赤色少四肢逆冷脉深沈
極微細遲者不宜服此方得下必變吐也宜與大黃黃
湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息看脉小浮出形
小見不甚沈微便可治也脉浮見者黃當明不復作桃
皮色心下自覺也大黃黃連瀉心湯方出次後十一味者是

治傷寒熱不除少大便時秘氣力無異食飲不妨已服諸湯散餘熱不除久黃者宜吐下方

苦參　黃連　大黃

右六味治下篩飲服方寸匕當大吐吐者日一服不吐日再亦得下服五日知可消息不覺退更服之小折便消息之

治發黃方

茵蔯　黃蘗　梔子　大黃

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服先服湯後服九方

大黃伍兩　茵蔯　梔子各叁兩

黃芩　黃蘗　黃連各貳兩

右六味爲末以蜜丸如梧子大白飲服二十丸令微利

治傷寒瘀熱在裏身體必發黃方

靜嘉堂文庫所藏

麻黃　連翹　甘草各貳兩　生薑參兩　大棗貳拾枚

杏人參拾枚　赤小豆壹升　生梓白皮切，貳升

右八味㕮咀，以勞水一斗，先煑麻黃，去沫，次內諸藥，煎取三升，分三服

茵陳湯 治傷寒七八日，內實瘀熱結，身黃如橘，小便不利，腹微脹滿，宜下之方

茵陳陸兩　大黃參兩　梔子肆拾枚

右三味㕮咀，以水一斗二升，先煑茵陳，取五升，去滓，次內梔子、大黃，煎取三升，分服一升，日三。小便當利，如皂莢沫狀，色正赤，當腹減，黃悉隨小便去也。范汪用療穀疸，小品加石膏用

石膏壹斤

大黃黃蘗湯 治發黃，腹滿，小便不利而赤，自汗出，此為表和裏實當下之方

大黃參兩　黃蘗　芒消各肆兩　梔子拾伍枚

右四味㕮咀，以水六升，煑取二升，去滓，內芒消，復煎取一升，先食頓飲之

茵陳圓 治時行病急黃，并瘴癘疫氣及痎瘧方

茵陳　梔子　芒消　杏人各參兩　巴豆壹兩

恒山　鼈甲各貳兩　大黃伍兩　豉伍合

右九味為末，以餳為丸，如梧子大，飲服三丸，以吐利為佳。不知，加一丸。初覺體氣有異，急服之，即瘥。神方

治急黃，熱氣骨蒸，兩目赤脉方

芒消壹兩　生地黃汁捌合　大黃壹兩半，末

右三味合和，一服五合，日二，以利為度，不須二服

静嘉堂文庫所藏

治風疸小便或黃或白洒洒寒熱好臥不欲動方

二月生艾壹束搗取絞汁煎如漆密封之大黃　黃連

凝水石　栝蔞根　苦參　葶藶各四銖

右七味六味爲末以艾煎和丸如梧子大先食服五丸日二可至二十丸有熱加苦參渴加栝蔞小便白加黃連大便難加大黃

葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃

濕疸之爲病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如純肝狀其小腹滿者急下之亦治一身盡黃目黃腹滿小便不利方

礬石　滑石各伍兩

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日三先食服之便利如血者已當汗出瘥

寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跗陽脈緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食則滿也尺脈浮爲傷腎跗陽脈緊爲傷脾風寒相薄食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡黃名曰穀疸

治勞疸穀疸丸方

苦參叁兩　龍膽壹兩

右二味爲末牛膽和爲丸如梧子大先食以麥粥飲服五丸日二不知稍加之

夫酒疸其脈浮者先吐之沈弦者先下之夫人病酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐嘔者宜吐之方前苦參散七味者是酒疸必小便不利其候當心中熱足下熱是其證

靜嘉堂文庫所藏

也夫酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黄故知之

枳實大黃湯 治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃酒疸心中懊憹而不甚熱或乾嘔方

枳實五枚　大黃三兩　豉半升　梔子七枚

右四味㕮咀以水六升煑取二升分三服心中熱疼懊憹皆主之

凝水石散 治肉疸飲少小便多如白泔色此病得之從酒

凝水石　白石脂　栝樓根　桂心各三十銖　菟絲子　知母各十八銖

右六味治下篩麥粥飲服五分匕日三服五日知十日瘥

茯苓丸 治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者方

茯苓　茵陳　乾薑各一兩　白朮熬　枳實各三十銖　半夏　杏仁各十八銖　甘遂六銖　蜀椒　當歸各十二銖

右十味為末蜜和丸如梧子大空腹服三丸日三稍稍加以小便利為度千金翼加[illegible]一兩大黃十八銖名茵陳丸治黑疸身體闇黑小便澀

半夏湯 治酒澼蔭胃心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致方

半夏一升　生薑　黃芩　茵陳　當歸各一兩　前胡　枳實　甘草　大戟各二兩　茯苓　白朮各三兩

右十一味㕮咀以水一斗煑取三升分三服

牛膽丸 治酒疸身黃麴塵出方

靜嘉堂文庫所藏

牛膽一枚 芫花一升 蕘花半升 瓜蔕三兩 大黃八兩

右五味㕮咀以清酒一斗漬一宿煮減半去滓內

牛膽微火煎令可丸如大豆服一丸日移六七尺不知

復服一丸至八九膈上吐膈下下或不吐而自愈

大茵蔯湯治內實熱盛發黃黃如金色脉浮大滑實緊數

者夫發黃多是酒客勞熱食少胃中熱或溫毒內熱者故

黃如金色方

茵蔯 黃蘗各一兩半 大黃 白朮各三兩

黃芩 甘草 茯苓 栝蔞根

前胡 枳實各二兩 梔子二十枚

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服得快下消

息三四日更治之

茵蔯丸治氣淋臚脹腹大身體面目悉黃及酒疸短氣不

得息方

茵蔯 天門冬 梔子各四兩 大黃

桂心各三兩 通草 石膏各二兩 半夏半升

右八味蒸大黃通草天門冬半夏梔子曝令乾合擣篩

蜜丸如大豆服三丸日三忌生魚以豆羹服不得用酒

一方去石膏內滑石二兩不知加至十丸

黃家至日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之當膀胱急

小腹滿體盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹臚脹而滿

如欲作水狀大便必黑時溏泄此女勞疸非水也腹滿者

難治

硝石礬石散治女勞疸方

靜嘉堂文庫所藏

消石

右二味治下篩大麥粥汁服方寸匕日三重衣覆取汗

病隨大小便出小便正黃大便正黑

黃疸之為病日晡所發熱惡寒小腹急身體黃顏黑大便溏黑足下熱此為女勞腹滿者難治治之方

滑石

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利則瘥

礬石各半兩

灸黃疸法

○正面圖第一 寅門 上斷裏 上膞 舌下 脣裏 陰縫 顬顱 俠人中 俠承漿 巨闕 上管

寅門宂從鼻頭直入髮際處取通繩分為三斷繩取一分入髮際當繩頭針是宂治馬黃黃疸等病

上斷裏宂正當人中及脣針三鋌治馬黃黃疸等病

上膞宂入口裏邊在上縫赤白脉是針三鋌治馬黃黃疸四時等病

舌下宂俠舌兩邊針治黃疸等病

脣裏宂正當承漿裏邊過齒斷針三鋌治馬黃黃疸寒暑溫疫等病

顬顱宂在眉眼尾中間上下有來去絡脉是針灸之治四時寒暑所苦疸氣溫病等

俠人中宂火針治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不轉者

俠承漿宂去承漿兩邊各一寸治馬黃黃疸急疫等病

巨闕穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫等病

靜嘉堂文庫所藏

上管穴在心下二寸灸七壯治馬黃黃疸等病
男陰縫穴挾陰反向上灸針灸無在
若女人玉門是穴男女針灸無在
○襄面圖第二 風府 肝輸 熱府 脾輸 肺輸 腎輸 心輸 膀胱俞
風府穴在項後入髮際一寸去上骨一寸針之治頭中百
病馬黃黃疸等病
熱府穴在第二節下兩傍相去各一寸五分針灸無在治
馬黃黃疸等病
肺輸穴從大推數第三推兩傍相去各一寸五分灸主黃
疸通治百毒病
心輸穴從肺輸數第二推兩傍相去各一寸五分
肝輸穴從心輸數第四推兩傍相去各一寸五分

脾輸穴從肝輸數第二推兩傍相去各一寸五分
腎輸穴從脾輸數第三推兩傍相去各一寸五分
膀胱俞在白肉後際針灸隨便治馬黃黃疸寒暑諸毒
等病
○側面圖第三 耳中 瞬石 子頭 頰裏 缺盆 手太陽 太衝
耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃黃疸寒暑疫
毒等病
頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針主治馬黃黃
疸寒暑溫疫等病頰兩邊同法
手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸
瞬石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太澤澤當作淵文向
上一夫按白肉際灸七壯治馬黃黃疸等病

靜嘉堂文庫所藏

鍼孔先度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸
太衝穴針灸隨便治馬黃溫疫等病

溫瘧第六 論一首方三十四首灸刺法十九首禳瘧法一首符二首

論曰夫瘧者皆生於風夏傷於暑秋為痎瘧也問曰瘧先寒而後熱者何也對曰夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧問曰先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩悶手足熱而欲嘔名曰癉瘧問曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏對曰溫瘧者得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓鑠肌肉消腠理發泄因有所用力邪氣與汗皆出此病邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外也如是則陰虛而陽盛盛則病矣衰則氣復反入入則陽虛虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧問曰癉瘧何如對曰癉瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消鑠脫肉故命曰癉瘧夫瘧之且發也陰陽之且移也必從四肢始也陽已傷陰從之故氣未并先其時一食頃用細左索緊束其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解

夫瘧脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下

靜嘉堂文庫所藏

之弦遲者可溫遲若脉緊數者可發汗針灸之脉浮大者
吐之瘧脉弦數者風發也以飲食消息止之
瘧歲歲發至三歲或連月發不解者以脅下有痞也治之
不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小
寒者引衣自覆汗出小便利即愈瘧者病人形瘦皮上必
粟起也病瘧一日發當以十五日愈設不瘥當月盡解也
今不愈當云何師曰此病結為癥瘕名曰瘧母急當治之

鼈甲煎圓主之方

成死鼈拾貳斤治如食法要略作鼈用叁兩　半夏　人參
大戟各陸銖　瞿麥　阿膠　紫葳一作紫菀　牡丹皮
石韋　乾薑　大黃　厚朴　桂心
海藻要略作赤消　葶藶　蜣蜋各拾貳銖　蜂窠
桃人　芍藥各壹兩　柴胡壹兩半　烏羽燒一作烏扇
黃芩各拾捌銖　䗪蟲　蜚蟲各叁拾陸銖要略作鼠婦
右二十四味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗以
酒漬灰去灰取酒著鼈其中煮鼈盡爛泯泯如漆絞去
滓下諸藥煎為丸如梧子大未食服七丸日三仲景方無大戟
海藻

柴胡栝蔞根湯治瘧而發渴者方

柴胡　黃耆　人參　甘草
生薑各叁兩　大棗貳拾枚　栝蔞根肆兩
右七味㕮咀以水一斗二升煑取六升去滓煎取三升
溫服一升日三

牡蠣湯牡瘧者多寒治之方牡瘧一作牝瘧

靜嘉堂文庫所藏

牡蠣　麻黄各肆兩　蜀椒參兩無以伯山代之　甘草貳兩

右四味先洗蜀椒二過去腹口咀以水八升煮蜀椒麻黄得六升去沫乃内餘藥煮取二升飲一升即吐出復飲之

蜀椒散　多寒者牡瘧也治之方

蜀椒　雲母　龍骨各等分

右三味治下篩先未發一炊頃以酢漿服半錢臨發服一錢溫瘧者加蜀椒半分雲母取火燒之三日三夜要畧

不用雲母用雲實

有癉瘧者陰去氣孤絶陽氣獨發而脉微其候必少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣内藏於心外舍於分肉之間令人消爍脫肉也

有瘧者其脉平無寒時病六七日但見熱也其候骨節煩熱時嘔朝發暮解名溫瘧

白虎加桂湯　治之方

石膏壹斤　知母陸兩　甘草貳兩　粳米陸合

右四味咀以水一斗二升煮米爛去滓加桂心二兩前取三升分三服覆令汗先寒發熱汗出者愈

麻黄湯　治瘧須發汗方

麻黄　括蔞根　大黄各肆兩　甘草壹兩

右四味咀以水七升煮取二升半分三服未發前食頃一服臨發一服服後皆覆取汗

治瘧或間日發者或夜發者方

恒山　竹葉各叁兩　秫米壹伯粒　石膏捌兩

靜嘉堂文庫所藏

右四味咬咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨
處橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器緩火煎取
二升分二服清旦一服未發前一食頃一服臨發一服
一二服訖靜室中臥莫共人語當一日勿洗手面及漱口
勿進食取過時不發乃漸洗進食并用藥汁塗五心胃
前頭面藥滓置頭邊曾用神驗救急方用烏梅貳栄枝

又方 先作羊肉臛麪餅飽食之并進少酒隨所能其令欲
欣有酒氣入密室裏燃炭火厚覆取大汗即瘥

又方 燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日三

恒山圓 治瘧瘧發不可具方
恒山 知母 甘草 大黃洛拾枚黃壹兩
右五味爲末蜜和丸如梧子大未食服五丸日二不知
漸增以瘥爲度 用後無忌小黃

又方 治瘧經數年不瘥者兩劑瘥一月已來一劑瘥方
恒山三兩爲末以雞子白和併手丸如梧子大置銅
椀中於湯中熬令軟殺腥氣則止以竹葉飲服二十
丸欲吐但吐至發令得二服時早可斷食時晚不可
斷食可竹葉汁煮藥少食之

梔子湯 治同前
梔子拾肆枚 秫米拾肆粒 恒山參兩 車前葉貳栄 枝炙乾
右四味咬咀以水九升煮取三升分二服未發一服發
時一服發後一服以吐利四五行爲瘥不止冷飯止之
治老瘧久不斷者方
恒山參兩 烏賊骨 升麻 鼈甲 附子酪壹

靜嘉堂文庫所藏

右五味㕮咀絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐下

治瘧無問新久者方

小便壹升半　蜜叁匕

右二味煮三沸頓服每發日平旦時服自至發勿食臨若漸退不過三服瘥

又方　鼠尾子　車前子　各壹兩

右二味㕮咀以水五升煮取一升未發前服盡

又方　馬鞭草汁五合酒三合勻二服

又方　擣良薑根燒熏灸和水服一合量人大小強弱用之

又方　瓜蒂二七枚擣水漬一宿服之

又方　常以七月上旬白採麻花為末酒服方寸匕

又方　故鞋底去兩頭燒作灰非花水服之

又方　桃花末水服方寸匕

治瘧方

鼈甲方寸炙　烏賊骨方貳寸　附子炮　甘草各壹兩

右五味㕮咀以酒一升半漬之露一宿明旦溫二五合手足過發時瘧斷若不斷可飲一合許瘥

蜀椒圓　治勞瘧并治積勞寒熱發有時似瘧者方

蜀椒　麥門冬　知母　白薇　地骨皮

升麻各叁拾銖　甘草　鼈甲　烏梅肉

萎蕤各壹兩　恒山半　石膏貳兩　豉壹合

右十三味為末蜜和丸如梧子大飲服十丸日再服之

靜嘉堂文庫所藏

稍稍加至二三十丸此神驗無不瘥也加光明砂一兩

烏梅圓 治寒執勞瘧久不瘥及久經勞役患之積年不瘥服之神效方

烏梅肉 一豆豉各壹合 升麻 地骨皮 柴胡 鼈甲 恒山 前胡各壹兩 肉從蓉 玄參 百合 蠶繭 桂心 人參 知母各半兩 桃人 拗拾壹枚

右十六味爲末蜜丸空心煎細茶下二十丸日二服老少孩童量力通用無所忌

治勞瘧積時不斷服治無效者方

生長大牛膝一握切以水六升煮取二升分再服第一服取未發前食頃第二服取臨發時

大五補湯 治時行後變成瘧瘧方

桂心 人參 桔梗 芎藭各貳兩 伏苓 乾地黃 芍藥 當歸 黃耆 甘草各叁兩

生薑 半夏各壹合

右十八味㕮咀以水二斗煮竹葉柏取二斗次內諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡

鮫鯉湯 治下寒下熱下有水無山瘴瘧方

鮫鯉甲 柏肆枝 鼈甲 恒山各叁兩 附子壹枚

右五味㕮咀以酒二升漬一夕發前稍稍啜飲勿絕吐之兼以塗身斷食過時乃食飲

靜嘉堂文庫所藏

烏梅圓 治肝邪熱爲瘧久令人顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉狀如死者或久熱勞微動如瘧積年不瘥方

烏梅肉　蜀椒　鼈甲　萎蕤　知母　甘草　苦參各壹兩　恒山壹兩半　石膏貳兩　細辛各拾銖　香豉壹合

右十一味爲末蜜丸如梧子大酒服十九日并飲服治以熟爲瘧不止或止後熱不歇不來作去令人煩悶其欲飲清水反寒多不甚熱者方

甘草壹兩　蜀椒參兩　恒山　鼈甲各肆兩　石膏伍兩　烏梅各叁拾枚　淡竹葉切貳升　香豉壹合　梔子

右九味㕮咀以水九升煮取三升分二服

恒山圓 治脾熱爲瘧或渴或不渴熱氣內傷不泄令人病寒腹中痛腸中鳴汗出方

恒山參兩　甘草半兩　知母　鼈甲各壹兩

右四味爲末蜜丸如梧子大未發前酒服十九臨發時一服正發時一服

恒山湯 治肺熱痰聚胃中來去不定轉而爲瘧其狀令人心寒寒甚則發熱熱間則善驚如有所見者方

恒山參兩　甘草半兩　秫米參伯貳拾粒

右二味㕮咀以水七升煮取二升分二服至發時令三服盡

又方 治腎熱發爲瘧令人淒淒然腰脊痛死轉大便難目眴眴然身掉不定手足寒方

恒山參兩　烏梅參拾枚　竹葉切壹升　香豉　搗合壹撮　葱白壹握

靜嘉堂文庫所藏

右五味咬咀以水九升煮取二升分二服至發令盡

五臟並有瘧候六腑則無獨胃腑有之胃腑瘧者令人曰病也善飢而不能食食而支滿腹大治之方

黎蘆　恒山　皂莢　牛膝各壹兩　巴豆卅枚

右五味先熬黎蘆皂莢色黃合擣爲末蜜丸如小豆大旦服一丸正發時一丸一日勿飽食服後無恒山牛膝

刺灸法

肝瘧刺足厥陰見血　心瘧刺手少陰

脾瘧刺足太陰　肺瘧刺手太陰陽明

胃瘧刺足太陰陽明橫脈出　腎瘧刺足少陰太陽

凡灸瘧者必先問其病之所發者先灸之從頭項發者於未發前頭灸大椎尖頭漸灸過時止從腰脊發者灸腎俞

百壯從手臂發者灸二間瘧灸上星及大椎至發時令滿百壯灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大炷也

覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者不過三灸以足踏地以線圍足一匝中折從大椎向百會灸線頭三七壯炷如小豆

一切瘧無問遠近正仰臥以線量兩乳間中垂從乳向下灸要頭隨年壯男左女右

五臟一切諸瘧灸尺澤七壯穴在肘中約上動脈是也諸瘧血脈不見者刺十指間出血去必已先視身之赤如小豆者盡取之

瘧刺足少陰血出愈

瘧瘧上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷谷豆是也灸

靜嘉堂文庫所藏

七壯先取譩譆後取天牖風池
癇日西而發者臨泣主之穴在目瞼上入髮際五分陷者
灸七壯
癇實則腰脊痛強則鼽衄飛揚主之穴在外踝上七寸灸
七壯
癇多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之穴在足
外踝後跟骨上陷中灸二壯
禳癇法
未發前把大雄雞一頭着懷中時時驚動令雞作大
聲立瘥
治癇符凡用二符
癇小兒父字石拔母字石鎚其符隨患人寫讀之

曰一切天地山水城隍日月五星昏敬竈君今有一癇鬼
小兒驚癎君作黑面奴若當不信看文書急急如律令
右件符必須真書前後各留白紙一行擬着竈君額
上兌石壓之不得觸字上勿令人近符若得專遣一
人看符大好亦勿令灸土傳符上致使字不分明出
見者符次第如後若明日日出後發須令人夜掃竈
君前及額上令淨至發日日午令患人整衣帽立竈前
讀符使人自讀必須分明讀符勿錯一字每一徧若
別人讀一徧患人一拜又以手捉患人一度若患
人自讀自捉衣裾云人姓某申如此是凡三徧讀三
拜了以淨兌石壓兩角字向上着竈額上勿令壓字
上若癇日西發具如上法三徧讀符至午時更三徧

靜嘉堂文庫所藏

讀如上法如夜發日暮更三徧讀並如上法其竈作
食亦得勿使動此符若有兩竈大竈上著符若有露
地竈釜裏竈上著止有露竈依法著之仍須手捉符
其符法如後若有客患會須客經停過二度發二度
委曲著符如上法符亦二名姓名患瘧乞拘錄瘧鬼
小兒如左凡治父患者一著符一漸瘧亦可五度著
符如始可全瘧又須手把符如律令
王良符張季伯書之急急如律令
右王良符依法長捲兩手捏念佛端坐如須行動撿
校揀著胷前字頭向上
右一符各依法一時用不得關一符萬一不瘧但得一
發轉後發日更讀即瘧一一仔細依法若字參差即不

瘴

診給毒證第七

江東江南諸谿源間有蟲名短狐谿毒亦名射工其蟲無
目而利耳能聽在山源谿水中聞人聲便以口中毒射人
故謂射工也其蟲小毒輒者及相逐者射著人影者皆不
即作瘡先病寒熱頭不喜冷體彊筋急頭痛目疼張口欠
欬嗽呼吸悶亂朝旦少蘇醒晡夕輒復寒熱或似傷寒發
石散動亦如中尸便不能語病候如此自非其土地人不
常數行山水中不知其證便謂是傷寒殊乃至吐下去血復恐疑是瘴
僻毒盛發瘡復疑是瘴殊乃至吐下去血復恐疑蠱毒是
以致禍耳今說其狀類以明其證與傷寒別也方見第二

十五卷中

靜嘉堂文庫所藏

重刊孫真人備急千金要方卷之十

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏

國立公文書館藏



靜嘉堂文庫所藏

肝藏脉論第一　肝虛實第二　肝旁第三　肝筋極第四　癥結癖氣第五　婦人丘瘕十二癥候

肝藏脉論第一

論曰夫人稟天地而生故内有五藏六腑精氣骨髓筋脉外有四肢九竅皮毛八窗咽喉唇舌肛門胞囊以此物而成軀故將息得理則百脉安和設用非宜即為五勞七傷六極者有方可救雖病無他先法可憑奄然永往所以此之中快卷卷皆備述五藏六腑等血脉根源流注与九竅癥候會處所并論五藏六腑等輕重大小長短闊狹受盛多少仍列對治方法丸散酒煎膏艾灸針孔穴並窮於此矣其能留心於醫術者可考而行之其冷熱虛實風氣則淮藥性而用之則内外百病无所逃矣凡五藏者在天為五星在地為五嶽約時為五行在人為五藏五藏者意精神魂魄也論陰陽察虛實知病源用補瀉候稟三百六十

靜嘉堂文庫所藏

五節終會通十二經肝藏魂官為六尚書肝者生之米謂之精
兩精相薄謂之神往来謂之魂魂者肝之藏也目者肝之官也
肝氣通目目神則能辨五色左目甲右目乙循環紫宫榮華於
服脾重四斤四兩左三葉右四葉有六童子三玉女守肝藏血血
合魂魂在氣為語在液為淚又曰人卧血歸於肝肝受血而能
視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝
扁鵲云肝有病則目奪精虚則恐實則怒虚則寒寒則陰氣
壯則夢山樹等又曰肝動則傷魂魂傷則狂忘失精主春者病
変於色色青者也
凡肝藏象木與膽合為府其經足厥陰與足少陽為表裏其
脉弦相於冬王於春春時萬物始生其氣來輭而弱寬而
虚故脉絃輭即不可發汗弱即不可下春以胃氣為本春肝輭弱
輕虚而滑端直以長故名曰弦反此則病其脉實而弦此則太
過病則在外實而微則名曰不及病在内則太過令人喜忘忽忽

眩冒巔疾病不及令人胷脇病引背下兩脇脹滿肝脉來輭弱如長
竿曰平其脉來盈實而滑如循長舒曰肝滿急而益勁如新絃曰
肝死真肝脉也内外急如循刀責責然如按琴瑟絃色青白不
澤毛折色大死於春春胃微絃曰平絃多胃少曰肝病但絃无胃
曰平胃而有毛曰秋病毛甚曰今病春肝王而脉絃細而長曰平
也反微濇而短者是肺之乘肝金尅木為大逆十死不治反得
浮大而洪者是心之乘肝子之扶母雖病當愈得沈濡而滑者
是名為虚邪腎之乘肝母之扶子病當愈得大而緩者是脾之乘
肝土之尅木土畏木不死心乘肝必吐利膽病太息口苦嘔宿汁
心中澹澹恐人將捕之也○凡肝病之狀必兩脇下痛引小腹令
人喜怒虚則如人將捕之若欲治之當取足厥陰經及足少陽其
氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫其脉沈之而急浮之亦然脇痛有氣
支滿引小腹而痛時小便難苦頭痛腰背痛足有寒時疼女
人月事不來時不止或得久必之時有所墮墜又云肝脉來濯

靜嘉堂文庫所藏

濯其脩竿如琴瑟絃再至曰平三至曰離經四至脫精五至死六
至命盡其脈急甚為惡言微急為肥氣在脇下如覆杯緩甚為
嘔微緩為水瘕大甚為內癰善嘔血微大為肝痺縮欬引小
腹小甚為多飲微小為消癉滑甚為㿉疝微滑為遺溺
濇甚為流飲微濇為瘈瘲筋攣。又曰肝脈搏堅而長色不
青當病墜若血在脇下令人喘逆輭散者其色澤者當病溢飲
溢飲者渴暴多飲而易入皮肌膚腸胃外也春脈之至也長
而左右強有積氣在心下支胠名曰肝痺得之寒濕與疝同邪在
肝則兩脇中痛寒中惡血在內䯒善瘈節時腫取之行間以引
脇下補三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其瘈
凡肝之積名肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈之形狀
久久不愈當發欬逆或瘖瘧連歲月或吐以季夏戊己日得之何
也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者故不受邪欲還肺
肺不肯受因留結為積故知肥氣以季夏得之肝病西行為食藥實得之

當以秋發若庚辛日死有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不
下積于脇下則傷肝肝氣虛夢見園苑生草得其時夢伏樹下
不敢起肝氣盛夢怒於肝夢山林樹木肝脹者脇下滿而痛引小腹
病在肝平旦慧下晡甚夜半靜肝病頭目眩支脇痛一日體痛二
日脹三日腰脊背小腹痛脛痠十日死若冬則日中夏則早食
又曰病胸脇滿脹喜恚怒叫喚身體熱而腹惡寒四肢不舉面
白身體滑脈當弦長而急今反短濇色當青今反白者此是金
之尅木為逆十死不治肝病其色青手足拘急脇下苦滿或眩冒
其脈絃長此可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春刺大敦夏刺行
間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中封皆瀉之當灸期門
百壯背第九椎五十壯肝中寒者灑灑惡寒翕翕發熱面翕然
赤漐漐有汗胸中煩熱頭風目瞤兩脇痛行常傴令人嗜甘阻歸
狀。又曰肝中寒兩臂不舉舌本燥善太息胸中痛不得轉側不
幸則涎汗欬食吐其汁鼻窒欲得張口卧時時手足青目冥

静嘉堂文庫所藏

童子痛診得肝積兩脇下痛邪起心下甚積尓浮並足脛寒腸痛引小腹男子積疝女子瘕淋身无膏澤喜轉筋爪甲枯黒春差秋劇色青肝者者其人常欲蹈其胸上先未苦熱時但欲飲熱左手關上陰絶者无肝脉也𤻲苦痿遺溺者難言脇下有邪氣喜吐刺足少陽在足第二指本節左手關上陰實者肝實也苦肉中轉動筋刺足厥陰經襄公問扁鵲曰吾欲不脉察其音觀其声知其病生死可得聞乎荅曰乃道大要師所不傳黄帝之貴之過於金玉入門見病觀其声呼吸則知往来出入吉凶之相角音人者肝声也其声呼其音琴其志怒其經足厥陰逆足少陽則榮衛不通陰陽反祚陰氣外傷陽氣内擊々則虛々則寒々熱々瘧啞不声此為厲風入肝踞坐不得面目青黒四肢緩弱遺失便利甚則不可治在者月旬之内方在治風毒方下卷又呼而哭々而反吟此為金剋木陰擊陽陰氣起而陽氣伏々則實々則熱々則喘々則逆々則悶々則恐畏視目不明語声切急謬說有人

此為邪氣血傷肝甚則不可治又云若脣色雖青面眼不應可治肝病為瘧者其人色蒼々然氣息喘悶戰掉然狀如死人方在傷寒下卷中若人本来少作悲恚忽尓嗔怒者反常乍寛乍急言未竟以手向眼如有所思若不即病禍即至矣此肝声之證也其人若虛則為寒風所傷若實則為熱氣所損陽則瀉之陰則補之春肝脉色青主足少陽脉又去春取絡脉分肉肝氣急其風疾經脉深其脉不能深入故絡脉分肉間又去其脉根本並在竅陰之門竅陰者是耳前上下脉以手按之動者是其脉起於目兊眥兊眥在目四髮後也從頭走足抵絶骨絶骨在外踝上五寸法隨人手握取一夫是其脉筋起於小指上出外踝前斷結伏兎直上入髀貫胷乳入心中出三毛抵額角毛際下耳後入耳孔出頸至缺盆循季脇横腰絡肝屬膽合手厥陰為表裏厥陰在掌後兩筋之間三寸中是同會手太陰黄帝問歧伯曰經脉十二而手太陰獨動不休何也手太陰本在寸口中是答曰足陽明胃脉為五藏六腑之海胃脉在足大指間上行三寸骨罅中是其精氣上清注於肺

靜嘉堂文庫所藏

氣從太陰行通下以候往来故人呼再動一吸脉亦動呼吸一不已
脉動不止
黄帝問曰氣口何以獨為五藏主岐伯曰胃者水穀之海六府胃
居其大五味入口藏於胃以養五藏氣氣口者
味皆出胃變變見氣口氣口屬手府藏主所以相發氣口即呼寸口者
也又云水陽之別名曰光明去踝半寸是也足陰下絡足跌實
則厥冫則陽病陽脉反逆大於寸口一倍則胃中熱心脇頭腦痛
缺盆腫下腫然則痿癖冫則陰病陰脉反小於寸口則胃中有寒
少氣口苦身躰先澤外至肘絶骨外踝諸節皆痛暴熏者又留
癖也陰陽俱病則脉俱動若引繩俱至表裏之病因起從少陽而發
病也其源從少陰而涉足少陽已足少陽之氣始發少陰之氣始衰
陰陽弗攻荅於腠理皮毛之病俱至表裏之病因起從少陽而發
少陰氣則藏府受春厲而生其病相反若府虚則為陰邪所傷腰
背強急脚縮不申肘中欲折目中生花若藏實則為陽毒所損

瀉濁前寒而後熱頸外雙筋牽不得舒申頸直背強眼赤黄若
欲轉動合身廻側曰筋牽病也方在傷寒上卷c扁鵲云灸肝
肺俞主治疳毒牽病當依源劇治調其陽理其陰府臟之疾
則不生矣　肝藏虚實方第二
治肝藏實熱先左手関上脉陰實者苦心不堅蒲常两肋息
忿忿如怒狀是名肝實則令肝熱氣損竹瀝麻黄湯主之方
竹瀝一升　麻黄三兩　石膏八兩
大青　梔子仁　升麻
知母各三　生葛八兩
右以水九升煮取二升半去滓下瀝煮两沸分三服要利下甚
治肝實熱目痛胃滿急塞瀉肝前胡湯方
前胡　秦皮　細辛　梔子仁　黄芩　蜀升麻
薤仁　決明子各三　苦竹葉一把　車前子一把　芒消一兩湯成下

靜嘉堂文庫所藏

右以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

治肝實熱夢怒虛驚防風煮散方

防風　茯苓　萎蕤　白朮　橘皮　丹參各七分

細辛八分　甘草四分　升麻　黄芩各六分　大棗七枚　夜干五分

酸棗仁三分　右擣篩為散麁下以方寸匕綿裹以井花水二升煮取一升時時動裹子分服之日二

治肝邪熱反常言語乍寬乍急遠志煮散方

遠志　知母　夜干　杏仁　升麻　大青各六分　伏神

乾葛　甘草　麥門冬各四分　芍藥七分　桂心三分　石膏八分

右擣麁下為散煮竹葉切一升以水三升五合煮取汁用煮藥一升半取八合為一服日二以錦裹散煮之

治肝邪熱傷肝好生悲怒所作不定自驚恐地黄湯方

生地黄　淡竹葉　生薑　車前　乾藍各切一升

丹參　玄參各四兩　茯苓二兩　石膏五兩　赤蜜一升

右以水九升煮取三升停冷下蜜更煎三兩沸分三服

治肝熱不止衝眼眼〃皆赤努肉痛及目精黄乾藍煎方

乾藍切　車前切　苦竹葉切各一升　細辛　秦皮

蕤仁　梔子仁　芍藥各二兩　決明子　升麻二兩

右以水二斗先煮藍車前竹葉取一斗去滓澄清內藥煮取三升分三服如要利加芒消三兩

治肝虛冷左手關上脉陰虛者苦脅下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰背痛肝虛冷勞損口苦關節骨疼痛筋攣手縮虎骨酒方

虎骨一升炙焦碎如雀頭　丹參八兩　乾地黄八兩　地骨皮

芎藭各四兩　猪椒根　白朮　五茄皮　枳殼各五兩炙

右㕮咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至一升日再服

治肝虛寒目䀮䀮視物不明諦視生花防風補煎方一方無芎藭

防風　細辛　芎藭　白鮮皮　獨活

靜嘉堂文庫所藏

甘草 各伍兩 橘皮 弐方 大棗 拾枚 甘竹葉 切 升 蜜 伍合

右以水一斗二升煮取三升去滓下蜜更煎沸分四服日三夜一

治肝虛寒腸下痛眼滿氣急目昏視物不明安膽飲子

生薑 柒兩 附子 柒枚炮 茯苓 橘皮 檳榔

桂心 各參兩 桔梗 白朮 各肆兩 吳茱萸 伍兩

右以水九升煮取三升分三服若氣喘者加苦酒三兩半夏四

兩甘草二兩 肝勞第三

肝勞病者補心氣以益之心王則感肝矣人逆春氣則足少陽不

生而肝氣內變順之則療逆之則亂反順為逆是為關格病生

矣

治肝勞寒關格勞澼閉不通方

豬膏 貳升 董汁 貳升

右二味以微火煎取三升下酒五升和煎分為三服

治眼病諸方

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸開昏

之有法五十已前服瀉肝湯五十已後不可瀉肝目中有疾可傳

散藥等死病不可輒傳之散但服補肝而已自肝中有風熱令

人昏暗者當灸肝俞及服除風湯丸散數十劑當愈

生食五辛 接熱食飲 刺頭出血過多 極目遠視

夜讀注書 久處煙火 博弈不休 日沒後讀書

飲酒不已 熱浴熨面 抄寫多年 雕鏤細作

泣淚過多 房室不節 數向日月輪看

夜視星月 極目瞻視川澤木

右十八件並是喪明之由養性之士宜孰慎焉又有馳騁田獵

冒涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之由也凡人少時

不自將慎年四十即漸眼昏若能依此將慎可得白首無他所

以人年四十已去慎須貫目勿顧他視非有要事不肯輒開此

之一術護慎之極也其讀書博弈等過度患目者名曰肝勞

若欲治之非三年閉目不視不可得差徒自瀉肝及作諸治終

靜嘉堂文庫所藏

是无效人有風冷多必眼暗先攻其風其暗自差

神麹丸主明目百歲可讀注書方

神麹四兩 磁石二兩研 光明砂一兩研

右蜜丸梧子飲服三丸日三不禁常服益眼力衆方不及斈者宜知此方神驗不可言須秘之

治肝實熱目眥痛如刺梔子仁煎方

梔子仁 蕤人 決明子各四分 車前葉汁三升 秦皮五分

石膏三分用赤小豆大 苦竹葉二合 細辛二分 赤蜜三合

右以藥花水三升煮取七合去滓下蜜更煎取四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以藥汁細細仰卧以傅目中

治眼赤漠漠不見物努肉生瀉肝湯方

柴胡 芍藥 大黄各四兩 決明子 澤瀉 黄芩

杏仁各四兩 升麻 枳實 梔子仁 竹葉各二兩

右水九升煮取二升七合分三服熱多體壯加大黄一兩羸瘠者去大黄加梔子仁五兩

瀉肝湯治眼風赤膜方

前胡 芍藥各肆兩 生地黄拾兩 芒消 黄芩

茯苓 白芷 梔子仁各叁兩 人參 白术

澤瀉 枳實各二 甘草炙 細辛 竹葉各兵

右以水一斗二升先煎竹葉取九升去滓下諸藥煮取三升半分三服

治肝氣不足兩脇下滿筋急不得太息四肢厥冷發搶心痛目闇補肝湯方

甘草炙 桂心 山茱萸各一 細辛 桃人去皮尖

栢子仁 茯苓 防風各二 大棗二十四枚

右切以水九升煮取三升六合分三服服之

補肝丸治眼暗方

青葙子 桂心 葶藶子熬 杏仁熬去皮尖 細辛

茺蔚子 枸杞子 五味子各四 茯苓 黄芩

靜嘉堂文庫所藏

防風　地膚子　蒺藜　決明子　麥門冬去心

蕤仁各五兩　車前子十兩　大黄酒浸各貳合　乾地黄十兩　兔肝一具炙

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心酒下日再加至三十丸

補肝丸治肝虚目睛疼冷淚不明寒氣所傷並宜服補肝方

兔肝一具炙乾　柏子仁　乾地黄　茯苓　細辛

蕤仁　枸杞子各一兩　防風　芎藭一兩　薯蕷各四分

車前子微炒　五味子一兩　甘草炙　菟絲子一合酒浸

右爲末蜜丸如梧子二十丸空心服加至四十丸

補肝散治目失明漠漠方

青羊肝一具去上膜薄切之

右以新瓦子未用者内火中燒令極乾

膽汁盡取之別搗決明子半升蓼子一合熬令香下篩和

合爲散以粥飲食後服方寸匕日三稍加至三匕不過兩劑

能一歲服之可夜細書

補肝散治三十失明方

細辛　鍾乳研煉成　茯苓　雲母研煉成　遠志　五味子各等

右爲散以酒服五分匕日三加至一錢匕

補肝散常服明目方

蕪菁子三升

右一味以醋味清酒三升煮令熟曝乾末下篩以井花水和服

方寸匕日三至三匕無所忌可少少作服之令人腸肥明目

又方

胡麻一石蒸之三十遍末每日酒服一升

又服小黑豆每日空心挪二七粒吞

又方

三月三日採蔓菁花陰乾末空心井花水服方寸匕

久服長生明目可夜讀書

補肝散治眼漠漠不明瓜子散方亦名十子散方

冬瓜子　青葙子　茺蔚子　枸杞子　牡荊子

蒺藜子　菟絲子　蕪菁子　決明子　地膚子

靜嘉堂文庫所藏

栢子仁　杜仲　酸棗仁各三　細辛　菥蓂子根各二

右為散合以酒服方寸匕日二神驗

補肝蕪菁子三兩　生地黃八斤擣取汁

右以地黃汁煮蕪菁子令汁盡日乾為散酒服方寸匕日二服

白瓜子十一升絹袋盛攪沸湯中三遍

又方

浸一宿曝乾末以酒服方寸匕日三加之服之百日

補肝散主目失明漠漠痛久宿食不消并眼茫茫暗風淚見物不分明

逐風寒

山茱萸　桂心　署預　天雄　茯苓

人參各五　芎藭　白朮　獨活　五加皮

大黃各十半　防風　乾薑　丹參　厚朴

細辛　桔梗各六　菊花　甘草各四　貫衆二分

橘皮各三　陳麥麴　大麥蘗各一升

右以末酒下方寸匕若食不消食後若止痛食前服之

又常服蕪菁子主輕身益氣明目方

以蕪菁子一升以水九升煮令汁盡出曝乾復以水九升煮

如前法三煮三曝末服方寸匕日三

古方

十月上巳以前收槐子以新淨甕盛以盆密封三七日發

洗去皮從月一日服一枚二日二枚日別加一枚計十日服

五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九百八十

枚小月減六十五枚主補腦早服之髮不白好顏色長生

益壽先病冷人勿服之

古方

牛膽盛槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白

髮再黑百日通神

補肝酒主二斤寒或當風眼淚等新病釀松膏酒方

靜嘉堂文庫所藏

秋稻米八壹伯斤

右細剉以水八斗浸之一宿煮之細細捋取汁當水竭更添之貯

盡三斗取汁煮之一斛因去火停冷脂當流下取一斤釀酒米一石

水七斗麴末二斗如家常釀酒法作冷下飯熟一百日脂米

並研冷酒投之熟下之一室細細飲之此酒須一倍加麴

又方

取苟杞子搗碎入内絹袋以酒二斗漬一升苟杞二升酒訖密

封口泥甕勿泄三日服之甕置天陰勿出三七日滿温酒服

任性飲忌酢

治目赤痛眼瞼當風淚方

光明硃砂一兩　貝齒五枚燒　衣中白魚七枚　乾薑半分

右以四味搗研之以倉帛三下為散仰卧令人取小指爪挑少許

傅目中取差為度

治眼暗目痛後失明以羊膽傅之晨暮各一度傅之

治眼暗方

七月七日生苦瓠中白絞取汁一合以酢一升古文錢七文

浸之微火煎之減半以沫内眥中

治眼漠漠洗之方

蕤仁　秦皮　黄連各貳分　螢火擣　決明子壹合

右以水八合微火煎取三合冷以綿注洗目日三

五藏客熱上衝眼内外受寒目痛不明方

地膚子　瓜子人各壹分　螢火壹分　大黄八分　桂心柒分

黄連陸分　栢子仁壹分　決明子　細辛各伍分　蕤仁

藍子　青葙子　菥蓂子　兔絲子　充蔚子各貳分

右擣篩蜜丸每服如梧子五丸日三

治目赤痛方

雄黄　細辛　黄連　乾薑各貳銖

右研末以綿裹如黍粟許塗兩眼頭注藥末内大眥頭勿閉目目

静嘉堂文庫所藏

中淚出須臾又合目止勿將手拭勿將帛拖勿洗之

又方　雄黃　乾薑　黃連　蕤仁各貳分燒

一石末用之如前方加細辛一分

治目生膚翳方　貝子十枚燒

一石細末或如麫已著翳上日二三仰臥令人傳之一炊久乃減之息肉者加真朱如貝子等分

治肝氣虛寒眼青盲䀮䀮不見物方

真朱一兩　白蜜貳合　鯉魚膽一枚

右以和合微火煎兩沸綿裹內目中當汁出藥歇更合

治眼暗方

以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅青一合以四月杏人白人一升取汁和銅青傳之日不過四五度大良

又方　古錢七文　銅青　乾薑　石鹽　胡粉各中棗大

黃連一分　烏頭棗核大　蕤人一百枚　菥蓂子棗大　細辛伍銖

酉合二　清酒五合　秋蒹一把取汁

右三味合煎取三分取二成盛瓷瓦器中著爆取人乳和傳目慎風冷

又方　每朝含黃蘗汁爪甲許使津出置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此法乃可終身行之求除眼疾神良

又方　柴胡　決明各三分

右擣末乳汁和傳目可夜書見五色

治眼赤暗方　杏仁杏仁脂熱時取汁一合　古字錢七文　青鹽三分

右和內瓷瓦器中封蒸百日後出著目中皆頭日二三避風冷

治目赤及翳方　烏賊骨　鉛丹十小分等

右和研細和白蜜如泥蒸之半食久著眼四皆日一

又方　熟羊眼睛曝乾末傳目皆　又羊髓傳之

又新生孩子胞衣曝乾水傳目皆

又方　古錢一文　鹽方寸匕　右二味和末傳目皆

治目中風寒淚出皆赤癢乳汁煎方

靜嘉堂文庫所藏

黄連三分 蕤人二分 乾薑四分

右㕮咀以人乳汁一升浸藥一宿以微火煎取三合綿絞去滓

取如黍米内目眥日再

治目卒腫方 以熱水作鹽湯洗之日四五度

治目熱痛熱汁出或目生障翳洗眼湯方

秦皮 黄蘗 決明子 黄連 蕤人各二分

梔子七枚 大棗五枚 黄芩二分

右以水二升浸煮取二合令仰卧洗目日三

治目熱眥赤生赤脉侵睛息肉澀痛如芥在眼㾦痛方

大棗七枚去核 黄連二兩 淡竹葉切五合

右水二升煮竹葉取一升澄清内棗等取四合洗目眥度

治目風淚出膚翳多膿爛眥方

乾薑 礬石燒一分 蕤人 細辛 黄連

戎鹽 決明子各一分 銅青半分

右㕮咀以少水浸一宿明旦以白蜜八合和之著銅器中上著

竅中以三升麥飯蒸之飯熟藥成絞去滓以新死大雄鯉魚

膽二枚内藥中又以大銭七枚常著藥底兼常著銅器中竹

簪綿頭以注目眥頭晝夜三四不避寒暑數著藥訖以魚

膽和好器覆藥器頭勿令氣歇

治風眼爛眥方

竹葉 黄連各四分 柏樹白皮三分

右水二升煮取三合稍用滴目兩眥日三四度

治胎赤眼方

右取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅鉢中使

童子以木研之至瞑止取夜卧時洗目傅眥日三

治目爛赤方

取三指撮鹽置古文銭上重重火燒赤投少醋中足淹銭

以綿沾汁傅目眥中

靜嘉堂文庫所藏

治毒病後目赤痛有障方
右以青布掩上以冷水漬青布良
治目卒痛方　右以削乾薑令圓滑内皆中
治熱病後漫睛方
以筋擩口熟嚼夜卧開目内之即閉目睡去明日即差
治目痛及淚出方　削附子作末蘸呆大内目中卧良
治風腫方　取死猪鼻燒末旦向日水服方寸匕
治目翳薄白膜方
右取雄雀呆人乳和熟研煎之以傅之當漸消爛
又方　以蜘蛛燒為末以傅之
治目不明淚出方　以烏鷄膽臘卧傅之
治雀盲方　地膚子酢　決明子一升
二物先以米飲汁沾濕之遂滴展取地膚散一服百枚日三夕
即更合善立

治眼暗赤冷淚方　雞人未　波斯鹽末
右二味等以驢脂和每夜傅目四角以一粟大容室中熱
一月日差忌五辛生冷
治目中息肉方　驢脂
右二味和合令調注目兩眥頭日三夜一月日差
又方　五茄木不聞水聲者根去土取皮末一升和上酒二
升浸七日外一日兩時服之禁醋二七日備身生瘡若不出
未得藥力以生熟湯浴之訖毒瘡出瘥
治雀目術
至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃呪曰柴公我還
汝盲汝還我明如此三四過与之眼即明也曾試有驗
治人馬白膜漫睛方
右以鵝翎截之近里睛及當白睛嗽之膜自聚鈎針鈎挽之
割去即見物以綿當眼上著以綿繫著三斷三日差

靜嘉堂文庫所藏

治目茫茫方
右青羊脂内銅器中煮以麵餅覆上七鑽两孔如人眼以目向下熏目不過再熏之即差
治目生珠管方
滑石 王瓜甲燒 龍骨 貝齒 丹砂各等分
右末以新筆點取當珠管上日三度又良
治目中生膚翳稍滿閉童子及生珠管方
取貝齒一枚燒之分 真丹等分
和以内翳上日三度又甚良
治熱病後生翳方
豉二七枚燒末 内管中以吹目中
治目中眯不出方
以蠶砂一粒吞之即出
又方
貝子拾枚 真珠壹兩
右以絹下之取如小豆著眯上日三亦治翳
治眼風腫除熱柔眼方
礬石燒令汁盡以棗膏和如彈丸以摩眼上下白食三丸頃止
治稻麥芒入目中方
取生蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布摩之芒出著布良
治砂石草木入目中不出方
以鷄肝注之 又書中白魚和乳汁注目中
治目中眯方
旦起對門户跪拜云户門狹小不足宿客乃便差
治目為物所傷觸青黑方
炙羊肉令熱熨勿令至熱猪肝亦得
治目中痛不得睡方
煎炙熱布熨并蒸大豆袋盛之枕一夜止常令熱
治眼暗灸之方
灸大椎下數節第十當脊中安灸二百壯唯多為佳至驗不在方藥也

靜嘉堂文庫所藏

治肝勞和一米眼小灸天窓百壯兩邊各在眼小眥近後在耳前
主三陽三陰之會百處以手按之手下橫脉是與耳門相對是
也又第九椎名肝俞主腰內兩脇下眼滿食不消喉痺目眩看
頭痛胃急嘔吐當椎灸五十壯老小以意斟酌之灸二百壯
主目不明神驗
治眼急痛不可遠視方
灸當重子上入髮際一寸隨年壯
治風腎方
患右員灸左手中指本節頭胃上五壯如小麥大左手亦如之
治風痺赤痛方　灸人中近鼻二壯仰目灸之
治目卒生翳方　灸大指節橫文三並在左灸右在右灸左
治筋極第四
夫六極者天氣通於肺也而地氣應於肝宿氣動於心穀氣成
於脾雨氣潤於腎經為川腸胃為海九竅為水注之氣所以養

注於五藏五藏和傷六府生極故曰五藏六極也九曰筋極者主
肝也謹筋節与肝合肝有病從筋生又曰以春遇疾者為筋痺之不
已復感於邪內舍於肝陽氣入於內陰氣出於外若山風之虛則
筋虛筋虛則喜悲色青蒼白見於眼下若傷寒則筋不能動十
指爪皆痛數好轉筋其源必春甲乙日傷風在筋為肝虛風也
若陽氣內發發則實之則筋實其實則怒口乾傷熱則咳咳
則腸下痛不能轉側又脚下滿痛故曰肝實風也然則因其輕而
瀉之因其重而減之因其衰而補之審其陰陽以別虛實陽病治
陰之病治陽善治病者在皮毛肌膚筋脉而持之次治六府若
至五藏則半死半生痛鵲云筋絕不治九日死何以知之手足爪
甲青黑呼罵口不息筋應足厥陰厥陰氣絕則筋弛厥陰是
肝脉也與筋合聚於陰氣而脉絡於舌本脉不榮則筋急筋急
則引卵縮并脊青舌卷卵縮則筋先死矣其日庚篤辛死金勝
木醫之拱手也

靜嘉堂文庫所藏

治筋實極則筋應肝欬々則兩脇下縮痛々甚則不可轉動
通氣湯方
橘皮四兩 白朮 石膏各五兩 細辛 當歸
桂心 茯苓各三兩 豉一升綿裹
右以水九升煮取三升分三服
治筋實極則兩脚下滿々而痛不得遠行脚心如割筋斷
折痛不可忍者煮散方
丹參拾貳分 芎藭 杜仲 續斷 地骨皮各捌分
牡蠣拾分 當歸 乾地黃 麥門冬 升麻
禹餘糧 麻黃各七分 牛膝拾分 甘草三分 生薑屑八分炒乾
桂心伍分 通草柒分
右十下篩為散々二匕井花水二升煮取一升頓服日二煮之散以
絹裹之煮時動裹子
治筋實極手足爪甲或青黃黑烏黯四肢筋急煩滿地黃煎方
地黃汁參升 生葛汁 生玄參汁各壹升 大黃 升麻各貳兩
梔子 麻黃 犀角各參兩 石膏 芍藥四兩
右以水七升煮七味取二升去滓下地黃汁兩沸次下葛汁等
煎取二升分三服
灸第二十二椎隨年壯主腰背不便轉筋急痺筋攣
治筋虛極痺好悲思顏色蒼々四肢噓吸脚手拘攣動申縮
急腹中痛方
五加皮壹斤 枳刺 大麻 猪椒皮 丹參各捌兩
桂心 當歸 甘草各參兩 天雄炮 秦椒
白鮮皮 通草各四兩 乾薑伍兩 薏苡人壹升
右切以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七日初服六
七合稍々加以知為度
治虛極則筋不能轉十指爪皆痛數轉筋或交接過度或病
未復交接傷氣內筋弛舌卷脣青引卵縮脛脉疼急腹中絞

靜嘉堂文庫所藏

痛或便或絶不能飲食人參酒方
人參　防風　茯苓　細辛　秦椒汗
黄耆　當歸　牛膝　桔梗各六分　乾地黄
丹參　署預　鍾乳　礬石各拾貳分　山茱萸
芎藭各捌分　麻黄拾貳分　棗叁拾枚去皮核　五茄皮壹升　生薑切炒乾
烏麻碎各貳升　白朮拾分
右切㕮咀鍾乳別小袋子盛以清酒二斗半浸五宿温服二合
日再无所間隨意增進
治虚勞瘦痺方
灸陽蹻下容爪百壯主勞冷氣逆腰髖冷痺脚屈申難
治交接損失精筋攣燒婦人月經衣灰服方寸匕
治轉筋十指筋攣急不得申別法灸脚踝骨上七壯中封在内
踝前筋裏宛宛中主治失精筋攣陰縮入腹相引痛下滿灸
五十壯兩脚一百壯

又云此二穴亦主治喉痺歎并五藏所苦鼓脹並悉主之老
人增二七已下至小兒隨年壯灸也
治轉筋脛骨痛不可忍
灸屈膝下廉横筋上三壯
治轉筋灸涌泉在脚心當拇指下大筋是灸七壯
又灸太都在脚大拇指本節内側白肉際灸七壯
又腹脹轉筋灸臍上一寸二七壯
治筋絶方
以蟹腦足髓熬内瘡中筋即續
治腰脚不隨兩脚攣方
椒九升以水四斗煮取二斗半甕盛下著火暖之懸板為
橋去湯二寸以脚蹋板柱却坐以綿絮密塞勿令泄氣若疲
即出入便以粉摩之一食久更入甕常令甕下火不絶勿
使湯冷如此消息不過七日得申展並腫亦減也
治卒腰痛積冷及婦人血瘕等方第五

靜嘉堂文庫所藏

病有積有聚何以別之答曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沈而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五藏所生聚者六府所成故積者其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也故元根本上下元所留止其痛元常處謂之聚故以是別之

治心腹積聚寒疝痛不下食及腹中滿堅痛有積寒氣入腹中冷發甚則上搶心氣並滿食飲喜嘔方

大黃　茯苓各六分　吳茱萸　桂心　黃芩
細辛　人參　蜀椒　乾薑各五分　牡丹
甘草　芎藭　苦參　䗪蟲各三分　芍藥
防葵　蝱蟲　厚朴　半夏各四分　男髮灰二分

右以蜜丸如梧子五丸日再稍加之酒服

治食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方

狗屎五升燒末綿裹之以酒一斗浸再宿分十服日再已後日再三服三日使盡隨所食癥結即便出矣神妙

治人吞蟲在腹生長乃蟲癥南人及山野人多有此

故敗扺梳壹枚　故敗梳壹枚

各破為兩分各取一分燒為末又取一分以水一五升以服前燒末頓服斯須出矣

治髮癥方

凡患髮癥者惟欲飲油也日之由乃至三二升不欲飲食以此為病候油一升以香澤煎之大鋤勢對安病人頭邊令口鼻臨油上勿令得飲之及塗鼻面並令有香氣當渴取飲不得與飲乃疲倦張口髮癥當從口出飲油入寸覘之并捉石灰一裹令見癥出以灰拌以手捉癥抽出須臾抽盡即是癥髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦之

治食中得病為鼈癥在心下堅強方

靜嘉堂文庫所藏

猪矢一升炒令黃色以酒一升浸取半去滓末以所浸酒服
方寸匕日二三日中作一劑
治卒暴癥腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不治百日必死方
牛膝貳斤
㕮咀以酒一斗浸之密塞器口煎取半服半升須臾吐去宿食神方
治卒暴癥方
取商陸根擣碎蒸之以新布藉腹上以熱熨上以衣
物覆其上冷復易之數日用之旦至暮勿息
治小腹堅大如盤胸滿食不消婦人瘕痛及三焦俞刺入二寸
第十三椎
又方　溫水服髮灰一方寸匕日再服
又方　飲服上好麴末方寸匕日三差
凡百病積聚七日收莨菪子一斗煮過熟取滓曝令乾擣篩
蜜丸和酒服如梧子七丸以知為度其汁煎飴服之

治伏梁氣方　白馬尿銅器承取平旦服之
治癥瘕方　灸內踝後宛宛中隨年壯　又氣海百壯
又方　槲樹白皮煎令可丸服之取知病動若下減之
治患癥結及瓜病似瓜形日月形或在臍左右或在臍上下出
若鱉龍病在左右脅下或當心上如合子大便有手腳治之法先
針其足對灸之取一新盆子受一斗盆底鑽二十孔孔上著椒
三合上著一重紙紙上著冷灰一升上著熱灰半升上著剛炭火
一斤半經久盆底熱徹當病上初安氈一重即安火盆火熱以
漸加一重若看火熱不可忍三重氈先食一口冷飲還上火消三分
許即停經三日勿著又經七日決得頓差然後食美食自補若
小差作露宿丸服之在補卷中
神明度世丸治久患腹內積大小便不通氣上搶心腹中脹滿
逆害飲食服之甚良方

靜嘉堂文庫所藏

大黄　芍藥各貳两

右蜜丸服如梧子四丸日三不知可加至六七丸以知為度

土瓜丸治諸藏寒氣積聚煩滿熱飲食中蠱毒在食生物及水中卵生入腹而成蟲蛇若為魚鼈留飲食婦人產瘕帶下百病陰陽不通利大小便不節絶傷墮落寒熱交結唇口焦黒身消瘦嗜臥少食多厭產乳胞中瘕服寒熱少腹中結痛引陰中方

大黄壹斤蒸貳斗米下曝乾　土瓜根末　桔梗末各半斤　杏仁壹升熬

右蜜丸如梧子食後服三丸日三不知加之以知為度酒服

常山丸治脇下邪氣積聚往来寒熱如瘧方

常山　蜀漆　白薇　桂心　鱣魚甲炙　白朮

附子　鼈甲炙　䗪蟲熬　貝齒各六分　蜚蝱壹分熬

右蜜丸如梧子以米汁服五丸日三服

又方　蒸鼠壤土熨之冷即易腹中切痛炒鹽一半升令焦内

湯中飲之大吐差若手足痛者燒青布内小口器中薰痛處

治鼈瘕腹堅硬腫起大如盆眠臥不得方

取藍一斤擣水三升服一升後服治瘕丸必消

又　槲根皮一握研取汁以水和頓服之

又　白馬尿一升雞子三枚取白合煎取二合空腹頓服之

治米瘕常欲食米方

雞屎一升　白米五合

合炒令米焦擣末水二升頓服之須臾吐出病源及發不當出更發

治蛟龍病開皇六年有人二月八日食芹得之其人病發似癲而面青黄服寒食餳三升吐出蛟龍有兩頭及尾大驗

大黄丸治婦人帶下百病無子服藥十四日下血二十日下長蟲及清黄汁出三十日病除五十日肥白方

大黄壹斤破如豆粒熬令黑色　柴胡壹斤炙　朴消壹斤熬　芎藭五两

乾薑切　蜀椒壹升各　茯苓如雞子大

靜嘉堂文庫所藏

先食服如梧子七丸米飲服之加至十丸日一九癥下

治十二癥瘕及婦人帶下絕產無子并服寒食藥可太一丸下之不下水穀但下病耳不令人困方

消石六兩熬令沸 大黃八兩 人參二兩 甘草三兩炙

並擣下篩以三年苦酒三升置銅器中以箸柱器中一升作一刻凡三刻以置火上先內大黃使微沸盡一刻乃內餘藥盡一刻有餘極微火使可丸如雞子中黃欲服藥當先齋戒一宿勿令小兒女人奴婢等見之欲服者二丸若不能大丸者可分作小丸子不過四丸也能一不分大丸若人羸者可小食若不羸者不須小食二日乃下若婦人服之下者或如雞肝或如米汁正黑赤或一升或三升下後慎風冷作一杯粥食之然後作羹臛自養如產婦之法六月則有子禁生魚豬肉辛菜若冷食等且服之

治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶心欲嘔不可多食懈怠不能動方

大黃 芍藥 葶藶熬令黃各一兩 土瓜根 椒汗

黃芩 白术 乾薑 地骨皮 芎藭各一

桂心 乾漆熬各一兩半

右十味蜜丸服如梧子十丸日三不知加之飲服

治婦人瘕結堅脇下痛乾薑丸方

乾薑 蜀椒汗 朴消 䗪蟲熬 杏仁熬

蠐螬熬 桃仁去皮尖熬 虻蟲去翅足熬各一合 芎藭 芍藥

當歸二兩 前胡 乾地黃 茯苓各一兩 人參三兩

右蜜丸以米飲服如梧子三丸加至十丸未食服之

治婦人若寒食氣胃滿吐逆氣六合氣其病頭氣結痛小便赤黃頭重方

烏頭炮 黃芩 巴豆去心皮各二分 半夏洗各四兩 大黃八兩

戎鹽六分 䗪蟲熬 桂心 苦參各十二分 人參 消石熬令沸各四分

蜜和生膝三升和擣三万杵如梧子宿不食酒服五丸安卧須臾

靜嘉堂文庫所藏

當下下黃者小腸積也赤者疝也白者肉風也如水者留飲也青
如粥汁膈上邪氣也血如腐肉者傷也赤如血者虛冷疾也如
蟲刺者蟲也下已必渴渴者飲以糜粥飢食以酥糜三日後當溫服食
必肥濃三十日平復

治男子五勞七傷女子血瘕心腹積聚乳餘疾絕產小腹堅滿貫臍中
熱腰背痛小便不利大便難不下食若伏蟲臚脹癰疽腫久寒
熱胃管有邪氣方

半夏五分洗　石膏　藜蘆　牡蒙　蓯蓉各三分
桂心　乾薑各四　烏喙二分炮　巴豆六十枚去心皮熬

研巴豆如膏合諸藥更令調和擣甚熟服如小豆二丸日三
服酒服

治婦人石瘕瘕下結堅腹大如姙娠月經不通發往來下利羸
瘦此為血氣瘕也生肉癥不可治未生肉可治方

生地黃三十斤取汁　乾漆一斤熬令煙斷

右二味合和微火煎令可丸繼成服梧子三丸食後服佳飲下之

治癖堅塞在人胸脇或在心腹大五明丸方

狼毒炙　乾地黃各四兩熬　附子炮　大黃　蓯蓉
厚朴　木防己　半夏各二兩　乾薑　桂心各六分
細辛　五味子　椒汗　藺茹熬令煙盡一兩
莽草　當歸　旋覆花各三分　巴豆二十枚去心皮熬　杏仁三十枚熬

右蜜和服如梧子二丸日二夜一以知為度酒服

小狼丸治病與前同方

狼毒　旋覆花各二兩　附子　半夏　白附子　藺茹各二兩

右蜜和擣五千杵服如梧子三丸加至十丸日三酒服

治堅癖狼毒丸方

半夏　杏仁熬各三兩　狼毒五兩　桂心四兩　附子炮
椒汗　細辛各一兩

右以各別擣杏仁蜜和服如豆大二丸酒服

靜嘉堂文庫所藏

太一神明陷冰丸治諸疾破積聚心下支滿寒熱鬼注長病欬
逆[redacted]噎辟除衆惡殺鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胷中惡氣結
氣咽中閉塞有進退繞臍惻惻隨上下按之挑手心慍慍如有
蟲狀毒注相染滅門方

雄黃油煮一日 丹砂 礜石燒二日 當歸 大黃各貳兩
巴豆壹兩 元青參拾枚 桂心參兩 真珠 附子炮壹兩半
蜈蚣壹枚炙 烏頭捌枚炮 杏仁肆拾枚熬 蜥蜴壹枚炙 斑猫七枚炙
樗雞七枚 地膽七枚熬 犀角 鬼臼 射罔
藜蘆各壹兩 麝香 牛黃 人參各壹兩

右為丸擣三萬杵丸如小豆飲服二丸日二不知加之以藥二
丸安門戶上令衆惡不近傷寒服之無不即差若至病家及
視病人夜行獨服二丸不近邪氣

治癥堅水腫蜚尸遁尸寒尸注尸骨血相注惡鬼忤毒邪氣往來
夢忤存亡留飲結積虎狼所嚙猘犬所咋鴆毒入人五藏服藥

巴消殺其毒食不消婦人邪鬼忤之亦能遣之蜥蜴丸方

蜥蜴貳枚 蜈蚣貳枚炙 地膽伍拾枚熬 䗪蟲參拾枚炙 杏仁參拾枚熬
蜣蜋拾肆枚炙 虻蟲參拾枚熬 朴消參分 澤漆 桃奴
犀角 鬼督郵 桑赤雞各貳分 芍藥 虎骨各陸分
甘草壹兩炙 巴豆柒分 款冬參分 甘遂伍分 乾薑肆分

右治巴豆杏仁如膏內藥末研調和蜜擣二千杵丸如麻子
食後及未食服三丸日一不知加之不敢吐下者一丸日一有人
風冷注癖堅二十年者得差酒服

治暴癥野葛膏方

當歸 附子炮 雄黃油煮一日 細辛各壹兩 烏頭貳兩炮
野葛壹尺 巴豆壹百枚熬去心皮 椒半升

右以大醋浸一宿豬膏二斤煎附子黃去滓內雄黃粉攪至凝
傅布上以摶癥上復以油重帛上重帛上復安十重紙以熨斗
火著上常令熱日三夜一亦須膏乾益良

靜嘉堂文庫所藏

治胃中心下結積食飲不消陷胃湯方

大黃　括蔞　黃連酢煮　甘遂壹兩

右以水五升煮取二升分三服

治暴堅久吝腹有堅甘遂湯方

甘遂　黃芩　芒消　桂心　細辛酢壹　大黃參兩

右雄擣水八升煮取二升半分三服

治五種飲二云飲水淡在心下二云辟飲飲水辟在兩脇下三云淡水在胃中四云溢飲飲水在膈上五藏間五云流水飲在動搖有声夫五藏飲者由飲酒後傷寒飲冷水過多之所致大五飲九方

遠志　芒硝參　烏賊骨　藜蘆　白朮

甘遂　五味子　大黃　石膏　括樓

半夏　紫苑　前胡　芒消　括蔞

桔心　蒜蓉　貝母　芫花　當歸

靜嘉堂文庫所藏

人參　茯苓　芍藥　大戟　苣蘆

黃芩酢壹　常山　甘草　薯預　石膏

細辛　附子炮各參分　巴豆參拾枚熬去心皮

右蜜和丸如大豆服三丸日三稍稍加之酒服

三云治五藏寒熱積聚臚脹大腹鳴而噫食不生肌膚苣蘆者嘔逆若傷寒瘧已愈今不復發食後五丸飲多者吞十丸當服令人大便調和長肌肉方

大黃參　前胡酢煮貳　孰消石　苣蘆熬　杏仁熬各

芎藭參　附子炮　細辛　半夏洗各壹兩　茯苓半兩

右擣五味蜜丸如梧子五丸稍加至十九以知為度酒服

治腹中積聚癥瘕方

苣蘆子一升熬酒五升浸七日服三合

治蛇癥方

白馬毛切長五分以酒服方寸匕大者自出更服二分方

寸匕中者出更服三分方寸匕小者出不可頓作一服殺人

治蛇癥大黄湯方

大黄 茯苓各半兩 烏賊骨二枚 皂莢六枚 甘草如指大 芒消如雞子一枚

右水六升煑三沸去滓内消羮温盡服之十日復一煑依前法

服之一宿莫食平旦服當下病根也

治肉癥思肉不已食訖後思空腹飲白馬尿三升吐肉出肉不出必死

治髪癥酒三升煑猪脂二升三沸一服一升日二白馬尿服之亦佳

無馬尿白牛亦得

治卒食不消欲成癥積方煎計如飴取半升一服之便利吐去

宿食神方

凡所食不消取其餘類燒作末服方寸匕便吐又有食挑作病者

特以挑復無挑就樹間得槁挑燒服之當吐病出甚良

治卒暴癥方

取五月五日亡上蒜十片去皮桂一尺二寸竈中黄土如雞子大

大一枚三味合舂淳苦酒和合之塗布上以掩病處不過三

治熱中食飯癖實不消心腹堅痛者方

右以水三升煑白鹽一升令消分三服利吐去食也并治暴癥

治癥堅心下大如杯食則腹滿心腹絞痛方

葶藶熬二分 大黄二兩 澤漆四兩

右以二味末葶藶熬為膏下二味擣五百杵入蜜更擣千杵服

如梧子五丸不知加之酒服

治男子百病虚羸吸冷宿寒久癖積聚或嘔逆不可并

風濕二三病悉治之

鍾乳練 紫石 流黄 赤石脂 礬石 枳實

甘草炙 白术 紫菀 山茱萸 防風 白薇

桔梗 天雄炮 皂莢炙 細辛 茯苓 人參

附子炮 藁本 乾薑 吴茱萸 蜀椒汗 桂心

麥門冬去心各二分 烏頭炮 遠志 茯苓各陸分

靜嘉堂文庫所藏

當歸一兩 䗪蟲卌枚 乾漆一兩熬各分

右蜜和擣五千杵酒服如梧子十九日三稍加之

治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來厥逆搶心心痛痺悶吐

下不止婦人産後羸瘦方

烏頭拾伍枚 吳茱萸 蜀椒 乾薑 桂心各二兩 前胡

細辛 人參 芎藭 白朮各五 皂莢各 紫菀

白薇 芍藥各三 乾地黃 四分

右末之蜜丸酒下如梧子十九日三稍稍加之以知為度

孫真人千金方卷第十一

歸安陸樹聲叔桐父印

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


134
24
4 9

靜嘉堂文庫所藏

孫眞人千金方卷第十二

膽府脉論第一　膽虛實第二　咽門論第三
髓虛實第四　風虛雜方第五　治吐血方第六
治萬病諸方第七

膽府脉論第一

膽者主肝也若目下果大膽乃横膽在肝短葉之間肝所以合氣於膽膽者膽府為中清之府也號將軍決曹吏能怒能喜能剛能柔貯和精二合重三兩三銖肝應膽膽應爪爪色黄則膽厚爪色紅則膽薄爪色青堅則膽急爪色赤軟大者膽緩爪直色白無約者膽直爪色多敗膽結也又云肝前受病移於膽肝欬不已則便嘔吐膽汁也（大腑此說恐此未知藏府之腑受凡嘔與賁胃象）凡膽腦髓骨脉女子胞此六者主地氣也藏於陰而象於地故藏而不瀉名曰奇恒之府也若胃大小腸三焦膀胱也此五者天氣所生其氣象天此受五藏之濁名曰受貯之府瀉而不藏五藏滿而不實六府實而不滿

靜嘉堂文庫所藏

固精神而不寫　扁鵲云膽有病則眉為之傾與足厥陰少陽為
表裏表清裏濁其病若實極則傷熱熱則驚神動精神而不守
臥起不定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩不能獨臥發於玄水其根
在膽先從頭面起腫至足在治水篇中　膽病者善太息口苦嘔
宿汁心中澹澹恐人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本
末亦見其脉之陷下者灸之寒則取陽陵泉善嘔有苦汁長太
息邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔膽取之三里在下
胃逆刺少陽血絡以閉膽却調虛實以去其邪也　膽脹者脇下
痛脹口苦太息厥氣客於膽則夢鬪訟

膽虛實第二

左手關上陽虛者無膽脉也口中味苦文恐畏如見鬼驚少力當
刺足厥陰在足大指間或刺三毛之間左手關上陽實者膽實也
若腹中不安身體習習刺足少陽在足上第二指本節左手關上
脉陽虛者若腹中氣滿飲食不下咽乾頭痛洒洒惡寒脇痛

半身習習氣喘噦逆

治膽府實熱精不守瀉熱方

生地黃五兩　酸棗五兩　黃芩一兩　遠志二兩
茯苓二兩　半夏三兩　宿薑三兩　秫米一升

右以長流水五斗煑秫米令蟹目沸揚之三千徧澄清取九升
煑藥取二升半分三服

俠膽俞旁行相去五寸名濁浴主胸中膽病灸隨年壯　膽虛灸足
內踝上一手夫名三陰交二十壯兩脚皆灸左手關上脉陽虛者
苦目厥痿足指不搖躄坐不能僵仆目黃失精䀮䀮

咽門論第三

夫咽門者應五藏六府往還神氣陰陽通塞之道也喉嚨包囊舌
者前熟津液調五味之氣本也不可研乎咽門者肝膽之候也其重
十兩廣二寸五分至胃管長一尺六寸主通五藏六府津液神氣
應十二時若藏熱咽門則閉血氣生寒若府寒咽門則破而聲嘶

靜嘉堂文庫所藏

母薑酒主之方在第六卷中熱則通之寒則補之若寒熱調和病一不生矣

髓虛實第四

髓虛者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虛實之應主于肝膽若其府有病從髓生熱則應藏寒則應府

治髓虛腦痛不安膽府中寒補髓丸方

羌活 芎藭 當歸各叁兩 桂心貳兩 人參肆兩

棗肉研如脂 牛髓 蘇 酪各壹升 羊髓貳升 大麻人貳升熬研如脂

右五味末下棗膏麻人又擣相為一家下二髓內銅鉢中湯中煎之取好為丸丸如梧子酒服三十丸日二服稍加至四十丸

治髓實勇悍驚熱主肝熱方

柴胡 升麻 黃芩 細辛 枳實

梔子人 芒消各叁兩 淡竹葉切壹升 生地黃切壹升 澤瀉肆兩

右以水九升煮取三升去滓下消分三服

風虛雜補酒方第五

治虛羸陽道不舉五勞七傷百病能食下氣酒方

巴戟天 牛膝 枸杞皮 生麥門冬 地黃 防風各貳兩

右並生用如無生者用乾者亦得細切以酒一石四斗浸七日去滓溫服常令酒氣相及勿至醉吐慎生冷猪油蒜春七日秋冬二七日夏勿服先患冷者加乾薑桂心各一斤好忘加遠志一斤大虛勞加五味子蓯蓉各一斤陰下濕加五茄根皮一斤加石斛一斤佳每加一斤藥則加酒七升此酒每年入九月中旬即合入十月上旬即服設餘藥以此酒下之大大要妙滓曝乾末以此酒服方寸匕日三益佳常加甘草十兩佳虛勞加

又方

巴戟天參斤 生牛膝參斤

黃耆一斤

右切以酒五斗浸之服一升並如前法

治虛勞不足五茄酒方

靜嘉堂文庫所藏

五茄　枸杞各細切壹斗

右水一石一五斗煑取汁七斗分取四斗浸麴一斗餘三斗用拌飯下米多少如常合酒法熟壓取服之多少任性禁如藥法倍日將息

治羸瘦羊膏煎方

不中水猪肪煎取一升內葱白煎令黃出內盆中看如人飢平旦空腹服訖覆臥晡時食白粥粥不得稀過三日服

補藥方

羊肝壹具　羊脊膂肉壹條　麴末半斤　枸杞根拾斤

右以水三大斗三升煑枸杞取一斗去滓細切肝等內汁中著葱豉塩著如羹法合煎看如稠糖即好食之七日禁如藥法

夏姬杏人方

杏人三斗內湯中去皮尖熟擣盆中水研取七八升汁以鐵釜置塘火上取羊脂四斤摩釜消之內杏人汁溫之四五日

色如金狀餌如彈丸日三肥白易容人不識

治欬嗽方

杏人熬黃去皮尖擣丸如梧子歛服五丸日三令人潤澤無所禁咳逆上氣喉中百病心下煩不得咽者得茯苓款冬紫菀併力大良

主陰熱喉中如息肉者亦服猪肚方

猪肚壹具　人參伍兩　椒壹兩　乾薑貳兩　葱白柒兩　粳米半升

右下篩諸藥相得內肚中縫合勿洩氣取四升水緩火煑爛空腹服之大佳

治五勞七傷羸瘦乾消小煎方

蜜貳升　猪脂壹斤　胡麻油半升　乾地黃末壹升

右以銅器中煎可為丸服三丸如梧子日三稍加至十丸久宜服當有大益黑者肥充酒服

治虛冷枯瘦身無精光虛勞損諸不足陸沉膏方

靜嘉堂文庫所藏

牛髓 羊脂各壹升 白蜜 生薑汁 酥各三
右先煎酥令熟次內薑汁內蜜次內羊脂牛髓後微火煎之三
上三下令薑汁水氣盡即膏成冬凝溫酒服之隨人能否不限
多少大良
治男子風虛勞損兼腎氣方
甘草壹尺 石斛 茯苓 人參 署預略肆 桂心 牛膝
巴戟天 芎藭 各叁兩並為末 五味子 菟絲子
冊參物 生地骨皮切壹升 胡麻叁升以水貳斗
牛髓叁升 生地黃汁壹升 白蜜貳升 生麥門冬汁叁升
右先煎地黃汁地骨皮汁減半內牛髓薑汁貳 白蜜貳升 生麥門冬汁叁升
前餘八升下諸藥散和令調內銅鉢中湯上煎令可丸酒服三
十丸如梧子日二加至五十丸
治一切虛羸皆悉服之方

鹿骨壹具 拘杞根切壹升
右二味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清乃合一器共
煎取五升日二服盡好將慎用大升
治內勞少氣寒疝腰急腹中痛逆腰脊痛除百病萬金骨髓煎
生地黃搗百壹拾介 甘草 阿膠
麥門冬 乾地黃搗壹 石斛壹斤 茯苓
酒肆升 麻子人參升東 拾枝 牛膝參介 白蜜拾介
蜀椒肆兩 桔梗 五味子 桂心略銖 人參伍兩
茯苓 當歸兩拾肆 乾漆壹拾兩
右先以酒二斗六升內桑白皮麻子人棗膠為刻識又以加酒
一斗四升煮取至刻絞去滓內蜜髓地黃汁湯上銅器煎內諸
藥半日許使可丸止大獲盛飲吞如彈九一枚日三若夏月暑
熱煮轉味者可以蜜地黃汁和諸藥成末為丸如梧子服十五
丸不知稍加至三十丸

靜嘉堂文庫所藏

天門冬大煎治男子五勞七傷八風十二痺傷中六極氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛肺極則寒痺腰痛心下堅有積聚小便不利手足不仁脉極則顏色苦青逆喜悅恍惚失氣狀似悲泣之後苦舌強咽喉乾寒熱惡風不可動不嗜食苦眩喜怒妄言筋極則拘攣少腹堅脹心痛膝冷四肢骨疼骨極則厥逆黃疸消渴癰疽妄發重病浮腫如水病狀肉極則發瘡[illegible]攣不復言甚者至死復生死不能治此皆六極七傷所致非獨房室之為也憂恚積思喜怒悲懽復隨風濕結氣欬時嘔吐食以變大小便不利時泄利重下溺血上氣吐下乍寒乍熱臥不安席小便赤黃時惡夢夢與死人共食飲入冢神室魂飛魄散喜極思則傷肝傷肝則腰背相引難可俛仰筋氣極則肺傷肺傷則小便有血目不明髓氣極則陰痿不起住而不卒骨氣極則腎傷腎傷則短氣不可久立陰疼惡寒甚者卵縮陰下生瘡濕癢搔之不欲住汁出此皆為腎病甚者多遭風毒四肢頑痺手足浮腫名曰腳弱一名腳氣醫所不治此悉主之方

天門冬（切參升半去心搗壓取汁盡） 枸杞根（切參升半淨洗以水貳石伍斗煮取壹斗參升澄清）

酥（煉參升） 生地黃（切參斗半搗取汁盡） 獐骨（壹具碎以水壹石煮取伍斗澄清） 白蜜（煉參升）

右並大斗鐵器中微火先煎地黃門冬汁減半乃合煎取大斗二斗下後散藥煎取一斗內銅器重釜煎令隱掌可丸下空心酒服如桐子二十丸日二加至五十丸慎生冷等擇四時王相日合之其合和一如第一卷合和篇說散方

茯苓	栢子人	桂心	白朮	萎蕤
菖蒲	遠志	澤瀉	署預	人參
石斛	牛膝	杜仲	細辛	蔓荊子
獨活	枳殼	芎藭	黃耆	蓯蓉
續斷	苟脊	萆薢	白芷	巴戟（各貳）
五加皮	覆盆子	橘皮	胡麻	大豆卷
茯神	石南（各壹）	甘草（陸兩）	椒	薏苡人（各一升）

靜嘉堂文庫所藏

阿膠炙 棗壹百枚 黄作膏

鹿角膠伍兩

右㕮咀末內前中有牛髓鹿髓各加三升大佳小便澁去柏子火加秦膠二兩乾地黄六兩陰痿失精去蒸熬加五味子二兩頭風去栢子人加菊花防風各二兩小便利陰氣弱去細辛防風加牛膝二兩腹中冷去防風加乾薑二兩無他疾依方合之凡此煎九月下旬採藥亦可日合而服之至五月上旬止若十二月臘日合若經夏至七月下旬即得服之若停經夏不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥沙中上加沙覆之則經夏不損也女人先患熱者服患冷者勿服

治吐血方第六

治藏熱結吐血衄血方

伏龍肝半斤細末 生竹茹壹升

黄芩 芍藥 當歸

甘草炙各 生地黄壹斤

右水一斗三升先煮竹茹減三升下藥取三升分三服

治凡是吐血方

服桂心末方寸匕日夜可二十服又治下血

棗立云吐血有三種有內衄有腸胃有傷胃內衄者當鼻出是近從心肺間津液出還流入胃中或如豆汁或如切蔥血疑停胃中滿悶便吐或去數升至于一斗者內衄者得之於勞倦飲食過常所為也腸胃者或飲酒之後胃中冷則不能消化不一合半升一升傷胃者因飲食大飽之後悶吐之時血從吐後出或能消化便煩悶強嘔吐之所食之物與氣共上衝蹙因傷裂胃口吐色鮮正赤腹絞痛一日汗出其脉緊帝數者為難治之凡吐血之後體中但言悗悗極心中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黄土湯阿膠散益加悶亂卒至不濟如此悶者當急吐之

瓜蒂貳枚 杜衡 人參各壹分

右末以水漿無時服一錢匕得下而已羸人小減之吐去青黄

靜嘉堂文庫所藏

或吐血一二升無苦

生地黃湯治憂恚嘔血煩滿少氣胸中痛方

生地黃汁貳　東棗拾枚　阿膠　甘草酪參

右以水一斗煮取四升分四服日三夜一

堅中湯治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血方

糖飴　芍藥

甘草酪貳　東棗拾枚　桂心酥　半夏　生薑

右水二斗煮取七升分七服日五夜二

治抑心吐血方

石膏酥參兩　厚朴酥參兩　麻黃　生薑

半夏　五味子　杏仁酪貳　小麥糙升

右以水一斗煮麻黃取七升內藥煮取二升半分二

黃土湯治吐血方

伏龍肝雞子大貳枚　桂心　乾薑　當歸

芍藥　白芷　甘草　阿膠酪貳

芳窮酒　細辛酥兩　生地黃搗兩　吳茱萸貳

右以酒七升水三升合煮取三升半去滓內膠煮取三升分三

服亦治吐血　又方

當歸　黃芩　乾薑　芍藥　阿膠酪貳

右水六升煮取二升分三服

治卒吐血及衄血方

甘草　白木　何膠　乾薑　黃芩酪參　伏龍肝酥

右以水一斗煮取三升去滓下膠令三服

治傷中裏急胸脇攣痛欲嘔血時寒時熱小便赤黃此於房

勞也方

澤蘭　糖飴壹　桂心　人參酪參　遠志貳兩

生薑酒　麻人糖　桑白皮炙　醇酒壹斗伍升

右以酒一斗煮取七升去滓下糖末食服一升日三

靜嘉堂文庫所藏

勞倦

治虛勞胷腹煩滿疼痛瘀血往來藏虛不受穀氣逆不得食中理血方

當歸 甘草 麥門冬 黃芩各貳兩 乾地黃參兩

厚朴炙 乾漆 乾薑 枳殼 防風

大黃 細辛 白朮各壹兩 茯苓伍兩 前胡陸分

人參伍分 䗪蟲 䖟蟲各拾伍枚

右蜜丸先食服如梧子十丸日三加之

治吐血汁大小便出血方

淡竹茹貳升 當歸 黃芩 甘草

芎藭各陸分 白朮 桂心 人參 芍藥各壹兩

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一

治癧勞傷寒熱欬逆吐血止血湯方

飴參斤 芍藥 甘草 半夏各參兩 桂心

生薑各貳兩 大棗拾枚

右水三升煮取一升先食服五合日三夜一服補虛良

治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲死方

艾葉壹升 阿膠如掌大 乾薑壹兩

右水三升煮取一升去滓內馬通汁絞之半升合煎取一升適寒溫頓服愈此方神効

又方

艾葉壹升 阿膠如掌大炙 竹茹壹升 乾薑貳兩

右水三升煮取一升去滓內馬通汁半升煮取一升頓服之取

新馬屎與少水和絞取汁服

治虛勞吐血方

灸胃管三百壯亦主勞嘔逆吐血少食多飽多唾百病

又方

生地黃五斤擣取汁微火煎之三沸投蜜一升又煎取三升

服半升日三主胷痛百病久服佳

靜嘉堂文庫所藏

治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絶面黒如漆方

黄耆　芍藥　芎藭　甘草各肆兩　生薑[illegible]

右酒五升浸一宿明旦更以水五升煮取四升分四服日三夜一陰中毒如湯沃雪也凡夏月不得宿浸藥酒客勞熱發痔下血穀道熱者去生薑用生地黄代之凡須三五劑得氣力

治吐血大小便下血方

竹茹[illegible]　甘草　芎藭　黄芩　當歸各陸分

芍藥　白朮　人參　桂心各壹兩

右水一斗煮取三升分四服

治吐血蠱毒痔血女子腰腹痛大便後出血者

取東向蘘荷根擣取汁頓服之立差

治吐血胷中寒痛方

芍藥　乾薑　茯苓　桂心　當歸　大黄

芒消　阿膠　甘草　人參各參兩　麻黄貳兩

地黄[illegible]　虻蟲　水蛭各捌拾枚　棗貳拾枚　桃人佰枚

右以水一斗七升煮四升分四服日三夜一

治血內崩上氣面色如土方

乾薑　阿膠　柏葉各貳兩　艾壹把

右以水二升煮取一升去滓內馬通汁一升煮取一升頓服

治吐血酒客温疫中熱毒乾嘔心煩者方

蒲黄　括蔞　犀角　甘草各貳兩　桑寄生

葛根各參兩

右以水七升煮取三升分三服

治温病不汗內蓄血及鼻衄吐血大便黒消瘀血方

芍藥　牡丹各貳兩　生地黄捌兩　犀角壹兩

右水九升煮取三升分三服喜忘如狂者加大黄

治吐血方

生地黄肥者五升擣以酒一升煮五六沸去滓以頓服

靜嘉堂文庫所藏

治忽吐血一二口或是心衂或是中崩方

蠐螬枚十四 牛膝 牡丹 王不流行 麥門冬

乾地黃兩五 萆薢 芍藥各四兩 續斷 阿膠各三兩

右以生地黃汁五升赤馬通三升煑取三升三服不差更合數劑取差

治吐血方

熟艾三雞子許水五升煑取二升頓服

又方

燒亂髮灰水服方寸匕日三服

灸九孔出血方

凡口鼻出血不止名腦衂灸上星五十壯入髮際一寸

又方 栢葉一斤以水六升煑取三升分三服

又方 擣荊葉汁酒和服二合

又方 生地黃汁半升 川大黃末一方寸匕

右温地黃汁一沸内大黃攪之空腹頓服日三差

又吐血唾血方

灸胸堂百壯不針

吐血唾血上氣欬逆灸肺俞隨年壯

吐血腹痛雷鳴灸天樞百壯

吐血嘔逆灸手心主五十壯

治萬病諸方第七

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不虞倉卒之秋應手皆得故有萬方焉余以此方散在羣典乃令學者難用討尋遂鳩撮要妙以爲斯品庶其造次可濟好事君子安不忘危無事之暇可預和合以備緩病察也

治萬病大理氣丸方

牛膝 甘草 人參 茯苓 遠志 常山

苦參 丹參 沙參 龍膽 芍藥 牡蒙

半夏 杏人 紫菀 龍骨 天雄 附子

靜嘉堂文庫所藏

葛根　橘皮　巴豆　狼牙各貳　大黃半
白朮各壹　白薇各半　玄參各半分　雚菌大者　生薑各末任
右別擣篩末又擣巴豆如膏然後和蜜更擣二三千杵丸如梧
子空腹服七丸日三丸瘕癖結五十日服永差至三十常用理氣
大有効驗酒服
治一切風冷痰飲癥癖瘡瘻萬醫所不治者皆治之芫花散一
名登仙散一名三建散
芫花　桔梗　紫菀　大戟　烏頭　附子
天雄　白朮　蕘花　狼毒　五加皮　莽草
王不留行　栝樓　欒荊　躑躅　麻黃　白芷
車前子　荊芥　茵芋各壹　石斛　人參　石長生
石南各壹　萆薢　牛膝　蛇牀　兔絲　苟杞
蓯蓉　秦膠各壹　藜蘆各半分　署預　細辛　當歸
薏苡　乾地黃　芎藭　杜仲　厚朴　黃耆

乾薑　芍藥　山茱萸　桂心　黃芩　防己
五味子　栢子人　遠志　蜀椒　獨活　牡丹
橘皮　通草　柴胡　藁本　菖蒲　茯苓
黃連　續斷　巴戟　食茱萸各貳分
右件不治不擇不炒不熬但振去塵土擣以簏下之即與人服
無所忌凡是猪雞五辛生冷酢滑任意食之彌佳唯不得食諸
豆皆殺藥故不得食
藥散三兩粘米三升細麴末二升上真酒五升先以三大斗水煑
米作粥極熟冬月揚去火氣春秋涼夏月揚絕大冷秋稍溫次
下麴末攪使和柔相得重下藥末攪使突突然好乃下上真酒重
攪使散盛不津器中以一淨杖攪散經宿即飲直以布蓋不須
密封凡服藥皆空心服之以知為度微覺發動流入四肢頭面
習習然定勿更加之如法服之常常內消非理加增必大利服
散者細下篩服一方寸匕和水酒將飲無在稍增以知為度

靜嘉堂文庫所藏

服丸者細下丸如梧子一服七丸但服此藥若酒丸
唯不得作湯若欲得補不令吐瀉但取內消其大補益勝於五
石兼湯詮病功効一等然作酒服佳於丸散而湯服流行迅疾
若有患人胸脇多時積癖宿食大陰久氣癥瘕積聚一切故
結者服酒一兩度增令使吐下泄去惡物不後小腹內銷便為
補益凡服藥慎勿食食與食觸藥必當大吐吐亦無損須更還
定但令人咽喉痛三兩日後始差服者宜知平旦服藥至午時
待藥勢定宜先食冷飯薄飲婦飲水午後藥勢好定任食熱食
無忌若藥行未定時不能即起行行即連悶旋倒眼花暗欲迷
絶此是逐風所致不須疑怪風氣之後縱令多服更亦不能悶
時但臥坐須臾醒甦不異於常若久後任意所之若必便旋當
策杖如廁少覺悶亂即須坐定坐定即醒醒乃更行病在胸上
久令痰陰積聚癥瘕結癖瘕宿食塊堅劾逆上氣等一切痼結
重病終日吐唾逆氣上衝胸喉此皆胃中積痰所致三焦膀間

宿冷以成諸疾此例便當吐却若重三五度下之令盡其吐狀
法初吐冷氣沫次吐酢水須臾吐黃汁大濃甚苦似牛膽病若
更多者當出紫痰似紫草汁黃齒焦有此者例入死道不定
死若有痊者吐血陳久黑血新者鮮血却罷永差一吐不發下
此吐藥當吐時大悶須臾自定即不虛憒得食冷食食訖耳不
虛龍手足不腫若胃口有前件等病勢久成者正當吐有塊物
塞胷喉吐復不出悶復不入悶當有異種大悶更加一二合藥
酒重投藥下少時即當吐出塊物如拳大真似肝膽等于中黃著
地以刀斫碎重者十塊輕者五塊凡人有上件等病若服藥時
不吐却者當時雖得漸損一二年後還發為此故須下吐藥散
服取吐者當以春三月服之春宜吐故也凡
臍下冷少腹滿腸鳴膀胱有氣冷利多者須加利藥於此酒內
服之便去惡物利法如清水如黃汁如青黑者一兩度
下利藥令得利以盡病源重者五度下利藥令使頻得大利以

靜嘉堂文庫所藏

盡病根利法旦起服藥比至痢時可作兩行即斷後復
此利勢即定還復如故然不令重利然宜取利凡長病人瘦弱
虛損老人貴人此等人但令少服積日漸漸加令多內消差取
除久病不加吐利也藥若傷多吐利困極不止者服方寸匕生
大豆末水服之即定藍青亦為要嚼以咽之登時定此據大困
時用之小小不須尤在世人有虛損陽衰消瘦骨立者服之
非常補益旬月之間肌膚充悅顏色光澤髓腦溢精滿以壯一等
凡衆病萬病皆除之治一切風病歷節賊風熱風大風二十四兩
和酒五升偏風腲腿癱緩風十二兩和酒二升此七種並帶熱
須加冬藥翼神使常數利賊風掣瘲八兩和酒二升濕風周痺八
兩和酒二升腰腳攣痛十二兩和酒二升筋節拘急八兩和酒
二升重病後汗不流初覺三服一服一盞年久服一升食熱食
安錐刀刺者八兩和酒二升口喎面戾一眼不合者初得四兩
和酒一升年久十二兩和酒三升頭面風似蟲行又似毛髮在
面者八兩和酒二升老即頭旋良久能定者四兩和酒一升心
悶嘔噦項強者風在心藏欬風雨便即先發八兩和酒二升因
瘡得風口強脊急者五服即定一服一合治一切冷病積冷癖
瘦者四兩和酒一升強者六兩和酒一升半痰飲疝瘕六兩和
酒一升半宿食嘔吐四兩和酒一升癥瘕腸鳴噫八兩和酒二
升頹痔塊堅冷嗽上氣二十兩和酒五升奔豚冷氣六兩和酒
一升半疰六兩和酒一升半久疰八兩和酒二升冷痢六兩和
酒一升半久勞八兩和酒二升卒中惡注忤心腹脹氣急垂
欲死者三服定一服一盞大吐出血瘴氣三服定一服一盞蠱
毒五服定一服一盞溫瘧五服定一服一盞痎瘧五服永差一
服一盞治婦人諸風諸病等並條件治方帶下十二兩和酒三
升崩中六兩和酒一升半月閉不通六兩和酒一升半冷不產
六兩和酒二升斷緒不産八兩和酒二升月水前後不調乍多
乍少亦令人絕産四兩和酒一升産後得風冷不産六兩和酒

靜嘉堂文庫所藏

二升若重者八兩和酒二升甚者十六兩和酒三升大
子宮下垂十六兩和酒四升
論曰遐覽前古莫覩此方有斉久李隆有自云隋初受之於定
州山僧惠通道人此亡用之六有効驗祕而不傳但得其藥方
不可得而聞始吉得之於靜智道人將三紀於茲矣時俗名醫
未之許也然此行之捻手雖不近人情至於救急吉踰特異方知神物効靈不拘常制至理
開感智亦能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此其不知所以然雖
聖人莫之辨也故述之篇末以貽後嗣好學君子詳之非止
博覓矣
救物兼深抑亦庶幾於博覓矣
耆婆萬病丸治七種大癖腹大如鼓病氣
咳嗽喉中如水雞鳴不得臥食不生肌膚令人肥充增益氣力及
十種惡疰牡心痛甘草炙得及參心痛十二種時瘧疾
千二種水病二十種微風并風入頭眼漠漠五種蠱毒積聚不
消塊閉不通心腹脹滿及連匈背致氣胠結流入四肢或腹大喘
氣滿時定時發小兒赤白下痢婦人絕嗣十年五年胡臭耳聾目昇
腰痛羸瘦五種下痢疳虫寸白諸由上下冷熱久積淡令人多
睡眠消瘦無力脹滿四肢腫便成滯患身氣腫飲食嘔逆腳疼四
肢沉重不能久行立婦人藏中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯
出流不尽時時疼痛為患或因此斷產服藥不過三劑萬病悉除
說無窮尽故稱萬病丸方

牛黃　麝香　犀角有方云一錢今各云二分　朱砂
雄黃　蕙連　馬鮫糠　大戟　芫花
芫青　人參　石蜥蜴　茯苓　乾薑
桂心　當歸　芍藥　甘遂
黃芩　桑白皮　前胡　細辛
巴豆熬　蜈蚣二節　桔梗
防風各壹　紫菀　蒲黃　葶藶

靜嘉堂文庫所藏

右並令精上件牛黃麝對雲母雄黃禹餘粮巴豆別擣
絹下之白蜜和更擣三千杵密封之破除日平旦空腹酒服三
丸如梧子取微下三升惡水為良若其發遲以熱粥一盞發之
癥瘕積聚丸如小豆三服皆間食以利差止五症鬼刺客忤服
二丸如小豆不差後日更服三丸拘急心腹脹滿心痛服三丸
如小豆不差更服空病欲死服三丸如小豆即吐利即差諸有
痰飲者服三丸如小豆冷癖服一丸如小豆日三皆間食常令
微洩利傷寒時行病服二丸如小豆日三下部中內二丸如小豆上氣嘔逆胷滿不得臥
丸如小豆日三下部中內二丸如小豆上氣嘔逆胷滿不得臥
二丸如小豆不差更服宿食不消二丸如小豆兩劑不止以酢
飯止之婦人諸疾胞衣不下服二丸如小豆即吐利即出水病
服三丸如小豆日二昔間食服之差止人弱隔日服小便不通
服二丸如小豆不差明日更服大便不通服三丸如小豆內下
部中即通蠱毒吐血腹痛如刺服二丸如小豆不差更服癰病

未發前服一丸如小豆不差更服男女邪病歌哭腹大如娠婦
二丸如小豆日三夜一間食猫鬼病服三丸如小豆末差更服
卒得中惡口噤至二丸如小豆和煖水一合灌口令下至差令微
利頭痛惡寒服二丸如小豆覆取汗小兒癗癎服一丸如米塗
乳令嘲之看兒大小量之乳不消心腹脹滿服二丸如米亦塗
乳頭令嘲之不差更服小兒客忤服二丸如米乳汁傳乳頭嘲
之至差胷脅腰腸腫以酢和傳腫上旦服二丸如小豆癰腫丁
腫破腫內一丸如麻子巨傳其根自出至差犯丁腫血出猪脂
傳有孔內孔中差止癬瘡以苦楸令汁出以酢和傳上日別一
易立差時病塗瘡勿綿上內孔中日別易差止瘡瘡有孔一丸如
小麥並內孔中旦和猪脂傳之耳聾傳耳以綿裹一丸如棗核
塞之差厲瘡以酢浒洗之取藥和猪脂傳之瘰癧以酢和傳上
差惡刺以一丸內瘡孔中即差諸冷瘡積年不差者以酢和塗
上亦餅貼差蝮蛇螫取少許內螫處若毒入腹心悶服三丸如小

靜嘉堂文庫所藏

豆蝎螫貼差以少許傅螫處疳濕一丸如杏人和酢二合灌下
部亦服二丸鼻衄服二丸如小豆大即差蜂螫取少傅螫處
忌陳臭生冷酢滑粘食大嗔猪魚雞狗馬驢肉白酒行房七日
外治得一日服二日補之得食新米韭骨羹粥臛飲食之三四
頓大良亦不得全飽産婦勿服之服藥利不止者以酢飯止

延命丸治一切蠱毒妖邪鬼疰病者有進退積聚堅結心痛如嚙
不得坐臥及時行惡氣温病風熱瘴氣相染滅門或時寒時熱似
迹瘧瘧咽喉腫塞不可食飲或煩滿短氣面目時赤或目中赤黄
或乾嘔吐逆或下利赤白或熱氣如雲或欲狂走自殺或如見鬼
或手足清冷或熱飲冷水而不知足或使手空攫或面目癰腫生
瘡或耳目聾暗頭項背脊強不得屈申或手足卒痒或百鬼惡疰
狐魅走入皮膚痛無常處方

馬目毒公　特生礜石　丹砂　麝香　朱砂
馬齒礬石　雄黄各壹兩　巴豆一撮去皮　青野葛叁兩

右七味別擣巴豆如膏末擣五千杵内蜜更擣一萬杵丸如小豆
強人服二丸弱人一丸入腹雲行四布通徹表裏從頭下行周
徧五藏六府魂魄静定情性得安病膝上出膈下下或蛇虫諸
毒五色熱水或下不吐下便微漸除差萬蠱妖精狐狸鬼魅諸
久固癖塊皆消散在表汗在裏下忌名其藥故此方無名也後
著延命丸

玉女玉壺丸方

雄黄　藜蘆　丹砂　礜石　巴豆各壹兩　八角附子叁兩

先擣巴豆三千杵次内礜石治三千杵次内藜蘆治三千杵次
内附子三千杵次内雄黄三千杵内蜜更擣萬杵更佳有加三
兩者若不用丹砂而内真珠四兩無在毋藥輒治三百杵内少
蜜恐藥飛揚治藥用王相吉日良時童子齋戒良天晴明日無
雲霧白晝日藥成密器中封之勿泄著淨潔處大人丸如小豆
服藥欲下病者宿勿食旦服二丸不知者以煖粥飲發之令下

静嘉堂文庫所藏

下不止飲冷水以止之病在上膈吐膈下利或但噫氣
愈或食肉不消腹堅脹或一丸立愈風疝寒心弦疝再發腹中
急痛服二丸積寒熱者老瘧蚘瘧三丸一切病量之不過一丸
莫不悉愈腹痛脹滿不食服一丸若寒熱往來服一丸卒關格
不得大小便不通欲死服二丸癥結堅痞服一丸日三服取愈
若治癥者射茵丸甚佳不利重下服一丸取斷或腹脹天行便
斷卒上氣氣但出不入并逆氣衝喉出鼻積聚者服二丸日再
瘧未發服一丸已發二丸便斷小兒百病瘧寒及熱百日半歲
者以一丸如黍米置乳頭與服之一歲已上如麻子一丸日三
以飲服小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成積聚一丸傷寒
赤色時氣熱病溫酒服一丸厚覆取汗若不汗更酒服一丸要
取汗欲行問者省病服一丸一丸頸上行無所畏至喪家帶一
丸辟百惡病若淋瀝瘦瘠百節酸疼服一丸日三婦人産後餘
疾及月水不通往來不時二丸日再卒霍乱心腸痛煩滿吐下

手足逆冷服二丸鬼疰百疾異種不可名服二丸日再若瞑中
如有蟲鑽刺人腸腹急痛一止一作如此是風氣二丸若惡瘡
不可名瘑疥疽以膏若好苦酒和竹以鹽湯洗瘡去痂拭乾傅
之惡風遊心不得氣息服一丸耳膿血汁出及卒聾如赤穀裹
二丸內之癰腫痤節瘰癧及欲作瘻以苦酒和傅之齒痛綿裹
塞孔中寒熱往來二丸若蚰蜒諸毒所中及猘犬狂馬所咋苦
酒和水服二丸亡惡不知人以酒若湯和二丸強開口灌喉中
若獨宿止丘澤冢墓社廟叢林之中燒一丸百鬼走去不敢近
辟飲留飲痰飲且服一丸以臘和一丸如彈丸著絳袋以繫臂
上男左女右精魅畏之中水毒服二丸若已有瘡苦酒和三丸
傅瘡夏及惡氣結留胸中心苦連噎及咳胸中刺痛服如麻子三丸
日三婦人胸中苦滯氣息不利少腹堅急繞臍絞痛漿服如麻
子一丸稍加之如小豆心腹常切痛及心中熱服一丸如麻子
日三五日差男女鬼交通歌哭無常或腹大經三 狀如妊娠

靜嘉堂文庫所藏

搽服二丸如胡豆大日三夜一又苦酒和之如粉且傅
心至暮又多傅足三陰三陽及鼻孔七日愈又搽服麻子大一
丸日三三十日止腹中三蟲勿食明旦進牛羊肉炙三臠須更
便服三丸如豆日中當下蟲過中不下更服二丸必有爛蟲下
小兒寒熱頭痛身熱及吐哯一丸如麻子小兒羸瘦丁奚大腹
不能食食不化搽服二丸日三又苦酒和梧子傅腹良風目赤
或痒視物漠漠淚出爛眥蜜解如黏注目眥頭卒風腫以苦酒
膏和傅之以如雞子黍之若為蠱毒所中吐血腹內如刺服一丸如
麻子稍加之如胡豆亦塗鼻孔中又以膏和通塗腹背亦燒服
薰治鼠瘻以猪脂和傅瘡取駁舌狗子舐之

又方倉公散

礜石燒　皂莢炙去皮　雄黃　藜蘆各等分

右為散主卒鬼擊鬼排鬼刺心腹痛如刺下血便死不知人及
臥魘嚙脚踵不覺者諸惡毒氣病取前散如大豆著管中吹病
人鼻得嚏則氣通便活若未嚏復更吹之以得嚏為度此藥起
死人漢文帝時太倉公淳于意方亦同此方作疾文在前

張仲景備急丸方

大黃　乾薑　巴豆去心皮熬各等分

右皆須精新多少隨意先擣大黃乾薑下篩為散研巴豆如脂
內散中合擣千杵即可用之為散亦好下蜜為丸佳密器貯著
莫令歇主心腹諸卒暴病若中惡客忤心腹脹滿刺痛口噤
氣急停屍卒死者以水若酒服大豆許三枚捧頭起令得下喉
須臾未醒更與三枚腹中鳴轉得利便愈

小金牙散主南方瘴癘疫氣腳弱風邪鬼疰方

雄黃炙　萆薢　黃芩　蜀椒　由跋
桂心　莽草　天雄　朱砂　麝香
烏頭炮各二分　牛黃一分　蜈蚣一枚六寸　細辛　萎蕤
礜石　乾薑各三分　黃連四分　金牙五分

靜嘉堂文庫所藏

右下篩合牛黃麝香擣三千杵溫酒服五銖七日三夜二以知
為度絳囊盛帶男左女右一方寸匕省病問孝不避夜行塗人
中晨昏霧露亦塗之

大金牙散主一切蠱毒百疰不祥醫所不治方

金牙 鸛骨 石膏各八分 大黃 鼈甲

梔子人 鬼督郵 龜甲 桃白皮 銅鏡鼻

乾漆 桂心 芍藥 夜干 升麻

徐長卿 鳶尾 蜂房 細辛 乾薑

芒消 由跋 馬目毒公 羚羊角 犀角

甘草 狼毒 蜣蜋 龍膽 狼牙

雄黃 真珠各三分 地膽 雚蘆 芫青各七枚

[illegible] 巴豆各一枚 雷丸 龍牙 白朮

[illegible] 活草子各六分 鐵精 赤豆各一分 芫花

莽草 射罔 烏梅各二 蛇皮一尺 班猫十七分

右為散服一刀圭稍加二匕帶之辟百邪治十種疰

大麝香丸治男子女人鬼疰飛尸萬病皆主之方

大麝香二分 牛黃 附子 鬼臼 真珠

莽草 犀角 礬石 細辛 桂心

獺肝 藜蘆各二分 蜈蚣 蜥蜴各一枚 丹砂二兩

雄黃一兩 巴豆 杏人各五十枚 地膽 芫青

亭長 斑猫各七枚 [illegible]石八分

右擣三千杵飲服如小豆一丸日三蠱毒所螫摩之以知為度
入瘦癘鄉死喪病處塚墓間絳囊盛之男左女右肘後繫之又
以少傳人中乃臥不魘魅

小麝香丸治病與大麝香同方

雄黃 當歸 丹砂各四分 乾薑 桂心

芍藥各五分 莽草 麝香 犀角 梔子人各三分

巴豆五十枚 附子 烏頭各五枚 蜈蚣一枚

静嘉堂文庫所藏

右加細辛五分服如小豆三丸日三可至五丸一切尸疰悉皆主之

治諸熱不調紫葛丸方

紫葛　石膏　人參　丹參　細辛　紫參

苦參　玄參　齊鹽　代赭　茯苓　巴豆八

烏頭各三分　乾薑　桂心　獨活各五分

右蜜和擣萬杵服如小豆六丸食前三丸食後三丸忌五辛猪雞魚蒜麪不在禁限若覺體中大熱各減一丸服之令人肥悅好顏色强陽道能食服藥後十日得利黃白汁大佳婦人食前食後只服二丸兩歲已下兒服米粒大令人能飲酒除百病藥之功能損益備述如左心腹病心下堅上氣欬嗽顏色不定痰飲久瘧四肢重身腫浮黃疸體瘡從高墮下絕傷中腹中積聚墮胎後傷中血宿食不消面腫皮肉進月水不定或前或後月水不斷心下閉塞宿癖沈重食吐逆咽喉鳴氣短有癖出入大腸出

鳴體疛駁不利小兒百病小兒癖氣不消乳小兒身常壯熱腹內有病大人坐起體重熱病温瘧下部痒關格不通熱淋癰瘡無力弱房少精精冷下部痒諸此病皆紫葛丸治之若積日服之未愈消息准方服之取差止祕不傳藥性冷冝患熱人服之

太一神精丹主客忤霍乱腹痛脹滿尸疰惡風癲狂鬼語蠱毒妖魅若温瘧無所不治方

丹砂　曾青　雌黃　磁石各四兩　金牙二兩半

右各擣絹下篩丹砂雌黃等更入雌黃三兩三味以醶酢浸之曾青用好酒銅器中漬密緘封之日中曝之經夏急待五日亦得無日以火暖之訖各研令如細粉以醶酢拌使乾濕得所內土釜中以六一泥泥其際勿令泄氣乾然後安鐵環施腳高一尺五寸置釜上以漸放火無問軟硬炭等皆得初放火取熟火兩秤炭各長四寸置於釜上待三分二分消盡即益如此三度盡用熟火然後用益生炭其過三上熟火已外皆須加至漸多及

靜嘉堂文庫所藏

至一切復時其火已欲近釜即使滿其釜下益灰住度即罷火盡極冷然後出之其藥精飛化熨上釜五色者上三色次一色下雖五色但色光皎皓潔如雪最佳若飛上不盡更合與火如前以雄雞糞掃取或多或少不定研細棗膏丸如黍粒治傷風大風惡病癘癩癲癎鬼打等最良服之法平旦空腹服一丸如黍米為一度其瘧病積久百方不差又加心腹脹滿上氣身面腳等並腫垂死者服一丸吐即差亦有不吐差者後日加半丸漸服無有不差氣亦定者即出青黃白物其因瘧兩脇下有癖塊者亦即消除若心腹不脹滿者可與一丸日日加之知為度不必專須吐亦可一丸即差勿併與服亦可三日一服皆須以意斟酌量得其宜或腹內有水便即下者勿怪若患百日近精神健亦可斟酌病人藥性併與兩丸作一丸頓服之皆至午後食勿使即冷勿使數數起煎藥隨任意食之若病瘧盛汗虛弱者日服一丸三日吐即止若患瘧不汗氣復不流脚弱者服一丸至三日即瘥即瘥有潤汗不至三日吐即止若患瘧無顏色者服藥後三日即有顏色亦有須吐若者亦宜服少許而差者亦可殺藥強人服三四丸始覺藥行者凡人稟性不同不可一槩與之但作黍米大服之為始漸加以知為度藥力驗壯勿併多服特慎油腻魚肉蒜當清淨服之若有患久不差在牀羸瘦幷腹脹滿及腫并下利者多死但與藥救之十人中或差三四人也又一說瘧瘕積聚服一刀圭以飲漿水送之治諸卒死客忤霍亂腹痛脹絶帶尸注風忤大病相易死亡喊門在顛鬼語已死氣絶心上微暖飲送藥一下即活語諸久病者日服一刀圭要復令取汗汗出即愈者不過再服亦有不汗而差復有不汗不愈者服如上法加半刀圭以差為度常以綿裹帶之及刀圭散男左女右小兒輭繫頭上辟癘毒惡氣射公小兒可以苦酒和之方寸匕紙上著兒心腹上令藥在上治之亦可有已死者冬二日夏一日與此藥服得藥不活不得入腹不活治若加金牙礜石者

靜嘉堂文庫所藏

服至五服內必令人吐逆不利過此即自定其藥如小豆大為
始從此漸小不得更大大風惡癘可二十丸偏風歷節諸惡風
等病可二十服自餘諸惡病者皆止一二服量人輕重強弱不
得多與若欲解殺藥爛煮肥猪肉服此藥後不甚頭痛身熱
一二日來大不能得食味後自漸漸得氣味五日後便能食若貪
食過多者宜節之若服藥下悶乱可煮木防已湯服之即定忌
猪肉蒜油膩等及冷漿水得食酢及酢菹凡言刀圭者以六粟
為一刀圭一說云小豆為一刀圭治大風惡癩偏風癱瘓歷節
鬼打瘤瘻小兒驚忤不能乳哺癰疽一名瘻并內外痔腹內積
病婦人産死未經宿狂猘所咬丁瘡苗虫寸白惡腫邪鬼精妖
鬼等並帶此藥去一切惡作土釜法取兩箇瓦盆各受二斗許
以甘土塗其內令極乾又一法作一瓦釜一熟鐵釜各受九升
瓦在上鐵在下其大小隨藥性多少不必依此說作六一泥法
赤石脂牡蠣滑石礜石黄礬蚯蚓屎鹵土各二兩醋拌以足為

度若無鹵土以鹽替之先作甘土泥各別裹前黄礬等五種
作團裹之勿令泄氣以燒周三日最好一日亦得出火破團取
藥各擣碎絹下篩然後与蚯蚓屎鹵土等合以酢和之如稠粥
既得酢可用二分酢一分水和用取前瓦盆以此泥塗之曾青
如蚯蚓屎如黄連佳世少此者好崑崙緑亦得差病丹砂亦勘
栗秋亦得舊不用礠石金牙今加云去用治萬種惡風神良凡
有患連年積歲不可治者宜須合此一篇皆以王相日天晴
明齋戒沐浴如法合之
述曰古之仙者以此救俗特為至秘余以大業年中數以合和而
苦雄黄曾青難得後於蜀中遇雄黄大賤又於飛鳥玄武大獲曾
青蜀人不識曾青今須識者隨其大小但作蚯蚓屎者即是如此
千金可求遂於蜀縣魏家合成一釜以之治病神驗不可論宿癥
風氣百日服者皆得痊愈故叙而述焉凡雄黄皆以油煎九日九
夜乃可入丹不爾有毒慎勿生用之丹必熱毒不堪服慎之

靜嘉堂文庫所藏

孫真人千金方卷第十三

心藏脉論第一　心虛實第二　心勞方第三
脉極方第四　脉虛實第五　心腹痛第六
肖痺方第七
心藏脉論第一
頭風第八　髮落白禿　頭瘡生髮

心藏脉論第一

神者五藏專精之本也心主神心為帝主監領四方夏三七十二日位在南方离宮火也任万物者謂之心心有所憶謂之意意有所思謂之神舌者心之官故心氣通於舌舌和則能調五味又云在竅為耳夫心者火也腎者水也水火相倚心氣通於舌舌非竅也其通寄耳左耳內右耳丁循環炎宮上出脣口知味榮華於耳外主血內主五音心重十二兩中有三毛七孔含精藏神號五神居隨節應會又心藏脉以合神在氣為吞在脉為汗篇韻曰心有病口生瘡齒爛心主憂病病者時寬時甚知其源取其俞觀其應察其害○凡心藏象火与小腸合為腑其經

手少陰与手太為表裏其脉洪相於春王於夏心脉洪大而長
洪則衛氣實〻則无從出大則榮氣萌萌洪相博可以發汗
陽氣上出汗見於頭五藏乾枯肉中虛空醫反下之此為重虛
脉浮有表无裏陽无所使不但危身并中其母母謂肝也凡裏
脉如鉤来盛去衰故名鉤反此則病来盛去亦盛為太過病在
外来衰去盛為不及病在内太過令人熱而煩痛浸淫不及則
令人煩心上見咳唾下為氣泄心脉来喘喘連屬其中微曲曰心病
曰心平夏以胃氣為本心脉来前曲後倨如操帶勾曰心死夏胃微勾曰平勾多胃氣少
曰心病但勾无胃氣曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病真心
脉至堅而搏如循薏苡累〻然其色赤黒不澤毛折乃死心藏
脉脉合神伏惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破䐜脫肉毛
悴色天至久乃死真心痛其手足寒至節且發夕死夕發旦一
死心中水者身躰腫而少氣不得臥煩躁腫心中熱者吸〻

發熱不能起心中飢欲食食即嘔夏心主其脉浮洪大而散名曰
平脉今反得沉而疾而滑者是腎乘心水剋火為大逆十死不治反
得弦而長者肝之乘心母之剋子雖病當愈反得大而緩者是脾
乘心子之剋母雖病當愈反得微澁而短者是肺之乘心金来剋
火為微邪雖病不死也心病者腎中痛又痛脇痛齊背肩甲間
兩臂內痛虛則腎腹大下与腰背相引而痛取手少陰經舌下血
者其變病刺郄中血者邪在心則心疾等悲時眩仆視有餘不足
而調之愈心之積名曰伏梁起齊上上攻心大如臂久久不愈苦
煩心心痛秋庚辛日得之肾病傳心心當傳肺脉適以秋王王者不
受邪心欲還之肾〻不肯受也因留結為積故知伏梁以秋得之也
心氣虛則悲不已實則笑不休虛則夢飛救火心傷得其時夢燔灼
心氣盛盛夢喜笑恐畏厥氣客於心則夢見山煙火心脹者煩心短
氣卧不安心腹懊憹痛腫聚往来上下行痛痛有休作腰脽喜渴
涎泄者是交蛕也少手聚持之母令得移以大針刺之久持之虫

靜嘉堂文庫所藏

不動乃出針病在心日中慧夜半甚平旦靜手心主之別名曰內
關去腕五寸出於兩筋間循經以上繫於心包胳心系氣盛則心
痛虛則為煩取之兩筋間手心主之脉起胸心包下膈歷絡
三焦其支者循胸出脇下掖三寸下循膈內行大陰之間入肘中
下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指
出其端是動則病手熱肘攣掖腫甚則胸中痛掌中熱為此諸病盛則鴻
面赤目黃是主脉所生病者煩心心痛掌中熱之陷下則灸之不盛不衰以經取
之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不衰以經取
之盛者寸口一倍大於人迎是主心所生
病者目黃脇痛臂膊內後廉痛厥掌熱。心病者先心痛一日
而發三日胠支痛五日閉不通身躰重二日不已死冬夜半夏日
中。手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則髮色不
澤故其面黑如漆柴者血先死壬篤死乙水勝火也心中風者吸
吸發不能起心中飢而食食則嘔心中風寒者其人苦心如噉蒜
驚劇者心痛懲脅背痛懲心臂如蠶注其脉浮者自吐乃愈心中
悲者其人勞倦頭面赤如丁重心中痛因煩發熱當齊挑手其脉
弦此為心祕所致邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者著於
心心氣虛者其人即畏合目欲眠夢寐而行精神離散魂魄妄行
陰氣甚者為癲陽氣甚者為狂。心脉沉之小而緊浮之而端苦
心下聚氣而痛食不下喜咽唾時手熱煩滿時恚不樂喜大息得
之憂思。心脉來累累如貫珠滑利再至曰平三至離經病四至
脫精五至死六至命尽。手厥陰心脉急甚為瘈微急為心
痛引背食不下緩甚為狂笑微緩為伏梁在心下時唾血大甚為
喉介微大為痛引背善淚小甚為噦微小為消癉滑甚為渴微
滑為心疝引齊少腹鳴濇甚為瘕。心脉搏堅而長當病舌卷
不能言其命尽而散者當消環自已赤脉之至也喘而堅診曰有積
氣在中時害於食名曰心痺得之外病思慮而心虛故邪從之
凡心脉急名曰心痺少腹當有形心病煩悶少氣大熱之上溫心

靜嘉堂文庫所藏

嘔吸吐逆狂語汗出如珠身脉厥冷其脉當浮而反沈濡而滑其
色當赤而反黑此水之尅火大逆十死不療心痛比行若食魚得
之當以冬發壬癸日心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼哭罵
詈悲思愁慮面青執其胸實大而數此為可療宜針大陵補之
又久之巨闕五十壯皆瀉五椎夫五
秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之所依託也魂魄飛揚者其五藏空虛
藏者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五藏空虛
即邪神居之脉短而微其藏不足者魂則不安魂屬於肝魄主精
液即為涕泣出脉氣衰者即欲泣出肝氣衰者即欲泣出肝氣
衰者魂則不安肝主喜怒訴得心積沉之而楚時上下无常處病
旨蒲悸腹中熱而赤咽燥心煩掌中熱甚則唾血主身瘈瘲主血
厥夏差冬劇則急療止旬日問曰心病少愈而卒死其源何生
答曰亦黑色黯黯如煙熏者見赤度年上此卒死痛鵲云心絶
幾日死心絶不治一日死何以知之面目回回直視有息立死凡
面赤自白鼻青喜思慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十日
死又面目赤黃死赤如血死吉凶之色若在外部脫入口此必死不出其辛名曰行尸若年上无色應三年之中病必死矣。徵音人主心聲也心聲笑其音竽其志喜其手少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反作陽氣內擊陰氣外傷傷則寒虛虛則驚悸悸制掣心悸定心湯王之也其方在第十四卷中語聲前寬後急後聲不續喜前混濁口唱冒時好自哭此為厲風荊瀝湯主之方在第八卷中傷心心壞為水身手不遂脊節離解緩弱不由便利先度量附湯主之方在第二十二卷中此病不盈旬日宜急治之又笑不淨咄而反晏此病水趨火陰擊陽陰起而陽伏伏則實亢則傷熱傷熱則狂冒絶則言多謬誤不可採聽此心已傷痛鵲曰其人口唇正赤可療其青黃白黑不可治也心病為癡者令人心煩也其病欲飲清水多寒少熱方在第十卷若人本來心性和雅而忽齧衣反於常倫白木酒主之方在風方卷中或言未竟便住手則知此人心禍難來及名曰行尸此心病声之

靜嘉堂文庫所藏

候也虛則補之憂心火脉色赤主午太陽也又曰憂取五經分淺
理心氣始長脉瘦氣弱名曰陽脉其脉本在命門之上三寸命門
者在心上一寸也脉根在手足澤太陰止在肘腕中火横丈是也其
脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肩
解繞肩甲入缺盆向脉絡心屬小腸合手少陰為表裏少陰本在
兌骨之端同會手太陽別白乏上腕五寸内注少陰別
走肘絡肩髃實則齒齲〻則陽病陽脉大反浮於寸口再倍疾
則小腸熱嗌痛耳聾目黃目不能言聞則急坐虛則慈寒〻則陰
脉反小於寸口過於一倍病則小腸寒短氣百節痛筋急頸痛轉
顧不能名曰憂癉也扁鵲云炎肾肝心三俞主治丹毒病當依源
為療表裏陰陽調和藏府疾不生矣

第二

心虛實

凡人左手寸口人迎以前陰實者手少陰經也若閉大便不利
腹滿四肢重身熱名曰心實瀉心陽主之

治心熱強或欲吐〻血不出煩喘急痛方

石膏一斤 地骨皮五兩 栀子十五枚 淡竹葉二升
茯苓三兩 小麥三升

右七味先以水一斗五升煮小麥三升熟去滓分三服

瀉心湯治老小下痢水穀不消腸中鳴心下痞滿乾嘔方

人參一兩 半夏三兩 甘草略一兩 乾薑一兩 黃連三兩 黃芩

右六味以水八升煮取二升半分三服并療霍乱若寒加附
子一枚若渴加括蔞二兩嘔加橘皮一兩痛加黃連一兩客熱
以生薑替乾薑

凡左手寸口人迎以前陰陽俱實者与手太陽俱實者也若頭
痛身熱灾便難心腹煩滿不得卧當氣不轉木穀也名曰小腸
俱實

靜嘉堂文庫所藏

治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安竹瀝湯方
淡竹瀝一升 石膏八兩 芍藥 白朮 梔子 人參各三兩
知母 茯神 赤石脂 紫菀各二兩 生地黃汁一升
右十一味以水九升煑十味取二升七合去滓下竹瀝更煎取
三升若須利入芒消二兩去芍藥分三服
茯神煑散方主心實熱
麥門冬 茯神各六分 通草 升麻各五分 紫菀
桂心各三分 赤石脂七分 知母四分 大棗二十枚 淡竹茹雞子大
右十味細切搗篩下為散方寸匕帛裹之井花水二升半煑
取九合時動裹子平旦為一服日再
灸法
從大椎數第五椎節名心俞主心病左右俠脊各一寸三分灸二
七壯小兒減之不能食胷中滿膈上逆氣悶熱悉灸之
瀉心湯療心氣不足吐血衂血方
大黃二兩 黃連壹兩 黃芩壹兩
右三味以水三升煑取一升服之亦治霍乱出
心熱滿煩悶驚恐安心煑散方
白芍藥 遠志 宿薑各八分 伏苓 知母
紫苑 赤石脂 石膏 麥門冬各七分 桂心
麻黃 黃芩各五分 葳蕤六分 人參四分 甘草二分
右十五味下篩先以水五升淡竹葉切一升煑取二升去滓煑
散一方寸匕半以絹裹時時動之煎取八合一服日再
治心虛方
凡左手寸口人迎以前脉陰虛者手少陰經也若悸恐不樂心
腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛補心湯主之也療心氣不
足喜悲恚怒衂血面目黃煩悶五心熱或獨語不覓喉咽痛
舌本強冷涎出善忘走不定婦人崩中面色赤茯苓補心湯方
桂心二兩 大棗二十枚 紫石英一兩 茯苓四兩

靜嘉堂文庫所藏

甘草二兩　人參二兩　赤小豆二十枚　麥門冬三兩

右八味以水七升煮取二升半分三服

心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤半夏補心湯方

半夏陸兩　宿薑五兩　茯苓　桂心　橘皮各三

白朮四兩　防風　遠志　枳實三枚

右九味切以水一斗煮取三升分三服

又五髓丸方通療百病虛瘠羸乏等方

牛髓　羊髓

麥門冬　伏神

甘草　羌活各五　乾薑　白蜜　蘇　棗膏各壹升

玉味子　防風各五　乾地黃各六　人參

右十九味切搗十四味再篩前研棗膏和散次与諸髓蜜和

散攪令相得內銅鉢中於金湯中銚之取堪為丸酒下如梧

子大三十九稍加至四十九日再服舊生羊髓佳

凡左手寸口人迎以前陰陽俱虛者吉洞泄苦寒少氣四肢寒

厥名曰心小腸俱虛

大補心湯治虛損不足心氣弱悸或時忘謬四肢損變氣大煩

色不營方

黃芩　附子各一　甘草　茯苓　桂心

石膏　半夏　遠志各四兩　生薑二兩　大棗二十个

粘糖作　乾地黃

右十四味水一斗五升煮取四服湯成下糖

補心九療藏虛喜恐怖如厭狀及女人產後餘疾月經不順方

當歸　防風　芎藭　附子　芍藥　甘草

蜀椒　細辛　桂心　半夏　厚朴　乾薑

大黃　豬苓各一　茯苓　遠志各二兩

右十六味蜜丸梧桐子服五丸日三不知加至十九冷加熱

藥米飲下

靜嘉堂文庫所藏

心勞第三

心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣逆夏氣則手太陽心不長

治心勞熱口為生瘡大便苦難閉澁不通心滿痛小腸熱方

大黃　澤瀉　黃芩　梔子人　芒消

桂心各三兩　石膏八兩　甘草一兩　通草二兩　大棗二十枚

右十味先以一升水別漬大黃一宿以九升水煮餘藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓分三服

脉極第四

脉極者主心也心應脉〻与心合有病從脉起又曰夏遇病為脾痺不已復感於邪內舍於心則食飲不為肌膚初脫血色曰不澤其脉虛口脣見色赤鵲曰脉絕不療三日死若脉氣空虛則衰顏焦髮落

治脉熱極則血氣脫色白乾燥不澤食飲不為肌膚生地黃消熱止極強胃氣煎方

生地黃汁　赤蜜一升　人參　茯苓　芍藥

白朮各三兩　甘草二兩　麥門冬一升　石膏六兩　生葳蕤四兩

蓴心一升　遠志二升　乾地黃三兩

右十三味切以水一斗二升煮十一味取二升七合去滓下地黃蜜更煎取三升五合分四服

灸法　挾巨闕兩邊相去各一寸名曰幽門主治胷中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤灸之各隨年壯凡顏色焦枯勞氣失精肩臂痛不得上頭灸肩井萬百壯井萬在肩外頭近外後以手按之有解宛宛中是也

脉虛實第五

凡脉氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之傷風損脉為心風〻之狀汗多若血脉實則熱〻則血傷心使人好怒色赤言語不快則血脫色乾燥不澤食飲不為肌膚若脉氣虛則寒〻則欬〻心痛喉中

靜嘉堂文庫所藏

介介如硬其則咽腫喉痺故曰心風虛實候也若陽經脈病療陰絡脈病療陽定其血氣各守其脈脈實宜瀉虛宜補善治之熱病至皮毛肌膚筋脈則全治之若至六府五藏則半死矣脈虛者好驚跳不定脈實者洪滿　凡脈虛實之應主手心小腹若其府藏有病從熱生則應藏寒則應府

治脈虛驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒補虛調中防風丸

防風　桂心　通草　伏神　遠志

麥門冬　甘草　人參各二十分　白石英十一分

右九味搗篩下為散白蜜和丸梧子大酒下三十九日再加至四十九為度

脈實滿洪主熱病升麻湯方

梔子人　升麻　子芩　澤瀉　淡竹葉

芒消各三兩　生地黃切一升

右七味以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

心脈厥大寸口小腸熱齒齲嗌痛麻黃調心泄熱湯方

麻黃　生薑各四兩　細辛　子芩　茯苓

芍藥各二兩　白朮二兩　桂心二兩　生地黃切一升

右九味以水九升煮取三升去滓分三服須利下芒消三兩脈不出針不容兩穴當心下一寸名巨闕主心悶痛上氣牽引小腸灸二七壯

心痛方第六

心腹冷痛寒氣客於五藏六府發卒心痛腎痺心痛三虫心痛如針錐刺之然谷崑崙發針不已取然谷心痛腹脹而滿心尤痛甚旦發夕死心下不可針者守有成聚不可取俞腸中有虫及蛔皆不可取以小針蛔心痛發作腫聚往來上下行痛不休腹中熱喜渴涎出是蛔咬也以手按之而堅持之勿令移以入針刺中管久持之虫不動乃去針。心痛引腰痛欲嘔取足少陰。心痛腹脹嗇然大便不利取足太陰。心痛引脊

靜嘉堂文庫所藏

背不得息刺足少陰不已取手少陰○心痛小腹滿上下無常處便溲難刺足厥陰○心痛但短氣不足以息刺手太陰○心痛不可按煩心巨闕主之○胸滿引背時寒間使主之○心脾心痛天井臨泣主之○心痛身寒難以俛仰心疝衝冒死不知人中管主之○心疝暴痛取足太陰○心痛有三虫多上管主之○腹中切痛者石門主之邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛皆調其三里○腹中雷鳴邪在大腸刺巨虛上廉三里○腸中氣脹食飲不下取之三脘○若曰食晦先取胃三焦合取委陽腸中雷鳴陽維在下入腹主之亦灸臍中溫留主之○大腸有熱腸鳴腹滿巨虛上廉主之

五辛湯主心腹冷痛方

蜀椒　細辛　桂心　干薑　芍藥
防風　苦參　甘草　當歸　乾地黃
吳茱萸各一文子　烏梅　大棗各二七枚

右十四味以水九升煮取三升分三服

犀角丸主心腹痛積年不定之不過一時間還發之甚則數日不食又便出無窮天下方法不能差甄立言處此一方數日即愈神妙方

犀角　麝香　雄黃　桔梗　莽草
鬼臼　桂心　芫花各二分　附子一分　甘遂六分
貝齒五枚　巴豆二十枚　光明砂一分　赤足蜈蚣二枚

右十四味飲服如梧子一丸日一服微利為度蜜丸

心中痞諸逆懸痛桂心三物湯主之方

桂心二兩　膠飴半斤　生薑二兩

右三味以水四升煮取三升去滓內飴分三服

烏頭丸主心痛徹背背痛徹心方

烏頭　附子　蜀椒各二分　赤石脂　乾薑各四分

右五味先食服如麻子一丸日三稍增之

靜嘉堂文庫所藏

九痛丸主九種心痛一虫痛二注痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九生來心痛方悉主之并治冷腫上氣落馬墮車方

附子　乾薑各二　巴豆人一　人參一　食茱萸各一

生狼毒四兩炙令香研

右六味蜜和空肚服如梧子三丸卒中惡腹痛口不能言者二九日一服又連年積冷流注心胸者亦服之好好將息神驗不傳秘之

凡客氣卒於五藏六府中則心痛方

大黄　芍藥　柴胡各四　升麻　黄芩　桔梗

熟朱砂三分　鬼箭羽　鬼臼　桂心　朴消各二兩

右十一味以水九升煮取二升七合分三服先分作　作三分一服内朱一分攪令均服之快利一不止更服後方

赤石脂六　桔梗　杏人各五兩

右三味以水六升煮取三升半分作三服

懸心痛或如中惡口中涎出不可禁止迴迴欲吐方

苦參十斤

右一味以水一石煮取二斗去滓下苦酒二斗更煎取三升大且黄末熬和汁中煎可為丸併手丸之如梧子酒一升進三四十丸日一服當倒腹吐不吐下利更酒漬三斤苦參進九斤佳非止懸痛骨骱等痛凡是腹中之疾皆悉主之又治宿冷血結陰癖癲用有効非復一條大良

虫心痛方

蜜丸鶴蝨服四十九日一服慎酒肉蜜湯下加至五十丸

又方　鶴蝨一兩末之空肚温酢一盞和服之虫當吐出

又方　服漆一合方在第十卷中治蠱虫方中凡虫心痛皆用漆主之也

當歸湯治虛冷盛腹痛不止飲食不消臚脹方

静嘉堂文庫所藏

當歸 秋芩酪五 黃芪 紫菀酪四 高良薑
乾薑酪六肉蓯蓉 桂心 鹿茸
橘皮酪三甘草二兩 桃人 地骨皮 法製
大麥蘗酪一烏頭一兩 薰大棗枚三十
右十八味以水一斗五外煮取四外二合分為五服若下利
加赤石脂龍骨各三兩湯加麥門冬一外
羊肉當歸湯治腹冷絞痛方
當歸酥四 乾薑 橘皮 黃耆 芍藥 芎藭
防風 獨活 桂心酪三人參 甘草 吳茱萸
乾地黃 茯苓酪二生薑酥六 羊肉五 大棗三十枚
右十七味以水一斗半煮肉取一斗二外計出肉內諸藥煮
取三外分三服日三覆取溫煖也
當歸湯治心腹絞痛諸虛冷氣方
當歸 芍藥 厚朴 羊夏酪三 桂心

甘草 黃耆 人參酪二 乾薑四兩 蜀椒一勺
右十味以水一斗煮取三外二合分四服羸劣人六服
治冷氣脇下往來衝胸脇痛引脇背當歸湯方
當歸 吳茱萸 桂心酪二 人參 甘草
芍藥 大黃三兩 茯苓 枳殼酪一 乾薑三兩
右十味以水八外煮取二外半分三服日三治尸注亦佳
治寒冷腹中痛當歸湯方
吳茱萸外一 人參 桂心各一兩
生薑切 半夏 小麥各一外 當歸二兩
右八味以水一斗八外煮取三外分三服日三亦治產後虛冷
神效
當歸湯治久寒疾胃腹中痛時下痢方
乾薑四兩 當歸三兩 甘草 甘皮酪二 附子一兩
右五味以水八外煮取二外分三服日三

靜嘉堂文庫所藏

當歸湯治久寒宿疾腹中痛短氣時滿下痢方

當歸　桂心各三兩　乾薑四兩　附子一兩

右四味以水八升煮取二升分三服日三

温脾湯治腹痛臍下絞結繞臍不止方

當歸　乾薑　附子　人參　芒消各三兩　大黃五兩　甘草二兩

右七味以水七升煮取三升分三服日三

高良薑湯治卒心腹痛如刺兩脇痛煩悶不可忍方

高良薑五兩　厚朴　當歸　桂心各三兩

右四味以水八合分三服一服六合日二若一服痛止便停不須服若強人為二服二升羸人分三服

治胃腹中痛生薑湯

生薑一斤　食蜜八兩　醍醐四兩

右三味微火上煎令相得適寒温服二合日三

卒中惡心痛方　苦參三兩　附子一兩　乾薑四兩　大黃二兩　甘草二兩

右一味好酢一升半煮取八合強人頓服老小二服

又方　桂心一兩以水四升煮取一升半分二服

心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蛔蟲也並宜温中當歸湯服二三劑後若不敢有具宜改方增損之

當歸湯方

當歸　芍藥　黃芩　朴消　桔梗　柴胡各三兩

外麻各三兩

右七味以水八升煮取二升半分三服

心痛方　灸臂腕橫文三七壯○又方灸兩虎口白肉際七壯

又方　桃白皮煮汁空肚服之

九種心痛方　取當太歲上新生棁枝一握去兩頭

右以水三升煮一升頓服

寒氣卒客五藏六府中則心痛胷脾痺感於寒微者為欬甚者則心痛胷脹滿與痛甚者同心痛也厥心痛之如以錐針刺

靜嘉堂文庫所藏

其心〻痛者甚肝心痛也厥心痛臥若從心痛悶動作痛益甚色不変者肺心痛

灸心痛　心悒憒微痛煩逆灸心俞百壯心痛如刀刺氣結灸膈俞七壯心痛胷痺灸亶中百壯不可針心痛冷氣上叉灸龍頷百壯在鳩尾頭上行一寸半不可針心痛惡氣上脇急痛灸通谷五十壯乳下二寸心痛暴絞急絶欲死灸神府百壯心鳩尾正心有忌心痛暴惡風灸巨闕百壯心痛胷脇滿灸期門隨年壯心痛堅煩氣結灸太倉一百壯

胷痺方第七

胷痺之病令人心中堅痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胷中愊〻如滿噎塞習〻痒喉中乾燥時欲嘔吐胷〻背痛手不得犯胷滿短氣咳唾引痛煩悶白汗出或徹引背不治殺人方

枳殼四枚　厚朴三兩　薤白一斤　苦蔞子一枚　桂心一兩

右五味以水七升煑取二升半分再服

師曰夫脉當太過与不及陽微陰弦即胷痺而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所以胷痺心痛者以其陰弦故也平人元寒熱短氣不足以息者實也胷痺喘息之病欬唾背痛短氣其脉沉而遲關上小緊數栝蔞湯主之

栝蔞子一枚　薤白一斤　半夏半斤　生薑四兩　枳殼二兩

右五味以水一斗煑取四升服一升日三

胷痺方胷痺之候胷中愊〻如滿噎塞習〻如痒喉中澀燥唾服具此

橘皮一斤　枳實三兩　生薑半斤

右三味以水五升煑取二升分再服

通氣湯主胷滿氣噎方

半夏八兩　生薑六兩　橘皮三兩　吴茱萸四十枚

右四味以水八升煑取三升分三服一方用桂二兩

胷腫痺逆背痛短氣細辛散方

細辛二兩　枳實　乾薑　白朮　栝蔞

靜嘉堂文庫所藏

乾地黄酸三桂心 茯苓酸五 甘草二两
右九味酒服方寸匕日三
尉炎背散主胃背疼痛而冈方
烏頭 細辛 附子 羌活 芎藭 蜀椒 桂心酸五
右七味為散帛裹微炙令煖以熨火背上取差乃止慎生冷如常
法 下氣湯主胃腹背閉滿上氣喘息方
大腹檳榔二枚 杏人四七枚去皮尖切
右童子尿三升煎取一升半分再服冒患發合之神效
檳榔湯主破宿背悉氣者亦治声寒閉方
檳榔四枚極大者 檳榔八枚小者
右二味破之以十歲已下小兒尿一升半煮減一升去滓分
三服頻与五劑永定
又方并療胃痛達背蜀椒散
蜀椒 食茱萸酸 桂心 桔梗各三兩 烏頭二枚炮

右六味食後酒服方寸匕日三
望古湯主胃脾方在第二十卷中
胃宝氣寒短氣茯苓湯主之方
茯苓 甘草 杏人五十枚
右三味以水一斗三升煮取六升為六服三日未差再合服之
灸胃痺法 胃痺心痛灸胃中百壯在鳩尾上二寸忌針胃
腸滿心痛宜灸期門隨年壯
頭面風病方第八
芎藭酒療腦風令人頭重頸項強眼脏、淚出善欠日欲眠
睡瞤風劇者耳鳴滿眉眼疼悶脊吐逆眩倒叫喚不自禁諸風
秉虛經五藏六府皆為癲狂邪病悉主之方
芎藭 辛夷 天雄 人參 礜石 石膏
茵芋 桂心 天門冬 栢子人 山茱萸
白頭公酸三兩 林蘑 細辛 署預 菖蒲 羚羊角

甘草各二兩　雲母一兩燒令赤止末之　防風四兩

右二十一味酒四升漬之七日初服二合漸加至五合日三有人少時患風眩發則倒地為婦漬年先兒服此酒并將紫石門冬丸服差生兒子平復也

頭眩屋轉眼不得開方

人參　當歸　防風　黃耆　芍藥

麥門冬醋二獨活　白朮　桂心各三兩

右九味以水一斗煮取三升分三服

風眩水將來不下方

木防己　附子　乾薑　防風　甘草各一兩

蜀椒　桂心各二兩

右七味以水四升煮取二升分三服日三

茵芋湯治風虛眩眼闇方

茵芋一分　人參　甘草　蒺藜　黃耆　芍藥

秦膠　厚朴乾　防風　烏喙二枚　松實　山茱萸各三

右十二味以水一斗煮取二升半分五服強人令日夜尽劣人分五服日二

頭風散方　附子一枚炮者　鹽

右二味作散沐頭竟以方寸匕摩頂上日三

頭風方　服刑癖不限多少取差止

又方　搗葫蘆根一升漬服汁

又方　末剉子二升酒二升絹袋盛浸十宿温服三合日三

又方　臘月烏鷄粪一斗炒令黃末之絹盛酒三斗浸温服任性常令醺酣

又方　七月七日麻勃三斗麻子一石末相和煮之沸湯一石五斗三揄淋之煮取一石神麴二十斤漬之令爆發以黍米二石五斗釀之熟封三七日服一升百日身中瘡皮八風五藏骨髓百病悉去

靜嘉堂文庫所藏

又方　油二升鹽一升煎一宿令消盡塗頭石鹽又良
又方　芥子末酢和付頭一周覆
又方　中風頭面腫擣杏人如膏又以雞子黃合搗令相得傳帛上厚裹之自乾不過八九付差
又方　常以九月九日取菊花作枕袋枕頭
又方　八月後取荊芥鍊杵又作枕枕頭立春日去之
風急腦上痰飲方
不開口苦瓠湯煮五沸以物裹熨及心腦上
治項強不得顧視方
蒜一好大豆一升合舂令變色內囊中枕之
又方　穿地作小坑燒令赤以水澆之令少許內生桃葉蒲葉其上布席臥之令項當熱上以衣著項二邊令氣上蒸
病上汗出良久愈若病大作地坑亦大
犀角湯治風毒熱頭面腫方

犀角　生薑酪二斤　括蔞　苦參酪一斗　石膏酢　竹葉　丙極
升麻　黃芩　青木香酪三　防風一兩　防己一兩半
右十一味切以水七升煮取二升分三服相去十里久內消不利禁生冷豬肉蒜麵
治頭風大豆酒方
大豆　三升炒令无声
右一味先以水一斗二升掩盛九升清酒乘豆熱即額著酒中密泥頭七日溫服之
頭風眩欲倒眼旋屋轉腦痛防風枳實湯方
防風　枳殼　杏人　苦蒡酪三　伏神　麻黃
前胡　生薑　半夏酪二　細辛二兩　竹瀝三升
右十一味切水六升煮前取三升七合分三服類服三兩劑
烏頭酒治風頭眩轉面上游風方
防風　菖蒲　伏神酪四　乾葛
桂心　細辛　人參　天雄　乾薑

靜嘉堂文庫所藏

枳殻　貫衆　椒酪三　麥門冬　石南各五両
山茱萸一升獨活二両　飛鴈頭五枚炙此鴈頭方在第一巻中述
右十八味並細切綿裹囊盛清酒四升漬六宿初服二合
日再稍々加以知為度
風頭眩口喝目痛耳聾大三五七散方
天雄　細辛酪三　山茱萸　乾薑酪五　署預　防風酪七
右六味篩為散清酒服三錢匕日再不知稍加至五錢
小三五七散
天雄酢二　山茱萸五両　署預七両
右三味搗篩清酒服五錢匕日再不知稍增以知為度
伏神湯主風眩倒屋轉吐逆悪聞人声方
伏神　獨活酪四分　黄耆　遠志　生薑　甘草　人參
當帰　牡厲　白朮　蒐落　附子酪三　防風五両
右十三味以水一斗二升煮取二升服五合分晝夜尽

防風散主頭面風在眉得熱如虫行或頭眩涙出方
防風紅　桂心二分　天雄　雄黄　細辛　朱砂　乾薑
人參　烏頭　附子酪二両　黄草　茯苓　當帰各一両
右十三味酒服方寸匕日三
防風散主風頭眩悪風冷心悶方
防風二両　澤瀉　細辛　附子　署藥　茯苓
天雄酪一　白朮分　桂心六分　乾薑二分
右十味酒服方寸匕常令酒氣相接則脫巾帽解頭梳髮百過
復投一升酒使洗手足須臾自熟解髮以粉之快然便熟
眠愈亦可洗頭面汗出
摩頭散主頭中五十種病方
蘭茹　半夏　蜀椒酪六　烏頭八分　莽草四分
桂心七分　附子　細辛各一両
右八味為散以大酢和摩頭記日数二日頭膚痛四五日後

靜嘉堂文庫所藏

一著藥如前十日以酢漿洗頭復摩藥摩之即愈若生息肉
并喉咽中息肉如棗大以藥摩之即愈耳鼻竅有疾並用之良
又方 四巴戟 菊花 芎藭 獨活 乾薑 防風 石南 白朮 烏頭
附子 細辛 署預 蜀椒 人參 桔梗 秦艽 括蔞
澤瀉 甘草 山茱萸 乾地黃 天雄 羌活 已上各等分
右二十二味並細下篩以酒服方寸匕日三
防風散主頭面遍身風腫方
防風二兩 白芷兩 白朮三兩
右三味搗篩酒服方寸匕日二服
菊花散主頭面遊風方 菊花 細辛 附子各兩 桂心
乾薑 巴戟 未防已 人參 石南 秦艽
茯苓 天雄酸二 防風 白朮 山茱萸 署預酸三 椒五
右十七味酒服方寸匕日三
卒患風頭痛方 搗生烏頭以大酢和塗故布上薄痛上須
臾痛止日夜五六薄逐痛處薄之去皮搗烏頭
風頭方 菊花 獨活 茵芋 防風 細辛
蜀椒 皂莢 杜衡 芫草 各等分
右九味可作湯淋及熨之
風頭沐湯方 猪椒根酸 麻黃根 防風酸各式 細辛 茵芋 各壹兩
右五味細切以水五升煮取一升汁温洗沐
又風頭方 葶藶子煮汁沐過三四度愈
又方 椒二升以水煮取汁沐良
署預散方療人頭目有風寒引目睛疼痛偏視不明方
細辛六分 秦艽壹分 天雄八分 獨活
桂心 山茱萸各酸分 署預 戎鹽分
右七味搗篩酒服方寸匕日三服
頭面痛又身熱療風熱方 竹瀝參升 升麻 生薑
杏人酪參 芍藥 柴胡酪四 石膏 生葛根酪八

靜嘉堂文庫所藏

右八味以水六升合竹瀝煮取二升七合分三服
忽患頭眩運得差後好食黄土方　白术三斤　麴二斤
右二味擣篩酒和併手丸之暴乾飲服三十丸日二三斷食土為効
風眩翻倒无定方　獨活二兩　枳殼三兩　石膏　蒴藋各四兩
右四味清酒八升煮取四升頓服之以藥滓熨頭覆眠取汗
覺冷又内鐺中炒令熱又熨之
頭面上風方　松脂　石鹽　杏人　蜜蠟各壹兩　薰六香二兩　蓖麻人三兩
右六味熟擣作丐淨剃百會上髮帖膏膏上安紙三日一湯
若癢刺安藥上不久風定
入頂散主頭面脹癧瘰偏枯發作有時狀似刀刺失声陰陰然
痛面目変青方　山茱萸　芎藭　防風　獨活各六分　細辛
茵芋　白术　署預　牛膝　石南　甘草各壹　烏頭
通草　附子　菖蒲　麻黄　天雄　椒　桔梗各三分
右十九味擣篩酒服方寸匕日三

杏人膏主上氣頭面風頭痛胸中氣滿賁肫氣上下往來心下
煩熱産婦金瘡百病方　杏人一升去雙人皮尖
右一味擣研以水一斗濾取汁令尽以銅器塘火上從旦煮
至日入當熟如脂膏下空心酒服一方寸匕日三不飲酒煮
以飲服之慎猪魚蒜酢
中風頭痛發熱耳頰急方　麻黄　葛根　石膏　桂心各參兩
附子　芍藥　甘草　秦膠　防風各貳兩　生薑三兩
右十味水一斗煮取三升分五服初服覆取汗出
頭中二十種病頭眩髮秃落面中風以膏摩之方
蜀椒　茵草各二兩　桂心　蔄茹　附子　細辛各壹兩
半夏　乾薑各壹兩　右八味擣篩以猪生肪二十两合擣
肪消尽藥成沐浴頭令淨以藥摩顖上日一即愈亦可以
生烏麻油和塗頭皮沐頭令淨乃揩之
肺勞熱不問老少頭生白屑瘙癢不堪然肺為五藏之蓋勞損

静嘉堂文庫所藏

必衝頂致使頭痒生白屑搔之隨手起世呼頭風者方

大麻子　秦膠各三升　皂角屑五合

右三味熟研內泔中一宿漬去滓濆王徧淋沐頭髮燥竟

更別皂角湯灌之付膏一方无皂角

生髮及治頭風痒白屑膏方　烏喙三兩　莽草　石南

細辛　續斷　澤瀉　皂莢　白朮　辛夷　柏葉

白芷各二兩　防風壹兩　竹葉一升　松柏一升　猪脂四兩

右生油三升猪脂二大兩和煎白芷黃為成可有二大升先

以醋浸一夕乃煎十五味並㕮咀細切以清酢三升漬一宿

明且微火煎膏成先沐後以塗之

一法　桑灰汁洗頭去白屑神良

又方　麻子三升末研內泔中一宿去滓且沐一月長二赤

禿无髮方　黑熟桑椹二升內甕中日中暴三七日化為水洗塗

生髮膏方　白芷　青澤蘭　大麻子　桑白皮　苜蓿　桑寄生

蔓荊子一兩　烏雞肪　雁肪壹兩　丁子香　甘松壹兩　零陵

香藿　細辛　竹葉　椒各略　苜蓿　辛夷人　松葉

柏葉　芎藭　杏人　防風　莽草三兩　胡麻油　臘猪脂

各壹右二十六味切以酢漬一宿內油中微火三上三下白芷

黃膏成澤塗頂上髮生矣日三夜一

頭中風痒白屑風頭長髮生髮膏方　蔓荊子　附子　細辛

續斷　皂莢　澤蘭　零陵　防風　杏人　藿香　白芷二兩

松膏　石南各三兩　馬鬐膏　猪脂各二升　莽草一兩　松葉切一升　熊脂二升

右十八味㕮咀細切清酒二升漬藥一宿明旦以馬鬐膏等

微火煎三上三下白芷黃膏成用如澤法

血脉極虛寒鬢髮墮落沐髮潤方

桑白皮切貳斤右一味以水五升淹煮五六沸去滓洗沐髮

鬢數數為之自然不復落也

又方　麻子三升研　白桐葉切壹把右二味米泔汁二升煮

取五六沸去滓以洗沐頭髮鬢不落而長甚有驗
又方　拔白髮用白蜜付髮孔即不復生白也
又方治髮鬢黃赤方
燒梧桐作灰用乳汁和塗付髮鬢并膚肉髮鬢即黑
又鬢髮墮落令生長方　生柏葉切一升　附子四枚　猪膏三升
右三味擣末以膏和為三十九用布裹一丸内煎沐頭汁中
沐髮長不落也
又方　附子　蔓荊子　栢子人各三分
右三味烏雞膏和擣三千杵貯新瓷器中封百日出以馬鬐
膏和以傅頭訖布裹之勿令見風日三十日生藥去滓
令白髮還黑方　隴西白芷　旋覆花　秦椒各一升　桂心一尺
右擣篩以井花水服方寸匕日三三十日白髮黑甚　忌家一
髮鬢禿落生髮膏方　莽草壹兩　防風　升麻　白芷　薺苨各二兩
蜣蜋四枚　馬鬐膏　豹膏　熊膏　猪膏　驢鬐膏

右十一味諸膏成煎各半升合煎諸藥沸則下付火復上火
三五沸乚絞去滓頭當澤用之
髮落生髮方　白芷　附子　防風　芎藭　莽草　辛夷
細辛　黃芩　當歸　椒各三兩　大黃六分　蔓荊子一升
右十二味馬鬐頭膏五合絞臘月猪膏二升合諸藥微火煎
白芷色黃膏成洗頭後用膏付如常澤去勿近面生毛也
風頭毛髮落不生方
鐵生衣篩下臈月猪脂合煎三沸塗日三良亦治眉毛落
髮落不生方　麻子壹升熬黑壓取脂付頭長髮妙
又方　鴈肪傅之
又方　多取烏麻花瓷甕盛密蓋埋之日八十日出用塗
髮令髮易長而黑
又方　麻葉桑葉以泔煮去滓沐髮七遍長六尺
又方　羊糞灰淋汁洗之三日一度洗不過十洗大生

靜嘉堂文庫所藏

頭髮落不止石灰酒方　石灰二升細篩水拌令濕極熱蒸之
下燒炒令至焦以布囊貯即著為候下停冷取二升絹袋
貯之以酒三升漬三宿服半合日三夜一稍加至三合神驗
染髮方　胡粉參兩　石灰陸兩絹下之熬令黃
右二味以榆皮作湯和之如粉先以皂莢湯淨洗髮令極淨
必不得有膩氣好暴乾訖以藥塗髮上令均訖取桑葉相
綴著頭上遍以裹髮一夜至旦取醋漿熱煖三遍淨洗訖
以醋泔熱煖洗髮又取生胡麻苗搗二升汁和水煮一二
沸濾以濯髮訖又用油湯灌之百日黑如漆
髮黃方　臘月豬脂和羊屎灰等分封頭二日一遍
又方　大豆二升極酢漿水二升煮令豆取五升沐之妙
鬢黃方　剪爪甲彈令毛孔血出以蜜塗之生黑毛也
生眉毛方　墻上青衣　鐵精等分水和塗之
又方　七月烏麻花陰乾末生烏麻油和二日一塗

眉毛髮火燒瘡瘢毛不生方　蒲灰正月狗腦和封毛生
又方　蕪菁子末酢和塗毛生
髮落不生方　蟬灰鼈脂和新拔毛却即塗之
又方　除日自拔毛鼈脂塗之
又方　猪狗膽塗之　又方狗乳塗之
拔白髮方　正月四日　二月八日　三月十二日　四月十六　五月廿
六月廿四日　七月廿八　八月十九　九月廿五日　十月十日　十一月十
十二月十日　右依此拔之至老不白也
髮白方　烏麻九蒸九暴末以棗膏丸久服之
又方　生油漬烏梅常用傅頭良
又方　水漬黑椹一斤漬之令塗髮黑也
白禿方　羊肉濕脯炙令香乘熱速搨上不過三四
又方　新殺猪肚去糞及熱速搨上痒慎勿搔當縛兩手當日
中臥半日去之

又方　皂莢湯洗訖乾試以陳久油滓塗之日三
又方　塩湯洗之生油和故蒲葦灰傅之日三
松瀝湯療頭瘡及白禿方　松瀝三合　丹参
雄黄　好水精二両　峭粉　礬石熬一分　黄連三両
右七味搗篩為散内瀝中攪和先以泔清洗髮及瘡无痂傅
藥二日一傅三傅後當更[illegible]洗之凢經三度濃出訖以
甘草湯洗去藥毒前[illegible]洗臥瘥
白禿髮落生白痂終年不差方　五味子　蒺藜　蔓荊子三両
兎絲五合　茯苓　松脂二両　雄黄　雌黄　白蚕一　雞屎白五分
右十味擣篩猪膏一升二合煎三沸内雄黄次内雞屎白次内
蜜次入松脂次内諸藥煎一沸下以汞末之膏成以桑灰
汁洗頭付之　○又白禿方煮桃皮汁飲之并洗上
又方　麵豆豉兩種下篩酢和傅上
又方　炒大黒豆末和臘月猪脂熱煖匙抄封上遍即巣

着忽見風
王不流行湯主白禿及頭面久瘡去蟲止痛方
王不流行　桃東南枝　蛇牀子
牡荊　苦竹葉切　蒺藜子三升　大麻人一升
右八味以水二升半煮取一斗洗瘡日再并療疽痂乳月蝕
瘡爛
松脂膏主白禿及癰疽百瘡方
木蘭　礬石　杜衡　雄黄　附子　大黄　石南
秦膠　真珠　苦参　水銀一両　松脂六両
右十二味以酢漬一夜猪膏一斤半煎之附子黄去滓及内
礬石雄黄水銀更煎三沸還濕地待凝以傅上日三
又方　以羊肉作五味脯灸令香及熱搨上不過三四
烏膏主種種諸瘡不愈者方
水銀壹兩　黄連貳兩　經墨叁分

静嘉堂文庫所藏

右三味以一不中水猪膏和傳上不過再三愈神秘訣多作任
人唯不治金瘡唯須熟研服銀

治赤充方　搗墨椹取二升服二日三

又方　桑灰汁洗頭搗椹封白中縣頭垂

又方　燒牛角灰和猪脂傳　又馬蹄灰末和臘月猪脂傳

治鬼舐頭方　燒猫兒屎臘月猪脂和傳

又方　猫兒毛灰膏和傳　又方塘末和蒜搗付白

治禿瘡方　蕪青子末醋和傳之日三

又方油麻鐵末塗之即生　又方麻子二升熬焦末脂和傳之

又方　東行棗根長三尺以中央艷中心熬之以物承取頭

汁塗頭髮即長

又方麻子三升末研內頭泔中一宿去滓日一沐一月長三尺

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏





版权所有 违者必究

靜嘉堂文庫所藏

小腸腑脉論第一　小腸虛實第二　古論第三

風眩方第四　風癲方第五　鵝掌方第六

對忘方第七

小腸腑脉論第一

小腸腑者主心也舌是其候也心所以合氣於小腸小腸應心為受貯之腑也號監倉吏重二斤十四兩長二丈四尺廣二寸四分左迴疊積環反十四曲定血脉和利精神神者水穀之氣腸胃之中常留水穀二斗四升其實一斗二升是穀也然心應皮皮厚則脉厚脉厚則小腸薄皮緩則脉緩脉緩則小腸大而長皮屈則脉屈脉屈則小腸結也心前受病移於小腸心痛不已小腸受之其小腸痛氣与欬俱出也凡人不食七日死者水穀氣津液皆尽矣命門云小腸絶不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸汗出不止手

少陰与太陽為表裏所以表清裏濁清實濁虛故食下腸實而胃虛故府實而不滿實則傷熱熱則口張口為之生瘡虛則傷寒之則利便泄膿血或發果水其根在小腸起方在治水方中○小腸有實其人下重便血有熱氣必痔小腸有伯食當有發熱明日復出小腸病者小腸痛腰脊控睾而痛時窘之後耳前熱若寒甚若獨有上熱甚及手小指次指間熱若脉陷此見其候也小腸控睾引腰上衝心邪在小腸者連睾係屬於脊貫肝肺胳心系氣盛則厥逆上衝胃動肝散於肓絡於舌厭取之肓原以散之按其所過之經以調之小腸脹者小腸膜脹引拍而痛厥氣客於小腸則憂恐已衝衛手太陽之脉動則咽痛頷腫不可回顧肩似拔脇臑似折黃帝曰手少陰之脉獨无俞何也岐伯對曰少陰者主心主藏太陽之大主也心為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去神去則身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脉也故少陰无俞也黃帝問曰少陰之俞以治心不病乎岐伯對曰其外經府病藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端

小腸府虛實第二

足左主關前至寸口為陽陽絶者死小陽脉也病膀痩小腹中有疝瘕五月即冷上搶心當刺手少陽陽絶者死小陽脉也病膀痩小腹中後横文中入一分左手寸口為陽實者小腸實也心下急熱痺小腸有熱小便赤黃刺手少陽絡少陽穴在左手上第二指間去本節後一寸動脉是也左手關前寸口陰絶者死心脉也若心下毒痛胷中熱時時喜嘔口中傷爛則足少陽左手寸口中陰實心實也若心中有水氣憂恚發之則手心主經在掌後横文中治小腸實熱足左手寸口人迎以前脉陽實者手少陽經也若身熱来去汗出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸實柴胡瀉湯方

湯妻之

治小腸熱脹口瘡柴胡瀉湯方

靜嘉堂文庫所藏

柴胡　橘皮　黃芩　澤瀉　枳實
旋復花　升麻　芒消各三　生地黃切一升

右九味切以水一斗煮取三升去滓下芒消分三服

大黃丸調小腸結熱滿不通方

大黃　芍藥　甚蘆各大戟　朴消各三　巴豆熬去皮二十枚

右七味搗篩赤蜜和飲服如梧子大大人七丸小孩三丸熱去一日一服

俠胃管兩邊相去一寸名曰陰都隨年炙主治小腸熱久炙第十七椎七壯是小腸俞炙左右兩邊各一寸三焦也俠臍兩邊相去各一寸名視舍炙一百壯治小腸中洲痢膿血小兒臧之又炙第十八椎七壯是小腸俞也治小腸虛凡左手十口下人迎以前脉為陽陽虛者苦顛際偏頭痛身耳熱痛者名曰小腸虛寒痛下赤白腸中膿膿補方

乾薑　當歸　芍藥　地榆各四　黃連
阿膠三　石留皮三枚

右以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取洋膠尺分三服

舌論第三

凡舌者心官主小腸之候也舌重十回兩長七寸廣三寸半善用則皮槁而然毛焦枯多食酸則肉肥而脣揭多食甘則脣痛而然髮落心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲酸此五味合五藏之氣也若心藏熱則舌生瘡引脣揭赤若腑寒則舌本縮口噤脣青然麻煎主之方在治面篇中

風眩方第四

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術頗意備所究也少采用之百死遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯明論以貽於後云耳

靜嘉堂文庫所藏

風眩論　○夫風眩之病起於心氣不足胸上蓄熱實故有高
風面熱之所為也痰熱相感而動風風心相乱則悶瞀故謂之為
風眩瞀大人曰顛小兒則為癇其實是此疾此方為治一方一元不愈
但證候不審或致差違大都忌食十二屬肉而奔豚為
氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜　所治
風眩湯散丸有十方凡人初發宜急与續命湯也困急時但度灸
穴便火針針之无不差者初得針竟便灸最良灸法次列於後余
業之以来三十有餘年所救活者数千百人无不差矣後人能睹
得此方幸勿参以餘術焉

眩發頭悶无知口沫出四躰角弓目反上口噤不得言續命湯主
之方

竹瀝二升　生地黄汁一升　龍齒末　生薑　防風
麻黄去節各四兩　防己　附子炮各三兩　石膏七兩　桂二兩

右十味以水一斗煮取三升分三服有氣加附子一兩紫蘇子
一五合橘皮半兩

氣奔急欲絶者奔豚湯主之方

茱萸一升　桂心　芍藥　生薑各四兩　石膏三兩　生葛根十兩
人參　半夏　芎藭各三兩　茯苓一兩　當歸一兩　李根皮仁

右十二味切以水二升清酒八升煮取三升分作三服

言語狂錯眼目茫茫或見鬼精神昏乱防己地黄湯方

生地黄五斤別切勿合藥漬疾小轉用二斤　防己　甘草二分　桂心　防風各三兩

右五味以水一斗漬之一宿絞汁著一面取滓著竹簀上以地黄
著藥滓上於五斗米下蒸之以銅器盛取汁飯熟以向前藥汁
合絞取之分再服已服續命湯口開四肢尚未好定而心中尚
不除者紫石湯主之方在下第五卷補紫石煮散是也

心中驚悸而四肢緩頭面熱心胸痰滿頭目眩冒如欲搖動者
薯蕷湯主之方

薯蕷　人參　麥門冬各四兩　前胡　芍藥　生地黄各八兩
枳實　遠志　生薑各三兩　茯苓六兩　半夏五兩　甘草

静嘉堂文庫所藏

黃芩　竹葉各二把　秫米三合

右十六味江水高丈半手揚三百九十下量取三斗煮米成一斗內半夏復減九升去滓下藥煮取四升分四服先行水處以千里東流水代之校千下不令上頭也秦中无江泾渭可用諸葛灌翁猶尚取之

服前湯後四躰尚不除冷頭目眩動者防風湯主之此湯大都宜長將服但藥中小將息之隨冷煖取捄除差者依此方法

防風　赤石脂　石膏　人參　白石脂　生薑

寒水石　龍骨　茯苓各酌三桂心兩　紫石英一兩

右十一味用井花水八升煮取三升分三服仕果井花取清淨江水无泥又无砂穢源泉遠流順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下

署豫煎方　署豫一斗　甘草炙　澤瀉　人參　黃芩各酌面

麥門冬　當歸　白斂　桂心　防風各三大豆卷

山茱萸　桔梗　芍藥　紫菀　白术　芎藭

乾薑　桂心各三　麻子人二升研　乾地黃三分已上三味末篩篩生地黃八斤搗絞取汁

桑根白皮切三升　麋鼻鹿茸髓　白膠各八兩

煎令黃大棗八斤去核　蜜三升

右以清酒二斗四升煮桑白皮麻子棗得一斗去滓乃下地黃汁膠髓蜜煎減半內前諸藥和却煎之味都足令丸可於鷄子黃飲服一枚日三稍加至三九

頭目眩冒心中煩悶厭厭欲驚悸狂癲署豫丸主之方

署豫三十分　桂心　大豆卷　鹿角膠各七分　當歸

乾地黃　人參　神麴各十分　防風　黃芩

麥門冬　芍藥　术各六分　甘草二十分　柴胡

桔梗　茯苓　杏人脂作　芎藭各五分　白斂

乾薑各三　大棗五枚擘　

右二十二味搗篩合白蜜丸如彈丸先食服一丸日三飲服

靜嘉堂文庫所藏

治頭目眩運屋轉旋倒者天雄散主之方

天雄 防風 芎藭 人參 獨活 乾葛 桂心各二分

白朮 遠志 署預 伏神 山茱萸各六分 甘草四分

右擣爲散先食以菊花酒服方寸匕日二匕漸加至三匕以知爲度

菊花酒法

九月九日鄧州取甘菊花曝乾作末以米饙中蒸熟作酒

治心中時恍惚不定者人參丸主之方

上黨人參 鐵精 牛黃 丹砂 雄黃 菖蒲

防風 大黃各一 赤頭蜈蚣 蜥蜴各一 鬼臼一兩白如米者

右十一味擣篩蜜丸一服七丸日三服夜一稍增之合藥皆忌見婦人青衣人犬鼠勿用青紙凡合藥皆忌觸穢汚雞犬六畜喪孝人具足人見之用前菊花酒在下

灸法以繩橫度口正兩邊既得口度之寸數便以繩一頭更度鼻盡其兩邊兩孔間也得鼻度之寸數中屈之取半合於口之全度合口中屈之先不見頭上廻髮當廻髮灸之以度度四邊左右前後當繩端而灸前以面爲正並依年壯多少一年凡三灸皆瘡差又乃灸數壯如前若連灸連火氣引上前其數如廻髮者則灸其近當鼻也若廻髮近額者亦宜灸若惜面爲瘢則闕其面処然病重者亦不得計此也○食藥方牛羊猪犬雞兎虎馬龍蛇猴鼠等○右件十二相屬物肉皆不得食及以爲藥牛黃龍骨齒用不可廢○嗣啓嗣於方術豈有效益但風眩最是遇患小差者常自寶秘誓不出手而爲作治亦不令委曲得法凡有此篇病是嗣所治未有一人差者負病此而死不逢嗣故也伏願問人立知非嗣之自誇殿下既須此方謹封上呈嗣鄙志尚存謹自書寫年老目闇多不成字猶恕謹白

治風癲方第五

凡癲病發則卧地吐涎沫无知強狂及遺糞者難治治之癲方

灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即差

靜嘉堂文庫所藏

又灸陰莖頭三壯　又灸足大指上叢毛中七壯
又灸囊下縫二七壯　又灸兩乳頭三壯
癲病有五一曰陽癲發作時如死人遺溺有頃乃解二曰陰癲得之初生小時臍病未愈數洗浴因此得之三曰風癲發時眼目引牽縱反急強羊鳴食頃方解熱作汗出當風得之房室過度醉飽滿行事令心氣逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐浴濕結腦沸不止得之五曰馬癲發時反目口噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之方

銅青　雄黃　空青　水銀各一　石長生　伏苓二兩
猪苓　白芷　白斂　白微　人參各一　卷栢
烏扇各半兩　硫黃一兩半　東門上鷄頭一兩

右十五味下篩青牛膽和著銅器中於甑中五斗大豆上蒸之藥成服如麻子三十九日再夜一服者先食飲下

治風癲瘈瘲口眼張大口中出白沫或作声或死不知人虎睛丸方

虎睛一具酒浸一宿炙之　防風　秦膠　防葵
龍齒　黃芩　雄黃　防巳　山茱萸　茯苓
鐵精　鬼臼　人參　乾地黃　牛黃　鉛屑
大黃各四　獨活　遠志　細辛　貫衆　麝香
白斂　白鮮皮各三　伏神　石膏　天雄各七　升麻三分
鬼箭　露蜂房各二　寒水石各六　蛇蛻一尺

右三十一味蜜和酒下十五九如梧子日稍加至二十五九佳

又云温病熱入腎中亦為痙小兒病癇熱盛亦為痙凡風痙甚熱尸厥及鬼魘不寤皆相似宜精察之故經言又厥則成癲是以明知似者也凡風或如狂迷或如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼魅喜怒悲憂煩亂癲倒邑邑短氣不得語語則失志心痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳恍然時復痛熱惡聞人声不知痛癢身悉振搖汗出腥脹頭重浮腫爪之不知痛頸項強口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣掣不得屈伸悉主之方

靜嘉堂文庫所藏

天雄　當歸　人參各五分　附子　防風
天門冬　蜀椒　獨活各四分　烏頭　秦膠
細辛　白朮　乾薑　麻黄　山茱萸
桔梗　白芷　五味子　柴胡　茵草各三分
右二十味共擣下篩治合相得酒服半方寸匕漸至全匕日
三服以身中覺如針刺者則藥行
癲癇厥元時發作方
防葵　代赭　人參　鉛丹　吊藤
伏神　雷丸　虎骨　遠志　桂心
防風　白殭蠶　生猪齒各六分　卷栢　莨菪子
光明砂　升麻　附子　牡丹　龍齒各一分
牛黄二分　蚱蟬十四枚　蛇蛻皮　白馬眼睛一具　白斂四分
右二十五味作散酒服方寸匕日二亦可為丸服良驗
風癲方
葶藶子　鈆丹　栝蔞　虎掌

烏頭各三分　朮一分　椒　大戟　甘遂
天雄各二分　鴟頭一枚　鐵精　藺茹各一兩
右十三味蜜和如梧子服二丸日三湯酒下之
灸法
灸督脉三十壯三報穴在直鼻中上入髮際天窗百會
各漸灸三百壯壯唯小作
又方
灸耳上髮際各五十壯
癲癇瘈瘲方
飛鴟頭二枚　鉛丹一斤
右二味先食服三丸日三劇者夜稍加之蜜丸飲下
虎睛湯主狂邪發無常披頭大喚欲殺人不避水火方
虎睛一具　茯苓　桂心　防風各三兩　獨活　甘草
人參　天雄各二兩　露蜂房一具　鴟頭一具　石長生十兩
香楓樹上寄生五兩
右十二味酒一斗二升煮取三升分四服日三夜一
又方
防葵　人參　貫衆各五兩　防風　桂心各三兩

靜嘉堂文庫所藏

右五味以水一斗煮取三升分四服亦可稍服

又法　　治卒服苦參丸蜜和丸如酸棗十九酒下

灸方　　灸間使穴男左女右隨年壯神良

風癲發之候其狀多喘口邊白沫動无常方

秦膠　人參　防葵　伏神　甘草炙酪三　鉛丹兩　黃漆一勺

右七味以水九升煮取三升半分三服

治風癲失性倒欲死五癲癇雄丸方

雄黃　雌黃　真珠酪二　鉛二碗熬成霜　丹沙二分　水銀八分

右六味搗三万杵丸如胡豆先食服之日二稍加以知為度

丸洒下

續命風引湯治中風癲眩不知人往古腫出方

麻黃　菩薁　石膏　人參　防風各三兩

甘草　獨活　桂心酪三兩　防已　附子

當歸酪一杏人三十枚　陳薑伍兩

右十三味以酒三斗水一斗合煎取四升分四服日三夜一

紫石煮散治大人小兒驚癇癲癎日數十發者方

大黃　龍骨　紫石英　乾薑酪四　甘草　桂心

牡礪酪三　滑石　白石脂　凝水石　石膏　赤石脂酪六

右十二味麞篩下盛以韋囊懸之欲用取三指撮以不汲水三升煮三沸大人服一升再服百日兒一合未能者綿沾著口中熟多者四五服以意消息之

凡發往則欲走或自高貴捐神聖皆須備諸火炙乃得求差耳若或悲泣呻吟者此則為邪非狂自依邪方法治之

治卒中邪魅恍惚振慄方

灸鼻下人中及兩手足大拇爪甲本節令艾丸半在肉上各七壯至十四壯

治卒狂鬼語方

針其足大母指爪甲下少許即止邪入於陽則為狂邪入於

靜嘉堂文庫所藏

陰則為血痺邪入於陽傳即為癲痙邪入於陰傳則為痛
痛陽入於陰病靜陰入於陽病怒
鎮心丸主男子女人虛勞夢寐驚悸失精婦人赤白主崩或
月水不利風邪鬼注寒熱往來腹中積聚悉主之方
紫石英 茯苓 菖蒲 菟蓉 遠志酢五 大豆卷
大黃 麥門冬當歸 細辛 乾薑 卷柏各王合
防風 人參 澤瀉 秦膠 丹參 烏頭 桂心 桔梗 甘草
芍藥 栝子人 石膏 牛黃各二分
署預 銀薄 前胡
白朮 半夏 大棗五枚 蜜丸十二枚 乾地黃十二分
右蜜棗和搗五千杵酒服如梧子五九日三加至二十丸
大鎮心丸所主与前方大同凡是心病皆悉治之方
乾地黃 牛黃 杏人 蜀椒各三 澤瀉

黃芩 茯苓 伏神 大豆卷 署預 前胡
鐵精 栝子人 烏頭 桂心 秦膠 芎窮
人參 麥門冬 遠志 丹砂 阿膠 甘草
大黃 銀薄 白斂 當歸
乾薑 防風 紫石英
右白蜜棗和丸酒下七丸日三加至二十丸如梧桐子大
鎮心丸治小兒驚癎百病鎮心氣方
銀屑 水銀 牛黃六分 茯苓三分 茯神
遠志 防己 白斂 雄黃 人參
芍藥 防葵 鐵精 紫石 真珠四分
右十五味先以水銀和銀屑如泥別治諸藥和丸三歲兒
如麻子二丸隨兒大小增之蜜丸一方有大黃六分
小鎮心丸治心氣小弱驚癎憂錯謬恍惚
方 紫石 朱砂 伏神 銀屑 雄黃 菖蒲 人參

靜嘉堂文庫所藏

拈梗　乾薑　遠志　當歸　甘草　桂心各二　防風
細辛　鐵精　防已各一兩

右十七味㱮下十丸如大豆日三漸加至二十九日三蚕九

大鎮心散治心虛驚悸夢寐恐畏方

紫石英　伏苓　防風　人參　甘草　澤瀉各八分
秦膠　朮　署預　白斂各六分　麥門冬　當歸各五分
杜心　遠志　大黃　石膏　桔梗　栢子人各四分
菟絲　細辛各三分　黃耆六分　大豆染　四合
乾薑　芍藥　乾薑

右二十四味酒服稍增之方寸匕日三服

小鎮心散治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚而驚方

人參　遠志　朮　附子　桂心　黃耆　細辛　乾薑
龍齒　防風　菖蒲　乾地黃　赤小豆二　茯苓四兩

右十四味搗為末酒服二方寸匕日三

大鎮心散治風虛心氣驚弱恍惚失常悲愁不樂方

紫石英　白石英　朱砂　龍齒　人參　細辛
天雄　附子　遠志　乾薑　乾地黃　伏苓
朮　楚　防風各二

右十五味酒服二方寸匕日三

治風癲方

黃芩子三升搗篩酒一升漬半日絞去之湯中煎之可
九先食服如小豆二九加至五九以知為度額上手中
從文理中亦起是知也先此候尚服比日發者三日愈間
日發者十日愈五日發者二十日愈半歲發者一月愈

酒服　又方　天門冬汁　地黃汁　取汁作前服之差

天門冬酒方通治五藏六府大風洞泄虛弱五勞七傷徵結滯氣
吟蝕諸風癲癇惡疾耳聾頭風四肢拘攣腰腿瀝節方病皆主
之久服延年輕身齒落更生白髮更黑方天門冬与百部相似天
門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利天門冬汁一斗漬麴
二升麴發以米二斗淮家法醞造酒春夏極冷下飯冬秋温如

靜嘉堂文庫所藏

人飢酒熟取清服一盞常令酒氣相接至醉法慎生冷酢滑雞猪
魚蒜忌油膩此是一斗法餘或一石二石三石亦准此状以爲本率服
藥十日齊身癢大痒漸乃三十日止此皆是風氣出去故也四十
日即身心朗然大快似有所得五十日便覺大快似有所得五
十日便覺大快當坐臥覺風不著人身中諸風悉不用米法先
淨淘米暴炊令乾臨欲用時更別取天門冬汁漬米乾漉炊之餘
汁拌飯取天門冬汁法淨洗天門冬去心皮乾漉去水切之擣押
三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式
服之久停則香美餘酒皆不文也凡八月九月即少合至十月多
合擬来年五月三十日以来服之春三月亦得合入四月不得合
服酒時若得散方倍速散方如左
天門冬去心皮曝乾擣篩以上件酒服方寸匕加至三匕久服長
生常酒亦得服

灸法　治大人癲小兒驚癇法灸背第三椎及下窮骨兩処
以繩端一處是脊骨上也凡三処畢復断繩作三折令各等而
參合如厶字以一角注中央灸下二角俠骨兩邊便灸之凡
五処也故畫圖法以丹処所灸五処各百壮削竹皮為度勝繩
也

狂風罵詈撾折人名為熱陽風灸口兩吻邊赤白際各
一壮陰嚢縫一灸三十壮令人立以筆正注當下已卧核卵上
以灸之勿令近前中卵核恐害陽氣也

治卒發狂方　卧其人著地以冷水淋其面終日淋之良

治卒狂言鬼語以甑帯急令縛兩手大指便灸左右脇下對屈肘
兩処火俱起各七壮須臾鬼語自道姓名乞得去徐徐語問之乃
解其手焉

倉公法狂癇不識人癲病眩乱灸百會九壮。狂走瘈瘲灸玉
枕上三寸一法頂後一寸灸百壮。狂走癲疾灸項後二寸十
二壮。狂邪鬼語灸天窓九壮。狂邪妄語灸口兩吻十五壮
狂癇哭泣灸手逆注三十壮穴在左右手腕後六寸。狂走驚

靜嘉堂文庫所藏

癇灸河口五十壯穴在腕後曰中動脉是也與陽明同也
狂癲風癇吐舌灸鼻管百壯不針○狂走癲疾灸大鉤百壯○狂言妄
狂走癲癇灸三肋三十壯○狂言悅惚灸天柱百壯○狂言妄
語灸閒使三十壯穴在腕後五寸骨上兩骨間○狂走喜怒悲
泣灸三攢隨年壯穴在背上甲內側反手所不及者骨並六分
捻之痛者是也○狂邪鬼語灸伏兔百壯○狂邪鬼癇病灸承
命三十壯穴在內踝後上行三寸動脉上○狂癲風鬼語灸
煩灸三陽五十壯○狂癲鬼語灸足太陽四十壯狂走鬼恍惚
灸足陽明三十壯○狂癲癇易疾灸足少陽隨年壯○狂走癲
厥如死人灸足大指三毛孔中九壯狂走亦灸八會隨年壯穴
在陽明下五分○狂癲驚走風恍惚瞑喜罵笑歌哭鬼語悉
灸頭太陽腦戶風池手太陽陽蹻少陽陽蹻足跟悉隨
年壯合三十六穴○驚怖心忪少力灸大橫五十壯○邪鬼
妄語灸縣命四十壯穴在口唇表中央絃絃若是也一名

鬼祿　又方　用剛刀決斷絃絃乃佳○悲泣鬼語灸大
府五十壯悲泣邪語鬼狂歌哭灸慈門五十壯○驚恐哭泣灸
腕後五寸兩筋間三十壯即間使穴○驚狂走病灸手內內
踝上三寸近後動脉上○邪病四肢重癇諸雜候灸澤上之一
名鬼堂邪病語不止灸諸雜候入中上之一名鬼市一名鬼客
聽凡人中西忽先押下是也邪病卧瞑瞑不自知風府主之一名鬼
穴邪病大喚罵逐灸十指端去爪一分主之一名鬼域○大
九占風之家亦以風為鬼斷邪病鬼癲內上主之一名鬼臣
主四肢重○邪病大喚罵走遠三里主之一名鬼邪勞宣一名
鬼路陽澤一名鬼臣耳前髮際宛宛中名鬼受足太陽名鬼路

治諸橫邪癲針灸面決方
凡諸百邪之病者源起灸途也其有種種衆相示表顛邪之
端而見其病或有默默而不言或復多言而謾說或歌或哭

靜嘉堂文庫所藏

或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露躰或晝夜遊
走或嗔罵無度或見蜚蠱精靈手乱目急如斯種類癲狂
之人今針灸並方藥並主之
扁鵲曰百邪所病者針有十三穴也凡針之躰先從鬼宮起次
針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴即可知矣
若是邪蠱之精便自言說論其由来往驗有實立得精靈未
必須盡其命求去与之男從左起女從右起若數処不言便徧
穴針也依决而行針灸穴等並畜主之仍須依掌决捻目治
之万不失一黄帝掌决別是術家至要縛鬼禁不交五岳四瀆
山精鬼魅並悉禁之有目在兩手中十指節間
治風邪方灸間使隨年壯　又灸承漿七壯
又灸心俞七壯　又灸三里　又方　商陸根三十斤去皮
右細切以水八升東向竈煎減半去滓更煎令可丸服如
梧子一丸勿令一切人見合時良若方亦神良

又服大豆紫湯汗出佳　又燒蝦蟆末水服方寸匕日三
又燒人屎灰酒服慎生冷酢滑猪雞魚
又以水服龍肝方寸匕日三　凡百邪鬼魅服頭垢小豆
大　治鬼魅方　灸入髮一寸百壯　間使手心各五十壯
狐魅合手大指縛指灸合間二七壯當狐鳴即差
治魅方　水服鹿角末方寸匕日三　又水服獺肝日三
治諸狐魅諸老精魅与人作種種惡怪令人恐怖方
雄黄六斤　油一斗二升
右二味破雄黄如棊子大鐺中以盆合頭作竈微火九日
九夜煎之不得少時火絶亦不得大猛火熱微微不絶
心風驚悸第六
治風虛滿頸項強心氣不定不能食之方
伏神　麥門冬各四兩　人參　羌活　遠志
甘草　當歸　五味子　紫石各二兩　生薑
靜嘉堂文庫所藏

防風　黃耆各二　生薑五兩　酸棗三升
右十四味以水一斗三升煮酸棗取一斗去棗內藥煎取
三升半一服七合日三服夜二服
治百病鼉甲湯方治邪氣夢寤時悌泣不欲聞人声體中
酸削乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲食或因疾病之後勞
動疲極或觸犯忌諱衆諸不節婦人產生之後月經不利時下
青赤白肌膚不生肉虛羸瘦小便不利或頭身發熱旋復解
散或一度交接弥日困極藥皆主之方
鼉甲七枚炙　甘草炙　白微　貝母　黃芩各二兩
防風三兩　麻黃　芍藥　朮各二兩半　凝水石
桂心　茯苓　知母各四　石膏六兩
右十四味切以水二斗煮取四升溫服一升日三夜一
治男子得鬼魅欲死所見驚悸欲走時有休止皆邪氣
所爲不能自絕九物牛黃丸方

荊實人精　牛黃土精　曾青蒼龍精　玉屑白虎精　雄黃地精
空青天精　赤石脂朱雀精　玄參真武精　龍骨水精各一兩
右九味名曰九精上通九天下通九地下篩蜜和服如小
豆先食吞一丸日三服稍加以知為度
服荊瀝法治心虛驚悸不定羸病方
荊瀝二升　白鮮皮　伏神各三兩　人參二兩　白銀十兩以水一斗煮取三升
右五味切以荊瀝銀汁中煮取一升四合分三服相去如人
緩行十里更進一服
又方　荊瀝二升
右一味緩火煎之取一升六合四分溫一服
四合日三服夜一服差止
治百二十種風癲癇驚狂及發即吐沫不識人方宜四月
五月服煮散方
紫石英研　芍藥　黃龍骨　麻黃去節　赤石脂
當歸　甘草炙　桂心　人參　括蔞

靜嘉堂文庫所藏

白鮮皮各二　大黃五兩　吐蠣粉三兩
右十三味搗篩馬尾羅之分作七裹每一裹棗十枚水三升煮取二升半去棗下一裹藥煎取一升去滓頓服相去七日一服〻訖即若吐宜溫粥生冷魚蒜
遠志湯治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚心中煩悶耳鳴方
遠志　黃耆　茯苓　甘草　芍藥　當歸
桂心　麥門冬　人參各二　獨活四　生薑五　附子一兩
右十二味以水一斗二升煮取四升服八合人羸可服五合日三
伏神湯治風經五藏大虛驚悸安神定志方
伏神　防風各一　人參　遠志　甘草　龍骨
桂心　獨活各二　細辛　乾薑各六　白朮一兩　酸棗一升
右十二味以水九升煮取三升分三服
治心氣不足驚悸汗出心中煩悶短氣喜悲怒恚不自知咽喉痛口唇黑嘔吐舌根強水漿不通者方
紫石英　伏苓　人參　紫蘇　遠志　當歸
伏神　甘草各二　麥門冬一升　大棗卅枚　赤小豆三合
右十一味水一斗二升煮取三升分四服日三夜一
補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通方
紫石英研　伏苓　人參　桂心各二　麥門冬三兩
紫菀　甘草各一　赤小豆廿枚　乾棗七枚
右九味以水八升煮取二升半分三服春夏服之佳
遠志湯主心氣虛驚悸喜忘不進食方
遠志　乾薑　鐵精　桂心　黃耆　紫石各二兩
防風　當歸　人參　伏苓　甘草　芎藭
羌活各二　麥門冬　半夏各四　五味子二合　大棗十二枚
右十七味以水一斗三升煮取三升半分五服日三夜一
定志補心湯主心氣不足心痛驚恐方

靜嘉堂文庫所藏

遠志　菖蒲　黃芩　人參　各四兩

右四味以水一斗煮取三升半分三服

傷心湯主傷心氣不足腰背相引痛不能俛仰方

伏神　黃芩　遠志　乾地黃酪一甘草　阿膠　糖酪一　半夏　附子　桂心　生薑酪一石膏　麥門冬各四兩　大棗三十枚

右十四味以水一斗半煮取三升去滓內糖阿膠煎取三升二合分三服

小定心湯治虛贏心氣驚弱多慮方

茯苓四兩　桂心三兩　甘草　芍藥　乾薑　遠志　人參酪三棗十枚　右八味以水八升煮取三升分四服日三夜一

大定心湯治心氣虛悸悅惚多忘或夢寤驚慮方

人參　茯苓　伏神　遠志　龍骨　乾薑　當歸　甘草　白朮　芍藥　大棗　桂心

柴苑　防風　赤石脂各二兩

右十五味以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜一

雞勞失志方　甘草　桂心酪一　龍骨　麥門冬　防風　牡厲　遠志酪三沃神酢　大棗二十枚

右九味以水八升煮取二升分二服相去行五里久又一服

治卒中風四肢不仁苦笑不息方

芎藭　黃芩　當歸　桂心　秦艽　乾薑　麻黃　黃連酪二杏仁二十枚

右十味水九升煮取三升頓服一升日三服令大汗出

治風歷年成歌哭大笑言語无所不及方

人參　白朮酪一　芍藥　甘草　防己　黃芩　當歸酪一　麻黃三兩

右十味水一斗二升煮取三升分三服日三覆取汗

五邪湯主邪氣淫泆或歌或哭方

靜嘉堂文庫所藏

禹餘粮 防風 桂心 防
甘草 白朮 人參 石膏 牡蠣 秦艽 各二兩
朮 防已 菖蒲 雄黄 伏神 蛇蛻 各一兩
右麤篩水一升半内三方寸匕日煮二沸去滓服之日四
好志方第七
治好忘久服聰明益智方 龍骨 虎骨 遠志 貝等
右三味為末食後服方寸匕日二酒服
又方 七月七日取菖蒲酒服方寸匕日飲酒不醉
又方 常以甲子日取石菖蒲一寸九節者陰乾百日治
合末飾酒服方寸匕日三耳目聰明
又方七月七日麻勃一斗真人參二兩末之蒸令氣遍夜欲
臥服一刀圭尽知四方之事酒服
又方戊子日取東邊桃枝二七枚縛着卧床中枕之不
忘又方常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木
人着衣帶中令人不忘
又方 七月七日取蜘蛛網着衣領中勿令人知不忘
又方 孔子大聖知枕中方
龜甲 龍骨 遠志 菖蒲
右四味等分酒服方寸匕日三常服令人大聰
令人不忘方
菖蒲 伏令 伏神 人參 貝母 遠志七分
右五味酒服方寸匕日三夜一五日知神良
又方以丁酉日自至市買遠志累着衣中角頭不復忘
又方 菟絲 續斷 遠志 菖蒲 菟丝 各三分
右五味酒服方寸匕日三至老不忘
開心散主好忘方 遠志 人參 菟絲 菖蒲 一兩
右四味散服方寸匕日三
益智九方 遠志 人參 菖蒲 生薑 各五

桂心二分　茯苓六分　附子四分

右八味如梧子一服七丸至二十九日二夜一主治心損喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目禁如藥法以飲服之

養命開心益智方

乾地黃　人參　伏苓　蓯蓉各三兩

兔絲子　遠志各三分　蛇床子一分

右七味散服方寸匕日二忌猪肉餘死忌飲服

北平太守八味散方

天門冬六分　乾地黃四分　桂心　茯苓各一分

菖蒲　五味子　遠志　石韋各三分

右八味酒水任服方寸匕後食三十日服力倍六十日氣力強志意足

治健忘方

天門冬　遠志　茯苓　乾地黃等分

右蜜丸如梧子酒下二十九日三服加至三十九常服之勿絕

孫真人千金方卷第十四

靜嘉堂文庫所藏

脾藏脉論第一　脾虚實窓第二消食　脾勞第三
肉極第四 祕溢　肉虚實第五　熱瘧第六
冷痢第七

脾藏脉論第一

論曰脾藏者意ㇾ者存憶之志脾主土為諫議大夫並四藏之所受存変謂之思因而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智ㇾ從而生謂之意ㇾ者主脾之藏也口唇脾之官脾氣通於口和則能知五味故云口為戊舌為已循環土腑上出頤頰候於唇下迴脾中榮華於舌外主肉內主味脾重二斤三兩主藏意秩祿號為意藏隨節應會所謂脾藏志ㇾ合意在氣為噫在液為涎希鵲曰脾有病則色萎黃實則舌本強直虛則多癖善忘注利又精氣并於脾則肌溢恐懼而不解則傷於精ㇾ傷則骨萎骨萎則病又精是五藏主不可傷ㇾ則土失而虛ㇾ則元氣之脾氣衰主与胃合為

靜嘉堂文庫所藏

腑其經足太陰与足之陽明為表裏其脉緩相於夏王於季夏土
子曰金ㇾ土常不相離金畏於火逃於水中水為金子閉門塞戶
內外不通此謂冬時土失其子其氣衰微水為洋溢浸漬其地走
擊皮膚面目浮腫喘於四肢愚醫見水直下下之虛胃水遂居
之肺為喘悸肝反畏肺故下沈沒下有荊棘恐傷其身僻在一邊
以為水流心衰則伏肝微則沈故令水伏而沈醫工逐占因轉孔
穴利其溲便遂通水道甘液下亡真陰陽喘息則微汗出正流肝
著其根心氣因起陽行四肢肺氣停ㇾ喘息前安腎為聲其味醎
倚坐毋敗涕臭如腥土得其子即成為山今得其毋名曰丘矣黃
帝問故伯曰脾脉獨何主歧伯對曰脾土也孤藏以灌四傍者也
善者不可得見惡者可見黃帝曰惡者何如歧伯曰其來如水之
流者此謂太過病在外如鳥之距此謂不及病在中太過令人四
肢沈重強脾ㇾ脉緩脾脉來和柔相離如雞践地曰平季夏以
胃為本脾脉來實而盛鼓如雞舉足曰脾病脾脉之堅銳如鳥之
啄如鳥之距如水之流如屋之漏曰脾脉死真脾脉來至弱乍疏
乍數乍大乍小如雀之啄如水之流如屋之漏曰脾脉死真脾脉來至弱乍疏
乍數已青黑不澤毛折乃死季夏胃脉微軟弱曰平胃小弱多脾
病但代死曰氣曰死軟弱有石曰冬病弱甚曰今病脾藏榮ㇾ舍
意愁憂不解則傷意ㇾ傷則悶乱四肢不舉毛髮堆悴面色痿黃
夭死于春足太陰氣絶則脾不營脾主肌肉唇舌唇舌者肌肉之
本也脾弗營則肌肉濡肌肉濡則舌萎人中滿則唇反唇反
者脾死甲笙乙死木勝土也脾中風者吸ㇾ發熱形如醉入腹內
煩重皮貌瞤ㇾ則吸ㇾ短氣六月季夏建未也坤未之間季土王
位脾王之時其脉大阿ㇾ然而緩者名曰和平人也反得弦而急
者是肝木之来脾土五行之中木是土鬼木之剋土為大逆十死
不治反得微濇而短者是肺金之来脾土之子子之扶母不
治自愈甚能為君致死子能為父報讎故自愈反得沈而滑者水
也是腎ㇾ土北方壬癸水也水之乘脾土鄉病合即差反得浮而
滑者是火也南方離宮午位火王盛夏心也火能生土反得心之

靜嘉堂文庫所藏

乘脾毋之剋子不治當差脾脉長大而弱來疏去概一呼再至一
吸再至曰平人三至曰離經病四至曰脫精五至曰死六至曰命
盡死人行之足太陰脾脉其色黃躰青飲食吐逆四肢重節疼良
久不已胕不舉其脉當浮大而緩今反
弦急其色黃而及青此木之剋土為大逆十死不治脾病色黃飲
食不消復苦脹滿躰重節痛大便不利其脉微緩而長此可治宜
服平胃九茱萸附子湯春刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之仲夏五
月刺大都補之又灸章門五十壯背十七椎百壯脾弱者大便堅
小便利問曰脾氣弱何謂曰病利不白腸垢不能更衣又汗出不
止名曰脾氣弱或吞液注下者黃白赤黑脾病者身重苦肌肉痠
足痿不收行熨脚下痛虛則腹脹鳴濇泄食不化取足太陰經腸
明少陰經血者并在脾胃肌膚陽氣有餘陰氣不足則熱中若肌
陽氣不足陰氣有餘即寒中腸鳴腸痛陰陽俱有餘若不足則有
寒有熱皆謂三重脾之積名曰痞氣在胃脘腹大如盤久

不愈病四肢不收黃癉食飲不為肌膚炎冬月壬癸日得之肝病
傳脾病傳腎水水適以冬十
肝木剋脾土故肝不肯受因久留而結如盤椀以冬得之有所犯作若因醉以入房汗出當風則復之
脾氣虛則夢食飲不足得其時則夢見築室蓋屋風雨脾脹者善噦四
肢急體重不能食病在脾曰呿欠惠平旦甚日中特下晡靜安強食
則嘔胃管病腹脹善噫得噫後快然如喪身體皆痒是主
脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛溏泄水閉黃癉好臥不能食肉瘕腹脹腫凝足大指不用為
此諸病盛則瀉之虛則補之甚則疾出之寒則久留之陷下則灸
之不盛不虛以經取之並論針法盛者右手寸口脉大三倍左手
於人迎脉虛者左手寸口脉大三倍左手人迎脾脉沈之而濡浮
之而虛苦煩滿胃中有熱不嗜食之而不化大便難四肢苦痺則

靜嘉堂文庫所藏

不仁得之房內[illegible]微不來來而并脾脈急甚為瘈瘲微急為膈中
食飲入而還出後沃沫緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧
然无疾大甚則擊仆微大為痺氣衰大膿血在腸胃外小甚為寒
熱微小為消癉滑甚為㿉癃微滑為蟲毒蛕蝎腸熱濇甚為腸
頽微濇為內潰多下膿血脾脈之至也大而虛有積氣在腹中有
厥氣女子法得之疾使四肢汗出當風脾病身重體痛一日脹二
日小腸月脊口三日背膂筋痛小便閉十日死冬日入夏晏食師
曰脈浮而乳浮則為陽乳則為陰浮乳相搏胃氣則熱其陽則絕
右手寸口脈弦而滑弦則為痛滑即為實痛即為急實即為踊弦
踊相搏即胷脇搶息趺陽脈浮而澀浮即為胃氣微澀即脾氣衰
微澀相搏即呼吸不得此為脾家失度右手寸口脈雙緊即為入
其氣不出无表有裏心下實堅趺陽脈微即少氣澀則傷脾寒在
膈而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已困噫寒在胃上
虛下實穀氣不通右手寸口脈緩而遲緩則為陽其氣長遲即為

陰榮氣不足榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必強趺陽脈滑
而緊滑即胃氣實緊即脾氣傷得食而吞不消者此脾不治也病
人脾出必脾先落也凡人病脈解而反暮煩者人見病者差安而
強與穀脾胃氣尚弱不消穀故令微煩損穀即愈動作頭痛屬
胃熱朝者屬胃脈診得脾積浮大而長肌減飽見䐜起与穀諍減
如果桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重足脛瘈不能臥足主
肌肉積色黃皆為脾々合肉々黃如鮑腹主口脣々是脾之候其人
土形相比於上宮黃色台面大頭美肩背大腹多肉好股行小手
足以下相稱行安地舉足心平好和為人無登貴長感而生病主足
太陰條々然
脾應月々若有舒盈脾隨四季小大為々脣六口小聚上脣厚下
脣薄无齗鉗脣鈌破此人脾不正揭脣者脾高々則實々則
熱々則季脇痛滿脣垂而大不堅則脾下々則脾虛々則危々則寒々
則身重不能行步脣堅者脾堅々則脾藏安々則不病脣上下好

靜嘉堂文庫所藏

者則脾端正上端正則脾胃利人無病脣偏舉者則脾偏痛好脹
凡主脾曰口分部中陷起者必有病生胃陽明爲心之部並藏格內
格外部亦無心隨沉濁爲內浮清爲外若外入胃所部則起起則前
病陽後陰若裏病內出所部必陷陷則前病陰後治陽陽則實
熱陰則虛寒寒主外熱主內人死生休否則藏神前變形于外脾
先病則脣口燋枯無潤若脾先死脣則乾青白漸縮急齒噤不開天
中等分墓色應必死不治脣色厚薄以判太陰促者則不出三百日
內促則旬朔之間曰脾病必愈而卒死何以得知之曰青黑如母
指大靨點見顏上此必卒死
扁鵲曰脾絕不治凡面青目黄病人著床心氣短息脾獨內傷百
日後愈欲起傍徨因坐於地其上倚床能治此者可謂神良又面
黄目赤不死黄如枳實死吉凶之色出於分部霏霏而見黑黄入
脣必病不出其年其穴在鼻上當兩眼是其分部位也若於上下
應三年禍必至也宮音人者主脾聲歌其音如鼓如生吼其人急怒

其足太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽反祚陽氣內擊陰氣外傷
傷則寒寒則舉體消瘦語音沉濁如破鼓之聲舌強不轉而好咽
唾口噤脣黑四肢不舉身重如山便利無度此不可治又言聲憂
懼舌本卷縮此是木剋土陽擊陰陰氣伏陽氣起起則實實則熱
熱則悶亂體重不能轉側語聲以宮聲氣深不轉而心急此爲脾邪
熱傷甚不可治扁鵲云脣雖萎黄語音若轉可治脾病爲瘧者令
人寒腹中痛鳴醒即熱汗出若其人本來少於喜怒而反常瞋喜
無度正言而鼻笑不答於人此脾病聲之證不出五百日禍必至也
陰陽之疾經絡之源究尋其病取其理從順行治萬不遺一也
季夏土王脈色黄主足太陰脈也其月土在中宮封之前四寸上舌
本中封是內踝上本筋裏宛宛中脈本從中封上四寸是也
其脈根在于隱白隱白在足內大指節是○其脈筋起於足大指
之間內側上結於內踝聚於陰入絡腸胃著於脇其脈起於大指
之端白肉際內踝直上膝股入腹上膈連舌本還心中爲脾絡胃合

陽明病為表裏陽明在足跌上大指間上三寸骨解中也　同會
手太陰其人太陰別名曰公孫去本節後一寸別走足陽明厥
逆則霍乱嘔熱則腹中切痛々則陽病陽脉反大於寸口二倍
病則舌強筋轉引縮牽陰股引胃痛腹身重食不下心急注脾
脾痛虚寒則腹中鼓脹々則陰病　陰脉反小於寸口一倍病則
泄水不能自煩而強欠股膝内筋痛若折々細々者脉時緩々動
發動甚者死不治四季之月各餘十八日此為四季之餘日主脾
胃黄肉陳病也其源從太陰太陽相格節氣相移三焦寒邊不調
四時關格而起則藏腑傷痾隨時受厲陽氣外泄陰氣内伏超
其病相若腑虚則陰邪所加頭重頭直皮肉強脾藏若實則陽疫
所傷蘊而結核起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉之中上散入
髮下貫顳顬隱々而熱不相斷離故黄肉陳病也痛謂口炎肝脾
二俞主治丹毒四時陳病當依源補瀉虚實之狗皮肉陳熱則
鍼破薄帖方呪促治疾無逃矣

治脾虚實方第二

凡右手關上脉陰實者若足寒腫熱腹脹滿煩擾不臥名曰膿實
熱舌本強直或夢歌樂而體重不能行宜瀉脾胃熱湯方

前胡　伏苓　龍膽　細辛　芒消各參
杏人肆　玄參　大青各貳　苦竹葉切壹
右九味以水九升煮取三升分三食後服
夜千煎方主治同前

夜千　大青　石膏　赤蜜壹斤
右四味以水四升煮取一升五合去滓下蜜煎取二升各三服
第十一椎名脾俞刺主四肢寒熱腰痠不得俛仰身黄腹滿食嘔舌
根直灸十一椎又左右各一寸三壯灸各七壯兩乳間名身堂主上氣
厥逆百壯　脾熱面黄宜赤豕膚痛滿

生夏　枳殼　栀子　芒消各參
細辛　伏苓　白朮
杏人　生地黄各壹

靜嘉堂文庫所藏

溪竹茹切壹升　薑切兩

右十一味以九水九升煮取三升去滓下消分三服

凡右手關上脉陰陽俱實者名曰脾胃俱實病苦脾脹腹堅搶脇下痛胃氣不轉大便難時反苦泄腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不出喉痺精少瀉熱方

大黃　麻黃　黃芩各肆兩　杏人　赤茯苓

甘草　橘皮　芒消　澤瀉各叁兩

右九味以水九升煮取二升絞去滓內大黃煮兩沸去滓下芒消分三服

治脾脉厥逆右手寸口大腹中熱切痛苦舌脹腹脹身重食不下心注脾急急痛大黃澤瀉湯方

大黃參兩細切水壹升半別漬一宿　澤瀉　茯苓　黃芩

細辛　芒消各貳兩　甘草　橘皮各二兩

右八味以水七升煮取三升三合去滓下大黃更煎兩沸去滓下芒消分三服

治脾熱脇痛熱滿不歇目赤不止口脣乾烈方

石膏壹斤　生地黃汁　赤蜜各壹升　淡竹葉切伍升

右四味以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清煮石膏取五升五合去滓下地黃汁兩沸次下蜜煎取三升細細服

治脾熱偏痛胷滿脇偏脹方

茯苓　橘皮　澤瀉　人參各叁兩　芍藥

白朮各肆兩　桂心貳兩　石膏捌兩　半夏陸兩　生薑切壹升

桑根白皮壹升

右十一味以水一斗二升煮取三升分三服若須利下芒消二兩

凡右手關上脉陰虛者脾虛冷也苦泄注腹滿氣逆霍亂黃癉煩不得臥腸鳴虛腹脇痛有息有時發作方悉補之

五加根皮　猪椒根皮　丹參　橘皮各壹斤　地骨皮

乾薑　朮各八兩　乾地黃　芎藭　附子各五兩

靜嘉堂文庫所藏

桂心　桔梗各肆兩　大棗伍拾枚　甘草參兩

右十四味切以酒四斗漬服七八合加至一升日再

凡右手關上脉微浮陰陽俱虛者名曰脾胃俱虛也苦胃中如飢

狀少氣不足以息四肢逆寒泄注腹脹善噫食則欲嘔泄澼溏下

口乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤喉痺補之方

黃連壹兩　馬餘粮貳兩　白术參兩　大麻仁兩

乾薑參兩　桑白皮捌兩　大棗貳拾枚

右七味以水一斗二升煑取三升分四服

大麴蘗丸主消穀斷下溫和又寒冷長脹不霍乱

大麴蘗末　麴末各壹升六月六日者　附子　乾薑　當歸各伍兩

人參參兩　赤石脂壹兩　桔梗　甘草各參兩　皂莢

茱萸各伍兩　椒貳兩半　烏梅肆拾枚

右十三味末蜜酢中半漬梅一宿蒸三升米下去核擣如泥和藥

以蜜和擣三千杵服十九日三下甚者加龍骨阿膠艾各三兩

並丸如梧子大

消食斷下丸寒冷者常服之方

麴末　大麥蘗末各壹升　吳茱萸肆兩

右三味蜜和服十五丸如梧子日三

溫脾丸久病虛羸脾氣弱食不消喜噫方

黃蘗　大麥蘗　吳茱萸　桂心　乾薑　細辛

附子　當歸　大黃　麴六月六日者熬　黃連各壹兩

右十一味擣蜜丸如梧子日三每服十五丸

麻豆散主脾氣弱不下食餌此以當食方

大豆黃末二升　大麻子三升熬令香末之

右二味和飲服一合日四五任情多少

乾薑散主不食心意冥然忘食方

法麴末　乾薑末　乾豉末　椒末　大麥蘗末各一升上

右五味食後服三方寸匕日三以能食為度米飲下

靜嘉堂文庫所藏

消食丸主數年不能食方

小麥蘗 麴(各壹升七合者) 乾薑(亖) 烏梅(各肆兩)

右四味蜜和服十丸日再至四十丸寒在胃中乃反胃番心者皆差陳米飲下

凡身重不得食ゝ味心虛滿時ゝ欲下喜臥者皆針胃管大倉服健中湯仍服此平胃丸方

杏人(伍十枚) 丹參 苦參 葶藶 玄參(各二兩)

大黃(肆兩) 芎藭 桂心(各壹兩)

右八味擣篩為末蜜丸如梧子大五丸日三酒下

麴蘗散主消穀能食除腸中水氣臚脹方

法麴(壹升) 杏人 麥蘗(各伍兩)

右三味食後酒服一合日三

治脾胃俱虛苦飢寒痛方

人參 當歸 桂心 茯苓 桔梗 芎藭

厚朴 甘草 橘皮 吳茱萸(各參兩) 白术(伍兩) 麥蘗(壹升)

右十二味以水一斗二升煮取三升分三服

治脾胃俱虛冷白术八等散方

白术 厚朴 人參 茱萸 茯苓

麥蘗 麴 芎(各參兩)

右八味酒服方寸匕食後日三

治脾寒飲食勞倦不消臚脹噫滿憂恚不樂檳榔散方

人參 茯苓 陳麴 厚朴 麥蘗

白术 吳茱萸 檳榔子(十枚炙皮子俱用已上各八分)

右八味為散食後酒服二方寸匕日再

脾勞第三

凡脾勞病者補肺氣以益之肺王則感脾是以聖人春夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本矣肝心為陽脾肺腎為陰

治脾勞實四肢不用五藏乖反脹滿氣急不安方

靜嘉堂文庫所藏

半夏　宿薑各捌兩　茯苓　白朮　杏人各參兩
竹葉切壹升　橘皮　芍藥各肆兩　大棗貳拾枚
右九味以水一斗煑取三升分四服
治脾虛寒勞損氣脹噎滿不食方
豬膏參升　宿薑汁伍升　吴茱萸壹升　白朮壹斤
右四味擣三味細細下爲散内薑汁膏中煎取六升
酒服方寸匕日再此方大人服也

肉極第四

凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病爲肌痺肌痺不已復感於邪内舍於脾體癢淫淫如鼠走其人身上津液脱腠理開汗大泄鼻端上色黃是其相狀也凡風氣藏於皮膚肉色則敗以季夏六月戊己日傷於震風從東北來擊脾爲風脾風狀多汗陰動傷寒寒虛則體重怠墮四肢不欲舉不嗜飲食食則欬欬則右脇下痛陰陰引肩背不可以轉動名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱熱則實實則人身上如鼠走唇口壞皮膚色變身體津液滲泄腠理開汗大泄名曰惡風而須決其紀知其終始陰陽動靜肉之虛實實則瀉之虛則補之能治其病者風始入肉皮毛肌膚筋脉之間即須決之若入肉腑五藏則半死矣方在第八卷中○扁鵲曰肉絶不治五日死皮膚不通外不出内不可決人命將絶十死不治若使良醫爲藥終不治也

肉虛實論第五

論曰肉虛者坐不安席身危變動肉實者坐安不動喘氣虛實之應主於脾胃若其臟腑有病從肉生熱則應臟寒則應腑方在第八卷中　○秘澁關格大便不通方
芒消　烏梅根皮各五兩　杏人各兩　麻人各參兩　大黄捌兩
右六味以水七升煑取三升分三服一方无烏梅加枳殼乾地黄各二兩
治大便秘塞不通神方
豬羊膽各壹

右二味以角灌一合許令深入即出矣出不盡須臾〻灌一方
加冬葵子汁和之亦有椒豉湯五升和猪膏三合灌之佳臨時
易可得即用之又煎蜜成煎如人指大深入穀道佳又無灰濃
酒半升鹽三錢匕煉成如上法

三黄湯治下焦熱結不得大便方

大黄三兩 黄芩二兩 甘草一兩 梔子二七枚

右四味以水五升煮取一升八合分三服若大秘加芒消二兩

治脹滿不通方

芍藥 芒消各四分 黄芩五分 杏人 大黄各八分

右五味蜜丸梧子大飲服十五丸日三 ○又方

通草 朴消各八 郁李人 黄芩 瞿麥 車前子五合一方二升

右六味以水八升煮取二升半分三服一方用絹袋盛煮頓服三升

又方

獨顆蒜燒熟去皮綿裹内下部中氣立通

削薑裹塩道之並佳 乾薑塩杏人之丸道之佳

五柔丸治秘澁及僻飲食不生飢膚實瘦預調補方

大黄一斤蒸三斗米下 前胡二兩 半夏 一 蓯蓉

芍藥 茯苓 當歸 葶藶 細辛各一兩

右九味擣合下擣萬杵先食後服十五丸如梧子大日再以蜜丸

凡候面黄者即知大便難趺陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便
數澁浮相搏則大便堅秘其病為脾弱者其人大便堅小便利而
不渴治之方

大麻人 枳殼各二斤 杏人一升去尖皮熬 芍藥八兩 大黄一斤 厚朴一尺

右六味蜜丸梧子大飲服五丸日再漸加至十丸一方芍藥六分

大便不通方

當陸 牛膝各三斤 大戟一斤 大豆五升

右四味切以水一五升煮取二升以大豆五升煎令汁盡至豆乾
初服三枚以通利為度

婦人大小便不利方

靜嘉堂文庫所藏

葵子貳升　消石貳兩

右二味以水五升煮取二升分再服

濡藏湯主大小便不通六七日腹中有燥屎塞迮煩悶短氣汗出脹滿方

生葛根貳斤　猪膏貳升　大黃壹兩

右三味以水七升煮取五升去滓內膏煎取三升澄清強人頓服羸人再服

大五柔九主藏氣不調大便難通榮衛利九竅消穀益氣力方

大黃　芍藥　枳殼　薤白各壹兩　茯苓　牛膝　桃人百枚　葶藶　杏人四拘枳

右十味蜜和九如梧子三十九日三加至二十九酒下

治老人小兒大便失禁方

灸兩脚大指去甲一寸三壯又灸臍下一寸三壯又灸橫文百壯

治大小便不通

灸臍下一寸三壯又灸橫文百壯

又方　葵子壹把　青竹葉壹把　水二升煮一沸頓服

又方　葵子一升　榆皮切壹以水五升煮取一升分三服

又方　葵子一升水三升煮取一升內猪膏一升空腹二服

又方　乾漆燒取十和蒲黃方寸匕日三

又方　水一升煮猪脂一斤三沸飲汁立通

又方　蜜和胡粉雞子黃內大孔中即出

又方　水四升蜜一升合煮熟冷灌下部中一食即通

論曰有人因時疾差後得秘塞不通逐致天命大不可輕之所以備述單復諸方以療危卒此練中九主宿食不消大便難方

大黃　捌兩　芒消　各肆兩　杏人　芒消各肆兩

右四味蜜丸如梧子食後服二七九日三稍加之

灸秘澁法

腹熱閉時大小便難腰痛灸連岡百壯灸在小腸俞下二寸橫三寸間灸之

大小便關塞寒氣結心堅滿灸石關百壯復不通灸足大都隨年

靜嘉堂文庫所藏

壯○大小便不利欲作腹痛灸築衛四穴在督脊四面各一寸
大小便不利灸八髎百壯穴在腰目下三寸夾脊相去四寸兩邊
各四穴計八穴故名八髎音遼
小便不利大便注泄灸天樞百壯穴在夾臍相去三寸魂魄之舍
不可針大法在臍旁一寸名臍相去可三寸

蝕刺方第六

論曰余立身已來三遭蝕刺一經冷刺皆日夜百餘行乃至移牀
就廁其困篤如此但率意自治者尋手皆愈乃知此疾天下易治
但中庸之俟率性橋倨良醫苦口不能剋已早餌朝過望暮以期
自差疾勢日增胃氣漸弱心力俱微食飲臨口嘗不能進飯不時
飡便稱痢病難治斯皆自誤也學者須深達斯旨勉強隨宜服
一物皆得差二唯須方意苦已服食以差為限則無不愈也又大
須慎口重者差後百日次者一月所以嘗哀驕恣者大不能自慎
興言於此以為天橫矣

論曰古今痢方千萬不具載此中但撮其效者七八而已雖然弘
之在人也何則陳壓九烏梅丸烏梅丸久下得之焉能不愈
温脾湯健脾丸久下得之焉能不愈
論曰大凡痢有四種論冷熱蟲毒雖無節度多睡眼澁蟲毒則純痢瘀無熱則多益黃連去其乾
薑冷則加其熱藥痢則以藥吹灌下部蟲毒則以蟲法治之雖飲
食主對與病相當復自勉勵服餌焉得不愈者也
論曰凡服止痢藥初服皆劇愚人不解即止不服此特不可但使
藥與病源的相主對雖劇但服不過卅三服漸漸自知唯非其主
對者本勿服也

○治熱毒痢方

苦參　橘皮　獨活　阿膠　藍青
黃連　鬼臼　黃蘗　甘草

右九味等分下篩以蜜丸如梧子服十九日三
稍加之至下注痢者大良飲服

靜嘉堂文庫所藏

治大熱毒純血痢治不可差者方

大黄 陸兩以水七升煮取三升半夜露著星月下旦空肚頓服之以將息即止不差加黄連二兩更作服之仍不差者以痢痢法治之

治赤滯下方

成煎猪膏 參合 清酒 伍合

右二味緩火煎十沸適寒温頓服之取差方止

凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬豉鹹所食諸食皆大須熟爛為佳亦不得傷飽此將息之大經也若將息失所聖人亦救也

治下雜血方 蠱毒

乾藍 犀角 地榆 各貳兩 蜜 貳合

右四味以水五升煮取一升半去滓下蜜煎取五合分三服此治熱毒蠱毒

治下痢絞痛腸滑不可差方

黄連 阿膠

右五味若大冷白多以痛者去黄連當歸以水煮之

陳壁九治百病下痢及傷寒身熱頭痛目赤四肢煩疼不解胸熱下痢或膿已吐下之腸內虛煩欲得冷飲、不能消腹中絞痛温食則吐下熱下冷狀如温瘧或小便不利氣滿嘔逆下痢不步

水中陳壁 參兩 漢中木防已 陸兩 紫石 參兩 厚朴 壹兩

隴西當歸 伍兩 三歲薄苦酒 伍升 豉 參升 黄連 貳兩

右八味皆取真新者以苦酒二升漬防已極令潤出之留苦酒置以利刀切防已厚令一分使厚薄悉等以枝瓦覆著炭火上以厚紙籍瓦上布成切了防已著紙上訖從頭依次反周而復始令色燋爆復漬向餘苦酒中更出著瓦上熬之如此盡苦酒止勿令火猛徐徐熬令極燥各擣下篩竟都合擣千杵以餘三

靜嘉堂文庫所藏

升苦酒漬豉一宿明旦以瓦盂盛又以一盂覆之蒸五升七下
頓土氣通流熟出之於盆中研豉以新布絞取其濃汁如棗膏
法和藥擣三千杵頓丸皆如水中雞頭子大分著數囊中懸令
陰乾取燃乃更好盛著甲中以蠟蜜封其際勿令風塵此
藥以三丸一劑平旦以井花水服一劑晝服一劑若服一劑皆
以水服之初服寧少食當餉食水餐飲消腹中調
和者日可一服若已差者二三日可一服消息以意若病重藥
力未行者但盡益服日可四五劑藥或時下不止者當復更增
令腹中有藥力飲食消是其效也新服藥未安調當水餐助藥
力心中則了缺〻後極可作羹臛但當餐食之耳若有時不喜
冷食者正是藥力盡耳復益服藥至一宿許則復欲進冷也若
欲不復藥者但稍溫食藥力自盡矣服藥不必須強多飲水也
自隨體調取之下虛服之如法禁熱食生魚豬肉蒜生菜酒〻
士藥力令病者煩熱也又禁辛物諸肥膩及難消物皆勿食若

有風疾如防風一兩人蔺可加石斛一兩若宿有下疾腸胃損
弱者可加太一禹餘粮二兩若婦人產後
疾及寒疾加石留黃二兩小便黃赤不剌加蒲黃一兩依方消
息之無不得效也

治下久赤白連年不止及霍乱脾胃冷實不消溫脾湯方

大黃 兩緯 人參 甘草 乾薑各貳兩 附子壹枚炮 桂大者

右五味以水六升煮取二升半分三服與後溫脾湯以異須大
轉瀉者當用此方神効熱剌水穀者用後方

黃連 阿膠各參兩 烏梅 黃檗 梔子各參拾枚

右五味煮取二升半分三服亦治匿神良
諸下血先見血後見便此為遠血宜服黃土湯先見便後見血此
為近血宜服赤小豆散方

赤小豆參升熬令胖 當歸參兩

右二味擣篩為散服方寸匕日三米飲下

靜嘉堂文庫所藏

黃土湯伏龍肝湯是方並在第六卷治血方中
治諸熱毒下黃汁赤爛血赤滯如魚腦腹痛壯熱方
黃蘗 黃芩 升麻 石榴各陸分 白頭公 寄生
當歸 牡厲 犀角 甘草各壹兩 黃連貳兩 艾葉參兩
右十二味以水六升煮取二升分三服
治冷熱不調或五色血者方
右酢石榴五枚合殼子搗絞取二升汁服五合差止
治下赤連年方 地榆 犀角 黃芩 各壹兩
右二味以水二升煮取一升分二服如不止取屋塵漬去滓服
一升分二服
又方 鼠尾草 薔薇根 秦皮如無用櫚皮代之
右三味水淹等分煎去滓銅器重釜煎成丸如梧子服五六丸
日三稍增差止亦可濃汁服之半升
治夏暴冷忽則壯熱泄痢引飲熱湯不斷變通身浮腫成冷下結

脉沈細小數方
澤漆 茱萸 茯苓 白朮 桔梗 當歸各參兩
犀角 青木香 海藻各壹兩 芍藥 大黃各貳兩
右十一味以水九升煮取三升分三服下後消息五六日許可
與女麴散
治熱毒下黑血五內絞切痛日夜百行氣絶欲死方
黃連糟 龍骨 木各貳兩 阿膠炙 乾薑
當歸 赤石脂各參兩 附子壹兩
右八味以水一斗煮取五升分五服余以貞觀三年七月十二
日忽得此熱毒痢至十五日命欲絶家造此方藥入口即定
治血痢方
蒲黃參合 乾地黃 桑耳 甘草 芒消
茯苓 參兩 百葉 阿膠 艾葉各參兩
赤石脂伍兩 禹餘粮 黃連各肆兩 生薑貳兩 鹿茸壹兩

靜嘉堂文庫所藏

右十五味以水一斗煮取四升分五服温服神効

白頭公湯主赤下下血連月不差方

厚朴二兩　阿膠　黄連　秦皮　附子　黄檗
茯苓　白頭公　芍藥貳兩　乾薑　當歸
赤石脂　甘草　龍骨各參兩　乾棗參拾枚　硬朩二兩

右十六味以水一斗二升先煮朩令熟出朩內藥煮取三升分四服

治下血虚極爽門冬湯方

麥門冬　朮各肆兩　甘草貳兩　牡蠣　芍藥
阿膠兩各參　棗貳拾枚

右七味以水八升煮取二升分再服

龍骨丸主下血下痢腹痛方

龍骨　當歸　龍膽　附子　乾薑各伍兩　赤石脂
礬石各參分　黄連伍兩　畢甲　羚羊角　甘草

右十二味蜜和先食服如小豆十二九日三加至二十九

又方

熟艾絡參　牛角鰓　當歸　乾薑
附子　黄檗　赤石脂　芍藥
阿膠　厚朴　甘草　橘皮

右十九味以水一斗三升煮取四升去滓內牛角鰓末阿膠消以綿絞去滓分七服日四夜三下血日夜七八十行方

黄連　黄檗各貳兩

右二味淳酢五升煮取一升半分再服治大便下血方　第二十椎主便血灸隨年壯凡赤白下灸髂脊頭唯多為佳

又方

酒四升煮錢四百文取二升分三服

又方

亂髮雞子大燒末水服不過三服

靜嘉堂文庫所藏

泄痢食不消不作肌膚灸脾俞隨年壯
泄注五痢便膿血重下腹痛灸小腸俞百壯
泄痢久下失氣勞冷灸下腰百壯三報穴在八髎正中央脊骨上
灸多益善也三寸骨是也
泄痢不禁小腹絞痛灸毋田百壯三報穴在膊下二寸
泄痢不嗜食久不消灸長谷五十壯三報穴在俠膝相去五寸一
名循際 ○泄痢亦白偏灸腕骨五十壯
久冷五痢便血灸中脘中千壯
小兒頭乾下痢上氣五痢便血失尿灸迴氣百壯穴在脊窮骨上
久泄痢百治不差灸足陽明下一寸膏肓之上兩中去大指歧三
寸灸隨年壯先屈竹量正當兩膀脊上兩膀點記下量一寸點兩
傍各一寸腹下量一寸當脊上合三處一灸三十壯灸一百以
上一切痢皆斷亦治濕冷脊上當膀點處灸 又方
灸臍中稍稍三百壯 又方 灸關元三百壯十日灸并

治冷腹痛在臍下三寸也

冷痢方第七

凡痢脉遲實者為未止宜以利藥下之○凡脉數而滑有宿食
急下急下必差之復不止者為下不盡更下之○凡痢腹有燥屎宜下之大孔痛者溫暖之下而腹痛為
寒下之腹滿不減者下之欲飲者熱下痢脉散而渴欲自愈下熱
汗出愈下痢手足無脉灸之不溫微喘者死下痢古黃燥不渴胃
中實下不止者死下痢後脉絶手足厥睟時脉還手足溫者生不
還不溫者死下痢脉沈弦者下重其脉大者為未止脉小浮弦者
血氣上結心胸脉弱數者散自已脉雖發熱不已下痢脉返浮數
尺中自溫者必清膿血有熱故也設脉復緊為未解下痢三部皆按之其脉緊
急下之下痢脉遲滑實也痢為未止○凡厲下之後心下堅痛
脉浮此寒但當溫之寒脉沈緊亦狀脉大浮強下當已

靜嘉堂文庫所藏

凡一五藏絶於內者下不自禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不失一病體例略如此耳○素問曰春傷於風夏為飧泄秋多下水也患是冷也夫積冷積熱及水穀實而下者以大黃湯下之強人勿過兩劑皆消息五六日更進一劑

一也夏傷於風秋必洞泄秋多下水也患是冷也夫積冷積熱及

違一劑其效遊湯不效者可三四日進一劑

凡白痢屬冷赤痢屬熱

治久冷痢下純白者此由積冷處經久痛發遂令脾胃俱冷日

夜五六十行大小腹痛不可忍方

上上好麴 天仁升微熬令香

右一味溫清淳酒令熱和麴末一升空腹一頓服之日三服

若至食時擣辣一升令至熟下薑椒末調和常食之法唯須

稠勿加鹽以水和麴二升作餻麴極爛煮之乾濕熱內辣薑

臼中相和一頓食之以與餻食至飢時仍進前食麴不須

比至差來少食餻食以此法治不過兩日無不差

治久冷或痢不痢但患腰腹苦冷方

上新蜀椒 參升醋宿漬

右一味以麪三升和椒一升緊捍煮作餅空肚頓服之加恣飲

盖任性調和不差更作以差為限不過一升椒即愈此不但治

冷大治諸虛損冷極有所益久當自聞

馬蘭九治積冷痢下白膿方

馬蘭子 壹升熬 附子 捌分

神麴 熬 麥蘗

右九味擣以酒服方寸匕日三服稍增以知為度九服亦佳

治痢於貴勝用建脾丸多效今治積久冷痢先以溫脾湯下訖後

以建脾丸補之未有不效者宜家難以克辨亦無可將息溫脾

湯方治積久冷熱亦白者方

大黃

桂心 酪參

右五味以水七升煮取二升半分三服

附子 乾薑 人參 酪貳

甘草 椒各

阿膠 炙酪貳 黃連 拾貳

椒伍分

乾薑

靜嘉堂文庫所藏

建脾丸主虚勞羸瘦體重脾胃冷弱不消飲食雷鳴腹脹泄痢不止方

鍾乳　赤石脂　好麴　大麥蘗　當歸
黃連　人參　細辛　龍骨
茯苓　石斛　桂心兩銖　附子一兩　蜀椒汗分

右十五味白蜜丸如梧子酒服十五丸加至四十丸弱者飲服此方通治男女

又增損建脾丸治丈夫虛勞五藏六腑傷壞受冷初作滯下久變五色赤黑如爛魚腹極臭穢者方

鍾乳　赤石脂各參　禹餘糧　茯苓
桂心　石斛　五味子　澤瀉　遠志
寄生　梧子人　人參　白頭翁　天雄
當歸　石榴皮　牡蠣　龍骨　甘草兩各貳

右二十味蜜和酒服二十丸日三加至四十丸凡此二方止痢神驗丸如梧子大

駐車丸主大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無度腹痛方

黃連陸分　乾薑貳兩　當歸　阿膠炙參兩　當歸貳兩　甘草壹兩

右四味以大酢五合煙膠和之併手丸如大豆乾之大人服三十九小兒經歲三九餘以意加減日三服飲下

黃連湯主赤白痢方

黃連　乾薑　石榴皮
黃檗　當歸　甘草各貳兩

右水七升煮取二升分二服

茯苓湯主困下空竭欲死滯下膿血日數十行羸劣垂危老少並宜方

人參　乾薑　黃連
當歸　桂心　芍藥
甘草兩貳　赤石脂大如棗貳枚

右十四味以水五升煮取二升半服不差滿三劑此方主風

靜嘉堂文庫所藏

虛冷痢最佳
大下後腹中空竭胷中虛滿不下食方
芍藥　甘草　生薑㕮咀　桂心各參兩
右七味以水八升煮取三升分三服三劑最佳
痢心胷不快滿腹中雷鳴或吐方
黃連伍兩　橘皮　棗拾伍枚　人參壹兩　生薑　甘草炙各貳兩　半夏洗各捌兩　龍骨參兩
右八味以水一斗先煮水一大沸乃內藥煮取三升分四服并
姙身良
斷痢湯胷心下伏水方
半夏洗　生薑伍兩　甘草　茯苓　龍骨各貳兩
黃連各參兩　棗貳拾枚
附子壹枚　人參
右九味以水八升煮取二升分三服

下後煩氣暴上香蘇湯方
香豉伍兩　生蘇壹把各用子參兩
右二味以水五升煮取二升頓服
暴下積日不住及久痢方
龍骨　甘草炙　芍藥
石榴皮壹顆大者阿膠捌分　附子炮
右十味以水八升煮取三升分三服
至聖湯
黃連伍兩　生薑貳斤
右二味以水五升煮取二升頓服未止更合服必定
熱病時氣下赤白痢逐成膿血方
女戒參分烏頭炮　桂各肆分　黃連　雲實
代赭壹分
右七味下篩蜜和為丸如梧子大兩丸若六下痢宿勿食漸旦

靜嘉堂文庫所藏

以冷水服之勿飲食云二日中過後乃飲食若得藥力明旦更
服如前亦可長服虛羸晝夜百行膿血亦差
倉米湯主小腹冷氣積聚結成冷痢日夜三十行方
倉粳米（半升淘） 薤白（壹握去青切細） 羊腎（壹具去脂膜熬）
香豉（三升以水壹斗煎取伍升澄清）
右四味先以羊脂煎薤白令黃并米內豉汁中煎取四升旦空
肚溫服一升如行十里更進一升得快利止若利更服如前利
後進粳米豉粥差復更服一劑永差
卒大下痢熱唇乾口燥逆引飲瀉心湯方
人參 甘草 黃芩 橘皮
栝蔞根（壹兩） 黃連（貳兩） 半夏（參兩） 乾薑（壹兩半）
右八味以水六升煮取二升分三服
治三年痢不止方
厚朴 乾薑 阿膠（各壹兩） 黃連（伍兩） 石榴皮 艾葉（各三兩）

右六味以水七升煮取二升分再服
大桃花湯主冷白滯痢腹痛方
赤石脂（捌分） 乾薑 當歸 龍骨 牡蠣（各參兩）
附子（貳兩） 朮（壹升） 甘草 人參（各壹兩半） 芍藥（壹兩）
右十味以水一斗二升煮朮取九升內諸藥煮取三升分三服
膿加厚朴三兩炙嘔者加橘皮二兩
○又方
龍骨（壹兩） 厚朴 當歸（各參兩） 赤石脂（伍兩）
右四味以水七升煮取二升半分三服熱加白頭公十分牡蠣
三兩
四續丸主三十年注痢骨立痿黃腸滑不治方
雲實（伍合熬令香） 龍骨（參兩） 附子 女萎（各貳兩） 朮（貳兩）
右五味為末以蠟煎烊以丸如梧子服五丸日三不過五六服差
三十年下利所入之物皆不消化或青或黃四肢沉重起即眩倒
骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦筋轉起止須扶陰冷無子方

赤石脂貳兩 乾薑參兩 蜀椒炒去汗參兩 烏梅拾箇
右五味下篩椒薑烏梅煮取汁和米下蒸令飯熟內薑椒末合
擣三千杵蜜丸服梧子大十九日三服不差至二十九加黃連
艾一斤並飲服
下痢丸主數年痢下氣消穀令人能食夏月長服令人不霍亂方
法麴壹斤 附子 乾薑 黃連 黃檗 桂心各參兩
椒半兩 烏梅貳斤 大麥蘗芽 吳茱萸肆兩
右十味蜜和食後服如梧子十九日三加至二十三十九再食
再服可至四十九飲服
久痢熱諸治不差方
烏梅壹斤熬 黃連壹斤
右二味蜜和服如梧子二十九日三夜一神妙飲下
治數十年下痢不止消穀下氣補虛贏方
好麴 大麥蘗各壹斤 附子 當歸 桂心各貳兩
黃連壹斤金色者

蜀椒 黃連
右十味蜜丸如梧子食已服二十九日三服飲服
治腸滑食藥俱完出方
黃連 烏梅肉
右五味蜜丸如梧子酒服二十九日三亦可再服
烏梅丸治冷痢久下方
烏梅拾箇 乾薑拾兩 黃連壹 當歸 蜀椒炒去汗肆兩
細辛 附子 桂心 黃檗 人參各陸兩
右十味下篩以苦酒漬烏梅一宿去核蒸五升米下擣如泥盤
中攪令相得蜜和擣二千杵食前如梧子大十九日三服稍增
至二十丸酒下慎生冷
治痢神方
黃連剉分 龍骨 赤石脂 厚朴各參兩
甘草各壹分 阿膠貳分 烏梅肉

靜嘉堂文庫所藏

右七味擣散以漿水服二方寸匕日二小兒一錢匕

桃花丸治下冷臍下攪痛方

赤石脂　乾薑各拾壹兩陸銖

右二味丸如豌豆服十丸日三服加至二十丸飲服

治積三十年常下痢神方

赤松樹皮去上蒼皮一升為散麪粥和一升服之日三差即止四十年痢服之百日差

治卒暴冷下下部疼悶方

燒塼令熱大酢沃之三重布覆坐上即差

治諸久痢不差方

灰汁洗去亂髮中垢曬燒末　赤黃連末各壹升

烏梅肉貳兩　酢　白蠟　羊脂壹分　蜜[illegible]

右七味合內銅器中湯上煎之攪可丸飲服如梧子大四十丸日二服

又方

黍米貳升　[illegible]　羊脂　膠各貳兩

右四味合煮作粥一服令盡即差

孫真人千金方卷第十五

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏



国立公文書館所蔵

靜嘉堂文庫所藏

胃腑脉論第一

論曰胃腑者土髀也口唇者是其候也髀合氣於胃胃者
水穀之腑也號倉廩守內藏更重二斤十四兩迂曲盘伸
長一尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀二斗五升其中
當留穀二斗水一斗五升廣胦大頸張胃五穀乃容而滿
上焦泄氣出其精微慓悍滑疾下焦下溉諸小腸此腸
胃所受水穀之數也平人則不然胃滿則腸虛腸滿則胃
虛更滿更虛氣得上下五藏安定血脉和利精神乃居故
神者水穀精氣也五藏不足調於胃故腸胃之中當留穀
二斗四升水一斗一升故人一日再至後併圓後二升半
一日中五升水一斗一升故人一日再至後併圓後二升半
一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡故平人不

靜嘉堂文庫所藏

飲不食七日而死者水穀精氣津液皆盡故七日而死矣
右手關上陽絕者無胃脉也若吞酸頭痛胃中有冷刺足
大陰治陰在足大指本節後一寸
右手關上陽實者胃實也若腸中伏伏一作幅幅不思食得食
不能消刺足陽明治陽在足上動脉浮而乳浮則爲陽
乳則爲陰浮乳相搏胃氣生熱其陽則絕
趺陽脉浮大者此胃家徵虛煩冒必日再行動作頭痛重
執氣朝者蠹胃
胃脉搏堅而長其色赤當病折髀其要而散者當病食痺
髀痛病先發於胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛痠三日
之膀胱背膂筋痛小便閉五日上之心脾心痛閉塞不通
身痛體重靈樞云三日不已死冬夜半後夏日昳

胃病者腹脹胃管當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食
不下下取三里
飲食不下膈塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在下
管則散而去之
胃脹者腹滿胃管痛鼻聞焦臭妨於食大便難
胃癉令人口病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽
明大陰橫脉出血
胃中有癖食冷物者痛不能食食執則能食脾前受病移
於胃脾couple不已嘔吐長蟲
厥氣客於胃則夢飲食
診得胃脉病形何如肉胃脉實則脹虛則洩脾應肉腳肉
腳堅大者胃厚肉腳麼者胃薄肉腳小而麼者胃不堅肉

靜嘉堂文庫所藏

胭不稱其身者胃下胃下者脘約肉胭不堅者胃緩肉胭無小果累標緊者胃急肉胭多小果累者胃結胃結者胃上脘約不利

扁鵲云足太陰與陽明為表裏脾胃若病實則傷熱熱則引水發常渴虛則傷寒寒則苦飢常痛發於風水其根在胃先從四肢起腹滿大通身腫方在治水篇中

胃絶不治五日死何以知之舌腫溺血大便赤泄

足陽明之脉起於鼻交頞中旁約太陽之脉下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中其支者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兎下膝入臏中下循胻外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者跗上入大指間出其端是動則病悽悽振寒善伸數欠顏黑病至惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為骭厥是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎脣胗頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳街股伏兎骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口

胃虛實第二 脉一條 方二首 灸法一首

靜嘉堂文庫所藏

胃實熱

右手關上脉陽實者足陽明經也病苦頭痛（脉經作腹中堅痛而熱）汗不出如温瘧脣口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛名曰胃實熱也

瀉胃熱湯方

梔子人　射干　升麻　茯苓（各叁兩）

芍藥（肆兩）　白朮（伍兩）　生地黃（汁）　赤蜜（各壹升）

右八味㕮咀以水七升煮取一升半去滓下地黃汁煮兩沸次下蜜煮取三升分三服老小以意加減

胃中熱病

灸三里三十壯穴在膝下三寸

胃虛冷

右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得臥惡風寒灑灑目急腹痛虛鳴（耳虛鳴外臺作時寒時熱）脣口乾面目浮腫名曰胃虛冷也

補胃湯 治少氣口苦身體無澤方

柏子人　防風　細辛　桂心　橘皮（各貳兩）

芎藭　吳茱萸　人參（各叁兩）　甘草（壹兩）

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服

人參散 補胃虛寒身枯絕諸骨節皆痛方

人參　甘草　細辛（各陸分）　麥門冬　桂心

當歸（各柒分）　乾薑（貳兩）　遠志（壹兩）　吳茱萸（貳分）　蜀椒（叁分）

右十味治下篩食後温酒服方寸匕

喉嚨論第三

靜嘉堂文庫所藏

論曰喉嚨者腑胃之候也重十二兩長一尺二寸廣二寸
其會圍十二重應十二時主通利水穀之道往來神氣若
藏熟喉則腫塞氣不通鳥鬚膏止之方卷中若腑衰喉則
耿耿如物常欲空虛痺涎唾熟則開之寒則通之不熟不
寒依藏調之方見第十六卷中

反胃第四脉二條 方十六首 灸法二首

寸緊尺澁其人胃滿不能食而吐吐止者為下之故不能
食設言未止者此為胃反故尺為之微澁
趺陽脉浮而澁浮即傷脾脾傷即不磨朝食暮
吐暮食朝吐宿穀不化名胃反趺陽脉緊而澁其病難治
治胃虛反食下喉便吐方

人參壹兩 甘草 桂心各貳兩 橘皮

乾薑兩各叁兩 茯苓肆兩 大黃陸兩 青竹茹伍兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升一服七合日三夜一
巳利者去大黃
治反胃而渴方

茯苓 澤瀉

右五味㕮咀以水五升煮取三升分三服一方肆兩入生薑
治胃反吐逆不消食吐不止方

人參 澤瀉 桂心各貳兩 茯苓肆兩

橘皮 甘草 生薑別兩 半夏壹升 麥門冬叁升

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升二合一服八
合日三夜一羸人六合巳利去大黃

靜嘉堂文庫所藏

治胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷方

橘皮叁兩　甘草　厚朴　茯苓
桂心　細辛　杏人　竹皮各貳兩
檳榔拾枚　前胡捌兩　生薑伍兩　人參壹兩

右十二味咬咀以水一斗三升煮取三升分三服一方有甘皮二兩　人參各貳兩

又方　橘皮叁兩　白术
蜀椒壹伯粒　桂心壹兩　雞白壹握

右六味咬咀以水二升漬一宿內羊肚中縫合以三升水煮水盡出之決破去滓分三服

治反胃大驗方

前胡　生薑　各肆兩　阿膠壹兩　大麻人伍合　橘皮叁兩

桂心叁寸　甘草伍寸　大棗拾枚　吳茱萸肆合

右九味咬咀以水二升煮取一升七合分二服

華佗治胃反胃反爲病朝食暮吐心下堅如杯升往來寒熱吐逆不下食此爲關上寒澼所作將成肺癰治之之方

眞珠　雄黃　卅砂各叁兩　朴消伍兩　乾薑拾累

右五味爲末蜜丸如梧子先食服三丸若小煩者飲水即解然無所忌神良無比一方用桂心一兩

治胃反食即吐方

擣粟米作麨水和作丸如梧子大七枚爛煮內醋中細細吞之得下便已麨亦得用之

治胃反不受食食已即嘔吐方

大半夏湯　半夏叁升　白蜜　白术各壹升　人參貳兩　生薑叁兩

靜嘉堂文庫所藏

右五味咬咀以水五升和蜜揚之二三百下煮取一升半分三服

治胃反食即吐出上氣方

蘆根　節根各貳兩細切

右二味以水四升煮取二升頓服之得下良

又方　飲白馬尿即止

又方　燒先死雞胜脛灰酒服男雄女雌

又方　淘小芥子曝乾爲末酒服方寸匕日三

又方　灸兩乳下各一寸以瘥爲度又灸臍上一寸二十壯又灸內踝下三指稍邪向前有穴三壯

治酢咽方

麴末壹斤　地黃參斤

右二味合擣日乾以酒服三方寸匕日三

反胃

治噫酢咽方

吳茱萸半斤生薑參兩　人參貳兩　大棗拾貳枚

右四味咬咀以水六升煮取二升先食服一升日再

治中散　治食後吐酸水方

乾薑　食茱萸各貳兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二胃冷服之立驗

嘔吐噦逆第五

夫吐家脉來形狀如新卧起陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦爲吐寸口脉緊而乳緊即爲寒乳即爲虛寒虛相搏脉爲陰結而遲其人即噎關上數其人則吐趺陽脉微而澀微即下利澀即吐逆穀不得入趺陽脉浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不入其人即嘔而

靜嘉堂文庫所藏

不得食恐怖如死覺緩即瘥嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥難治

論曰凡服湯嘔逆不入腹者先以甘草二兩水三升煮取二升服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘湯即流利更不吐也凡嘔者多食生薑此是嘔家聖藥

半夏湯 治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方

半夏壹升 生薑壹斤 茯苓 桂心各伍兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分三服若少氣加甘草二兩

前胡湯 治寒熱嘔逆少氣心下堅聚彭亨滿不得食寒熱痟渴補不足方

前胡 生薑各叁兩 甘草

朴消湯下

大黃別浸各貳兩 芍藥 茯苓 麥門冬

當歸 半夏 滑石 石膏

栝蔞根 黃芩 附子 人參各壹兩

右十六味㕮咀以水一斗二升煮取六升分四服

治嘔吐四肢痺冷上氣腹熱三焦不調方

前胡 芎藭 甘草 當歸

石膏 人參 桂心 橘皮各貳兩

芍藥叁兩 半夏肆兩 生薑伍兩 大棗叁拾枚

右十二味㕮咀以水一斗二升下黃芩二兩合煮取三升分三服一方不用黃芩

小麥湯 治嘔吐不止方

小麥壹升 人參

厚朴各肆兩 甘草壹兩

靜嘉堂文庫所藏

生薑汁 各三合 茯苓 各三兩 青竹茹 二兩半

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服

猪苓散 治嘔而腸上寒方

猪苓 茯苓 白朮 各各三兩

右三味治下篩以飲服方寸匕日三渴者多飲水

犀角人參飲子 治嘔逆胃氣虛邪風熱不下食方

犀角 人參 各各二兩 雞白 五兩 粟米 一合

右四味㕮咀以水四升半煮取一升七合下米煮令米熟分四服相去七里久進一服

治春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變爲噦方

橘皮 桂心 葛根 各二兩 白茅根 一升

右四味㕮咀以水六升煮取二升分二服數進服盡更

合有熟去核

小半夏加茯苓湯 治諸嘔噦心下痞痛膈間有水痰眩悸

者方見第十八卷中

治嘔噦方

人參 一兩 胡麻人 一升 橘皮 一兩分 枇杷葉 一升

右四味㕮咀以水一斗煮枇杷葉取五升下藥煮取二升內麻人稍飲之

又方 一升粳米切二升以水一斗煮取四升分四服

治氣厥嘔噦不得息方

豉 一升 半夏 一升 生薑 二兩 人參 甘草 各二兩

前胡 桂心

右七味㕮咀以水九升煮取二升分二服

靜嘉堂文庫所藏

又方 大棗拾伍枚 附子壹枚 橘皮貳兩
豉壹升 生薑 甘草各壹兩
右六味㕮咀以水九升煎取二升分二服日三
治卒嘔噦厥逆方
飲新汲冷水叁升佳
橘皮湯 治乾嘔噦若手足厥冷者方
橘皮肆兩 生薑半斤
右二味㕮咀以水七升煮取二升分三服不止更合服之
治傷寒後噦乾嘔不下食方
生薑粳切壹升 青竹如壹升 粳米叁合
右四味㕮咀以水五升煮取二升分三服不止服三劑
又方 通草 橘皮各貳兩 生薑粳切壹升 粳米叁合

右四味㕮咀以水四升煮取一升半分二服
治乾嘔吐逆涎沫出者方
半夏 乾薑各壹兩
右二味㕮咀以漿水一升半煮取七合頓服之日三
治病人乾嘔方
取羊乳汁飲一杯
治乾嘔方
酒浸馬桑一宿取汁服之
又方 灸心主尺澤亦佳 又灸乳下一寸三十壯
乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使二十壯若
四厥脉沈絕不至者灸之便通此起死人法
治噦方

靜嘉堂文庫所藏

煮豉二升飲汁佳
又方 空腹飲薑汁一升 又方 灸承漿七壯灶如麥大又灸臍下四指七壯
治惡心方
苦瓠穰并子一升碎以酒水二升煮取一升頓服須臾吐并下如蝦蟆衣二升
又方 服小便百日佳
又方 麻子一升熬令香熟擣取酒二升熟研濾取一升飲盡日二服盡一石瘥一切病自能飲食不能酒任性多少
治食已吐其食方
大黃 甘草 貳兩

右二味㕮咀以水二升煮取一升半分再服

治食飲輒吐方
頓服生熟湯二升即止
灸法 餘散見前
吐逆嘔不得食灸心輸百壯
吐嘔逆不得下食今日食明日吐者灸膈輸七壯
吐變不得下食灸肓堂百壯
吐逆不得食灸巨闕五十壯
吐逆食不住灸胃管百壯二報
吐逆飲食却出灸脾募百壯二報章門穴也
吐嘔宿汁吞酸灸神光膽募名百壯二報甲乙經日月膽募也在期門下五分
吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯

靜嘉堂文庫所藏

噫噦膈中氣閉塞灸腋下聚毛下附肋宛宛中五十壯

噦噫嘔逆灸石關百壯

噎塞第六 論一首 方二十八首

五噎圓 治胷中久寒嘔逆逆氣食飲不下結氣不消方 古今錄驗云五噎者氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胷脅苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣膈脅下支滿胷中填塞令手足逆冷不能自溫食噎者食無多少惟胷中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視䀮䀮此皆憂恚嗔怒寒氣上入胷脅所致也

乾薑　蜀椒　食茱萸　桂心
人參各五分　細辛　白朮　茯苓
附子各四分　橘皮六分

右十味為末蜜和丸如梧子大以酒服三丸日三不知稍加至十九

又方 治五種之氣皆令人噎方

人參　半夏　桂心　防風一作防葵　小草
附子　細辛　甘草各二兩　紫菀　乾薑
食茱萸　芍藥　烏頭各六分　枳實一兩

右十四味為末蜜丸如梧子大以酒服五丸日三不知加至十五丸烏頭與半夏相反但去一味合之

竹皮湯 治噎聲不出方

竹皮一用竹葉　細辛各二兩　甘草　生薑　通草
人參　茯苓　麻黃　五味子　桂心各一兩

右十味㕮咀以水一斗煑竹皮減二升去竹皮下藥煑取三升分三服

乾薑湯 治飲食輒噎方 集驗名半夏湯

静嘉堂文庫所藏

乾薑　石膏各肆兩　栝蔞根集驗作桔梗
人參　桂心各貳兩　半夏　小麥各壹升
吳茱萸貳升　甘草壹兩　赤小豆各三拾粒
右十味㕮咀以酒五升水一斗煑棗二十枚去滓合煑
取三升分三服

通氣湯治胷滿氣噎方
半夏捌兩　生薑陸兩　桂心參兩　大棗參拾枚
右四味㕮咀以水八升煑取三升分五服日三夜二

羚羊角湯治氣噎不通不得食方
羚羊角　通草　橘皮各貳兩　厚朴
吳茱萸　乾薑各參兩　烏頭伍枚
右七味㕮咀以水九升煑取三升分三服日三

又方杏人　桂心各壹兩
右二味為末蜜丸如棗大稍稍咽之臨食先含彌佳

治卒噎方
滿口著蜜食之即下
又方捻取飯盆邊零飯一粒食之即下
又方刮舂杵頭細糠含之即下神驗

治諸噎方
常食乾粳米飯即不噎
又方末火炭蜜丸如彈子大含少少咽即下
又方老牛涎棗核大水中飲之終身不復噎
論曰凡療病者皆以其類至如治噎之法豈宜以鸕鷀主
骨哽狸虎治魚哽耶至於竹篾薤白嚼筋綿蜜等事乃可

靜嘉堂文庫所藏

通寫諸哽用耳

治諸哽方

取鹿筋漬之令濡合而索之大如彈丸以線繫之持筋端吞之入喉推至哽處徐徐引之哽者筋出

又方作竹篾刮令滑淨綿裹內咽中令至哽處可進退引之哽即隨出

又方用綿二兩以蜜煎使熟的的爾從外薄哽所在處灼氐以熨綿上若故未出復煮一段綿以代前用者并以皂莢筯少少吹鼻中使得嚏哽出(用後方云治哽百日不出者)

又方煮雞白令半熟小嚼之以線繫雞中央捉線吞雞下喉至哽處牽引哽即出矣

治哽咽方

以虎骨末若狸骨服方寸匕

又方鼈甲末服方寸匕

治魚骨哽方

鸕鷀屎服方寸匕

又方口稱鸕鷀鸕鷀則下

又方服沙糖水又方燒魚網灰服方寸匕(此效方云取魚網囊頭也下)

治骨鯁在喉衆治不出方

取粉糖丸如雞子黃大吞之不去更吞漸大作丸可至十九止

又方燒虎狼屎服之又方吞猪膏如雞子不瘥更吞瘥止

治食中吞髮咽不去絞喉方

取亂髮燒末酒服一錢匕

靜嘉堂文庫所藏

治吞錢方

艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之即下

又方 服蜜二升即當 又方 末火炭酒服方寸匕水服亦得

治吞金銀鐶及釵方

白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳

又方 吞水銀一兩再服之

誤吞鐶及指環方

燒鴈毛二七枚末服之鵝羽亦得

誤吞釵方

曝韮令萎盡熟勿切食一束即出或生麥葉筋縷如韮法皆可用但力意多食自消

誤吞銅鐵而哽者方

燒銅鐶牙令赤內酒中飲之立愈

誤吞針及箭鏃等方

但多食脂肥肉令飽自裹出

治誤吞針方

取懸針磁石大如小豆方寸匕即下古今錄驗云吞針在口中而服磁石末入腹皆合磁石口中或吸針出耳

脹滿第七論一首 方八首 灸法十一首

論曰病者腹滿按之不痛者為虛按之痛者為實也夫腹中滿不減減不驚人此當下之舌黃未下治下之黃自去腹滿時減復如故此為寒當得溫藥腹滿口中若乾燥腹間有水是飲跗陽脈微弦法當腹滿不滿者必下部閉塞大便難兩脇下疾痛此症寒氣從下向上當以溫藥服之

靜嘉堂文庫所藏

取痰腹滿轉痛來趣小腹爲欲自利也一云腰中痛若爲欲自利

溫胃湯 治胃氣不平時脹痰不能食方

附子 當歸 厚朴 人參 橘皮
芍藥 甘草各壹兩 乾薑伍分 蜀椒叁合

右九味㕮咀以水九升煮取二升分二服

大半夏湯 治胃中虛冷腹滿塞下氣方

半夏壹升 大棗貳拾枚 甘草 附子
當歸 人參 厚朴 茯苓
枳實各貳兩 桂心伍兩 生薑捌兩 蜀椒貳伯枚

右十二味㕮咀以水一斗煮取二升分三服

附子粳米湯 治腹中寒氣脹滿腸鳴切痛胷脅逆滿嘔吐

附子壹枚 半夏 粳米各半升 甘草壹兩 大棗拾枚

右五味㕮咀以水八升煮米熟七滓每服一升日三服

集驗加乾薑貳兩

厚朴三物湯 治腹滿氣脹方 仲景云治腹滿發熱數十日脈浮數飲食如故者

厚朴半斤 甘草 大黃各叁兩 大棗拾枚
枳實伍枚 桂心貳兩 生薑伍兩

右㕮咀以水一斗煮取五升去滓內大黃煮取四升服
八合日三嘔逆者加半夏五合利者去大黃寒多者加
生薑至半斤

厚朴三物湯 治腹滿發熱數十日脈浮而數飲食如故方

厚朴半斤 大黃肆兩 陳枳實大者伍枚

右㕮咀以水一斗二升煮取五升內大黃煎取二升去

靜嘉堂文庫所藏

滓服一升腹中轉動者勿服不動者更服一方加芒
吳茱萸湯 治乄寒胷胷逆滿不能食方
吳茱萸 半夏 人參 桂心各二兩 大棗貳拾枚 生薑捌兩
右八味㕮咀以酒五升水三升煮取三升分三服
大半夏湯 治虛羸胷腸滿方
桂心 生薑各壹兩 半夏壹斤 黃耆肆兩 小麥各壹升 甘草
右四味㕮咀以水一斗半煮取五升分五服日二夜二
治男子卒勞內傷汗出中風腹脹大飢食不下心痛小便
赤黃時白大便不利方
大黃 葶藶 寒水石 苦參 黃連 栝蔞根各等分
右六味爲末蜜丸以豉汁和飲服如梧子大二九日三
加至十九
灸法
膿脹胷腹滿灸腸輸百壯二報
胷滿心腹積聚疰痛灸肝輸百壯二報
脹滿水腫灸脾輸隨年壯二報
腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晞先取脾輸後
取季胷
臟附積聚脹滿羸瘦不能飲食灸二焦輸隨年壯
脹滿雷鳴灸大腸輸百壯二報穴在鳩尾下二寸
脹滿氣聚寒冷灸胃管百壯二報穴在臍上一寸
腹脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守百壯穴在臍上一寸

靜嘉堂文庫所藏

一名水分

脹滿痕聚滯下疫冷炙氣海十壯穴在臍下一寸忌不可針

脹滿氣如水腫狀小腹堅如石炙膀胱募百壯穴在中極

臍下四寸

脹滿腎冷痕聚洩利炙大樞百壯穴在臍傍相對橫去臍

兩傍各二寸

痼冷積熱第八論二首 方二十首 炙法一首

論曰凡人中寒者喜欠其人清涕出發熱色和者善噦凡

覩病者未脉望之口燥清涕出善噦欠此人中寒其人下

利以裏虛故也欲噦不能此人腹必痛凡寒脉沈弦脉雙

弦者寒也弦脉狀如張弓弦按之不移脉數弦者當下其

寒脉雙弦而遲者心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之

右手寸口脉弦者即胷下拘急而痛其人滿悶惡寒師曰

遲者為寒澀為無血寸口脉微尺中緊而澀緊即為寒微

即為虛澀即為血不足故知發汗亡血復下之大露宿丸主

寒冷方見第十七卷中

幻汉露宿圓 治寒冷積聚方

礬石 桂心 附子 乾薑各二兩

右四味為末蜜丸如梧子大每服十丸日三後稍加之

露宿圓 治遇冷氣心下結緊嘔逆寒食不消并主傷寒晨

夜觸寒冷惡氣方

附子 烏頭 桂心 礬石各二兩

右四味為末蜜丸如胡豆大以酒服三丸日三加至十

丸藥耐寒冷忌熱食近火宜冷食飲

靜嘉堂文庫所藏

治痼冷風眩寒中手足冷胃口寒臟下冷百病五勞七傷第一令人能食二強盛三益氣四有子神驗方

大豆叁升半　烏頭壹佰伍拾枚　生地黃拾伍斤取汁

右二味以除日炙咀烏頭以酒一斗半和地黃汁浸烏頭至破日絞去滓內豆藥汁中至除日出曝之有汁更浸曝之至汁盡藥成初服從二豆起可至二十豆酒服之有病空腹服無病食後服凶時合並得一月二月爲上時藥令人能食益氣強盛有子鬚白更黑齒落重生

先病熱人不可服

治心腹痼冷百治不瘥方

麴末叁升　白朮伍兩　乾薑

桂心陸兩　蜀椒　吳茱萸各貳兩

右六味治下篩以米飲服方寸匕日二不過五劑諸冷頓愈無忌煞五腹脹之

治積年冷病方

蜀椒貳兩　香豉壹升

右二味擣椒爲末和豉更擣三千杵丸如彈丸大食前酒服日再

治諸冷極醫所不治方

馬蘭子九升淨治去土空腹服一合日二飲及酒下之服訖須臾以食壓之取瘥乃止

赤圓　治寒氣厥逆方

茯苓　桂心　細辛壹兩

烏頭　附子各貳兩　射罔如大棗壹兩

靜嘉堂文庫所藏

右六味爲末內眞朱爲色蜜丸如麻子大飲腹酒服一九
日再夜一不知加至二九以知爲度（方寸匕半夏
肺兩不用桂）

半夏湯 治胃滿有氣心腹中冷方

半夏壹升　桂心肆兩　生薑捌兩

右三味咬咀以水七升煮取二升一服七合日三服

生薑湯 温中下氣方

生薑壹斤　甘草叁兩　桂心肆兩

右三味咬咀以水六升煮取一升半一服五合日三服

甘草湯 治虛羸煩燥懊憹氣欲絶方

甘草　五味子　生薑各貳兩　吳茱萸壹升　人參壹兩

右五味咬咀以水四升煮茱萸令小沸去滓內藥煮取
一升六合分二服服數劑佳

吳茱萸湯 治久寒不欲飲食數十年澼飲方

吳茱萸捌合　消石壹斤　生薑壹斤

右二味以酒一斗水解令得二斗煮藥取四升服二升
病即下去勿更服之養如乳婦法

大建中湯 治心胸中大寒大痛嘔不能飲食飲食下咽自
者更可服之養如乳婦法

知偏從一面下流有聲決決然若腹中寒氣上衝皮起出
見有頭足上下而痛其頭不可觸近方

蜀椒貳合　乾薑肆兩　人參貳兩　粘糖壹斤

右四味咬咀以水四升煮取二升去滓內糖微火煮令
得一升半分二服服湯如炊三升米久可飲粥二升許
更服當一日食糜温覆之

大黃附子湯 治脅下偏痛發熱其脉緊弦此寒也當以温藥下之之方

大黃參兩　附子參枚　細辛貳兩

右三味㕮咀以水五升煮取二升分再服

論曰寸口脉弦而緊弦即衛氣不行即惡寒緊則不欲飲食弦緊相搏即為寒疝跗陽脉浮而遲浮即為風虛遲即為寒疝凡瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

大烏頭湯 主寒疝繞臍苦痛發即白汗出手足厥寒其脉沈弦仲景名二物烏頭煎

烏頭十五枚熬黑不切以水三升煮取一升去滓內白蜜二斤煎令水氣盡得二升強人服七合羸人五合一服未效明日更服每日止一服不可再也

烏頭桂枝湯 治大寒疝腹中痛逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥不能治

秋乾烏頭實中者伍枚除去角　白蜜壹斤

右二味以蜜煎烏頭減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升許初服二合不知更進三合復不知加至五合其知者如醉狀得吐者為中病也桂枝湯方見傷寒卷中外臺方云以水貳升半煮桂取壹升以桂汁和蜜煎令得壹升半煮桂取壹升以桂汁和蜜煎又云浣注方云以桂枝湯和煎

烏頭煎服

論曰凡人患大熱皆須候脉若大大熱者不得一準方用藥皆準病用藥大熱不可那者當兩倍二倍大大熱者乃至十倍用之乃可制之爾有人苦熱不已皆由服石所致

靜嘉堂文庫所藏

種種服餌不能制止惟朴消煎可以定之武德中有貴高人師市奴謂之金石凌非也此方直用二消寒水石石膏可也即不勞金有金者貴高人所加也

朴消湯方

朴消壹斤 芒消劑兩 寒水石兩半 石膏 金各貳兩

右五味先內二消於八升湯中攪令消以紙密封一宿澄取清內銅器中別擣寒水石石膏碎如豆粒以絹袋盛之內汁中以微火煎候其上有漠起以筯投中著筯如凌雪凝白急下瀉著盆中待凝取出烈日曝乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜一合和冷水五合攪和令消頓服之日三熱定即止

五石湯 治胃間熱熱病後不除煩悶口中乾渴方

寒水石 消石 赤石脂 龍骨 括蔞根 牡蠣 甘草 黃芩 各伍分 知母 桂心 石膏各叁分 大黃貳分

右十二味咬咀以水七升煮取二升分四服日二夜一

諸本只有四石

竹葉湯 治五心熱手足煩疼口乾唇燥胃中熱方

竹葉 小麥各壹升 知母 石膏各叁兩 茯苓 黃芩 各貳兩半 生薑伍兩 麥門冬 各貳人參壹兩半 括蔞根 甘草 半夏各壹兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮取二升分二服老小分五服

半夏湯 治胃中客熱心中煩滿氣上大小便難方

靜嘉堂文庫所藏

半夏壹升 生薑捌兩 前胡肆兩 茯苓 白朮各伍兩
甘草壹兩 黃芩 人參各貳兩 杏人 枳實各叁兩
右十味㕮咀以水九升煮取三升分爲三服胷中大熱者
沉冷服之大小便澀加大黃二兩一方用梔子人二兩爲十一味

承氣湯 治氣結胷中熱在胃管飲食嘔逆渴方
前胡 枳實 桂心 大黃 寒水石
知母 甘草各壹兩 消石 栝蔞根 石膏各貳兩
右十味㕮咀以水一斗煮取三升分爲三服

治熱氣手足心煩熱如火方
竹葉貳升 枳實叁兩 青葙子 白前各壹兩
吳茱萸 黃芩各貳兩八分 栝蔞根 麥門冬各貳兩
生薑陸兩 前胡 芍藥一作柴 半夏各伍兩

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分爲三服

地黃煎 治熱方
地黃汁肆升叁合 茯神 知母 萎蕤各肆兩
栝蔞根伍兩 竹瀝叁合一用竹葉 生薑汁 生地骨皮
生麥門冬汁 白蜜各貳升 石膏捌兩
右十一味㕮咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去
滓下竹瀝地黃麥門冬汁微火煎四五沸下蜜薑汁微
火煎取六升初服四合日三夜一加至六七合四月五
月作散服之

治積熱方
枳實 黃芩 大黃 黃連 芒消各貳兩
右五味爲末蜜丸如梧子大空心酒服三十丸加至四

靜嘉堂文庫所藏

十九日一服

治腸上熱方

苦參 豬膽兩 玄參 伍兩 麥門冬 參兩 車前子 貳兩

右四味為末蜜丸如梧子大一服十五九日二服

細圓 治客熱結塞不流利方

大黃 葶藶酪 參 香豉 參合杏人 巴豆 各伍 八分

右五味為末蜜丸如梧子大每日飲服二九以利為度

治骨蒸熱羸瘦煩悶短氣喘息鼻張日西即發方

龍膽 黃連 芒消 貳分 梔子 拾枚 枯蔓根 肆分 若參 大黃

青箱子 各貳兩 黃芩 芍藥

右十味為末蜜丸如梧子大飲服二九日二以知為度

一方無苦參巳下止五味張文仲為散飲服方寸匕

治骨蒸方

天靈蓋如梳大炙令黃碎以水五升煮取二升分二

服起死人神方

又方 水服芒消一方寸匕日二服神良

又方 取人采灰以酒服方寸匕日二服

治五臟熱及身體熱脉弦急者方

炙第十四椎與臍相當五十壯老小增損之若虛寒

至百壯橫三間寸炙之

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


184
24
4 9

靜嘉堂文庫所藏

肺臟脉論第一

論曰肺主魄魄藏者任物之精也爲上將軍使在上行所以肺爲五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之藏也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迎肺中榮華於髮外主氣內主胷與乳相當左乳與右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鴻主藏魄號爲魄藏隨節應會故云肺藏氣氣舍魄在氣爲欬在液爲涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胷滿仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物

靜嘉堂文庫所藏

凡肺藏象金與大腸合爲腑其經手太陰與陽明爲表裏其脉浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯萎枝條扤然獨在其脉爲微浮衛氣遲榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷陰當昇而不昇爲邪所中一氣感激故中陽中邪則捲陰中邪則緊捲則惡寒緊則爲慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃來出曰中旦發暮中暮發藏有遠近脉有遲疾周有度數行有漏刻遲在上傷毛采數在下傷下焦中焦有惡則見有善則匿陽氣下陷陰氣則温陽反在下陰反在巔故名曰長而且留秋脉如浮秋脉肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而反其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人氣逆而背痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

肺脉來厭厭聶聶如落榆爽曰肺平秋以胃氣爲本肺脉來不上不下如循雞羽曰肺病其源無不宇

肺脉來如物之浮如風吹毛曰肺死

眞肺脉至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而

弦曰春病弦甚曰今病

肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不

人皮革焦毛悴色天死于夏

手太陰氣絶則皮毛焦太陰者行氣温皮毛者也氣并

則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷者

靜嘉堂文庫所藏

則爪皮一作枯毛折毛折者則氣先死丙篤丁死火勝金也
肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺王其
脉微澁而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子
爲虛邪雖病易治反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之乘
母爲實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火之
尅金爲賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘
肺木之陵金爲微邪雖病即攝肝乘肺必作虛
右手關前寸口陰絕者無肺脉也若短氣欬逆喉中塞噎
逆刺手陽明治陽
右手關前寸口陰實者肺實也若少氣胷中滿膈膨與胷
相引刺手太陰治陰
肺脉來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰

經病四至脫精五至死六至命盡手太陰脉也
肺脉急甚爲癲疾微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背
若鼻息肉不通緩甚爲多汗微緩爲痿漏風一作偏風頭已下
汗出不可止大甚爲脛腫微大爲肺癉引胷背起腰內小
甚爲飧泄微小爲消癉滑甚爲鼠瘻在頸腋腋之間下不勝其上
血濇甚爲嘔血微濇爲鼠瘻在頸腋之間下不勝其上
其能喜酸
肺脉搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏灌一作汗至
今不復發散
白脉之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胷中喘而虛
名曰肺癉寒熱得之醉而使內也
黃帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休何也手太陰本

靜嘉堂文庫所藏

在寸口中岐伯對曰足陽明胃脉也胃者五臟六腑之海胃腧在足趺上大趾間上行三寸骨解中是其精氣上清注於肺肺氣從太陰而行之其行之也以息往來故人一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸不已脉動不止

黃帝問曰氣口何以獨爲五藏主岐伯曰胃者水穀之海六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五藏氣氣口者太陰是也藏腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬腑藏主即呼寸口者也

扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胷憑仰息其陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉水等肺在聲爲哭在變動爲欬在志爲憂憂傷肺精氣并於肺則悲

味主秋結滿而血者病在胷及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合

病先發於肺喘欬三日之肝脅痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出

病在肺下晡慧日中甚夜半靜

假令肺病南行若食馬肉及麞肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也宜赤藥

凡肺病之狀必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝攣髀腨胻足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經手太陰足太陽之外厥陰内少陰血者

肺脉沈之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱小便赤肩背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風

肺病其色白身躰伯寒無熱時欬其脉微遲爲可治宜
服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉
之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸膻中
百壯背第三椎二十五壯
邪在肺則皮膚痛發寒壯上氣氣喘汗出欬動肩背取之
臂中外輸背第三椎之傍以手痛按之快然乃刺之取之
缺盆中以越之
形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上
行肺傷其人勞倦則欬唾血其脉細緊浮數皆吐血此爲
躁擾嗔怒得之肺傷氣擁所致也
肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹
肺中寒者其人吐濁涕

肺水者其人身體腫而小便難時時鴨溏
肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脉浮大
跌陽脉浮緩少陽脉微緊微爲血虛緊爲微寒此爲鼠乳
診得肺積脉浮而毛按之辟易脅下時時痛逆背相引痛
少氣善忘目瞑結癰皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蟲
緣之狀甚者如針刺之狀時癢色白也
肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久久不愈病洒洒
寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺
肺當傳肝肝適以春王王者不受邪肺復欲還心心不肯
受因留結爲積故知息賁以春得之
肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脉當短濇今反浮
大其色當白而反赤者此是火之剋金爲大逆十死不治

靜嘉堂文庫所藏

商音人者主肺聲也肺聲哭其志樂其經手太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽反作陽氣內擊陰氣外傷傷則寒寒則虛虛則厲風所中噓吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短憊四肢僻弱面色青黯遺失便利甚則不可治依源麻黃續命湯主之方見第八卷中

又言音喘急短氣好唾此為火剋金陽擊陰陰氣沈陽氣昇昇則實實則熱熱則狂狂則閉眼悸言非常所說口赤而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不

歌可治也

肺病為瘧者令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見若恒山湯主之方見第十卷中若其人本來語聲雄烈忽爾不亮掩氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應蛙曰未

病勢當一久此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應深淺當治乃不失也

白為肺肺合皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精康急心靜悍性直為史耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主手太陰康康然肩膺虛薄正竦則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲不病喘喝粗理者則肺大大則虛虛則寒喘鳴多飲善病胸喉痺逆氣臣肩反膺陷喉者則肺高高則實實則熱上氣肩息欬逆合腋張胸者則肺下下則逼貫迫肝善脅下痛鼻塞或壅而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷於熱喘息鼻翕肩膺好者則肺端正端正則和

靜嘉堂文庫所藏

利難傷膚偏歇者則肺偏傾則病胃偏痛鼻亦偏疾
凡人分部陷起者必有病生大腸陽明爲肺之部而藏氣
通於內外部亦隨而應之沈濁爲內浮清爲外若外病內
入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內
出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休
否則藏神前變形于外人肺前病鼻則爲之孔開焦枯若
肺前死鼻則爲之梁折孔閉青黑色若天中等分慕色應
之必死不治看色深淺斟酌賒促遠不出一年促不延時
月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指厭黵見顏
煩上此必卒死肺絕三日死何以知之曰張但氣出而不
還面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄泄目
則爲青雖有天救不可復生面黃目白妊枯脣死吉凶之

色在於分部順而見赤白入鼻必病不出其年若
不應三年之中禍必應也
秋金肺脉色白主手太陰脉也秋取經輸秋者金始治肺
將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及躰陰氣未
盛未能深入故取輸以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰
故取於合其脉本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在
腕下動脉其脉根于太倉太倉在臍上三寸一夫是也
其筋起於手大指之上循指上行結於魚後行寸口外側
上循臂結肘中上臏內廉入腕下上出缺盆結肩髃前上
結缺盆下結會裏散貫貫下抵季脅
其脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫
出腕下下循臏內行少陰心主之前下肘中後循臂內上

靜嘉堂文庫所藏

骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後
直次指內廉出其端合手陽明為表裏陽明之本在肘骨
中同會于手太陰

太陰之別名列缺起於腕下分間並太陰之經直入掌中
散入於魚際別走手陽明主肺生病病實則大腸熱熱則
手兌掌起起則陽病陽脉反逆大於寸口三倍病則效上
氣喘渴煩心胷滿膨脅內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肓
肯痛風汗出中風虛則大腸寒寒則欠效小便遺數數則
陰病陰脉反小於寸口一倍病則肓肯寒痛少氣不足以
息季脇空痛泵色變交手遺失無度

秋三月者主肺大腸白氣狸病也其源從太陽擊手太陰
太陰受邪之氣則經絡壅滯毛皮緊腎發泄邪生則藏

腑傷溫隨秋受邪其病相反若腑虛則為陰邪所傷乍
乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆若藏實則為陽毒所損鼻熱生
斑氣喘引飲故曰白氣狸病也

荷鵠云炙心肺二輸主治丹毒白狸病當依源為療調其
陽理其陰則臟腑之病不生矣

肺虛實第二 脉四條 方十首 灸法三首

肺實熱

右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺脹汗
出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名曰肺實熱也
治肺實熱胷憑仰息泄氣除熱方

石膏捌兩 白前 杏人各叁兩 橘皮
白木各伍兩 赤蜜柒合 枸杞根皮切貳升

靜嘉堂文庫所藏

右七味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服

治肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黃切貳升　石膏捌兩　麻黃伍兩
杏人肆兩　升麻　羚羊角
竹瀝各叁兩　赤蜜壹升　淡竹茹雞子大壹枚

右九味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服

治肺熱悶不止胷中喘急驚悸各熱來去欲死不堪服藥泄胷中喘氣方

桃皮　荒花各壹升

右二味咬咀以水四斗煮取一斗五升去滓以故布手

中內汁中薄胷溫四肢不盈數日即歇

治肺熱氣上攻息奔喘方

摘皮　麻黃各叁兩　乾紫蘇剛繁作乾藍
柴胡各貳兩　杏人各肆兩　石膏捌兩
甜竹各壹兩

右七味咬咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下諸藥煮取三升去滓分三服不瘥與兩劑

治肺熱喘息鼻衄血方

羚羊角　玄參　射干　雞蘇
芍藥　升麻　柏皮各叁兩　生地黃切壹斤
梔子人肆兩　淡竹茹如雞子大壹枚

右十味咬咀以水九升煮取三升分三服須利者下芒消三兩更煮三沸

靜嘉堂文庫所藏

治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘方

麻黃肆兩　甘草　五味子各參兩
杏人伍拾枚　母薑伍兩　淡竹葉切壹升

右六味㕮咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升去滓分三服

瀉肺散治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黃腫起即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絶心下弦急不能飲食或吐膿血胷痛引背支滿欲嘔方

五味子　百部各貳兩半　茯苓　附子　蓯蓉
當歸　石斛　遠志　續斷各壹兩　細辛
甘草各柒分　防風　蜀椒　紫菀　桂心
款冬花　乾薑各壹兩半　桃人陸拾枚　杏人參拾枚

右十九味治下篩以酒服方寸匕日三後稍加至二匕

灸法

肺脹氣搶脅下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃管兩邊相去一寸胃管在心下三寸

肺脹脅滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各止七壯

肺與大腸俱實

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻不收名曰肺與大腸俱實也

治肺與大腸俱實令人氣滿煮散方

茯苓　麻黃各陸分　黃耆　大青　桂心各參

細辛　杏人各五分　石膏二兩　丹參半兩　五味子
甘草　貝母　橘皮　芎藭各一兩　枳實三枚
右十五味治下篩爲粗散帛裹一方寸匕半井花水一升五合煮取七合爲一服日再

肺虚冷

右手寸口氣口以前脉陰虚者手太陰經也病苦少氣不足以息嗌乾不津液名曰肺虚冷也

治肺虚冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虚瘠風入肺方

防風　獨活　芎藭　秦椒　乾薑
黄耆各四十二銖　天雄　麻黄　五味子
山茱萸　甘草各三十六銖　秦艽　桂心
薯蕷　杜仲　人參　細辛　防己各三十
甘菊花　紫菀各二十四銖　貫衆二枚　附子[illegible]

右二十二味治下篩以酒服方寸匕日二（一方有石膏當歸各五分）

酥蜜膏酒治肺虚寒癘風所傷語聲嘶塞氣息喘憊欬唾止氣嗽通聲方

酥　崖蜜　飴糖　生薑汁
生百部汁　棗肉　杏人各一升研　甘皮五具末
右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久取薑汁等各減半止温酒一升服方寸匕細細咽之日二夜一

又方

猪胰三具　大棗百枚
右二味以酒五升漬之秋冬七日春夏五日出布絞去滓七日服盡二七日忌鹽羊胰亦得治欬嗽胷脅支滿多喘上氣尤良（肘後方亦治久欬上氣十年諸治不瘥者）

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方

靜嘉堂文庫所藏

棗肉貳枚（一作脂） 杏人壹升熬熟
白蜜 生百部汁各壹升
白糖 生薑汁
右七味合和微火煎令可攪約一炊久下之細細溫清酒
服二合日二

補肺湯 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起
口中如含霜雪言語失聲甚者吐血方
五味子叁兩 乾薑 桂心 款冬花各貳
麥門冬壹升 大棗貳拾枚 粳米貳合 桑根白皮一斤
右八味㕮咀以水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮取三
升分三服

又方 黃耆伍兩 甘草 鍾乳 人參各貳兩 乾地黃
桂心 茯苓 白石英 桑白皮 厚朴

乾薑 紫菀 橘皮 當歸 五味子
遠志 麥門冬各叁兩 大棗貳拾枚
右十八味㕮咀以水一斗四升煮取四升分五服日三
夜二

又方 治肺氣不足效逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能飲
食方
蘇子壹升桑白皮伍兩半 紫菀 人參
甘草 五味子各貳兩 款冬花 射干各壹
麻黃 乾薑 桂心各叁兩 細辛壹兩半
右十四味㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服日
三夜二

又方 治肺氣不足效逆短氣寒從背起口中如含霜雪語

靜嘉堂文庫所藏

無音聲而渴古本乾燥方

五味子　蘇子　各壹升　白石英　鍾乳　各叁兩
款冬花　竹葉　桑白皮　茯苓　橘皮　桂心
麥門冬　肆兩　生薑伍兩　紫菀　各貳兩　粳米貳合
杏人伍拾枚　大棗拾枚

右十六味㕮咀以水一斗三升先煮桑白皮粳米大棗米熟去滓內諸藥煮取五升分六服日三

又方　治肺氣不足心腹支滿欬嗽喘逆上氣唾膿血胷背痛手足煩熱惕然自驚皮毛起或哭或歌或怒乾嘔心煩耳中聞風雨聲面色白方

款冬花　桂心　各貳兩　桑白皮　生薑　五味子　鍾乳　各叁兩　粳米伍合　大棗拾枚　麥門冬　肆兩

右九味㕮咀以水一斗二升先煮粳米棗令熟去之內藥煎取二升分三服溫服之一方用白石英二兩用紫菀人參各一兩名紫菀湯

麻子湯　治肺氣不足欬唾膿血氣短不得卧方

麻子　壹升　桑白皮　紫菀　各壹斤　桂心　人參　各貳兩　阿膠　紫菀　各壹升　生薑　叁兩　乾地黃　肆兩

右九味㕮咀以酒一斗五升水一斗五升合煮取四升分五服

猪肚　治肺氣不足咽喉苦乾方

作餳任多少取乾棗一升去核熟擣水五升和使相得絞去滓澄去上清取濁者內飴中攪火上煎勿令堅入令連連服如雞子大漸漸吞之日三夜二

靜嘉堂文庫所藏

治肺風氣接絕四肢滿脹喘逆胷滿方

炙肺輸各二壯肺輸對乳弓繩度之在肇三椎下兩傍相去各一寸五分

肺與大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖名曰肺與大腸俱虛也

小建中湯 治肺與大腸俱不足虛寒乏氣小腹拘急腰痛羸瘠百病

大棗拾貳枚 生薑 桂心各叁兩 甘草貳兩炙 芍藥陸兩

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓內糖八兩煮三沸分三服肘後用黃耆人參各貳兩名黃耆建中湯

肺勞第二論一首 方二首 灸法一首

論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人通秋氣則手太陰不收肺氣傳蒲順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

麻黃引氣湯 治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫方

麻黃 杏人 生薑 半夏各伍分 紫蘇肆分 白前 細辛 桂心各叁分 橘皮貳分 石膏捌兩 竹葉切壹升

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分二服

半夏湯 治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胷脅氣滿從胷達背痛憂氣往來嘔逆飲食即吐虛乏不足方

半夏壹升 生薑壹斤 桂心肆兩 甘草

靜嘉堂文庫所藏

厚朴各貳兩人參
右八味㕮咀以水一斗煮取四升分四服腹痛加當歸
二兩

厚朴湯 治肺勞風虛冷痰滯水氣晝夜不得臥頭不得近
枕上氣胷滿喘息氣絶此痰水盛溢方

厚朴　麻黃　桂心　黃芩
石膏　大戟　橘皮各貳兩　杷實
甘草　秦艽　杏人　茯苓各叁兩
細辛壹兩　半夏壹升　生薑拾兩　大棗拾五枚

右十六味㕮咀以水一斗三升煮取四升分五服
治咳痺氣逆欬嗽口中涎唾方
炙肺輸七壯亦可隨年壯至百壯

氣極第四 論一首 方六首 灸法一首

論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋遇病
為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒溫之氣客於
六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胷常欲自恚以秋庚
辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒
則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮則甚陰氣至溫氣生故甚
陰畏陽氣晝日則瘥若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上
胷臆甚則唾血然陽病治陰陰是其裏陰病治陽陽是其
表是以陰陽表裏衰王之源故知以陽調陰以陰調陽陽
氣實則決陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脉則
治之若至六腑五臟半死矣
扁鵲曰氣絶不治喘一作而冷汗出二日死氣應手太陰

靜嘉堂文庫所藏

太陰氣絶則皮毛焦氣先死矣

鍾乳散 治氣極虛寒陰畏陽氣晝瘥暮甚氣短息寒亦治百病令人力強能飲食去風冷方

鍾乳別研 乾薑 桔梗 茯苓 細辛 桂心 人參各壹兩 白朮壹兩 防風 附子各貳兩 桔蔓根 牡蠣各貳兩半

右十二味治下篩酒服方寸匕日三漸加至二七五十以上可數服得力乃止（一云有枳椇各二兩）

黃耆湯 治氣極虛襄皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損乏方

黃耆肆兩 人參 白朮 桂心各二兩 生薑捌兩 大棗拾枚 附子參拾銖一方不用

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分四服

大露宿圓 治氣極虛寒皮痺不已內舍於肺寒氣入客於六腑腹脹虛滿冬冷積聚百病方

礬石燒 附後作礬石 乾薑 皂莢 桔梗

右六味為末蜜丸梧子大酒服十九日三漸加之愼熱及近火等

硫黃圓 治氣極虛寒澼飲胷中燸滿心腹痛氣急不下飲食方

硫黃 礬石 乾薑 附子 桂心 細辛 白朮 烏頭

右十味為末蜜丸如梧子酒服十九日三漸加之以知

靜嘉堂文庫所藏

爲度（附後無白朮桔梗茯苓用吳茱萸蜀椒人參皂莢當歸十二種爲丸用治人大冷夏月溫飲食不消）

衣者

大前胡湯治氣極傷熱喘息衝胸常欲自恚心腹滿痛內外有熱煩嘔不安方

前胡（捌兩） 半夏 麻黃 芍藥（各肆兩）

生薑（伍兩） 黃芩（叁兩） 枳實（四枚） 大棗（拾貳枚）

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服溫

竹葉湯治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾方

竹葉（貳升） 麥門冬 小麥 生地黃（各壹升）

生薑 石膏（各陸兩） 麻黃（叁兩） 甘草（壹兩） 大棗（拾枚）

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

灸法

嘔吐上氣灸尺澤不三則七壯尺澤者在腕後肘中橫文

腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上管下一寸名太倉七壯

積氣第五（論二首 方五十一首 灸法一十四首）

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若柈在心下腹中疾痛不能飲食時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣即嘔逆惡心熱氣即說物不竟而迫怒氣即上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得息恚氣即積聚在心下不得飲食喜氣即不可疾行不能久立憂氣即不可劇作暮臥不安愁氣即喜忘不識人語置物四方還取不得去處若閙急即四肢胕腫手足筋攣捉不能舉如得病此是七氣所生男子

靜嘉堂文庫所藏

辛得飲食不時所致婦人即產後中風諸疾也

七氣圓方

烏頭 大黃各柒兩 紫菀 半夏 前胡
細辛 卅參 茯苓 芍藥 桃人 胡洽作杏人
菖蒲一作蘭石膏 吳茱萸 桂心 桔梗各叁分
人參 甘草 防葵各壹兩 乾薑 蜀椒各半兩

右二十味為末蜜丸梧子大酒服三丸日三加至十九
一方去半夏加甘遂三分 胡洽無卅參甘草

七氣圓 主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣
氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時
去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒
失精怒氣狀不可當熱痛上盛心短氣欲絕不得息恚氣

狀稍聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不
可治作卧不安席愁氣狀平故如怒喜忘四肢肘腫不得

亦治產後中風餘疾方

大黃貳兩半 人參 半夏 吳茱萸 柴胡
乾薑 細辛 桔梗 葛蒲各貳分 茯苓
芍藥 甘草 蜀椒一合去汗 石膏 桃人各叁分

右十五味為末蜜丸如梧子大每服酒下三丸日三服
漸加至十九千金翼十味無茯苓芍藥甘草石膏桃人

七氣湯 治寒氣熱氣憂氣勞氣愁氣或飲食為膈氣或勞
氣內傷五臟不調氣衰少力方

乾薑 黃芩 厚朴深師作桂心 半夏
甘草 枯薑根深師作楊皮 乾地黃 芍藥各貳兩

靜嘉堂文庫所藏

蜀椒叄兩深師作桔梗　枳實伍枚　人參壹兩　吳茱萸伍合

右十二味㕮咀以水一斗煑取三升分三服日三

又方　治虛冷上氣勞氣等方

半夏壹升　人參　生薑　桂心　甘草各壹兩

右五味㕮咀以水一斗煑取三升分三服日三

五膈圓　治憂膈氣膈食膈飲膈勞膈五病同藥服以憂恚思慮食飲得之若冷食及生菜便發其病苦心滿不得氣息引背痛如刺之狀食即心下堅大如粉絮大痛欲吐吐即瘥飲食不得下甚者及手足冷上氣欬逆喘息短氣方

麥門冬　甘草各伍兩　蜀椒　遠志　桂心

細辛各叄兩　附子壹兩半　人參肆兩　乾薑貳兩

右九味爲末蜜和丸微使淖先食含如彈丸一枚細細咽之喉中胷中當熱藥力稍盡復含一丸日三夜二服藥七日愈延年方云若不能含者可分一大丸作七小圓盡服之夏月含去麥門冬甘草人參胡給酒服如梧子大十丸酒服之經心錄以吳茱萸代桂心云亦可梧子五丸空腹服之崔氏療冷則心痛咽中有物吐之不出咽之不入食飲少者

治結氣冷癥積在脅下及脚氣上入小腹腹中脹滿百病

大蒜去心皮三升擣令極熟以水三升和令調絞取汁更擣餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁更擣餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁合得九升所得滓可桃顆大棄却以微火煎取三升下牛乳三升合煎取三升旦起空腹一頓溫服令盡至申時食三日服一劑三十日服十劑止

大蒜煎　治疝瘕積聚冷癖痰飲心腹脹滿上氣欬嗽刺風

風癮偏風半身不隨腰疼膝冷氣息不通百病方

蒜陸斤肆兩去皮切水肆斗煮取壹斗去滓

葶藶　胡椒

戎鹽兩各貳　石菖蒲　木香各壹兩　乾薑兩各叁　石蜜　阿魏

右十二味為末合內蒜汁中以銅器微火煎取一斗空腹酒下一兩五日已上稍加至三兩二十日覺四體安和更加至六兩此治一切冷氣甚良

桔梗破氣圓　治氣上下不通塞不能息方

桔梗　橘皮　乾薑　厚朴　枳實

細辛　葶藶各叁分　吳茱萸　白朮各陸分　胡椒

蜀椒　烏頭各炮去皮臍各貳分　蓽撥拾分　人參　桂心

附子　茯苓　前胡　防葵　芎藭各壹分

甘草　大黃

右二十四味為末蜜丸如梧子大每服酒下十丸日三有熱者空腹服之

檳榔湯　治氣實若積聚不得食息方

檳榔叁枚　附子壹枚　半夏壹升　細辛壹兩

生薑捌兩　大黃　當歸各捌分

橘皮　甘草　紫菀　柴胡各叁兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取二升分三服相去如人行十里久若有癥結堅實如石加鼈甲二兩防葵二兩氣上加桑白皮切二升枳實厚朴各二兩消息氣力強弱進二劑後隔十日更服前桔梗破氣圓

治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絶腹中堅實聲

靜嘉堂文庫所藏

所不治復謂是蠱方

檳榔大者肆枚柒枚 附子壹枚 半夏壹升 柴胡叁兩

生薑捌兩 橘皮 甘草 桂心

當歸 枳實各貳兩

右十味㕮咀以水一斗煑取三升分三服五日一劑服三劑永除根本

半夏湯治逆氣心腹滿氣上胷脇痛寒冷心腹痛嘔逆及吐不下食憂氣結聚方

半夏壹升 生薑 桂心各伍兩 橘皮肆兩

右四味㕮咀以水七升煑取三升分四服日三夜一人強者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛

又方治逆氣心中煩滿氣悶不理氣上方見第十六卷中附篇四味[illegible]

貝母湯治上氣咽喉窒塞短氣不得臥腰背痛胷滿不得食面色萎黃方

貝母壹兩 生薑伍兩 桂心 麻黃

石膏 甘草各貳兩 杏人叁拾枚 半夏伍合

右八味㕮咀以水一斗煑取三升分為三服日三

麻黃湯治上氣脉浮欬逆喉中水雞聲喘息不通呼吸欲死方

麻黃捌兩 甘草肆兩 大棗叁拾枚 射干如博棊子貳枚

右四味㕮咀以井花水一斗煑麻黃三沸去沫內藥煑取四升分四服日三夜一

奔氣湯治大氣上奔胷膈中諸病發時迫滿短氣不得臥劇者便悁欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

靜嘉堂文庫所藏

生薑壹斤　半夏
桂心伍兩　人參
右六味咬咀以水一斗煮取三升分四服

枳實湯　下氣治胷中滿悶方
枳實參枚　附子貳枚大棄捨　半夏伍兩　人參
甘草　白朮　乾薑　厚朴各貳兩
右九味咬咀以水七升煮取二升半每服八合日三
下氣治氣滿腹脹方
半夏壹升　生薑壹斤　人參壹兩半　橘皮參兩
右丙味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三
方無人參止二味

治氣兩脅滿急風冷方
杏人　茯苓　防風各捌分　吳茱萸　橘皮
桂心　防風　澤瀉各伍分　白朮
芍藥　蘇子　枯梗　枳實各陸分　射干
右十四味爲末蜜丸梧子大酒服十九日二加至三十
治氣滿閉塞不能食喘息方
訶梨勒十枚爲末蜜丸如梧子食後服三丸不息得
利即止

治上氣數逆方
蘇子壹升　五味子伍合　麻黃
紫菀　人參　黃芩　細辛
桂心　當歸各壹兩　生薑伍兩　甘草各貳兩
右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服　半夏參兩

靜嘉堂文庫所藏

治氣上不得卧神秘方

橘皮　生薑　紫蘇
人參　五味子各伍兩一方作梗梗

右五味㕮咀以水七升煮取三升分三服
治熟發氣上衝不得息欲死不得卧方

桂心半兩　白石英　麥門冬　枳實　白鮮皮
貝母　茯神　檳榔人　天門冬各貳兩半

車前子貳兩　人參　橘皮　白薇
杏人各壹兩半　郁李人參兩　桃人伍分

右十七味爲末蜜和丸如梧子大以竹葉飲服十丸日
二加至三十丸

白朮散法

竹葉　紫蘇子各壹升　紫菀　白前各貳兩
百部　甘草　生薑各參兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升温下前丸藥盡更合
服

人參湯　安食下氣理胸膈并治客熱方

人參　麥門冬　枳實
甘草　五味子　乾薑　當歸　茯苓
桂心參兩半夏壹升大棗拾伍枚　芍藥　黄耆　枳實各貳兩

右十三味㕮咀以水九升煮取二升去滓每服九合從
日至晡令盡皆熱服慎勿冷

海藻橘皮圓　下氣治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺息奔
令咽喉氣悶往來方

海藻　橘皮　白前各參分　杏人　茯苓

芍藥　桂心各伍分　酥子伍合　棗肉
昆布酪貳　吳茱萸　人參　白朮　桑根白皮
右十五味爲末蜜丸如梧子大飲服十九日二加至十
五丸以利小便爲度
治氣上方
硇砂　細辛　牛膝各拳分
右三味末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法
治上氣方
上酥壹升　獨頭蒜伍顆
右二味先以酥煎蒜黃出之用生薑汁一合并煎令
熟空腹温服一方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法
治上氣嘔吐方
芥子二升爲末蜜丸寅時井花水服如梧子七九日
二亦可作散空腹服之及有酒浸服并治臍下絞痛
治勞氣方
小芥子三升擣末絹袋盛酒二斗浸之密封七日去
滓温服半升漸至一升半得方更合忌如藥法
治上氣二十年不瘥方
大棗　杏人各壹伯枚　豉壹伯貳拾粒　蜀椒貳伯粒
右四味先擣杏人豉令熟後內棗椒更擣爲丸如棗核
大含稍咽之日二夜一
治積年上氣不瘥垂死者方
莨菪子　熬令色變　熟羊肝薄切曝乾
右二味各擣等分以七月七日神酢拌令相著夜不食

靜嘉堂文庫所藏

空腹服二方寸匕須臾間以冷漿白粥二七止之隔日一服永瘥四十日內得煮飯汁作蕪菁羹食之已外一切禁斷

下氣方

生薑伍兩　小麥青升

右二味以水七升煮取一升頓服

又方　大棗貳拾枚　紫蘇葉切壹升

右二味以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得一方加橘皮半兩肘後方無棗用橘皮

治氣方

桃皮二斤去黃者㕮咀以水五升煮取二升再服一升盡止

又方　酒服驢脂二合日二瘥止

又方　驢乳初服二合至二日後日別五合後至十合七日後至一升忌葵菜猪魚油等

又方　取牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之日二

又方　烏牛尿空腹服百日止治一切病

補氣虛逆方

大棗叁拾枚　甘皮去瓤　乾薑貳兩　乾地黃切炒

右四味治下篩酒四升漬棗二宿漉出棗取酒為炊汁將棗內甑中微火蒸令棗膏入釜中和前酒令餘二升許候甑中棗只留皮核在乃止火貯器中將前散及熟下攪令調大要令與糖相似以酒服二合日再此方非止補氣亦通治一切知氣并形體羸瘦甚良

大補氣方

乾地黃伍兩甘草　秦椒各壹兩乾薑　昆布
地骨皮兩半白朮　桂心　人參　厚朴
海藻兩半各叁　羊腎壹具去膏膜羊肚壹具治如食
右十二味治下篩內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟爛爲
度及熟米臼合擣取肚腎與藥爲一家曝乾更擣爲散
酒服方寸匕日二

白朮散　明目利小便治氣及補五勞七傷無所不治方
鍊成白石英十兩白朮
取白淨者爲佳擣細下
絹袋於銅器中水飛之
者去之取中央好者研
用者使熟臼絹袋子盛
斗米下蒸之極熟乾更

成之爲　石斛
茯苓　橘皮各壹兩　乾薑各壹兩　澤瀉
右七味治下篩總於甕器中研令相得重篩酒服方寸
匕日二不得過之猪肉鵝鴨蒜冷醋滑

補傷散　治肺傷善泄欬善驚恐不能動肋不可遠行膝不
可久立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛引胸中卧不安
常忽忽喜夢寒熱小便亦黃目不遠視唾血方
天門冬壹升去心　澤瀉　人參　阿膠各壹兩半
括蔞根　前胡　芍藥　石膏　乾薑
大豆卷貳合紫菀　白斂各壹兩　桂心　白朮各壹兩半
乾地黃　甘草　薯蕷各壹兩半
右十九味治下篩食上酒服方寸匕日三

靜嘉堂文庫所藏

白石英圓 補養肺氣方
白石英二作白石脂　陽起石　礜石
覓絲子　菟絲　乾地黃各貳兩半　石斛
栝婁根　白朮　五味子各貳兩　防風
巴戟天各伍分　桂心　人參各壹兩　蛇牀子半兩
右十五味爲末蜜丸如梧子酒下十五丸加至二十九日二十服

理氣圓 治氣不足方
杏人　桂心各壹兩　乾薑　益智子各貳兩
右四味爲末蜜丸如梧子未食服二九以知爲度

治冷氣氣短方
蜀椒五兩絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意多少

治讀誦勞極疲乏困頓方

酥　油　糖　酒　白蜜各貳升
右五味合於銅器中微火煎二十沸下之爲準七日七夜服令盡宜愼生冷

又方 人參　甘草　茯苓　當歸各貳兩　地骨皮
芍藥　芎藭　乾地黃　黃耆各叁兩　大棗貳拾枚
右十味㕮咀以水一斗煮取二升分二服一方用桂

治卒短氣方
檎韭汁服一升立差用後方治卒上氣喘息煩滿欲絕

治乏氣方
生薑　枸杞葉各貳兩
右二味㕮咀以水二升煮取一升頓服

治少年多多短氣方

靜嘉堂文庫所藏

豉汁合
梔子貳拾枝
右二味以水二升煮豉取一升半去豉內梔子煮取八合服半升不瘥更服
灸法
凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸大衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止○上氣厥逆灸胃堂百壯穴在兩乳間
胃脘中氣灸關輸隨年壯（一云第四推下兩傍各一寸半名關輸）
心腹諸病堅痛煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄利灸太倉百壯（太倉穴一名胃募在心下四寸乃胃管下一寸○結氣囊裹針藥所不及灸盲募隨年壯盲募二穴從乳頭下度至臍中留去半從乳下行斐頭是穴

下氣灸肺輸百壯又灸大衝五十壯
凡腫下絞痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯穴在臍下三寸
短氣不得語灸天井百壯穴在肘後兩筋間○又灸大推隨年壯○又灸肺輸百壯○又灸肝輸百壯○又灸尺澤百壯○又灸小指第四指間交脉上七壯○又灸手十指頭合十壯○少年旁多短氣灸婦尤甚臍五十壯○又臍灸臍孔中一七壯
之氣灸章五推下隨年壯
論曰之氣卒厥逆上氣氣攻兩脅心下痛滿奔豚欲絕此為奔豚氣海百壯穴在臍下一寸半○又灸關元百壯穴

靜嘉堂文庫所藏

在臍下二寸○奔豘灸期門百壯穴直兩乳下第二肋端傍一寸五分

奔豘腹腫灸章門百壯章門一名長平二穴在大橫外直臍季肋端○奔豘搶心不得息灸中極五十壯中極一名玉泉在臍下四寸

奔豘上下腹中與腰相引痛灸中府百壯穴在乳上三肋間○奔豘上下灸四滿二七壯穴俠丹田兩傍相去三寸即心下八寸臍下橫文是也

肺痿第十八 論一首 方五首

論曰寸口脉數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此爲肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬爲肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難數被駃藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發汗陽脉早索陰脉不澀三焦踟蹰入而不出陰脉不澀身體反冷其内反煩多唾脣燥小便反難此爲肺痿傷於津液便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬出乾沫久久小便不利其脉平弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

甘草乾薑湯 温臟治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴不欬若渴者屬消渴法上虛不能制溲服此湯已小溫覆之

甘草肆兩 乾薑貳兩○集驗有大棗十二枚 肘後

右二味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分二服

靜嘉堂文庫所藏

甘草湯 治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方 千金翼名甘草二兩㕮咀以水二升煮取一升半去滓分二服

生薑甘草湯 治肺痿咳唾涎沫不止咽燥而渴方

生薑伍兩 甘草肆兩 人參參兩 大棗拾貳枚

右四味㕮咀以水七升煮取二升去滓分二服

桂枝去芍藥湯 治肺痿吐涎沫不止方 去芍藥加皂莢

桂枝 生薑各參兩 甘草貳兩 皂莢壹莢 大棗拾枚

右五味㕮咀以水七升煮取二升去滓分二服

麻黃湯 治肺脹咳而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水方

麻黃 芍藥 桂心各參兩半夏 生薑 細辛 五味子各半升 石膏肆兩

右八味㕮咀以水一斗煮取二升分二服 仲景名此為小青龍加石

論曰病欬唾膿血其脉數者曰肺癰虛者曰肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿若口中辟辟燥欬即胷中隱隱痛脉反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脉何類何以別之師曰寸口脉微而數微則為風惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷於脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脉數缺陽脉緊實熱相搏故振寒而欬缺陽脉浮緩胃氣如

經此爲肺癰師曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此爲癰腫病醫反不知而以傷寒治之不瘥愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中者爲肺癰其脉數數唾有膿血設膿未成其脉自緊數緊去但數膿爲已成也

桔梗湯 治数胷中滿而振寒脉数咽乾而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是爲肺癰者方

桔梗 參兩集驗用貳兩古今録驗用壹兩 甘草 貳兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升去滓分二服必吐膿血也 一方有數名花壹兩半

葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰喘不得臥方

葶藶 參兩為末

大棗 貳拾枚

右二味先以水二升煮棗取一升去棗内藥一棗大煎取七合頓服今盡三日服一劑可至三四劑治肺癰胷脇脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭数逆上氣喘鳴迫塞未進此方宜先服小青龍湯却服前藥其青龍湯方在十八卷

黃昏湯 治数有微熱煩滿胷心甲錯是爲肺癰者方

黃昏手掌大一片是今昏皮也 以水三升煮取一升分二服

又方 薏苡人 瓜瓣半升 桃人伍拾枚 薑葱切二升水二斗煮取五升去滓

右四味㕮咀内薑汁中煮取二升服一升當有所見吐膿血

飛尸鬼疰第八 論一首 方四十五首

論曰凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但氣息

靜嘉堂文庫所藏

急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服雚參
湯盡二剂得下便覺稍覺并暴癊堅結宿食及女人血堅
痛發作無定者神良
五注湯 治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方
大黃 甘草各參兩 當歸 芍藥各貳兩
烏頭拾枝 生薑 蜜各壹斤 桂心肆兩
右八味㕮咀別漬大黃以水九升煮取二升烏頭別內
蜜中煎令得一升拌湯中去滓分服三合姌人行三十
里又更進一服曰三不知加至四合
蜈蚣湯 治惡疰邪氣往來心痛徹背或走入皮膚移動不
定苦熱四肢煩疼贏乏短氣方
蜈蚣壹枝 牛黃壹分 大黃貳兩 丹砂 人參各壹分
細辛 鬼臼 當歸 桂心 乾薑各肆兩
黃芩 麝香各半兩 附子肆枝
右十二味㕮咀以水一斗煮取二升去滓下牛黃麝香
末勻二服
治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時
搶心胷滿脅痛如刀刺口噤者方
甘草 茯苓 乾薑
羊脂 乾地黃 當歸
吳茱萸 桂心各貳兩 栀子人拾伍枝 細辛各壹兩 芍藥
右十一味㕮咀以水八升煮取二升去滓內脂炸盡分
二服欲利者加大黃二兩
治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛者方

靜嘉堂文庫所藏

乾地黃　茯苓　芎藭　當歸　甘草各壹兩
吳茱萸　桂心　乾薑　芍藥各貳兩　梔子人拾四枚
右十味㕮咀以水八升煮取三升分三服痛甚者加羊
脂三兩當歸人參芍藥各一兩心腹堅急加大黃三兩
桃皮湯治中惡氣心腹痛胷脇脹滿短氣方
桃白皮東引者壹握　真珠　附子各壹兩　梔子人拾肆枚
當歸參兩　吳茱萸　豉各伍合　桂心貳兩
右八味㕮咀以水五升煮取二升去滓內真珠末分作
二服一方無當歸以下四味
桃奴湯治中惡諸尸蠱疰心腹卒絞痛方
桃奴　當歸　人參　乾薑各貳兩
芎藭　甘草各參兩　丹砂　麝香

茯苓　犀角　鬼箭羽　桂心各壹兩
右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分三服未
食服大便不通腹滿者加大黃三兩芒消二兩胡洽有雄黃壹兩無丹砂芎藭
治卒中風寒冷溫氣入腹虛脹急滿搶心胷脇叉痛氣息
不通脉弦緊汗不出及得傷寒方
吳茱萸　當歸　麻黃　獨活
甘草　桔梗　茯苓各貳兩　桂心
青木香　石膏　大黃　犀角各參兩
右十二味㕮咀以水九升煮取二升八分三服日三
治風冷氣入腹忽絞痛堅急如吹大小便閉小腹有氣結
如斗大脹滿起其脉弦老者沈遲方

靜嘉堂文庫所藏

雚麥　當歸
猪令　鬼箭羽
桔梗　防己
海藻　呉茱萸
芍藥各貳兩　桂心
大黃各叁兩　一用雚角貳兩

右十一味㕮咀以水九升煮取二升分二服
治諸雜疰相連續死亦治二十年疰疾方

桃根白皮一斤㕮咀以水一斗煮取一斗去滓分八
九服須令二日服盡雚氏用桃根白皮治疰在心腹痛不可忍者

又方　擣桃人一七枚研消服

小附散　治飛尸賊風發時急痛不在一處針則移發

又方　小芥子末雞子白和傅

尸疰鬼疰者即亡尸之中尸疰又挾諸鬼邪為害者也其變動乃有二十六種至九十九種大畧令人寒熱淋漓波
沈默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯
以至於死死後復注易傍人乃至滅門覺如此候者宜急

獺肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一法
不瘥更作

小附散　治飛尸賊風發時急痛不在一處針則移發
日半日乃瘥須臾復發者方

細辛　甘草炙作
烏頭　乾薑各壹兩　雄黃　眞珠各半兩

右九味治下篩酒服方寸匕不知稍增以知為度胡治
椒肉桂心附子

大附散　治五尸疰忤與前狀同者方

黃芩　由跋　椒目　細辛　雄黃
乾薑　黃連各壹兩　金牙　雚角　麝香

靜嘉堂文庫所藏

牛黃各壹分　天雄　桂心各半兩　真珠叁分　蜈蚣壹枚
右十五味治下篩酒服一錢匕日三以知為度

大金牙散　治一切疰病方見第十二卷中

金牙散　治鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊胃脇流熱常處不喜見人志意不定面脫色目赤鼻張唇乾甲黃者方

金牙　雄黃　鐵精　野葛　露蜂房
苓䗪　大黃　甘草　曾青　蛇蛻皮
真珠　丹砂　薤如　乾漆各壹分　石長生
狸骨一作鼈骨　桔梗　鬼臼　鬼箭羽　鬼督郵
椒目　烏頭　滑石各貳分一作消石　毒公
雷丸　鼈甲　狼毒　蕪荑　黎蘆
胡燕采　牛黃各叁分　人參　狼牙　寒水石

桂心八分　石膏伍分　蜈蚣　蜥蜴　附子各壹枚
蜣蜋　亭長各柒枚　元青　徐長卿　斑猫各肆枚
貝母貳枚

右四十五味治下篩先食以酒服一刀圭日再不知漸加之蟲隨大小便出

白术散　治風入臟腑悶絕常自躁痛或風疰入身冷疰鬼疰飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕癢或大便有血小便赤黃妄中勞極

白术　拾肆枚　附子　秦艽　人參
牡蠣　蜀椒　細辛　黃芩　芎藭
牛膝各叁分　乾薑　桂心　防風各伍分　茯苓

靜嘉堂文庫所藏

桔梗　當歸
甘草　麻黃　獨活　柴胡各肆分　烏頭
天雄　杜仲各貳分　石南　莽草　栝蔞根

右二十六味治下篩平旦酒服五分七訖如人行七里久勢欲解更飲酒五合爲佳

太乙備急散　治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼癉及中蠱痓吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日方

雄黃　桂心　芫花各貳分　蜀椒各壹兩
藜蘆　巴豆各壹分　野葛參分　附子伍分

右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更擣合和調置銅器中密貯之勿泄有急疾水服錢五匕可加至半錢匕老小半之病在頭當鼻眉在膈上吐在

下利在四肢當汗出此之所爲如湯沃雪手下皆愈

仲景秘之非賢不傳

龍牙散　治百疰邪鬼飛尸萬病方

龍牙　茯苓各貳兩半　雄黃　礜石各伍兩半　芍藥各伍分
乾地黃　石斛　胡燕巢各參分　鬼箭羽
烏頭　羌活　露蜂房　曾青　眞珠
桂心　杏人　防風　桃奴　鬼臼
鸛骨各壹兩　大黃各壹兩半　白朮　貳兩　蘇子肆合
銅鏡鼻　甘草　橘皮　苦鼓　鬼督郵
遠志　鼈甲各半　貍陰貳具　蜈蚣貳枚

右三十二味治下篩酒服一刀圭以知爲度當有蟲從犬便出

靜嘉堂文庫所藏

治鬼疰蠱疰毒氣變化無常者方

犀角　麝香　丁香
鮫魚皮　丹砂　雄黃　蜈蚣
蜀椒　乾薑各壹分　貝子拾枚
右十二味治下篩酒服方寸匕加至二七日三
【備急】治卒中惡風氣忤迷絕不知人方見第十二卷三味備急丸是
治暴心痛面無顏色欲死者方
以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中消服之利即愈
治蠱疰方
燒猫兒棄灰水服一用雄黃亦良
【墨汁散】治卒得惡疰腹脹方
金下墨壹合

右二味合治以水一升半煮取八合一服令盡須臾吐
下即瘥
治咒疰方
梳齒間刮取垢水服之
【人方】亂髮壹兩　臘月猪脂壹合
右二味取猪脂煎髮令消炸服之蠱死矣
【人方】熬大豆令黑熨之
治一切病食疰方凡食人得病名為食疰
取金下七雞子大為末酢漿清一升和服之行五十
步吐即瘥
【人方】還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰如
杏人大水服之

靜嘉堂文庫所藏

鸛骨圓 治遁尸飛尸積聚胷痛連背走無常處或在藏或腫在腹或奄奄然而痛者方

鸛骨（叁寸） 丹砂（一作丹參） 牡蠣（一作牡丹） 雄黃
莽草（各肆分） 藜蘆 桂心 野葛（各貳分）
斑猫 芫青（各拾肆枚） 巴豆（肆拾枚） 蜈蚣（壹枚）

右十二味為末蜜丸如小豆每服一丸日三以知為度

蜥蜴圓 治癥堅水腫飛尸遁尸寒尸喪尸尸注骨血相注惡氣鬼忤蛄毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼所齧猘犬所咋鴆毒入人五臟服藥以殺其毒毒即消婦人邪氣鬼忤亦能遣之之方（方與積聚篇重）

蜥蜴 蜈蚣（各貳枚） 䗪蟲 杏人（各叁拾枚） 地膽（伍拾枚）
虻蟲（肆拾枚） 蜣蜋（拾肆枚） 朴消 巴豆（各柒分） 澤漆
鬼督郵 桑赤雞 桃奴 犀角（各貳分） 乾薑（肆分）
虎骨（陸分） 甘草（壹兩） 芍藥 甘遂（各伍分） 款冬花（叁分）

右二十味別治巴豆杏人如膏內諸藥末研調下蜜擣二萬杵丸如麻子大食前服三丸日一不下加之不取吐下者一丸日服有人風冷注癖堅二十年得愈

桔梗圓 治毒疰鬼疰食疰冷疰痰飲宿食不消酒癖諸病

桔梗 藜蘆 皂莢 巴豆 附子（各貳兩）

右五味為末蜜和擣萬杵丸如梧子宿不食平旦飲服二丸仰卧服勿眠至食時膈上吐膈下下去惡物如科斗蝦蟇子或長一二尺下後當大虛口乾可作雞羹飲五合太極飲食粥一升三四日病未盡更服忌如藥法

十疰圓 治十種疰氣疰勞疰鬼疰冷疰生人疰死人疰尸

靜嘉堂文庫所藏

疰食疰水疰十疰等方

雄黃　巴豆各貳兩　人參　甘草　麥門冬

細辛一作藁本　桔梗　附子　皂莢　蜀椒各壹兩

右十味末蜜丸如梧子空腹服五丸日再稍加以知爲度

太乙神明陷冰圓治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長病欬逆唾噫辟除衆惡殺鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胷中結氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之挑手心中慍慍如有蟲狀毒注相染甚至滅門者方

雄黃　桂心　丹砂　礬石一作礜石　藜蘆

大黃各貳兩　芫青伍枚　眞珠　附子各壹兩半　麝香

人參　犀角　鬼臼　射罔　牛黃各壹兩

蜈蚣　蜥蜴各壹枚　烏頭捌枚　杏人參拾枚　斑猫

樗雞　地膽各　當歸各三兩　巴豆壹兩分

右二十四味爲末蜜和擣三萬杵丸如小豆先食服一丸日再不知稍增以藥二丸著門上令衆邪不近傷寒服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸衆邪不能近也胡洽無芫青桂心眞珠麝香人參犀角鬼臼射罔蜥蜴樗雞牛黃當歸只十二味

積聚癖重

江南度世圓治萬病癥結積聚伏尸長病寒熱疰氣流行皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡疰汗出口噤不開心痛方

蜀椒各三兩　人參　細辛　甘草各貳兩　茯苓

眞珠　大黃　乾薑　丹砂　野葛

桂心　雄黃　麝香　鬼臼各壹兩　烏頭

靜嘉堂文庫所藏

牛黄各貳分　附子　紫菀各陸分　巴豆陸拾枚　蜈蚣貳枚
右二十味爲末蜜丸如小豆飲服二丸加至四丸日二
加獺肝一具尤良
大度世圓治萬病與前狀同者方
牛黄　大黄　雄黄　細辛　附子
真珠　甘草　人參　射罔　丹砂
鬼臼　莽草各壹兩　蜀椒　麝香　鬼箭羽
茯苓　桂心　紫菀各貳兩　乾薑各參兩　野葛壹尺
蜥蜴　蜈蚣各壹枚　地膽伍拾枚　元青貳拾枚　樗雞各參拾枚
巴豆人捌拾枚
右二十六味末蜜丸如小豆飲服二丸日二先食服之
[illegible]疰病[illegible]蜴及霍亂中惡小兒客忤長病方

獺肝壹具　蜈蚣壹枚　麝香貳分　雄黄
莽草　丹砂　鬼臼　羊角
巴豆　大黄　牛黄各壹兩
右十一味末蜜丸如麻子空腹服一丸至三丸以知爲度
曲氏千金圓治行諸氣宿食不消飲食中惡心腹痛如刺
及瘧方
消石參分　大黄伍分　桂心　乾薑貳兩　巴豆人卒枚
右五味爲末擣三千杵蜜丸如大豆服一丸神驗無比
巳死者折齒灌之
治卒得尸疰毒痛往來方
杏人　亂髪灰各等分
右二味研如脂丸如梧子每服酒下三丸日二姚氏猪膏和丸

靜嘉堂文庫所藏

治遁尸疰心腹刺痛不可忍者方

桂心　乾薑各壹兩　巴豆人貳兩

右三味治下篩以上酢和如泥傳病上乾即易之

治遁尸疰心腹及身有痛處不得近者方

取艾小按令碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰令強熱置艾上冷即易不過二三度瘥

治遁尸飛尸又治暴風毒腫流入四肢頭面方

白芥子一升熬熟擣以黃丹二兩攪和分作兩分用疎布袋盛更熬使熱以薄痛上當更迭蒸袋常使熱薄之如此三五度即定

治人皮膚中痛名曰癢疰方

醋和燕窠土傳之

治疰疰方

燒車缸令熱斷入水以濕布裹病上

治二十年氣疰方

豉心半升　生椒壹合

右二味以水二升煮取半升適寒溫用竹筒縮取汁令病者側臥手孥大孔射灌之少時當出惡物此法垂死悉治得瘥百千不可具說

灸法

凡五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸疰也今皆取一方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胷傍攻兩脅或纍堤踊起或攣引腰背治之之法灸乳後二寸男左女右可二七壯不止者多其壯數取愈止○又灸兩手大拇指頭各

靜嘉堂文庫所藏

七壯○又灸心下二寸十壯○又灸乳下一寸隨病左右多其壯數○又以細繩量患人兩乳頭內即裁斷中屈之又從乳頭向外量使當肋縫於繩頭灸二壯或七壯男左女右卒症忤攻心胷灸掌七椎隨年壯○又灸心下一寸二壯○又灸手肘文隨年壯

一切病食症灸手小指頭隨年壯男左女右

五毒症不能飲食百病灸心下二寸胃管十壯

水症口中經云肺來乘腎食後口水灸肺輸○又灸二陰交○又灸期門穴在乳下一肋間瀉肺補腎也各隨年壯

一切症無新久先仰臥灸兩乳邊邪下二寸第二肋間隨年壯可至二百壯又治諸熱神良一名注市

重刊務眞人備急千金要方卷之十七

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏



國立國會図書館所蔵

靜嘉堂文庫所藏

大腸腑脉論第一

論曰大腸腑者主肺也肺合皮毛在中央是其候也肺合皮毛於大腸大腸者為行道傳寫之腑也號監官掾重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脉和利精神千金明堂外臺同長二丈一尺大四寸徑一寸之少半六曲盛穀一斗水七升半

右手關前寸口陽絶者無大腸脉也若少氣心下有水氣立秋節即效刺手太陰治陰在魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也若腸中切痛如刺刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯支日重感于寒則泄當臍

靜嘉堂文庫所藏

而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉
腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨
虛上廉三里
大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化
大腸有寒鶩溏有熱便腸垢
大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀
肺前受病移於大腸肺效不已效則遺失便利厥氣客於
大腸則夢田野
肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大
腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相
離者大腸結
肩髃二穴手太陰陽明為表裏大腸若病實則傷熱熱則

腹滿不通口為生穀食下入腸腸實而胃虛食下胃實
而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒
則腸中雷鳴泄青白之利而發於氣水根在大腸水菀中
大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死
手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出合谷
兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外
前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡
肺下膈屬大腸其支者從缺盆直而上頸貫頰入下齒縫
中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔是動則病
齒痛頸腫是主津所生病者口乾鼽衄喉痺肩前臑
痛入指次指痛不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛則
寒慄不復盛者則人迎大二倍於寸口虛者則人迎反小

靜嘉堂文庫所藏

於寸口也

大腸虛實第二 脈二條 灸法七首 方二首

大腸實熱

右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腸鳴善噫面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

生薑瀉肺湯 治大腸實熱腹脹不通口爲生蓼者方

生薑　橘皮　青竹茹　黄芩
梔子人　白朮各三兩　桂心壹兩　茯苓
芒消各壹兩　生地黄　枳殼各兩　大棗拾枚擘破

右十一味以水七升煮取三升去滓下芒消勺一服治腸中膿脹不消方

灸大腸輸四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立口燥上氣口乾目急善驚泄白名曰大腸虛寒主之

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胷中喘腸鳴虛渴唇乾目急善驚泄白名曰大腸虛冷也

黄連湯 治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相逐方

黄連四兩　茯苓　芍藥各叁兩
酸石榴皮五片　地榆五兩　伏龍肝雞子大壹枚

右六味以水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分服治腸中雷鳴相逐痢下方

灸承滿五十壯穴在俠巨關兩邊各一寸半
一寸灸之者俠巨關兩邊各二寸半
治腸中常鳴時上衝心方
灸臍中

治飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃陽綱主之
腹脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹中痛灌灌冬日重感於
寒則泄當臍而痛腸胃間游氣切痛食不化不嘈食則脹
俠臍急天樞主之
腸鳴而痛溫留主之

肛門論第三

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號為通事今史重十
二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臟傷熱則肛
門閉塞大行不通或腫縮入生蟲若腑傷寒則肛門開大
行洞寫肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和
平依經調理方見第二十四卷中

皮虛實第四論一首 方二首

論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外
生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓痠疼然陰
陽表裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實
者熱凡皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱則應
臟寒則應腑

胡麻煎湯 治皮虛主大腸病寒氣關格方
蒴藋根葉切參桃葉皮枝判參萬浦葉切貳升
細糠壹斗 秫米五升

靜嘉堂文庫所藏

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯之於
盆上作小竹牀子臥盆人身坐牀中四面周迴將蒂薦
障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對中泄氣取通
身接汗可得兩食久許如此三日蒸還温藥足汁用之
若盆裏不過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切
勞冷悉皆治之

梔子豉湯治皮實主肺病熱氣方

梔子人　枳實　大青　杏人
柴胡　芒消各貳兩　生地黃　淡竹葉壹升
生玄參五兩　石膏捌兩
右十味以水九升煮取二升去滓下芒消分為二服
效噉第五論一百一十首　方六十首　證七條　效法十四首

論曰經云五臟六腑皆令人咳肺居外而近上合於皮毛皮
毛喜受邪故肺獨易為咳也邪客於肺則寒熱上氣喘汗
出咳動肩背喉鳴甚則唾血肺咳經久不已傳入大腸其
狀咳則遺糞腎咳者其狀引腰背痛甚者咳涎腎咳經久
不已傳入膀胱其狀咳則遺尿肝咳者其狀左脅痛甚者
不得轉側肝咳經久不已傳入膽其狀咳則清苦汁出心
咳者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心咳經
久不已傳入小腸其狀咳則失氣脾咳者其狀右脅痛陰
陰引肩背甚者不得動動則咳劇經久不已傳入胃其狀
咳而嘔嘔甚則長蟲出久咳不已三焦受之三焦咳之狀
咳而腹滿不能飲食此皆飛於胃關於肺使人多涎唾而
面浮腫氣逆也右順時有風寒冷人觸冒解脫傷皮毛間

靜嘉堂文庫所藏

入於肺藏爲欬上氣如此也有非時忽然暴寒傷皮膚中與
肺合則爲欬逆上氣或胷脇支痛咳唾有血者是寒熱得非
時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服溫藥
欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天有非時寒者急
看四時方也

問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有肢欬有肝
欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰
十欬之證以何爲異師曰欲語因欬言不得竟謂之風欬
飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則支痛其脉
反遲謂之肢欬欬則引脅下痛謂之肝欬欬而唾血引手
少陰謂之心欬欬而涎出續續不止引少腹謂之脾欬欬
引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰幷臍中
謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之
厥陰欬風欬者不下之寒欬肢欬肝欬刺足太衝心欬刺
手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽
欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵

夫久欬爲瘀欬而時發熱脉在九菽一作卒弦者非虛也此爲
胷中寒實所致也當吐之

夫欬家其脉弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐耳

欬家其人脉弦爲有水可與十棗湯下之防見不能卧出
者陰不受邪故也留飲欬者其人欬不得卧引項上痛欬
者如小兒掣縱狀夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲過
度所致也其脉沈者不可發汗久欬數歲其脉弱者可治
實大數者死其脉虛者必善冒其人本有支飲在胷中故

靜嘉堂文庫所藏

也治傷飲家上氣汗出而欬傷飲家欬而小便利若失溺
不可發汗汗出即厥逆冷
夫病吐血喘欬上氣其脉數有熱不得卧者死寒家欬而
上氣其脉數者死謂其人形損故也脉大而散散者為氣
實而血虛名曰有表無裏上氣面腫有息其脉浮大不
治加利尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗愈

小青龍湯 治欬逆倚息不得卧方

麻黃　芍藥　細辛　桂心
乾薑　甘草各參兩　五味子　半夏各半升

右八味咬咀以水一斗先煑麻黃減二升去上沫乃內
諸藥煑取三升去滓分三服若渴去半夏
加栝蔞根二兩若微利去麻黃加菫花如雞子大若喘

欬逆者去麻黃加附子一枚若小便不利小腹滿者
麻黃加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏人半升

青龍湯下已多唾口燥寸脉沈尺脉微手足厥逆氣從小
腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小
便難時復冒者與茯苓桂心甘草五味子湯治其氣衝

茯苓肆兩　桂心
甘草各貳兩　五味子半升

右四味咬咀以水八升煑取三升去滓分三服溫服
衝氣即低而反更欬胸滿者用茯苓甘草五味子去桂加
乾薑細辛以治其欬滿方

茯苓肆兩　甘草　細辛各參兩　五味子半升
乾薑

右五味咬咀以水八升煑取三升去滓溫服半升日三
欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也

靜嘉堂文庫所藏

服之當逐渴而渴反上者爲支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水方

半夏　五味子各半升　茯苓　細辛　甘草各二兩　乾薑

右六味咬咀以水八升煮取二升去滓溫服半升日三水去嘔止其人形腫者應內麻黃以其人遂痩故不內麻黃內杏人方

杏人　五味子　半夏各半升　茯苓　細辛　乾薑　甘草各二兩

右七味咬咀以水一斗煮取二升去滓溫服半升日三若逆而內麻黃者其人必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

心下熱如醉此爲胃熱上衝熏其面加大黃利之方

大黃　乾薑　茯苓　五味子　半夏各半升　甘草各二兩　細辛

右八味咬咀以水一斗煮取二升去滓溫服半升日三欲而上氣肺脹其脉浮心下有水煮腦下痛引缺盆設若有實者必躁其人常倚伏小青龍加石膏湯主之方

石膏　乾薑　桂心　甘草　細辛各二兩　麻黃　半夏各半升　五味子一升

右九味咬咀以水一斗先煮麻黃減二升下藥煮取二升半強者服一升羸者減之小兒四合

（仲景用治腦脹而喘脉浮者心下有水外臺同）

辛甘發汗治上氣其脉沈者方

澤瀉三斤 細切以東流水伍斗 煮取一斗伍升去滓澄清 半夏半升
生薑 紫菀一作紫參 白前各伍兩 黃芩
甘草 桂心 人參各叁兩

右九味內澤瀉汁中煮取五升每服五合日二夜一

麥門冬湯 下氣止逆治大逆上氣咽喉不利方

麥門冬汁叁升 半夏壹升 粳米叁合
人參 甘草各貳兩 大棗貳拾枚

右六味以水一斗二升煮取六升去滓服半升日三夜

射干麻黃湯 治效而上氣喉中如水雞聲者方

射干 細辛 款冬花 紫菀 麻黃
生薑各肆兩 大棗柒枚 半夏 五味子各半升

右九味咬咀以東流水一斗二升先煮麻黃去上沫內

藥煮取二升去滓分二服日二

射干麻黃湯 治效而大逆上氣胷滿喉中不利如水雞聲

其脉浮者方

厚朴伍兩 麻黃肆兩 石膏 細辛
小麥壹升 杏人 半夏 五味子各半升 乾薑各貳兩

右九味咬咀以水一斗二升煮小麥熟去滓分二服日三

麻黃石膏湯 治上氣胷滿喉中不利如水雞聲

麻黃肆兩 石膏 雞子大 枚 厚朴伍兩 小麥壹升 杏人半升

右五味以水一斗先煮小麥熟去之下藥煮取二升去
滓分二服 深師用治久逆上氣時時嘔濁但坐不得臥方

皂莢圓 治效逆上氣時時嘔濁但坐不得臥方

靜嘉堂文庫所藏

皂莢八兩爲末蜜和九如梧子大以棗膏和湯服三
九日二夜一必效方以酢炙皂莢

十棗湯 夫有支飲家數煩胷中痛者不卒死至一百日一
歲可與此方

大棗卷枝 大戟 甘遂 芫花各等分

右大戟甘遂芫花擣爲末以水一升五合煮棗取八合
去滓內藥末強者一錢七羸者半錢頓服之平旦服而
不下者明旦更加藥半錢下後自然補養

溫脾湯 治食飽而效者方

甘草 肆兩 大棗貳拾枚

右二味㕮咀以水五升煮取二升分二服溫服之若吐
中痛而聲鳴者加乾薑一兩

白部根湯 治數不得臥兩眼突出方

白部根 生薑各貳兩 細辛 甘草各參兩 貝母
五味子 白朮各貳兩 桂心肆兩 麻黃陸兩

右九味㕮咀以水一斗二升煮取二升去滓分二服飲
錄驗用水八斗煮取三斗

海藻湯 治效而下利胷中痞而短氣心中時悸四肢不欲
動煩不欲食有有痛時惡寒方

海藻肆兩 五味子 半夏各半升 生薑壹斤
細辛 貳兩 茯苓 陸兩 杏人伍拾枚

右七味㕮咀以水一斗煮取二升去滓分二服日三
方無五味子生薑

白前湯 治水效沖上氣身體浮腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥因中作水雞鳴方

白前　紫菀　半夏　大戟各貳兩

右四味咬咀以水一斗浸一宿明旦煮取二升分三服

治九種氣噦欲死百病方

乾薑　半夏　細辛　紫菀　吳茱萸

款冬花一作花茯苓　甘遂　甘草　防葵

人參　烏頭　大黃　杏人各壹拾箇分

巴豆　厚朴　白薇各叁兩分　五味子　遠志

前胡　烏淸　桔梗貳分

當歸　大戟　桂心各叁分　蜀椒　皂莢

右二十八味爲末蜜丸如梧子大先食服二丸日二服

以知爲度不知增之

小青龍湯 治上氣咳嗽

麻黃半斤　杏人百枚　甘草叁兩　桂心壹兩

右四味治下節別研杏人如脂內藥末和合臨氣上時服一方寸匕食久氣未下更服一方寸匕可至三匕

發便服即止一方去桂加大棗令王叔和所撰御服蜀椒圓 治上氣咳嗽甚良

大棗　杏人　烏頭　菖蒲

蜀椒伍分　款冬花

皂莢　紫菀　礬石各壹分　細辛

乾薑　礬石各叁分　吳茱萸　麻黃各貳分

右十二味爲末蜜丸梧子大暮服吞二丸治二十年久

效不過二十九

靜嘉堂文庫所藏

通氣圓治久上氣欬嗽咽中腥臭虛氣攪心痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注時氣食不生肌胷中隔塞嘔逆多唾惡心心下堅滿飲多食少惡瘡淋痛病方

飴糖參升　蜀椒貳升　杏人壹升　蜈蚣伍節　大附子伍枚

乾薑　人參各肆分　桂心陸分　烏頭柒分　天門冬拾分

右十味爲末別治杏人如脂稍稍內藥末擣千杵烊糖乃內藥末中令調和含如半棗一枚日六七夜二三四服以胷中溫爲度若夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣食不消加杏人五合小腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後勿加也有留飲加葶藶一兩

治欬嗽上氣方

蜀椒　桂心　海蛤各肆分　昆布

海藻　乾薑　細辛各陸分　麥門冬拾分

右八味爲末蜜丸梧子大飲服十丸加至二十丸日二服有人風虛中冷胷中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣上欬欬服此方得瘥

治欬嗽胷脅支滿多唾上氣方

礜石一作礬石　烏頭不用分　菖蒲各壹分　細辛

黃環各貳分　欵冬花　紫菀　杏人各參分

吳茱萸肆分　乾薑伍分　蜀椒伍合

右十一味爲末蜜丸梧子大每服一丸著牙上咽汁日五六服劇者常含不止

又方　薑汁壹升半　砂糖伍合

靜嘉堂文庫所藏

右二味煎薑汁減半内糖更煎服之

又方 白糖 四分　皂莢末一方寸匕

右二味先微暖糖令消内皂莢末合和相得丸如小豆先食服一二丸

又方 酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如藥法若吐多以酢飲三四口止之

又方 巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日二枚二日三枚

又方 服芥子七丸以油酒下之

射干煎 治欬嗽上氣方

生射干　款冬花 各貳兩　紫菀　細辛

桑白皮　附子　甘草 各貳分　白蜜

竹瀝　生薑汁 各壹升　乾薑 伍兩　飴糖 伍兩

右十一味以射干先内白蜜并竹瀝中煎五六沸去[illegible]㕮咀六物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴薑汁煎如餔服如酸棗一丸日三夜二不知加之以知為度

杏人煎 治欬嗽上氣鼻中不利方

杏人 伍合　五味子　款冬花 各參合　紫菀

乾薑 各貳兩　桂心 參兩　甘草 肆兩　麻黃 壹斤

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又内膠飴半斤白蜜一斤合内汁中攪令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知加之以知為度

又方 治忽暴嗽失聲語不出方

靜嘉堂文庫所藏

杏人　薑汁
紫菀洛參二通草
右九味㕮咀以水九升煮取二升去滓內杏人脂薑汁
蜜糖和攪微火煎取四升初服二合日再夜一後稍加

芫花　乾薑各等分兩　白蜜貳升

右二味爲末內蜜中令相和微火煎令如棗每服如棗
枚大一枚日二夜一以知爲度欲利者多服深師以治
治二十年久咳者以水伍升煮芫花取
叁升去滓內薑加蜜合煎如棗服之

又方　治同前

款冬花　乾薑末　紫菀各叁兩

五味子貳兩　芫花壹兩熬令赤

右五味咬咀先以水一斗煮二味取二升半去滓內末
花乾薑末加蜜二升合投湯中令調於銅器中微火煎
令如糖每服半棗許日二
治二十年咳嗽或咳或寒熱雖不同悉主之方

細辛　款冬花　防風

紫菀各叁兩　蜀椒伍合

右六味咬咀取藜蘆先煮銅器中次紫菀次細辛次款
冬花次椒以大棗百枚閒煮藥閒以水一斗一升煎
火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明日服
一枚以胃中溫溫爲度若強人咳嗽吐者可小增服之
便吐膿囊裹結吐後勿冷飲食咳愈止藥藥數靜乃食
不爾令人吐不已

治二十年久嗽方

百部根二十斤擣取汁煎如飴服一方寸匕日三服
外臺秘要壹斤煎成煎以溫粥飲調下深師方以白蜜貳升煎五六沸服叁合

又方　紫菀貳兩　款冬花叁兩

右二味治下篩先食飲服一方寸匕日三服七日瘥

又方　白蜜壹斤　生薑貳斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日三服禁一切雜食

治久嗽不瘥方

兎屎肆拾玖枚　硇砂貳分　胡桐律壹分

右三味爲末蜜和丸如梧子大每服三丸以粥飲下日三吐冷物盡瘥

治積年欬嗽喉中呀聲一發不得坐臥方

紫菀　貝母　半夏　桑根白皮

五味子　射干　百部各伍分　款冬花

皂莢　乾薑　橘皮　鬼督郵

細辛各肆分　白石英　杏人各捌分　蜈蚣貳枚

右十六味爲末蜜和丸如梧子大飲服十丸日再稍加至二十丸崔氏無半夏射干乾薑橘皮鬼督郵細辛白石英用麻黃貳兩芫花桑白皮壹兩半以煮棗湯送

款冬圓　治三十年上氣欬嗽唾膿血喘息不得臥方

款冬花　乾薑　蜀椒　吳茱萸

桂心　菖蒲各伍分　人參　細辛

蕘花　紫菀　甘草　桔梗

防風　芫花　茯苓　皂莢各叁分

右十六味爲末蜜丸如梧子大酒服三丸日三服

又方　款冬花　紫菀　細辛　石斛　防風

芎藭　人參　當歸　藁本　甘草

靜嘉堂文庫所藏

蜀椒　白朮　半夏　天雄　菖蒲
鍾乳　桂心　麻黄各参両　獨活貳両　烏頭
芫花　附子各壹両　桃人貳拾枚　大棗貳拾伍枚
右二十四味爲末蜜丸如梧子大酒服二十丸日二服
不知加之酒漬服亦得

又方　款冬花　乾薑　桂心　紫菀各参分
細辛貳分　杏人　皂莢　礜石焼一作礬石
藺茹　烏頭各壹分　蜀椒伍合　吴茱萸伍合
右十二味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日二夜一
七丸嗽不過五十日愈兼欬嗽喉鳴上氣服一劑永瘥

治肺傷欬唾膿血腸澀背氣不能食惡風目暗䀮䀮足脛寒冷方
白膠　生薑各伍両　桂心　人参
紫菀各貳両　大棗貳拾枚　乾地黄切壹升半　桑白皮切貳升
芎藭　大麻人　飴糖各壹升　大麥参升
右十一味㕮咀以水二斗五升煑麥取一斗去麥下藥
煑取二升分五服

五味子湯治唾中有膿血牽胷脇痛方
五味子　桔梗　紫菀　甘草　續斷各貳両
竹茹参両　赤小豆壹升　地黄　桑根白皮各伍両
右九味㕮咀以水九升煑取二升七合分爲三服

竹皮湯治欬逆下血不息方
生竹皮参両　紫菀貳両　飴糖壹斤　生地黄切壹升
右四味㕮咀以水六升煑取三升去滓分三服

靜嘉堂文庫所藏

【前部圓】治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根 冬二兩 升麻半兩 甘草 紫菀

右七味爲末蜜和丸如梧子大每服二九日三以知爲度

治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁 杏人各二升 糖 蜜各二盞 猪膏二合

右五味先以猪膏煎杏人色黃出之以紙拭令淨擣如膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核一枚日夜六七服漸漸增加

治一切肺病欬嗽膿血及唾血不止方

好酥二十斤二物鍊得取凝當出醍醐服一合日三服漸止一切藥皆不出此神方

【又方】二鍊酥如雞子黃適寒温灌鼻中日再夜

【鍾乳七星散】治寒冷欬嗽上氣胷滿唾膿血方又名吸散

鍾乳 礬石 欵冬花 桂心各等分

右四味治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送下先食服日二不知加之數試大驗又云臨井吸服之

【又方】鍾乳 細辛 天雄 紫菀 欵冬花 石膏各等分

右六味治下篩取如大豆七聚如前法吸之日一只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知小益之勿大多

【七星散】治二十年欬嗽方

欵冬花 紫菀 細辛 代赭 桑根白皮 伏龍肝各二兩

靜嘉堂文庫所藏

右六味治下篩作七星聚聚如豌豆者以竹筒口當藥上一吸咽之令藥入腹中先食日二元服四日日復作七星聚以一臠肉多令熟以養轉藥聚上令藥悉漏肉上仰卧咀嚼之細細咽汁令藥力散散割割然毒氣入腹中藥力盡緩咽却取蔗止未蔗復作如初羊牛豚肉皆可猪肉不可用

治噉熏法

以熟艾薄薄布紙上紙黃四寸後以硫黃末薄布艾上務令調勻以狹一枚如紙長卷之作十枚先以火燒纏下去狹煙從孔出口吸煙咽之取吐止明日復熏之如前日一二止自然可蔗得食白粥餘皆忌是熏黃如硫黃見火必焰矣

又方熏黃一兩研令細以蠟紙并上熏黃令與蠟相入調勻捲之如前法熏之亦如上法日一二止以吐為度七日將息後以羊肉羹補之

又方爛青布黃四寸布上布艾艾上布青纔末纔上布少熏黃末又布少鹽又布少豉末急捲之燒令著內燥鐮中以紙蒙頭更作一小孔口吸取煙細細咽之以吐為度若心胷悶時略歇煙盡止日一二度用二捲不盡蔗三七日慎油膩

論曰凡上氣多有服吐藥得蔗亦有針灸得除者宜深體悟之

灸法

噉灸兩乳下黑白際各百壯即蔗○又以蒲當乳頭周匝

靜嘉堂文庫所藏

圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯○又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者是口合度○灸從大推數下行第五節下第六節上穴在中間此即神道穴隨年壯并主上氣○灸手臂中有橫文外骨捻頭得痛處十四壯良

上氣欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯○上氣欬逆短氣風勞百病灸有并二百壯○上氣短氣奔豚灸巨闕灸風門熱府百壯○上氣欬逆胃滿短氣奔豚胃痛灸巨闕期門各五十壯○上氣欬逆短氣胃滿多唾唾惡冷痰灸肺輸五十壯○上氣胃滿短氣欬逆灸雲門五十壯○上氣欬逆胃痺背痛灸胃堂百壯不針○上氣欬逆灸膏中五十壯

上氣氣閉欬逆咽冷聲破喉猜猜灸天牖五十壯一名天窗逆氣虛勞寒損憂恚筋攣痛心中欬逆泄注腹滿喉痺頸項強腸痔逆氣痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻中乾燥滿狂走勞氣凡二十一病皆灸絕骨五十壯穴在內踝上三寸宛宛中

痰飲第六 總一論一法一首 方四十一首

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得卧其人如腫謂之支

靜嘉堂文庫所藏

凡心下有水者藥藥而悸短氣而恐其人眩而癲先寒即爲虛先熱即爲實故水在於心其人心下堅藥藥短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脇下支滿嘔而痛水在於腎心下悸

夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脉偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能食脉沈者留飲病病有留飲者胷下痛引缺盆嗽轉其人勢而不得臥引項上痛欬者如小兒擊發狀夫胷中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沈者有留飲也心下有

留飲其人背寒冷大如手病人有息上引此皆有溢飲在胷中久者缺盆滿滿馬刀腫有劇時此爲氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒自泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沈細此非風也必有飲在上焦其脉虛者爲微勞榮衛不周故也久自瘥一本作久久自瘥

病痰飲者當用温藥和之

小半夏湯 病心腹虛冷游痰氣上胷脇滿不下食嘔逆者

半夏壹升　生薑壹斤　橘皮半斤

右三味以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛內桂心四兩若腹滿痛內當歸三兩羸弱及老人尤宜服之一方用人參二兩仲景無橘皮人參

靜嘉堂文庫所藏

又方 半夏壹升 生薑壹斤 桂心叁兩 甘草壹兩
右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

甘草湯 治心下痰飲胸脅支滿目眩方
甘草貳兩 桂心
白朮各叁兩 茯苓肆兩
右四味㕮咀以水六升煎澒煮取二升去滓服一升日
三小便當利

十棗湯 治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而欬
者此爲飲也方見欬嗽篇中 芫汗方見欬嗽篇中 范汪用大青龍湯

小青龍湯 病溢飲者當發其汗
又久喘滿心下痞堅面色黧黑其
脈沈緊得之數十日醫吐下之不愈者用此方

木防己 茯苓兩 人參肆兩 石膏雞子大 桂心貳兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升分二服渴者即飲
者二日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩若
消二合以水六升煮取一升去滓下利即愈一方不加茯苓

厚朴大黃湯 夫酒客欬者必致吐血此坐久飲過度所致
也其脈虛者必盲其胃中本有支飲支飲胃滿主之之方

厚朴 大黃陸兩 枳實肆兩

右二味㕮咀以水五升煮取二升分爲二服溫服之

葶藶大棗瀉肺湯 治支飲不得息方見肺癰篇中

小半夏加茯苓湯 嘔家不渴渴者爲欲解本渴今反不渴
心下有支飲故也小半夏湯主之又有先渴却嘔者此爲
水停心下小半夏加茯苓湯主之治卒嘔吐心下痞膈間

靜嘉堂文庫所藏

有水目眩悸方

半夏壹升　茯苓參兩　生薑半斤

右三味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓分再服溫服之胡治不用茯苓用桂心肆兩

茯苓散　假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癲眩水也此方主之方見前茅九卷中

椒目圓　腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之

椒目　木防己　大黃各壹兩　葶藶貳兩

右四味爲末蜜丸如梧子大先食飲服一丸日二後稍增口中有津液止渴者加芒消半兩

甘遂半夏湯　病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也此方主之

甘遂大者　芍藥各參枚　甘草壹枚如指大以水壹升煮取半升

右四味以蜜半升內二藥汁合得一升半煎取八合頓服之

大茯苓湯　主胷中結痰飲澼結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

茯苓　白朮各參兩　當歸　橘皮　附子各貳兩　生薑　半夏　桂心　細辛各肆兩一作人參

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服服三劑良

茯苓湯　治胷膈痺滿方

茯苓肆兩　半夏壹升　生薑壹斤　桂心捌兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加

靜嘉堂文庫所藏

大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚此方與第十六卷嘔吐篇方相重分兩加減法不同

大半夏湯 治痰冷澼飲胃膈中不理方

半夏壹升　白朮參兩　生薑捌兩　茯苓
人參　桂心　甘草　附子各貳兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

半夏湯 治痰飲澼氣吞酸方

半夏　吳茱萸各參兩　生薑陸兩　附子壹枚
右四味以水五升煮取一升半分三服老小各半日三

乾棗湯 治腫及支滿澼飲方

大棗拾枚　大戟　大黃　黃芩
甘草　甘遂各壹兩　芫花　芜花各半兩

右八味㕮咀以水五升煮取一升六合分內服空心服以快下爲度

當歸湯 治留飲宿食不消膜中積聚轉下方

當歸　人參　牡心　黃芩　甘草
芍藥　芒消各貳兩　大黃肆兩　生薑　澤瀉各參兩

右十味㕮咀以水一斗煮取二升分二服

治痰飲飲食不消乾嘔方

人參　旋復花　橘皮　細辛各壹兩　澤瀉
白朮　杏人　松實各貳枝　茯苓　柴胡
生薑　半夏　芍藥各參兩

右十二味㕮咀以水九升煮取二升七合分二服日三

治胷中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

靜嘉堂文庫所藏

檳榔拾貳枝 生薑
半夏捌兩 茯苓伍兩
杏人 白朮各肆兩
橘皮叁兩
右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

治胷中積冷心嘈煩滿汪汪不下飲食心胷應
背痛方

吳茱萸叁兩半夏肆兩 桂心 人參各貳兩
甘草壹兩 生薑伍兩 大棗貳拾枚
右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服日三
治胷膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口
中清水自出脅肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷故
其脉喜沈弦細遲悉主之方

半夏 生薑各伍兩 芍藥叁兩 茯苓肆兩

辟復花 細辛
人參 甘草
右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服病先有
喜水下者用白朮二兩去辟復花若欲得利者加大
一二兩須微調者用乾地黃

治冷熱父辟實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡 生薑 茯苓 半夏各肆兩
甘草 枳實 白朮各叁兩 桂心貳兩
右八味㕮咀以水八升煮取二升分二服

前胡湯 治胷中久寒辟實隔塞胷痛氣不通利二焦冷氣
不調飲食淡泊無味或寒熱身重臥不欲起方

前胡 人參
當歸 甘草

靜嘉堂文庫所藏

半夏各叁兩 大黃 防風 麥門冬
呂茱萸 黃芩各壹兩 生薑肆兩 杏人肆拾枚
右十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服深師方云
若脇下滿加大棗拾貳枚此利水亦生

旋復花湯 治胷膈痰結唾如膠不下食者方

旋復花 細辛 前胡 甘草 茯苓各貳兩
生薑捌兩 桂心肆兩 半夏壹升 烏頭伍枚
右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

薑椒湯 治胷中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐
薑汁柒合 蜀椒叁合 桂心 附子 甘草各壹兩
茯苓各貳兩 半夏叁兩 橘皮 枯梗 旋復花
右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內薑汁煮取
二升分二服服三劑佳若欲服大散諸五石丸必先服
此湯及進黃耆丸佳一方不用甘草

薑附湯 治痰冷澼氣胷滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方
生薑捌兩 附子肆兩生用四破
右二味㕮咀以水八升煮取二升分四服亦主卒風

掠腸散 治心上結痰飲實寒冷心悶方
瓜丁貳拾枚 赤小豆貳拾枚 人參 甘草各壹分
右四味治下篩酒服方寸匕日二亦治諸黃

斷腸湯 治胷中痰澼方
恒山叁兩 甘草 松蘿各壹兩 瓜蒂貳拾壹枚
右四味㕮咀以水酒各一升半煮取一升半分二服後
服漸減之得快吐後須服半夏湯半夏湯方見前當

靜嘉堂文庫所藏

松蘿湯 治胷中痰積熱皆除方

松蘿貳兩 烏梅 栀子各拾肆枚 甘草壹兩 恒山叁兩

右五味㕮咀以酒三升浸一宿平旦以水三升煮取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止

杜衡湯 主吐百病方

杜衡 松蘿各叁兩 瓜丁叁枚

右三味㕮咀以酒一升二合漬一宿去滓分二服若一服即吐者止未吐者更服相去如行十里又令藥力盡服一升稀糜即定老小用之亦佳

蜜煎 主寒熱方

蜜伍合 恒山 甘草各貳兩

右三味取二味㕮咀以水一斗煮取二升去滓納蜜

服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水一方用醋捌合

方 蜜貳合

右二味調和平旦頓服須臾猥猥然欲吐摘之若意中不盡明日更服無不大嘔安穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胷膈中痰厥氣衝所致名為厥頭痛吐之即瘥方

單煮茗作飲二三升許適冷暖飲二升須臾摘即吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽乃止不損人而渴則瘥

忍白湯 治冷熱膈脘發時頭痛悶亂欲吐不得者方

葱白貳茎亞 烏頭 甘草 真珠 恒山各半兩 桃葉壹把一作桃枝葉

右六味㕮咀以水酒各四升和煑取三升去滓内珠每服一升吐即止

大五飲圓主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水澼在兩脅下三曰淡飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五臓間五曰流飲水在腸間動揺有聲夫五飲者由飲酒後及傷寒飲冷水過多所致方

蓯蓉　遠志　苦參　藜蘆　烏賊骨
白朮　甘遂　大黄　石膏　栝蔞根
桔梗　半夏　紫菀　前胡　五味子
芒消　桂心　芫花　當歸　人參
貝母　茯苓　芍藥　大戟　葶藶
黄芩各壹分　甘草　恒山　薯蕷　厚朴
細辛　附子各叁分　巴豆叁拾枚

右三十三味為末蜜和丸如梧子大飲服三丸日三稍加之以知為度

旋復花圓治停痰澼飲結在兩脅腹脹滿羸瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利腹中動揺作水聲腹内熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛方

旋復花　桂心　枳實　人參各伍分　甘遂叁分
吳茱萸　細辛　大黄　黄芩　葶藶
厚朴　芫花　橘皮各肆分　乾薑　芍藥
白朮各陸分　茯苓　狼毒　烏頭　礜石各捌分

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日二後加以知為度延年方無白朮狼毒烏頭礜石細辛黄芩厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂有皂莢附子各貳分蜀

靜嘉堂文庫所藏

椒防葵杏人各叁兩乾地黃肆分

中軍候黑圓治澼飲停結滿悶目暗方黑又作里

芫花叁兩　巴豆捌分　杏人伍分　桂心　桔梗各貳分

右五味為末蜜丸如胡豆每日服三丸稍增得快下止

順流紫圓治心腹積聚兩脇脹滿留飲痰澼大小便不利小腹切痛膈上塞方

石膏伍分　代赭　烏賊骨

半夏各叁分　桂心肆分　巴豆柒枚

右六味為末蜜丸如胡豆平旦服一丸加至二丸胡洽有藜蘆茯苓當歸各叁兩八分范汪方無石膏半夏有當歸壹兩八分茯苓各叁兩八分茯苓貳分藜蘆伍分

治停痰澼飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食食不消喜噫酢大小便或澀或利方

旋復花　大黃　附子　茯苓

椒目　桂心　芫花　狼毒

乾薑　芍藥　枳實　細辛各捌分

右十二味為末蜜丸如梧子飲下二三丸日三服後漸增

治風氣膈上痰飲方

不開口苦瓠湯煑三二五沸以物裹熨心膈上

治結積留飲澼囊胃滿飲食不消方

灸通谷五十壯

九蟲第七　論二首　方四十五首

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害尸蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰蚘蟲長一尺三曰白蟲

靜嘉堂文庫所藏

長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蜣蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲則羣蟲之主也蚘蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蜣蟲居腘腸之間多則爲瘕因人羸瘦即生諸癰疽癩瘻瘍疥癬蟲無所不爲人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以白雞草沐浴佳根葉皆可用既是香草且是尸蟲所畏也論曰凡欲服補藥及治諸病皆須去諸蟲并痰飲宿澼醒醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力

治肝勞生長蟲在肝爲病恐畏不安眼中乍

蠐螬　吳茱萸東行根皮各叁兩

乾槐肆兩　雞子伍枚去黃更搥米粉半斤

右五味擣茱萸皮爲末和藥銅器中煎可丸如小豆大宿勿食平旦飲服一百丸小兒五十丸蟲當爛出方集驗

茱萸根名雞子丸

治心勞熱傷心有長蟲多白蟲長一尺貫心爲病方

雷丸　橘皮　石蠶　桃人各伍分一作桃皮

狼牙陸分貫衆貳枚殭蠶叁枚　吳茱萸根皮柒分

蕪荑　青葙　乾槐各肆分　亂髮如雞子大燒

右十二味爲末蜜丸如梧子空腹苦酒下十丸加至二七丸日二服一方無石蠶

靜嘉堂文庫所藏

治脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔下蟲方
大麻子 捌升　橘皮 貳兩　東引吳茱萸根 大者壹尺
右三味㕮咀以水煎臨時量服凡合禁聲勿語道作藥
蟲當聞便不下切忌之
治肺勞熱生蟲在肺爲病方
狼牙 叁兩　東行桑根白皮 切壹升
東行吳茱萸根白皮 伍合
右三味㕮咀以酒七升煑取一升平旦頓服之
治腎勞熱四肢腫急蟯蟲狀如菜蟲在腎中爲病方
蕪荑　胡粉　槐皮 各壹兩　乾漆 貳兩
貫衆 叁枚　杏人 肆拾枚　吳茱萸 伍拾枚
右七味治下篩平旦井花水服方寸匕加至一匕半

治蟯蟲方
以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煑數沸宿不食
空心頓服之
又方 真珠 貳兩　亂髮 如雞子大燒末
右二味治下篩以苦酒調旦起頓服之 附後方用治三蟲
雚蘆圓 治少小有蚘蟲結在腹中數發腹痛微下白汁吐
悶寒熱飲食不生肌皮肉痿黃四肢不相勝舉方
蕪荑　貫衆　雷丸　山茱萸
天門冬　狼牙 各捌分　雚蘆　甘菊花 各肆分
右八味爲末蜜丸如大豆三歲飲服五丸五歲以上以
意加之漸至十丸加雚蘆六分名雚蘆丸治老小及婦
人等萬病腹內冷熱不通急滿痛胸膈堅滿手足煩熱

靜嘉堂文庫所藏

上氣不得飲食身體氣腫腰脚不遂腹內狀如水雞鳴
婦人月經不調無所不治

治蚘蟲方
雚蘆末以飲臛和服方寸匕不覺加之（備急以治蟯蟲）

治熱患有蚘蟲懊憹方
雚蘆拾分　乾漆　萹竹各貳分
右三味治下篩米飲和一合服之日三

治蚘蟲在胃中漸漸羸人方
醇酒　白蜜　好漆各壹升（外臺作好鹽）
右三味內銅器中微火煎令可丸如桃核一枚溫酒中
宿勿食旦服之蟲必下未下更服（外臺治蟯蟲）

又方　取楝實淳苦酒中浸再宿用綿裹內穀道中入三寸
一日易之（集驗方用治長蟲）

治蚘蟲攻心腹痛方
剉薏苡根二斤以水七升煮取三升先食服之蟲即
死出

又方　鶴蝨苦酒空腹服方寸匕佳

又方　七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸匕（日三即瘥）

治寸白蟲方
吳茱萸細根壹把（熟擣）　大麻子參升（熬擣末）
右二味以水三升和搦取汁平旦頓服至巳時與好食
令飽須臾蟲出不瘥明旦更合服之不瘥三日服（肘後治三蟲以酒漬取汁服）

又方　蕪荑陸分　狼牙肆分　白斂貳分

右二味治下篩以苦酒二合和一宿次早空腹服之

又方 胡麻壹升　胡粉壹兩

右二味為末明旦空腹以豬肉臛汁嗽盡即瘥

又方 槀子四十九枚去皮以月上旬平旦空腹服七枚七日服盡蟲消成水永瘥

又方 取吳茱萸北陰根乾去土切二升以酒一升浸一宿平旦六分二服凡茱萸皆用細根東引北陰者良若如指以上大不在用

又方 用石榴根如茱萸法亦可水煮

又方 研大麻取汁五升分五服亦治小兒蛕蟲

又方 以好油麻二升煎令熟內葱白三寸葱白黑便熟絞頓服之

又方 整飽令十分燥作末以藥方寸匕內羊肉臛中服之

又方 桑根白皮切二升以水七升煮取二升宿勿食平旦空腹頓服明後云齊大行中見其腹多蟲故地宜遠蚘之

又方 檳榔二七枚治下篩以水二升半先煮其皮取一升半去滓內末頻服暖卧蟲沉或不盡更合服取瘥止

衛生家寶

論曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齒斷無色舌上盡白其者脊梁有瘡內如栗瘡者心內懊憹痛悶此蟲在上蝕其有瘡唾血脊內如栗瘡者心內懊憹痛悶此蟲在上蝕其五臟下脅內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服此蚘蟲藥不爾蟲殺人又曰凡患瀉蟲者多

靜嘉堂文庫所藏

是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此病亦有乾蠱不甚泄痢而下部瘡癢不問乾濕久則殺人凡濕得冷而苦痢單煮黃連及艾葉苦參之蠱皆可用之若病人齒斷無色舌卜白者或喜眠煩憒不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下部為意下部生蟲蟲蝕其肛肛爛見五臟便死燒艾於竹筒熏之

治傷寒蠱病方

取生雞子小頭叩破入漆一合熟和攪令極調當沫出更內著熱水中仰吞之食頃或半日乃吐下蟲劇若再服蟲盡除病愈

治濕蠱方

黃連　生薑各若干兩　艾葉別兩　苦參肆兩

右內咏叹以水一斗煮取二升分二服久者服二劑

懊憹散　治濕蠱瘡爛殺蟲除蠱方

蒴竹半兩　薤盧

青葙　女青　雷丸

右六味治下篩粥飲服方寸匕日三加至二匕亦酒服

青葙散　治熱病有蠱下部生瘡方

青葙子　吉豆兩　橘皮

薤盧肆兩　蒴竹各貳兩

右六味治下篩米飲和每服一合日三不知稍加之以無甘草

薤蠱湯　治濕蠱方

靜嘉堂文庫所藏

生薑汁一合　白蜜叁合

右二味以水二升別煮黃連取一升去滓內薑蜜更煎

取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

治蠱蟲蝕下部瘡穀道中生瘡方

阿膠　當歸

右四味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分二服

苦人湯　治蠱方

杏人伍拾枚　苦酒貳升　鹽壹合

右二味和煮取五合頓服之小兒以意量服

桃皮湯　治蝕蟲蛔蟲及痔瘻蟲食下部生瘡方

桃皮　艾葉各壹把　青葙子各貳兩

右四味㕮咀以水二升煮取半升頓服之良

猪膽一具苦酒半升和之火煎令沸二上二下藥成

放溫空腹飲二漱口蟲死便愈

治溫病下部有瘡蟲蝕人五臟方

雄黃　皂莢各壹分　麝香　朱砂各貳分

右四味為末蜜和擣萬杵初得病酒服如梧子大一丸

日二若下部有瘡取如梧子大末內下部日二

治下部生瘡方

濃煮桃皮煎如糖取內下部口中有瘡含之

治濕蠱方

取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以

水一升半合和相得平旦空腹服仍前止薑一枚如

靜嘉堂文庫所藏

繭大以楸葉若桃葉數重裹訖於糖灰火中燒令溫
熱內下部中食頃若濕盛者日二日作頻服無有不差

又方 青黛貳兩 黃連 黃蘗 丁香各壹兩 麝香貳分

右五味治下篩以小棗大內下部中日一度重者棗大
和車脂二三合灌下部中日一服

雄黃兌散 治時氣病䘌下部生瘡方

雄黃半兩 桃人壹兩 青葙子 黃連 苦參各叁兩

右五味為末綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸
匕日三

治病䘌蟲方

燒馬蹄灰作末以豬脂和傅綿繩上內下部中日四
五度

治大孔蟲癢方

蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸綿裹訖宿內大孔
中明旦蟲皆出水銀損腸宜慎之

治䘌蝕下部方

胡粉 雄黃

右二味各等分為末著穀道中亦治小兒

治傷寒熱病多睡變成濕䘌四肢煩疼不得食方

羊桃十斤切擣令熟暖湯三斗淹漬之日正午時入
中坐一炊久不過三度差

治熱病䘌毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下利膿血當
數視其人下部大小之孔稷稷然一作戢戢然赤則䘌蝕也

䘌因殺人見人肝肺服藥不差可熏之方

以泥作小甕令受一升竹筒一枚指大者一頭横
穿入甕腹中一頭内人穀道中浅入可取熟艾如鶏
子大着甕中然之於甕口吹氣令入人腹艾盡乃止
大人可受艾小兒減之羸者不得多多亦害人日再
熏不過三作蟲則死下斷亦可未
愈雄黄如此熏之

重刊務眞人備急千金要方卷之十八

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


134
24
4 10

靜嘉堂文庫所藏

腎藏脉論第一

論曰腎主精腎者生來精靈之本也爲後官內宦則爲女主所以天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生來謂之精精者腎之藏也腎之官也腎氣通於耳耳和則能聞五音矣腎在竅爲耳然則腎氣上通於耳下通於陰也左腎主右腎與臍相當經於上焦深於中焦衛於下焦外主胥內主膀胱腎重一斤一兩有兩枚神名澒澒主藏精號爲精藏隨節應會故云腎藏精精舍志在氣爲欠在液爲唾腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑

靜嘉堂文庫所藏

氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵没居水中

凡胃藏象水與膀胱合爲腑其經足少陰與太陽爲表裏其脉沈相於秋王於冬冬時萬物之所藏白蟲伏蟄陽氣下陷陰氣上昇陽氣中出陰氣列而爲霜遂不上昇化爲霜雪猛獸伏蟄蟄蟲匿藏其脉爲沈沈爲陰在裏不可發汗發之者如蟄蟲出見其霜雪陰氣在表陽氣在藏慎不可下下之者傷脾脾土弱即水氣妄行如魚出水蛾入湯重客在裏慎不可熏熏之逆客其息則喘無持客熱令口爛瘡陰脉且解血散不通正陽遂厥陰不往從客熱狂內爲結胸脾氣遂弱清溲利通

脉如營炙脉者腎也北方水也萬物之所以合藏也故

脉緊來沈以搏故曰營炙此者病何如而反其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人解㑊脊脉痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病飢肋中清脊中痛小腹滿小便變赤黃

腎脉來喘喘累累如引葛按之而堅曰平冬以胃氣爲本腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎脉來發如奪索辟辟如彈石曰腎死

腎脉至搏而絶如以指彈石辟辟然色黃黑不澤毛折乃死

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有勾曰夏病勾甚曰金病凡人以水谷爲本故人絶水谷則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真藏脉不得胃氣

靜嘉堂文庫所藏

也所謂脉不得胃氣者肝不弦腎不石也
腎藏精精舍志志盛怒不止則傷志志傷則善忘刖言腰脊
痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏
足少陰氣絶則骨枯少陰者灵脉也伏行而濡滑骨髓者
也故骨不濡則肉不相親即肉濡而却
肉濡而却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤已
死土勝水也
腎死藏浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死
冬腎水王其脉沉濡而滑曰平反得微澁而短者是肺之
乘腎母之歸子為虛邪雖病易治反得弦細而長者是肝
之乘腎子之乘母為實邪雖病自愈反得大而緩者是脾
之乘腎土之刻水為賊邪大逆十死不治反得浮大而洪
者是心之乘腎火之陵水為微邪雖病即瘥
左手關後尺中陰絶者無腎脉也若足下熱兩髀裏急精
氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽左手關後尺中陰實者
腎實也若恍惚忘目視眺眺耳聾悵悵善鳴刺足少陰治陰
右手關後尺中陰絶者無腎脉也若足逆冷上搶胸痛夢
入水見鬼善驚狂黑色物來掩人上刺足太陽治陽
右手關後尺中陰實者腎實也若骨疼腰脊痛內寒熱刺
足少陰治陰
腎脉沈細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至
死六至命盡足少陰脉也
腎脉急甚為骨痿癲疾微急為奔豚沈緊足不收不得前
後緩甚為洞下洞下者食不化入咽還出大

靜嘉堂文庫所藏

甚爲陰痿微大爲石水起臍下以至小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚爲洞泄微小爲消癉滑甚爲癰癭微滑爲骨痿坐不能起目無所見視見黑花滿甚爲大癰微滿爲不月水沈痔

腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其耎而散者當病少血黑脉之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎癉得之沐浴清水而臥

扁鵲曰腎有病則耳聾腎在竅爲耳然則腎氣上通於耳五藏不和則九竅不通陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者不得盡期而死也

腎在聲爲呻在變動爲慄在志爲恐恐傷腎精氣并於腎則恐

[illegible]支病在藏者取之非

病先發於腎小腹腰脊痛脛酸一日之勝脫背膂筋痛小便閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不已死冬大寒夏晏晡

病在腎夜半慧日乘四季甚下晡靜

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當以長夏時發得病以戊己日也

凡腎病之狀必腹大脛腫痛喘欬身重寢汗出憎風虛即胃中痛大腹小腹痛清欬意不樂取其經足少陰太陽諸腎脉沈之而大堅浮之而大緊苦手足骨腫欬而陰不興腰脊痛小腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之浴水中身未乾而合房內及勞倦發之

靜嘉堂文庫所藏

腎病其色黑其氣虛弱吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時時失精飲食減少膝以下清其脉沈滑而遲此爲可治宜服內補散建中湯腎氣丸地黃煎春當刺涌泉秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺太谿皆瀉之又當灸京門五十壯背第十四椎百壯

邪在腎則骨痛陰痺陰痺者按之而不得腰脹腰痛大便難肩背頸項強痛時眩取之涌泉崑崙視有血者盡取之有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎

腎藏

腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻頭汗其足逆寒大便反堅一云面反瘦

腎中風關腎中寒關

腎脹者腹滿引背央央然腰髀一作脾痛

腎著之病其人身體重腰中冷如冰狀一作如水狀一作如坐水中形如水狀反不渴小便自利食飲如故是其證也病氣下焦從身勞汗出衣裏冷濕故久久得之

腎著之爲病從腰以下冷腰重如帶五千錢

診得腎積脉沈而急按之與腰相引痛劇則見飽則減少腰裏急口乾咽腫傷爛目瞤瞤骨中寒主髓厥善忘色黑腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下如豚奔走之狀上下無時久久不愈病喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何也脾病傳腎腎當傳心心適以夏王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受因留結爲積故知奔豚以夏得之腎病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩疼小腹結痛氣衝於心其脉當沈細而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土

靜嘉堂文庫所藏

之尅水爲大逆十死不治

羽音人者主腎聲也腎聲呻其音瑟其志恐其經足少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽飜祚陽氣内伏陰氣外昇昇則寒寒則虚虚則厲風所傷語音謇吃不轉偏枯脚偏跛蹇若在左則左腎傷在右則右腎傷其偏枯風體從鼻而分半邊至脚緩弱不遂口亦欹語聲混濁便利仰人耳偏聾塞腰背相引甚則不可治腎瀝湯主之方見第八卷中又呻而好恚恚而善忘恍惚有所思此爲土尅水陽擊陰陰氣伏而陽氣起起則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黄語音口動而不出笑而看人此爲邪熱傷腎甚則不可治若面黑黄耳不應亦可治

腎病爲瘖者令人僂僂然腰脊痛死轉大便難目眴眴然身搖不定手足戰恒山湯主之方見第十卷中若其人本來不吃吃然謇吃而好嗔恚反於常性此腎已傷雖未發覺已是其候見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手栅腹把眼偐此腎病聲之候也虚實表裏浮沈清濁宜以察之逐以治之

黑爲腎腎合骨黑如烏羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上羽黑色大頭曲面廣頤小肩大腹小手足發行搖身下尻長背延延也不敬畏善欺紿人戮死耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足少陰汗汗然耳大小高下厚薄偏圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難傷粗理者則腎大大則虚虚則腎寒耳聾或鳴汗出腰痛不得俛仰易傷以邪耳高者則腎高高則實實則腎熱背急綴痛耳膿血出或生肉塞耳耳後陷者則腎下下則腰尻

腎藏

痛不可以俛仰爲狐疝耳堅者則腎堅堅則腎不受病不
病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼鬧善病消癉
耳好前居牙車者則腎端正端正則和利難傷耳偏高者
則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分部骨陷者必死不
免使膀胱并太陽爲腎之部骨當其處陷也而藏氣通於
內外部亦隨而應之沈濁爲內浮清爲外若色從外走內
者病從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷
內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內
凡人生死休否則藏神前變形于外人腎前病耳則爲之
焦枯若腎前死耳則爲之黫黑焦癖若天中等分墓色應
之必死不治看應增損斟酌賒促賒不出四百日內促則
旬月之間腎病少愈而卒死何以知之曰黃黑色黫黑如

拇指應耳耳必卒死腎絕四日死何以知之齒爲暴枯面
爲正黑目中黃腰中欲折白汗出如流面黑目青（白一作黔）
黑內傷病因留積八日當亡是死變也面黃目黑不死黑
如炲死吉凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官
位相法若不遭官事而應死也其人面目帶黃黑連耳左
右年四十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年
上無三年之內禍必至矣
冬水腎脈色黑主足少陰脈也少陰何以主腎曰腎者主
陰陰水也皆生於腎此脈名曰太衝凡五十七穴冬取其
井滎冬者水始治腎方閉陽氣衰少陰氣堅盛太陽氣伏
沈陽脈乃去故取井以下陰氣逆取滎以通（素問作實）陽氣其
脈本在內踝下二寸應舌下兩脈其脈根于涌泉（涌泉在脚心下）

靜嘉堂文庫所藏

大指指端
其筋起於小指之下入足心並太陰之筋而邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上循陰股結於陰器循脊內俠膂上至項結於枕骨與太陽之筋合

其脉起於小指之下斜趣足心出然骨之下循內踝之後別入跟中以上腨內出膕中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中合足太陽為表裏大陽不在跟以上五寸中同會于手太陰當踝後繞跟別走太陽其別者其足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊主腎生病病實則膀胱脫熱虛則腰痛痿厥嗜卧足下熱而痛炎則強食而生災緩帶被髮夫杖重襲而步虛則膀胱脫寒寒則腰痛痛則陰脉反小於寸口其病則飢而不欲食面黑如炭色欬唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目眩眩無所見心悸若病飢狀氣不足則善恐心惕惕若人將捕之是為骨厥

冬三月者主腎膀胱黑骨濕病也其源從大陽少陰相搏熱積三焦上下壅塞陰毒內行臟腑受客邪之氣則病生矣其病相反若腑虛則為陰毒所傷裏熱外寒意欲守火而引飲或腰中痛欲折若臟實則為陽溫所損胃脘切痛類如刀刺不得動轉熱彰喜嘔若服冷藥過差而便洞瀉故

靜嘉堂文庫所藏

曰黑骨温病也

扁鵲曰灸脾肝腎三輸主治丹金毒黑温之病當依源為理調臟理腑清濁之病不生也

腎虛實第二 脉四條 方四首 灸法一首

腎實熱

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩嗌乾胷脇時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背強急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑耳聾名曰腎實熱也 脉經云腎實熱者病苦膀胱脹閉小腹與腰脊相引痛也

右手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦痺身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩名曰腎實熱也

瀉腎湯 治腎實熱小便脹滿四肢正黑耳聾夢腰脊離解及伏水等氣急方

芒消 茯苓 黃芩各三兩 生地黃汁

菖蒲各五兩 大黃切以水一升密器中宿漬 磁石八兩碎如雀頭

玄參 細辛各四兩 甘草二兩

右十味㕮咀以水九升煮七味取二升半去滓下大黃內藥汁中更煮減二三合去大黃內地黃汁微煎一兩沸下芒消分三服

治腎熱好怒好忘耳聽無聞四肢滿急腰背轉動強直方

柴胡 茯神外臺作茯苓 黃芩 澤瀉

升麻 杏人 大青 芒消各三兩

淡竹葉 地黃各切一升 磁石八兩碎 羚羊角一兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下芒消分三服

靜嘉堂文庫所藏

治腎熱小便黃赤不出出如梔子汁或如黃蘗汁每欲小
便莖頭即痛方

榆白皮切 冬葵子各壹升 車前子切貳升 滑石捌兩碎
子芩 通草 瞿麥各叁兩 石葦肆兩

右八味㕮咀以水二斗先煮車前草取一斗去滓澄清
取九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱
實也病苦脊強反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側名
曰腎與膀胱俱實也

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱
實也病苦癲疾頭重與目相引痛厥欲走反眼大風多汗
名曰腎膀胱俱實也

腎虛寒

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心中悶
下重足腫不可以按地名曰腎虛寒也

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足脛小
弱惡寒脉代絕時不至足寒上重下輕行不可按地小腹
脹滿上搶胷痛引脇下名曰腎虛寒也

治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言音混濁陽氣頓絕

蓯蓉 白朮 巴戟天 麥門冬
茯苓 甘草 牛膝 五味子
杜仲各捌兩 車前子 乾薑各伍兩 生乾地黃伍斤

右十二味治下篩食後酒服方寸匕日二

治腎風虛寒方

灸腎輸百壯對臍兩邊向後似脊相去各一寸五分

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病若小便利心痛脊寒時時小腹滿名曰腎膀胱俱虛也

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病若心痛若下重不自收纂及出時時苦洞泄寒中泄腎心俱痛名曰腎膀胱俱虛也

腎勞第二論一首　方五首

論曰凡腎勞病者補肝氣以益之肝王則感於腎矣人逆交三氣則足少陰不藏腎氣沈滯順之則生逆之則死順之

則亂反順為逆是謂關格病則生矣

治腎勞實熱小腹脹滿小便黃赤末有餘瀝數而小腹中痛陰囊生瘡方

梔子人　芍藥

石膏伍兩　滑石拾兩　通草　石韋各叁兩

榆白皮　淡竹葉切各壹升

右十味㕮咀以水一斗煮取二升去滓分二服

麻黃根湯　治腎勞熱陰囊生瘡方

麻黃根　石硫黃各叁兩　米粉伍合

右三味治下篩安槃如常用粉法搭瘡上粉濕更搭之

治腎勞熱妄欲腰脊不可俛仰伸煮散方

丹參　牛膝

葛根　杜仲

靜嘉堂文庫所藏

乾地黃　甘草　猪苓各貳兩半　茯苓
遠志　子苓各壹兩　柏子仁各貳兩　五加皮
羚羊角　生薑　石膏各叁兩　桂心
右十六味治下篩爲粗散以水三升煮兩方寸匕帛裹
之時用動取八合爲一服日二服
治虛勞陰陽失度傷筋損脉噦叉短氣溺溢泄下小便赤
黃陰下濕癢腰脊如折顏色隨落方隨一作墮
革解　棗肉　生地黃
桂心　杜仲　麥門冬各壹斤
右六味咬咀以酒一斗五升漬二宿出曝乾復漬如此
候酒盡取乾治下篩食後酒服方寸匕日三
治腎勞虛冷乾枯憂恚內傷久坐濕地則損腎方

秦艽　牛膝　詩鶻　防風　桂心
獨活　茯苓各肆兩　乾薑一作乾地薑　麥門冬
地骨皮各叁兩　杜仲　側子各伍兩　石斛陸兩　丹參捌兩
五加皮捌兩　薏苡人壹斤　大麻子貳升
右十七味咬咀以酒四斗漬七日每服七合日二服
精極第四論一首　方十九首
論曰凡精極者通主五臟六腑之病候也若五臟六腑衰
則形體皆極眼視而無明齒焦而髮落身體重則腎水生
耳聾行步不正凡陽邪害五臟陰邪損六腑陽實則從陰
引陽陰虛則從陽引陰若陽病者主高高則實實則熱眼
視不明齒焦髮脫腹中滿滿則歷節痛痛則宜瀉於內若
陰病者主下下則虛虛則寒身體重則腎水生耳聾行步

靜嘉堂文庫所藏

不正邪氣入內行於五臟則欬欬則多涕唾面腫氣逆邪氣逆於六腑淫虛厥於五臟故曰精極也所以形不足溫之以氣精不足補之以味善治精者先治肌膚筋脉次治六腑若邪至五臟已半死矣

扁鵲曰五陰氣俱絕不可治絕則目系轉轉則目精奪為志先死遠至一日半日非醫所及矣宜須精研以表治裏以左治右以右治左以我知彼疾皆瘥矣

竹葉黃芩湯治精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱方

竹葉切貳升 黃芩 茯苓各參兩 甘草 麥門冬

大黃各貳兩 生薑陸兩 芍藥肆兩 生地黃切壹升

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

治精極五臟六腑俱損傷虛熱遍身煩疼骨中痟痛煩悶

生地黃汁貳升 麥門冬汁 赤蜜各壹升 竹瀝壹合

石膏捌兩 人參 芎藭 桂心

甘草 黃芩 麻黃各參兩 當歸肆兩

右十二味㕮咀以水七升先煮八味取二升去滓下地黃等汁煮取四升分四服日三夜一

治五勞六極虛羸心驚忪弱多魘忘湯方

茯苓肆兩 甘草 芍藥 桂心

乾薑各參兩 大棗伍枚 遠志 人參各貳兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

治虛勞少精方

鹿角為末白蜜和丸如梧子大每服七丸日三服十

曰大效

又方 漬水煮棘子令熟取汁洗陰二十日知

棘刺圓 治虛勞諸氣不足夢泄失精方

棘刺　乾薑　黃絲子各壹兩　天門冬
烏頭　小草　防葵　薯蕷　菖蒲
細辛　石龍芮　枸杞子　巴戟天　菟絲
石斛　厚朴　牛膝　桂心各壹兩

右十八味為末蜜丸如梧子大酒服五九日二服深師方

蜜和細子白各半和丸若患風憂神氣體不便熱煩當
少氣腎渴加菱藥天門冬黃芩小便赤黃不
利加石龍芮枸杞子關
脹時泄數痺吐逆加
便餘瀝加石斛天門冬
以麥門冬代天門冬
子白病小便過多失精

治夢中泄精眾後餘瀝及眾精方

人參　麥門冬　赤石脂　遠志　續斷
鹿茸各壹兩半　柏子人　丹參　韭子各壹兩陰錄
茯苓　龍齒　礜石　蛇床各貳兩　乾地黃醉

右十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再稍加
至三十九

治虛損小便白濁夢泄方

菟絲子　車前子　韭子各壹升　礜石
當歸各貳兩　附子　苓藭各叁兩　桂心壹兩

右八味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三

又方 太乘伍拾枚 韭子伍合 黃耆　人參　甘草
乾薑　當歸　龍骨　半夏　芍藥各貳

靜嘉堂文庫所藏

右十味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日三服

韭子圓 治房室過度精洩自出不禁腰脊不得屈伸食不生肌兩脚苦弱方

韭子 青幷 甘草 桂心 紫石英 禹餘粮
遠志 山茱萸 當歸 天雄 紫菀
薯蕷 細辛 茯苓 礜石 菖蒲
人參 杜仲 白朮 乾薑 芍藥
附子 石斛 天門冬 各壹兩半 菟絲子
黃耆 菟絲子 乾地黃 蛇床子 各貳兩
大棗伍拾枚 牛髓 乾漆 各肆兩

右三十一味爲末牛髓合白蜜棗膏合搗二千杵空腹服如梧子大十五丸日再可加至二十丸

治小便失精及夢洩精方

韭子 麥門冬 各壹兩半 菟絲子
車前子 各貳合 苓蘑 貳兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三不知稍增甚者夜一服用後用澤瀉壹兩半

治大虛勞夢洩精莖核微弱血氣枯竭或醉飽傷於房室驚惕忪悸小腹裏急方

桑根白皮 人參 芍藥
桂心 甘草 茯苓
澤瀉 貳兩 黃耆 壹兩
牡蠣 貳兩 生薑 貳斤 半夏 壹升
白龍骨

右十二味咬咀以水九升煮取四升一服七合日三若不能食小腹急加桂心六兩

靜嘉堂文庫所藏

治夢洩失精方

韭子一升治下篩酒服方寸匕日再之效

治虛勞衆精方

韭子青升　稻米貳升

右以水一斗七升煮如粥取汁六升爲二服精溢同此

又方石榴皮外白作灰白皮切各㕮咀合

右二味以酒五升煮取二升分二服

又方乾膠三兩爲末以酒二升和分三服溫服瘥止一方

用鹿角膠

又方新韭子二升十月霜後採者用好酒八合漬一宿明旦日色好童子向南擣一萬杵平旦溫酒五合服方寸匕日再

治失精羸瘦衰劣前少氣目視不明聾闇人聲方

韭子貳升　粳米青川

右二味於銅器中合熬米黃黑及熟以好酒一斗投之絞取汁七升每服一升日三盡二劑

治失精多睡目瞤脈方

羊骨壹具煎館糖半斤　生地黃　白朮各叁兩　大棗貳拾

桑白皮　厚朴　阿膠各壹兩　麥門冬　人參

芍藥　生薑　甘草各叁兩　茯苓肆兩　桂心捌兩

右十五味㕮咀以水五斗煮羊骨去骨取汁二斗煮藥取八升湯成下膠飴令烊平旦服一升後日服一升

灸法

虛勞衆精灸第七椎兩傍各二十壯○又灸第十椎兩傍

靜嘉堂文庫所藏

各二十壯○又灸第十九椎兩傍各二十壯○又灸陽陵泉陰陵泉各隨年壯

夢洩精灸二陰交二七壯夢斷神良內踝上大脉並四指見

丈夫夢失精及男子小便濁難灸腎輸百壯

男子陰中痠痛溺血精出灸腎端五十壯陰上橫骨中央宛曲如却月中央是也此名橫骨

男子虛勞失精陰上縮灸中封五十壯

端二十寸

男子虛勞失精陰縮灸中封五十壯

男子腰脊冷痠溺多白濁灸脾募百壯

男子夫精脉脫痠痛冷灸曲泉百壯穴在膝內屈文頭

骨極第五論一首　方一首　灸法一首

論曰骨極者主腎也腎應骨骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎耳嗛見黑色是其候也若腎病則骨極牙齒苦痛手足痠痹不能久立屈伸不利身痺腦髓痠以冬壬癸日中邪傷風為腎風風歷骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則其寒則而腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒搖腰脊相引而痛痛甚則效唾甚若氣陽陽則實實則熱熱則面色炲隱曲脛脫不通牙齒腦髓若痛手足痠痹耳鳴色黑是骨極之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善治病者始於皮膚筋脉即須治之若入臟腑則半死矣

痛而切痛伸縮不得十日死骨應足少

靜嘉堂文庫所藏

陰少陰氣絶則骨枯髮無澤骨先死矣

三黃湯 治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏色枯黑耳鳴虛熱方

大黃切別漬水壹升　黃芩各叁兩　梔子拾肆枚

甘草壹兩　芒消貳兩

右五味㕮咀以水四升先煑黃芩梔子甘草取一升五合去滓下大黃又煑兩沸下芒消分三服

灸法

腰背不便筋攣痺縮虛熱閉塞灸第二十一椎兩邊相去各一寸五分隨年壯

小便不利小腹脹滿虛乏灸小腸輸隨年壯

骨虛實第六　論一首　方六首　灸法一首

論曰骨虛者酸疼不安好倦骨實者苦煩熱凡骨虛實之應主于腎膀胱若其腑臟有病從骨生熱則應臟寒則應腑

虎骨酒 治骨虛酸疼不安好倦主膀胱寒方

虎骨一具通炙取黃焦汁盡碎如雀頭大釀米三石麴四斗水三石如常釀酒法所以加水麴者其骨消麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十日開飲之

治骨實苦酸疼煩熱煎方

葛根汁　生地黃汁　赤蜜各壹升　麥門冬汁伍合

右四味相和攪調微火上煎三四沸分三服

治骨髓中疼方

虎骨肆兩　芍藥壹斤　生乾地黃伍斤

靜嘉堂文庫所藏

右三味㕮咀以清酒一斗漬二宿曝乾復入酒中如此取酒盡爲度擣篩酒服方寸匕日三

治骨髓冷疼痛方

取地黃汁一石酒二斗相攪重煎温服日三補髓

又方 茶上廉七十壯三里下二寸是穴

治虛勞冷骨節疼痛無力方

附子 地黃 拗各一斤

右二味兩度烝曝乾爲散食後以酒一升進二方寸匕日三三百日取瘥

又方 天門冬爲散酒服方寸匕日三

腰痛第七 論一首 脈法一首 方十八首 雜療法七首

凡腰痛有五一曰少陰腎也十月萬物陽氣

一見以腰痛二曰風痺風寒著腰是以腰痛三曰腎虛用傷腎是以腰痛四曰腎腰墜墮傷腰是以腰痛五曰取寒眠地為地氣所傷是以腰痛痛不止引牽腰脊背痛

杜仲酒 治腎脉逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胃中動通四時用之方

杜仲 乾薑各四兩一云乾地黃 蜀椒 桂心 芍藥 防風

天雄 秦艽 烏頭 細辛各三兩 五加皮 石斛各五兩

括蔞根 地骨皮 續斷 桔梗 茸草各一兩

右十九味㕮咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七八合日再通治五種腰痛

又方 桑寄生 牡丹皮 鹿茸 桂心

靜嘉堂文庫所藏

右四味各等分治下篩酒服方寸匕日三

又方　單服鹿茸與角亦愈

治腎虛腰痛方

茸薤　桂心　白朮各三分　牡丹皮二分

右四味治下篩酒服方寸匕日三亦可作湯服之甚良

又方　附子二分　桂心　牡丹皮各一兩

右三味治下篩酒服一刀圭日再甚驗

腎著湯　腎著之為病其人身體重腰冷如水洗狀不渴小便自利食飲如故是其證也從作勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢者方古今録驗名甘草湯

甘草二兩　乾薑三兩　茯苓　白朮各四兩

右四味咬咀以水五升煮取三升分三服腰中即温

腎著散方

杜仲　桂心各三兩　甘草　澤瀉

牛膝　乾薑各二兩　白朮　茯苓各四兩

右八味治下篩為粗散一服三方寸匕酒一升煮五六沸去滓頓服日再

治腰疼不得立方

甘遂　桂心一作附子　杜仲　人參各二兩

右四味治下篩以方寸匕內羊腎中炙令熟服之

治腰痛方

革薢　杜仲　枸杞根各一斤

右三味咬咀好酒三斗漬之內甕中密封頭於銅器中煮一日服之無節度取醉

靜嘉堂文庫所藏

杜仲圓　補之之方

杜仲一兩　石斛二分　乾薑　乾地黃各一分

右四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再

丹參圓　治腰痛并冷痺方

丹參　杜仲　牛膝　續斷各三兩　桂心　乾薑各二兩

右六味為末蜜丸如梧子每服二十九日再夜一禁如藥法

獨活寄生湯　腰背痛著皆是腎氣虛弱卧冷濕當風得之不時速治邪流入脚膝或為偏枯冷痺緩弱疼重若有腰痛攣脚重滯急宜服之　方見第八卷中　治腰脊苦痛不遂方

大豆二斗熬一斗熟一斗酒六斗漬一斗一日令極熱豆亦熱內囊中封閉口秋冬二七日於竈口作孔出取服五合日夜二三服

又方　地黃花為末酒服方寸匕日三

又方　甑角去上皮取白者熬令黃為末酒服方寸匕日三特禁生魚餘不禁新者良陳者不佳服角心中黃處亦不中服大神良

又方　羊腎為末酒服二方寸匕日三

又方　三月三日收桃花取一斗一升井花水二斗麴六升米六斗炊之一時釀熟去糟每服一升日三服若作食飲用河水禁如藥法神良

治丈夫腰脚冷不隨不能行方

靜嘉堂文庫所藏

上醇酒二斗水二斗合煮糞中溫漬脚至膝三日止
冷則屢下常著灸火勿使冷手足煩者小便二升益
中溫漬手足
腰腎痛導引法
正東坐收手抱心一人於前據蹲其兩膝一人後捋
其頭徐牽令偃卧頭到地二起二卧止便瘥
針灸法
腰腎痛宜針決臍腰旁畫中青赤路脉出血便瘥
腰痛不得俛仰者令患人正立以竹柱地度至膝斷竹乃
以度度脊脊灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人得知
腰痛灸脚跟上橫文中白肉際十壯良。又灸足巨陽主
壯巨陽在外踝下。又灸腰目窈七壯右亦如左名曰

又灸八邪及外踝上骨約中
腰卒痛灸骶骨上一寸七壯左右一寸各灸七壯

補腎第八 凡五十九首

論曰補方通治五勞六極七傷虛損五勞五臟病六極六
腑病七傷表裏受病五勞者一曰志勞二曰思勞三曰憂
勞四曰心勞五曰疲勞六極者一曰氣極二曰血極三曰
筋極四曰骨極五曰髓極六曰精極七傷者一曰肝傷善
夢二曰心傷善忘心三曰脾傷善飢四曰肺傷善嗽五曰腎
傷善唾六曰骨傷善飢七曰脉傷善嗽凡遠思強慮傷人
憂恚悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願
傷人感慨所患傷人寒暄失節傷人故曰五勞六極七傷
也論傷甚衆且言其畧此方悉主之

靜嘉堂文庫所藏

建中湯治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利方

膠飴半斤　黃耆　乾薑　當歸各三兩
人參　半夏　橘皮　芍藥
甘草各貳兩　附子壹兩　大棗十五枚

右十一味㕮咀以水一斗煑取三升半湯成下膠飴烊沸分四服深師有桂心六兩生薑壹斤無橘皮乾薑

又方治虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不得屈伸不能飲食寒熱頭痛手足逆冷大小便難或復下痢口乾夢中泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節疼痠方

附子　厚朴各壹兩　人參　甘草　桂心
當歸　茯苓各貳兩　麥門冬　黃耆　龍骨各叁兩

芍藥肆兩　生薑伍兩　飴糖四兩　生地黃壹斤　大棗卅枚

右十五味㕮咀以水一斗煑取四升去滓內飴糖每服八合日三夜一若加生薑一倍

又方治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足疼痛久立腰疼起則目眩腹中懸急而有絕傷外引四肢方

生薑　芍藥　乾地黃
甘草　芎藭各叁兩　大棗參拾枚

右六味㕮咀以水六升漬一宿明旦復以水五升合煑取三升分三服藥入四肢百脉似醉狀是效無生薑酒漬乾薑三兩一宿用之常行此方神妙

大建中湯治虛勞寒澼飲在脅下決決有聲飲已如從一邊下決決然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失

精氣短目䀮䀮惚惚多忘方

蜀椒貳合　半夏壹升　生薑壹斤
甘草貳兩　人參叁兩　飴糖捌兩

右六味㕮咀以水一斗煑取三升去滓內糖消服七合裏急拘引加芍藥桂心各三兩手足厥腰背冷加附子一枚勞者加黃耆一兩

又方治五勞七傷小腹急臍下彭亨兩脅脹滿腰脊相引鼻口乾燥目暗䀮䀮憒憒不樂胸中氣急逆不下食飲莖中策策痛小便黃赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去精驚恐虛乏之方

飴糖半斤　黃耆　遠志　當歸千金翼無
澤瀉各三兩　芍藥　人參　龍骨
甘草各貳兩　生薑捌兩　大棗貳拾枚

右十一味㕮咀以水一斗煑取二升半湯成乃納糖令烊一服八合消息又一服深師無飴糖遠志澤瀉龍骨有桂心六兩半夏一升附子一枚

小建中湯凡男女因積勞虛損或大病後不復常苦四體沈滯骨肉疼酸吸吸少氣行動喘惙或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾脣燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘戚多卧少起久者積年輕者百日漸致瘦削五臟氣竭則難可復振治之之方

甘草貳兩　桂心　生薑各叁兩
芍藥陸兩　膠飴壹升　大棗拾貳枚

右六味㕮咀以水九升煑取三升去滓內膠飴每服一升日三間三日復作一劑後可與諸丸散仲景云嘔家不可服肘後

靜嘉堂文庫所藏

一云加黃耆人參各貳兩為佳若患痰滿及溏洩可除膠飴胡洽方有半夏陸兩黃耆參兩分錄驗名芍藥湯

前胡建中湯治大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾方

前胡參兩　黃耆　芍藥　當歸

茯苓　桂心各貳兩　甘草壹兩　生薑捌兩

白糖陸兩　人參　半夏各陸分

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內糖分四服

黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足方

黃耆　生薑　桂心各參兩　甘草貳兩

芍藥陸兩　大棗拾貳枚　飴糖壹升

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內飴令消溫服一升日三服間日可作嘔者倍加生薑腹滿者去棗加茯苓四兩佳仲景集驗古今錄驗並同深師治虛勞腹滿食少小便多者無飴糖有人參貳兩半夏壹升又治大虛不足小腹裏急勞寒拘引臍氣上衝胸短氣言語謬誤不能食吸吸氣乏悶亂必效方治虛勞下焦虛冷不甚渴小便數者有人參當歸各貳兩若失精加龍骨白斂各壹兩古今錄驗治虛勞裏急小腹急痛氣引胸脅痛或心痛短氣者以乾薑代生薑加當歸肆兩

黃耆湯治虛勞不足四肢煩疼不欲食食即脹汗出方

黃耆　麥門冬　芍藥　桂心各參兩　甘草

當歸　五味子　細辛　人參各貳兩　大棗貳拾枚

前胡陸兩　茯苓肆兩　生薑　半夏各捌兩

右十四味㕮咀以水一斗四升煮取三升每服八合日二服深師方治虛勞之四肢煩重或口乾吸吸少氣小便利諸不足者無麥門冬五味子細辛前胡有桑螵蛸貳拾枚治丈夫虛勞風冷少損或大病後未平復而早牽勞腰背強直腳中疼弱補諸不足者無五味子細

靜嘉堂文庫所藏

辛白遠志橘皮各貳兩蜀椒壹兩烏頭二枚小品方治
虛勞少氣小便過多者無五味子細辛人參前胡茯苓
半夏有黃芩壹兩地黃貳兩以水九升煑取三升治虛
勞胸中客氣寒冷癖宿食不消吐噫胷間水氣或流
飲腸鳴食不生肌肉頭痛上重下輕目䀮䀮忽忽去來
躁熱臥不得安小腹急小便赤餘瀝臨事不起陰下濕
或小便白濁傷多者無麥門冬五味子當歸細辛前胡
茯苓半夏有厚朴貳兩胡治方治五藏內傷者無麥門
冬五味子當歸細辛前胡茯苓名大黃耆湯延年秘錄
方主補虛損強腎氣者無麥門冬五味子細辛前胡有
防風芎藭
各叁兩

大黃耆湯治虛勞少氣胷心淡冷時驚惕心中悸動手脚逆冷體常自汗五藏六腑虛損腸鳴風濕榮衛不調百病補諸不足又治風裏急方

黃耆　人參　橘皮　當歸　桂心
細辛　前胡　芍藥　甘草　麥門冬
茯苓各貳兩　生薑伍兩　半夏貳兩半　大棗貳拾枚

右十四味㕮咀以水一斗煑取四升每服五合日三夜一深師方無橘皮及細辛前胡甘草麥門冬有烏頭叁兩蜀椒貳兩遠志貳兩胡治崔氏有蜀椒壹兩烏頭五枚崔氏名樂令大黃耆湯

腎瀝湯治虛勞損羸乏欬逆短氣四肢煩疼腰背相引痛耳鳴面黧黮骨間熱小便赤黃心悸目眩諸虛乏方

羊腎壹具　桂心壹兩　人參　澤瀉
五味子　甘草　防風　芎藭
地骨皮　黃耆　當歸各貳兩　茯苓
玄參　芍藥　生薑各肆兩　磁石伍兩

右十六味㕮咀以水一斗五升先煑腎取一斗去腎入藥煎取三升分三服可常服之廣濟方治虛勞百病者無人參甘草芎藭當歸芍藥生薑玄參有茯苓各叁兩牛膝五加皮各貳兩胡治治大虛傷損夢寤驚悸上氣肩息腎中風濕小腹裏急

靜嘉堂文庫所藏

引腰脊四肢常苦寒冷大小便或澁利無常或赤或白足微腫或昏忘善忘者無澤瀉防風黄耆玄參磁石地骨皮有黄芩壹兩麥門冬乾地黄遠志各參兩大棗二十枚崔氏治腎藏虚勞所傷補益無芎藭玄參磁石地骨皮有黄芩遠志各貳兩乾地黄參兩麥門冬肆兩大棗二十枚治五勞六極八風十二痺補諸不足者無澤瀉甘草十五味子防風芎藭生薑玄參地骨皮有附子牡丹皮各壹兩乾地黄壹兩半牡荊子菖蒲桑螵蛸各貳兩經心錄治腎氣不足耳無所聞者無澤瀉甘草五味子防風黄耆芎藭生薑玄參地骨皮有附子牡丹皮牡荊子各壹兩乾地黄參兩大棗拾伍枚名曰羊腎湯近效方除風下氣強腰脚明耳目除痰飲理榮衛永不染時疾諸風者無當歸芎藭磁石有獨活牛膝各壹兩半麥門冬貳兩丹參伍兩為煮散都合分貳拾肆貼每貼入生薑壹分杏人拾肆枚水參升煮取壹升

又方 羖羊腎壹具切去脂以水壹斗陸升煮取壹斗參升 大棗貳拾枚 桑白皮陸兩

五味子 黄耆 蓯蓉 防風 巴戟天

秦艽 澤瀉 人參 桂心 薯蕷

丹參 遠志 茯苓 細辛 牛膝各參兩

補腎

石斛 生薑各伍兩 杜仲 磁石各肆兩

右二十一味㕮咀内腎汁中煮取三升分三服相去如人行五里再服

增損腎瀝湯 治大虚不足小便數噓吸焦㿀引飲膀胱滿急每年三伏中常服此三劑於方中商量用之

羊腎壹具 麥門冬 地骨皮 人參 石斛

澤瀉 栝蔞根 乾地黄肆兩 遠志 生薑

甘草 桑白皮一作桑寄生 當歸 桂心

茯苓 五味子各貳兩 大棗參拾枚

右十七味㕮咀以水一斗五升先煮腎取一斗二升去腎内藥煮取三升去滓分三服小品同方無石斛栝蔞地骨桑白皮茯苓有芎藭黄連龍骨各貳兩螵蛸貳拾枚又治腎氣不足消渇引飲小便過多腰背疼痛者無石斛栝蔞地骨桑白皮甘草

靜嘉堂文庫所藏

有芎藭貳兩黃芩芍藥各壹兩桑螵蛸貳拾枚雞肶胵黃皮壹兩崔氏治腎損虛勞李子豫增損者無石斛栝蔞地骨桑白皮有黃耆黃芩芍藥防風各貳兩

治左脅氣衝膈上滿頭上有風如蟲行手足頑痺鼻塞腳轉筋不能伸縮兩目時腫痛方

猪腎壹具　防風　芎藭　橘皮　澤瀉

桂心　石斛各壹兩　生薑　丹參

茯苓　通草　半夏各貳兩　乾地黃各叁兩

右十三味㕮咀以水一斗半煮腎減二升去腎下藥煮取二升七合去滓分三服

五補湯治五臟內虛竭短氣欬逆傷損鬱悒不足下氣通津液方

五味子　桂心　甘草　人參各壹兩

麥門冬　小麥各壹升　生薑切四兩　粳米各三合

薤白　枸杞根白皮各壹斤

右十味㕮咀以水一斗二升煮取三升每服一升日三口燥者先煮竹葉一把水減一升去葉內諸藥煮之

麥門冬湯治虛損短氣咽喉凝唾不出如膠塞喉方一名茯苓湯

麥門冬伍兩　茯苓　人參貳兩　前胡叁兩　甘草

乾地黃　桂心　芍藥壹兩　大棗叁拾枚

右九味㕮咀以水九升煮取三升分溫三服

補湯方

車前子叁兩　防風　桂心貳兩　巴戟天　丹參

乾地黃　鹿茸　枸杞皮　五加皮各五兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服

靜嘉堂文庫所藏

人參湯治男子五勞七傷胷中逆滿害食乏氣嘔逆兩脅下脹小腹急痛宛轉欲死調中平臟理絕傷方

人參　當歸　芍藥　甘草　生薑

麥門冬　白糖　桂心各貳兩　前胡　茯苓

五味子　蜀椒　橘皮各壹兩　枳實各三兩　大棗拾伍枚

右十五味㕮咀取東流水一斗半漬藥半日用三年陳蘆稍煎取四升內糖復上火煎令十數沸年二十以上六十以下一服一升二十以下六十以上一服七八合雖年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不爾藥力不接則不能救病要用勞水陳蘆不則水強火盛猛即藥力不出也貞觀初有人久患羸瘦殆死余處此方一劑則差如湯沃雪所以錄記之餘方皆爾不能一一具記

[illegible]治男子五勞六絕其心傷者令人善驚妄怒無常其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲臥面目痿黃其肺傷者令人少精腰背痛四肢厥逆其肝傷者令人少血面黑其腎傷者有積聚小腹腰背滿痺欬唾小便難六絕之為病皆起於大勞脉虛外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憒憒不欲語憎聞人聲方

乾地黃　菟絲子　山茱萸　地麥各五兩　遠志

巴戟天半兩　麥門冬　五味子　甘草　人參

蓯蓉　石斛　桂心　茯苓　附子各壹兩半

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三匕無所禁

石斛散治大風四肢不收不能自反覆兩肩疼痛身重脛

靜嘉堂文庫所藏

急筋腫不能行時寒時熱足腨如刀刺痛身不能自任此皆得之飲酒中大風露卧濕地寒從下入腰以下冷不足無氣子精虛衆脉寒陰下濕盛消令人不樂恍惚時悲此方除風輕身益氣明目強陰令人有子補不足方

石斛若干分　牛膝貳分　附子　杜仲各肆分
柏子仁　石龍芮　芍藥　松脂
雲母粉　山茱萸　澤瀉　菟絲子
菟絲子　防風　菟辭　細辛
右十六味治下篩酒服方寸匕日再陰不起倍菟絲子杜仲腰中痛倍牛膝脊痛倍菟辭腰中痛倍芍藥膝中風倍防風少氣倍柏子仁覺不能行倍澤瀉隨病所有增之分亦可為丸以棗膏丸如梧子酒服七丸

治虛勞百病方

羖羊腎壹具　陰乾　茯苓壹兩半　五味子　甘草
巴戟天　桂心　石龍芮　牛膝
山茱萸　防風　乾薑　細辛各壹兩
乾地黃貳兩　人參　鍾乳粉　石斛
菟絲子　丹參　薤白　附子各五分
右二十味治下篩合鍾乳粉和櫚更篩令勻平日清酒服方寸匕稍加至二七日冊

又方　治男子五勞七傷八風十二痺無有冬夏憂愁憔悴凡是病皆須服之方

羊腎陰乾一具　五味子　女萎　細辛
牡荊子　芍藥　巴戟天　石斛
肉蓯蓉　白斂

靜嘉堂文庫所藏

石龍芮　茯苓
龍膽　桂心
白朮　菊花
黃耆　澤瀉
附子　防風
薯蕷　泰艽各貳兩
右二十七味治下篩酒服方寸匕日三忌冷室

又方
石龍芮　續斷
山茱萸　茯苓兩各貳兩　薯蕷
巴戟天　人參
肉蓯蓉　細辛
薯蕷　苦鼠

桂心各壹兩半
五味子　牡荊子
乾漆各叁兩　羊腎壹具塗炙
右三十六味治下篩酒服方寸匕日三
有烏頭天雄各壹兩半餘並同

薯蕷散　補丈夫一切病不能具述方
薯蕷　荊實
牛膝　菟絲子
蓯蓉各貳兩　五味子
右十一味治下篩酒服方寸匕日二夜一惟禁醋亦自
外無忌服後五夜知覺十夜力生十五夜力壯如盛年
二十夜力倍若多忘加遠志茯苓體澀加栢子人服三

山茱萸　乾漆
苁蓉　蜀椒
續斷　遠志　人參
車前　黃芩各壹兩　乾薑
蒲黃　牛膝各壹兩半　桔梗貳兩半

石龍芮　茯苓
龍膽　桂心
白朮　菊花
黃耆　澤瀉
附子　防風
薯蕷　泰艽各貳兩
右二十七味治下篩酒服方寸匕日三忌冷室

又方
石龍芮　續斷
山茱萸　茯苓兩各貳兩　薯蕷
巴戟天　人參
肉蓯蓉　細辛
薯蕷　苦鼠

桂心各壹兩半
五味子　牡荊子
乾漆各叁兩　羊腎壹具塗炙
右三十六味治下篩酒服方寸匕日三
有烏頭天雄各壹兩半餘並同

薯蕷散　補丈夫一切病不能具述方
薯蕷　荊實
牛膝　菟絲子
蓯蓉各貳兩　五味子
右十一味治下篩酒服方寸匕日二夜一惟禁醋亦自
外無忌服後五夜知覺十夜力生十五夜力壯如盛年
二十夜力倍若多忘加遠志茯苓體澀加栢子人服三

山茱萸　乾漆
苁蓉　蜀椒
續斷　遠志　人參
車前　黃芩各壹兩　乾薑
蒲黃　牛膝各壹兩半　桔梗貳兩半

靜嘉堂文庫所藏

兩劑盛肌肉亦可爲丸每服三十丸日二夜一以頭面身體暖爲度其藥和平不熱調五臟久服健力不可當婦人服之面生五色

補五勞方

五月五日採五加莖七月七日採葉九月九日取根治下篩服方寸匕日三長服去風勞妙

治五勞六極七傷虛損方

從蓉	白龍骨	陽起石	續斷	天雄各柒分
牡蠣	五味子	蛇牀子	乾地黃	桑寄生
天門冬	白石英各貳兩	地膚子	車前子
韭子	菟絲子各伍合	地骨皮 捌分

右十七味治下篩酒服方寸匕日三服

鍾乳散

治五勞七傷虛羸無氣力傷極方

鍾乳 陰干兩無問粗細以白淨無赤黃黑爲上銅鑵中研粗如麻豆許取粟粗糠貳合許內鑵中煮五六沸乃內乳莫水欲滅又添如故一瞬時出以暖水淨淘之暴乾玉磑研不作聲止重密絹水下澄取用

鹿角白膠 白馬莖別搗疏黃別研一石斛 鐵精

人參 磁石 桂心 殭蠶各壹兩 蛇牀人參各兩

右十一味爲末以棗膏和擣二千杵酒服三十丸如梧子日再慎房室及生冷酢滑雞猪魚陳敗

寒食鍾乳散

治傷損之少氣力虛勞百病令人丁彊飲食去風冷方見第十七卷氣極篇中

地黃煎

主榮氣調中補絕令人嗜食除熱方

生地黃三十斤細切曝乾取生者三十斤擣汁漬之令相得出曝乾復如是九反曝擣末食後酒服方寸

靜嘉堂文庫所藏

匕勿令絶

三石散治風勞毒冷百治不瘥補虚方

鍾乳　紫石英　白石英　白朮
桔梗　防風各五分　栝蔞根　人參
蜀椒　乾薑　附子　牡蠣
桂心　杜仲　細辛　茯苓各拾分

右十六味治下篩酒服方寸匕日三行十數步至五十步以上服此大佳少年勿用自餘補方通用老少皆宜冬月服之（千金翼名曰更生散用赤石脂不用紫石英蜀椒杜仲茯苓爲十二味）

石韋圓黄帝問五勞七傷於高陽負高陽負曰一曰陰衰二曰精清三曰精少四曰陰消五曰囊下濕六曰腰（一作髀）脅苦痛七曰膝厥痛冷不欲行骨熱遠視淚出口乾腹中鳴時有熱小便淋瀝莖中痛或精自出有病如此所謂七傷一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞此謂五勞黄帝曰何以治之高陽負曰石韋丸主之

石韋　細辛　礜石　茯苓
澤瀉　菖蒲　杜仲　蛇牀子　肉蓯蓉
桔梗　天雄　牛膝　山茱萸　柏子人
續斷　薯蕷各貳兩　防風　赤石脂各參兩

右十九味爲末取棗膏如蜜和丸如梧子酒服三十丸日三七日愈二十日百病除長服良（崔氏無礜石茯苓澤瀉桔梗薯蕷有栝蔞根貳兩半一云白水侯方）

五補圓治腎氣虚損五勞七傷腰脚酸疼肢節苦痛目暗𥉌𥉌心中喜忘恍惚不定夜卧多夢覺則口乾食不得味

静嘉堂文庫所藏

心常不樂多有恚怒房室不
酸水小腹冷氣眾有餘瀝大便不利方悉主之久服延年
不老四時勿絕一年萬病除愈之方

杜仲　巴戟天陸分人參　五加皮　五味子
天雄　牛膝　防風　遠志　石斛
菟絲子　狗脊各肆分　乾地黃　蓯蓉各拾伍分　鹿茸拾伍分
蛇牀子　石南　覆盆子　石龍芮炒分　車前
白术各叁分　天門冬　柴胡分

右二十四味為末蜜丸如梧子酒服十九日三有風加
天雄菖蒲石南獨活柏子人白
术各三分有氣加厚朴枳實橘皮各三分冷加乾薑
心吳茱萸附子細辛蜀椒各三分泄精加韭子白龍骨

牡蠣雄雌各二分泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅肉
三分春依方服夏加地黃五分黃芩三分麥門冬四分
冷則去此加乾薑桂心蜀椒各三分若不熟不寒亦不
須增損直爾服之三劑以上即覺庶事悉佳慎酢豬
陳臭大冷醉吐自死百無所忌稍加至三十丸不得增
常以此為度

無比薯蕷圓　治諸虛勞百損方

薯蕷貳兩　五味子陸兩　菟絲子
杜仲叁兩　山茱萸　乾地黃
澤瀉　茯神一作茯苓　巴戟天　赤石脂各貳

右十二味為末蜜丸如梧子食前酒服二十九加至三
十九日再無所忌惟禁雞豬陳臭蒜等物服七日後令人

健四體潤澤脣口赤手足暖面有光彩消食身體安和
音聲清朗是其驗也十日後長肌肉其藥通中入腦鼻
必酸疼勿恠若求大肥加燉煌石膏二兩失性健忘加
遠志一兩體少潤澤加柏子人一兩 古今錄驗有白馬莖貳兩共十六味

治丈夫五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痹骨疼腰髖不隨食雖多不生肌肉或少食而脹滿體澀無光澤陽氣衰絕陰氣不行此藥能補十二經脈起陰陽通內制外安魂定魄開三焦破積聚厚腸胃消五藏邪氣除心內伏熱強筋練骨輕身明目除風去冷無所不治補益處廣常須服餌爲佳七十老人服之尚有非常力況少者乎

大薯蕷圓 治男子女人虛損傷絕頭目眩骨節煩痛飲食微少羸瘦百病方

薯蕷 附子 古今錄作茯苓 人參 澤瀉各捌分
天門冬 乾地黃 黃芩 當歸各拾分
乾漆 杏人 阿膠各貳分 白术
白斂 古今錄作防風 芍藥 石膏 前胡各叁分
桔梗 乾薑 桂心各肆分 大黃陸分
五味子拾陸分 甘草貳拾分 大棗壹佰枚
大豆卷伍分 古今錄作黃耆

右二十四味爲末蜜和棗膏擣三千杵丸如梧子酒服五丸日三漸增至十丸 張仲景無附子黃芩石膏乾漆五味子大黃有神麴拾分芎藭防風各陸分茯苓伍分丸如彈丸每服壹丸以壹佰丸爲劑

腎氣圓 治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數囊冷濕尿有餘瀝精自出陰痿不起忽忽悲喜方

乾地黃捌分 遠志 防風 乾薑 牛膝
麥門冬 萎蕤 薯蕷 石斛 細辛

靜嘉堂文庫所藏

地骨皮　甘草　附子　桂心　茯苓
山茱萸肆錢　蓯蓉陸分　鍾乳粉拾分　羯羊腎壹具
右十九味爲末蜜丸如梧子酒服十五丸日三稍加至
三十丸古今録驗無遠志防風乾薑牛膝地骨萎蕤杜仲
乾薑壹分今貳兩　有枸杞壹兩黃耆肆兩人參叁分三兩澤瀉
大棗壹伯枚

又方　治男子婦人勞損虛羸傷寒冷乏少無所不治方
石斛貳兩紫菀　牛膝　白朮各伍分　麻人壹分
人參　當歸　茯苓　苦酒　大豆卷
薤叁　甘草各陸分　杏人　蜀椒　乾地黃
防風　桂心各肆分　羊腎壹具　一方有蓯蓉六分

右十八味爲末蜜丸如梧子酒服十九丸加至三十丸日再漸增之

又方　此方勝胡公腎氣丸及五石丸

乾地黃　茯苓　玄參各伍分　澤瀉　薯蕷
山茱萸　桂心　巴戟肉　芍藥各肆分　附子叁分

右九味爲末蜜丸如梧子酒服二十丸加至三十丸以
知爲度千金翼有牡丹皮肆兩爲十味

又方　治腎氣不足羸瘦日劇吸吸少氣體重耳聾眼暗百病

桂心肆分　乾地黃壹斤　澤瀉　薯蕷
茯苓各叁兩　牡丹皮陸兩半夏壹兩

右七味爲末蜜丸如梧子大酒服十九日三

八味腎氣圓　治虛勞不足大渴欲飲水腰痛小腹拘急小
便不利方

乾地黃捌兩　山茱萸　薯蕷各肆兩　澤瀉
牡丹皮　茯苓各叁兩　桂心　附子各貳兩

靜嘉堂文庫所藏

右爲末蜜丸如梧子酒下十五丸日三加至二十五丸
仲景二云常服去附子加五味子姚八云加五味子參兩
發參肆兩張文仲二云五味子參兩
黃肆兩附子澤瀉
各壹兩餘各貳兩

黃耆圓 治五勞七傷諸虛不足腎氣虛損目視眩眩耳無所聞方

黃耆　乾薑　當歸　羌活　白朮各等分
甘草　茯苓　細辛　桂心　烏頭
附子　防風　人參　芍藥　一石斛
乾地黃　發各貳兩　棗膏和合羊腎煮熟

右十九味爲末以棗膏與蜜爲丸如梧子大酒服十五丸日二加至三十丸一方無芍藥乾薑當歸羌活止用四味

黃耆　鹿茸　茯苓　烏頭　乾薑各等分
乾地黃　當歸　桂心　芍藥各肆分　枸杞白皮
菟絲子　五味子　伯子人　白朮各伍分　大棗貳拾

右十五味爲末蜜丸如梧子平旦酒服十丸夜十丸以知爲度禁如藥法

神化圓 治五勞七傷氣不足陰下濕癢或生瘡小便數有餘瀝陰頭冷痠失精自出小腹急縮臍痛脇重不能久立目視漠漠見風淚出脛酸精氣衰憊卧不欲起手足厥冷調中利食方

蓯蓉　牛膝　巴戟各伍分　續斷　山茱萸
大黃各伍分　遠志　澤瀉　天雄　柏子人

菟絲子　人參　防風　石斛　栝蔞根
杜仲　黃連　白朮　甘草　礬石
當歸　酸棗仁　桂心　石南　乾薑　蛇牀子
赤石脂　蜀椒　茯苓　細辛　葛蒲
芎藭　各等分

右三十一味爲末蜜丸如梧子酒服五丸日三加至十丸

人九丸圓　治五勞七傷補益方

酸棗人　柏子人　薏苡人　菟絲子
菊花子　枸杞子　蛇牀子　五味子
菴閭子　烏麻子　牡荊子
乾地黃　蔓荊子　桂心各貳兩　發參兩
右十六味爲末蜜丸如梧子酒服二十丸日二夜

通明圓　治五勞七傷六極虛乏補五臟除萬病方

石斛　當歸　牡蠣　石長生
石韋　遠志　發參　巴戟天
紫菀　茯苓　乾薑　天雄　蛇牀子
牛膝　牡蠣　附子　柏子人
甘草　薯蕷　阿膠　乾地黃　五味子貳兩
蜀椒參兩

右二十六味爲末白蜜和丸如梧子大酒服二丸日二滿旁室所食不消胃氣不平加麥門冬參斤乾地黃　石韋各等分紫菀　五味子　甘草　阿膠

靜嘉堂文庫所藏

杜仲　遠志　茯苓　天雄各半斤
右十二味爲末蜜丸如梧子食上若酒服十丸日再加
至二十丸
補虚益氣大通圓治五勞七傷百病方
乾地黄兩　乾薑　當歸　石斛　肉蓯蓉
天門冬　白朮　甘草　芍藥　人參各陸兩
麻子人半兩　紫菀　大黄　黄芩各伍兩　蜀椒參升
防風肆兩　茯苓　杏人　白芷壹兩
右十九味末白蜜棗膏丸如梧子空腹服一丸日三服七日
赤石脂圓治五勞七傷每事不如人無子諸疾方
赤石脂　山茱萸分　防風　遠志　栝樓根
牛膝　杜仲　薯蕷肆分　石韋參分　肉蓯蓉
蛇牀人分　菖蒲　續斷　天雄　柏子人各分
右十五味爲末蜜棗膏和丸如梧子大空腹服五丸日
三服十日知久服不老加菟絲子四分佳
鹿角圓補益方
鹿角　白馬莖　石斛　薯蕷　乾地黄
人參　菟絲子　防風　蛇床子伍分　山茱萸
杜仲　赤石脂　澤瀉　乾薑肆分　石龍芮
遠志參分　五味子　牛膝　巴戟天陸分　天雄貳分
蓯蓉柒分　一方無乾薑五味子
右二十一味爲末丸如梧子酒服二十丸日二忌米醋
蓯蓉圓補虚益氣治五臟虚勞損傷陰痿陰下濕癢或生
瘡莖中痛小便餘瀝四肢虛吸陽氣絕陽脉傷方

靜嘉堂文庫所藏

薤蓉　薯蕷伍分　蛇牀子　遠志肆分　莞絲子陸分
天雄捌分　五味子　山茱萸柒分　巴戟天拾分
右九味末蜜丸如梧子酒服二十九日二加至三十九
乾地黃圓 治五勞七傷六極臟腑虛弱飲食不下顏色黧黯八風所傷補虛益氣進食資顏色長陽方
乾地黃　茯苓　天雄各柒分　蛇床子陸分　桂心
麥門冬伍分　遠志　薤蓉　杜仲　甘草拾分
五味子肆分　阿膠　棗肉捌分
右十三味為末蜜丸如梧子酒下二十九日再加至三十九常服彌佳
治虛勞不起囊下癢汗出小便淋瀝陰中數痛尿時赤黃甚者失精劇苦溺血目視眩晄見風淚出陰中冷精悉

兩膝腫不能久立起則目眩補虛方
蛇牀子　細辛　天雄　大黃　柏子人
莞絲子　杜仲　茯苓　防風　車前
葛蒲　澤瀉各肆兩　遠志　牛膝各陸分　枯薑根參分
山茱萸　桂心　薤蓉　蜀椒
石韋　白朮各伍分
右二十二味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日再漸加至五十九十五日身體輕二十日聰明五十日可御女
覆盆子圓 治五勞七傷羸瘦補益令人充健方
覆盆子　莞絲子各拾貳分　薤蓉　茯苓　鹿茸
巴戟天　白龍骨　天雄
白石英　五味子　續斷　薯蕷各拾分

靜嘉堂文庫所藏

乾地黄 捌分 蛇牀子 伍分 遠志 乾薑 各陸分

右十六味爲末蜜丸如梧子酒服十五丸日再細細加至三十丸愼生冷陳臭 張文仲方無龍骨鹿茸天雄續斷石英有石斛白朮桂心枸杞子人參柏子人澤瀉各陸分牛膝肆分山茱萸伍分赤石脂甘草各捌分細辛肆分

治五勞七傷虛羸無氣力傷極方

菟絲子 五味子 各貳兩 蛇床子 壹兩

右三味爲末蜜丸如梧子每服十丸日二服禁如常法

補益方

乾漆 柏子人 山茱萸 酸棗人 各肆分

右四味末蜜丸如梧子每服二七丸加至二十丸日二

曲聚圓 治風冷補虛弱亦主百病方

乾地黄 薯蕷 牡蠣 天雄 蛇牀子

遠志 杜仲 鹿茸 桂心 五味子

鹿藥草 石斛 車前子 菟絲子 肉蓯蓉

雄雞肝 未連蠶蛾 各等分

右十七味欲和任意擣末蜜丸如小豆大酒服三丸加至七丸日三夜一禁如常法須令常有藥氣大益久服藥十日以後少少得強

崔平卅治五勞七傷方

鍾乳粉 萆薢 各壹分 乾薑 叁分 一作乾地黄

巴戟天 菟絲子 蓯蓉 各貳分

右六味爲末蜜丸如梧子酒服七丸日三服訖行百步服酒二三合更行三百步胷中熱定即食乾飯牛羊兎肉任爲羹去肥膩餘不忌

靜嘉堂文庫所藏

明目益精長志倍力久服長生耐老方

遠志　茯苓　細辛　菟絲子
木蘭　續斷　人參　菖蒲
龍骨　當歸　芎藭　茯神各伍分

右十二味末蜜丸如梧子服七丸至十九日二夜一滿三年益智

磁石酒　療丈夫虛勞冷骨中疼痛陽氣不足陰下痒（一作痛）熱方

磁石　石斛　澤瀉　防風各伍兩
杜仲　桂心各肆兩　天雄　桑寄生
天門冬　黃耆各叁兩　石南貳兩　狗脊捌兩

右十二味㕮咀以酒四斗浸漬服三合漸加至五合日一再服亦可單漬磁石服之

石英煎　治男子女人五勞七傷消枯羸瘦風虛痼冷少氣力無顏色不能動作口苦咽燥眠中不安惡夢驚懼百病

紫石英　白石英各壹斤碎如米以醇酒玖升瓷器中微火煎取叁升以竹篦攪勿住手去滓澄清
乾地黃壹斤　白蜜叁斤　酥　桃人升各叁
石斛伍兩　柏子人　遠志　茯苓　山茱萸
人參　麥門冬　桂心　乾薑　五味子
白朮　蓯蓉　甘草　天雄　白芷
細辛　芎藭　黃耆　防風　薯蕷各貳兩

右二十四味治下篩內煎中如不足加酒取足為限煎令可丸丸如梧子大酒服二十丸日三稍加至四十丸為度無藥者可單服煎令人肥白充實

靜嘉堂文庫所藏

麋角圓方

取當年新角連腦頂者爲上看角根有斫痕處亦堪用退角根下平者是不堪諸麋角丸方凡有一百一十方此特出衆方之外谷成子羔服而羽化夫造此藥取角用五具或四具三具兩具一具爲一劑先去尖一大寸即各長七八寸取勢截斷量把鎊得即於長流水中以竹器盛懸浸可十宿如無長流水處即於淨盆中滿著水浸每夜易換即將出削去皺皮以利鎊鎊取白處至心即止以清粟米泔浸兩宿初經一宿即乾握去舊水置新絹上曝乾淨擇去惡物粗骨皮及鎊不勻者即以無灰美酒於大白甆器中浸經兩宿其酒及器物隨藥多少其藥及酒俱入淨釜中

初武火煮一食久後即又著火微煎如蟹目沸以柳木篦長四尺闊三指徐攪不得住手困則易人時時更添美酒以成煎爲度煎之皆須平旦下手不得經兩宿仍看骨消似稀膠即以牛乳五大升酥一斤以次漸下後藥

麋角（壹條炙令黃爲散與諸藥同制之） 檳榔 通草

秦芁 人參 甘草 肉蓯蓉

菟絲子（酒浸兩宿待乾別擣各壹兩）

右擣爲散如不要補即不須此藥其煎又可一食時候藥似稠粥即止火少時歇熱氣即投諸藥散相和攪令相得仍待少時漸稠粘堪作丸即以新器盛貯以衆手一時丸就如梧子大若不能衆手丸就旋暖漸丸亦得

靜嘉堂文庫所藏

如粘手者少酥塗手其服餌之法空腹取三果漿以下之如無三果漿酒下亦得初服三十丸日加一丸至五十九爲度日二服初服一百日內忌房室服經一月腹內諸疾自相驅逐有微利勿怪漸後多泄氣能食聰耳明目補心神安臟腑填骨髓理腰脚能久立髮白更黑貌老還少患氣者加杏實青木香准前各一大兩若先曾服丹石等藥即以三黃丸食上壓之令宣泄如飲酒食麪口乾鼻中氣粗眼澁即以蜜漿飲之即止如不止加三黃丸使微利諸　如此一度發動已後方始調暢服至二百日面皺自展光澤一年齒落更生強記身輕走風日行數百里二年常令人肥飽少食七十已上却成後生三年腸作筋髓填骨末明四年常飽不食自見仙人三十已下服之不輟頓一定功不變其藥修合時須淨室中不得令雞犬女人孝子等見婦人服之亦佳

治五臟虛勞小腹弦急服熟方

炙腎輸五十壯老小損之若處於可至百壯橫二間寸灸之

重刊孫真人備急千金要方卷之十九

靜嘉堂文庫所藏



静嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏



國家圖書館 典藏

靜嘉堂文庫所藏

重刊孫真人備急千金要方卷之二十 膀胱腑

膀胱腑脉論第一

論曰膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱膀胱者津液之腑也號水曹掾名玉海重九兩二銖左回曲積上下縱廣九寸受津液九升九合兩邊等應二十四氣皆空在外膀胱漏泄

黃帝曰夫五藏各一名一形腎乃独兩何也岐伯曰膀胱為腑有二處腎亦二形應腑有二處藏名一腑名二故五藏六腑也一說腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦

左手関後尺中陽絶者無膀胱脉也病苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精衆有餘瀝刺足少陰經治陰在

靜嘉堂文庫所藏

足內踝下動脉是也
右手関後尺中陽絶者無子戸脉也病苦足逆寒絶産帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰
左手関後尺中陽實者膀胱實也病苦逆下脊下邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後陷中
右手関後尺中陽實者膀胱實也病苦小腹滿引腰痛刺足太陽經治陽
病先發於膀胱者脊膂筋痛小便閉五日之腎小腹腰脊痛脛痠一日之脾閉塞不通身痛體重二日不已死冬雞鳴夏下晡一云日夕
膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得有上熱若脉陷及足小趾外側及脛踝後皆熱若脉陷取中委

膀胱脹者小腹滿而氣癃
腎前受病傳於膀胱腎欬不已欬則遺溺
欬氣客於膀胱則夢遊行
腎應骨容理厚皮者三焦膀胱緩急皮而無毫毛者三焦膀胱急
薄腠理疎者三焦膀胱薄粗理薄皮者三焦膀胱
毫手美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也
扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽為表裏
膀胱總通於五臟所以五臟有疾即應膀胱膀胱有疾即應胞囊傷熱則小便不通膀胱急尿苦黃赤傷寒則小便數清白或發石水根在膀胱四肢小其腹獨大也方見治水篇中
骨絶不治齒黃落十日死
足太陽之脉起於目內眥上額交巔上其支者從巔至耳

靜嘉堂文庫所藏

上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫臀入胭中其支者從膊內左右別下貫胂髀一作過髀循髀外後廉下合胭中以下貫胫內出外踝之後循京骨至小指外側是也動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲胭如結胫如別是為踝厥是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭腦項痛目黃淚出鼽衄項背腰尻胭胫脚皆痛小指不用盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膀胱虛實第二 脉四條 方六首 灸法一首

膀胱實熱

左手尺中神門以後腠陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背強名曰膀胱實熱也

治膀胱實熱方

石膏八兩 梔子人一作瓜子人 萩苓

知母各三兩 蜜五合 生地黃 淡竹葉各切一升

右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮二沸分三服須利加芒消三兩

治膀胱熱病不已舌乾咽腫方

蜜七合 升麻 大青各三兩 射干

生玄參 黃檗 薔薇根白皮各四兩

右七味以水七升煮取一升去滓下蜜煮二沸細細含之

痛不可俛仰勞也名曰膀胱實熱也

石手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背強名曰膀胱實熱也

治膀胱實熱方

石膏八兩 梔子人一作瓜子人 萩苓

知母各三兩 蜜五合 生地黃 淡竹葉各切一升

右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮二沸分三服須利加芒消三兩

治膀胱熱病不已舌乾咽腫方

蜜七合 升麻 大青各三兩 射干

生玄參 黃檗 薔薇根白皮各四兩

右七味以水七升煮取一升去滓下蜜煮二沸細細含之

靜嘉堂文庫所藏

膀胱虛冷

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腰中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏拈腰痛外踝後痛名曰膀胱虛冷也

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲名曰膀胱虛冷也

治膀胱虛冷飢不欲飲食面黑如炭腰脊疼痛方

磁石六兩　黃耆　茯苓各三兩　五味子
杜仲各四兩　白朮　白石英各五兩

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服

治膀胱冷熱嗽唾則有血喉鳴喘息方

羊腎一具　人參　玄參　黃耆
桂心　芎藭　甘草各三兩　茯苓四兩
地骨皮　生薑各五兩　白朮六兩

右十一味咬咀以水一斗二升先煮羊腎減三升去腎下藥煮取三升去滓分為三服

治膀胱腎冷坐起欲倒目眩眩氣不足骨痿方

龍骨　柏子人　乾地黃　甘草　防風各五分
禹餘粮　白石英　桂心　黃耆　茯苓各七分
五味子　菟絲　人參　附子各六分　山茱萸
玄參　芎藭各四分　磁石　杜仲　乾薑各八分

右二十味為末蜜丸如梧子大空腹酒服三十九日二加至四十九

靜嘉堂文庫所藏

治膀胱寒小便數漏精稠厚如米白泔方

赤石脂 白石脂 五分 乾地黃 三分 綏蔡 六分 赤雄雞腸 雞肫胵 兩具 桑螵蛸 牡蠣 龍骨 黃連 各四分

右十味治下飾內雞腸及肫胵中縫塞燸令熱曝乾合搗為散以酒和服方寸匕日三

治膀胱方

灸之如腎虛法

胞囊論第三 論一首 灸法八首 方十六首

論曰胞囊者腎膀胱候也貯津液并尿若臟中熱病者胞澀小便不通尿黃赤若腑中寒病者胞滑小便數而多白若至夜則內陰氣生故熱則溺之寒則補之不寒不熱依經調理則病不生矣

凡尿不在胞中為胞盛辟津液不通以葱葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹之胞脹津液大通即愈

榆皮通滑泄熱煎治腎報應胞囊澀熱小便黃赤苦不通

榆白皮 赤蜜 葵子 各一升

滑石 通草 各三兩 車前子 五升

右六味㕮咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取三升分三服婦人難產亦同此方

滑石通治膀胱急熱小便黃赤方

滑石八兩 車前子 冬葵子一升 榆白皮四兩

右五味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治盡勞尿白濁方

取榆白皮切二斤水二斗煮取五升分五服

靜嘉堂文庫所藏

又方 擣乾羊骨為末服方寸匕日二

又方 灸脾輸一百壯○又灸章門百壯在季肋端

凡飽食後或忍小便或走馬或忍小便大走及入房皆致胞轉臍下急痛不通治之之方

亂髮急纏如兩拳大燒為末醋四合和二方寸匕服之訖即炒熟黑豆兼蹲坐上

治胞轉方

石韋一兩 葵子 通草 甘草 各二兩

鬼箭三兩 滑石、四兩 榆白皮一升

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治丈夫婦人胞轉不得小便八九日者方

葵子一升 滑石 寒水石 各一斤

右三味㕮咀以水一斗煮取五升分三服

治胞轉小便不得方

葱白四七莖 阿膠 一兩 琥珀三兩 車前子一升

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

又方 阿膠三兩水二升煮數沸頓服之

又方 豉五合以水三升煮取二升煮數沸頓之

又方 麻子煮取汁頓服之 又方 連勃閑燒灰水服之

又方 筆頭燒灰水服之 又方 燒死蜣蜋二枚末水服之

又方 內白魚子塗孔中 又方 酒和豬脂雞子大頓服之

治腰痛小便不利苦胞轉方

灸玉泉七壯穴在閑元下一寸大人從心下度取八

靜嘉堂文庫所藏

寸足玉泉穴小兒酌酌以取之○又灸第十五推五
十壯○又灸臍下一寸○又灸臍下四寸各隨年壯

三焦脈論第四

論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管又射中焦名霍
亂下焦名走哺合而為一有名無形主五臟六腑往還神
道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息氣腠胃
之間不可不知也三焦名中清之腑別號玉海水道出屬
膀胱合者雖合而不同上中下三焦同號為孤腑而榮出
中焦衛出上焦榮者絡脉之氣道也衛者經脉之氣道也
其三焦形相寫薄大小並同膀胱之形云
三焦病者腹脹氣喘小腹尤堅不得小便窘急溢則為水
留則為脹倀在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見

于脉取委陽
小腹腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脉
與厥陰小絡結而血者腫上及胃管取三里
三焦脹者氣滿於皮膚殼ㇾ而不堅疼一云殼ㇾ而堅
欠欬不已得之三焦欬而腹滿不欲飲食也
手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表
腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽
之後入缺盆交膻中散絡心胞下隔循屬三焦其支者從
膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下額至
頰其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至
目兌皆是也動則病耳聾煇ㇾ焞ㇾ嗌腫喉痺是主氣所
生病者汗出目兌背痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指

靜嘉堂文庫所藏

吹指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者入迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

三焦虛實第五論三首 灸法七首 寸方十八首

論曰夫上焦如霧霧者霏上也 其氣起於胃上管難經甲乙經作上並咽以上貫膈布胸中走腋循兄太陰之分而行還注於手陽明上至舌下注足陽明常與榮衛俱行於陽二十五度行於陰二十五度為一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰也生于少陽心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背身中皆熱不循衛氣之道而出者何也此邪傷於風內開腠理毛衆理泄衛氣走之固不得循其道此氣慄悍滑疾見開而出故不得從其道名曰泄氣其病則肘攣痛食先吐而後下其氣不續膈間厥悶所以飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便痢語聲不出若實則上絕於心若虛則引氣於肺也

澤瀉湯 通脉瀉熱治上焦飲食下胃胃氣未定汗出面背身中皆熱名曰漏氣方

澤瀉 半夏 柴胡 生姜各三兩
桂心 甘草各一兩 茯苓各二兩
地骨皮五兩 石膏八兩 竹葉五合 粟心二升
右十二味㕮咀以水二斗煮取六升分五服一云水一斗煮取三升分三服

治上焦熱腹痛不欲飲食或食先吐而後

靜嘉堂文庫所藏

下肘攣痛方

麥門冬　生蘆根　竹茹　廪米各一升

蓴心五合　甘草　茯苓各二兩　橘皮

人參　萎蕤各三兩　生姜四兩　白术五兩

右十二味㕮咀以水一斗五升煑取三升分三服

治胷中膈氣聚痛好吐方

灸厥陰輸穴在第四椎兩邊各相去一寸五分隨年壯

黃耆理中湯 治上焦虛寒短氣不續語聲不出方

黃耆　桂心各二兩　五味子　桔梗　乾姜

茯苓　甘草　芎藭各三兩　丹參　杏人各四兩

右十味㕮咀以水九升煑取三升分為三服

黃連圓 治上焦冷下痢腸內不安食飲注下方

黃連　烏梅肉八兩　桂心二兩　乾薑　附子

阿膠各四兩　檗皮　芎藭　黃檗各三兩

右九味為末蜜丸如梧子大飲下二十丸加至三十丸

厚朴湯 治上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸方

厚朴　茯苓　芎藭　白术

玄參各四兩　桔梗　附子　人參

橘皮各三兩　生薑八兩　吳茱萸八合

右十一味㕮咀以水二斗煑取五升分三服

論曰中焦如漚（漚者在胃中如漚也）其氣起於胃中管（難經作中口甲乙巢源作胃口）在上焦之後此受氣者主化水穀之味秘糟粕蒸津液化為精微上注於肺脉乃化而為血奉以生身莫貴於此

靜嘉堂文庫所藏

故獨得行於經隧名曰營氣主足陽明陽明之別巍巍曰豐
滌在外踝上去踝八寸別走太陰絡諸經之脉上下絡太
倉主腐熟五穀不吐不下實則生熱熱則閉塞不通上下
隔絶虛則生寒寒則腹痛洞泄便痢霍亂主脾胃之病夫
血與氣異形而同類衛氣是精血氣是神故血與氣異名
同類焉而脫血者無汗此是神氣奪汗者無血此是精氣
故人有兩死一死而無兩生猶精神之氣隔絶也若虛
則補於胃實則瀉於脾調其中和其源萬不遺一也

瀉熱湯 開關格通隔絶治中焦實熱閉塞上下不通
隔絶關格不吐不下腹滿腦膨喘急方

蜀大黃 切炒水一升浸 黃芩 澤瀉 升麻
梔子各三兩 各四兩 生玄參八兩 地黃汁一升

右九味咬咀以水七升煮取二升三合下大黃更煮兩
沸去滓下消分三服

藍青湯 治中焦熱水穀下痢方

藍青汗三升黃連八兩 黃蘗四兩 烏梅肉
地膚子 地榆 白朮各二兩 阿膠五兩

右八味為末以藍青汁和微火煎丸如杏人大飲服三
九日二七月七日合大良當併手九之

黃連煎 治中焦寒洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度腹
中虛痛方

黃連 酸石榴皮 地榆 阿膠各四兩
黃蘗 當歸 厚朴 乾薑各三兩

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓下阿膠更煎取

靜嘉堂文庫所藏

烊分三服

治四肢不可舉動多汗洞痢方

灸大橫隨年壯穴在俠臍兩邊各二寸五分

論曰下焦如瀆瀆者如溝渠也其氣起胃下管別回腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱下於太腸主足太陽灌滲津液合膀胱主出不主入別於清濁主腹滿之病候也若實則大小便不通利氣逆不續嘔吐不禁故曰走哺若虛則大小便不止津液氣絕入飲酒入胃穀未熟而小便獨先下者何蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀出也所以熱則瀉於肝寒則補於腎也

柴胡通塞湯 治下焦熱大小便不通方

柴胡　羚羊角　黃芩　橘皮　澤瀉各三兩
香豉一升　知母　生地黃一升　芒消二兩　梔子四兩　石膏六兩

右十味㕮咀以水一升煮取三升去滓內芒消分三服

赤石脂湯 治下焦熱或下痢膿血煩悶恍惚方

赤石脂八兩　烏梅二十枚　梔子十四枚　粟米一升

白朮　升麻各三兩　乾薑二兩

右七味㕮咀以水一斗煮米取熟去米下藥煮取二升半分為三服

生嘔人參湯 治下焦熱氣逆不續嘔吐不禁名曰走哺方

人參　萎蕤　黃芩　知母　茯苓各三兩
生薑　梔子　白朮　橘皮各四兩　石膏八兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓分服

靜嘉堂文庫所藏

青荷湯 治下焦熱毒剔魚臟雜痢赤血臍下小腹絞痛不可忍欲痢不出方

青蒿 薤白各一升 黃連 黃檗 白水 舊根各三兩 梔子 黃芩 地榆各四兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治膀胱三焦津液下大小腸中寒熱赤白泄痢及腰脊痛小便不利婦人帶下方

炙小腸輸五十壯

黃檗止泄湯 治下焦虛冷大小便洞泄不止方

黃檗 人參 地榆 阿膠各三兩 黃連五兩 茯苓 檉皮各四兩 艾葉一升

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下膠消分三服

人參續氣湯 治下焦虛寒津液不止短氣欲絕方

人參 橘皮 茯苓 麥門冬 黃耆 吳茱萸三合 桂心二兩 白朮 乾薑各三兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

茯苓圓 治下焦虛寒腹中瘀血令人喜忘不欲聞欲入語胷中噎塞而短氣方

茯苓 乾地黃 當歸各八分 甘草 乾薑 人參各七分 黃耆六分 芎藭五分 桂心四分 厚朴三分 杏人五十枚

右十一味為末蜜丸如梧子初服二十丸加至三十丸為度日二清白飲下

靜嘉堂文庫所藏

伏龍肝湯 治下焦虛寒損或先見血後便轉此為近血或利不利方

伏龍肝五合未乾 地黃五兩用黃藥 阿膠 牛膝一作半夢振 甘草 乾薑 黃芩 地榆各三兩 灰二合

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓下膠煮消下髮灰分為三服

治下焦虛寒損或先便轉後見血此為遠血或利或不利好因勞冷即發宜續斷止血方

續斷 當歸 桂心 蒲黃

阿膠各一兩 甘草二兩 乾薑 乾地黃各四兩

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓下膠取烊下蒲黃分三服

當歸湯 治三焦虛損或上下發泄吐嗽血皆從三焦起或熱損發或因酒發宜此方

當歸 乾薑 小薊 阿膠 羚羊角

乾地黃 柏枝皮三兩 炙甘草 黃芩 白朮各四兩 蒲黃五合

青竹茹半升 伏龍肝 髮灰一雞子大

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓下膠取烊下髮灰及蒲黃分三服

灸法

五臟六腑虛心痛腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便不利贏瘦少氣灸三焦輸隨年壯

腹疾腰痛膀胱虛寒溺飲注下灸下極輸年壯

三焦寒熱灸小腸輸隨年壯

靜嘉堂文庫所藏

三焦膀胱腎中熱氣炎水道隨年壯穴在俠脊骨相去五寸（脊骨在脊下五寸脊骨端水道俠兩邊各二寸半）

霍亂第六（論一首 方二十八首 證四條 灸法十八首）

論曰原霍亂之為病也皆因飲食非鬼神夫飽食脆膾復食乳酪海陸百品無所不啾眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲升陰氣欲降陰陽乖隔變成吐瀉頭痛如破百節如解遍體諸筋皆為回轉論證雖小卒病之中最為可畏雖臨深履危不足以喻之養生者宜達其旨趣庶可免於夫橫矣

凡霍亂務在溫和將息若冷即遍體轉筋凡此病定一日不食為佳仍須三日少少與粥三日已後可恣意食息七日勿雜食為佳所以養脾氣也

大凡霍亂皆中食膾酪及飽食雜物過度不能自裁夜卧失覆不善將息所致以此隨命者衆人生稟命次五臟為主夫五臟者即是五行內為五行外為五味五行五味更宜扶抑所以春夏秋冬逆調理之食啖不可過度凡飲食於五臟相尅者為病相生者無他經曰春不食辛夏無食鹹季夏無食酸秋無食苦冬無食甘此不必全不食但慎其大甚耳諺曰百病從口生蓋不虛也四時皆食不得太飽皆能生病從夏至秋分忌食肥濃然熱月人自好冷食更與肥濃兼食果菜無節極遂逐冷眠卧冷水洗浴五味更相剋賊雖欲無病不可得也所以病苦人自作之非關運也書曰非天夭人人中自絕命此之謂也

凡諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止但與孛朴葛根

靜嘉堂文庫所藏

飲若冬瓜葉飲但沾漬咽喉而不可多與若服湯時隨服
吐者候吐定乃止診脉絶不通以桂合葛根為飲吐下心
煩肉熱汗不出不轉筋脉急數者可犀角合葛根為飲吐
下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉汁為佳若不止可
與葛根薺苨飲服之

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此為霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼悪寒而復吐利當屬何病師曰當為霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其脉微濇本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本叐下利者不可治也霍亂吐多者必轉筋不渴即臍上築霍亂而臍上築者為腎氣動當先治其築治中湯主之去朮如桂心去朮者以朮虛故也加桂者恐作賁㹠也霍亂而臍上築吐多者若下多者霍亂而驚悸霍亂而渴霍亂而腹中痛嘔而吐利嘔而利欲得水者皆用治中湯主之

治中湯治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛方

人參　乾薑　白朮　甘草各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服不瘥頻服三劑遠行防霍亂依前作丸如梧子大服三十丸如作散服方寸七酒服亦得若轉筋者加石膏三兩仲景云若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復用朮悸者加茯苓二兩渴欲得水者加朮合前成四兩半腹中痛者加人參合前成四兩半若寒者加乾薑合前成四兩半腹痛者去朮加附子一枚服湯後一食頃服熱粥一升微自溫勿發揭衣被也

桂心湯治吐利止而身體痛不休者當消息和解其外以此湯小和之方見傷寒篇中

靜嘉堂文庫所藏

四順湯 治霍亂轉筋肉冷汗出嘔噦者方

附子 一兩 人參 乾薑 甘草 各三兩

右四味咬咀以水六升煮取二升分三服若汗云利甚加龍骨二兩

四逆湯 治多寒手足厥冷脉絶方

生薑八兩 當歸 芍藥 細辛 桂心 各三兩

大棗二十五枚 通草 甘草 各二兩 吳茱萸二升

右九味咬咀以水六升酒六升合煮取五升分五服薑方用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之如退棗入高根二兩佳霍亂四逆加半夏一合附子小者一枚惡寒乃與大附子

又方 治吐下而汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脉微欲絶或發熱惡寒四肢拘急手足厥方

甘草 二兩 乾薑 一兩半 附子 一枚

右三味咬咀以水三升煮取一升二合溫分再服彊者可與大附子一枚乾薑至三兩廣濟方若吐後咬咬火氣及下而腹滿者加人參二兩

通脉四逆湯 治吐利已斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶

大附子 一枚 乾薑 三兩強者四兩 甘草 一兩半

右三味咬咀以水三升煮取一升二合分二服脉出即愈若面色赤者加葱白九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔逆加生薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩皆與方相應乃服之用仲景咏四逆加猪膽汁湯

竹葉湯 治霍亂吐利已服理中四順等湯熱不解者方

靜嘉堂文庫所藏

竹葉一握　小麥一升　生薑十累　甘草
人參　附子　桂心各二兩　白朮三兩
當歸　芎藭各一兩　橘皮
右十一味㕮咀以水一斗半先煮竹葉小麥取八升去
滓下藥煮取三升分三服上氣者加吳茱萸半升即瘥
理中四順湯皆大熱若有熱宜竹葉湯古今錄驗無芎藭
甘草瀉心湯　治婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下之心下即
痞當先治其涎沫可服小青龍湯涎沫止吹治其痞可與
此方
甘草四兩　乾薑　黃芩各三兩
黃連一兩　半夏半升　大棗十二枚
右六味㕮咀以水一斗煮取六升分六服

小青龍湯　治霍亂嘔吐方　見第十八卷中
附子粳米湯　治霍亂四逆吐少嘔多者方
中附子一枚　粳米五合　半夏半升
大棗十枚　乾薑仲景方無　甘草各一兩
右六味吹咀以水八升煮取米熟去滓分三服
理中散　治年老羸劣冷氣惡心飲食不化心腹虛滿拘急
短氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗狀若
麥門冬　乾薑各六兩　人參　白朮
甘草各五兩　附子　茯苓各三兩
右七味治下篩以白湯三合服方寸匕常服將蜜丸如
梧子大酒服二十丸
人參湯　治毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指皆

靜嘉堂文庫所藏

腫端息垂死絶語音不出百方不效脉不通者服此湯取
蹇乃止隨吐續服勿止并灸之之方

人參　附子　厚朴　茯苓　甘草
橘皮　當歸　葛根　乾薑　桂心各二兩

右十味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

治霍亂蠱毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣方

極鹹塩湯三升熟飲一升刺口令吐宿食使盡不吐
更服吐訖復飲三吐乃住靜止此法大勝諸治俗人
以為由舍溲近法鄙而不用守死而已凡有此病即
須先用之

治霍亂方

豬豆　香薷各一升

右二味以水六升煮取二升分服單用亦得

治霍亂洞下不止者方

艾一把水三升煮取一升頓服之良

又方香菜一把水四升煮取一升頓服之青木香亦佳

治霍亂吐下腹痛方

以桃葉煎汁服一升立止冬用皮

治霍亂引飲飲輒乾嘔方

生薑五兩㕮咀以水五升煮取二升半分二服高良
薑大佳

杜若圓治霍亂久將遠行預備方

杜若　藿香　白朮　橘皮　吳茱萸
乾薑　人參　厚朴　木香　雞舌香

靜嘉堂文庫所藏

鼈麥　桂心　勒荷　女萎　茴香

右十五味等分為末蜜丸如梧子酒下二十九

治霍亂氣不發九方

虎掌　薇銜各二枳實　附子　人參

檳榔　乾薑各三厚朴六兩皂莢三寸白朮五兩

右十味為末蜜丸如梧子大每服酒下二十九日三武

德中有德行尼名淨明患此已久或一月一發或一月

再發發即至死時在朝大醫將許甘棠之徒亦不能識

余次霍亂治之處此方得愈故疏而記之

凡先服石人因霍亂吐下服諸熱藥吐下得止因即變虛

心煩手足熱口燥欲得水嘔逆悶亂脈急數者及時行熱

病後毒未盡因霍亂吐下仍發熱心胃欲裂者次此解之

薺苨　人參　厚朴　知母　栝蔞根

茯苓　犀角　鼈子　枳實　桔梗

獨皮　葛根　甘草各二兩

右十四味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治中熱霍亂暴利心煩脉數欲得冷水者方

新汲井水頓服一升立愈先患胃口冷者勿服之

治霍亂腎所不治秘方

童女月經衣合血燒末酒服方寸匕百方不瘥者用之

治霍亂轉筋方

蓼一把去兩頭以水二升煮取一升頓服之一方作藥

又方　燒舊木梳灰為末酒服一枚小者永瘥

又方　車轂中脂塗足心下瘥

靜嘉堂文庫所藏

治霍亂轉筋入腹無柰何者方

作極鹹鹽湯於槽中暖漬之

治轉筋不止者方

男子則以手挽其陰牽之女子則挽其乳近左右逆

又方 以酢煮青布揾之冷即易

灸法

論曰凡霍亂灸之或雖未能立瘥終無死憂不可逆灸哉但先腹痛或先下後吐當詹病狀灸之

若先心痛及先吐者灸巨闕七壯在心下一寸不發更灸如前數

若先腹痛者灸太倉二七壯穴在心厭下四寸臍上一夫不止更灸如前數○若吐下不禁兩手陰陽脉俱疾數者灸心蔽骨下三寸又灸臍下三寸各六七十壯

若乾嘔者灸間使各七壯在手腕後三寸兩筋間不差更灸如前數○若嘔噦者灸心主各七壯在掌腕上約中吐不止更灸如前數

若手足逆冷灸三陰交各七壯在足內踝直上三寸廉骨際未瘥更灸如前數

若先下利者灸歛門二七壯在臍傍三寸男左女右一名大腸募不瘥更灸如前數○若下不者灸大都七壯在足大趾本節後內側白肉際○若泄痢所傷煩欲死者灸慈宮二七壯在橫骨兩邊各二寸半骨在臍下門骨是

轉筋在兩臂及胃中者灸手掌白肉際七壯又灸臺中中府巨闕胃管尺澤并治筋拘頭及愈○走哺轉筋灸踵踝白肉際各三七壯又灸小腸在橫骨中央隨年壯○

轉筋四灸兩乳根黑白際各一壯○轉筋灸滄泉六七壯在足心下當拇趾大筋上又灸足大趾下約中一壯○轉筋不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈○轉筋入腹痛欲死四人持手足灸臍上一寸半四壯自不動勿復持之又灸股裏大筋去陰一寸○霍亂轉筋令病人合面正卧伸兩手方才以繩橫量兩肘尖頭依繩下俠脊骨兩邊相去各一寸半灸一百壯無不瘥肘後云此華佗法

霍亂已死有腰氣者灸承筋七壯（取繩量圖足從趾至跟半以度折一頭至踵踏地處引起屈上至膝頭即是）令人不老房室不勞損氣力顏色不衰

雜補第七 論一首 方三十首

論曰彭祖云使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色不衰者莫過麋角其法刮為末十兩用生附子一枚合之酒服方寸七日三大良亦可熬令微黃單服之亦令人不老然遲緩不及附子者又以雀卵和為丸彌佳服之二十日大效

琥珀散治虛勞百病除陰痿精清力不足大小便不利如淋狀腦門受寒氣結在關元強行陰陽精少餘瀝腰脊痛四肢重咽乾口燥食無常味乏氣力遂視眩眩驚悸不安五臟虛勞上氣滿悶方

琥珀（研）　無菁子　胡麻子　車前子　蛇床子
菟絲子　狗杞子　菴閭子　麥門冬（一升擣皮）
肉蓯蓉（松脂）　松子　柏子
茯苓（各三兩）　牡蠣（各四兩）　柏子仁（各三兩）
石亭　石斛　滑石
人參　杜蘅　續斷
牛膝　牡丹（各三兩）　遠志　當歸（十四銖）

靜嘉堂文庫所藏

右三十味各治下篩合搗二千杵盛以韋囊先食服方寸匕日三夜一用牛羊乳汁煎令熱長服令人體益氣消穀能食耐寒署百病除雖衛十女不勞損令精實如膏服後七十日可得行步久服老而更少髮白更黑齒落重生

菟絲散 主輕身益氣彊骨補髓不足能使陰氣強盛方

肉蓯蓉　五味子　遠志　甘草各一斤
生地黃三十斤取汁　慎火草切　楮子　乾薑各二升

右八味以地黃汁浸一宿出曝乾復漬令汁盡為散空腹酒服方寸匕日三服三十日力倍常雖衛十女無損

有方室人常服勿絕方

菟絲子　遠志　防風

五味子　巴戟　杜仲　蓯蓉各二兩

右八味治下篩酒服方寸匕日二無室勿服

大雄散 治五勞七傷陰痿不起衰損者方

天雄　五味子　遠志各一兩
蓯蓉十分　蛇床子　菟絲子各六兩

右六味治下篩酒下方寸匕日三常服勿止

治陰下濕癢生瘡失精陰痿方

牡蒙　菟絲子　柏子人　蛇床子　蓯蓉各二兩

右五味治下篩酒服方寸匕日三以知為度

治陰痿精薄而冷方

蓯蓉　鍾乳　遠志　蛇床子
續斷　菟絲　鹿茸各三兩

靜嘉堂文庫所藏

右七味治下篩酒服方寸七日二欲多房室倍蛇牀欲堅倍益志欲大倍蒐絲治五勞七傷庶事衰惡方

巴戟天　蛇床子　天雄　菟絲子　牛膝　遠志　各二分　雄蠶蛾十枚　五味子　蓴實　各三分　石斛　菟葵　各五分

右十一味治下篩以酒服方寸七日三

石硫黃散　極益房勞補虛損方

石硫黃　白石英　鹿茸　遠志　蛇牀子　五味子　天雄　薑蠶　白馬莖　女萎　各等分　菟絲子

右十一味治下篩酒服方寸七日三無房勿服

又方羅勒　五味子　酸棗人　枸杞子　乾地黃　枸杞根皮　各三兩

右六味治下篩酒服方寸七日三

又方重前子莖葉根治下篩服方寸七彊陰益精

常餉補方

枸杞子一斤天雄三兩　菟葵　菟絲子　遠志　續斷　各五兩　石斛　乾地黃十兩　乾薑　各八兩

右九味治下篩酒服方寸七日二食無所忌服藥十日

候莖頭紫色乃可行房

治男子陰氣衰腰背痛苦寒並消少精小便餘瀝出失精囊下濕癢盧之服此令人充實肌膚肥悅方

巴戟天　菟絲子　杜仲　桑螵蛸　石斛

靜嘉堂文庫所藏

右五味等分治下篩酒服方寸七日一常服佳

又方 薯蕷 巴戟天 山茱萸 冊參
人參 各五分 蛇牀子 五味子 各四分 天雄
細辛 各三分 桂心二分 乾地黃十分

右十一味治下篩酒服方寸七日二夜

又方 五味子 蛇牀子 各二兩 續斷
牛膝 各三兩 車前子 薤蓉 各四兩

右六味治下篩酒服方寸七日二

杜仲散 益氣補虛 治男子羸瘦短氣五臟憂損腰痛不能久房室

杜仲 蛇床子 五味子 乾地黃 六分 菟絲子 十分
遠志 各八分 木防己 五分 巴戟天 七分

右九味治下篩食前酒服方寸七日二長服不絕佳

薤蓉散 補虛益陽 治陽氣不足陰囊濕褢尿有餘瀝漏洩虛損氣為不起方 又方見前

薤蓉 續斷 各八分 蛇床子 九分 五味子 天雄
薯蕷 各七分 遠志 六分 乾地黃 巴戟天 各五分

右九味治下篩酒服方寸七日三凡病皆由醉飽後或疲極之餘而合陰陽致成此病也

白馬莖圓 治空房獨怒見敵不興口乾汗出失精囊下濕褢尿有餘瀝卵偏大引痒腰冷脛痠目中眩眩小腹急腰有腫男子百病方

白馬莖 石韋 天雄 遠志 赤石脂
蛇床子 菖蒲 薯蕷 杜仲 菟絲根
肉薤蓉 石斛 續斷 牛膝 山茱萸

靜嘉堂文庫所藏

柏子人　細辛　防風各八分

右十八味為末白蜜丸如梧子大酒服四丸日再服漸加至二十丸七日知一月日百病愈

治陰痿方

雄雞肝一具　鯉魚膽一枚

右二味陰乾百日為末雀卵和丸如小豆大吞一丸

又方　菟絲子一升　雄雞肝三具陰乾百日

右二味為末雀卵和丸如小豆大每服一丸日三

又方　乾藸　白朮　甘草　菟絲子

菟蓉　牛膝　巴戟天　五味子

桂心各三兩　石南　石龍芮各一兩　乾地黃四兩

右十二味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日三

又方　蜂房灰夜卧傳陰上即熱起無房室不可用

治陽不起方

原蠶蛾未連者一升陰乾去頭足毛羽為末白蜜丸如梧子大夜卧服一丸可行十室菖蒲酒止之

又方　磁石五斤研清酒三斗漬二七日每服三合日三夜一

常服天門冬亦佳

又方　五味子一升新好者治下節酒服方寸匕日三稍加至三七無所忌食豬魚大蒜大醋盡一劑即得加百日已上可御十女服藥常令相續不絕四時勿廢功能自知

又方　菟絲子　五味子　蛇床子各等分

右三味為末蜜丸如梧子飲服三丸日三

靜嘉堂文庫所藏

蛇牀子　菟絲子　杜仲各五分　菘蓉八分　五味子四分

右五味為末蜜丸如梧子每服酒下十四丸日二夜一

壯陽道方

蛇床子末三兩　菟絲汁二合

右二味相和塗上日五遍

冷腰痛壯方

蛇牀子　菘蓉　遠志各三分　附子一分

右四味為末以蜜和丸如梧子空腹內玉泉中

一行當百思想不忘方

蛇牀子三分　遠志各二分　桂心一分　無食子一枚

右五味為末嚥九如梧子空腹內玉泉中稍時通體

重刊孫真人備急千金要方卷之二十

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


184
24
4 10

靜嘉堂文庫所藏

心不得眠第二　林閉之錄

裡方第五



戒消渴病者然則大寒凝海而酒不凍鹽藏此二味酒客耽嗜不離其口三觴對酢醬不擇酸鹹積年長夜酣與乾燥木石猶且焦枯在人何能不節慎旬月而膠不自覺苦志所慎者有三一飲酒

靜嘉堂文庫所藏

至足大麻亦得

麥門冬汁 蘆根切各貳升 茆根切各壹升

服忌如藥法

□熱□渴方

□冬五兩各 生薑陸兩 萎蕤肆兩

大棗貳拾枚去核 知母肆兩

□□□□取九升去滓下藥煑取四升分四服服

□□□□□□即治

連 梁米各伍兩 括蔞

母三兩 麥門冬二兩去心

絕塞安甑中蒸之極爛接熟及熱木臼中

蜜和之丸如梧子飲服三十丸日二加至五十

之非但治胃熱

麥門冬去心 鉛丹熬各 茯神 甘草炙各六分

煑取二升半分三服日進一劑服十劑佳

苦參 括蔞 麥門冬去心 茯神 人參

甘草炙 黃連 知母各參兩 乾地黃 石膏各六兩

兔絲子三合 茯苓四兩

以牛膽三合和蜜丸如梧子以茆根湯服三十丸日二服加

十九 又方

靜嘉堂文庫所藏

宗近桶口結燒作灰井　不過三劑

取豉漬取汁任恬多少飲之

濃煮竹根取汁飲之以差止

以青粱米煮取汁飲之以差止乃

棗丸兼治口乾方

棗肉壹升五合　酢石榴子乾之五合　葛根　覆盆子各叁兩　烏梅五拾枚

茯苓　括蔞各貳兩　桂心六兩　石蜜四兩半

如酸棗許不限晝夜以口中津液為度

三黃丸治男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下

方

肆兩　大黃貳兩　黃連肆兩

陸兩　大黃壹兩　黃連柒兩

兩　大黃叁兩　黃連叁兩

如大豆服五丸日三不知稍加至七丸服

試有驗夏月人當飲冷水故不服也

生地黃各壹

浸黃連出曝之乾復內汁盡乾擣末蜜丸服二

匕三食前後無在亦可散以酒服方寸匕日三服

祕方

括蔞根厚削皮至白處止以寸切之水浸一日一夜

經五日出取爛擣碎研之以絹袋濾之如出粉法水服

寸匕日再亦可作粉粥乳酪中食之不限多少取差止

脈絕胃反而吐方

苓兩　澤瀉四兩　朮　生薑　桂心各叁兩　甘草壹兩炙

水一斗煮小麥三升取汁三升去麥下藥煮取二升半服八

日再服　又方

上瓦三十年者碎如雀　水二石煮取二斗

靜嘉堂文庫所藏

氣如左　生朮　乾薑　生薑各捌兩　橘皮
人參　甘草　黃耆　遠志各叁兩　桂心
當歸　芍藥各貳兩　棗叁拾枚
煑取三升分四服單飲此汁亦佳
後虛熱渴四肢煩疼方
根壹斤　人參　甘草各壹兩　竹葉壹把
斗五升煑取五升但渴即飲之日三夜一服
不效宜服煎方
菟絲子　山茱萸　當歸　牛膝
巴戟天　麥門冬去心　石斛各叁兩　石韋
桂心　茯苓各肆兩　大豆卷壹升　天門冬五兩
地黃　栝蔞根各十斤搗絞取汁於微火上煎之
並下白蜜三斤牛髓一斤微火煎之令如
日三服亦可飲之

不止消渴補虛羸散方
萎蕤各肆兩　生石斛　黃連各捌兩
參各伍兩　甘草　五味子　知母
歸各叁兩　麥蘗捨
寸匕水三升煑取一升以絹袋盛煑之日二度
苦渴骨節煩熱或寒枸杞湯方
根白皮切伍升　麥門冬壹升　小麥貳升
水二斗煑麥熟藥成去滓每服一升日再
壅熱注脾胃從脾注肺好渴利方
麥　地骨白皮各壹升　竹茹切叁升　麥門冬去心
茯苓各肆兩　甘草炙叁兩　生薑　栝蔞各伍兩　大棗去核叁拾枚
以水三斗煑小麥取一斗去麥清下藥煑取三升分三服
熱引飲不止極渴方

靜嘉堂文庫所藏

六兩各貳　地骨皮　生地黃八升　茯神
萎蕤　知母　生薑十兩各肆　生麥門冬壹升半
小一斗二升下大棗三十枚并藥煮取四升分四服
由瀝湯治腎氣不足消渴小便多腰痛方
腎具　遠志　人參　澤瀉　乾地黃
心　當歸　龍骨　甘草　芎藭各貳兩
五兩　五味子五合　大棗參拾枚去核　麥門冬壹升
五升煮羊腎取一斗二升下藥取三升分三服
利而多服不蔽人虛熱當風取冷患脚氣喜動兼小
此湯立減方
乾薑肆兩　麻子壹升　遠志肆兩
人參壹兩　甘草參兩炙
升半去滓內膠分三服說云小便利多白
日十類服良

當由熱中所作也小便多於所飲令人虛
物皆消作小便也貞觀十年梓州刺史李文
忽然房道強盛經月餘漸患渴經數日小
來百方治之漸以增劇四體羸惙不能起止心
乾而卒此病雖稀甚可畏也利時脉沈細微弱服
不能長愈服鉛丹丸立即減其間將服除熱補丸
方
枚　菝葜　括蔞　石膏碎　黃連　甘草參兩各
斗煮取三升分五服日三夜二劇者多合渴即飲之
治氣小便數方
蒼　芍藥　生薑　桂心　當歸
甘草各　麥門冬　乾地黃　黃芩各壹兩　大棗參拾枚
以水一斗煮取三升分三服服之日三
生放恣者眾盛壯之時　快情縱慾極意房

靜嘉堂文庫所藏

長腎氣虛竭百病皆生又年…能房多服石散且
盡石氣孤立惟有虛耗唇口乾焦精液自洩小便赤黃大便
或渴而且利日夜一石已來或不渴而利所食之物皆作小
便由房室不節之所致也又有胎中之病者並長與盛不妻
出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎
腎中石熱也又宜服白鴨通丸便差

…湯方

大豆黄卷 石膏各… 人參 茯神
知母 葛根 黄芩 括蔞 甘草各貳兩

右…升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三升
臥之下焦熱者夜輒合一劑病熱漸歇即止凡平
…心王也心王便汗汗則腎中虛燥故渴而小
以小便多而數也此為平人之證也名為消
…云腎實則消而利是也所以服石之人於

…得石則實實則消水漿故利利多則不渴
…張仲景云熱結上焦則為堅熱結下焦則
…明不必悉患小便利信矣内有熱者則喜渴
…除熱補虛則差也

熱氣入腎中變寒熱脚弱虛滿方

生括蔞汁 生地黄汁 羊乳汁

…和黄連末丸如梧子任多少飲服三十丸大病五日
三日差無羊乳汁牛乳亦得可以麥粥飲服之治虛熱佳

…萍 括蔞根各… 人乳汁

…末以乳汁和丸如梧桐子飲服二十丸日三三年病者愈

…咽中乾手足心黄短氣黄連煎熱止渴方

…黄汁 生括蔞汁 生羊脂 蜜各… 黄連末壹斤

…合煎可為丸如梧子大飲服五丸日二加至十丸若苦…
差即別服溫藥

靜嘉堂文庫所藏

使數
海陸分 括蔞壹兩 茯苓參兩 鉛丹壹分 雞肶胵中黃皮拾枚
散飲服方寸匕日三當小便其佳常服去鉛丹蜜丸
丹熬 胡粉熬各貳分 括蔞 甘草各拾分炙
鳩 石膏碎 赤石脂 白石脂各伍分
以水服方寸匕日三壯人一匕半一年病一日愈二年病二日愈
夜二服腹痛者減之丸服亦佳傷多令人腹痛
根三十斤切以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五
盡以煖酒先食服如雞子大日三服
七八升方
末以酒服五分匕日三漸加至方寸匕
一升亦佳

大兩束水五斗煮取三斗空腹一服三升
白榆皮貳斤去黑
取五升一服三合日三
根水煎之服佳
雀一把搗取汁頓以服之
年重鵲巢燒末以飲服之
桃膠如彈丸含呑之
蠟如雞子大以酢一升煮之二沸頓服之
蔞粉和雞子曝乾更爲末水服方寸匕日三丸亦佳
水和括蔞散服方寸匕亦可蜜丸如梧子大服三十丸
治男子百病小便過多失精方
刺 石龍芮 巴戟天各貳 麥門冬 厚朴炙
子 萆薢 栢子人 小草

静嘉堂文庫所藏

羊杜仲 牛膝 石斛
心 防葵 乾地黄各壹兩 烏頭半兩炮
蜜和更搗五千杵丸如梧子飲服十九日三加至十五丸

脈一具作羹如食法任性食不過三具

更不禁多日便一二斗如血色方

冬 乾地黄酪捌 乾薑壹兩 蒺藜子
桂酪貳 甘草壹兩炙

煮取二升五合分三服

多或不禁方

去毛 蒲黄酪三 消石壹兩 内蒻蓉貳兩
胵中黄皮三兩為散飲服方寸匕日三如人行

又方

韭子 桂心壹 附子大者 澤瀉三兩
炒令黄 天 炮去皮

日三加至一七漿水服之

白日已上者不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿
羸瘦而死亦忌有所誤傷但作針許大瘡所
出不止者死慎之慎之初得患者
椎下横三寸間○消渴數溲成膿水而出
佳○灸消渴咽喉乾不可忍者灸小腸俞百壯
亦灸之○消渴欲逆灸手厥陰隨年壯○消渴咽喉
自堂五十壯又灸脚太陽五十壯
消渴利始發於春經一夏服括蔞瞿麥汁得其力渴漸差然小
數甚晝夜二十餘行常三四升極差不減二升也轉小便
食肥膩日就羸瘦咽喉唇口燋燥吸吸少氣不得多語心煩
脚酸食乃兼倍於常故不為氣方者然此病皆由虛熱所為
括蔞汁可長將以除熱牛乳亦補此法最有益

靜嘉堂文庫所藏

小便數灸兩手小指頭及足□□上并灸項椎佳
當脊梁中央解間一處與腰目上灸兩處凡三處
灸背上脾俞下四寸當夾脊梁灸之兩處凡諸灸皆當隨年壯也
灸背俞二處又灸腰目在腎俞下三寸亦俠脊骨兩傍各一
若以指按取灸十壯爲佳關元一處又兩傍各二寸二處
處在膝上當伏兔上行二寸臨膝取之或二列灸相去一
者犢鼻下三寸黃帝經云伏曲泉陰谷陰陵泉復灸此諸穴斷小
能損陽氣亦云遺溺也大谿中封然谷太白大都趺陽
隱白涌泉
百壯腹背兩脚凡三十七處其腎俞腰目關元水道
日一報之各得一百五十壯佳涌泉一處可灸
間此處可灸三壯餘悉七壯皆五日一報之滿
如此灸諸陰而不愈宜灸諸陽諸陽在脚表并
穴壯數如灸陰家法灸小便數而少且難用

者也令其人兩手合掌併兩大指令齊急逼
一炷灸兩爪甲本肉際方後自然有角令炷
上此兩指共用炷也亦灸脚大指與手同法各
又灸之

療虛煩悶不得眠方第二

虛煩不得眠方
麥門冬 茯苓 酸棗貳升 甘草炙
黃芩 遠志 萆薢 人參
薑各貳兩 秫米壹升
以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚之萬過澄清取一斗
煮藥取二升半分三服

虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠方
酸棗五升 人參 桂心 生薑各貳兩
石膏四兩 茯苓 知母 甘草各一兩半

靜嘉堂文庫所藏

水一斗先煮酸棗取七升去……取三升分三服日三

虛勞煩悶方

乾棗貳拾枚 蔥白壹握 右以水三升煮取一升去滓頓服

溫膽湯 主大病後虛煩不得眠此是膽冷故方

生薑肆兩 半夏貳兩 橘皮 竹茹 甘草各叁兩

以水八升煮取二升分三服 又入枳殼貳兩

治虛勞不得眠劇者顛倒懊憹欲死方

梔子拾肆枚 豉柒合

以水先煮梔子取二升半內豉更三沸去滓一服一升安

加橘皮生薑各二兩

眠方

枸杞白皮伍兩 麥門冬 甘草 前胡各叁兩

知母 人參各貳兩 豉 粟米各五合

取三升七合分四服

榆葉各等分

子十五丸日再飲服

薑四兩湯和頓服取汗病愈

療淋結方第三

膲則堅熱結下膲則溺白淋閉不通此多是虛損之

下膲客熱所為亦有自然下膲熱者但自少苦羞候之

結熱小便赤黃數起出少莖痛或血出溫病後餘熱及霍

亂風取涼飲酒房勞及行步冒熱冷飲逐熱熱結下膲及散

石熱關格小腹堅肥脹如斗諸有此淋皆悉治之立驗神方

地膚草叁兩 知母 黃芩 豬苓 瞿麥

枳殼炙 升麻 通草 葵子 海藻各貳兩

水九升煮取三升分三服大小便閉者加大黃三兩女人房

室中有熱小便難加豬腎一具

靜嘉堂文庫所藏

七傷八風十二痺結以為淋[…]熱結為內淋小便

[…]方

滑石 王不留行 冬葵子 桂心

車前子各貳分 甘遂壹分 通草 石葦各叁分

為散服方寸匕以麻子飲五合和服日三亦主沙淋

[…]通方

[…]肆兩 貝子燒末 茯苓 白朮 通草 芍藥各貳兩

[…]服方寸匕日二十日差

[…]葵子[…]合 茯苓 白朮 當歸各貳兩

[…]煮取二升分三服日三

葵子 榆白皮各壹兩

[…]半取一升以散三方寸匕和分二服即通

麻根伍兩 甘草壹兩 石首魚頭石

[…]根各叁兩 貝子伍合

[…]次取五升分五服日三夜二亦主石淋

[…]三升熬令赤極熱以酒三升淋汁取汁頓服

[…]壹[…] 車前子 冬瓜子各壹升 鯉魚齒

通草 地麥各貳兩 瞿麥肆兩

[…]煮取二升分三服日三

[…]為尿僻津液不通以葱葉尖內陰莖孔中深三寸微用

胞脹津液大通便愈凡人候鼻頭色黃法小便難也

[…]瀝方 濃煮薄荁汁飲不限多少

以豉半升水二升煮一沸頓服立通

[…]產後小便淋瀝方

豬腎壹具 茯苓壹斤 瞿麥陸兩 車前根切貳升

[…]芩叁兩 澤瀉貳兩 地膚子壹兩

靜嘉堂文庫所藏

二斗煑車前取一斗六升去滓　煑可六升去滓下藥
取三升分三服一方用榆白
淋
車前子二升絹袋盛水九升煑取三升頓服石出
滑石取蒲子十篩水三升酢一升煑取二升服一升
桃膠棗大以三四合湯和一服日三下石子如豆石盡止
熬鹽熱熨小腹　又方　臍中著鹽灸之三壯
淋寒淋熱淋勞淋小便澀胞中滿腹急痛方
石葦　王不留行　甘草各二兩　滑石
芍藥　冬葵各三兩
飲下方寸匕日三服
滑石　石葦各二兩
方寸匕日三服
蒲黃　芍藥

一錢匕日三服
方
茯苓　葶藶各參兩
寸匕日三服
黃　滑石　等分酒服方寸匕日三服
利膀胱腸水氣流腫方
葶藶乾末酒服方寸匕日三服
方　白茅根　右水五斗煑取五升服一升日三服
常煮冬葵根作飲服之
不得小便方　杏人七枚熬末飲服之立下
紫菀末井花水服三指撮立通血出五度服之
婦人胞轉不得小便八九日方
滑石　寒水石各二　葵子　右以水一斗煑取三升分三服
小便不通　葵子一升四升流　以汁煑葵子取二升

靜嘉堂文庫所藏

三服　又方
屎豉各一合和擣丸如梧子酒服三丸日三服
髮去垢燒末一升葵子一升以飲服方寸匕日三服
魚頭石末水服方寸匕又石膽寒灰匕許井花水服之日三
服車前子末酒服方寸匕日三服
灸關元五十壯　又灸俠玉泉相去一寸半三十壯
大敦二十壯
水三升煮船下苔如鴨子許取二升頓服
水三升煮豉一升一沸去滓下鹽一合頓服
斗煮比輪錢三百文服三升分三服
湯服方寸匕　又方　空腹單茹蜀葵一滿口止
律汁二升酥二合和空腹頓服之當尿小豆汁止
以膏自出治之如氣淋也夫勞淋之爲病也勞
灸足太陰百壯在內踝上三寸三報治之與

治熱淋方　大棗貳枚去核
取一升二合分二服熱加黃芩一兩出難加滑石
加茜根三兩痛者加芍藥二兩
五升煮茆根四斤取五升服一升日三夜一
熱發甚即尿血餘如氣淋方
灸丹田隨年壯
水五升煮麻根十枚取一升頓服之
以水四升煮大豆葉一把取二升頓服之
以水三升煮葵子一升取一升日三服
法　遺溺灸遺道俠玉泉五寸隨年壯
灸陽陵泉隨年壯　又方　灸足陽明隨年壯
卒淋灸外踝尖七壯
遺溺失禁出不自知灸陽陵泉……

靜嘉堂文庫所藏

泉下一寸名尿胞一曰胃端主[illegible]小便數々起灸二七
小兒以意石淋臍下三十六種病不得小便灸關元一百壯
五淋不得小便灸引泉十四壯穴在内踝前一寸斜行小脉
上是中封之別名耳　石淋灸氣門三十壯
淋病不得小便陰上綾痛灸足太衝五十壯
淋不得小便灸水泉三十壯足大敦是也

療諸尿血方第四

熱小便黃赤方
子參兩　車前子　冬葵子各壹升　榆白皮肆兩
煮取三升分三服
兩芳各五寸　又灸大敦隨年壯
四升煮取一升頓服
伏　又方　酒服葵莖灰方寸匕日三

方

芩　桂心　黃芩等分
方寸匕日三加至二匕
力
茸各肆兩　桑耳參兩　阿膠貳兩
炙取二升分二服日二服
分陸　甘草　蒲黃　鹿茸角膠炙　芍藥各貳兩
礬石燒參兩　棗拾枚　右水九升煮取二升分三服
胡麻三升搗細末以東流水二升浸一宿平旦去滓煮
沸頓服之　又方　搗荊葉取汁酒服二合
酒三升煮蜀當歸四兩取一升頓服之
血方　生大麻根十枚水五升煮取二升分三服
車前根葉子多少煮之爲佳
桃膠二兩以水三四合冬以湯[illegible]　日石下如豆

靜嘉堂文庫所藏

滑石末水和傅繞小腹及繞陰了佳

熱鹽熨小腹冷易之

水血方　葵子一升水三升煮取一升半服之

多泉白濁方　灸脾俞一百壯穴在第十椎

三焦俞百壯在第十三椎是又灸腎俞百壯在第十四椎

章門百壯在季肋端

榆白皮二斤水二斗煮取五升分七服佳

擣乾羊骨末酒服方寸匕日二服

方

服

栢葉壹把　黃芩貳兩　阿膠參兩

三升去滓下膠分三服一方加甘草二兩

白芷　荊實　兎絲　乾地黃

令　當歸　茯苓　酸漿各等分

服四丸日三稍加至十丸

下玉泉主腰痛小便不利苦轉胞灸七壯

取八寸是玉泉穴也小兒斟酌取之

方　木防巳　葵子　防風各貳兩

取二升半分服之散服亦佳

灸臍下寸半隨年壯　又灸大敦三壯

汁服之又燒雞腸末服水服方寸匕日三一云面北服之

失禁方　灸大敦七壯　又灸行間

水三升煮雞腸取一升分三服

方　垂兩手兩髀上盡指頭有陷處灸七壯

灸臍橫文七壯

取羊胞盛水令滿線縛兩頭熟煮即中開取水頓服之立差

取雞肶胵一具并腸淨洗末酒服男雌女雄

取羊胞盛水令滿中炊之熟空腹頓飲之不過四五頓差

新炊飯一盞寫尿床處拌之…之良

靜嘉堂文庫所藏

鷰巢草燒作灰水服一錢匕日良
禁不知家方
豆醬汁和竈突墨如豆大内尿孔中
兒小便不通方　灸口二吻各一壯立愈
傷白花胡葵子末煮汁服之
猪脂一斤水煮取一升服五合日三服
雞尿白服一錢亦用蜜和更佳飲服
尿血方　燒鵲巢灰并花水服之亦治夜尿床
便不通方　車前子䊚　小麥䊚　右煮為粥飲之日三
取一升以水二升煮取一升内滑石一分研服半合
車前子一升水四升半煮取一升分三服
服一合日三大人服三合臘月者

療水腫方第五

治差後特須慎於口味又病水人多嗜食不廉
代醫者隨逐時情不太性命病人欲食肉於貴勝
頭蹄肉如此未見有一愈者又此病百脉之氣中
飲今寫之使虚并羊頭蹄極補那得瘳愈所以治水
諸藥本草云葶藶多服令人大虚故水病非久
其根又有蠱但腹滿不腫水脹但腹大腫而四肢面目
有醫者不善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但見脹滿
如此者仲景所云愚醫殺人今録慎忌如左
産乳音樂房室諠戲一切魚肉生冷醋滑蒜豆油膩並不得
右以前件禁者並具本方之下其房室等犯之三年慎之永
重發不爾者差而更發重發不可更治也古方十水丸葶藶
利大便不利小便所以不能述錄也諸從腰以下腫當利大
腹以上腫當發汗即愈　黄帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹石
水何得別之岐伯曰水之起也目窠上微腫如新卧起之狀
頸脉動欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成以手按其腹隨手而

靜嘉堂文庫所藏

水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者
客於皮膚之間殼殼然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹
色不變此其候也黃帝曰鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚
其色蒼黃腹脉起此其候也黃帝曰腸覃何如岐伯曰寒氣客
外與衛氣相薄正氣不得營因有所繫癖而內著惡氣乃起息肉
其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲
之則移月事以時下此其候也黃帝曰石瘕何如岐伯曰石瘕
中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當寫不寫衃以留止
狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之黃
鼓脹可刺耶岐伯曰先寫其脹之血絡後調其經刺
病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水
骨節疼痛其人惡風皮水其脉外證胕腫按之沒
如鼓不滿不渴當發其汗正水其脉沈遲外證自
沈外證腹滿不喘黃汗其脉沈遲身體發熱胸滿

差必癰膿水有十種不可治者第一脣黑傷肝第
第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足平滿傷腎
問曰有病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫何
病水若小便自利及汗出者自當愈心水者其
不得臥煩而躁其人陰腫肝水者其腹大不能自轉
腹中痛時時津液微生小便續通肺水者其身腫小便難
鴨溏脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小
腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗濕
逆寒其面皮瘦
腹水腫氣息不通命在旦夕者方
牛黃貳分　昆布拾分洗　海藻各拾分　牽牛子
桂心各八分　葶藶陸分　椒目參兩熬
別搗葶藶如膏丸如梧子飲服十丸日二而至小便利為度大良
觀九年漢陽王患水醫所不治□□此方日夜□□斗五

靜嘉堂文庫所藏

[illegible]差差後有他犯因爾殂[illegible]矣[illegible]良是神方
氣通身洪腫百藥治之不差待死者方
大麻子一石 皆取新肥者佳 赤小豆一石 不得[illegible]
右二味皆以新精者淨揀擇以水淘洗[illegible]蒸[illegible]寸使熟更
曝乾貯於淨器中欲服五升[illegible]熬[illegible]黃香唯須緩火勿令焦
極細末以水五升搦取汁[illegible]盡[illegible]貯[illegible]明旦欲服令[illegible]以小
豆一升淨淘浸之至旦乾漉去[illegible]以[illegible]麻汁水煮[illegible]未[illegible]漉出
乾內麻子汁中煮令大爛熟[illegible]空腹[illegible]意食之日三服當
[illegible]小時即止五日後小便數或赤唾[illegible]乾不足怪之服
[illegible]除行未得即卧十日後針灸三里絕骨下氣[illegible]泄盡
速不可下者取大鯉魚一頭鮮[illegible]首尾[illegible]等巳
[illegible]先開[illegible]去藏以上件汁和[illegible]熟作
[illegible]皮生薑紫蘇調和食之斷[illegible]飲[illegible]暖
[illegible]食不得至飽止得免飢而已慎房室瞋恚言語

治水腫利小便酒客虛熱當風飲冷水腹腫陰脹滿方
葶藶一兩 甘遂一兩 芒消 吳茱萸 芫花各三兩
右蜜丸如梧子飲下三丸日三一方加麝香豬苓各四兩
治婦人短氣虛羸徧身浮腫皮膚急人所稀見方
麝香三銖 雄黃六銖 芫花 甘遂各二分
右散酒服方寸匕老小以意增減亦可為丸小豆大服七丸
治虛勞浮腫方
灸太衝百壯 又灸腎俞百壯穴在第十四椎
[illegible]表腫方
生商陸一升 豬膏一斤煎盡可得二升
右和煎令黃去滓以摩腫亦可服少許并塗以紙覆之燥便
付之不過三日差
[illegible]水利小便方
大黃 朮 木防己各等分
蜜丸如梧子飲下十丸利小便[illegible]不知加之

靜嘉堂文庫所藏

葶藶肆兩　桂心壹兩　右五丸如梧子飲下七丸日

三以知為度　又方　牽牛子末之水服方寸匕日一以

小便利為度　又方　郁李人末　麪各壹升

石和作餅子七枚燒熟空腹熱食四枚不知更加一枚不知加之十枚

方　水銀三兩三日三夜煮　葶藶子熬　椒目熬各壹升　白魚貳七枚

水萍貳兩　瓜蔕　滑石各貳兩　芒消伍兩

右搗葶藶令細下水銀更搗令不見水銀止別搗椒目令細搗

瓜蔕水萍下篩合和餘藥以蜜和更搗三萬杵成丸初酒服一

丸如梧子次服二丸次服三丸次服四丸次服五丸次服六丸

至七日還從一丸起次服二丸如是每至六丸還從一丸起服

藥一喉上有癧子腫起頰車腫滿齒肉皆腫唾碎血出勿怪

也不經三五日即消所苦皆差亦止服藥若下多停藥以止

利藥至五下止病未差更服病差止此治諸躰肉肥厚按之不

陷甚者發癥者衣袖不受大十種大水皆不治者悉主之神良

醋生冷菜茹子一切魚肉鹽醬五辛治十日差神驗

服者皆差凡作一月日服之

又方　蓽撥　昆布　杏人　葶藶各等分

飲服五丸若服訖腹鬧氣急服之勿令至利

氣急積久不差遂成水病攻面目身從腰以上腫皆此湯

愈其方如後　麻黃肆兩　甘草貳兩

五升煮取三升分三服取汗愈慎風冷等

湯治徧身流腫方

麻子伍升　當歸壹兩　防風貳兩　附子壹兩　赤小豆叁升

先搗麻子熟以水三斗煮麻子取一斗三升去滓內藥及豆

煮取四升去滓食豆飲汁

水氣腫鼓脹小便不利方

莨菪子壹升　羖羊肺壹具青羊佳

洗羊肺薄切之暴乾末以三年醋漬莨菪子熬令變

靜嘉堂文庫所藏

擣如泥和脯三千杵食後一食〻[illegible]門冬飲服如梧子四
三日以後喉中乾口粘爲候數日小便大利佳
麥門冬飲法
麥門冬貳拾伍銖去心　米貳十伍銖
以水一斗和煮米熟去滓以下前丸藥
男子女人新久了得具卅悉風入腹婦〻新産上圊風入藏中
馬鞭者噓吸短氣欬急大豆煎方
大豆一斗淨擇以水五斗煮取一斗三升澄清内釜中以一斗
八升酒内中更煎取九升宿勿食旦服三升温覆兩食頃當下
風氣腫頃風冷十日平復也除日服之腫不盡加之
又枝桑一大束切煮取汁隨多少釀酒但服醉爲佳
腫差後可常服之
又鯉魚長一尺五寸以尿浸令沒一宿平旦以水從口中
至尾微火炙令微熟去皮空腹頓服再佳

猪苓散主虛滿通身腫利三焦通水道方
猪苓　葶藶　人參　玄參　五味子　防風
澤瀉　肉桂　狼毒　椒目　白朮　乾薑
大戟　甘草各貳兩　蓯蓉貳兩分　女麴熬三合　赤小豆三合
右十七味搗篩爲散酒服方寸匕日三夜一老小一錢匕以小
便利爲度
徐王煑散主水腫服輒利小便方
防巳　羌活　人參　丹參　牛膝　牛角䚡
升麻　防風　秦膠　轂皮　紫菀　杏人去皮尖
生薑屑　附子　石斛各叁兩　橘皮貳兩　桑白皮陸兩　白朮
澤瀉　茯苓　猪苓　黃連去毛　郁李人各貳分
右二十三味以水一升五合煑五方寸匕煑取一升頓服日再
不能者一服二合三月以前可服此主利多小便澁者用之大驗
深湯主水氣通身洪腫四肢無[illegible]消渴或從黃疸支飲内

靜嘉堂文庫所藏

不足榮衛不通氣不消化實及膚中喘息不安腹中響響脹眼不

方

澤漆根拾兩　鯉魚伍斤　赤小豆貳升

生薑八兩　茯苓參兩　人參　麥門冬　甘草各貳兩

右八味以水一斗七升先煮魚及豆減七升去之內藥煮取四升半服三合日三人弱服一大合再服氣下喘止可至四合晬時小便利腫氣減或小溏下若小便大利還從一合始大利便止若無鯉魚鮦魚亦可用若水甚不得臥不得轉則加澤漆一斤渴加括蔞二兩咳加紫菀二兩細辛一兩款冬一兩桂二兩增魚汁二升

麻黃煎主風水通身腫欲裂利小便方

麻黃去節　茯苓肆兩　防風　澤漆　白朮各伍兩

杏仁去皮尖　大戟　清酒各一升　黃耆　豬苓各參兩

澤瀉肆兩　獨活捌兩　大豆貳升以水七升煮取一升半清之

右十三味以豆汁酒及水一斗合煮取六升分六七服一日一夜令盡當小便極利為度

苦瓠丸主大水頭面徧身大腫脹滿方

苦瓠白穰實如大豆麪裹煮一沸空腹吞一枚至午當出水一升三四日水自出不止大瘦乃差三年內慎口也苦瓠須好無黶細研淨者不爾有毒不堪用

大豆湯主風水通身大腫眼合不得開短氣欲絕方

大豆　杏人去皮尖雙人　清酒壹升　麻黃去節

防風　木防己　豬苓各肆兩　澤瀉

黃耆　烏頭各參兩　生薑柒兩　半夏陸兩洗

茯苓　白朮各參兩　甘遂　甘草各貳兩

右十六味以水一斗四升煮豆取一斗去之內藥及酒合煮取七升分七服日四夜三得小便快利為度腫消停藥不必盡劑若不利小便者加生大戟一升葶藶二兩無不快利方不失一

腫上氣煮散方

防己　澤漆葉　石韋　澤瀉各伍兩

白术　丹參　赤小豆　橘皮

桑根白皮　通草各叁兩　郁李人伍合　生薑拾兩

右麤篩下為散水一升半煮散四方寸匕取八合頓服日三取

大小便利為度

水腫茯苓丸方

茯苓　白术　椒目各肆兩　木防已　葶藶熬　澤瀉各伍兩

甘遂拾貳分　赤小豆　前胡　芫花　桂心各貳兩　芒消別研

右蜜和丸如梧子飲服五丸日一加至以知為度

有人患水腫大四肢細腹堅如石小勞苦即腳腫小飲食便氣急

此終身疾不可強利下恐極而不差宜服此藥將以微除風濕利

小便水穀歲久服之乃可得力耳差後可長服之方

丹參　鬼箭羽　白朮　獨活各伍兩　秦膠

猪苓各叁兩　知母　海藻　茯苓　桂心各貳兩

右酒三斗浸五日服五合日三任性以力漸加之

治膽玄水中軍候黑丸主澼飲停結滿悶目暗方

芫花拾貳分　巴豆人熬捌分　桂心　桔梗各四分　杏人去皮熬伍分別搗

右飲服蜜丸如胡豆二丸日一服此膽水先從頭面至腳腫頭眩

痛身虛熱名曰玄水體腫大小便澀宜此方

治小腸府小腹滿暴腫口苦乾燥方

巴豆三十枚和皮吹咀水五升煮取三升綿內汁中拭腫上

隨手減矣日五六拭莫近目及陰數

停痰飲結在腹腫脹滿不能飲食乾嘔大小便澀方

旋復花　大黃　附子　黃芩　椒目　桂心

芫花　狼毒　乾薑　芍藥　枳實　細辛各捌分

右蜜丸如梧子飲下三丸日三服

治腎水四肢腫滿方

猪腎一具　茯苓四兩　防已　橘皮　玄參　黃芩

杏人熬　澤瀉　桑白皮各壹兩　猪苓　白术　大豆各叁兩

靜嘉堂文庫所藏

右以水一斗八升先煑桑根大豆澤漆取一斗清內藥煑取三升分三服若欬加五味子二兩凡服三劑間五日一劑

治大腹水下虛不實上下渫去方

赤小豆五升 桑白皮切二升 鯉魚一頭 白术五兩

右四味以水三斗煑取魚爛去魚食取盡并絞汁取四升許飽飲下魚莫與鹽

又方

羊肉一斤 當陸切一升

右以水二斗煑令當陸爛去滓下肉爲臛葱豉鹽醋事事如臛之法

治膀胱石水四肢瘦腹腫方

桑白皮切 桔樹白皮切 澤漆葉各三升 大豆五升 防巳 夜干 木防巳肆兩

右以水一斗煑取六升去滓內好酒二升更煑取五升每日二服夜一服除者明日更服

又方

桑白皮六兩 夜干 黃芩 茯苓 术各肆兩 澤瀉參兩 防巳貳兩 澤漆切壹升 大豆參升

右水五斗煑大豆取三斗去豆澄清取汁一斗下藥煑取三升空腹分三服

治水通身腫方

灸足第二指上一寸隨年壯

又灸兩手大指縫頭七壯

又煎猪椒枝葉如餳空腹服一匕日三

又 苦瓠膜二分葶藶子五分蜜丸酒服之五丸日三

又 葶藶桃人等分皆熬爲丸酒服之利小便

又 大棗肉七枚苦瓠膜如棗核大擣丸一服三丸日三如前

又 燒石令赤內牛尿中令熱服一升

單服牛尿大良凡病水服無不差

灸水腹肚如大鼓者方

烏豆壹斗熬令香勿令太熟 擣去皮細末篩下餳粥皆得服之初服一合稍加之若服初多後已嫌臭服盡則更造取差止不得食肥膩渴則飲羹汁慎酒肉豬魚生冷酢滑房室得食醬粥牛羊兔鹿肉此據大飢渴得食之可忍亦勿食也此病難治雖諸大藥丸散湯膏當時雖差過後還發唯此大豆

靜嘉堂文庫所藏

散差竟不發終身之所禁之食常須少啖莫令意饑物
諸雜食等當忌之
又方　葶藶子一升七熬搗蒼耳子灰三十七和水服之日三
今方　樹白水洗者取熬之搗如膏酒服方寸匕
又方　煮馬兜苓服之
八水病初病目上先腫如老蠶色次頸脈動股裏冷脛中痛按
之沒指腹中轉側有聲此其候也不即治之身稍腫腹中盡脹按
隨手起水為已成猶可治也此病皆由從大虛損得之大病下利
後婦人產後飲水不即消三焦決漏小便不利仍相結裏流諸經
絡故也
治風水腫方
大豆　參斗　桑白皮　五升
以水七斗煮取三斗內後藥
茯苓　半夏洗　生薑各二兩

當歸　防已　猪苓酸棗　大戟各一兩
以內前汁中煮取三升一服八合分三服
治面腫小便澁心腹脹滿方
茯苓　杏人　猪苓各一兩　橘皮　防已
葶藶熬搗　蘇子各一合
右為丸如小豆以桑白皮湯服十九日二加至三十九
凡水病忌腹上出水出水者一月死大忌之

孫真人千金方卷第二十

孫真人千金方卷第二十二

序論第一	菓實第二	
穀米第四	鳥獸第五	菜蔬第三

序論第一

仲景曰人體平和唯須好將養勿妄服藥藥勢偏有助令人藏氣不平易受外患夫舍氣之類未有不資食以存生而不知食之有成敗百姓日用而不知水火至近而難識余慨其如此聊因筆畫之暇撰五味損益食治篇以啓童稚庶勤而行之有如影響河東衛汎記曰扁鵲云人之所依者飛也氣也濟命扶危者醫也安身之本必資於食救疾之速必憑於藥不知食宜者不足以存生也不明藥忌者不能以除病也斯之二事有靈之所要也若忽而不學誠可悲夫是故食能排邪而安臧府悅神爽志以資血氣若能用食平病釋情遣疾者可謂良工乎閒老之奇法極養生之術也夫為醫者當須先洞曉病源知其

靜嘉堂文庫所藏

所犯以食治之食療不愈然後命藥治剛列猶若御兵兵之猛
暴豈容妄發發用乖宜損傷處衆藥之投疾殊濫亦然高平王熙
補食不欲雜雜則有所犯者或有所傷或當時雖無災苦
積久為人作患又食欲鮭膏務令簡少忌肉菓實取益人者而食
之凡常飲食每令節儉若貪味多餐盤大餉食訖覺腹中微與短
氣或致暴疾仍為雍亂又夏至以後迄至秋分必須慎其肥膩酥酪
雞蘇油之屬此物與酒皆不可節故也又魚鼈諸腥冷之物多損於人斷
春夏取冷太過飲食不節故也又魚鼈諸腥冷之物多損於人斷
之益善乳酪酥等常食之令人有筋力膽幹肌體潤澤亦多食之
虛脹泄利漸漸害已黃帝曰五味入於口各有所走各不所病酸
走筋多食酸令人癉不知何以然少俞曰酸入胃也其氣濇以收
也上走口走兩脇氣濇不能出入即留於胃中胃中和溫即下注膀胱
膀胱走胞胞薄更得酸則縮卷約而氣不通水道不行故癉也陰
者精筋之所終聚也故酸入胃走於筋也減走血多食減令人渴

何也答曰鹹入胃也其氣上走中脘注於諸脈脈者血之所走也
與鹹相得即血凝凝則胃中汁泣汁泣則胃中乾竭竭則咽路焦
焦故舌乾喜渴血脈者中焦之道也故減入胃走於血辛走氣多
食辛令人溫心何也答曰辛入胃也其氣走上膲上膲者受使諸
氣而營諸陽者也薑韭之氣熏至榮衛榮衛不時受之卻溜於心
下痛也辛者與氣俱行故辛入胃而走氣與氣俱出故氣盛也苦
走骨多食苦令人變嘔何也答曰苦入胃也五穀之氣皆不勝苦
苦入下管下管者三膲之道皆閉則不通故氣變嘔也齒者骨之
餘所終也故苦入胃走骨入而復出從必梨踈甘走肉多食甘令
人惡心何也答曰甘入胃其氣弱劣不能上進而與穀俱留於胃
甘者令柔潤者也胃柔則緩緩則蚘動蚘動則令人惡心其氣外
通於肉故甘走肉則肉多粟起而胝黃帝問伯高曰穀之五味所
主可得聞乎伯高云夫食風者則有靈而延壽食穀者則智而勞
神食草者則愚癡而多力食肉者則勇猛而多嗔是以青色宜酸

靜嘉堂文庫所藏

赤色宜苦黃色宜甘白色宜辛黑色宜鹹

五藏所合法肝病宜食麥羊肉李韭心病宜食麥羊肉杏雞脾病宜食稗米牛肉棗葵腎病宜食大豆黃卷豕肉栗藿　五味動病法

酸走筋筋病勿食酸苦走骨骨病勿食甘辛走氣氣病勿食辛鹹走血血病勿食鹹走肉肉病勿食甘辛米飯甘麻酸豕鹹羊苦雞辛葵甘韭酸藿鹹薤苦葱辛

五藏病五味對治法　肝苦急急者食甘以緩之肝欲散急食辛以散之用酸瀉之。心若緩緩者急食酸以收之心欲耎急食鹹以耎之用甘瀉之。脾苦濕濕者食燥以燥之脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之禁溫食飽食濕地煖衣。肺若氣氣上逆息者急食苦以泄之肺欲收急食酸以收之用辛瀉之腎苦燥燥者急食辛以潤之腠理潤致液氣腎欲堅急食苦以結

之食鹹以寫之

無犯此禁慎無厚衣厚衣傷皮是以五穀為養五肉為益五果為助五菜為充精以食氣氣養精以榮色形以食味味食形生力此之謂也神藏有五形藏有四以此輔神可長生久視也精得氣以靈也若食氣惡則傷精也形受味以成也若食味不調則損形也是以聖人先禁食以存性後制藥以防命也故形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣味溫補以有形精歧伯云陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精食氣形氣傷於味味出下竅氣出上竅味厚者為陰之陽氣厚者為陽之陰味厚則泄薄薄則通流氣薄則泄厚則秘基壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣氣味辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰陰勝則陽病陽勝則陰病陰陽調和人則平安。春七十二日省酸增甘以養脾氣夏七十二日省苦增辛以養肺氣秋七十二日省辛增酸以養肝氣冬七十二日省鹹增苦

靜嘉堂文庫所藏

爛食為苦以養心氣季月各十八日省五增減以養腎氣

果實第二

檳榔味辛温濇無毒主消穀逐水除滄瀉殺三蟲去伏尸治寸白
豆蔻味辛温濇無毒主温中心腹痛止吐去口臭氣
蒲桃味甘平無毒主筋骨温暖益氣倍力強志令人肥健耐飢忍
風寒久食輕身不老治腸間水調中可作酒常飲益人逐水利小便
覆盆子甘平無毒主益氣輕身令髮不白
大棗味甘辛熟滑無毒主心腹邪氣安中養脾氣助十二經通九
竅補津液身中不足大驚四肢重可和百藥補中益氣強志除煩
悶心下懸癰治腸澼久服輕身長年不飢神仙
生棗味辛多食令人熱渴氣脹苦寒熱羸瘦者彌不可多食傷
人藕實味苦寒無毒食之令人心歡止渴去熱補中養神益氣除
百病久服輕身耐老不飢延年名水芝生根寒主止熱渴破留血
雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強
志意耳目聰明久服輕身不飢耐老
芡實味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名芡黃帝云七月
勿食生芡芡作蛲蟲
栗子味鹹温無毒主益氣厚腸胃補腎氣冷人耐飢生食之甚治
之腰脚不隨
櫻桃味甘平濇主調中益氣可多食令人好顏色美志性
橘柚味辛温濇無毒主胷中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除膀
胱留熱停水破五淋利小便治脾不能消穀却胷中吐逆霍亂止
渴消去寸白服之去口臭通神輕身長年一名橘皮陳久者良
津荷子味苦滑平多食令人口爽不知五味
梅實味酸平濇無毒主下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁
死肌去青黑誌滅惡疾止下利好唾口乾利筋多食壞人齒
柿味甘寒濇無毒主通鼻耳氣腸澼不足及火瘡金瘡止痛
不凡實味酸寒温濇無毒主温腸氣霍乱大吐下後脇轉筋不

靜嘉堂文庫所藏

止其生樹皮無毒亦可煮用
桃實味甘平無毒殺蟲主五痔去三蟲殺蠱毒鬼注惡毒
甘蕉味甘平濇無毒主下熱和中補脾氣利大腸上渴去煩解酒毒
棗味苦冷濇無毒多食動宿病益冷氣發欬嗽
苹味辛滑平無毒主寬腸胃充肌膚〔名士安不可多食動冷氣〕
烏羊苦滑微寒無毒主消渴瘧熱止益氣〔名藉姑名水萍三月採〕
杏核人味苦冷而利有毒主殺蟲逆上氣腸中雷鳴喉痺〔氣產乳〕
金瘡寒心奔肫驚癎心下煩熱風無去來時行頭痛解肌消心急
殺苟毒五月採之〔核兩人者害人宜去人〕
杏實向生味極酸其中核猶未勦熟毒偏鵲云杏人不可久服令人目盲眉鬚落動一切宿〔
桃核人味甘辛平無毒主破瘀血閉瘕邪氣殺小蟲治欬逆上氣
消心下勦除交暴擊血破癥通月水止心痛七月採凡一切果核
中有兩人者並害人不任用其實味酸無毒多食令人有熱黃

帝云飽食桃人水沿成淋病
李核人味苦平无毒主僵仆踏瘀腫實痛
除固熱調中宜心不可多食令人虛黃帝云李子不可和白蜜食
食人五內傷
梨味甘寒濇有毒主除客氣止心煩不可多食令人寒中金瘡產
婦勿食令人萊女困寒中
林檎味酸苦濇平无毒主止渴好睡不可多食令人百脉閉
榛子味酸苦寒濇無毒主耐肌益心氣不可多食令人臃脹久病
人食之病尤甚
安石榴味酸濇無毒主止咽燥渴不可多食損人脾
琵琶葉味苦平無毒主哕不止下氣不爾削取生樹皮無毒嚼之
少少咽汁亦好煮汁冷服之大佳
胡桃味甘冷滑无毒不可多食動皮飲令人惡心吐水吐食

菜部第三

靜嘉堂文庫所藏

枸杞葉味平无毒濟主補精髓益精髓諺云去家千里勿食羅
摩枸杞此則言其強陽道益陰氣速疾故也
蘿摩味甘平一名苦丸无毒其葉厚大作藤生摘之有白汁出人
家多種亦可生啖亦可煮煮食之補益奚杓根葉同
瓜子味甘平寒無毒主令人光澤好顏色益氣不飢久服輕身耐
老又除胷忩滿不樂又作寒中人可作面脂一名水芝一名白瓜
子即冬瓜人也八月採
白冬瓜味甘微寒无毒主除小腹水脹利小便止消渴凡冬瓜味
甘寒無毒滑去渴多食令人陰下痒濕生瘡發黃疸黃帝云九
月勿食被霜瓜向冬發寒熱及患病初食時即令人吐也食竟心
內作停水不能自消或為胃反
越瓜味甘平无毒可久食益腸胃
胡瓜味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積瘀熱
青瓜味甘寒無毒食之去熱煩不可久食令人多忘

冬葵子味甘寒无毒主五藏六府寒熱羸瘦破五淋利小便堕
乳難血閉久服輕身長肌肉延年十二月採
葵菜味甘寒滑无毒豆腐久服食利胃氣治心傷百藥忌食心
心有毒黃帝云霜葵凍者生食之動五種留飲飲盛則吐水
凡葵菜和鯉魚鱔食之害又四季之月勿食生葵菜令人飲食不
化發宿病
苋菜實味甘寒濇无毒主治清盲白翳明目除邪氣利大小便
去寒熱殺蛔蟲久服益氣不飢輕身一名馬苋一名莫實即馬齒
苋菜也治反花瘡
小苋菜味甘大寒无毒滑可久食益氣力除熱不可共鼈与蕨菜
食成癰瘕
邪蒿味辛无毒主至宿惡南中臭惡氣利腸胃
苦菜味苦大寒滑无毒主五藏邪氣歇胃痺腸僻大渴熱中暴
疾惡瘡久食安心益氣聰耳少臥輕身不老耐飢寒一名選一名

靜嘉堂文庫所藏

葵冬不死四月上旬採乾

氣和中殺諸毒其子主明目二痛其根主目瘡

蕪菁及蘆菔菜味苦冷瘡无毒主利五藏輕身益氣官久食

蕪菁子主明目久蒸暴却黃頑利小便久服神仙根主消風熱毒腫不可多食令人氣脹

菘菜味甘溫瘡无毒麦服通利腸胃除胷中煩解消渴本是蔓菁也種之即江南化為菘亦如枳橘所生土地隨変

芥菜味辛溫辛歸鼻无毒主除陰腎邪大破效逆下氣利九竅明耳目安中久食溫又云寒中其子味辛二亦歸鼻有毒主喉痺去一切風毒腫黃帝云芥菜不可共兎肉食成惡即病

苜蓿菜味苦平瘡无毒主安中利久四躰宜可久食之

荏子味辛溫无毒主效逆下氣溫中補髓其葉主調中去臭令氣九月採陰乾用之油亦可作油衣

蒜實味辛溫无毒主明目溫中解肌祛風寒下水氣面目浮腫去

雞冠其葉辛歸舌治大小腸邪氣利中益志黃帝云蒜食過多有毒發心痛蒜和生魚食之令人奪陰氣核子療痛求死二月勿食

蒜傷人腎扁鵲云蒜又食令人寒熱損骨髓殺丈夫陰氣少精

葱實味辛溫無毒宜肺辛歸頭主明目補不足其葉白皮平滑作湯主傷寒傷執骨肉痛能出汗治中風面目浮腫喉痺不通安胎其青葉溫辛歸目主除府中邪氣利五藏益目精根盲通毒及桂黃帝云食生葱即嗽蜜變作下利食煞葱并嗽蜜瘕氣而死正月不得食生葱令人面上起皰風薤味苦辛溫滑无毒宜心辛歸胃主金瘡久敗能生肌肉輕身不飢耐老菜之北除寒熱去水氣溫中散結氣利產婦病人諸瘡病中風久寒水腫生搗付之哽骨在咽不去者食之則去黃帝云雞不可共牛肉作羹食之成瘕疾韮亦然十月上月十月勿食生薤令人多涕唾

韮味辛酸溫瘡无毒辛歸心腹宜肝可久食安五藏除骨中熱不

靜嘉堂文庫所藏

利病人其心腹有固冷者食之必加劇其子主蠱泄精衆色白根
黃汁以養髮黃帝云霜韭凍不可生食動宿飲又盛必吐水出
五月勿食韭損人滋味令人多氣力
白棗荷味辛溫微温无毒主中蠱及瘧病搗汁服三合日二生
根主諸瘡
菘菜味苦大寒无毒主時行壯熱解風熱惡毒
紫蘇子味辛微温无毒主下氣除寒中惡氣
雞蘇味辛溫微温无毒主吐血下氣一名水蘇
羅勒菜味苦辛温溫平无毒主消停水散堅積氣不可久食濇榮衛
諸氣 ○蕪夷味辛平性热滑无毒主五内邪氣散皮膚骨節中
淫又温行毒去三蟲能化宿食不消逐寸白散腹中温又急痛者
名无姑名藪虞盛器物甚辟水蛭其氣甚臭化即山榆子作之
榆莢味甘平滑无毒王小兒痈小便不利傷暑熱困悶煮汁冷服
生榆樹白皮味甘冷主利小便破石淋花主小兒頭瘡

胡麥子味酸平无毒主消穀能食味葉不可久食之令人多忘華
恒云胡麥菜胡臭人患口氣臭憑齒人食之患加劇腹内患邪氣
者不得食加劇發病金瘡尤忌
海藻味鹹寒滑無毒主癭瘤結氣散頸下靭核痛者腸内上下
雷鳴下十二水腫利小便起男子陰氣
昆布味酸滑無毒主下十二水腫癭瘤結氣瘀瘡破積聚
同萬味辛氣勝平無毒主安心氣養脾胃消痰飲
白萬味苦辛平无毒主養五藏補中益氣長毛髮久食不死白兎
食之仙
吳葵甘名蜀葵味甘微滑无毒花主定心氣葉主除客熱利賜
胃不可久食鈍人志性若食之拔鉤齒者瘡永不差
藿香味辛寒温无毒宜腎主北大便數去煩熱
香菜味甘平微温主霍亂腹痛吐下散水腫煩心去熱
甜瓠味甘平滑无毒主消渴惡瘡鼻口中肉爛痛其葉味甘平

靜嘉堂文庫所藏

主耐飢扁鵲云患腑氣虛腫者不得食之其毒未不除
尊味甘寒滑无毒主消渴熱痺多食動痔病
落葵味酸寒無毒主滑中散熱寔說澤人面一名天葵一名�露
繁蔞味酸无毒主積年惡瘡痔不瘥者以灰用之扁鵲云丈夫患惡瘡陰頭及
滋草一名雞腸草乾之燒作灰用之扁鵲云丈夫患惡瘡陰頭及
葶藶瘡膿爛疼痛者不可忍久不差者以灰一分蚯蚓　出糞泥
二分以水少和研緩如似煎餅麵以泥瘡上乾則易之禁酒麵五
辛并熱食等黃帝云繁蔞要合鄭食者發消渴病令人多忘
戟味辛微温有小毒主蠷螋尿瘡多食令人氣喘不利人脚多食脚痛
葫味辛温有毒辛歸五藏主散癰疽治惡瘡除風邪殺虫氣獨子
者最良黃帝云生葫共青魚鄭食之令人腹內生瘡腸中腫又成
疝瘕多食葫行房傷肝氣令人面先色四月八月勿食葫傷人神
損膽氣令人喘悸脇肋氣急口味多爽
小蒜味辛温無毒辛歸脾腎主霍亂腹中不妄消穀理胃氣温中

除邪癘毒氣二月五日採暴乾葉主心煩痛解諸毒小兒不可久
食殺人心力黃帝云食小蒜傷人志性
月勿食小蒜傷人志性
茖味苦酸冷无毒可久食令人有力悅志微動氣黃帝云不可共
韭食令人身重
蕃荷菜味苦辛濇无毒可久食却腎氣令人口氣香絜主辟邪毒
除勞弊形瘦疲倦者不可久食動痔病
耳子味甘温葉微寒濇有小毒主風寒頭風濕痺四肢拘急孿
痛去惡肉死肌膝痛汗熱久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡
菜名地葵一名常思黃帝云戴甲者耳甲下之戒走注又患兩腸立秋後忌食之
甜瓠復以葉耳甲下之戒走注又患兩腸立秋後忌食之
食葉黃味辛大温无毒九月採停陳久者良其子閉口者有毒不
任用主止痛下氣除欬逆去五藏中寒中諸冷宜之不消其主白皮
主中惡止痛齒疼痛其根細者主去三蟲寸白黃帝云六月七月

靜嘉堂文庫所藏

勿食茱萸傷神起氣令人起伏氣主喉不通徹賊風中人口僻不能
言者取茱萸一升去黑子及合口者好豉三升二物以清酒和煑
四五沸取汁冷服半升日三得小汗差蟲蛀人齒茱萸封止
蜀椒味辛大热有毒主邪氣欬逆溫中下氣留飲宿食能使痛者痒〻
者痛多食令人乏氣失明主欬逆逐皮膚中寒冷去死肌濕痺痛
心下冷氣除五藏六府寒三百骨節中積冷大風汗自出者止下
利散風邪合口者害人黑子有小毒主下水仲景云熬用之黃帝
云十月勿食椒損人心傷血脉
乾薑味辛热无毒主胷痛欬逆上氣溫中止漏血出汗逐風溫痺
腸澼下利寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾
血生者尤良
生薑味辛微溫无毒辛歸五藏主傷寒頭痛去淡下氣通汗除鼻
塞欬逆上氣止嘔吐去胷鬲上臭氣通神明黃帝云九月九日勿
食薑傷人神損壽壷居士云薑殺腹內長蟲久服令人少志少

智傷心性聰智
胡荽味辛微溫无毒主除邪氣惡毒久食益脂氣強志其子主
泄精　董葵味苦工自毒久服除人心煩急動痰冷身重多懈
墮　芸薹味辛寒无毒主腰脚痺若舊中腰痛不可食必發
劇又治油腫用毒益胡臭解禁呪之輩出五蠱經
竹笋味甘微寒无毒主消渴利水道益氣力可久食
野苣味苦平无毒久食輕身少睡黃帝云不可共蜜食之作內痔
懷香菜味苦微寒濇无毒主霍亂辟熱除口氣臭其子主蛇咬
瘡久不差擣付之又治九種瘻
白苣味苦平无毒主益筋力黃帝云不可共飴食必作蟲
蕒菜味苦寒无毒主小兒大丹諸毒腫去暴熱也
藍菜甘平无毒久食大益填髓腦利五藏調六府壷居士云隴西
羌胡多種食之漢地少有其葉長大厚煑食甘美經冬不死春亦
有英其花黃生角結子子甚治人多睡

靜嘉堂文庫所藏

萹竹葉味苦濇平无毒主侵淫瘙疽痔殺三蟲女人陰蝕痛
鵲云者炙汁与小兒服治蛔蟲
斷菜味苦酸冷濇无毒主益筋力去伏熱治五種黃病生搗絞
汁冷服一升日二黃帝云五月五日勿食一切菜發百病凡一切
菜熟者皆熱食時病差後食一切肉并蒜食竟行房病發必死時
病差後未得食生青菜者手足必青腫時病未健行房病更發必死
十月勿食被霜菜令人面上无光澤目濇痛腰疼或致心瘧瘧發
時手足十指爪皆青困瘵

米食部第四

薏苡人味温无毒主筋拘攣不可屈伸久風濕痺下氣久服輕身
益力其生根下三蟲名醫云薏苡人除筋骨中邪氣不仁利腸胃
消水腫令人能食一名薏一名感米蜀人多種食之
胡麻人味甘平无毒主傷中虛羸補五內益力長肌肉填髓腦堅
筋骨金瘡止痛及傷寒温瘧大吐下後虛熱困乏久服輕身

不老明耳目耐寒暑延年作油微寒主利大腸產婦胞衣不落生
苔擘瘡腫生毛髮去頭面游風一名狗虱一名才芦一名鴻藏
葉名青蘘主傷暑熱花主生毛髮七月採最上採頭者陰乾
用之　白油麻子味甘平无毒宜肝主補中益氣脾健不老治
中風汗出逐水利小便破積生毒腫復血脉產後乳餘疾能長
髮可為沐藥久服神仙　粳味甘微温无毒主補虛冷益
氣力止腸鳴困痛除煩無血却冷嗽　大豆黃卷味甘平无毒主
久風濕痺筋攣膝痛除五藏胃氣結積益氣止毒去黑志
面黑潤皮毛宜腎　生大豆味甘冷无毒生搗涓酢和付之治
一切毒腫并煮汁冷服之殺鬼毒逐水脹除胃中熱却風痺傷
中淋露瘀血散五藏結積內寒殺鳥頭三建解百藥毒不可
久服令人身重其　熬豆味甘温平无毒主胃中熱去身
腫除痺消穀止脹九月採黃帝云服大豆末者忌食豬肉炒豆
不得与一歲以上十歲已下小兒食之肩嗽豬肉炒豆擁氣死

靜嘉堂文庫所藏

赤小豆味甘鹹平冷无毒主下水排癰膿血一名赤豆不可久服令
人枯燥　青小豆味甘酸温平濇无毒主寒熱〻中消渇止泄
利〻小便除吐逆卒澼下腹脹満一名麻累一名胡豆黄帝云青
小豆合鯉魚鮓食之令人肝黄五年成乾瘠病
大豆豉味苦甘寒濇无毒主傷寒頭痛寒熱辟瘴氣悪毒煩
躁満悶虚労喘吸兩脚疼冷殺六畜胎子諸毒
大麦味鹹微寒滑无毒宜心主消渇除熱久食令人多力健行
蘖温主消食和中熬末令赤黒擣作麨主止泄利和清酢漿服
之日三夜一服　小麦味甘微寒无毒養肝主去客熱止
煩咽燥利小便止漏血令女人孕必得男作麴六月作者温無
无毒主小児癇食不消下五痔蟲平胃氣消穀止利作麪温
无毒主消熱止煩不可多食長宿癖加客氣
青粱米味甘微寒无毒主胃痺熱中除熱渇止泄利止小便
益氣力補中軽身長年　黄粱米甘平无毒主益氣和中止

泄利人呼為竹根米又却當風臥濕寒中者　白粱米甘微寒无
毒主除熱益氣　粟米味鹹微寒无毒主養腎氣去胃痺
熱中益氣陳粟米苦寒无毒主胃中熱消渇利小便
黍米味苦微温无毒主欬逆上氣霍乱止泄利除熱去煩渇黄
帝云五種黍米合葵食之令人成固疾又以脯腊著五種黍米
中藏儲食之云令人閉氣　陳廩米味鹹酸微寒无毒主除
煩熱下氣調胃止泄利黄帝云久藏脯腊安米中満三月人不
知食之害人　蘗米味苦微温无毒主寒中下氣除熱
秫米味甘微寒无毒主寒熱利大腸治漆瘡
酒味苦大熱有毒主殺百邪悪氣黄帝云暴下後飲酒者膈
上變為伏熱食生菜飲酒莫炙腹令人腸結扁鵲云久食飲酒者
腐腸爛胃潰髓蒸筋傷神損壽醉當風臥以扇自扇成悪
風醉以冷水洗浴成疼痺大醉汗出當以粉〻身令其自乾
發成風痺常日未設食訖即莫飲酒終身不乾嘔飲水及酒

靜嘉堂文庫所藏

成瘕癖　菉豆味甘微温无毒主益氣安中補利胃主霍乱
吐下不止　稷米味甘平无毒主益氣安神補虚和胃宜脾
白黍米味平温无毒宜肺主補中益氣不可久食多熱令人煩
糠米味辛苦平无毒主心煩断下利平胃氣長肌肉温中　云
生者冷熱者熱　糯米味苦温无毒主温中令人能食多熱難
大便　酢味酸温无毒主消癰腫散水氣殺邪毒鴿鴿云多
食酢損人骨能里諸藥消毒熱　鹽味鹹无毒主殺鬼蠱注
毒氣下部暨傷寒熱能吐胷中濕辟止心腹卒痛堅肌骨不可
多食傷肺令人多瞋黒損肝力鴿鵲云鹽能除一切大風疾痛
者炒熨之黄帝云食甜粥音食鹽即吐或成霍乱　喬麥味有
微寒无毒食之難消動熱風其葉生食動刺風令人身痒黄帝云
作麵和猪羊肉熱食之不過八九頓作熱風令人習顛落

鳥獸部第五

人乳汁味甘平无毒主補五藏令人肥白悦澤

馬乳汁味辛温無毒主止渴
牛乳汁味甘微寒無毒主補虚羸止渴
羊乳汁味甘微温無毒主補寒冷虚乏少血色令人熱中
驢乳味酸寒一云大寒無毒主大熱黄疸止渴
馬生羊駱味甘酸微寒無毒主補肺藏利大腸黄帝云食胡駱音
即食大酢者癰疽作血澼又衆血華他云馬生羊駱蛆蜒入耳者治療
之即出　沙牛及白羊酥味甘微寒無毒主除習中客氣利大小
腸云治口瘡　石蜜味甘平微寒無毒主心腹邪氣驚癎痙
安五藏治諸不足益氣補中心腹痛解諸藥毒除衆病和百藥
養脾氣消心煩食不下止腹澼去肌中痛治口瘡明耳目久服強
志輕身不飢耐老延年神仙一名石飴白如雪者良其令諸山中
崖亂蜜也青赤蜜味酸噉也食之令人心煩去蜂黒色似蚤
臘密味甘微温無毒主下利膿血補中續絶傷隳金瘡益氣力不
飢耐老　白色臘主久泄澼差音後重見血者補絶傷利小兒

靜嘉堂文庫所藏

久服輕身不飢生於蜜旁或木石上惡黃花一曰合此則今所用
臘也黃帝云七月勿食生蜜令人暴下發霍亂
熊肉味甘微寒微温無毒主風痺筋急五緩若腹中有積聚
寒熱羸瘦者食能治病永不除其脂味甘微寒治法与肉同又去頭
瘕白禿面黯黑食飲嘔吐久服強志不飢輕身長年黃帝云一切
諸肉莫不熟熟生熟者食之成瘕能殺猪二種脂不可作燈其烟
氣入人目失光不能遠視
鴈肪味甘平無毒主風蠻拘急偏枯血氣不通利肉味甘平無毒
久服長髮髭鬚眉益氣不飢輕身耐暑黃帝云六月勿食鴈鵝傷
人神氣
鵝羊角味酸苦温微寒無毒主青盲明目殺蛊蟲止
寒泄心悲驚悸除百邪中結氣及風產蠱毒吐血者婦人產後餘
痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身勿令中溼有毒髓味
甘温無毒主男子丈夫傷中陰陽氣不足却風熟止毒利血脈益
經氣以酒和服之可久服不損人
青羊膽汁冷無毒主諸瘡

能生人身脉治清盲明目肺平主補肺治嗽止汗多小便者傷中
心虛補不足去風邪青羊肝主補肝明目主心憂悲鬲中逆腎氣
虛弱益精髓頭骨主小兒驚癎者以浴之婦肉平主丈夫五勞
七傷肉味苦甘太熱無毒主緩中止痛產乳餘疾及頭腦中大風
汗自出虛勞傷寒冷能補寒弱為安心止驚利產婦不利時
患人頭肉平主風眩瘦疾小兒驚癎丈夫五勞其骨執主虛勞寒
中其宿有熱者不可食生肺主止下利脫肛去風毒婦人產後腹
中絞痛肝主胃及治虛羸小便數止虛汗黃帝云羊肉共鮓食
之傷人心亦不可共生魚酪和食之害人凡一切羊歸甲中有珠
子白者名羊懸筋食之令人瘨白羊黑頭食其腦作腸癰羊肚共
飯常食炙之成反胃作痟病甜粥共羊肚食之令人多唾吐清
水羊腦猪腦男子食之損精氣少子若欲食者研之如粉和醋食
之仍不妒不食住青羊肝和小豆食之令人目少明一切羊肝生
共椒食之破人五藏傷心最損小兒弥忌水中柳木及白楊木不

靜嘉堂文庫所藏

得銅器中者殺羊肉食之丈夫損陽子絶陰暴下後不止合羊
髓及骨汁成煎熟難退動利六月勿食羊肉傷人神氣
沙苄髓味甘温無毒主安五藏平胃氣通十二經脉理三膲温骨
髓補中續絶傷益氣力止泄利去消渇皆以清酒和煖服之肝
主明目膽可丸百藥味苦大寒無毒主除心腹熱渇止下利去口
焦燥益目精心主虚妄腎生去濕痺補腎氣益齒主小兒小精羊
癇肉味甘平無毒主消渇止唾涎大安中益氣力養脾胃氣不可
常食發宿病自死者不任食
牛牛酥味甘平無毒主去諸風濕痺除熱利大便云宿食
醍醐味甘平無毒主補虚去諸風痺百練乃佳甚去月蝕瘡瘍
髓補中填骨久服增年
黄犍沙牛黒牯沙牛尿味苦辛微平無毒主水腫腹脚俱滿者
利小便黄帝云烏牛自死北首者食其肉害人一切生蟲熱瘕卒
死者捴不任食食之作腸癰患牛腳食其蹄中拒筋令人作肉
刺患疥牛馬肉食令人身痒牛肉共猪肉食之必作寸白蟲直尔
黍米白酒生牛肉共食亦作寸白大忌人下利者食自死牛肉必
劇一切牛馬乳汁及酪共生魚食成魚瘕六玄胂人一生莫食十
二月勿食牛肉傷人神氣牛喉嚨主小兒啤馬心主喜忘腑主寒
熱小兒尪羸萎肉味辛苦平冷無毒主傷中除熱下氣長筋強腰令
壯健強志利意輕身黄帝云白馬自死食其肉害人白馬玄顙食
其腦令人瘨白馬鞍下烏色徹肉棗者食之傷人五藏人下利者
食馬肉必加劇白馬蹄肉不可食一切馬汁氣及毛不可入食中
害人諸食馬肉心煩悶者飲以麦酒則解白酒則劇五月勿食馬
肉傷人神氣野馬陰莖味鹹温無毒主男子陰萎少精者肉立平
無毒主人馬癰筋脉不能自收風痺肌不仁病死者不任用
驢肉味酸平無毒主風狂愁憂不樂能安心氣病死者不任用其
狗陰莖味酸平無毒主傷中丈夫陰莖不起狗腦主頭風痺下部
頭燒却毛煮取汁以浸麹釀酒甚大動風不休

靜嘉堂文庫所藏

憑瘡瘡中息肉肉味酸鹹温無毒宜腎主安五藏補絶傷勞損乏
病人虛者服之輕身益力黄帝云白犬自死不出舌者食之害人犬春月多狂若鼻赤起臭爛者此
欲狂其肉不任食九月勿食犬肉傷人神氣
丹雄雞肉味甘微温無毒主女人崩中漏下赤白補虛温中能愈
九傷之瘡不肯差者通神殺惡毒
黄雌雞肉味酸醎平無毒主傷中消渴小便數而不禁者腸澼泄
利補益五藏絶傷五勞益氣力雞子黄微寒主除熱火灼爛瘡痤
可作琥珀神物卵白汁微寒主目極赤痛除心下伏熱止煩滿欬
逆小兒泄利婦人産難胞衣不出生吞之
白雄雞肉味酸微温無毒主補中心痛
烏雄雞肉味甘温無毒主除風寒濕痺五緩六急安胎黄帝云一
赤雌雞肉味甘平無毒主傷中消渴
切雞肉合魚肉汁食之成心瘕雞具五色食其肉必狂若有六指

玄雞白頭家雞及野鳥生子有文八字雞及野鳥死不申足瓜此
四種食之害人雞子白共蒜食之令人短氣雞子共鼈肉烝食之
害又雞肉共獵肉共食作遁尸注藥所不能治食雞子噉生葱變
成短氣雞肉犬肝共食害人生葱共雞犬肉食令人氣滿遂終身流
血烏雞肉合鯉魚食生癰疽犬肉和食必泄利野雞肉亦令雞肝
食成遁尸鬼纏身四肢百節疼痛小兒五歲已下飲乳未斷者
勿食雞肉二月勿食雞子令人常惡心丙午日食雞雉肉丈夫燒
死目盲女人血死立見四月勿食暴雞肉作肉疽腎腋下出漏孔丈
夫少陽婦人絶孕虛勞之氣八月勿食雞肉傷人神氣
鹿頭肉平主消渴多夢恣生血治癰腫筋主勞損歸肉味平主腳
膝髓骨疼痛不能踐地骨主肉虛續絶傷滿骨可作酒髓味甘温
主丈夫婦人傷中脉絶筋急痛欬逆以酒和服腎平主治腎氣肉
味苦温無毒補中強五藏益氣力肉生者二中風口僻一不正細細
剉之以薄僻上華他云和生椒揚薄之使人尊看之正即急去之

靜嘉堂文庫所藏

不爾復蹇尚不僻處黃帝云鹿膽白者食其肉令人殺亡鹿肉不
可和蒲白作羹食發惡瘡五月勿食鹿肉傷人神氣胡居士云
鹿性驚烈多別良草常食九物餘者不嘗群處必依山岡產歸
下澤饗食神用其肉者以其性烈清淨故也凡餌藥之人不可食鹿
肉服藥必不得力所以然者以鹿常食解毒之草是故能制散諸
藥故也九草者葛葉花鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山倉
耳薺苨鹿角散錯取一升末白蜜五升攪之微火熬令小變色暴
乾更末服方寸匕日三令人輕身益氣力強骨髓補絕傷
麞骨微寒無毒主虛損泄精肉味甘溫無毒主補益五藏髓主
益氣力悅澤人面黃帝云五月勿食麞肉傷人神氣
虎肉味酸無毒主惡心欲嘔者益氣力止多唾不可熱食壞人齒
虎頭骨治風邪虎眼睛主驚癇鬼勞夢
豹肉味酸溫無毒主補中輕身益氣亦治諸注黃帝云正月勿食
虎豹貍肉傷人神損壽

兔肝主目闇肉味辛平無毒主補中益氣止渴黃帝云兔肉和獺肝
食之三日必成遁尸共白雞肝心食之令人面失色一年成疸黃
共薑食變成霍亂共白雞肉食之令人血氣不行二月勿食兔
肉傷人神氣　雉肉味酸微寒無毒主補中益氣止泄利久食
之令人瘦觜生蟣黃帝云八月建酉日食雉肉令人短氣八
月勿食雉肉損人神氣　白鵝脂主耳聾消以灌耳主射工
水毒肉味平利五藏　鶩肪味甘平無毒主風虛寒熱肉主
補虛乏除客熱利藏腑及水道黃帝云六月勿食鶩肉傷人神氣
鴛鴦肉味苦微溫無毒主瘻瘡清酒漬之炙令熱以薄之亦炙服
之治夢思慕者黃帝云龜鼈目凹陷者不可食之害人秋果菜共龜肉
食之令人短氣飲酒食龜肉并菰白菜令人生寒熱六甲日勿食
龜鼈黿及鱓魚之肉害人心
螺蚌共菜食之令人心痛三日一發蝦鱠共豬肉食之令人常惡心
多唾損精色蝦無須腹下通烏色者食之害人大忌勿輕十二月勿

靜嘉堂文庫所藏

食蝦蟆著甲之物十一月勿食之三月食之令人臭腫成水病作頭眩丈夫陰萎女
鼈肉甘平無毒主傷中益氣補不足黃帝云五月五日不以鼈子
共鯢魚子食之作瘕黃鼈腹下成王字不可食鼈兔肉和芥子
醬食之損人鼈三足食之害人鼈目凹者不可食鼈共莧菜食之作鼈瘕害人
蟹味酸寒有毒主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠其
黃解結散血愈漆瘡養筋益氣黃帝云蟹目相向足斑者食之害
人十二月勿食蟹損人神氣
㯽脯味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒熱風寒濕痹四肢拘攣不
收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近男子陰萎令一云官茹十月取
黃帝云生㯽兔肉共蝦汁食之令人心痛生㯽兔肉共雉肉食作固疾
豘味寒無毒主陰莖中痛並驚癇鬼氣蠱毒除寒熱賁豘
平無毒主五癃邪氣攣縮一名豘顛陰乾勿令敗豘肉味辛平有
小毒不可久食令人身體筋肉碎痛之氣
大豬後腳懸蹄甲無毒主五痔伏在腸中腸癰內蝕取酒浸半日
炙焦用之大豬四蹄小寒無毒主傷撻諸敗瘡母豬蹄寒煮汁服
之下乳其解石藥毒大豬頭肉平無毒主補虛乏氣力去驚癇鬼毒
熱五痔腦主風眩心平無毒主驚邪憂恚虛悸氣逆女人産後
中風聚血氣驚恐腎平無毒主除冷利理腎氣通膀胱肝苦平無
毒主明目豬喙微寒無毒主凍瘡痛癢者肚微寒無毒主補中
益氣止渴斷暴利虛弱者腸微寒無毒主消渴小便數者補下焦
虛竭其肉間脂肪平無毒主煎諸膏藥破冷結散宿血解斑猫元
青毒大小猪洞腸平無毒主洞腸挺出血多者豭豬肉味苦微酸冷無
毒主狂病多日不愈凡豬肉味苦微寒宜腎有小毒主補腎氣
虛竭不可久食令人少子發宿病弱筋骨閉血脈虛人肌有金
瘡者食之瘡尤甚豬血平澀無毒主卒下血不止美清酒和炒
服之又主中風絕傷頭中風眩及諸淋露賁豘暴氣黃帝云凡
豬肝肺共魚鱠食之作癰疽豬肝共鯉魚腸魚子食之傷人神
豘腦損男子陽道臨房不能行事八月勿食豬肺及飴和食之

靜嘉堂文庫所藏

令人交發疸十月勿食猪肉損人神氣
母猪乳汁平無毒主小兒驚癎以飲之神妙甚驗
越燕屎味辛平有毒主殺蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便
熬香用之治口瘡肉不可食之入水爲蛟龍所殺黃帝云十一月
勿食鼠肉燕肉損人神氣鼠肉味甘温無毒主踒折續筋骨擣
薄之三日一易　獺肝味甘有小毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久
嗽皆燒作灰酒和服之肉味甘温無毒主時病疫氣牛馬時行病
皆煮取汁冷服之六畜亦灌之　狐陰莖味甘平有小毒主女子絕子
陰中痒小兒陰㿉卵腫肉并五藏及腸肚味苦微寒有毒主蠱毒
寒熱五藏固冷小兒驚癎大人狂病見鬼
蝮蛇肉味平有毒主釀酒去癩疾諸九瘻心腹痛下結氣除蠱中毒
天鼠味平有小毒主鼠瘻　石蠶雄蛾温有小毒主益精氣強陰
男子陽道交接不倦甚治泄精不用相連者
鱓魚味甘無毒主百病　鰻鱺魚味甘大温有毒主五痔瘻瘡

殺諸蟲　鯉魚肉甘大温黑者無毒主補中養血治瀋唇五月
五日取頭骨燒服止久利　鱓（徒河反）魚平無毒主少氣吸吸足不
能立地黃帝云四月勿食蛇肉鱓肉損神害氣
烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛
寒熱癥瘕無子驚氣入腹痛環臍者丈夫陰中寒令人有子肉
味酸平無毒主益氣強志　鯉魚肉味甘無毒主欬逆下氣癉
黃止渴黃帝云食桂竟食鯉魚肉人腹中宿癥病　百食鯉魚肉害
人　鯽魚味甘平無毒主一切瘡燒作灰和醬汁付之日二又去
腸癰黃帝云魚白目不可食之魚有角食之發心驚害人魚無腸
膽食之三年丈夫陰痿婦人絕孕魚有黑點不可食魚目赤作鱠
食成瘕病作鮓食之害人一切魚共菜食之作蛔蟲蟯蟲一切魚
尾食之不益人多有勾骨著人咽肉魚有角白背不可食凡魚赤
鱗不可食魚無腮不可食之魚頭全腮食之發癰疽鯆魮魚不益
人其尾有毒治齒痛鯸鮧魚有毒不可食之二月庚寅日勿食

魚忌五月五日勿食鯉魚子共猪肝食必不消化成悪病下利
者食一切魚必加劇致困難治一飯鰱魚肉臭魚不可合食之
三月勿食鮫龍及一切魚肉令人飲食不化發宿病傷人神損血
失氣洗物黄帝云麝肉共鵠肉食之作癰瘕一切禽獸自死無傷
勲不可食野猪青蹄不可食鳥及獸赤足者不可食野獸自死共
首伏地不可食獸有歧尾不可食家獸自死共鵝汁食之作疽瘡
飛鳥投人不肯去者口中必有物開看無者拔毛放之大吉甲
子日勿食一切獸肉大吉三月三日勿食鳥獸五藏及一切果菜
五辛大吉

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏

十二

134
24
4 10

静嘉堂文庫所蔵

靜嘉堂文庫所藏

丁腫方第一　癰疽方第二　發背方第三

丹毒方第四　瘰疬方第五　瘭疽方第六

丁腫方第一

猛康曰飡歲多病飢年少疾信哉不虛是以關中土地俗好儉畜厨膳蔬餚不過葅醯而已其人少病而壽江南嶺表其処豐饒海陸鮭肴无所不備士俗多疾而早夭北方士子遊官至彼遇其豐贍以為福祐所臻是以尊卑長幼恣口食噉夜長醉飽四體熱悶亦露眠臥宿食不消未踰旬月大小皆病或患霍乱脚氣脹滿或寒或熱瘧痢惡疰丁腫或癰疽痔漏或偏風偏腿不知醫療以至於死凡如此者比肩皆是不雅云不集水土都不知病之所由尽言思之可為患者也學者先須識此以自誡慎故此一卷存於攝養預防不逮耳○一麻子丁其狀肉起頭如黍米色稍黑四

邊微赤多痒忌食麻子及衣麻布并入麻中行。二石丁其狀皮肉相連黑如黑豆青硬刺不入肉隱々微疼忌瓦礫塘石之屬。三雄丁其狀麁頭稍黃向裏窠亦似衣瘡也忌房。五火丁其狀似火瘡頭黑四邊有煙燄衆皮如赤粟米忌灸及火烙。六爛丁其上稍黑有白班瘡中有膿水形大小如鼈面忌熱食爛物。七三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生三三及至十若滿三十六藥所不能治不滿三十六可治黑麁忌瞋怒畜積恨等。八蛇眼丁其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大躰硬忌瞋怒惡眼人見之及婦女人見。九蝕膚丁其狀大如鼈面偏瘡皆赤有黑粟粒起忌飢食。十水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑窠汁出中偏忌忿飲漿水洗渡河等

十一刀鎌丁其狀瘡如雞葉大長一寸左側肉黑燒鑠忌刺及刀鎌切割之。十二浮漚丁其瘡瘢曲真少許不合長而狹如雞葉大肉黃乃黑曲處刺不痛肉黃處刺之則痛。十三牛拘丁其狀肉色摘不破

右一十三瘡初起先痒後痛先寒後熱々定則寒多四肢沉重頭痛心薀眼花若大重者則嘔逆逆者難治其麻子丁一種如未唯痒所録忌縱不療不能殺人其狀寒熱与諸丁不同皆以此方療所禁忌縱不療不能殺人其狀寒熱与諸丁不同皆以此方療之乃不失一欲知犯狀但脊強瘡痛極甚不可忍者是也療之用枸杞其藥有四名春名天精夏名枸杞秋名却老冬名地骨皮春上建日採葉夏上建日採莖秋上建日採子冬上建日採根名曰地骨皮凡四時初逢建日取枝葉根子等四味並曝乾若得五月五日午時合和大良如不得依法採者但得一種亦得用緋繒一手帕裹藥取四為限亂髮雞子大牛黃梧子大灸令辣針二十七粒末小豆七粒末

右先於緋十一薄布亂髮上即和緋卷作貝以

靜嘉堂文庫所藏

髮作繩十字縛之熨斗中急火熬之沸定自乾即刮取作末絹
篩以方寸一匕取枸杞四味擣絹篩取二匕和合前一匕共為
三匕令相得又分為二分平朝空腹以酒服一分
治凡丁腫皆用之此名齊州榮婆方
白殭蚕壹兩半黄者 牡礪玖兩燒 枸杞根皮貳兩 鍾乳二兩
白石英壹兩 桔梗壹兩半
右六味各擣末秤之合和令調先取伏龍肝九升以清酒一斗
貳升攪令溫溫然澄取清二升和藥末捻作餅子闊六分厚二
分其濁滓仍置盆中布餅子於龍上一張紙藉盆上以泥酒氣
蒸之仍數攪令氣散發經半日藥餅子乾乃内瓦坩中一重紙
一重藥綿布勿令相著密以泥封三七日乾以紙袋貯之乾仍
著之用法並如前方其二方本是一家者評論以後方最是直一
本其病通忌酒肉五辛及芸薹胡荽油麪生冷等
其後方
殭石伍兩 牡礪拾兩 枸杞根皮四兩 茯苓参兩
右四味各擣篩和先取新枸杞根切六升水一斗半煎取五升
去滓内苟屎五升攪令調澄令清和前擣捻作餅子陰乾取兩
刀針當頭直刺瘡痛徹拔出刮取藥末塞孔中拔針出即内
藥勿令歇氣并封瘡頭上即復起針挑根出重者半日已上即
出或以消爛挑根不出亦自差其病在内者外當有腫相應並
皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞刮取藥如梧桐子大五枚和
服之日夜三度服即自消也若須根出服藥經一日以雞羽剔
吐即隨吐根出若不出根亦自消爛在外者亦日夜三度傳藥
根出後常傳勿住即生肉易差若犯者取苟杞根切三升水五
升煎取二升去滓研藥末一錢匕和苟杞汁一盞服之日二三
服并單飲苟杞汁兩盞彌佳又苟杞汁攪白苟屎取汁服之更
良所言白狗屎是狗食骨其屎色如石灰直言狗白屎也如預
造取五月五日七月七日九月九日臘月臘日造者尤良神驗

靜嘉堂文庫所藏

或有人忽患喉中痛亦寒亦熱或腹中痛亦寒發熱者並是其病但依前服之立差

凡丁腫單方此病忌見麻勃見之即死亦不得入麻中行方

胡麻　燭烬　針沙　各等分和醋以傅之

又方　針刺四邊及中心塗雄黃立可愈神驗

又方　擣馬齒菜搗　石灰三分　雞子白和傅之

又方　鼠新望土和小兒屎傅之。又鐵衣末和人乳汁傅之可

又方　以人屎尖傅之立差

又方　以四神丹一枚當頭心經宿即根出矣

治魚膾丁此瘡似新灸針瘡四邊赤中央黑色可針刺之若不大

痛即殺人方

以臘月魚頭灰和髮灰等分以雞漉屎和傅上此瘡見之喜可

而能殺人又以寒食麪傅之良

治魚膾瘡其頭白似腫痛不可忍者方

先以針刺瘡上四畔作孔揭白豆取汁滴孔內又用水懶屎不

之大良

治赤根丁方

熬白粉令黑蜜和傅之良又以新望鼠壤水和塗之若又揭馬

牙齒末臘月豬脂和傅之拔根出

犯丁瘡方

燕菁根　鐵生衣

右各等分和搗以大針刺作孔復剉燕菁根如針以前鐵生

衣塗上刺孔中訖驗者封上仍以方寸匕綿裹塗帖上有膿出

易之須臾拔根出立差忌油膩生冷醋滑五辛陳臭粘食

又方　刺瘡頭又四畔令汁極出搗生乘黃傅上以麪圍之勿令

黃出從旦至午拔根出

又方　取蛇蛻皮加雞子大以水四升煮三四沸去滓頓服差

又方　取蒼耳苗搗取汁一二升飲之滓傅上立差

靜嘉堂文庫所藏

又方治一切丁腫
蒼耳根莖苗但取一色燒為灰醋泔淀和如泥塗上乾即易之不過十度即拔根出神良

論曰臣以貞觀四年忽口角下生丁腫遂告甘子振母為帖藥經十日不差臣以此藥塗之得愈已後常作此藥以救人無有不差者故錄之以傳後嗣也丁腫方乃有千首皆不及此方齊州榮姥方亦不及之也

又方　取鐵漿每飲一升立差又麪和臘豬脂封上立愈

又方　蒺梨子一升燒為灰釅醋和封上經宿便差或針頭封上更佳

又方　皂莢子取人作末傳之五日內差

貞觀初醫博士徐使君訪得治丁腫人韓元文蓄稽燒作灰濃作竹筒中淋取六合汁石灰如麪和煉以針刺瘡中至痛即點之如前法亦大神驗貞觀中治得三十餘人故錄之

論曰凡療丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令無血出去血傅藥藥氣得入針孔中若不達裏療不得力又其腫好著口邊頰邊及下著之亦是如珠子磣痛應心是也是寒毒久結作此疾不即療之日夜根長流入諸脈如箭入身捉不得動搖若不慎之味房室便死經五六日眼中見火光心神惛昧即死也

癰疽方第二

脈數身無熱即內有癰　諸浮數脈當發熱而皮洗洗惡寒若有痛處當結其癰　脈微而遲必發熱脈弱而數此為振寒而發癰腫　脈浮而數身無熱其形嘿嘿胃中微燥不知痛處其人當發癰腫　脈滑而數滑則為實數則為熱滑即為榮數即為衛榮衛相逢即結為癰　熱之所過即身射有腫或苦處有瘡

夫癰疽初發至微人不以為急此實奇患唯宜速治若療相遲乃即病成遂致禍者不一但發背外皮薄為癰外皮厚為疽宜急治之

○夫癰壞後有惡肉者宜豬蹄湯洗之次傅食肉膏散惡肉盡後傅生肉膏散及摩四邊令好肉速生當斷房室忌風冷勞煩

靜嘉堂文庫所藏

縁新肉易傷〻則裏潰〻則重發〻則難救也
凡癰疽始發或似小癤或復大痛或小痛或發口如米粒或白膿此皆微候宜善察之見有小異即須大熇急須攻之勿令斷口味速服諸湯下去熱毒若无心処即當頭灸之若重者四面中央總灸三百壯復帖冷藥必須速焉
凡用藥帖皆當瘡頭処其藥開孔令泄熱氣亦以當頭大針〻入四分即差或身中忽有痛処狀似打名曰氣痛不可忍遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬時受温氣至春暴寒風來折之不成温病宜先服五香連翹湯并摩丹參膏又以白酒煎楊柳皮煖熨之有赤點〻者即刺出血也其連翹湯及竹瀝湯可服數剤勿以一劑取差便住以言无効即禍至凡諸暴腫一〻不同无問近遠皆服五香湯刺去血小豆末傅之其間數〻刺去血若失療已潰乱者猶服五香及漏芦湯下之外以升麻散搨洗熨之摩升麻膏若生息肉者以白䕡茹散傅之青黒肉去尽即停之好肉生傅升麻膏如肌不生傅黄耆散若傅白䕡茹青黒悪肉不尽者可以漆頭䕡茹散半匁匕和三匁〻白䕡茹散傅之稍〻安之其散各取當色單搗篩之直不成散用之素問云氣宿於經并血澀不行擁結為癰疽也不言熱之所作其後成癃又陽氣湊集寒化為熱〻盛則肉腐為膿宜以醋和蚌蛤灰塗之乾易之差止
○凡腫根廣一寸名癤一寸已上名癰如豆粒者名疱子皆始作急服五香連翹湯下之數剤取差乃止
凡癰高而光不大熱其肉内正元異而紫者不須攻之以竹葉黄耆湯甲其氣耳癰卒痛以八味黄耆散傅之大癰七日小癰五日其自有堅強者發背及發乳若熱手不得近者先内服王不留行散外摩發背膏若背生破无苦在乳宜令極熟候手按之隨手即起者熟也須針之令著膿以意消息胸背不過一寸斟量不得膿即与食肉膏散著兊頭内癰〻中如鮮氣動歇即服木占斯散五日後癰欲差者即服排膿内塞散

凡癰破之後便綿綴欲平復者當以手按腫上无所
連乃是風毒耳勿針之令塞如不痛破壞後不差者作豬蹄湯洗之更
分近下一勺針之令塞如不痛破壞後不差者作豬蹄湯洗之更
用二日冬用七日或胷中有結癰若不痛氣者當入閤室中以左手捺眼視
若見光者胷中有結癰若不痛氣者是癰疽內發也
凡右件氣痛先服五香湯傳丹參膏數劑後及次服小竹湯
中間逐空服白薇散以次第療之有氣腫痛其狀如癰元頭虛
腫色不變但皮急痛不過手近亦消服之五香湯為之次与蔗梨
散傳之方在單方中

漏芦湯方

漏芦　白蘞　黃芩　麻黃　白微
枳殼　芍藥　甘草　大黃略三
右以水一斗煮取三升分三服快下之无藥処單用大黃下之
五香湯主數毒氣奔腫結作核或以癰癤而非使人頭痛寒熱

氣急者數日不除殺人方

青木香　薰陸香　丁香　沉香　薰陸香略一

右以水五升煮取二升分三服不差更服之

連翹五香湯主一切惡核黑癰疽腫方

連翹　木香　沉香　薰陸香　夜干
升麻　獨活　寄生　通草　麝香
丁香略貳　大黃參兩

右以水九升煮取四升內竹瀝二升更煮取二升分三服快利

丹參膏方

丹參　葫蘆各三兩　芎藭　椒　鼯鼠矢貳分
獨活　白及　牛膝　菊花　烏頭　防巳略壹

右一劑細剉醋二升浸一宿夏半日如急要便煎之豬脂四升
煎令醋氣散慢火煎之去滓用傅患上日五六度

氣痛小竹瀝湯方

靜嘉堂文庫所藏

淡竹瀝一升　夜干
术　防風　杏人　獨活　枳殼
茵芋　伏苓　秦膠　芍藥　甘草
右以水九升煮取半下瀝煮取三升分四服

白微散方
白微　防風　夜干　术各六分　當歸
防已　青木香　天門冬　烏頭　枳殼
獨活　山茱萸　菱蕤各四　麻黃　柴胡
白芷各三　茵草　秦膠伍分
右為散以漿水服方寸匕日三加至二匕
療癰腫不潰困无情賴令安穩方

龍骨　當歸　桂心各四分
治葛皮半分　括蔞半分　王不留行陸合
右為散温酒服方寸匕日二不煞膿自潰即差瘡癒平復神

良浩仲堪所用此方
又八味黃耆散傳之方

芎藭　大黃　黃連　芍藥　茵草
黃芩　黃耆各二拾兩
右為末雞子白和如泥傳之隨腫大小傳之乾易之若已開口
封瘡上須開頭令散氣
治久癰瘡敗後及骨疽方
右末龍骨粉猪四面厚二分以膏著瘡中日一易之虫出如髮
用膏方　大蝦蟆一枚自死者　亂髮一兩　豬脂一斤
内三味肉中和煎微消却下鑷待冷更内塩一合攪和充前用
烏麻膏主諸漏西瘡一十三般丁腫五色遊腫癰癤毒熱狐刺
蛇毒狂犬虫狼六畜所傷不可識者二十年漏金瘡中風皆以此
膏帖之惡膿盡即差止痛生肌一帖不換藥唯一日一度拭去膏
上膿再帖之以至差乃止

靜嘉堂文庫所藏

生烏麻油壹升　黃丹　蠟四分㕮咀
以腊日前一日徙午內油銅器中微火煎之至明旦看油減一
分下黃丹消盡不得見之令冷成至午時下之惟男子合之小
兒女人六畜不得見之

治諸腫紫葛帖之方

紫葛　大黃　白斂　玄參　黃芩　黃連
升麻　榆白皮　由政　赤豆　青木香各一兩
右擣為末以生地黃和如泥傳腫上乾易之死地黃汁一升酷

和之

又帖膏方

松脂一斤　大黃醋漬　豬脂半斤　細辛　防風
黃芩　芎　白斂　當歸　白芷
芍藥　茵蕳　黃蘗　黃連各半兩　白蠟肆兩
右十五味細切先煎脂臘令洋乃內諸藥三上三下絞去綿及
布以著水中為餅取少許火炙之油紙上傳之帖瘡
治瘡腫時痛惡瘡婦人妒乳漆瘡方

野葛　芍藥　雄白　當歸　通草各三分　附一分
右切醋浸半日先煎豬脂八合令煙出內亂髮二分令消盡下
之待冷又內松脂八分又內蜜二分更火上令和即內諸藥煎
令沸三上三下待冷去滓故烏傳藥帖腫上乾即易之如春法
附子瘡須洗去垢不令瘡痛

治瘡腫松脂膏

黃芩　當歸　黃連　芍藥　大黃
蠟　芎藭　各壹兩
右細切合松脂一斤半豬脂一合半微火煎三上三下綿絞去
滓火炙傳紙上隨腫大帖之日三

治腫瘡梨子膏方

梨葉子壹升熬之令黃以麻油和之如泥炙令焦黑以傳

靜嘉堂文庫所藏

故熱布上如腫大小勿開孔帖之無蕨水用小豆末和雞子白
如前即傳之
搨腫方　大黄　黄芩　白歛各參　朴消陸合
右以水六升煮取三升故帛四重內汁中搨腫上乾即易之無
度數
治癰疽始作腫赤焮熱長甚速方
青木香　犀角　大黄　升麻　黄芩　梔子人
紫檀香　黄連　甘草　芒消　射干　黄蘗
羚羊角　白歛各參　地黄汁五合　麝香一兩研入
右水二升煮取一升小冷故帛兩重內湯中搨腫上乾易之日
夜數百度
禁腫法
以春發蟄時急以兩手掌承雷聲止乃止後七日勿洗之後以
手摩一切腫乃尋手差

書腫方　天乙神生　未乙縱死
右以丹書閉氣書腫上立差
療癰方　用芫花為末膠和如粥傅之
療癰癤潰後膿不斷及諸物刺瘡不差方
石流黄粉二兩　筋壹片碪頭碎
右溫之內流黄中以刺瘡孔中瘥瘥為度
療頸項及胸背有大腫赤發即封令不成膿方
生乾地黄半斤　香豉半升　朴消伍兩
右合擣令地黄爛傅腫上厚三分日三四易至差止兼治一切腫
治癰腫痛煩悶方
生楸葉十重帖之以帛包令緩急得所日二易止痛兼消腫食
膿甚良勝於衆物如冬月無生葉取乾者臨時鹽潤之
治石癰堅如石不作膿者方
生商陸根擣傅之乾即易之取軟為度　又方

靜嘉堂文庫所藏

瘰漏諸癰癤石癰等發腫有根者及石癰當上灸之百壯石
子當出立差
又方 蜀桑根白皮陰乾擣末以膠酒和藥末傅腫拔出根
又方 醋和莨菪子傅頭上一日一易拔出根矣
又方 蛇蛻皮帖之經宿便差
又方 梁上塵 葵莖灰等分 醋和傅之即差
治附骨疽方
槲樹皮燒末飲服方寸匕。又隨便從後一寸灸之隨年壯一差
又方 新剝鼠皮如錢孔大帖腫即膿出也已潰者取猪脂帖
之膿出也。又方 一切腫取萆麻子擣傅之即差
治癰腫惡肉不盡者方
藋灰 石灰 二味各淋取汁煎如膏[illegible]蝕惡肉亦
去黑子此藥過三日後不用也
又方 生地黃汁煎如膠作餅子帖之日四五度

又方 癰無問大小方圓取膠如手掌大煖水浸令軟中心開一孔
如錢大帖腫心對孔須臾乾急未有膿者即定已作膿者當出
若以蜂針當孔上刺出膿大效至差乃洗去膠
治久癰不差方 馬齒菜擣以傅之差
治小兒癰腫方 生猪腦傅紙上帖之乾易之日三四度
又方 灸兩足大母指奇中立差仍隨病左右
又方 芥子湯和傅紙上帖之。又方 白僵蚕末蒜和擣傅上差
又方 馬鞭草擣傅上即頭出
療癰有膿令潰方 以雞羽三七枚燒末服之即潰
又方 人乳和麪傅上穿膿出也並不用近手
又方 箔經繩燒末臘月猪脂和傅之上畔即潰不須針灸
癤子方
夫癤無頭者吞葵子一枚不得多服又燒[illegible]藤灰封上自消又
鼠粘葉帖之又米和雀屎傅之又生椒末釜下土二等分和醋傅

靜嘉堂文庫所藏

之又狗頭骨末芸薹子末等分醋和傅之

療癰腫發背初作及經日已上腫𤸷焮熱毒氣盛日夜痛百藥不效方

假雞子壹枚　新出窠者如雞子大

右二味攪調和微火熬令得所為作餅子可頭大小貼紙上以帖腫上仍帛抹之轉動又歇氣一宿定如多日患者三日貼之一日一易差止

論曰此方穢惡不可施之貴勝然其愈疾一切諸方皆不及之自外諸方還復備具設儀法已文見者寫既斯亦備諸急用亦又

論曰余平生數病癰腫但得効者皆即記之昔其病亦多是藥氣所作或有二十世服石遂令子孫多有此疾食中亦不宜食麪及酒蒜又慎溫牀厚被能慎之者可得終身無它此皆躬自驗之故論之爾

○療膿潰後瘡不合方

燒鼠皮一枚作末傅瘡孔中　又熟嚼大豆以傅之○又炒烏麻令黑熟擣以傅之又以牛屎傅之乾即易之

療癰始覺腫令消方

大黃　通草　葶藶　茵草各等分

右為末以水和傅上乾易之

又方　以莨菪三指撮水服之日三神良

療諸癰肉中如眼諸藥所不効者方

取附子削令如棊子安腫上以唾貼之乃灸之令附子焦復唾沾之乃重灸之如是三度令附子熱氣徹內即差此法極妙

又方有堅如石核者復大色不變或作石癰治之方

鹿角八兩燒　白斂二兩　粗理黃石一斤

右醋五升先燒石令赤內醋中不限數醋半止擣末以餘醋和三味如泥厚傅之乾易之消止內服諸漏瘡者其藥悉皆用之仍火針針頭破傅藥又單磨鹿角半夏末和傅之不如前方也

地黃丸主壯熱人長宜服之終身不患癰疽方

靜嘉堂文庫所藏

乾地黄酥　芍藥　甘草
黄芩　遠志　石斛　當歸　黄耆
巴戟天　人參　桂心　大黄酒各參二兩
右蜜丸酒服十九日三加至二十九三十九如梧桐子大
又消瘡癤乾地黄丸方
乾地黄肆兩　大黄酒炒　芍藥　茯苓　王不留行
麥門冬　甘草　遠志　天門冬酒各肆兩
黄芩酪參　桂心　人參　升麻
右蜜丸酒服十九日三服漸加至二十丸為度如梧子大
又治虚勞客熱數發癰腫瘡瘍經年不差長服令人肥健方
乾地黄肆兩　人參壹兩　天門冬酒　黄耆　黄連
細辛酪參　桂心　芍藥　甘草　澤瀉
茯苓　大黄　乾漆一各貳兩
右以蜜丸酒服十九日三夜一加至三十丸久服延年凡方中

用大黄昏薄切五升米下蒸之暴乾用之丸如梧子
療人身中但患癰疽皆宜服之方
赤小豆壹升熬內醋中如是染慶　人參　甘草
當歸　猪苓　黄芩
黄芪八兩各壹　防風兩壹　升麻肆兩
右為末以酒服方寸匕日三夜二
凡患腫皆因宿熱所致須服冷藥差後有患冷利不止方
赤石脂　人參　龍骨　甘草　乾薑酪貳　附子壹枚炮
右水八升煮取二升半分三服無服入合
枸杞煎主虚勞益氣令人有力一切癰疽永无發方
枸杞參拾斤和根莖以水壹石煮取五斗去滓澄將滓更入釜
與水依前煮取五斗并前為一斛澄之去淀釜中煎之取二斗
許更入小銅鍋子煎令連ゝ如餳止或器盛重湯煮更好每
日早朝服一合半日再初從一合發漸加之

靜嘉堂文庫所藏

地黃煎主虛勞散除石去癰瘧痔疾悉宜服之方

生地黃拾伍斤三擣三漉取汁新布絞之銅器中湯上煮次減半出之布絞之去滓更煎之減半如餳酒服如彈丸許日三服勿加之

主溫風躰痛不能食無主癰瘡補虛方

薔薇根 枸杞根各壹百斤 生地黃拾 人參蜜治斤

右以水煮炙二根令味濃取二斛去滓內地黃煮令爛絞去滓微火煎令如粥內蜜令相得每食後服如彈丸許

發背第三

論曰凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而發者由上代服五石之類也其候甚多於背兩甲間起如粟米或痛或痒仍作赤色人皆不以為事日漸簇長不過十日遂至於死臨困之時以闊三寸高十寸瘡有數十孔以手按之諸孔皆膿出尋時失音夫人見有此候背上痒痛者異即火急取淨土水和為泥捻作餅子厚二分闊一寸半以簪文大作灶灸泥上帖患上灸一百灶一易餅子若粟米大可以柴餅子即差如榆莢大易七七餅灶可灸一百五十即差如錢大可日灸灸之不限灶數仍服五香連翹湯及鐵漿攻之主發背未作大瘡可水箭射之浸石令爛熨之日夜莫住差乃止

論曰凡服石人皆須勞役可躰無令自安不爾者多有發動縱得遂便恣意取煖令稱己情必須取寒雖當時不發於後猶終无發動之慮爾

治癰發背方凡腫起背中中頭白如黍粟四邊連暈赤黑令人悶亂即名發背也即禁房室酒肉蒜麪若不爾即入內教人並灸當瘡上七八百壯有人不識多作雞腫治者即死

又乱髮灰酒服方寸匕又三年醋滓微火煎令稠和牛黐傳上日一易又狗牙燒灰醋和傳之日三易又蛇頭灰醋和傳之日三易又飲鐵漿一升取永

又方　燒鹿角灰醋和傅之日四五

又方　燒石蜂灰雞子白和傅之日三易

治癰疽發背已潰及毒腫方

括蔞　榆皮　胡鷰窠　鼠坌土

右女人月經衣水洗取汁已上等分以水和土爲泥乾易瘥者

四面封之

治癰疽發背及小小瘰癧方

李樹根皮　通草　白斂　桔梗　厚朴

黃芩　附子炮　甘草　當歸各貳兩　葛根叁兩

半夏洗伍兩　桂心　芍藥各肆兩　芎藭陸兩　括蔞伍兩

右爲散酒服方寸匕日三瘡大人困者夜再服之曽有人患骨

從瘡中出兼有三十餘癰癤服此散得可

治大瘡熱退膿血不止瘡中肉虛疼痛排膿內塞散方

防風　茯苓　白芷　桔梗　遠志

甘草一兩　人參　芎藭　當歸　黃耆各[illegible]

桂心二分　附子二枚炮　厚朴二兩　赤小豆五合酒浸熬之

右爲散酒下方寸匕日三夜一

治癰排膿止痛利小便方

瞿麥一兩　芍藥　桂心　赤小豆酒浸熬　芎藭

黃耆　當歸　白斂　麥門冬去心各一兩

右爲散酒下方寸匕日三

治癰腫令自潰長肉方

薏苡人　桂心　白斂　當歸　蓯蓉　乾薑各二兩

右爲散食後溫酒服方寸匕日三

治發背癰腫經年差後復發此因大風或結氣在內經脈閉塞至

夏月已來攻於背久不治積聚作膿爲瘻內漏大排膿散方

山茱萸　五味子　茯苓　乾薑各六分　當歸

石韋去毛　芎藭各四分　附子二分　蓯蓉　巴戟天去心

靜嘉堂文庫所藏

遠志去心　麥門冬去心　乾地黃各八　桂心　芍藥各三
地膚草　兔絲子各八　石斛　人參　甘草各三
右散酒服方寸匕日三夜一服加之終無患

治癰疽發背已潰排膿生肉方
當歸　桂心各二兩　人參　芎藭各一兩
防風　甘草　白芷　桔梗各一兩

右為末酒服方寸匕日三夜再未者合服喪任
治癰疽發背婦人發乳諸癰瘡已潰未潰不消合潰方
木占斯　敗醬　細辛　乾薑　厚朴
甘草　桔梗　附子各二兩　防風　人參各三兩

右散酒下方寸匕日七八夜二三如長服去敗醬
治癰疽發背豬蹄湯方
豬蹄　嘻具治如食法　黃耆　芎藭各三兩
薔薇根　狼牙根各八兩　乾地黃　芍藥各四兩　黃連　芍藥各三兩

右以水三斗煮取豬蹄令熟漉清取二斗下諸藥煮取二斗去滓洗瘡一食頃以帛拭乾帖生肉膏日二如痛加當歸甘草各二兩

食惡肉散方
硫黃　馬齒莧熬七頭蘭茹　丹砂　麝香
雄黃　雌黃　白礬各燒各一兩

右件為細末以傅之

又食惡肉膏方
大黃　芎藭　茵蔯　真珠　雌黃　附子各一兩
白斂　礬石熬　黃芩　蘭茹各二兩　雄黃一兩

右以豬脂一升半煎六七沸去滓內藥末攪調傅瘡中惡肉不乃止

又方
蘭茹　礬石各熬　雄黃　雌黃各等分

右為末傅瘡中惡肉盡即止不得過好肉也

靜嘉堂文庫所藏

治癰疽發十指及發背後生惡肉方

猪蹄壹具治如食法　當歸　大黃　芎藭　獨活　芍藥　黃芩

右水三斗煮猪蹄取八升去之內諸藥煮取四升去之後下麝香膏

麝香膏

治癰疽及發背去惡肉麝香膏方

麝香　雄黃　樂石　簡如右一兩

右四味細篩以猪膏調如泥傳之惡肉盡即止傅生肉膏

治癰發背後生肉膏方

生地黃汁　辛夷貳兩　獨活　當歸　大黃

黃耆　芎藭　白芷　芍藥　黃芩

續斷各壹兩　白蘞壹兩

右以臘月猪脂煎傳之立差

治癰疽發肯潰後令生肉方

甘草　當歸　白芷　茯苓　獨活

細辛各貳兩　烏喙六枚生用　蛇銜一兩　雞白皮十　乾地黃三兩

右以醋半升漬一宿猪膏二斤令沸三上三下膏成塗之立差

治癰疽發背黃耆竹葉湯主之方

黃耆　甘草　麥門冬　黃芩　芍藥各三兩

當歸　人參　石膏　半夏各貳兩

石膏　大棗擘十　淡竹葉一握

生薑五兩　生地黃八兩

右水一斗二升煮竹葉取一升去滓內藥煮取三升分四服日三夜二

桅子湯主表裏三焦采實身躰生瘡癰疽方

芒消　桅子　黃芩　甘草　知母各貳兩　大黃四兩

右水五升煮減半下大黃取一升八合去滓內芒消分二服

治背上初欲結腫即服此方

大黃　升麻　黃芩　甘草各一兩　桅子擘司

靜嘉堂文庫所藏

右水五升煑取二升分三服取快利便止

治發背癰腫已潰未潰方

香豉三升少与水和熟擣成強泥可腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布豉餅以艾列其上灸之使温〻而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出即差也

治諸色癰腫差後有瘢方

礬石鍊 安悉香 狼毒 烏頭炮 羊躑躅
附子炮 野葛 白芷 烏賊骨 赤石脂
皂莢皮炙去 乾地黄 天雄炮 芍藥 芎藭
當歸 茼草 石膏 地榆 朮
續斷 鬼臼 蜀椒汗 巴豆去皮熬 細辛 各一兩

右擣末以煎了猪脂四斤和藥以此為準煎之三上三下以好塩一大匙下之膏成須服者与服須摩者与摩之忌近眼及

傅諸丹皆用之日三

治丹毒搨方

升麻 漏蘆 芒消各二兩 梔子二十枚 黄芩三兩 蒴藋五兩

右水三升浸良久煑取二升以故布染汁搨後須服飲子并漏蘆湯方並在前項癰腫條中但服之立差

治丹毒以單用藥方

大黄 黄芩 芒消 水苔 生蛇銜
生地黄 生菘菜 蒴藋葉 慎火葉 五葉藤
豆葉 浮萍 梔子

右但以一味單擣傅之立差大黄之類水和用

治丹神驗方

右以芸薹菜熟擣傅之隨手即差如未愈但三日內傅之且以貞觀十七年三月八日內江縣毎以飲多至夜睡中覺一股骨肉疼痛目眩額角上如彈丸大腫痛不得手近至午時至右角

靜嘉堂文庫所藏

至夜諸處皆烈其取合並不
藥治不差經七日吕自處此方其驗如神故疏之以傳于世凡小
凡五色油丹皆將丹猪玩頭臥之其良。又方以牛屎傳之乾易
赤流腫丹毒方取榆根白皮作末雞子白和傳之。又方
擣大麻子傳之 又方以羊脂煎丁摩之得青羊脂最良
凡小兒丹毒方 擣馬齒菜一握取汁飲之滓以傳之
又方 擣小豆五合水和取汁飲之滓塗五心
又方 濃煮大豆汁傳之此差亦無痕
又方 臘月猪脂和釜下土傳之乾易之
治小兒五色丹方 以韮根葉擣之。又方猪槽下爛泥傳
之乾易。又方服黄龍湯三呑并傳患上
治小兒白丹方 燒猪屎灰雞子白和傳之良
治小兒火丹赤如朱走皮中以醋和酢浙傳之
又方 鯉魚血傳之良 又方擣狂子傳之良

姓氏人若滅瘢者以布指令傷傳之鼻中息肉取如大豆内鼻
中此疾血酒服如核大痔漏以綿裹如梅子内下部若中風摩
患上取差崩中亦内若滅瘢取少許和鴈屎白傳之取臘月日合
治惡毒腫或在陰囊或著逢痛寧急引入小腹不可忍一宿
殺人方
取茴香煮擣取汁飲一升日三四服瘥傳之此是外國神方從
元嘉年末即用之起死人也
治風毒腫疼痛寧或引小腹及腰髀方
桃人壹升去尖皮熬搗人數令煙出研如脂
右以酒三升攪和頓服之須臾盡令汗不過三劑若從脚腫向
上至腹者死以後方
右以水三升煮令爛出滓入豉汁適鹹至膝每日一度差止若已
入腹不須浸但煮豆食之亦差若加鹽菜不妨等湯飲豆汁差乃止
治毒腫無定處或赤色悉裹或心膈刺痛煩悶者此是毒氣深重

靜嘉堂文庫所藏

夜干三兩　生商陸　防己一兩　酪酥二兩　麻子五兩　升麻四兩　赤小豆四兩

右以水四升八合先煮四味取二升半去滓研麻子汁和汁煮一沸濾去滓取汁煮豆爛取汁每一服五合日三夜一當利小便為度腫退即差并食豆

療丹毒諸方第四

論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之大者如手掌甚者遍身有痒有腫無其定色　或有白丹肉中有粟或痒而復痛微虛腫如吹狀癮疹亦有雞冠丹赤色而起大者如錢小者如麻豆粒狀如雞冠色皮澀一名茱萸丹　或有火丹　或有水丹遍身起遇水濕搏之晃晃如黃色如有水在皮中喜著股及陰此雖小疾令人至死宜此治丹毒方

升麻　白薇　漏蘆　連翹　芒消
黃芩各二兩　蛇銜　枳殼各三兩　梔子十枚　蒴藋四兩

右微擣之水三升浸半日以豬膏五升煎令水氣盡去滓膏成

又方　豬槽水和絞取汁服少許良

小兒天火丹肉中有赤如丹色大者如手甚者遍身或痛或痒或腫方

小豆貳升擣末雞子白和如薄泥傅之乾易之便差一切丹並用此方皆差

治小兒骨火丹方其瘡見骨

右擣小蒜厚封之著足踝者是

小兒殃火丹方每著兩脇及腋下是

伏龍肝末和油傅之乾易之若入腹及陰以慎火草取汁服之

小兒尿竈丹方

初從兩股起及臍間走入陰頭皆赤色水二升桑皮切二升煮取汁浴之良

又方　燒李根為灰以田中流水和傅之良

小兒未游火丹方　一日一夜即成瘡先從背起漸至遍身如棗

靜嘉堂文庫所藏

大正赤色以濃煮䔧根汁洗之已成瘡者以小豆末傅之未成瘡
者以雞子白和傅之
凡方中用雞子者皆取先破者用之宅者無力
凡天下極冷無過藻菜最冷但有患熱毒腫并丹等取渠中
藻菜細切熟擣傅丹上厚三分乾易
天火丹方病從髀間起小兒未滿百日犯行路竈君若熱流不
令陰頭赤腫血出方 伏龍肝擣末雞子白和傅之日三良
又方 鯽魚肉剉五合 小豆末三合
右和擣少水和傅之良
凡徧身皆赤者名野火丹用酒塗之
小兒初從背起徧身如細纈一宿成瘡名茱萸丹方
右小赤豆作末以粉之如未成瘡者雞子和傅之
凡發竈火丹初從足趺起正赤 以棗根煮汁沐之
小兒赤丹方 右以芸薹汁服三合滓傅上良

小兒赤丹斑駮方 以唾和胡粉從外向内傅之
又方 鍛鐵屎以豬脂和傅之○又方屋塵和臘月豬脂傅
小兒患癮胗身體腫強而苦乾方
蕪菁子末酒服方寸匕日三服
又方 服車前子亦作末粉之良○又鹽湯洗之以蓼子挼傅之
又方 蚕砂二升煮汁洗之良
療癮胗方第五 俗呼為風屎亦名風尸
素問曰風邪客於肌中則肌膚虚真氣遂散被寒搏於皮膚外
發湊理經氣行之則爲痒也所以癮胗搔之皆由於此
又有赤胗忽起如蚊蚋啄煩痒搔之逐手起 又有白胗亦如此
赤胗熱時即發冷即止白胗天陰冷即發白胗宜煮礬石汁拭
之或煮蒴藋和以酒以塗之良或煮石楠汁拭之良或水煮雞
屎汁或煮枳殼汁或以芝白塗跡一切治丹方法
象六十四種風淫〻〻入走入皮中如蟲行腰脊強直五緩六急

靜嘉堂文庫所藏

手足拘攣癮胗攣之作瘡風尸身痒卒面目腫起手不得上頭口
噤不得言方
石楠根炙乾薑 黃芩 細辛 人參酌各壹 桂心
麻黃 當歸 芎藭各陸分 甘草捌分炙 乾地黃參分
食茱萸 [illegible]
右以水六升酒二升煮取三升分三服蓋令快汗忌入風此方
但是癮胗宜服之差
主暴氣在表攻皮上癮胗作瘡 煮槐枝葉洗之
主風搔癮胗方
牛膝為末酒下方寸匕日三并治骨疽癩病及瘡瘍
又方 粟米酒服方寸匕日三
又方 石灰淋取汁洗之良 又方白芷根葉煮汁洗之
又方 芥子末漿水服方寸匕日二
又方 酪和鹽熟煮摩之手下即消良妙

主癮胗百方不差者方
昌夫壹斤壹名慎火草擣取汁傳上熱炙手摩之
又方 黃連廿兩 水六升煮取三升去滓洗之日四五
主舉身痛痒如蟲齧痒而攙之皮便脫落方
蒺藜子 舂令碎 蛇床子 大戟壹斤 大黃 酸漿各壹斗
右酒四升水七升煮取四升去滓內礬石帛染拭之
又方 灸臍上二穴隨年壯發即灸之神良
主搔痒皮中風虛方
枳殼 物參 獨活 茯苓 黃耆 秦膠各四兩
丹參 葫蘆各伍兩 松菜 豉壹升
右以酒二斗漬六宿再服三合日二稍稍加之
主風瘙癮疹痒在頭面方
大黃 廿銖分 黃連 黃芩 栝蔞子 蒺梨子伍合

靜嘉堂文庫所藏

右水七升煑取三升去滓下消以帛染搨之日一度勿近目一

主身軆赤癮胗而痒搔之隨手起方

莽草貳分　當歸　芎藭　大戟　細辛　芍藥

芫花　蜀椒　附子　躑躅各肆分　猪脂貳斤半

右合煎膏成去滓以傅病上日三

主癮胗大痛方

大黄　升麻　黄蘗　當歸　防風　芍藥

黄芩　青木香　甘草各貳兩　楓香伍兩　朴消壹兩　地黄汁壹升

右水一斗煑取三升半去滓下消帛染搨病上日四五度

主風瘙癮胗心迷悶方

天雄　牛膝　桂心　知母各肆分　防風陸分

乾薑　細辛各叁分　人參貳分　栝蔞　白朮各伍分

右為末酒服半匕加至一匕已上為度

又方　巴豆二兩以水七升煑取三升故帛染汁拭之大人小兒

加減之

又方　礬石二兩末酒三升洋令消帛染拭病上

主風痒癮胗方　大豆三升酒六升煑四五沸每服一錢日三服

又方　蛇床子三升　防風二升　生蒺梨二斤　水一斗煑取五升拭病上

又方　朮三兩　戎鹽　礬石各二分　黄連　黄芩

細辛　芎藭　茵芋各一兩

右水一斗煑取三升洗之良

又方　馬蘭子　蒴藋　茺蔚子　礬石　蒺梨子

茵芋　羊桃　萹竹各二兩

右漿水二斗煑取一斗二升内礬石洗之日三

主風熱赤胗搔之逐手作瘡方

青羊脂　甘草　芍藥各半兩　白芷　寒水石

防風　黄芩　白及　黄耆　升麻各四

石膏一斤　竹葉切一升

靜嘉堂文庫所藏

右先以水八升煮石膏取四升去滓浸諸藥以不中水猪胰二升合前膏成傳病上良

瘭疽方第六

論曰瘭疽者肉中忽生黵子如豆粒小者如粟劇者如梅李或赤或黑或青或白其狀有根不浮痛傷之應心根深至肌經久便四面悉腫皰黵色能爛壞骨若毒散遂時入藏殺人南方人著即割之亦燒鐵烙之或令焦如炭或灸百壯或飲麥根汁或飲藍青汁或飲犀角汁及升麻汁竹瀝黃龍湯等專去其熱耳其病著乎疳故与代指相似人不識之呼作代指不急治之亦逐脉中入藏殺人南方人得之皆斬去其指疽著初指頭先黵黵後腫赤黑痛入心是也復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不治自長出不止亦不痛痒此由春冬時受惡風入肌脉內變成此疾治之宜漏蘆湯外燒鐵烙之日日為之令焦尽即以升麻膏傳之。又有赤脉病身上忽有赤

脉突起隴脊如蚯蚓之狀看之如有水在脉中長短皆逐脉所處此由春冬惡風入經脉中其血內瘀所作也宜五香連翹湯及竹瀝等治之剌去其血仍傳丹參膏亦用白雞屎傅之良惡核病者肉中忽有核累累如梅李核小者如豆皮肉瘡痛壯熱癊索惡寒是也与諸瘡根殟癧相似其根因瘡而生是綫無毒又有惡脉病卒然而起若不治入腹煩悶殺人皆由冬月受溫風至春夏有暴寒相搏氣結成此毒也但服五香湯以小豆末傅之亦黄湯滓時時洗之　後毋參膏付之令餘拠消尽　凡惡核似初被射公毒无常定處多側側然或時不痛人將謂此皆遲不治即殺人是以宜早防之尤忌牛肉雞猪魚馬驢等肉其疾初如粟米或以麻子在內裹而堅似皰長其速初得多惡寒須臾即知氣取葉莫五合作末水一升和之絞取汁頓服之以滓傅上須臾服此汁令毒散止即不入腹也

論曰惡核瘡病瘭疽等多起嶺表中土數有南方人所食雜類繫

靜嘉堂文庫所藏

多感病亦復不一仕人往彼深須預防防之无法必遭其毒唯須
五香湯小豆散吴茱萸皆是其要藥
凡疽卒著五指筋急不得屈申者灸踝骨中央數卅壯或灸百壯入
乱髮灰服方寸匕日三飲下
又方　煑芸臺菜汁取一升服之并食乾熟芸臺數頓以少鹽醬
冬月研芸臺子水和服之。又方　以猪膽傅之良
又方　枸杞根葵根葉煑汁煎如糖服之隨意
又方　臘月糟日夜浸之數日
主疽潰後以鹽湯洗拭了以皂莢灰粉上良
又方　梁上塵和車缸脂傅之
又方　以牛耳中垢傅之良
又方　以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出也
又方　以沸湯和餳灌瘡中三四凡疽似癰而小有異今日去膿
了明日還滿膿如小豆汁者宜　芸臺菜係盛之埋熱灰中更

再灸之即候得安不過再三即差
又方
皂莢煎湯洗瘡了拭乾以蘗皮末傅勿令人近凡骨疽一百方治
不差者可以灸之一一灸次上火三日三夜便差如灸瘡不差
而復發骨從孔中出者名為骨疽取烏雌雞一隻去肉取骨
熬焦如炭取三家牛鞍木刮取屑三家甑箅各一兩皆熬成末
合導瘡中碎骨當出已片差
主瘭疽秘方世所不傳神良无比方
夜干　甘草　枳實炙　乾地黄　升麻
黄芩略八　大黄十兩　射香二兩　犀角六兩　前胡二兩
右水九升煑取三升下大黄一沸去滓内射香分三服差乃止
不限劑數
主瘭疽諸疽十指焮赤痛而痒方
白芷　大黄　芎　黄芩　黄連　甘草

細辛　葉本　當歸　芎藭　芎草各四兩

右水二斗煮藥取五升浸瘡即差

主瘰疬浸淫多日漸大方

胡粉　甘草炙　蘭茹各二兩　黃連六兩

右為末以粉瘡上日三四

凡瘰疬著手足有青黑如米起色白刮之汁出差後復發方

黃蒼二兩　款冬二兩　升麻四兩　附子　苦參　赤小豆各一兩

右為末酒服方寸匕加之

又方　虎屎白者以馬屎和之暴乾燒為灰粉之良

又方　胡粉二兩　青木香　滑石各三兩　米粉一升

右為末和粉瘡上日三

又方　龍屋塵　龍骨各一分　金下土各一分

右水煮三沸取汁洗瘡日三四度

又瘰疬著手足有青忽發黑黑如赤豆刺之汁出者治方

右蕪菁子熬擣帛裹展轉其上

又方　以麻子熬作末摩上良　又方　酒和麪傅之

又方　鮒魚長二寸者　苦酒　猪脂一升　右煎為膏傅之

又方　剝去瘡痂温醋泔清洗之訖以胡麻寒和百日兒屎傅之

療風疽方　腳踹及曲秋中痤撚之汁出是風瘡以青竹筒一枚徑一寸半長三尺當中著大豆一升糖馬屎和二升緩火當筒中燒之以器盛兩頭取汁泔清和盆洗瘡了即傅豆汁不過三度極效　又方　嚼胡麻傅以綿裹之日一易之神良

主石疽方狀如痤癰而皮厚　搗楮樹子傅之

主骨疽方其瘡不差差而復發骨從孔中出名骨疽

以猪膽秋棗搗封　又方搗白楊葉末傅又蕪菁搗傅之

又方　穿地作坑口小東大深三尺取乾雞屎二升以艾及荊葉搗碎和雞屎与火坑中燒之令煙出內疽於坑中薰之以衣擁坑口勿泄氣半日當有蟲出

靜嘉堂文庫所藏

主久疽方　鄉魚破腹勿損內白鹽於腹中針縫之於銅器中火上煎之令乾作末傳瘡有膿者無膿者以豬脂和傳之小疼痛無怪之十日止

辯附骨法

凡附骨疽者以其無破附骨成膿故名附骨疽喜著大節解中大夫產婦喜著體骼中小兒亦著眷睛夫大人急著者竟痛不得動搖按之應骨痛經日便皮肉漸急洪腫如肥狀是也小兒手近便啼呼即是故節皆痛也大人緩者先覺肌烘然經日便繞一股不能動搖亦如不隨狀看股節中若有那拱拱處不知此附骨疽或徧身成腫不至潰躰皆有青黯大人亦不別呼為賊風不知是疽。凡人躰患熱當風取涼風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候啫眠沈重忽忽不欲夏露卧為冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取冷何故而有此疾由其血盛肌嫩為風折之即疑組故也。凡賊風其久躰卒无熱由風冷即骨解深痛不發轉動按之應骨痛也久即結成瘰癧異耳若治附骨作賊風則增益病深膿多若治賊風作附骨則風冷遂成瘰癧偏枯攣曲之疾也療之都在其始耳此非天下至精其孰能与於此若候附骨与賊風而已其賊風但痛不熱附骨則其上此熱四躰尓寒尓熱小便赤大便澁而无汗若得下却熱并開發滲理便消也縱不得尽亦得浮淺近久凡賊風但夜痛骨不可按不得迴轉痛処不壯熱亦不尓寒尓熱多汗身躰柔柔虽冷欲得熱厭痛處即小寬時復有汗出此為賊風正也宜針灸附子湯小豆散得消可服五香連翹湯凡初得附骨疽即急服漏蘆湯下之傳小豆散得消可服五香連翹湯凡初得附骨疽即急服漏蘆湯下之傳小豆散得消可服五香連翹湯凡編病喜發四肢其狀亦泳起如編繩急痛壯熱其發於脚者從踹起至踝亦如編病也發於脣喜者服下皆由四肢熱氣盛為温涼所折氣結筋中成此病也若不即治其久潰

靜嘉堂文庫所藏

膿亦令人筋攣縮也若不消潰其毒氣不散多作瘻疾漏蘆湯主之寫下鋒針數針又去惡血氣針寫其根核上傅小豆末取消為度亦用三味甘草散傅之若潰傅膏散如癰法經云氣宿於經絡中血氣俱澁不得行擁結為癰為疽也不云熱之所作其成癰久寒化為熱熱盛即肉腐爛為膿也由人躰有熱被寒冷搏之而脉凝結不行熱氣擁結成癰疽方有灸法亦有温治法以其中冷未成熱之時其用冷藥帖傅之治熱已成以消熱令不成膿也

○治赤色腫有尖頭者藜蘆膏方治淺瘡經年抓搔成痒孔方

藜蘆二分　黃連　礬石　雄黃　松脂　黃芩各八

右末豬脂二升二合煎令烊調和以傅上癰瘻頭瘡極効

又有風熱毒相搏為腫其狀先腫上生瘭漿如火灼處名曰風熱毒治之一如丹法○又有洪燭瘡身上忽生瘭漿如沸湯洒劑者徧頭面赤有胷脇腰腹通躰如火湯灼熛起者是也治之急服漏蘆湯下之外以升麻膏傅之其間傅升麻膏若無効一依傅丹方

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏


134
24
4 10

靜嘉堂文庫所藏

孫真人千金方卷第二十四

九漏方第一　腸癰方第二　癬疥方第四　惡疾方第五

九漏方第一

黃帝問岐伯曰夫九漏之為病皆寒熱瘰癧在頸腋若何氣使生岐伯對曰此皆鼠瘻之本皆根在於藏甚末上出於頸腋之下其浮於肺中而未著於肌肉而外為膿血者易去問曰去之奈何對曰請從其未引其本可使去而絕其寒審其道乎坐之徐往來以去之其小愛者一刺知之刺也已決其死及衰目視之其中有赤脉從上下貫童子見一脉一歲半一歲死見二脉半二歲死見乃至三脉三歲死見三脉救此赤脉不下貫童子可治躰骨寒熱驚陰於股股胳齒枯槁者死不治骨厥亦然肺寒熱咳嗽上氣者肺俞主之寒熱痺血肝俞主之寒執食多身瘦小熱不得臥胃滿膈俞主之

腸急痛䏶俞主之寒熱頸瘰癧大迎主之寒熱䐈腸偏腫陰谷主之

寒氣頸腫丘虚主之

治一切漏方

班猫肆拾枚 豉貳拾枚 元青貳拾枚 地膽拾枚 蜈蚣壹寸

犀角棗核大 牛黄棗核大 生豆黄壹枚

右為末蜜丸飲服梧子二丸須臾多作酸漿粥冷飲之病從小便出尿盆中看之如有蟲形狀又似膠汁此病出也隔一日一服欲粥如常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸差特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作食

○又方

煮塩花以人擁病上 麪匡中厚二寸其下以桑葉二重藉塩候冷熱得所可忍冷則無益熱則破肉一日一度候瘰癧根株勢消則止若已作瘡者擣穄穀為末粉之

○又方

空青 商陸 狸骨 知母 徃子 桔梗

黄芩 礬石 礜石 白朮 雌黄 班猫

地膽 雄黄 甘草 芍藥 防風 白芷分并

右以醋服一刀圭日三如大豆一枚是也凡瘻皆以此療之

又方

槲樹北陰白皮三十斤剉之以水一石煮取一斗去滓煎如糖又取都廁下雌雄鼠屎各十四枚燒令汁盡末內温酒一升侵煎中合攪之羸人五合服之當有蟲出也

治漏作瘡孔方

露蜂房臘月猪脂和付孔上

灸漏法 心鳩尾骨下宛宛中灸七十壯兩胯裏患瘰癧處宛宛中日一壯七日止神驗

凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏及宜禁五辛也酒麪熱食凡漏有似石癰累累然作瘰癧子有核在兩頸及腋下不痛不熱者治皆練石散付服五香連翹湯下之已潰者治如癰法諸漏結核未破者火針針使著核結中元不差者

治漏發心胷以下者方

静嘉堂文庫所藏

武都雄黃　松脂各壹兩

右和為塊刀子刮為散飲服一匕日三不差更合

灸漏方　擣生商陸根捻作餅子安漏上以艾灸上餅乾易之灸三四升艾差

治漏方　擣土瓜根傅之燥易之不限時節

何謂九漏　一曰狼漏　二曰鼠漏　三曰螻蛄漏　四曰蜂漏

五曰蚍蜉漏　六曰蠐螬漏　七曰浮沮漏　八曰瘰癧漏　九曰轉脉漏

治狼漏發於頸有根起於缺盆之上連延耳根此自憂恚氣上不得下其根在肝空青主之商陸為之佐散方

空青　蝟腦各貳分　蝟肝一具乾　芎藭半分　女婦蓐草

獨活　黃芩　鼈甲　斑猫　乾薑

商陸　地膽　當歸　茴香　礜石各壹　椒叄拾枚

右以酒服一匕日三十五日服之一方無商陸

治鼠漏發於頸無頭尾如鼷鼠使之寒熱此得之於鼠毒其根在胃狸骨主之知母為佐散方

狸骨　鯪鯉甲　知母　山龜殼　甘草

桂心　雄黃　乾薑　各等分為末

右以飲服方寸匕日用以三匕蜜和以瘡中無不差先灸作瘡後以藥付之已作瘡不用灸

治螻蛄漏發於頸狀如腫此得之於瓜菓毒不去核其根在大腸荏子主之桔梗為佐丸方

荏子　龍骨各半兩　附子壹兩　椒百粒　桂心

乾薑　桔梗　礬石　獨活　芎藭各壹

右末以棗二十枚和擣醋漿和之服五丸飲服

治蜂漏發於頸瘰癧三四處但腫連以潰此得之飲流水水有蜂毒其根在脾雄黃主之黃芩為佐用同鼠漏方

雄黃　黃芩　蜂房壹具　鼈甲炙　茴香

茱萸　乾薑　椒貳百枚去目

靜嘉堂文庫所藏

右八味作散付瘡口上日一十日止
治蚣蜈漏發於頸初得如瘍寒此因食中有蚣蜈毒其瘡
石主之防風為之佐方
礬石　防風　桃白皮　知母　雌黃　乾薑
獨活　青黛　斑猫　白蘞
海藻　當歸　各壹分　朮　蝟皮　各貳
右擣篩飲服一七日三服
治蟾蜍漏發於頸無頭尾如棗核塊多在皮中使人寒熱心痛此
因喜怒哭泣其根在心欖礬石主之白朮為之佐方
空青　當歸　各貳分　細辛　壹兩　蝟皮　斑猫
枸杞根　地膽　各壹分　乾烏腦　參大豆許
右為散服方寸匕日三以酢漿服之
治浮沮漏方發於頸如兩指使人寒熱欲臥得之因思慮憂滿
其根在膽地膽主之甘草為之佐方
雄黃　乾薑　地膽　石決明　續斷
菴蕳根　龍膽　各參分　細辛　貳分　大黃　半分　甘草　壹分
右為散付之瘡日四五度
治瘰癧漏方發於頸有根令人寒熱此得新沐汗流於頸根在背
雄黃主之芎藥為之佐方
茯苓　續斷　乾地黃　空青　礬石
乾薑　桔梗　柏山　虎骨　炙
狸肉　烏腦　斑猫　各壹　礬石　貳　附子　壹兩
右蜜丸以酒服十丸如大豆日三
治脉漏方發於頸濯濯脉轉振振熱得之因觸寒犯其根在小
腸斑猫主之白蘞為佐方
綠青　大黃　各貳分
麥門冬　白朮　各壹　人參　當歸　桂心　各貳兩
防風　蛇膽　升麻　鍾乳　甘草
續斷　麝香　礬石　各壹

靜嘉堂文庫所藏

右蜜丸酒服十丸如大豆日三服勿食菜慎房百日

治九漏方

空青　商陸　知母　狸骨　桔梗　防風　茯苓

礬石　白芷　芍藥　斑狸　木　礜石　等分

右蜜丸以酢服如大豆三丸三十日知四十日愈六十日平復

一百日慎房室

又方

蝟皮一枚　蛇　附子　當歸　蜂房　地榆

桂心　通草　乾漆　薏苡人　蕤核子　牡丹

漏蘆　龍膽　土瓜各叁分　斑猫　蜘蛛

大黃　雄黃　藺茹　細辛　蛇蛻皮　各貳分

鶴骨參分　鯪鯉甲　樗雞各肆分　蜥蜴　蜈蚣一枚

右為散酒服五錢匕以知為度日二服

灸漏法

葶藶子壹合　豉壹升和擣令極熟作餅如錢大厚二分許取

一枚當瘡孔上作大艾炷如小指大灸餅上三炷一易三餅九

易日三隔三日復一灸之

治風漏及鼠漏方

赤小豆　白斂　黃耆　牡蠣　各等分

右以酒服方寸匕日三

治鼠漏瘡差復發及不差出膿血不止方

右以不中水猪脂㕮咀生地黃內脂中令其脂與地黃足相淹

和煎六七沸桑灰汁洗瘡去惡汁以地黃傅瘡上日一易

治鼠漏方

得蜥蜴所螫大鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗自瘥

遇耳并付瘡中酒服

又方

死鼠一枚中形者　乱髮如雞子大

右以臘月猪脂取令淹鼠髮煎之令其鼠髮消盡膏成分作

二分稍稍付瘡二一分稍稍以酒服之則差矣鼠子當從瘡中出

靜嘉堂文庫所藏

出良秘方

治鼠瘻腫核痛未成膿方

右以栢葉汁著腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消驗良

治寒熱瘻癧及風瘻曾青散方

班猫　芫青各五　曽青　荏子　礬石　附子各半

當歸　防風　栝蔞　芎藭　黄耆　黄芩

狸骨　甘草　露蜂房各貳　細辛　乾薑各一

右爲散以酒服一方寸匕日再服

治寒熱瘰癧散方

連翹　土瓜根　龍膽　黄連　苦參

栝蔞　芍藥　恒山各壹

右以酒服五分匕日三服

又方　以狸頭一於炙篩爲散且飲服方寸匕日二

治身躰有熱氣瘰癧及常有細瘡及口中生瘡方

石龍芮　黄耆　芍藥　黄芩　鼠李子皮

苦參　白斂　防風　龍膽　栝蔞各壹

枝子人肆兩　薔薇根參兩

右服知梧桐子大十五丸日二再服蜜丸酒服

治蟻瘻方　取鯪鯉甲參柒枚燒末猪膏和付瘡上

治漏方

鍛落鐵屑　狗頰車齒骨炙　虎糞乾曝　鹿皮合灰

右件等分擣羅以猪膏和內瘡中須臾易之日五六度

治蟻漏方

取大紫萆薢新瓦坯土令赤以苦酒浸坯土時合壁土故熱以當醋著壁土上屢轉令熱以傅瘡上

治癰疽膿血內漏諸漏壞敗男發背女乳房及五痔猬皮散方

蝟皮　蜂糖各壹　地榆根皮　附子　桂心　當歸

續斷各參　乾薑　椒　藁本各肆　厚朴陸分

靜嘉堂文庫所藏

右以為末空腹以酒服方寸匕日三取差加班猫七枚良

青龍五生膏主癰疽寿漏惡瘡膿血出皆以導之方

生梓白皮　生龍膽　生桑白皮　生青竹茹　蜂房
雌黄　雄黄各鞋　生梧白皮　狸皮　蛇蛻皮各壹
蜀椒　附子　芎藭酪壹

右細切以三年苦酒二升浸藥一宿放炭上炙熬擣下細篩以豬脂二斤半於微微火上煎絞令相得如飴著新未中水白器盛稍稍隨病深淺付之并以清酒服如棗核良

治鼠瘺蒸熏瘡五白膏方

取白雌馬羊猪犬雞屎各一斤研絹篩之以豬膏一升三合前亂髮二兩半令極消尽乃內諸末微微火上煎五六沸藥成先去瘡痂以塩湯洗拭乾然後付膏若無痂猶須湯洗日再上膏常以鳥翼上勿令手風令也神驗

瘰癧方　白疆蚕為散水服五錢匕日三服十日差

又方　於瘻之背兩邊腋下後隨年灸

又方　灸耳後髮直脉七壯

又方　改鞋內穅替燒末五匕和酒一升日一向日服之強行還更吐鼠出三朝服

又方　狸頭蹄骨等衣黄擣篩為散飲服一錢匕

又方　猫兩眼睛乾燒灰井花水服

又方　乾猫舌末傅瘡上　狼屎傅之亦良

又方　狐頭狸頭灰傅上　又方猫腦苦藥等分著孔中

又方一切瘰癧在項上及髑觸但有空結擬作瘻及癰癤者皆以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷稱蒜大小帖癧子上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯易蒜日日灸之取消止

諸瘻方

灸瘻周四畔即差。又方七月七日日未出時取麻花五月五

日取艾等分合擣作灶用灸瘡百壯。又方霜下瓠花曝乾末傅之。又方死蛇去皮肉取骨末之合和豬胆封瘡上即大痛以杏子人膏摩之止。又方死蛇和臘月豬胆合燒作灰末之内孔中。又方燒死蛇蛾末醋和塗死蛇灰和傅

蛇瘺方

治頭灰傅之。又方人屎蛇蛻灰臘月豬膏和傅。又方蜂窠灰臘月豬膏和付孔中

蟻瘺方

蜻皮肝心灰末酒服一錢匕。又方死蛇腸中鼠臘月豬胆煎令焦去滓付之。凡蟻瘺孔容針亦有三四孔是

治蜂瘺初生時狀如雞而痒搔之則引大如雞子如覆手者方

出窠塊裂之宿四日一个差至百日成瘺其狀大如四五寸巴豆三十中生蜂作孔乃有數百。灸法以石流黄隨多少燃燭燒令汁出著瘡孔中須臾間見蜂數千唯蜂尽乃差

治瘺結瘺　搠葉灰先以甜清煮搠葉取汁洗拭乾内瘡中

治撓蛾瘺方

牛屎灰和臘月猪脂傅之。又蜣蛾九末傅即蜣蛾所食屎也。又乾牛屎末傅痒即更厚傅差乃止。又熟牛糸塗之

有蚯蚓瘺方　蚯蚓屎雞屎末之亦用社猪頷髓傅之

有喝瘺　五孔皆相通是檐芽根汁著内孔中

有瘭斑蕨蟙者横門作頭狀若蚕子形亦作瘭瘢方

雄雞屎灰臘月猪脂和付之

有如石兩頭出者其狀堅實令寒熱方

以大鈹針破之鼠粘草二錢末和雞子白一枚傅之　。又方

檐榄子和井花水傅之

蝦蟆瘺方　五月五日蛇頭及野猪脂同水衣傅之佳

有蛇瘺方　蛇蜕皮臘月猪脂和傅之

有顛當瘺　檐木瓜根付至差慎口味

靜嘉堂文庫所藏

有雀瘧方　取丑豬屎灰和臘月豬脂傳虫出發作形
有膿瘧方　桃花末和豬脂塗之佳
凡諸惡瘧中冷息肉炙足踝上各三壯二年者六壯。又方故
布裹塩如彈丸燒令赤末酒服。又方服白馬尿汁一升
又方正月雄狐屎陰乾杵末水和服。又方　塩麪和燔灰付之
又方水研杏人服之。又方豬脂一升酒五合煎沸頓服之
几一切瘧燒吐出蛔蟲灰先以甘草湯洗瘧後著灰無不差
填味
九漏方
班猫柒拾枚去足翅熬　蝟皮炙　真珠　雄黃各拾分
右四味擣篩酒服半錢七日三　。又方未成鍊松脂填瘡
孔令滿日三四度七日差大神驗
又方　班猫貳柒枚去足翅　雄黃　桂心　犀角各壹兩
右四味擣篩酒服一錢七病從小便出日二。又炙肓井二百壯

又方
右件為末臘月猪脂和先以暖酒清洗瘡拭乾傳曰二
又方　乾牛屎
右二味擣先幕綿瘡上綿上著屎蟲聞屎香出若乃痒
即與綿去之更別取屎綿著如前法候蟲出盡乃止
又方　苦瓠四枚大如盞者各穿孔如指大置湯中煮十數沸
取一竹筒長一尺內一頭塞孔中一頭注瘡孔上令則易之徧止
腸癰方第二　乾人屎　乳癰附
治卒得腸癰而不知其病候愚醫見之錯則殺人腸癰之為病小
腸重而強挌之則病小便數似淋時上汪出後惡寒其身古皆甲
錯復皮急如腫狀其脈數者中有膿也其脈遲緊者未有膿也若
著腹股大轉側聞水聲或遶臍生瘡或膿從臍中出或大便出膿
血迫治之灸法　在兩肘正灸肘頭銳骨各百壯刺下膿血取差
又方　大黃肆兩　牡丹壹兩　桃人拾枚去皮尖　冬瓜人壹升　芒消貳兩

靜嘉堂文庫所藏

右以水三升煮取一升頓服之當下膿血也

治腸癰湯方

牡丹　甘草　敗醬　薏苡人　桔梗　麥門冬酚參皿參　芍藥酚肆　生地黃酚肆

右以水一斗煮取三升分三服日三　○又方

薏苡人酚壯升　桃人酚參　瓜瓣人升貳

右以水六升煮取二升分再服

又方　雄雞頂上毛并屎燒末空心酒服之

又方　截取襟頭犬火許燒灰和水服當孔出膿血愈

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛感遶臍有瘕如棗皮熱便膿血出似赤白下必死矣

又方　苡子參升擣末碎以水三升煮取一升五合分三服

又方　死人塚上土和泥塗之　○又方馬牙灰和雞子塗之乾則易之　○內癰未作頭者服雞屎即差

治妒乳乳癰方

產後宜勤濟乳不宜令圖畜積畜積不去便不復出惡汁於內引熱濕壯結堅牽疼痛大渴飲乳急痛手不得近成妒乳非癰也

治妒乳急矣兩手魚際各二七壯漸癰脉也不復手近乳汁汙白出便可手助定持之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯自下外以小豆薄傳之便差

產後不自飲兒并失兒無兒飲乳畜喜結癰其不飲兒令乳上者以雞子白和小豆散傳乳房令消結也若飲兒不泄者數慈去之亦可令大老子含水使三中令均嘬取乳汁吐去之不令水嘬熱去喜令乳頭作瘡乳孔塞也

婦人乳生創頭汁出疼痛欲死不可堪鹿角傳方

鹿角參分　甘草壹分炙

右二味杵羅令細和以雞子黃於銅器中盲於溫處炙上傳日再即愈神驗不傳

靜嘉堂文庫所藏

婦人乳腫痛一个除蒺藜丸方
蒺藜　大黄各四分　敗醬癰　桔梗　人參
附子　薏苡仁　黄連去毛　黄耆　雞骨
當歸　枳子　芍藥　通草各參分
右以擣蜜丸未食以飲服如梧子三九一不知益至五丸日三無所忌

葱乳癰連翹湯方
連翹　亡消各二兩　芍藥　射干　升麻　防已
杏人去皮尖　大黄各參分　柴胡　甘草各參兩
右以水九升煮取二升五合分三服。又方以蒲黄半合以度從乳上行炙熨頭三七壯。又方取裘葉擣篩飲服方寸匕日三即愈

妬乳乳腫方
取研米搥二枚炙令熱以絮及故帛揖乳上以槌更手熨之差

十已用立驗
乳癰堅方　以水灌中成醋泪清燒石令熱內中沸止更燒如前少熱內乳漬之冷更燒石內漬不過三燒石即愈。又方
黄芩　芍藥　各等分
右以漿水飲半錢止日三服若左乳汁結者即將右乳汁去也若右乳汁結者可將左乳去汁將散即消

婦人乳堅方
當歸　黄耆　附子炮　雞骨　蒺藜子
枳殼各參分　桂心貳兩　薏苡仁　人參　芍藥各壹兩
右擣篩為散酒服方寸匕日三

乳癰始作方　大黄　練子　芍藥　馬蹄炙
右等分擣篩飲服方寸匕取汁出差

排膿散主乳癰方
慈菰　鐵精　桂心　細辛　黄參　防已

靜嘉堂文庫所藏

芍藥　人參　乾薑　芎　當歸各參分　甘草炙分
右以擣篩為散酒服方寸匕日三夜一服藥十日膿血出多大
怪之其惡肉除也
又方　擣生地黃汁三升　竹瀝消參合　豉壹升
右三味薄之熱即易之取差止一切癰腫皆用之
治妒乳乳生瘡方
蜂房　猪甲中土　車轍中土等分
右末苦酒和傅之
治乳癰方
大黃　茵芋　生薑各貳分　伏龍肝拾貳分
右擣末以酢和塗乳痛即止有效一方云生薑極驗可用薑也
又方　以鹿角下篩以猪脂上清汁服方寸匕不過卅服亦可酢漿水服
論曰凡女人多患乳癰年四十已下治之多差年四十已上慎不治治之多死不治自得終天年

治乳癰方　大黃　鼠屎新者各壹分　黃連貳分
右擣黃連大黃末合鼠屎共治以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟粳米亦得
治乳癰二三日衆治不差但堅鞕色青柳根削去上皮擣令熟熬令温盛著練囊中熨乳乾易
柳根削去上皮擣令熟熬令温盛著練囊中熨乳乾易
一宿即愈
婦人女子乳頭生淺瘡癢搔之黃汁浸淫為長百種治不差者動經年月名為妒乳婦人飲兒若乳皆欲斷也謂苟少乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之博二物飛烏膏及飛烏散佳若始作者可付黃蘗漏蘆散及黃連朝粉散又方燒自死蚰灰脂膏和塗良赤龍湯方
槲樹皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之冬温用之分以洗乳亦洗諸敗爛久瘡洗竟付膏散

靜嘉堂文庫所藏

天麻草湯洗方
天麻草切五升以水一斗半煮取一十二升隨寒熱分洗乳以殺痒也此草葉如麻氣冬生莖著花赤如鼠尾花也亦以洗浸淫黃爛熱瘡痒痛濕蝕瘡及小兒頭瘡洗竟傳膏散

飛烏膏散方
用燒朱砂作木銀上黑煙名傾粉者叁兩　礬石叁兩
右為末以甲煎和之如脂以傳乳瘡日三傳作散者不須和汁自著者可用散以傳諸熱瘡黃爛瘡浸淫汁痒丈夫陰蝕痒濕瘡小兒頭瘡口邊肥瘡

黃連胡粉膏散方
黃連貳兩　胡粉拾九　水銀壹兩
右以黃連為末以三物相和炙皮果熟投之有和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傳乳瘡諸溫瘡黃爛照瘡等若乾著甲煎為膏

治小兒頭生小瘡浸淫痒黃膏出不生痂疥連年不差者亦名蛀頭瘡以赤龍湯及天麻湯洗之內服漏蘆湯下之宜傳飛烏膏散及黃連胡粉水銀膏散

腸痔方第三

治痔方
蝟皮壹具　礬石　當歸　連翹　乾薑
附子　續斷　黃耆叁兩　乾地黃五兩　槐子三兩
右飲服如梧子大十五九日再加至四十九亦治血蜜丸
又方　取生槐白皮　十兩　熟擣丸如彈丸綿裹內下部中此病常食葅竹葉及煮麥粥大佳
治穀道痔痛繞緣腫起裹許欲生肉突出方
槐樹白皮陸升
右一斗汁煮取二斗浸故帛薄之熱即易之
治穀道痔痛痔瘡槐皮膏方

靜嘉堂文庫所藏

槐皮　練實 洛佰兩　甘草　白芷
桃人 陸拾枚　當歸 三兩　赤豆 二合
右以成煎猪膏一斤微火煎白芷黃藥成摩瘡上日再并導
下部
治痔下部出膿血有蟲旁生孔竅方
槐白皮壹擔對內釜中水煮令味極出置外器適寒溫坐其中
欲大便狀蟲悉出冷又易之不過二三即差
治痔
取槐耳赤雞一斤治末服方寸匕日三即是槐攜也
治五痔有氣痛寒溫濕勞即發蛇蛻主之壯痔生肉如鼠乳在
孔中頭見外妨於更衣鼈甲主之酒痔從孔中起外腫五六日
自潰出膿血猬皮主之腸痔更衣挺出久不縮毋猪右足懸蹄甲
主之脉痔更衣出清血蜂房主之藥皆下篩等分隨其病倍其
主藥為三分且以井花水服半方寸匕病甚者暮服之亦可四五
服禁公食猪肉生魚旁肉唯得食乾白肉病差之後百日令通旁
內又用藥導之下部有瘡內唯得乾白肉病差之後百日令通旁
刀圭內藥中服藥五日知二十日若愈痔病通忌薺菜也
治五痔一曰牡痔二曰酒痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔
牡痔者肛邊如鼠乳時瀉清膿出酒痔者肛腫痛生瘡脉痔者
肛邊有瘡痒痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨
便污衣衆醫所不治神方
雷丸　重蟲 洛半兩
葉本 貳兩　石南草
紫參　亂髮燒　紫苑 洛壹
蜚虫 洛半兩　貫衆 參兩　猪後懸蹄 雞
一右合擣下篩坐髓腊前和服如梧子十五丸日二若劇者夜
一服四日肛邊痒止八日膿血不見乳悉差滿六十日終身不
復發也久服益善忌魚猪肉等 ○又方 取槐根煮洗之
又方用桃根煮洗之
治痔方　蝟皮 方三指大切　薑黃 棗大　孰艾 雞子大

靜嘉堂文庫所藏

右穿地作孔坑調和取便薰之口中薑黃煙氣出為佳火稍
尽即停、三日將息更薰之凡三度永差勿犯冷羹臛將補
猪雞等填

治穀道痛方　兎絲子熬黃黑和雞子黃以傅之日三。又方
取杏人熬令黃擣作脂以付之

治大便卒痛如鳥喙方

以大小豆各一斗和擣內兩倪中蒸之令熱更于坐之差

治痔方　以蒲黃服方寸匕日三良妙

槐子丸主燥濕痔痔有雌雄皆主之方

槐子　干漆　茱萸根白皮㕮咀　秦膠　白芷
桂心　黃芩　黃耆　白斂　牡厲　龍骨
雷丸　丁香　木香　附子　蔌梨子各貳兩

右十六味蜜為丸飲服二千丸如梧子日三
小槐子丸主五痔十年者方

槐子貳斤　白糖貳斤　礬石燒　研黃各壹斤
大黃　乾漆　龍骨　各拾兩

右七味擣篩四味二種石及糖並細切內銅器中一石米下蒸
之以綿絞汁以和藥令作丸併手丸之大如梧子陰乾一服二
十丸日三酒服

槐子酒主五痔十年不差方

槐東南枝鉤取石　槐皮切壹石　槐子壹分
槐東南根鉤取石

右四味以大釜中十斛水煮取五斛澄取清更煎取一石六斗
炊二石黍米麴二斤釀之攪令調封泥七日酒取清飲適性
常令小小醉令更煮粟淖淘米洗器不得生水須知此事忌生
水故也。又方塗雄膽取差止神良一切方皆不及此

神方主痔七月七日多採槐子熟擣取汁重浸絞之內銅器中著
宅中高門上曝二十日上日前成如鼠屎大內谷道中日三易
主癢百種瘡

靜嘉堂文庫所藏

又方　取三具鯉魚腸以炙香以綿裹內穀道中一食久須更
蟲當出食魚腸數易之尽三枚差一方名腸令香坐上虫出
經用有効

又方　虎頭　星角末
右二味各末之如雞子大和不中水猪胆大如雞子塗之瘡上
治久痔方

生朱　雄黃　雌黃各壹兩　竹灰酥　猪膏壹斤
右末內猪膏中和調後藥煎用和乱髮切半雞子大東向煎
三上三下髮燋出湯洗拭乾付之前藥
治寒熱瘡及風疥諸雜瘡方　齊癬方第四代指　癰瘍疵　白癜附

千年非根　白礬　雄黃　藜蘆
瓜蒂　水銀　胡粉
右以栁木研水銀使尽用猪胆一升煮藜蘆非根瓜蒂三
沸去滓內諸藥和調相得即成以付袖良
聞莽膏方

蘭茹　狼牙　青箱　地榆　藜蘆　當歸
羊蹄根　菴蕳根　白斂各貳兩　蛇床　白薇各六分　漏蘆貳分
右切擣以苦酒漬一宿明旦以成煎猪膏四升煎之三上三下
膏成絞去滓內後藥

雄黃　雌黃　硫黃　白礬　胡粉　松胎各貳兩
水銀參兩
右細研着水銀散尽即傾前件膏中以十隻筋攪數百徧止
用瓷器貯之密舉勿令泄氣煎膏法必微火急即不中用一
切惡瘡疥疽漏瘑悉付之不可近目及陰先研雄黃等令細徧
膏小冷即和攪傳之

治疥疽方

水銀　胡粉各壹分　黃連　黃檗各拗　礬石

附子　蛇床子　苦參各參分

右水銀胡粉別研苽泥餘末以成前猪脂令研和調以傅之凡瘡疥小秦艽散駕蛇肉二兩主之黃耆酒中加烏賊脯一尺亦大効

治凡有瘡疥腰胯手足背生疱疥者方

薔薇根剉　黃連　石龍芮　苦參　當歸　續斷略壹　括蔞根兩

右蜜丸如梧子大以薔薇飲服之二十九日三加至三十丸瘡疥差乃止乾疥白癬勿服

治久疥癬方

丹砂　雄黃　白蜜略壹兩　蘭苽參兩　巴豆拾肆　猪脂貳升

右先煎髮消尽內松脂蜜三上三下去滓內諸末中更一沸止以傅之

又方　水銀　礬石　蛇床子　黃連各壹兩

右為末以猪脂七合和攪不見水銀為度傅之一方以加梨蘆一兩

治諸瘡疥癬治不差者方

水銀壹斤　猪脂五斤

右以鐵器中用馬通火七日七夜勿住火出之傅冷取膏去水銀不妨別用以膏傅一切瘡無不應手立差

又方　取特牛屎一斗　羊蹄根切伍升

右和宿浸日曝乾取汞尽止作末傅諸瘡等諸疥蟲皆單以水銀猪膏研細傅之

又方　拔取生烏頭十枚切煮汁洗之差

治癬方　洗取醬豆雀屎和傅之差止

又方　水銀無美和酥傅之。又方日中午時擣桃葉汁付之

靜嘉堂文庫所藏

又方　日中時灸病處影上三壯灸火呪曰癬中蟲毛戎々若欲
治待日中
凡諸瘡癬初生時或痛痒即以種種單方救之或嚼鹽傅之
取桔樹汁傅之。又以蒜墨和傅之。又以薑黃傅之。又以
鯉魚鮓糝傅之。又以牛子屎汁傅之若微以此救不差乃
以前諸大方治之也
治諸濕癬肥瘡用前大麻䔉傅之五日差
治細癬方
蛇床子　白鹽　羊蹄根各壹　赤葛根　苦參
菖蒲各半　黃連　茵草　各叁兩
右水七升煮取三升適寒温以洗身々如炊一石米頃為佳清
澄後用當微温之滿三日止
又方
羊蹄根於磨石上以苦酒磨之以傅瘡上當先刮傷以
火灸乾後傅四邊

瘑瘡方　凡一切瘑瘡灸足大指奇間二七壯。又方醋一升炒
韮一把傅之　又方擣桃葉和鯉魚鮓糝封之　又方以鯽
傅之　又方炒臘月糖傅之　又方灸大指頭亦佳
凡瘑瘡常相對生々在手足隨月生死　又方燒故履系末傅
又方燒松根取脂以塗之
燥瘑方　醋和灰塗之　又方熱牛屎塗之
濕瘑方燒乾蝦蟆猪脂和傅之　又方　以羊蹄根五升以桑
柴灰汁煮四五沸以洗之　又方桃皮貳兩去上青末以苦
酒和傅上日二度　又方諸桑樹白汁傅瘡上一　又方
菖蒲末五兩以酒三升漬釜中蒸之使味出先絶酒一日一
服一升若半升　又方用乾荊子燒中央兩頭取汁傅之先
刮瘡上令傷後傅之
治小兒癬方　以蛇床子擣末和猪肝以傅之
治蠶痒方　以水銀和胡粉以傅之

靜嘉堂文庫所藏

治身躰搔痒白如癬狀方

楮子叄枚　猪胰一具　皂莢一挺

右以苦酒一升合擣[illegible]日三

惡瘡似火爛洗湯方

白馬屎曝乾以水[illegible]之下篩絞取汁洗之

惡瘡十年不差似癩方　蛇蛻皮一枚燒之末下篩以猪脂和傅之

又方　苦瓠一枚㕮咀煮汁洗瘡日三又煎以塗癬其良皆先以泔淨洗癬乃塗三已差

治代指其狀失腫痛[illegible]熱痛色不黯緑爪甲[illegible]結膿則者爪甲皆脫

右以瓮和白礬[illegible]作[illegible]着[illegible]以爪指著中一日差○又方[illegible]上[illegible]指上令厚五分[illegible]過數徧差○又方　單煮[illegible]削作[illegible]刺去

膿血灸魚鮓皮令温以纏裹周匝痛止便愈　又方以𣙜回合水一升煮三沸以漬之　又方取萎蕤葉煮漬之　又方以甘草貳兩水一升漬之若先用芒消代之但得一物令藥汁搯之

瘰瘍方

以三年醋磨烏賊骨先布摩肉赤傅之　又方取途中先死蜣蜋擣爛塗之當揩令熱宿差

又方　硫黃　雌黃　檞皮燒　蛇蛻壹具燒

右四味等分擣篩以清漆合和之薄塗白癜欲塗時以巴豆半截拭白癜微破然後傅之不過兩三度

又方　硫黃　水銀　礬石　竈墨

右等分擣篩內坩子中以葱葉涕和研之臨臥時傅病上

九江散主白癜風及二百六十種大風方

當歸　石南　躑躅　秦膠　菊花

乾薑　防風　雄黃　麝香　丹砂

靜嘉堂文庫所藏

班猫各三　蜀椒閉口去目及鬼箭　連翹　石長生
知母各捌　蜈蚣三枝　全蠍　地膽各十　附子四兩
鬼臼炙　人參　獨活　木防己　茵草各十二分　水蛭百枚
烏頭炮　天雄炮　王不留行
石斛　天雄炮　白蘞　又方
右三十味諸虫皆去足翅熬令熟為散以酒服方寸匕日
再甚病入髮令髮白服之百日愈髮還黑　又方
生當陸　蜘蠋各壹升　黃芩略三　乾薑肆兩　附子壹兩
右七味擣篩為散酒服五錢匕日三
又方　礬石硫黃等分為末酢和傅之　又方以酒服生胡麻
油一合日三稍〻加至五合慎生冷猪雞魚蒜等百日服五
升差　又方羅摩草煮以拭之　又方以蛇蛻皮熬摩之數百
過弃置草中又方以水銀拭之令熱即消差不數〻拭之差
乃止

大風惡疾方第五

論曰惡疾大風有多種不同初得偏躰無異而眉髮已落有偏躰
已壞有驗懸然有諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手足
十指已有墮落有患四躰大寒而重衣不暖者尋常患熱不能暫
涼者百躰枯槁者有津汗常不止者有身躰乾痒徹骨壞之白皮
如麩手下作瘡者有瘡痍茶毒乃蟲出生晝夜苦痛不已者有直
置頑鈍不知痛痒者其色亦有多種有青黃赤白黑光明沾暗此
候離種狀貌不同而難療皆在前人不由醫者何則此病一者無問賢愚皆難有与醫者何則此語四慎心違不受醫教直
希望藥力不欲求己百餘人差者十分有一莫不一一親自撫養所
以深細諳委之

論曰神仙傳有數十人皆因惡病而致何者由割棄塵累懷頽
陽之風所以非止差病乃因禍而取福也故曰所觀者其中頗有
士大夫乃至有異乳名人及遇斯患皆委縣妻妾子孝心髓不能割

靜嘉堂文庫所藏

捨直草藥力未肯求諸身若能絕嗜慾斷其所好非但病愈因茲亦可自致神仙吾問諸病一皆自作不仁之行各並為極猥之業於中仍欲更作云為雖悔言而無悔心但能自親受教命食進藥餌何有不除吾以貞觀年中將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之唯須求之於己不可一仰醫藥者也然後其人數患身體頑痺於差後私見妻妾不告師令知其後病或狀貌分明乃云犯藥卒患此皆自誤然此疾也雖大療之於微亦可即差此疾入得遠者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者自謂百年不死深可悲悼一遇斯疾即須斷鹽一切公私物務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷谷不交俗事絕乎慶弔幽隱巖谷周年乃差差後終身慎房犯之還發茲疾有吉凶二義得修善即吉還同俗類是凶今略述其由致以後之學者可覽而思正焉

苘豆療惡疾方

紙粒烏豆擇取摩去皮不落者取三月四月天雄烏頭苗及根淨去土勿洗擣絞取汁漬豆一宿漉出曝乾如此七反始堪服一服三枚漸加至六七枚日一禁房室猪魚雞蒜畢身毛髮即生犯藥不差

岐伯神聖散治萬病癰疽疥癩風痿骨肉疽敗百節痛眉鬚髮落身體淫淫躍躍痛痒目痛爛眥耳聾齒齲痔瘻方

天雄　附子　茵芋　躑躅　細辛

烏頭　石南各一　椒　乾薑　防風各二

菖蒲　朮　獨活各三

右擣篩散服方寸匕日三勿增之

惡疾狼毒散方

狼毒　秦艽等分

右擣篩酒服方寸匕日三五十日愈　又方　練松脂投冷水中二十遍蜜丸服二兩飢便止日三鼻柱斷離者二百服之差

並斷鹽及雜食房室　又天門冬酒服百日愈

靜嘉堂文庫所藏

石灰酒主生毛髮長鬚眉去大風疾

石灰一石[illegible]濕[illegible]蒸令氣足　松脂成煉伍斤和之

上麴一斗二升　黍米一石

右先以大鍋炒石灰以木札著灰中火出為度以枸杞根剉

五斗水一石五斗煮取九斗去滓以淋石灰三徧澄清以

石灰汁和漬麴用汁多少一如釀法訖封四七日開服常令酒氣

相及多少[illegible]忌不得觸風其米泔及飯糟一事已上不得

使人畜犬鼠食皆須深埋却此酒九月作二月止恐熱隔　上麴者服

後進三三二二合飲嘔之婦人不能飲酒黃瘦積年及蓐風不過

一石即差其松脂末初酘酒摊飯時均散著飯上待飯冷乃

投之

孫真人千金方卷第二十四

孫真人千金方卷第二十五　雜方

解食毒第一　百藥毒第二　五石毒第三

蠱毒方第四　胡臭方第五　脫肛方第六

瘤癭方第七　癩病方第八　妬精　陰瘡　小兒癩

解食毒第一

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中其毒素不知方多遭其斃豈非枉橫也然而大聖久設其法以救養之正為貪生嗜樂所以不學一朝逢遇便自甘心竟不識之所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉 論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒葱湯下咽便愈中野葛毒土漿飲下訖而止如此之事其驗如反掌人皆不肯學之誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒試之大懸絕不及甘草有人服玉壺丸吐嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此則成規更不須試練也解毒方中條例

極多若不指蹉二孝有一可卒知餘方例尔治諸食中毒者唯
黃龍湯及犀角汁二九不治也飲馬尿亦良　治食魚中毒黃橘皮
湯停冷飲之立効　治食魚鱠及肉生在胷間不化吐不出成瘕瘕方

大黃三兩
厚朴
右二味以酒二升煮取一升尽服立消人強者倍之更用三兩酒
取二升再服之

治食鱠不消春馬鞭草飲汁一升即消去也生薑亦良
又鮓魚皮水服之無完皮還刃裂取之也　一名鮸魚皮
治中射肉補毒未具于水服如豆佳无不差又治苦毒也食麪臛
中毒并同　治麪肉作麪臛肉食已下方服犀角末方寸匕立驗
治諸牛肉毒方　猥不及水服良　又温湯服猪胎良
治牛馬肉毒方　飲人乳汁良
凡六畜肉毒水服雞冠血底黃土方寸匕
凡百獸肝毒損眼猪胆一斤佳

治陳肉毒　凡食鴨肉成病胷面赤不食服秫米汁
治濕脯毒　搗韮汁服之良　又大豆汁良
又麪鮓肉濕脯毒　燒狗屎末服方寸匕水服
治脯在黍米中毒方　麪亦良
右水一升塩兩撮服之
治食鰒中毒方　冬瓜汁服二升亦可食冬瓜
治食山中菌毒方　人屎汁服一升良
治六畜肉中毒方　各取六畜乾屎末水服之佳若是自死
六畜肉毒水服黃蘗末方寸匕須臾復與佳
又方　燒小豆一升末服三寸匕尤良
治食生肉中毒方　搗地深三尺取下土三升
右以水五升煮土五六沸取上清飲一升立愈　神
治食馬肉血下欲死方　杏人貳百粒
右�咀蒸之五升飯下飯熟搗之再服令尽

靜嘉堂文庫所藏

又方　盧根汁飲
又方　以浴即解
治食狗肉不消心中堅口乾大渴心急發熱狂言妄語或狂者或
啊下万　耽杏人壹升
右合皮研以沸湯三升和分三服狗肉皆完片出即靜也良驗
百藥毒毋第二
惡氣瘡毒用犀角羚羊角雄黃麝香喉腫邪氣惡毒入腹用升麻
夜干風腫毒用五香及紫檀百藥毒用甘草蒴苗大小豆汁藍及
實研汁皆解射菌毒用藍汁大小豆竹瀝大麻子汁金雷血貝齒
屑蛆蚓屑藕汁並解之亦
治野葛毒　用雞子汁甘草汁鴨頭熱血溫豬膏並解之
治班猫元青毒　用大豆汁白飲白及藍汁木占斯並得解之
黎盧毒毋　用椿
巴豆毒　用煮黃連汁大豆汁生薑汁豆蒲汁煮寒水石汁並解之

蹲躅毒挽子汁解之　○雄黃毒用防己解之
礬石毒　用大豆汁白鵝膏並解之
蜀椒毒
用葵子汁煮桂汁鼓汁人尿及冷水及飲土食菻雞毛燒煙並解之
大戟毒　用菖蒲汁解之
蜈蚣毒　用桑皮汁及煮根汁並解之
芫花毒　用防風甘草桂汁並解之
烏頭天雄附子毒　用大豆汁遠志防風東肉粘糖解之
杏人毒　用猪地漿以水沃中攪之令濁澄清飲之解
桔梗毒　用漿解之　○防己毒用葵根汁解之
鐵毒
用礪石解之　○雞子毒用淳酢解之
萇菪子毒　用黃芩甘草升麻犀角解之
野刃毒　用清水解之　○野羊毒以土漿及糞汁解之
解一切毒方　毋猪尿水和服　又水三升三合米粉飲之

靜嘉堂文庫所藏

解鴆毒一切毒藥不止解煩方
甘草 蜜 各肆 粱米粉 壹升
右三味水三升煑甘草取二升去滓歇大熱内粉攪令調内白蜜
煎令熟如薄粥適寒溫飲一升佳
治野葛毒方 用雞子三枚打破并呑之須臾吐出
又方 甘草汁令飲之 ○又方 服人屎汁三合佳
解諸毒雞腸草散方 雞腸草 叁分 薺苨 升麻 各肆兩
芍藥 當歸 甘草 各壹 藍子 壹合 壇土 壹分
右八味爲散水服方寸匕多飲水爲佳若爲蜂蛇等衆毒蟲所螫
以針刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕爲毒箭所中削竹
如釵股長一尺五寸以綿纏水沾令濕取導内瘡中隨瘡深淺
令至底止有好血出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止
治野葛已死口噤取青竹去兩節柱脇上内冷水注中暖即易之立
活唯須數易水

一切諸毒藥方 甘草 叁兩
右以水五升煑取二升内粉一合更煎又内蜜半兩服七合須臾更服之
鈎吻衆毒困欲死面青口噤逆冷身痺方
薺苨 捌兩
右一味水六升煑取三升冷如人體服五合日三服夜二服
又方 煑桂汁飲之噉葱涕治諸毒用煑葱唯令濃飲之二升佳
凡六畜五藏著草自動搖及得鹹酢不變色又墮地不汚又
與犬犬不食者皆有毒殺
凡肉汁在器中密蓋氣不泄者皆殺人
凡生肉熟肉皆不用深藏密蓋不泄氣皆殺人若中此毒取犬屎
水服方寸匕良 ○解野葛毒 雞屎汁解之
解金銀鐵毒方 以鴨屎汁解之 又煑葱汁服之
又方 雞屎白燒末以猪膽月猪脂和服之如小蒜大三丸
治腹中有鐵方 白炭刮取末井花水服三錢不過再服

靜嘉堂文庫所藏

治諸熱毒或蠱毒鼻中及口中吐血醫所不治方

右取人屎尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解百毒

時氣熱病之毒服已溫覆取汗勿輕此方極神驗

食金毒服水銀數兩即出 又方鴨血及雞子汁又水淋雞屎汁並解之良

食諸菜中毒方

以甘草貝齒胡粉三種末水和服之小兒尿乳汁共服二升亦好

飲食中毒煩滿者煮苦參汁飲之令吐出

食石藥中毒用白鴨屎解之人參汁亦好

服藥過劑悶亂者 吞雞子黃 又藍汁又水和胡粉又

土漿又蘘荷汁又粳米瀋汁又豉汁乾薑黃連飴

服藥忌食

服藥有巴豆勿食蘆筍羹及猪肉 有白朮勿食桃李及雀肉 日葱青魚鮓

有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉 有黃連桔梗勿食猪肉

有細辛勿食生菜 有茯苓勿食醋物 有甘草勿食菘菜

有藜蘆勿食狸肉 有牡丹勿食生胡荽 有當歸勿食犬肉

有恒山勿食生葱 有空青朱砂勿食生血物

服藥不可食肥猪肉犬肉肥羹及魚腥雞肉等物

服藥不可食生葫蒜雜生菜及諸滑物果菜等

凡服藥通忌見死尸及產婦諸厭穢事

解毒藥散方

薺苨 壹分 藍 貳分并花

七月七日取藍陰乾別擣和水服方寸匕日三服中毒者吞

鷰毛二枚和水二升服之差

解一切毒藥發不問草石始覺惡即服方

生麥門冬 葱白 各捌兩 豉 叁升

右三味以水七升煮取二升半分三服

治入井塚毒方

取他井中水灌身上至三食頃便差若東井取西井西井取東井南井取北井北井取南井

解五石毒第三

靜嘉堂文庫所藏

論曰人不服石庶事不佳惡瘡疥癬溫疫瘧疾年年常患寢食
不安興居常惡非止己事不康生子難育所以石在身中萬事休
泰要不可服五石也人年三十已上可服石藥若素肌肥充勿服
四十已上必須服之五十已上三年可服一劑六十已上二年可
服一劑七十已上一年可服一劑。論曰人年五十已上精華消竭
服石猶得其力六十已上轉惡服石難得力所以常須服石令人
手足溫暖骨髓充實能銷生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是
以大須服凡石皆熟煉用之。論曰凡食發當必惡寒頭痛心悶
發作有時狀如溫瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止一切冷
食唯酒須令溫其諸解法備如後說其發背癰疽腫方在第二十三卷中
凡服石人甚不得雜食口味雖百品具陳終不用重食其肉諸雜
既重必有相賊聚積不消遂動諸石但如法持心將攝得所石藥
為益善不可加余年三十八九嘗服五六兩乳自是來深深體悉
至於將息節度頗識其性養生之士宜留意詳焉然其乳必須土
地清白光潤羅紋鳥翮一切皆成乃可入服其非土地者慎勿服
之皆殺人甚於鴆毒紫石白石極須外內映徹光淨寒石五石更
生者散方。論曰舊說此藥方上古名賢無此漢末有何侯者行
用自皇甫士安已降有進餌者無不發背解體而取顛覆余自有
識性已來親見朝野仕人遭者不一所以寧食野葛不服五石明其
大大猛毒不可不慎有識者遇此方即須焚之勿久留也今但錄
主對以防先服者其方以從煙滅不復須存令人生為害也

解石毒散發諸方

鍾乳動术又動菰蔞其主肺上通頭胷术動鍾乳胷塞短氣鍾乳
動术頭痛目疼鍾乳雖不動海蛤海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣
有時术動鍾乳直頭痛胷寒然鍾乳与术可為患不過此雖所患不同
其源一矣發動之始要有所由始覺體中有異与患相應便速服此方

葱白半斤 豆豉貳升 甘草 人參各叁兩

右四味先以水一斗二升煮之作湯澄取八升煮藥三升分服纔服便

靜嘉堂文庫所藏

使人案摩搖動口中嚼物然後仰卧覆以暖衣汗出去之湯熱歇
已便溫餐壽撰樂脯而已若服此不解復服甘草湯方
甘草叁兩　桂心貳兩　豉貳升　葱白半斤
右四味合服如上法若服此已解脾家猶有客熱餘氣復服桂心湯方
桂心　麥門冬各叁兩　人參　甘草各貳兩　葱白半斤　豉貳升
右六味合服如前法
流黃動防風又動細辛其治主肺脾腎通至腰脚防風動流黃煩
熱脚疼腰痛或嗔忿无常或下利不禁防風細辛能動流黃流黃
不能動彼始賁發便服杜仲湯方
杜仲叁兩　枳殼　甘草　李核人各貳兩　梔子拾四枚　香豉貳升
右六味合服如上法若不能解復服大麥奴湯
大麥奴四兩　甘草　人參　芒消　桂心各貳兩　麥門冬半斤
右六味合服如上法若服此已解脾腎有餘熱氣或冷服人參湯方
人參　乾薑　甘草　附子壹枚　當歸各壹兩

右五味合服如上法
白石英動附子其治主胃通至脾腎附子動白石英煩熱腹脹白
石英動附子嘔逆不得食或口噤不開或言語難手脚痛疼如
覺宜服生麥門冬湯方
生麥門冬四兩　甘草　麻黃各貳兩　豉貳升
右四味服如上法不解更服大黃湯方
大黃叁兩　豉貳升　甘草貳兩　梔子三十枚　若煩加細辛五兩
右五味服如上法頻頻服之得下便止不下非盡若熱勢未除視
瞻高而患渴復服瓜蔞湯方
生瓜蔞　大麥奴各四兩　甘草貳兩　葱白半斤　豉貳升
右五味服如上法稍稍一兩合服之隱約得一升許便可食少糜動口
若已解胃中有餘熱復服芒消湯方
桂心　芒消各貳兩　朮壹兩　李核人　通草　甘草各叁兩　大棗貳拾枚
右七味合服如前解鍾乳湯法若腹脹去芒消用人參貳兩

靜嘉堂文庫所藏

紫石動人參其治主心腎脚人參動紫石心急而痛或驚悸不得眠洗惚忘誤失性發狂閉々欲眠或憤々欲瞋或差或劇寒熱耳聾目閉又防風雖不動紫石猶動防風則亦心痛煩熱頭強覺發服此人參湯方

人參 末酪參 甘草 桂心酪貳 細辛 壹兩 攷參升

右六味合服如上法若瞋盛加大黃々岑梔子若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯火炙發汗方

麥門冬 生去 甘草 酪參 人參 貳兩 攷貳升 菘白 半斤

右五味合服如上法溫淋暖覆牀下著火口中蠶吻使徧身汗一日便解若心有餘熱氣更服人參湯方

人參 防風 甘草 酪參 桂心 貳兩 生薑 六 各壹兩

右六味合服如上法

海蛤動瘈數涎蛤先發手足煩熱瘈數瘈數先發嗽寒清涕出宜服瘈數湯方

瘈數 甘草 酪貳兩 大黃 壹兩 梔子 擘四箇

右四味合服如解鍾乳法

赤石脂動桔梗動石脂心痛寒嗽手脚逆冷心煩悶赤石脂動桔梗頭痛目々與躰壯熱發宜溫酒飲之隨能否酒熱行則解亦可服麥門冬發則心急嗽骨節疼強或節々生瘡發即服菘白豉湯方

菘白 半斤 豉貳升

甘草 貳兩

右三味以水六升煮取二升半分三服

术動鍾乳术發頭痛目疼或术身壯熱解如鍾乳法附子動白石英亦動赤石脂附子發嘔逆手脚疼痛躰強骨節痛或項強面目滿發則飲酒服麥門冬動壯熱煩悶宜服大黃々岑湯取下方

大黃 黃芩 梔子人酪參 豉壹升 菘白 切壹升

右五味以水六升煮取二升半分三服

牡蠣發四肢壯熱心膜煩悶極渴治食宿飯臭酸肉及羹臭宿菜發者服梔子豉湯方

靜嘉堂文庫所藏

梔子 拾四枚 香豉 參升 甘草 參兩

右三味以水八升煎取三升八分三服亦可加人參蔥白夫食發宜服蔥白豉湯飲酒過醉服湯不解宜服理中湯方

人參 甘草 术 附子 名參 乾薑 貳兩

右四味以水六升煮取二升半分三服

瞋怒大過發宜服參湯情色過多發宜服黃芩湯將冷太過發則多壯熱以冷水七八升洗浴然後用生熟湯五六石灌之已食少暖食飲少熱酒行步自勞非熱大過發則多心悶時々食少冷食若夏月大熱之時散發動多起於渴飲多所致水和麪服之不差再服藥發或有宜冷或有宜飲酒不可一槩流黃鬱金石桔梗牡蠣茯苓此五物宜浴白石英亦可小浴其餘皆不宜浴赤石脂紫石英宜飲酒得酒即解浴法初熱先用暖水後用冷水浴々時填不可洗頭垂沐可以二三升灌之鬱金石發宜用生熟湯凡藥宜浴得解即佳不差乃可餘治茯苓發熱多攻頭以冷水洗身漬之

人衣服之後忽忽身體浮腫多是取冷過所致宜服檳榔湯方

檳榔 參枚 生

右擣碎水八升煮取二升分再服

若散發身體卒生瘡宜服生麥門冬湯方

生麥門冬 伍兩 甘草 參兩 桂心 貳兩 人參 壹兩 茯苓 拾兩 半夏 貳拾枚 生

右六味如解鍾乳湯法

若大小便祕塞不通或淋瀝溺血陰中疼痛此是熱氣所致熨之即愈熨法前以冷物熨小腹及以熱物熨之若便數此亦是取冷當暖將理自愈○若藥發下利者衣服故即斷能多益佳○鬱石發通身發熱兼口燥○不流黃發通身熱兼腰膝痛○赤石脂發心煩身熱頭痛目赤○桔梗發頭面熱○白石英發先腹脹後發熱○紫石英發不爾不熱○牡蠣發頭痛而煩滿熱○茯苓發動者去草藥乘力易盡石性沈滯獨住胃中故去數發欲服之時以絹盛散一匕著四合酒中搴

靜嘉堂文庫所藏

其口一宿之後飲盡之其酒用多少將養節度自如稽去此則藥石之熱俱用石不住胃由何由而發事甚驗

解散熨法

大麥熬令汗出燥便止勿令煙香去皮細擣絹篩以冷水和服之治服散勿發動宜服葱白湯方

豉壹升　葱白壹斤切

右四味切以水七升煮取三升分三服

又方

乾薑伍兩　甘草貳兩

右二味以水三升煮取一升去滓內蜜令和絞頓服之不差重服

解散除熱鴨通湯方

麻黃參兩　豉參升　白鴨通伍兩之證清取二升半汁

右六味以鴨通汁煮六升去滓內豉三沸分服五合若未覺體冷便少布其間若熱猶盛小便未通依服之不限五合但而便多耳

升麻　大黃　黃連　甘草　黃檗酯參兩　芍藥陸兩

白鴨通伍兩　黃芩參兩　梔子拾壹枚　竹葉切壹升　豉壹升

右十味取水三升先煮鴨通竹葉取二升去滓澄清取二升沐內諸藥取三升分三服若上氣者和蜜六合膜滿加石膏三兩下散法主熱發熱固方

黍米右三升作糜以成煎猪脂一斤和之令調勻宿不食旦空肚令盡之令飽晚當下神良不盡發更合服

又方

肥猪肉伍斤　葱　薤白切

合藥時宿不食頓服之令盡不盡旦更服

瀕患藥發數數患熱困下之方

猪肾壹具不令著水以火炙之取汁適寒溫一服三合二日夜五六服多至二升半二日當稍稍隨大便下

又方

依肥猪肉噉一升調如常法空肚頓服令盡少時腹中

靜嘉堂文庫所藏

雷鳴鳴定藥下也收取擣之很石

凡藥發瘡腫方

蔓菁子 熬　杏人　黄連 禾　胡粉 各壹兩　水銀 貳兩

右五味別擣蔓菁杏人如膏合研水銀投塗上日三夜一服

散發赤擘膏方

生地黄 己兩　大黄 壹兩　杏人 肆拾枚　生商陸 叁兩

右四味切醋漬一宿猪膏一斤煎商陸令黒去滓摩之日三服夜一服

散發生細瘡方　黄連　芒消 各伍兩

右二味以水八升煑黄連取四升去滓內芒消以布取帖瘡上數

數易之多少皆著之

散發瘡痛不可忍方　冷石 叁兩

右一味下篩粉瘡上即燥痛須臾靜定

蠱方第四

凡卒患蠱痢或赤或黒无多少此皆是蠱毒麁醫以斷痢藥

處之此大非也治中蠱毒止下血皆如爛肉令人心腹絞切痛如

物嚙若不即治蝕人五藏盡乃死驗之法欲知是蠱當令病人唾

水沈者是蠱不沈者非也

治之方　茜根　蘘荷根 各叁兩

右二味切水四升煑取二升頓服

又方　槲樹北陰皮 貳兩　桃根 壹兩　蝟皮 壹具炙

生麻子汁 伍升　亂髮灰 半兩

右五味先水四升煑槲皮桃根取濃汁一升和麻汁髪灰

一方寸匕令患人少食旦服 大麻一升須臾著盆水以雞翎擿

吐水牛涎犢胎及諸蠱並出

治蠱方　槲樹北陰皮去蒼皮大握長五寸水三升煑一升空

心服蠱蟲出矣

又方　蝟皮灰水服方寸匕亦出蠱

又方　五月五日桃白皮　大戟 各四　斑猫 壹分去足翅熬

靜嘉堂文庫所藏

右三味篩，旦空肚水一雞子許服八捻，用二指相著如開頭服之。若指頭相離，取藥太多，恐卻損人矣。

治蠱吐下血方

櫸皮（廣五寸長一尺）　蘆荻根（五寸如足大指）

右二味，以水二升煮取一升，頓服，下蠱矣。

治人中蠱，人有行蠱毒以病人者，若服藥知蠱主姓名，當使呼喚將去。凡中蠱毒之狀，令人心腹絞痛，如有物嚙，或吐血下血，不急治之，食人五臟，盡則死。診法：唾水中沈者是也。○凡欲知蠱主姓名，以敗鼓皮燒作末，服方寸匕，須臾自呼蠱主姓名，可語令去則愈矣（水服）。亦有似蠱合作蠱藥著食飲中與人者，唯此一種令人積年乃死。

有人中蠱毒，腹內堅如石，面目青黃，小便淋瀝，病變無常方

羖羊皮（方五寸）　犀角　芍藥　黃連　牡丹（各一兩）　梔子（七枚）　蘘荷根（四兩）

右七味切，以水五升煮取一升半，分三服。

蠱方

羚羊角（四錢匕）　天雄（二兩）　莽草（三兩）　犀角屑（七錢匕）　真珠　雄黃　鬼臼屑（四錢）　貝子　蜈蚣（二枚各五寸）　射罔（如雞子黃大一枚）　巴豆（十五枚）　桂心（五錢）　麝香（二分）

右十三味，合擣，蜜丸如小豆。一丸含咽，咽不知，增。凡卒得腹滿蜚尸，服大豆許二丸。若惡氣腫，以苦酒塗之。縫袋子盛藥，繫左臂，去辟不祥，可以備急。

北地太守酒方　主萬病蠱毒風氣寒熱方

烏頭　甘草　芎藭　黃芩　桂心　藜蘆　附子（各四兩）

白斂　桔梗　半夏　柏子人　前胡　麥門冬（各六兩）

右十三味，七月麴十斤，秫米一斛，如醞酒法，㕮咀藥，以絹袋盛之，沈於瓮底。酒熟去糟，還取藥滓，青布袋盛之，沈著酒底，泥頭。春秋七日，夏五日，冬十日，乃空腹服一合，日三，以知為度。藥有毒，故以青布盛之。服忽中心，二十日大有病出，其狀如漆，五十日病悉愈。有婦人年五十，被病連年，腹中積聚，冷熱不調，時時切痛，遶臍絞急，上氣背滿二十餘年，服藥二七日，所下三四升即愈。又有女人病偏枯絕產，服二十日，吐黑物大如刀，潛長三尺許，即愈，其年生子。又有女人二十三得癲病，服十八日，出血二升半，愈。有人被杖，崩血內瘀，卧著牀九年，服

靜嘉堂文庫所藏

藥十三日出黑血二三升愈有人耳聾十七年服藥三十五日鼻中
出血三升耳中出黃水五升便愈古方云耆婆二年北地太守自光上
然此偏主蠱毒有人中蠱毒者服無不愈蛇螫雖差不過二七日所有
効莫不備出曾有一女人年四十餘偏枯羸瘦不能起長臥牀枕耳
聾一無所聞兩手不收已經三年自為合之遂得平復如舊論曰
人有中毒而先患風服茵芋酒傷多吐出蠱數十枚遂愈何況
此酒而下蠱也嘉其功効有異帶方故具述焉

灸蠱方

當足小指尖上灸三炷當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯
出肉菜上得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出

論曰蠱毒千品種種不同或吐下鮮血或好臥闇室不欲光明或
心性反常乍瞋乍喜或四肢沈重百節酸疼如此種種狀貌說不
可盡亦有得三年乃死急者一月或百日即死其死時皆於九孔中
或於脅下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡

藥則蠱鬼狐狸老物精魅永不敢著人養蠱之家大須慮此俗亦
有灸法初中蠱於心下捺便大炷灸一百壯並主猫鬼亦灸得愈矣

巴豆貳枚 藜蘆壹兩 附子 礬石貳分

右五味別治巴豆餘篩和相得蜜和丸如大豆內孔中服之日三酒服

又方

苦瓠壹分

以水二升煮取一升稍稍服之吐下蝦蟆科斗十一月後乃盡

治蠱注四肢浮腫腹大如水狀如水人痛酸索劾逆不安轉易家
人一名蠱脹方

雄黃 巴豆 莽草 鬼臼各肆兩 蜈蚣叁枚

右蜜和丸搗三千杵密封勿泄宿勿食旦酒服如小豆一丸一炊
不知更加一丸當先下清水蠱長數寸及下蛇又下假雞子息有
蛇毒入菜菓子中食之令人得病名曰蛇蠱毒服之皆出

又方 大豆末酒漬絞取汁服半升

論曰世有拙醫見患蠱脹者偏身浮腫四肢如故小便不甚澀

靜嘉堂文庫所藏

以水病治之延入日服水藥然五十日望得痊愈只復增加更致殞
歿如此者不一學者嘗細尋之意在息用之萬不失一醫方千卷
不盡其理所以不可一一備述云耳
太上五蠱丸治百蠱吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下
吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐
狸作魅卒得心痛上叉胸脅痛如刀刺經年累歲著床不起悉主之方
雄黃 椒目 巴豆 莽草 芫花 真珠 鬼臼
礬石 藜蘆 斑蝥 蜈蚣 獺肝 附子
右十三味末之蜜丸如小豆先食飲服一丸餘密封勿泄氣十丸為一
劑如不中病後日增一丸以下利為度下蟲種種狀貌
不可述下後七日將息服一劑三十年者
又方
酒服桔梗屑方寸匕日三不
心中當煩須臾自靜有頃下
治蠱下血如雞肝日夜不解欲死者皆可用之

凡人患積年時復大便黑如漆或堅或薄或微赤者皆是蠱
凡人忽患下血以上件方治更增劇者此是中蠱其下血狀如雞
肝腹中攪痛難忍者此方主之
桔梗 黃蘗 茜根 升麻 犀角屑
黃芩 地榆 白蘘荷
右八味以水九升煮取二升半分三服此蠱利血用之
治腹下赤後下黃白連年不差方
牛膝一兩
右一味㕮咀以清酒一升漬一宿旦空腹服之再服便愈
太一追命丸治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛積聚
臌脹疝瘕宿食不消吐逆嘔噦寒熱瘰癧蠱毒婦人產後餘病方
蜈蚣一枚 丹砂 附子 礬石 雄黃
藜蘆 鬼臼 巴豆
右八味末之蜜丸如麻子一服二丸日一服傷寒一日二服一丸當
汗出綿裹兩丸塞兩耳中下痢服一丸塞下部中蠱毒服二

靜嘉堂文庫所藏

丸在外膏肓和摩病上一丸著痛上吐膿下利有瘡一丸塗之毒自出
産後餘病服一丸耳聾以綿裹塞耳
又方 班猫去翅足 二七蠱蟲蠍去翅足各壹分 殭蠶 解毒子 透山根 地不容各壹兩熬
蟬花壹兩 水蛭 巴豆去心皮各叁分 朱砂研 雄黃各壹分 黃丹貳分
右十二味擣羅以醋浸蒸餅丸如梧子有患者乾薑湯下三丸
但是蠱毒各隨形狀而出神驗
治人得藥雜蠱方
班猫陸枚 桂如指長 釜下土如彈丸大 藜蘆如指許
右四味爲末水服一錢匕出蚰蠱蝦蟆蜣蜋百蟲俱出
胡臭漏腋第五
有天生胡臭有爲人所染臭天生臭者難治爲人所染者易治
然須三年傅樹散勿止并服五香丸乃可得差勿言一度傅藥
即差止可傅藥時暫得一差耳五香丸方在第六卷中
凡故胡臭人通忌若蓋五辛治之終身不差治胡臭方
辛夷 芎藭 細辛 杜衡 藁本各二分
右五味㕮咀以淳苦酒漬之一宿煎三日取汁傅之欲傅取臨
目時取差爲度
石灰散主胡臭方 青木香 楓香 薰陸香 酪二
橘皮 陽起石各三兩 丁香二兩 礬石二兩 石灰一升
右八味下篩以綿作篆麤如指長四寸展取藥使著篆以絡
袋盛繫著臂以布揩令痛後夾之
又方 青木香 附子 白灰各二兩 礬石半兩燒令赤研
右並爲散傅之
又方 辛夷 細辛 芎藭 青木香各四兩
右四味爲散粉之
又方 牛脂 胡粉
右合煎和塗腋下一宿即愈不過三劑
治漏腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕臭方

靜嘉堂文庫所藏

枸杞根　乾薯蕷根　甘草各半兩　商陸根　胡粉　消石各壹兩

右六味未取以苦酒少和涂當汗微出易多復更塗之不過三著便愈再發再塗不可多塗有傷於人

又方　水銀　胡粉

右以面脂研和塗之大驗

又方　銀屑壹升　石灰叁升

右合和絹囊盛汗出粉之妙

又方　正旦以尿洗腋下良神妙

又方　黃檗若干燒令汁盡治末絹袋盛粉之即差

脫肛方第六

治肛門主腫熱應肛門熱則閉塞大便不通腫縮牛豬兔通方

白蜜叁升

右一味煎蜜令燥冷調可得爲丸長六七寸許內肛門中到身向上頭向下少時取炙斯須通洞便也

治肛門主大腸寒應肛門寒則洞寫肛門滯出猪肝散方

猪肝壹具熬令燥　黃連　阿膠炙　烏梅肉各貳兩　芎藭　女葉各壹兩

右六味擣篩爲散平旦溫清酒一升服方寸匕半日再服若不能與酒清白飲服之

治肛滯出壁土泥方　故屋東壁土壹升　皂莢叁挺各長壹寸貳寸

右二味擣土爲散亘粉肛頭出處取皁莢炙暖更遞熨取入即止

又方　炙麻覆底案令入頻案令入求差

又方　故敗麻覆底　鼈頭各壹枚

右二味燒鼈頭擣爲散付肛門出頭將覆底案入即不出矣

治脫肛歷年不愈方　生鐵叁斤

以水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再

又方　用死鼈頭一枚燒令煙絶治作屑以傅肛上進以手按之灸

又方　灸龜尾立愈龜尾生鄙後第骨是也

靜嘉堂文庫所藏

脫肛方　蒲黃（二兩）　豬肛　豬脂和傳肛上內之二三愈

腸出不入方　生菰數根取汁漬豬脂薄分上溫塗內之

治積年脫肛方　枳實（壹枚炙）　石上磨摩令滑澤鑷安把蜜塗炙令微煖煖熨之冷更易之取縮入止

又方　鐵精粉內上令入即愈

治病寒冷脫肛出方　灸臍中隨年壯

治肛出方　磁石（肆兩）　桂（壹赤）　蝟皮（壹枚名令黃）

右擣下篩飲服方寸匕日一服即縮愼舉重及急帶衣斷房室周年乃佳

又方　女萎（升燒以煙熏肛即入）

瘻瘻方第七

石瘻氣瘻吐瘻憂瘻等方

通草　昆布　蠡魚（各參）　海藻　龍膽　海蛤　松羅（各參兩）　麥麴（肆兩）　半夏（肆兩）

右九味酒煎方寸匕日三禁食魚豬肉三辛生菜十日灸二十日愈

瘤瘻方　海藻（貳兩）　昆布（壹兩）　桂心（壹兩）

逆流水柳鬚（壹兩）　乾薑（貳兩）　羊靨（炙枚陰乾）

右六味爲末蜜丸如小彈子大含一丸津咽

又方　蝟皮石　芎藭　當歸　黃芩（各貳分）　吳茱萸（壹分）

芍藥　白斂　黃芩　大黃　黃連

右九味爲末雞子黃和之塗細故布上隨瘤大小厚薄帖之乾易之著藥熱作膿胎細細從孔出也探郤膿血盡者生肉喜肖若膿不盡覆起如故也

生肉膏方主雍疽潰漏及金瘡百瘡方

當歸　附子（各壹）　甘草　白芷　芎藭（各貳兩）　雞白（貳枚）　生地黃（三兩）

右七味切以豬脂二升半煎白芷黃傳之日三度

又方以狗屎雞子傳之法去膿水如前方訖傳生肉膏取差方在第二十卷發背方中

靜嘉堂文庫所藏

五癭先方　取鹿鬱以佳酒漫令沒炙乾內酒中更炙令香含咽汁盡更易盡十具愈

又方　小麥麪一升　特生頭碧石　貳拾兩　海藻一斤

右二味三年米醋漬小麥麪曝乾醋盡各擣為散服兩方寸匕日四五服藥含極乃咽之禁薑五辛豬魚生菜大吹讀誦大別語等

又方　昆布　松羅　海藻　桂忽　海蛤　通草　白斂　各三兩

右七味為散酒服方寸匕日三服

又方　海藻　海蛤　昆布　半夏　細辛　通草　白斂　各三兩　龍膽　各二兩

右十味酒服方寸匕日再不得作重力用

又方　昆布　二兩　切如拍大醋漬含咽汁盡此愈

又方　海藻一斤　小麥麪一升

右二味醋二升以浸麪末曝乾往反醋盡合擣為散酒服方寸匕日三服忌怒

灸方　灸風府百壯灸項兩邊兩穴兩耳上髮際一百壯

又方　灸頸衝頸衝在紳兩手直向前令臂着頭對鼻所處灸之各隨年壯凡灸五處九炷凡肉癭不治殺人須子細

灸癭方　灸膊隅左右相對宛宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯或再上取差止

陷腫散治三三十年瘤癭及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤息肉大如杯杓升斗十年不差致有癰瘍令人骨消肉盡或核而不潰令人驚惕寤寐不安身體羸縮愈而復發

烏賊骨　石流黃　各壹兩　白石英　紫石英　鍾乳　各二分　丹參　瑿屎　大黃　乾薑　各四分　附子

右十一味為散以葦囊盛勿泄氣瘡邊即傳若瘡乾猪肪和傳日三四以乾為度若汁不盡者至五劑七劑止加芒消二兩佳癭上氣短氣炙肺前百壯癭上氣胃滿灸雲門五七壯癭惡灸

靜嘉堂文庫所藏

肯堂一百壯瘦勞氣灸衝陽隨年壯在肘外屈横文外頭瘦灸天瞿
三百壯横三間寸灸之瘦氣面腫灸通天五十壯在上星下一寸
瘦灸中封隨年壯在兩足趺上四分宛宛中

㿗方第八

凡治㿗以蒲横度口如廣折之一倍增之布著[illegible]腹大腹大横文
令度中央上當齊勿使偏抒灸度頭及中央合二處隨年壯好自
養勿舉重大語怒言下房

又方牽陰頭正上灸頭所極不牽向左右髀留下行灸之末

又方灸足厥陰在左灸右在右灸左左右各三壯厥陰足大指[illegible]節間

治㿗丸 桃人五十枚去皮熬 桂心 澤瀉 蒺藜子 地骨子 防風
防葵 橘皮 茯苓 五味子 芍藥各三兩
細辛 牡丹皮 海藻各一兩洗 菝葜[illegible]
右十五味篩蜜和服十丸丸如梧子稍好加至二十丸

又方 取楊柳枝如脚指大長三尺二十枚水煮令熱以故布皮
熨掩腫處熱柳枝更互柱之如此取差

㿗疝卵偏大氣上不能動方 牡丹皮 防風各一兩
右二味酒服方寸匕日三服

男㿗有腸㿗卵脹卵㿗氣四種腸㿗卵脹難差氣㿗水㿗針
灸易治卵偏大上入腹灸三陰交在內踝上八寸隨年壯男陰卵
偏大㿗灸肩井及肩解辟接處隨年壯凡㿗灸手指端七壯病
在右可灸左左著灸右○男陰卵偏大㿗病灸關元百壯○男
陰卵大㿗病灸玉泉百壯報之穴在關元下陰以其處男多灸之
又灸泉陰穴在横骨外○男陰卵偏大病灸大陰百壯三報在趺後三
寸○㿗病陰卒腫者令並足合兩母指相並以灸兩爪端方角
處一丸令頓上與爪角也令丸上爪指佳七壯愈○男陰卵大㿗
病灸太陽五十壯報之○男陰卵大㿗病灸足大陰五十壯在內
踝上一寸○男陰卵大㿗病灸足大敦在足大指三毛中隨年壯
又灸足大母指聚毛端去甲[illegible]際[illegible]壯兩[illegible]雙灸之甚佳

靜嘉堂文庫所藏

又方　灸橫骨兩邊二七壯[illegible]　壹差

又方　陰癩灸足大指下理中　十壯　隨癩邊灸之　男兒癩

先將其雄頭祝之曰從一灸[illegible]　元其[illegible]陰囊癩故灸汝三七二十一

灸訖便牽小兒令雀頭下向囊縫當陰頭灸縫上七壯即消

已　驗　又灸足大指奇頭亦可　灸癩當騎縫軸以莖用置軸上齊

陰莖頭前

陰瘡方○　論曰：有人自少至長陰下常有乾癬方有[illegible]五乃七

傷而得陰下瘙癢[illegible]之[illegible]宜用神丸散[illegible]治之仍須與藥

治之亦有患如搭精[illegible]以姊精[illegible]治之○　又[illegible]精[illegible]在

陰頭[illegible]下婦人在[illegible]以甘[illegible]作[illegible]食之[illegible]即不痛[illegible]方

用銀[illegible]猪[illegible]黃[illegible]以[illegible]熟取

乾槐枝煎塗之

又方　麝香　黃礬　青礬等末傅上不過三度

陰蝕瘡方　蒲黃　水銀[illegible]成粉傅之即愈差止

又方　肥猪肉[illegible]　水三石煮熟去肉內汁盆中浸自清冷即

易不過四度差

治陰下生瘡洗湯方　地榆　黃蘗各[illegible]

右二味水一斗五升煮取六升去滓用洗瘡日再之煮黃蘗汁洗之亦佳

治人陰蝕瘡方　以肥猪肉五斤水三斗煮肉令極爛去肉以湯令

極熱便以灌瘡中冷即愈

又方　狼牙兩把切以水五升煮取一升溫洗之日五度

療有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠方

取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊[illegible]令厚半寸須臾熱氣大

通日再易之取消差止

又方　煮大薊根汁服一升日三不過三劑愈

治陰蝕生瘡或痒方　雄黃　礬石各二分燒令汁盡　麝香半分

右三味篩為粉粉瘡上即差

治陰惡瘡方　蜜煎甘草末塗之[illegible]

靜嘉堂文庫所藏

治男女陰瘡方　石流黃末以傅瘡上
治男子陰痒生瘡方　噀胡麻傅之佳
凡虛熱石熱當路門冷浸傷肌熱聚在裏變成熱及水病腫滿
腹大氣急大小便不利腫如皮紙盛水日日光亮老蠱色陰堅
腫爲瘡水出此皆胃熱虛強取風濕傷脾胃也治之內宜依方
服諸利小便藥又以此湯洗四肢竟以葱豉膏傅之別以猪蹄
湯洗竝上　蒺藜子碎　赤小一豆各壹升
菘菜子膩　巴豆去皮殼　葱心青白切壹升　葫蕾切伍升
右六味水二斗煮取八升以淋洗腫處
猪蹄湯治服石處熱困勞損熱盛當風露卧並腫方
猪蹄雙　葶藶子餘　蒺藜子碎　黃蘗伍兩
右五味以水三升煮取二升令洽陰並日三度
葱膏方　葱白　葫蕾根切　冊參切
蒺藜子碎各
猪膏伍升

右七味煎如膏法用
又方　雄黃壹兩　礬石貳兩　甘草壹尺赤
右三味水五升煮減半洗之
陰腫皮痒方　熬桃人令香爲末酒服方寸匕日三服
療小兒癩病方
用生白頭翁根無多少㕮咀隨陰偏核以傅之一宿瘡出
二十日愈
治小兒卵腫方取雞翅六莖燒作灰服隨卵左右腫取鼬飲服
治陰腫痛方　擣莧菜根傅之
治陰九痛如刺汗出此兩方
小蒜　韭根　柳根各壹
右三味合燒以酒灌之及熱以氣熏之即愈
治陰痛炙大敷三壯核入陰令二陰交七壯
又服車前子亦佳

靜嘉堂文庫所藏

陰囊腫膏取和熱灰熨之佳　又釜月土雞子白和傅之

玉茎生瘡　甘苦　石蜜等末和乳洗之

新雕孫真人　千金方卷第二十五

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏





國立國會圖書館藏

靜嘉堂文庫所藏

卒死第一 屬 中惡 自縊 渴乏 凍 酢酒
地毒第二 蝎 蠷 蜈 射公 猫兒 狗咬
被打第三 竹木刺 從高墮下 惡刺 著深
火瘡第四 灸 針 金瘡 腫

卒死第十

治卒死無脉牽牛臨鼻上二百息牛舐必差牛不肯舐著鹽汁塗
面上即牛肯舐又灸鬲尖斗尻灸兩脇下又針間使各百餘息又灸鼻
下人中一名鬼客聽又取馬牛屎汁飲之無新者水和乾者亦得
治屬死方搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳
辟屬方不自覺慎燃火令人手動牽牛臨其上即覺苦卒不
吾取東門上雞頭末之酒服又雄黃如棗大絳左裓下令人
灸兩足大指爰毛中各三十壯
冷水和伏龍角如雞子大必吐又溫二壯

靜嘉堂文庫所藏

如雞子大酒服之

又方 中三壯又肩井百壯又間使七壯又巨闕
通筆頭七枚燒末水和服之即通
又方 犢子糞半盞子酒三升煮取一升半分二服得吐即愈若
又方 犢子糞半盞子酒三升煮服之亦治霍亂
又方 臘月野狐腸燒末水服方寸匕又死鼠灰水服
治卒忤死方灸手十指爪下各三壯餘同上方
又方 書墨水服末一錢匕
治鬼擊方灸臍上一寸七壯又臍下一寸三壯
又方 雞粟白如棗大青花麻一把酒七升煮取三升熱服須臾發汗若不汗熨火或
又方 艾如雞子大三枚水五升盛炎炙兩脇下使熱汗出愈
治鬼魘不悟方伏龍肝夫吹鼻內
又方 一刀圭皂莢末起死人水服

治中惡方灸胃管五十壯愈又灸心心黃刺鼻孔中血出愈
又方 大豆二枚雞子黃酒半升頓服之
又方 使人尿其面上愈 凡鬼擊者卒著人如刀刺狀脅腹內
絞急切痛不可抑案或即吐血或鼻口血出或下血名鬼痱方
灸人中一壯立愈不差更如還魂湯主卒感忤鬼擊飛尸諸奄
忽心氣絕無復覺或已死絞口開去齒下湯湯入口不下者捉病人
髮左右捉搖肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇方
麻黃四兩 桂心貳兩 甘草壹兩 杏人柒拾粒
右四味水八升煮取三升分三服
卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕方
雄黃粉酒服一刀圭日三血化為水

自縊死方

徐抱解之心下尚溫者以氈毡覆口鼻防人吹
即以物塞兩耳以兩竹筒內口中使兩人痛吹

靜嘉堂文庫所藏

出半日死人即噫勿吹
身心徐緩緩解愼勿割繩抱取心小猶煴者刻雞冠血出滴著
中即活男婦女雞又方雞衆白妬東東大酒半盞和灌口及
又方蕊華吹阜莢末兩鼻中逆出更吹又方梁上塵大如豆各
一小竹筒同時吹兩耳兩鼻即活又四肢大節
陷大指本文名曰地神各灸七壯又雞血塗喉下又方衆鼻口服
耳中并捉頭髮撮如筆管大擊之立活○治五絶方一曰自
縊二曰牆壁厭死三曰溺水四曰厭魅五曰產乳絶凡五絶皆以
半夏二兩細下篩丸大如豆內鼻中愈心溫一日亦可治物死
治熱腸方取道上熱塵土以塞心上少冷即易氣通止
又方仰卧腸人以熱土塞臍中令人衆了更益人衆之
臍中溫即愈又方可以飲熱湯亦可內少乾薑橘皮甘草煮飲
稍稍咽勿頓使飽但以熱土及熬熱炭土塞其上佳又灸兩乳頭

各七壯又濃煮黃昔取汁三升飲之即愈又方地黃汁盛服之又水
半升和麪一大指服之
中小壞死人頭令湯入腹須臾即蘇又灌地漿一盞而愈又使人
噓其心上又方抱狗子若雞著心前尉之又屋上南向瓦熱尉心
冷易　治落水死方凡落水經一宿猶可活解死人衣炙臍中
又方竈中灰布地令厚五寸以甑側著灰上令死人伏於甑上使
頭小垂下抄鹽二方寸匕內管中吹下孔中即當吐水下水困去
甑下死人著灰中壅身常出鼻口即活又方掘地作坑熱數
斛灰內坑中下死人其上臨甑口燃韋火二七
半日一即活又方取大甑傾之死人伏其上臨甑口燃韋火二七
燒甑中當死人心下令煙出小入死人鼻口中鼻口中水出
舌火無復益之令人心足得煖字無數者於岸側削地如甑空下
人著上勿令隱人腹令死人低頭水得出妙矣灰
則易又方但埋死人煖灰中頭足俱沒唯聞七

靜嘉堂文庫所藏

以苧酒灌鼻下部又酢灌鼻又方綿裹阜
懸解去衣去膚中垢極吹兩耳起乃止又方熬沙覆死人上下旦
出鼻口耳沙濕而易又方竈中灰二石埋死人從頭至足又
兩脚著生人兩肩上死人背負持走行出水便活
治冬月落水凍內肢直口噤尚有氣者方熬灰使煖盛以囊薄其
心上冷即易心煖氣通得轉口乃開溫尿粥稍稍吞之即活若不
温不得持火炙身冷氣與火爭則死
治人忽中水毒方手足皆俱冷是
吳茱萸糟 生薑切 犀角屑 升麻 橘皮 烏梅十四枚
右六味以水七升煮取二升分二服
又方 烏梅汁飲半升
治中水毒手足拘冷即是也或至指或至膝肘方浮萍草曝乾

酒醉中酒方
凡醉恐爛五藏即以湯槽中漬之冷復易夏亦用湯凡醉不得安
卧不動必須使人搖轉不住特忌當風
治飲酒頭痛方 竹茹 伍兩
右以水八升煮取五升去滓令冷內破雞子五枚攪調取煮
沸飲二升使盡差
又病酒方 豉葱白各一升以水四升煮取二升頓服之
治飲酒房勞虛熱飲酒不已酒入百脉心氣虛令人錯謬失常
方 芍藥 甘草 人參 白薇 枳實
知母 各貳兩 生地黃 酸棗仁 伏神 各叁兩
右十味以水一斗煮取三升分三服
治因酒咽喉舌上生瘡方 葛根汁一二升無多少取醒止
大麻人 壹升 黃芩 貳兩

不醉方　栝子麻子人各兩合一服之乃進酒三倍
葛花　小豆花
右合為末服三方寸匕飲服行進葛汁及枇杷葉飲倍能飲酒
又九月九日菊花臨飲服方寸又小豆花葉陰乾百日末服之又方
五月五日末服之又方五月五日取井中倒生草枝陰乾末酒服之
治飲酒令無酒氣乾蔓菁根二七枚三編蒸末兩錢酒後水服之
治飲酒大醉恐腸爛方絞茅根汁飲二升
治飲酒中毒方煑大豆三沸飲汁三升又酒漬乾椹服之
治飲酒腹滿不消方煑鹽湯以竹筒灌大孔中
治惡酒健嗔方空井中倒生草灰服之勿令知之又取其牀上塵
和酒飲之
斷酒方酒七升著缾中熟朱砂半兩著酒中急塞缾口安著猪圈
中任猪搖動經七日取酒服飲盡又方臘月鼠頭灰柳花等分黃
昏時服一杯又方正月一日大酒五升淋碓頭擣下取飲又方故氊
中氊蒼耳七枚燒作灰黃昏時煖一坯酒呪言與病狂人飲也勿令知之
後不喜飲酒也又方白猪乳汁一升飲之永不飲酒也又方刮馬汗和
酒與飲終身不飲又方大蟲屎中骨燒末和酒與飲又方鸕鷀屎
灰水服方寸匕永斷又取毛鷹為一過吐出毛頓服又方故紡車細燒灰
和酒與飲又驢駒衣灰酒飲又方自死蠐螬乾擣末和酒與飲永世聞
酒名即嘔神驗又方酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之又方酒漬汗靴替
一宿旦空肚與即吐不喜見酒又方白狗乳汁服之又方臘月鳥腦酒服之

蚰蜒毒方第二

治因熱逐涼睡熟有蚰入口中撓不出方以刀破蚰尾內生椒三兩枚
裹著須臾即出○治蚰入口中方并入七孔中者割母猪尾頭瀝血
著口中即出○又方以三歲大猪以患人手中指等猪尾截之以
器承血急以病人口蚰寫血口中拔出之
治蚰蟄方　凡蚰蜒蟄灸上三七壯又方小蒜汁滓薄上又熟
服二人屎淳塗帛裹即消

靜嘉堂文庫所藏

治蠷螋毒方　消蠟注瘡上不差更消注著

令人尿瘡上又令人騎度三過又令人坐上又末薑薄之乾

復易之又以射罔塗腫上血出即愈

又方　生麻蕕葉合擣以水去滓漬之

衆蚰毒亡心　雄黄　乾薑

右乾篩和射菵著竹筒中帶行有急用

又方　雄黄末瘡上且用銅青傅瘡上又擣大蒜和胡粉傅囓

封上三差又以麪圍上以童男尿著中燒鐵令赤投中冷復

燒著三三度差又口嚼大豆葉塗之良又猪脂和鹿角灰塗

之又射罔封上

又方　鹽四兩水一升煮十沸沸定以湯浸冷易之

又方　擣紫莧取汁飲一升以滓封瘡以少水灌之

又方　灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小爇之

又方　梳中垢如指大長一寸尿和傅之又灸梳汗熨之

又方　瓜合用楸葫葉苗等分擣傅之無不差

又方　男子陰間毛二七枚含之有汁即咽却祕之

入山辟衆蚰方　乾薑　麝香　雄黄

右三味分等麁擣袋盛帶之男左女右蚰毒塗瘡

又方　常燒羖羊角使煙出蚰則去矣

治蚰瘡已愈毒在肉中淫濼痛方

大蒜　山蒜各壹升

右合擣之熱湯淋以汁灌瘡大良

治卒為蚰繞人不解方　以熱湯淋之若無湯令人尿之

治蚰骨刺人毒方

鐵精如大豆內管中吹內瘡中良又燒死鼠末傅之又雞尿

二七枚燒作灰著酒服之

靜嘉堂文庫所藏

根令濃以洗之十徧飲汁及擣散服方寸匕日五甚者
夜二又煮栗塗之
又治虎齧瘡方
青布急卷為繩止一物燒一頭然內竹筒中注瘡口薰
瘡妙又煮鐵令濃洗瘡
凡入山燒水牛錢羊角辟虎狼蜚皆走
治蝎毒方
取齒中殘飯傅之又豬脂封之又射肉封之又硇砂和水塗上立愈
凡一切毒螫之物見不得起慈心向之亦不得殺之若輒殺之於後
必遭被螫傷之治之亦難差
治蝎螫毒方
以冷水漬之暖則易之餘處冷布水搦之又以井底泥塗傅
之溫即易　又方生烏頭末唾和傅之
又蜂蛆毒之取瓦子摩其口唾二七訖置瓦子上故處治蜂螫方

蜜伍合　蠟貳兩　豬脂伍合
右和煎稍稍食之
又方　燒牛屎灰苦酒和塗之　又方淳酢沃地取起泥塗之
又方　鮓脂塗之立愈
又方　齒垢塗之又臛臨塩塗之又屎塗之又以尿洗之又反手
捻地上土傅之
有蠷叟蝓蟲蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀似粟粒累累聚疼
痛身中忽有處蝓痛如針刺蟲後細瘡漏作聚如粟黃子壯
也四邊赤中央有白膿如粟米亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱處
者連起竟脅脇胃也治之法初得摩犀角塗之止其毒治如火丹
法余以武德中六月得此疾經五六日竟心悶不佳以他法治不
愈又有教畫地作蠷蝓形以刀子細細取之盡蠷蝓腹中就中以
和成泥再塗即愈將知天下萬物相感冥曉其由矣
又方　　毅羊髭灰臘月豬脂和封之又擣敗封之

靜嘉堂文庫所藏

酢和胡粉塗之

治蠼螋尿瘡方

燒鹿角爲末以苦酒和傅瘡上已有汁者燒道傍蔽蒂傅之

又方　槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮去瘡處以洗日五六

又方　末小豆以苦酒傅之燥復易小兒尿和

又方　嚼大麥以傅之日三　又方以猪脂鷰巢中土苦酒和傅之

又方　熟嚼梨葉塗之燥後易之　又方馬鞭草熟擣以薄之燥則易

又方　取茱萸東行根土作酢和塗之

瘡表裏相當一名侵淫瘡方

取社樹下猪牙車骨年久椎破燒令脂出熱塗之

又方　取苦練樹皮若枝燒作灰傅之乾者猪膏和并小兒禿瘡及諸惡瘡並治

論三種射公蟲毒候

一名射公二名䠶狐三名溪毒其蟲形如甲蟲有一長角橫在口前如弩檐臨其角端曲如上弩以氣爲矢因水勢以射人也或聞人在水中鈫鈫然作聲取要須得水没其口便射人此蟲畏鵝鵝能食之其初始證候先惡寒噤瘮寒熱筋急乃似傷寒亦如中尸便不能語朝旦小蘇晡夕輒劇寒熱悶亂是其證始得三四日及其成瘡似蠼螋尿亦似飈疽瘡

治射公中人寒熱或發瘡偏在一處有異於常方

取鬼目葉一把内苦酒中漬濕之竟熟擣絞取汁服一升日三

又方　犀角三兩　升麻三兩　烏扇根二兩

右三味以水四升半再服相去一炊頃盡更作

又方　取生茱萸莖葉一握中斷去前後取握中熟擣以水二升煑取七合頓服之

又方　取蜈蚣大者一枚去牙炙之治末和苦酒以傅瘡上

治射公中人已有瘡方

[illegible]十擣合熟苦酒和厚塗瘡上半日痛便止又方取狼牙

靜嘉堂文庫所藏

之取擣𦆭之令熟薄所中處又飲四五合汁

射公中瘡有三種其一種瘡正黑如黶子皮周邊悉赤衣起如有

刺痛一種作瘡久久穿或晡間寒熱[illegible]一種如火灼熛起此熛者

最急數日殺人此病令人寒熱治之方

烏翣根 叁兩　升麻 叁兩

右二味以水三升煮得一升適寒溫盡服之滓薄瘡上

山水中陰濕草木上石蛭著人行肌皮膚則穿嚙人肌肉中侵淫墳起如蟲行道治之方

灸斷其道則愈凡山水中常以臘月猪膏和鹽塗脚脛及足指門趺上乃著鞋蘇蛭不得著人也

江南毒氣惡核射公暴腫生瘡五香散方

甲香　犀角　鼈甲　薰陸香　升麻　烏翣　丁香　青木香

黄連去毛　甘草　牡蠣　羚羊角　黄芩各四分　吳茱萸三分　黄檗六分

右十五味為末中射公毒及諸毒皆水服方寸匕日三并雞子白和塗腫上乾易之并以水和少許洗上則差

野葛膏主射公惡核卒中惡毒方

野葛一尺　茵芋　躑躅　附子　丹參各肆分

巴豆伍合　烏頭伍合　蜀椒伍合　雄黃　大黃各貳兩

右十味下篩不中水猪膏十斤煎三上三下去滓內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩痛上勿近眼合名膏皆不用六畜産婦女人小兒雞犬見之唯須清淨

又治溪毒方　桃葉　梅葉

右二味等分擣絞取三升汁分為再服

又治射公毒方　赤莧菜一味切擣絞取汁為一服日四五服

又方　白雞屎取白者三枚湯和塗中毒處

治沙虱毒　斑猫二枚研末服之又燒一枚末著瘡中

又方　大蒜十枚止一物合皮安熱灰中炮令熱去皮刀斷頭熱所著毒處

[illegible]射香大蒜和擣以羊脂和著小筒中帶

靜嘉堂文庫所藏

雄黃朱砂常山等分五月五日中時童子合之

治水毒方

凡山水有毒蟲人涉水中人似射公初得之惡寒微似頭痛暮寢百節皆強而煩兩膝痛或吸吸而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷三日腹中生蟲食下部肛中有瘡不痛不痒令人一身不急治過六七日下部出膿潰蟲蟲上食人五藏蟲盛毒煩下利不禁八九日良醫不能矣若瘡如鯉齒者痛甚經不過二十日殺人欲知是水中毒當作五六升湯以小蘇五升以咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑則非他病也水毒擣倉耳汁服一升又以綿裹枝沾汁滴道下部曰三又方蓼一把擣取汁服一升不過三服又方藍一把擣水解以塗浴面目身體令偏又方擣大黃根末飲之并道下部生者用汁夏月行常多賣此藥屑入水以方寸匕水上流無所畏又辟射公凡洗浴以少許投水盆中即免毒治猫鬼野道病歌哭不自由方

五月五日自死赤蛇燒作灰井花水服方寸匕日一針灸方在第十四卷中

又方　臘月死猫兒頭灰水服一錢匕日一

治猫鬼眼見猫狸又雜有所聞方

相思子　苘麻　巴豆去心皮　朱砂末　蠟各四銖

右五味合作九先取麻子許大含之即以灰圍患人前頭者一升灰火吐藥火中沸即盡上作十字其猫兒並死

治蜘蛛咬人方　人尿傅　又油傅　又炮薑帖之

又胡猻屎傅之　又烏麻油和胡粉如泥塗上乾即易之

治馬犬嚙方

馬骨刺傷人及馬血入瘡中取灰汁溫漬瘡常令汁器有火數易汁勿令燸人肉二三數日漬之有腫者炙石灰之日二消止

治馬血入瘡中

人糞如雞子復以薑傅瘡上又方取婦人月水傅之神良

靜嘉堂文庫所藏

馬嚙人及瘡毒腫熱疾痛方

馬鞭梢長二寸　　鼠屎采二七枚

右合燒末以膏和塗之立愈

治馬汗馬尾入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈又方飲淳酒取醉即愈又方石灰

傅之又方燒雞毛作末水服方寸匕

治馬嚙人陰卵脫出方推內之以桑皮細作線縫之破烏雞取肝

細剉以封之旦忍勿小便便愈

猘犬嚙人方

取地榆根擣作末傅瘡上又水服方寸匕日三又方用頭髮

猬皮合燒分等水和飲一杯口噤者折齒內藥又方擣韭絞

取汁飲一升日三瘡愈止已愈後復發者又嚙之又方以丑

醬塗之日三四又方刮虎牙若骨水服方寸匕

凡猘犬咬人七日一發過三七日不發則脫也要過百日乃得免

耳每到七日轉當擣韭汁飲之二三升乃當終身禁食犬肉蜚蝠

食此則發死不可救瘡未愈之間禁食生魚及於肥臛器中食便發

一年乃佳耳但苦飯下蒸生魚及於肥臛器中食便發

猘犬毒方

燒虎骨傅瘡及熨又微敷杏人擣研取汁服之良又取燈

盞殘油灌瘡口此並禁酒猪肉生魚菜

凡犬齧燒犬尾末傅瘡日三又燒白死蛆一枚令燋末內孔中

凡猘犬所嚙未盡其惡毒發七百日已當日炙一肘若不血出其

血百日炙乃止禁飲酒猪犬肉一生

又方　用韭根搥二枚水二升煮取一升頓服

又方　蝦蟆灰粥飲服之　又取其猘犬腦毛傅上不發

又方　桃南枝白皮水二升煮取一升分再服吐出大子

根良若子七枚且服　又梅子末酒服之

靜嘉堂文庫所藏

治猘犬嚙人方　熬杏人五合令黑碎研成膏傅之
又方　取竈中熱灰以粉瘡中帛裹繫之
又方　以沸湯和灰壅瘡上　又方以頭垢少少內瘡中
又方　鼠屎臘月豬膏和傅之　又方飲生薑汁一升韮汁亦佳
又方灰灸蠟以灌瘡又以熱牛屎塗之佳又方以苦酒和灰塗瘡上
又方　以水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血自止以綿裹之差
治猪嚙方　松脂煉帖上又屋霤中泥塗上
治狂犬嚙人方　虵脯一枚炙去頭擣末飲服五分匕日三
又方　服青布汁三升又飲驢屎一升又擣莨菪根和鹽付三日
論曰凡春末夏初犬多發狂必誡小弱持杖預以防之防而不免
者莫出於灸百日之中一日不闕者方得免難若初見瘡差痛
定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖
即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心中醒然
惺惺了了方知咬已即狂是以深須知此此病雖重世皆輕之不

以為意生之死者每年常有吾昔初學醫未以為業有人遭此
將以問吾吾了不知報答以是經吾手而死者不少自此說意尋
之一解已來治者皆愈方知世無良醫枉死者半此言非虛故將
來學者非止此法餘一一方皆須沈思留心作意懃懃學之乃
得通曉莫以粗解一兩種法即謂知訖極自誤也

被打方第三

治被打傷破腹中有瘀血方
蒲黃壹升　當歸　桂心各貳兩
右三味酒服方寸匕日三夜一
又方　劉寄奴　延胡索　骨碎補各一兩
右以水二升煎取七合復內酒及小便各一合熱溫頓服
又方　末莨菪子傅瘡上
又方　䗪蟲　虻蟲　水蛭熬各卅枚　桃人伍拾枚去皮尖雙人者　桂心　[illegible]　大黃伍兩
[illegible]末酒水各五升合煮取三升分五服

靜嘉堂文庫所藏

手腹中瘀血并治婦人血滞之為水方

白馬蹄燒令煙盡酒服方寸匕日三次一

天有瘀血不能言其人喜忘不欲聞人聲胷中氣塞短氣方

甘草 宣兩 伏苓 宣兩 大棗人伍拾枚去皮尖婁人

右三味以水一斗煮取三升分三服

治被歐傷聚血腹滿方

右以水三升煮三沸分再服不差重服

治被打頭青腫方

炙猪肉熱搦上 又炙猪肝帖之 又新羊肉封之

又大豆黃末塗之 又方墻上柝骨唾和石上研摩之乾易

治杖瘡方 石灰柒斤 新猪血壹升

右二味和丸熟燒之破更丸燒三徧止末傳之

又方 服小便良久金月下土細末油和塗羊皮上臥之

治血悶搶心氣絶不能言治法

凡被打撲血搶心不能言可擘口開永吞半合喉咽即甦

又方四肢骨碎及筋傷蹉跌

生地黃不限多少熟擣罨所撲傷處

又方

時二升以水二升漬之絞取汁飲止悶血

凡被打及産後惡血及一切皆黃蘗骨木汁三飲之

治竹木刺在皮中不出方

羊屎燥者燒作灰和猪脂塗刺上若不出重塗乃言不煑刺

出時一云用乾羊屎末

治久刺不出方 服玉不留行即出兼取根末帖之

治刺在人肉中不出方 煮小豆麥汁飲之日三差之

又方 用牛膝根莖并擣以薄之即出瘡止雖已合從出也

又方 溫小便漬之

又方 嚼白梅以塗之兼治瘡因風致腫

甘草末以水和塗之立出久者不過一次

靜嘉堂文庫所藏

刺不出方并竹刺
薔薇灰水服方寸匕日三十日刺出
又方　燒鑿柄灰酒服方寸匕又酸棗服之　又方頭垢塗之
被傷風入體方
角弓反張口噤不能言或產墮胎凡得此者用紫湯大
重者不過五劑
治針折入肉中方　刮象牙末水和聚著折針上即出
又方　以鼠腦塗之
治瘡中水腫方　炭灰白胡粉等分脂和塗孔上水則出
治卒刺手足中水腫方
擣韭及藍青置上以火炙熱徹即愈
治瘡因風致腫方　櫟木根皮三十斤濃煮內鹽一把漬之
治被傷風腫方　厚塗杏人膏燃麻燭遙炙
治瘡腫痛方　溫灰汁漬令溫溫之常令熱神秘

治刺傷中風水方
刮箭羽下漆塗之又燒魚目灰傅之又服黑牛埶屎一服二
升三服即止又煮韭埶搗之又羊屎灰猪脂和傅半日刺自
出不痛大神驗
凡八月九月中刺手足犯惡露腫殺人方
桑枝三枚內塘灰中推引之令極熱破斷以頭枉瘡口上熱
盡即易之盡三枚則瘡自爛仍取韭白薄瘡上以布急裹
之若有腫者更作用韭白第一佳
治從高墮下及為木石所傷凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死無不
治之方洛禹亦治
取淨土五升蒸之令編分半以故布數重裹之以熨病上
勿令火熱破肉令則見之取差乃止
凡有損傷皆以此法治之神效已死不能言者亦差三年亦差
尚書下傷折疾痛煩燥啼叫不得卧方

靜嘉堂文庫所藏

屎燒末篩以猪膏和塗痛上即安常急裹之

治瘀血方　蒲黄八兩　附子燔二兩

右二味酒服五六七日三不知增之

從高墮下崩中方　當歸　大黄各貳

右二味酒服方寸匕日三

治被損瘀血方　生地黄汁叁升

右以酒一升半煮取二升七合切三服

凡墮落馬心腹積血唾吐無數方

乾藕根末酒服方寸匕日三禁口味

大豆一升熬去腥勿使太熟擣末炙之氣偏合甑下盆中

以酒一斗淋之温服一升要復取汗傳李久高瘡上也

治墮車馬馬鞍者物隱體肉斷方酢和麪除生之

治四肢骨碎筋傷跌方以水二升漬三升煮取汁服之又酒服敷

散方寸匕日三又方羊腦胡粉脂和髮灰胡粉擣調如膏

傳生布裹之又方初破時以熱馬尿傳之無瘢又方大豆三

升以水五升煮取二升以淳酒六七合和汁服之一日盡如

湯法

桃人湯治從高墮下落車馬下會腹中有血不得氣息方

桃人（拾肆枚去皮尖雙人）大黄　消石　甘草各貳兩　蒲黄壹兩半　大棗貳拾枚

右六味以水三升煮得一升絞去滓適寒温盡之當下不止漬

糜汁一杯飲之即止神良

治瘀血桃人湯　桃人（伍拾枚去皮尖雙人）　大黄四兩　芒消

桂心各壹兩　當歸　甘草各貳兩　亡虫虫蝕　水蛭各拾枚

右八味皆以水八升煮得三升絞去滓適寒温服一升日三服

治瘀血湯方　大黄伍兩　桃人（伍拾枚去皮尖雙人）　桂心貳兩

水蛭各拾枚　蝱蟲

右八味以水八升煮得三升適寒温飲一升日三服

靜嘉堂文庫所藏

氣息方　治血若為兵杖所加木石所笮血在胷背及脇中痛不得
右二味以炭火炙令燋燥合擣之下篩以酒一升煮之三沸止
一服盡之三服愈
治毆傷聚血腹滿方　鼓壹升
右以水三升煮三沸三下分為再服三日止更取麻子一升以
水三升煮三沸三下分為再服三日止若不差更從改起如上法
升漬如故法分為再服三日止
治瘀血湯方　大黃如指節大者一枚去皮　桃人拾肆枚去皮尖雙人　亂髮壹握
右以布方黃四寸以繞亂髮燒之咬咀大黃桃人以酒三升煮
取一升盡服之血盡出
治男子傷絕或從高墮下犯傷五藏微者唾血及金瘡經內者大
膠艾湯方　阿膠　乾地黃　芎藥　各叁兩　當歸　芎藭各貳兩　乾薑壹兩
艾葉　甘草　當歸

石八味以水八升去滓內膠令洋分再服亂人三服此湯治婦
人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛不知不止者神良
折骨斷筋方　乾地黃　當歸　羌活　苦參各貳兩
右四味酒服方寸匕日三服
治蹉折骨損痛不可忍方
以大麻根及葉擣取汁飲之一升無生麻煮乾麻汁服亦主
墮擗打撲血心腹滿短氣良
治被傷筋絕取蟹頭中膽和之內瘡中髓熬之內瘡中筋即續生又擣
葛根汁飲之葛白屑散亦佳
治丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷經脈中
皆主之方　防風　芎藭　乾薑各貳兩　艾葉酢
右四味以水八升煮取三升去滓內膠令消分二服亂人三服
女人產後崩傷下血過多虛喘腹中絞痛下不止者服之妙

靜嘉堂文庫所藏

□五升以水一斗煮取二升半汁服令盡劇者不過三作

治腹中瘀血痛在腹中不出滿痛短氣大小便不通方

荊芥(半分) 䗪蟲(參拾枚) 大黃 芎藭(各參兩) 蒲黃(伍兩)

當歸 桂心 甘草(各貳兩) 桃人(參拾枚去皮尖熬)

右以九味水一斗煮取三升分三服

當歸散主落馬墮車諸傷腕折臂脚痛不止方

芎藭(六分熬) 甘草(參分) 澤蘭(壹分) 蜀椒(去目及閉口)

桂心 當歸 附子(各貳分炮)

右七味並熬令香為散酒服方寸匕日三凡是傷損皆服之十日愈小兒亦同

黃耆散主踠折方

黃耆 芍藥(各參兩) 乾地黃 當歸 附子(炮) 續斷

桂心 乾薑 通草(各貳兩) 大黃(壹兩) 蜀椒(壹合去目及閉口) 烏頭(半兩)

右十二味為散先食酒服五分匕日三

治血蒲黃散方

蒲黃(壹升) 當歸(貳兩)

右二味為散先食酒服方寸匕日三

又方

䗪蟲 牡丹皮

右為散酒服方寸匕血化為水

又方

蕃蕳草汁飲之亦可服子

又方

大麻根擣取汁數升飲之即下通蘇息無麻葉汁亦佳

治下瘀血湯方

大黃(陸兩) 桂心(貳兩) 桃人(陸拾枚)

右三味以酒漬六升煮取三升分三服

呪唾捉瘖方法

我按先師本法男師在左女師在右上白東王公下白西王母北斗七星黃姑織女請制水之法清且明不混不濃不疼不痛羅脉得脉羅肝得肝羅肉得肉不任軀婬偎來自小兒為日不吉不良其中為刀斧㓞前熊虎湯火所傷三唾三呵平復□故急之如律令呪法不復須度受但存會稽東懸歆誦之非止

靜嘉堂文庫所藏

書所傷亦治瘢痘隨坊患轉後語呼之良驗一切瘡毒皆用之

治惡刺方

苦瓠開口內小兒一梁煮兩三沸浸病上又方萇苕根水煮浸之冷復易神方又方濃煮大豆汁漬取差

治惡刺并狐尿刺　以烏賊尿溫漬之又驢尿漬之又白馬尿溫漬之

治蛇虫蜣蜋虫方　人屎塗之　又猪毋耳中垢傅之

凡瘡腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中狐尿刺治之燒棱公苦牛馬屎苦生棗條取得多少燒煙熏汁出愈

又方　小蒲公英莒摘取根莖白汁塗之唯多塗為佳乾止

余以貞觀五年七月十五日夜左手中指甘鰌者痒痛至腕遂患痛不可忍經一日痛甚深瘡白焉大色如熟小豆色甘聞長者之論有此治之試復為之半下則愈痛亦即除瘡亦即差小過十日尋平復此人神効故疏之蜀人名取菜關中名猗乳妙句

又方　李葉搗絞取汁點之即効

治梁漆洗湯方

生柳葉三斤以水一斗五升細切煮取得七升適寒溫洗之日三又取磨石石下泙泥塗之取差止又方蓮葉燥者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再又方貫衆治末以塗上即愈又羊乳汁塗之又方苦酒五兩湯浸以洗之又舊石羊湯中洗之又方漆姑草擣封之又取猪膏塗之又嚼猪肉臍稃穀塗之又方濃煮鼠耳葉以洗瘡上亦可擣葉取汁以塗之妙

火瘡第四

治火瘡方

赤起麻油和梔子人塗之唯厚為佳已成瘡燒白糖灰粉之即燥立差

治炙瘡方　甘草　當歸各壹　胡麻　羊脂各壹合

右四味猪膏二合煎用傅之

又方爛瓔方

靜嘉堂文庫所藏

杏仁貳兩　附子貳枚　甘草壹兩　羊脂伍兩　松脂大雞子
右五味以不中水猪膏五兩煎傅之
治火瘡敗藥方　栢白皮
右以臘月猪膏合淹酒相得煮四五沸色變去滓傅瘡上
凡火燒慎以冷水洗之瘡得冷氣更深轉入骨壞人筋骨難差
初被火燒急更向火炙雖大痛強忍之一食久即不大痛神驗
治火燒悶絶不識人以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤絞口
開與之然後治之方
梔子四拾枚　白斂　黄芩各伍
右三味以水五升油一升合煎冷水氣歇去滓冷之以淋瘡令
溜去火熱則肌得寛也任意用膏傅湯散以治之
治一切湯火所傷初著即以女人精汁塗之即差
治火爛瘡膏方
栢皮四兩　竹葉　甘草各貳兩
右三味猪脂一斤煎令以傅之

治火瘡方
鼠頭壹枚　臘月猪膏煎令消盡以傅乾即傅差不作瘢
神効又方用塗無多少以羊脂猪髓腦煎塗之無瘢神良
治灸瘡膏方
韮白貳兩　羊髓壹斤　當歸貳兩　白芷壹兩
右四味煎取傅之日三
治灸瘡中風冷腫痛方
但向火炙之瘡得熱則瘡快至痛止日六七炙愈
治灸瘡方
搗竈下黄土水和黄令熱漬之
治諸瘡差後瘡復發方
大蒜　鼠屎　書墨
右三味等分末搽之日三
暴氣在表皮上作癮胗瘡者槐枝葉汁煮湯洗
灸及湯火所損晝夜啼呼止痛滅瘢之方
右四味松脂破鐺中切脂爛熬著松栅上小傾鐺火燒諸物
內火取汁傅松栅是肥松木節也

靜嘉堂文庫所藏

□□瘡膿壞不差方　臘月豬脂壹升　薤白壹握　胡粉壹兩

右三味先煎脂薤白令黃去之勿令熟就上篩白灰一兩胡粉一兩內膏中令調塗故帛貼之日三

又方　白蜜壹兩　烏賊魚骨貳枚

右二味相和塗之

治灸瘡方

石灰一兩末絹篩豬脂和相得微火上煎數沸以暖湯洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡上灸之令[illegible]

治針灸瘡血出不止方

燒人屎灰傅之又死蜣蜋末豬脂塗之

凡灸瘡不差日別灸上六七壯自差

又方　松脂伍兩　蠟參兩

右合煎塗帛貼之日三又治手車皸脂

治小兒火灸瘡方

死鼠一頭麻油一升煎令消盡傅之日三

治灸瘡爛方　榆白皮嚼熟塗之

治小兒凍爛方　猪後懸蹄以夜半時燒之研細篩以猪脂和傅

治小兒入手足腫痛方　生胡麻擣薄之

金瘡大散方

五月五日平旦使四人出四方各於五里內採一方草木莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細切碓擣并石灰極令爛熟一石草斷一斗石灰先鑿大實中桑樹令可受藥取藥內孔中實築令堅仍以桑樹皮蔽之以麻擣石灰極密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使牢至九月九日午時出取陰乾百日藥成擣之日暴令乾更擣絹篩貯之凡一切金瘡傷折出血以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即差不腫不膿亦不畏風若傷後數日始得藥須暖水洗之令血出即傅之此藥大驗平生無事宜多合之金瘡之要無出於此雖突厥質汗黃末未能及之

靜嘉堂文庫所藏

矢不出方　白斂　半夏
右等分末酒服之方寸匕日三三十日出
治金瘡血出不止方
擣車前汁傅之血即絕連根取用亦効又方以精塗之又飲
人尿汁三升愈又方以蜘蛛幕貼之血即止
金瘡內漏方　還自取瘡中血著杯中水和盡服愈
金瘡腹中瘀血二物湯方
大麻子三升　大葱白貳拾枚
右二味擣令熟著九升水煮取一升半頓服之若血
出未盡腹中有膿血更一服當吐膿血耳
金瘡內漏血不出方　牡丹皮為散水服三指撮立尿出血
金瘡出多虛竭內補散方　蓯蓉　甘草　芍藥各四
蜀椒去目汗及閉口　乾薑　當歸　芎藭　桂心　黃芩
人參　厚朴　吳茱萸　白芷　黃耆各壹兩

右十四味為散酒服方寸匕日三
金瘡煩滿方　赤小豆壹升
右以苦酒漬之熬燥復漬漬滿三日令色黑服方寸匕日三
凡金瘡若刺瘡瘡痛不忍百方不差方
葱一把
右水三升煮數沸漬瘡即止痛
金瘡煩痛大便不利方　大黃　黃芩
右二味等分擣蜜和先食服如梧桐子大二丸日三酒服
金瘡　桑白汁塗桑皮裹或石灰封妙也
凡金瘡出血必虛竭當忍飢燥食不得飲粥及漿犯即血出動殺人也
金瘡方　末雄黃傅之瘡當沸汁出即差又方刮貝子末酒服一
錢匕此方并主中毒箭又方末礜石傅之主止痛斷血
凡金瘡深用不早合即以少滑石末令不得合

靜嘉堂文庫所藏

[illegible]藍汁一升并薄之无藍溫漬青布取汁并灌瘡中鏃不出擣
死鼠肝塗之鼠腦亦得又方內鹽臍中灸之又方煎地黃汁作丸服之
百日矢當出又方煑蘆根汁飲之三升又方多飲葛根汁并治一切金瘡

治肎箭方

藍子伍合　升麻捌兩　甘草　王不留行各肆兩

右四味冷水服二方寸匕日夜二又以水和塗瘡乾易之

金瘡內漏方

七月七日麻勃肆分　蒲黃貳兩

右二味酒服一錢匕日五夜二

治金瘡腸出方

磁石　滑石末　鐵精末各叁兩

右三味末粉腸上後用磁石末飲服方寸匕日五夜二腸入

治金瘡出血多虛竭內補方

當歸叁兩　芎藭伍分　乾薑叁分　辛夷伍分　甘草叁分

右五味酒服方寸匕日三夜一

治卒為弓弩矢所中不出或肉中有聚血方

取女人月經布燒作灰酒服之

治金瘡內塞散方

黃耆　當歸　芎藭　白芷　乾薑　黃芩　芍藥　續斷各貳兩　附子半兩炮　細辛壹兩　鹿耳叁兩

右十一味下篩先食酒服五分匕日增至方寸匕

治金瘡腹破骨突出欲令入法取人屎乾之以粉腸即入矣

治金瘡中筋骨散方

續斷伍兩　乾薑　芎藭　人參　附子各二兩炮　乾地黃　細辛各壹兩　椒去目閉口汗　桂心各壹兩半　甘草貳兩　虵銜　地榆各四兩　當歸　芍藥　蓯蓉各叁兩

右十五味下篩酒服一方寸匕日三

治被傷腸俱出不斷者方

作大麥粥取汁洗腸推內之常研米粥飲之二十日稍稍作強糜百日後乃可差耳

治金瘡方

麻蕡叁斤

[illegible]二十熟煑取三升半一服又方飲麻子汁數升又蚯蚓屎水服

靜嘉堂文庫所藏

方寸匕三日又布之石灰細末猪脂和封之又馬金瘡止痛大良
治金瘡血不止煑桑根十沸服一升即止又柳絮封之
治金瘡血不止令唾之呪曰某甲今日不良為某所傷上告天皇下
告地王清血莫出良藥百裹不如熟唾日二七痛唾之即止
治金瘡無大小冬夏及所傷血出便以白灰厚纏裹之若瘡甚
深不欲使合者内少滑石末即金瘡不得合也
又方 燒乾梅作炭擣末傅之一宿即差亦治被打傷
治𩋅瘡血出不止方
取葱葉温炙取汁塗瘡上即止若為婦人所𩋅者取婦人中
衣火炙令熱以熨瘡上又取豉三升漬熱湯食頃絞去滓内
蒲黄三合頓服之及紫湯如產婦人法方在產後卷中
又方 蒲黄壹斤 當歸二兩
右二味篩下酒服方寸匕日二服
箭鏃不出方 牡丹皮壹分 白鹽貳分
右二味散酒服方寸匕日三出 又取半夏末塗箭瘡即出
又方 酒服瞿麥方寸匕日三差
地黄膏治金瘡火瘡灸瘡不能差方
生地黄切擣絞取汁三升 薰陸貳兩 松脂貳兩 羊腎脂伍合煎
杏人貳兩去皮尖 烏麻油貳升 蠟蜜貳兩 石鹽貳兩研
右八味先下蠟微火令消次内羊脂次下油次下松脂次下杏
人次下薰陸次下地黄汁次下石鹽微火煎之令地黄汁水氣
盡以綿濾停凝一切諸瘡初傷皆傅之日三夜二慎生冷猪肉
熟雞魚此膏治瘡法先以惡肉去不著血先從内差[illegible]至平
復魚麵一不良[illegible]大千[illegible]妙
治鯁方 取薤白煑令半熟以綫繫大如彈丸 持筋端吞之入喉
至鯁處徐徐引之鯁著筋出
治食骨鯁 燒虎狼屎水服之 魚鯁燒鸕鷀屎水服之方寸匕
又方 末虎骨若狸骨水服方寸匕 又瞿麥末水服方寸匕

骨鯁口稱鸕鷀即下　又含陳皮湯　又服沙糖水
又燒魚網灰水服方寸匕
治骨鯁在喉衆治不出方
取米糖丸如雞子黃吞之不去更吞
又方　吞猪膏如雞子不差更二三至瘥止
治諸哽　竹篾刮令滑綿裹内咽中令至哽處可進退引之哽即
隨出也
又方　薤令半熟小嚼之線繫薤中央捉線吞薤下喉哽即出矣
治食中吞髮咽不去方　取亂髮燒末酒服一錢匕
治吞錢方　艾三兩
右以水五升煮取一升頓服之即下
治吞金鐶及釵方
白糖貳斤一頓漸漸食之多食益佳
又方　吞水銀壹兩再服之

悮吞錢方
𦢊韮令萎熟勿切食一束即出或生麥菜筋縷如韮法
皆可用但任意多食自消
悮吞針及箭鏃等方　但多食脂肥肉令飽
悮吞錢　末火炭酒服方寸匕水服亦得又服蜜二升即出
悮吞環將彄方
燒鴈毛二七枚末水服之鵝羽亦得
悮吞珠銅鐵而哽者方
燒銅弩牙令赤酒中飲之立愈
治吞針方
取懸針磁石末飲服方寸匕即下

孫真人千金方卷第二十六

靜嘉堂文庫所藏

孫真人千金方卷第二十七 平脈

平脈大法第一　五藏脈輕重第二
指下形狀第三　五藏脈所屬第四
分別病狀第五　三關對治法第六
五藏積聚第七　陰陽表裏虛實第八
何時得病第九　扁鵲華佗察聲色第十
五藏六府氣絕候第十一　四時相反第十二
死期年月第十三　扁鵲診諸反逆死脈第十四
診百病死生第十五　三部死生要第十六

平脈大法第一

論曰夫脈者醫之大業也既不深究其道何以為醫者哉是以古之哲醫寤寐俯仰不與常人同域造次必於醫顛沛必於醫故醫者必能感於鬼神通於天地可以濟衆可以依憑若與常[illegible]其波瀾則庶事墮壞使夫物類將何仰焉由是言之學者必

靜嘉堂文庫所藏

棄俗情凝心於此則和調之功因茲可得而致也經曰診脈
之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調
勻氣血未亂乃可診有過之脈切其五色察其精明觀五藏有餘不足六
府強弱形之盛衰可以參伍決生死之要也。又曰平脈法皆於平旦
勿食勿語消息體氣設有所作亦如食頃師亦如之既定先診寸
口初重指切骨定乃便漸舉指令指不厚不薄與皮毛相得如三
菽之重輕重之間隨人強弱肥瘦以意消息進退舉按之宜稱其
浮沉類應於四時五行與人五藏相應不爾者以其輕重相薄體
狀尋論異息得失。凡人稟形氣有中適有躁靜各各不同氣脈
潮動亦各隨其性韻故呼而脈再至吸而脈再至呼吸之間復一
至合為五至此為中適者也春秋中日夜正等其呼而脈至多吸
而脈至少或吸而脈至多呼而脈至少此則不同為冬夏日夜長
短之異也凡氣脈呼吸晝夜變通效於四時然於呼吸定息應五
至之限無有虧越猶晷刻與四時長短而歲功日數無遺也若人

狀貌有羸有壯其呼吸雖相接續而晝夜息度隨其漏刻是謂呼
吸象晝夜變通效於四時也。夫診脈當以意先自消息壓取病
人呼吸以自同然而後察其脈數計於定息之限五至者為平人
若有盈縮尋狀論病源之所宜也。黃帝問岐伯曰何謂三部脈
也岐伯曰寸關尺也凡人修短不同其形各異有尺寸分三關之
法從肘腕中橫文至掌魚際後文却而十分之而入取九分是為
尺從魚際後文却還度取十分之一則是寸口又十分之而入
取九分之中則寸口也此處其骨自高故云陰得尺內一寸陽得
寸內九分從寸口入却行六分為關分從關分又行六分為尺分
絃為少陽躁為陽明洪為太陽三陽也微為少陰遲為厥陰沉為
太陰三陰也呼為表屬腑吸為裏屬藏。夫十二經皆有動
脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之法何謂也然寸口者脈
之大會手太陰之動脈也人一呼吸定息脈行六寸人一日一夜
二千五百息脈五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二

靜嘉堂文庫所藏

一度行陰亦二十五度又言十至五十度為一周晬時也故五十度周而復會於手太陰寸口者節五藏六腑之所終始故法取於寸口人有三百六十脈法三百六十日又曰從魚際却行一寸其中名曰寸口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰中關關前為陽主氣而關後為陰主血入以中關為界如天地人為三界○寸主射上焦頭及手竟手上部關主射中焦及腹中部尺主射下焦小腹至足下部此為三部法象三才天地人頭腹足為三元也

診五藏脉輕重法第二

初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部肺金秋三月之氣○如六菽之重與血脉相得者心部心火夏三月之氣○如九菽之重與肌肉相得者脾部土王四季六月戊己之氣○如十二菽之重與筋平者肝部木春三月甲乙之氣○按之至骨舉指來疾者腎部水冬三月壬癸之氣○浮而大散者心也象火浮散○浮而短濇者肺也象金濇○唯腎肝二脉俱沈也沈水而流○牢而長者肝也木動而生○按之而濡舉指來實者腎也濡弱如水重勝

指下形狀第三

浮脉舉之有餘按之不足曰浮○沈脉舉之不足按之有餘曰沈○濇脉細而遲往來難且散或一止復來曰濇○滑脉往來前却流利替然與數相似曰滑○洪脉極大在指下曰洪○細脉小大於微常有但細耳○微脉極細而軟或欲絶若有若無○弦脉舉之無有按之張琴弓弦狀○緊脉數如切繩狀曰緊○遲脉呼吸三至去來極遲○數脉去來促急一息六至曰數○緩脉去來亦遲小駃於遲○弱脉極軟而沈細按之欲絶指下似有曰弱○動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥然曰動○伏脉極重指著骨乃得曰關上沈不出名曰伏○芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實曰芤○軟脉極軟而浮細曰軟○虛脉遲大而軟按之不足隱指下

靜嘉堂文庫所藏

[illegible]〻然曰虛○實脉大而長微強按之隱指愊愊然曰實
促脉來去皆疾急數時止曰促○結脉往來緩時一止復來脉
結者生○代脉動而中止不能自還因而復動脉代者死
散脉大而散散者氣實血虛有表無裏○革脉有似沈伏
實大長微弦曰革　沈与緊相類　浮与芤相類　耎与弱相類
微与濇相類沈与伏相類緩与遲相類革与實相類滑与數相類

五藏脉所屬第四

心部在左手寸口(亦絡小腸)　肝部在左手關上　腎部在左手尺中
肺部在右手寸口(亦絡大腸)　脾部在右手關上　胃部在右手尺中
凡三部脉大都欲得等類尺如小細少許婦人小軟小兒四五歲
呼吸八至細數者吉
尺脉為陰陰脉常沈而遲寸關為陽陽脉但浮而速　脉法
肝心出左　脾肺出右　腎与命門　兩出尺部　魂魄穀神
皆見寸口　左主司官　右主司府　左大順男　右大順女

關前一分　人命之主　左為人迎　右為氣口　神門決斷
兩在關後　人無二脉　病死不愈　諸經減損　各隨其部
三陰三陽　誰先誰後　陰病治官(官藏內也)　陽病治府(府外也)　奇邪所舍
知何補取　審而知者　針入病愈　脉有三部　陰陽相乘
營衛血氣　而行人躬　呼吸出入　上下於中　因息遊布
察色觀脉　大小不同　一時之間　變無常經　尺寸參差
或長或短　上下乖錯　或存或亡　願為纂陳　令可分明
脉有三部　尺寸及關　營衛流行　不失衡銓　腎沈心洪
肺浮肝弦　此自常經　不失銖分　出入升降　漏刻周旋
漏水百刻　脉周一身　旋復寸口　虛實見焉　變化相乘
陰陽相干　風則浮虛　寒則緊沈　熱潛水滀　支飲急弦
動弦為痛　數洪熱煩　設有不應　知變所緣　三部不同
病各異端　太過可怪　不及亦然　邪不空見　終必有姦
審察表裏　三焦別分　知邪所舍　消息診看　斷決府藏

靜嘉堂文庫所藏

脈之貴若神 ○凡察病容色氣色澤脈之盛衰病之新故乃可治形氣相得色澤以浮脈從四時此為易治形氣相失色毛不澤脈實堅其脈逆四時此為難治○逆四時者春得肺脈夏得腎脈秋得心脈冬得脾脈其皆懸絕離者曰逆春夏沈澁秋冬浮大病熱脈靜泄所謂脈大脫血脈實病在中脈堅實病在外脈不應四時皆逆四時皆主難治 ○凡脈沈在裏 脈浮在表 遲則在藏數則在府 滑為下實數為虛熱 浮為風虛 動為雜痛沈為水實 弱為虛悸 則為寒 濇則少血 啾而且寒緩則為虛 洪則為氣 緊則為寒 弦數為痛 微亦為虛代散則死 偏弦為飲 雙弦胸下 拘急而痛 其久使人齒、惡寒

分別病形狀第五

凡訣脈視其久大小長短及性氣緩急脈之皆如其人形性則吉反之者則凶○夫脈者血之府也長則氣理短則氣病數則煩大則病進上盛則氣高下盛則氣陷代則氣衰細則氣少短而急者病在上 長而緩者病在下 弦而沉者病在內浮而洪者病在外 濇而微浮病在下 下緊上虛病在脾長而絃者病在肝 脈小血少病在心 大而緊者病在腎脈實者病在內 脈虛者病在外 浮大而虛者熱風沈細滑疾者內痛熱汗出 凡脈府為陽主熱藏為陰主寒 陽微則汗 陰浮自下 陽數口瘡尺數惡寒 陽數出血 陰澁下血

脈與肌內相得久持之至者可下之弦小緊者可下之弦遲者宜溫藥緊數者可發其汗

十口脈浮大而疾者名曰陽中之陰病苦煩滿身熱頭痛腹中熱汗出陰氣不通臂不舉 ○夫脈沈細名曰陰中之陰病苦兩十口沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時脛酸疫不能久立陰氣衰小便餘瀝陰下氣熱痒○尺寸堅牢而中无有此為陰中陽苦兩脛重少腹引腰痛寸口狀大尺

靜嘉堂文庫所藏

考此為陽干陰苦小腹痛滿不能溺
陽干陰苦小腹痛滿不能溺〇癉脉自弦〻數多熱痛弦遲多寒痺初持脉如急
風〻頭痛〇癉脉自弦〻數多熱痛弦遲多寒痺初持脉如急
躁狀疾洪久按之細而空苦費腰脚引痛不能食足脛重脉來
下大下小下長下短為癉癉禍〇十脉但實者心勞
脉來洪大頭〻者禍亦〇寸口脉弦中手頭痛
脉來過寸入魚際貴永
脉來中手弦從上擊者肩背皆痛
脉來中手弦從上擊者肩背皆痛陰中傷足脛寒足脉浮而大為
脉盛滑緊者痛在外熱
脉小實而堅痛在內冷
脉洪浮傷寒秋吉春成病
脉來緩滑者熱在胃中
脉小弱而浮滑外熱久病
脉來盛緊脹痛也
脉浮滑其人外熱風走利有飲難治
脉洪浮大風眩癲疾
脉急疝瘕小腹痛寒自
脉出魚際逆氣喘息
脉來伏者霍乱

脉來弦急疾者痺痛
脉浮而緩外波膚風發
脉來遲而澁脾中寒癥結
脉沈而細下焦寒小便數時苦絞痛下利
脉滑而浮散有擲緩風四肢不收
脉遲而緩脾胃風有急寒
脉沈而數其人中水冬不治自愈脉浮而細滑者傷寒飲冷
脉浮而緩外波膚風發
脉來遲而澁脾中寒癥結
脉沈而細下焦寒小便數時苦絞痛下利
脉滑而浮散有擲緩風四肢不收
脉遲而緩脾胃風有急寒
脉沈而數其人中水冬不治自愈脉浮而細滑者傷寒飲冷
脉弦而鈎腸下如刀刺狀如蛊已至困不死
脉短而滑病酒
脉沈遲藏腹痛痺
脉沈而滑下重亦腹痛
脉微弱者有寒少氣
脉澁者多血少氣
脉來弦急疾者痺痛
脉浮而緩外波膚風發
脉來遲而澁脾中寒癥結
脉沈而細下焦寒小便數時苦絞痛下利
脉滑而浮散有擲緩風四肢不收
脉遲而緩脾胃風有急寒
脉沈而數其人中水冬不治自愈脉浮而細滑者傷寒飲冷
脉弦而鈎腸下如刀刺狀如蛊已至困不死
脉短而滑病酒
脉沈遲藏腹痛痺
脉沈而滑下重亦腹痛
脉微弱者有寒少氣
脉澁者多血少氣
脉來大緊疾瘧病
脉沈而緊上焦下焦得冷大小便下痛
脉來緩而緊積聚擊痛
脉數有寒飲冬夏難治
脉微數雖甚不成病不可勞
脉滑陽氣盛
脉真即却中散絶者病在消渴
脉緊而數寒熱俱發必當下乃愈
脉小者血氣俱少
脉來大緊疾瘧病
脉沈而緊上焦下焦得冷大小便下痛
脉來緩而緊積聚擊痛
脉數有寒飲冬夏難治
脉微數雖甚不成病不可勞
脉滑陽氣盛
脉真即却中散絶者病在消渴
脉緊而數寒熱俱發必當下乃愈
脉小者血氣俱少

脉大者血氣多
脉大者血氣多
脉緊者胃中有寒苦不能食時久利
脉緊者胃中有寒苦不能食時久利曰難治

靜嘉堂文庫所藏

而緊左脇痛肝藏傷有瘀血　脉大細滑中有短氣
脉来浮緊且滑直有外熱内令不得大小便
兩手脉前部陽絶者苦心下寒毒喘中熱
脉洪大緊急病遠近在外苦頭痛發腫
脉浮大中風頭重鼻塞　脉微浮秋吉冬成病
脉沈重而中散者寒食澼水氣
脉細小緊急病遠近在中寒為疝瘕積聚腹中刺痛
脉来疾者為熱遲者為寒滑者為鬼注弦為痛痺
脉沈重而直前絶者病血在腹間水氣
脉沈重前不至寸口者徘徊絶病在肌肉遁尸
脉累〻如貫珠不前至當風寒在大腸留不去
脉累〻如止不至寸口輸者結熱在小腸膜中留不去
脉微即陽氣不足沾熱汗出
凡無陽即厥無陰即寒陽微不能呼陰微不能吸呼吸不足胃

滿短氣前大後小即上熱下冷頭痛目眩前小後大即胃滿短氣
上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死
腎絶為精亡魂魄飛揚心神脾志言嘔而長
陽邪來見浮洪　陰邪來見沈細　水穀來見實堅
浮而滑者宿食　洪大傷寒熱病　弦小者寒癖也
浮滑之脉速疾者食不消脾不磨也　関脉緊而滑者蚘動
尺脉沈滑者寸白蟲也　三部皆小至陰氣在胃故令不通也
脉緊而急者遁尸　脉緊而長過寸口者注病
尺脉浮者客陽在下焦　関脉浮積熱在胃中
諸浮諸弦諸沈諸緊諸滑諸實若在寸口膈上以上病　頭部
若在関上以下病　臂脚
若在尺中腎以下病　腰脚
寸口沈胃中短氣若弦上寸口者宿食降頭〻痛有表無裏邪
之所止得鬼病何謂表裏寸尺為表関上為裏兩頭有脉関

靜嘉堂文庫所藏

[illegible]脉上不至關為陰絶　寸脉下不至關為陽絶
陰絶而陽微死不療上下不至關陰陽俱絶

三關對治法第六

平寸口脉對治法

寸口脉沈緊苦心下有寒時痛即有積邪
寸口脉偏絶則臂偏不遂其人兩手俱絶者不可治
寸口脉瀲瀲如羹上肥陽氣微　寸口脉連連如蜘蛛絲陰氣衰
寸口脉沈而弱寒中疝瘕小腹痛
寸口脉沈而緊病在中浮而盛病在外
寸口脉滑而遲不沈不浮不長不短者為病
寸口脉沈大而滑沈即為血實滑即為氣實血氣相搏入藏即死入腑自愈
寸口脉絃而緊絃即衛氣不行衛氣不行即惡寒水不流走腸間
寸口脉緊或浮膈上有寒肬下有水氣

寸口脉沈滑者中有水氣血實目腫
寸口脉雙絃兩脇下拘急而痛淅淅惡寒
寸口脉緩而遲緩即為虚遲則為寒虚寒相搏則欲温食食冷即咽痛
寸口脉浮而滑頭中痛
寸口脉遲而澁遲即為寒澁為少血
寸口脉浮大按之反澁尺中亦微而澁故知有滯氣宿食
寸口脉動而弱動即為驚弱即少氣為悸
寸口脉弦大婦人半生漏下男子亡血
寸口脉微弱氣血俱虚男子吐血婦人下血
寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風府向火灸身摩治風膏覆被卧令汗出
寸口脉緊傷寒頭痛宜服麻黄湯發汗針眉衝顳顬摩傷寒膏
寸口脉微脉苦外寒吐酸水是蛔膈宜五味湯摩茱萸膏令出汗
[illegible]脉數即吐有熱在胃管熏胷中宜吐針胃管宜除熱湯若傷寒[illegible]

靜嘉堂文庫所藏

七日至十日熱在中煩滿渴宜知母湯

寸口脉緩皮內膚外內頑痺不仁風寒在肌肉腠理宜防風湯以

藥薄熨之也灸諸治風穴

寸口脉滑陽氣實胷中逆滿宜前胡湯針巨闕寫之

寸口脉弦心下愊愊胷頭胃管痛在右邊心下有水氣宜甘遂

丸針期門寫之

寸口脉弱陽氣虛弱自汗出宜伏苓湯内補散將適飲食消息勿

極勞針胃管補之

寸口脉濇是脾胃氣虛竭乏不足宜乾地黄湯自養調和飲食

針三里補之

寸口脉芤吐血微芤者衄血出宜竹皮湯葛根湯黄土湯灸膻

中百壯

寸口脉伏胷中上逆欬氣噎塞不通是諸氣上衝胷中宜前胡鐵

大逆丸針巨闕腧并以寫之

寸口脉軟弱汗出是虛損病宜乾地黄湯署蕷丸内補散牡蠣

粉針太衝補之　寸口脉遲上焦脾口有寒痺心痛咽酸水宜

附子湯生薑湯茱萸丸調和飲食以煖之

寸口脉實則生熱在脾肺嘔逆氣塞虛則生寒在脾胃食不消

化熱即竹葉葛根湯寒即茱萸生薑湯

平關脉對治法

關脉時來時去乍大乍小乍踈乍數者胃中寒熱羸劣不欲飲食如瘧狀

關上襜襜大而尺寸細者其人必心腹冷積癥瘕結聚欲熱飲食

關上濇堅大實按之不減有力為中焦實有伏結在脾肺氣塞實

熱在胃中

關上脉滑而乍大乍小不均是為病方欲來不出一二日復欲發

動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止者死

關上微浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲心健忘

[illegible]浮大數風盛在胃中張口肩息悶心下澹澹食欲嘔

靜嘉堂文庫所藏

[illegible]弦長有腫痛如刀刺之狀在臍左右上下
關上脉浮氣虛腹滿不欲飲食浮為虛滿宜針胃管補之服平胃
九伏苓湯生薑前胡湯
關上緊心下苦滿痛脉緊不為實
宜針巨闕下管寫之服葉黃當歸湯又加大黃二兩
關上脉微細胃中冷氣心下拘急心宜針巨闕補之服附子生薑湯
附子丸
關上脉緩不欲食此脾胃氣不足宜服平胃丸補
脾湯又針章門補之
關上脉數胃中有客熱宜針巨闕下管寫之服知母湯除熱丸
關上滑胃中熱氣滑為熱實氣滿故不欲食宜針胃管寫之宜服
朴消麻黃湯平胃丸
關上弦胃中虛冷氣心下脹逆脉
弦胃氣虛宜針胃管補之又宜葉黃湯調飲食
關上脉弱無胃氣胃中有虛熱脹弱為虛熱作病說云有熱不
可大攻之熱去即寒起正宜針胃管補之服白薇湯
關上脉澁無血逆冷脉澁為血虛宜地黃散針太衝上瀉之

關上扎大便去血宜生地黃三升生竹皮湯灸臍前臍俞在第七
椎傍各寸半五十壯重下去血針關元服龍骨散
關脉伏有氣滯泄宜水銀丸針關元利小便止滯泄便止
關脉沈心下冷氣滿吞酸宜針胃管補之服白薇伏苓丸附子湯
關脉輕苦虛冷脾氣絶重下病宜針關元補之服赤石脂湯姜黃丸
關脉違　腹中有寒宜桂枝丸葉黃湯針胃管補之
關中脉　脾胃氣虛盛熱腹滿鬲宜針巨闕胃管寫之服紫
死丸寫脾丸
平尺脉對治法
尺脉弱下冷無氣上熱衝頭面脉偏滑疾面赤如醉外熱則病
尺脉細溏泄下冷利　尺中牢小者足脛寒痿痺腳疼
尺澁下血不利多汗　尺細而急者筋攣痺不能行
尺盛者熱上衝胸中疼小便赤　尺寸俱輕弱內惡熱手足逆冷若
寸俱沈關止若有冷氣苦寒心下痛陰寒冷脚

靜嘉堂文庫所藏

尺寸俱微少心力不欲言無氣不足其人腳弱短氣
尺寸俱數有熱手足頭面有熱俱遲有寒手足頭面有冷風
尺脈浮大不絕婦人血閉與關相應和滑者男子氣血實婦人
即為妊娠
尺中來而斷絕者男子少腹有滯氣婦人月水不利
尺脈浮下熱風小便難宜針橫骨關元寫之服瞿麥湯滑石散
尺脈緊臍下小腹結痛宜針關元補之服當歸湯灸臍左右二寸
天樞百壯
尺脈微厥逆小腹拘急針氣海在臍下一寸服小建中湯
尺脈數惡寒臍下熱痛小便赤黃宜針橫骨寫之服雞子湯白魚散
尺脈緩腳弱下腫小便難有餘瀝針橫骨寫之服滑石散
尺脈滑血氣實經脈不利針關元寫之服朴消煎大黃湯下
尺脈弦小腹疼小腹及腳中拘急服建中湯當歸湯針氣海寫之
尺脈弱下氣少發熱骨煩服前胡湯乾地黃茯苓湯針
關元補之　尺脈澀足脛逆冷小便赤服附子四逆湯
針太衝補之　尺脈芤下虛小便去血服竹皮生地黃湯灸
丹田關元左右一寸半五十壯
尺脈伏小腹痛癥疝穀不化服平胃丸結腸丸針關元補之
尺脈沉腰背痛宜服腎氣丸針京門入三分補之
尺脈輭腳不收風痺小便難服瞿麥湯白魚散針關元寫之
尺脈遲下焦冷陰有寒服桂枝丸針氣海關元寫之
尺脈實牢癥疝腰背胯冷小腹痛小便不禁服當歸湯加大黃一兩
利大便針關元補之止小便

五藏積聚第七

病有積有聚有繫氣夫積者藏病也終不移也聚者腑病也發作有
時展轉痛移繫氣者脇下牽痛痛則愈愈復發為繫氣夫病以
愈不得復發發之病發節之為繫氣也諸積大法脈來而細附骨者
乃積也關上積在臍旁關下積在少腹尺積在氣衝關積在心

靜嘉堂文庫所藏

積在胃中微出積在喉癰脉出在左積在左脉出在右積
又腹中横積痛其關脉弦腹中急痛腰背痛則相引腹中有寒疝
瘕關脉弦緊而細微也夫寒痺癥瘕積聚之脉狀皆弦緊若在心
即寸弦緊在胃管即關弦緊在臍下即尺弦緊

又脉癥法

癥在左手脉横癰在右手脉横頭大在上頭小在下偏得洪實而
滑亦為積弦緊亦為積寒痺為疝痛内有積不見脉難治見脉相
應為易治諸不相應為不合治左手脉大右手脉小上病在左脇
下下病在右足右手脉大左手脉小上病在右脇下下病在左足
脉弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治脉来細而沈時直者
身有癰腫若腹中有伏梁脉来浮而虚者出注也脉来沈實者
胃中有積聚不可下食即吐脉来細而滑按之能虚因急時直者
僵仆從高墮下癰在其内也脉濇而微浮病在脇下緊在上凡亡

汗肺中寒也飲冷水欬嗽下利胃中虚冷此等其脉並緊

五色法

赤色欲似鳥雞裏朱砂不欲如赭色
白色欲似鵝羽色不欲如堊土色
黄色欲如白雞裏雄黄不欲如黄土色
黑色欲如重漆色不欲如黑土色
青色欲如蒼璧之澤不欲如藍青色

陰陽表裏虚實第八

脉有一陰一陽一陰二陽一陽一陰一陽二陰一陽三陰
此六脉者謂浮沈長短滑濇也凡脉浮滑長陽沈濇短陰也今言
一陰一陽者謂脉来沈而滑也一陰二陽者謂沈滑而長也一陰三
陽者謂浮滑而長時一沈也今言一陽一陰者謂脉来浮而濇也一
陽二陰者謂脉来長而沈濇也一陽三陰者謂脉来沈濇而短時浮
經所在言其病逆順也浮數動滑陽也沈濇弱弦微陰也陽

靜嘉堂文庫所藏

為陰脉者逆也主死陰病見陽脉者順也主生關前為陽關後為陰陽數即吐陰微則下陽弦則頭痛陰弦即腹痛休之以察病也

○定虛實法

人有三虛三實者謂有脉之虛實有病之虛實也

脉有虛實者脉來濡者為虛大者為實言脉虛不言者為實緩者為病有虛實者出者為虛入者為實言脉虛不言者為實緩者為虛急者為實也

有診之虛實者濡者為虛牢者為實弦者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰虛實也

又邪氣盛則實精氣脫則虛何者是重實大熱病氣熱脉滿者是也浮之損小沈之實大名曰陰盛陽虛陽盛陰虛脉盛皮熱腹脹前後不通為五實

脉細皮寒氣少泄痢飲食不入為五虛

何時得病第九

何以知人露卧得病也陽中有陰也何以知人春得病也無肝脉也中何以知人春得病也無肝脉也冬得病无胃脉也四季之月得病无脾胃脉也凡四時皆以胃氣為本雖有四時王相之時無胃氣者難差何謂胃脉余前以滑者是命曰易治

扁鵲華佗察聲色要訣第十

病人耳目鼻口有黑色起入口者必死

病人兩目皆有黃色一把者其病當愈

病人耳目及頰顴上有青色一日死

病人有黑色出於額上及髮際至眉毛眉兩顴上五日死

病人及健人黑及白色一日鼻口者一五日而死

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人妄語錯亂及不能語者五日死口如魚口不能復閉而索水者多不返者死

靜嘉堂文庫所藏

病人循衣縫語言者不可治　病人尸白毛甚毛不可治
病人巳迴直視有息者一日中死　病人背青人中反者三日死
病人面無精光及土色不能念事者四日死
病人目无精光及牙齒黑色不可治
病人面黃目黑者九日死　病人面赤舌白者十日死
病人面赤目青者立即死　病人面青目黃者五日死
病人齒燥面黑者十三日死　病人髮乾者十五日死
病人遺尿不覺者死　病人爪甲青者必死
病人舌卷及卵縮者死　病人頭白及痛竿視物者死
病人面色黃目赤者不死　病人面黑目直視惡人者死
病人面黃目白者不死　病人舌青目白者死
病人面黃目青者死

病人面目俱黃即不死　病人面目俱白者即死
病人面黑目青者不死　病人面青唇黑者死
病人髮如乾麻喜怒者死　病人髮與眉衝起者死
病人面色黑兩脇下滿不能自轉及者死
病人卒腫面色蒼黑者死　病人手掌腫無文者死
病人臍腫反出外者死　病人陰囊並俱腫者死
病人手足爪甲下肉黑者死　病人汗出不流舌卷者
病人脣反人平滿者死　病人陰陽絕目眶陷者死
病人五藏已傷神氣不守聲嘶者死。病人陰陽俱絕裂衣掇空
病人陰結陽絕目精脫悅惚者死　病人榮衛竭絕面浮腫者死
妄言者死　。病人陰陽俱泄絕失音不能言者死
心病目黑腎刻心主笑而死　脾病唇青肝刻脾甲乙日死
病皮黑肺刻肝庚辛日死　肺病喘赤目腫心刻肺丙丁日死
腎病面腫唇黃脾刻腎戊己日死

靜嘉堂文庫所藏

訣五藏六府氣絕證候第十一

病人心絕一日死何以知之肩息回顧直仿偟視立死一曰停言死
病人肺絕三日死何以知之口張但出氣不還一曰鼻口虛張知氣不
病人骨絕五日死何以知之脊痛腰疼腎中重不可及轉一曰足脈
後平九日死
病人腎絕六日死何以知之耳乾胸舌皆腫溺血大便赤一曰足
腫九日死
病人脾絕口冷足腫腹熱臚脹泄利不禁十二日死何以知之泄
利不禁其時一曰五日死
病人筋絕九日死何以知之爪色青又主筋槐驚虛恐手足爪甲
青呼罵而不休一曰八日死
病人腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得左右白汗不止
病人肝絕八日死何以知之眸王眼其色青面青但欲伏眠目視
而不見人魂忘恐懼汗出如水不止一曰二日死

病人腎絕四日死何以知之腎主胃節胸腰精齒尚当正黑日
中黃色脹中欲折白汗出如流水一曰人中平七日死
病人胃絕齒路白黃十日死
諸浮脉無根者死已上五藏六脉為根也

診四時相反脉第十二

春三月木王肝脉治肝脉當先至而反不至及得腎脉此為四時王相脉相
順脉也到六月土王脾脉當先至而反不至及得腎脉此為四時反
脾也七十日死何謂腎反脾
夏火王心脉當先至脾脉次之而反得腎脉是謂腎反脾期五
月六月忌丙丁脾反肝三十日死何謂脾反肝春肝脉當先至而
不至脾脉先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙肝反肺三歲死
何謂肝反肺
秋肺當王至而不至肝反先至是肝反肺也期七月八月忌庚辛
反腎二歲死何謂心反腎

靜嘉堂文庫所藏

急當先至而不三脈俱先至是謂一死也
冬腎水脈當先至而不至而心脈反至是謂心反腎逆中不論
肺金之氣疎略未預指南又推五行亦頗顛倒待垂別録上

珍曰脈動止投數死期年月第十三

脈一動一止二日死　脈二動一止三日死　脈三動一止四日死或五日死
脈四動一止六日死　脈五動一止七日死　脈六動一止八日死
脈七動一止九日死　脈八動一止十日死
脈九動一止十一日死　一經云十三日死又云春死
脈十動一止立春死　一經云立夏死又一經云立夏至死
脈十一動一止立夏死　一經云立冬死
脈十二十三動一止者立秋死又一經云立夏死
脈十四十三動一止者立冬死　一經云立夏死
脈二十動一止一歲死又經云立秋死

脈二十五動一止三歲死　一經云一歲又云立冬死
脈三十動一止三歲死　脈四十動一止四歲死
脈五十動一止五歲死

五行氣畫陰陽數周榮衛出入經脈通流晝夜百刻五德相扶
脈來五十投而不止者五藏皆受氣是樊衛不失即無病也
脈來四十投而一止者　藏無氣却後四歲春草生而死
脈來三十投而一止者二藏無氣却後三歲麥生而死
脈來二十投而一止者三藏無氣却後二歲桑葉赤而死
脈來十投而一止者一藏無氣不出年中死
脈一來而久住者宿病在心主十
脈二來而久住者病一肝支中
脈三來而久住者病在脾下
脈四來而久住者病在腎間
脈五來而久住者病在肺支間
五脈病虛贏人得此者死所以然者藏氣不得而治針不得而及如
是逆人可治氣公故也

扁鵲診諸反逆死脈要第十四

脈病人不病來如屋漏雀啄者死屋漏者絶止時々起而不相連者也雀啄者頻來而數而疾也又經云得病七八日脈如屋漏雀啄者死脈彈人手如黍米也

脈來如彈石去如解索者死彈石者辟々急也解索者動數而隨散乱无復次緒也順則生逆則死所謂順者手足溫逆者手足冷也病人脈如蝦之游如魚之翔者死如蝦游者苒々而尋復退沒不知所在久乃復起々輙遲而沒去速者是也魚翔者似魚不行而但掉尾動頭診之久住者是也

脈浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當欬也

脈如轉豆者死　脈如偃刀者死似側刀刃也

脈涌々不去者死　脈分絶者死而上下分散也

脈有表無裏者死經名曰結去何謂結去在皆下如麻子動搖而去屬腎名曰結去不可治也何謂代凡脈五來人合一氣々息一止經五來不復增減者名曰代也脈來絃而微者血氣俱虛微少氣也脈々來是人一息半時不復增減亦名曰代不可治也

脈來洪大盛而堅硬者血氣俱盛實也

病若閉目不欲見人脈當得肝脈強急而長而反得肺脈浮短而濇者死

病若開目而渴心下牢者脈當得緊實而數反得濡而微者死

病若吐血復鼽衄脈當得沈細而反浮大牢者死

病若譫言妄語身有熱脈當洪大而反手足四逆脈細微者死

病若大腸而泄脈當微細濇而反得緊大而滑者死又形脈與病相反者死

病若頭痛目痛脈反短濇者死　病若腹痛脈反浮大而長者死

病若腹滿而喘脈反滑利者死　病若四肢厥逆脈反浮大而短者死

病若耳聾脈反浮大而濇者死　病若腦痛反而緩者死

左有病右痛下有病上痛此為逆逆者不可

靜嘉堂文庫所藏

反步沈之絶濇浮之不止推手者半月死
人形病脉不病者生脉病形不病者死
人病尸厥浮之不應脉絶者死　脉當二反小者死
肥人脉細小如絲沈絶者死　羸人得躁脉者死
人自濇而脉來往疏者死　人自滑而脉來往遲者死
人自長而脉來往短者死　人自大而脉來往小者死
尺脉上應寸口太過者半日死
診五藏六腑十二經脉皆有相反有一反逆即為死候也

診百病死生訣第十五

診人温病三四日不得汗脉大疾者生脉細難得者死
診人温病下利腹中痛甚者死　診人温病下利腹中痛甚者死
診人病甚而脉不調者難差　診人病甚而脉洪易若
診人頭痛目痛至視無所見者死
診人病瘧腰脊強急喪溲者不可治

診人心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死
診人腸辟下膿血脉沈小遲者生數疾大熱者死
診腸辟下白膿脉沈者生浮者死
診洞泄食不化下膿血脉數微小者生堅急者死
診腸辟下膿血脉懸絶則死滑大則生凡腸辟之屬身不熱脉不懸絶滑大皆生懸濇皆死（詔經元懸脉之狀有弦或作絃字）
診諸腸辟下膿血有寒者生有熱者死
診諸腸辟其脉滑者生浮者死懸絶澁者皆死
診欬嗽脉沈堅者死浮直者生
診吐血衄血脉滑小弱者生實大者死
診唾血脉堅強者死滑者生也
夫病吐血而嗽上氣其脉數有熱不得臥者死
診人心腹積聚耳脉堅急者生虚弱者死
若腹大脹四肢逆冷其人脉反長者死

靜嘉堂文庫所藏

診人熱病七八日脈不教者當後三日温汗汗不出者死
診人熱病七八日其脈反細小便一夜口燥舌焦乾黑者死
熱病未得汗脈盛躁得汗者生脈躁者難治
熱病已得汗脈靜安者生脈躁者難治
熱病脈躁疾而一不得汗者出陽之極也十死不治
熱病已得汗脈常躁盛氣之極也死
熱病已得汗常大熱不去者死
熱病已得汗熱未去脈微躁者憤不得刺治也
熱病發熱熱甚者其脈陰陽皆竭慎勿刺汗不出必不治
診癲病脈實堅者生脈沈細小者死
夫病欬嗽羸瘦脈堅大者死
診傷寒欬嗽上氣其脈散者死謂其形損故也
診嗽脫形發熱脈堅急者死
診嗽而嘔腹脹而洩其脈絃絃欲絶者死

診諸欬嗽其脈浮輭者生沈伏者死　診上氣脈數者死
診人肌瘦脫形熱不去者死
診上氣面浮腫肩息其脈大不可治加刺必死
診人消渴其脈數大者生細小浮短者死
診人消渴脈實大病人可治小堅急不可治
診人病舌蝕疹陰其脈乘小者生脈堅急者死
診人腸辟節攣其脈小細安靜者生浮大堅者死
診人被風不仁其脈虛者生堅急疾者死
診人上氣喘息肩竹其脈滑手足温者生脈濇四肢寒者死
診人汗出若刃其脈小滑者生大躁者死
診人陰陽俱竭言見其脈小滑下如熱小反其脈躁者死
診人寒熱夢衣其脈代絶者死
診金瘡血出太多脈虛細者實大者死
診人從高顛仆內傷眠滿其脈堅強者生小弱者死

靜嘉堂文庫所藏

診傷寒熱盛脉浮大者生沉小者死
診傷寒已得汗脉沉小者生浮大者死
診心腹積聚其脉堅強急者生沉小者死
診癥逆汗出脉堅急者生虛緩者死
診水病脉洪大者可治微細者不可治
診水病腹大如鼓脉實者生虛者死
診洩注脉緩時小結者生浮大數者死
診人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死
診寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆澁則死
診金瘡出血脉沉小者生浮大者死
診人卒得中惡脉大而緩者生緊而浮者死緊細而微者亦生
診人惡吐血數升脉沉數細者死浮大而疾者生
診人為百藥所傷脉微細者死洪大而速者生
診老人脉微微陽羸陰強者生脉躁大加息者死陰弱陽強

脉至而代奇月而死
診熱病三五日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾者八日死
尺脉濇如堅為血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上衝此為婦
人胞中絕傷有惡血久成結瘕若餘赤而死脉來細而微者血氣
俱不足細而來有力者穀氣不充得節輒動棗葉生而死
左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關關至尺三部之位
處處動搖各異不同其人仲夏得之此脉桃葉落而死
右手寸口脉偏沉伏乍小乍大朝來浮大暮夜沉伏浮即太過
魚際沉伏即下至關往來無常時時復來者榆葉枯落而死
左手尺部脉三十動一止又頓還三十動一止乍動乍疎不與
息數相應其人雖食穀猶不愈蘩草生而死
右手尺部脉三十動而一止止而復來來如循直木如循張弓弦
絙絙然如兩人共引一索至立春而死
診水病陰閉其脉沉大者生沉細虛小者則死

靜嘉堂文庫所藏

三部脉虛實決死生第十六

三部脉實長病得之不治
三部脉虛長病得之不治虛而濇長病亦死虛而滑亦死虛而緩亦死虛而絃急癲病亦死矣
三部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死
三部脉絃而數卒病得之死
三部脉微而伏長病得之死
三部脉革長病得之死卒病得之生
三部脉激激如羹上肥長病得之死卒病得之生
三部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生
三部脉軟長病不治自愈治之死卒病得之生
三部脉如鈎長病得之死卒病得之生
三部脉累累如貫珠長病得之死
三部脉如水淹然流長病不治自愈
三部脉如水之流者長病得之生卒病得之死
三部脉實而滑長病得之生卒病得之死
三部脉堅而數如張弓絃蠱毒病必死
三部脉數而輭蠱毒病得之生
三部脉軟而長久得之死
三部脉如雀啄長病得之死
三部脉如屋漏長病得之死
三部脉浮而數長病得之生卒病得之死
三部脉細長輭長病得之生微而緊亦生
三部脉芤長病得之生
三部脉細而數長病得之生
三部脉絃急長病得之生
三部脉如釜中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中得夜半死
三部脉實而滑長病得之死實而緩則生實而緊亦生
三部脉緊急癲病可治

孫真人千金方卷第二十七

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏

二三

134
24
4 10

静嘉堂文庫所蔵

靜嘉堂文庫所藏

養性序第一　道引養性第二
黃帝雜忌第三　按摩法第四
調氣法第五　居處法第六
房中補益第七　服食法第八
養性序第一

靜嘉堂文庫所藏

希鵠云晝夜漏下水百刻凡一刻人百三十五息十刻一千三百五十息人之居世數息之間信哉嗚呼昔人歎逝何可不為善以自輔耶吾悟常患一日一夜有十二時一日十夜百二十時百日六千夜一萬二千時萬日萬夜十萬時此為三十年若長壽者至九十年只得三十六萬時百年之內斯須之間數時而活朝菌蟪蛄不足為喻雖可不自攝養而馳騁六情孜孜汲汲追名逐利千詐万巧以求屢言沒齒而無獲故養性者知其如此於名利若存若亡於

非善亦若存若亡所以没身不殆也余慨時俗之多僻皆放
逸以須亡耶因聊日組述養性篇用獎人倫之道好事君子与我
同志焉○六養性者欲所習以或性、自為善習無不利也性
既習善內外百病皆悉不生禍乱災害亦死由作此其養性之経也
蓋養性者則治未病之病其義故也養性者不但餌藥飡霞其在
兼於百行百行周備雖絶藥餌足以遐年德行不充縱服玉液金
丹未能延壽故老子曰善攝生者陸行不遇兕虎此則道德之祐
也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以樂餌者以救无行之人故愚
者抱病歷年而不修損一行纏病沒齒終无悔心此其所以岐和
長逝彭附永謝良有以也統康曰養生有五難名利不去一難喜
怒不除為二難聲色不去為三難滋味不絶為四難神慮精散為
五難五者必存雖心希往者口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能
不迴其操不夭其年也五者无於胷中則信順日closed道德日全不
祈喜而有福不求壽而自延此養生之大旨也然或有服膺仁義

无甚泰之累者抑其亞欤魏武與皇甫隆令曰聞鄉年出百歲
而體力不衰耳目聰明顏色和悦此盛事也何所服食施行可
得聞乎若有可傳想密示封內上疏對曰臣聞天地之性唯人
為貴人之所貴莫貴於生唐荒先始刼運先窮人居其間忽如電
過每一思此罔然心熱生不再來逝不可追何不抑情節性之自
保惜今四海垂定太平之際又當須展才布德當由萬年萬年先
窮當由修道道甚易知但莫能行云云臣常聞道人蒯京之年
百七十八而甚丁壯言當朝一服食玉泉琢齒使人丁壯有顏色
去三蟲而堅齒玉泉者口中垂也朝旦未起早嗽津令滿口乃吞
之輒琢齒二十過如此者亦乃名曰練精云云
蒯道人年近二百而少若旦言但取天門冬去心切乾之搗服方
寸匕日三人令人不老補中益氣令耳聰目明除百病云云
仲長統曰王侯之家侍妾數百晝則以酣酒
人甚晉髓夜則以房室竭其血氣耳聽嫭聲目樂邪色醺內不出

靜嘉堂文庫所藏

迯外不返一云公得之於上古家隆馳之於下及至生産不時至育大
早或童孺而擅氣或疾病而竭精〻氣薄惡血脉不純既出胞藏
養護無法又蒸之以綿纊爍之以五味胎傷孩病而脆未及堅
剛復縱情慾重〻相生病〻相孕国無良醫〻無審術姦佐其間
過謬常有會有一疾痛莫能自免當今以百歳之人者豈非所習
不純正也 ○黄帝問於岐伯曰余聞上古之人春秋皆度百歳
而動作不衰今時之人年至半百而動作皆衰者時代異耶將人
之失也岐伯曰上古之人其知道者法則陰陽和於術數食飲有
節起居有常志不妄作勞故能形与神俱尽終其天年度百歳乃
去今時之人則不然以酒為漿以妄為常以醉入房以欲竭其精
以耗散其眞不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居无節
故半百而衰也夫上古聖人之教下也皆如謂虚邪賊風避之有
時恬惔虚無眞氣從之精神内守病安從來是以其志閑而少欲
其心安而不懼氣從以順各從其欲皆得所願故甘其食美其服

樂其俗高下不相慕故其人曰朴是以嗜欲不能勞其目淫邪不
能惑其心愚智賢不肖不懼於物合於道數故能度百歳而動作
不衰以其德全不危也是以人壽夭在於撙節若將息得所則長
生不死恣其情欲則命同朝露岐伯曰人年四十陰氣自半
也起居衰矣年五十身重耳目不聰明年六十陰痿氣大衰九竅
不利下虚上實涕泣俱出故曰知之則強不知則老故同出名異
智者察同愚者察異〻愚者不足智者有餘〻則耳目聰明身躰
輕強〻老復壯〻者益理是以聖人為无為之事樂恬惔之味能
縱欲快志得虚無之守故壽命無窮与天地齊此聖人之治身法

道引養性法第二

眞人曰雖常服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道欲
小勞但莫大疲及強所不能堪耳人食畢當行歩躊躇有所為
之為快也故流水不腐戸樞不蠧以其動故也人不得食食
畢但當行歩訖夜中數里往來飽食即臥生百病不消成積聚

靜嘉堂文庫所藏

也食欲少而數不欲頓多難消也常欲令如飽中飢々中飽故養
性者先飢乃食先渴後飲食畢當行畢使人以粉摩腹上數百
徧食易消大益人令人能飲食無百病暮臥常習閉口開即失
氣又邪惡從外入窗牖側臥益人氣力勝正偃臥春欲晏臥早起
夏及秋欲寢夜早起冬欲早臥晏起皆益人雖云早起莫在雞鳴
前雖晏起莫在日出後冬天地閉血氣藏人不可作勞出汗發泄
陽氣損人養性之道莫久行久立久坐久臥久聽久視莫強食莫
強酒莫強舉重莫憂思莫大怒莫悲愁莫大懼莫跳踉莫多言
莫大笑勿急急於所欲勿悁悁懷忿恨皆損壽命若能不犯則長
生也飲酒不欲多々則速吐之為佳醉不可以接房又不可當風
臥不可以人扇之皆即得病也醉不可露臥々黍穰中發瘡
醉不可強食或發癰疽或發瘖或生瘡醉飽交接小者面䵟欬
嗽六者傷絕藏脈損命醉飽不可以走車馬及跳躑不可忍小便
因以交接使人得淋莖中痛面失血色人有所怒血氣未定以交

接令人發癰疽婦人月事未絕而與交接令人成病得白駮新沐
浴髮勿以當風勿濕縈髻勿濕頭臥使人頭風眩悶髮頹面黑齒
痛耳聾頭生白屑飢食畢當漱口數過令人牙齒不敗口香濕衣
汗衣皆不可久著令人發瘡及風瘙大汗能易衣佳不易者急洗
不爾令小便不利春天不可薄衣令人傷寒霍亂食不消頭痛抱
朴子曰或問所傷之者豈色欲之間乎答曰亦何獨斯哉長生之
要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年尚少
壯而知還陰丹補腦采氣以益補不服藥物不失一百二百歲但
不得仙耳不得其術者古人方之於冰杯之盛湯羽苞之蓄火又
且才所不逮而強思之傷也力所不勝而強舉之傷也深憂重恚
恚傷也悲哀憔悴傷也喜樂過度傷也汲々所欲傷也戚々
所患傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沈酒
嘔吐傷也飽食即臥傷也跳走喘乏傷也讙呼哭泣傷也陰陽不
交傷也積傷至盡々則早亡々則非道也是以養性之士唾不至遠

靜嘉堂文庫所藏

行不疾步子不極聽目不極視坐不久處立不至疲卧不至慰先
寒而衣先暑而解不欲極飢而食不可過飽不欲極渴而飲飲
不欲多飢食飽食飲過多則成痰癖也不欲甚勞
不欲甚佚不發流汗不發多睡不欲極目遠望不
發咳生冷不發食酒當風不欲廣志遠願不欲規造
異巧冬不欲極温夏不欲窮涼大寒大熱大風大霧皆不發冒之五味不欲偏多故酸多則傷脾
苦多則傷肺辛多則傷肝酸多則傷心甘多則傷腎此五行自
然之理也凡言慎欲者亦不使過耳長以善攝生者
卧起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方
杜疾閉邪有吞吐之術流行榮衛有補寫之法節宣勞佚有当奪
之要忍怒以全陰氣抑喜以養陽無勞後先服草木以救虧缺後
服金丹以定元氣養性之理尽於此矣
每旦初起面向午展兩手於膝上心眼觀氣入頂下達湧泉旦旦

如此名曰送氣常以鼻引先引氣微吐之不得開口復欲得出氣少
入氣多每欲食先須送氣入腸微以食為主寢不得語若欲語須住乃語行語令久失
鍾磬不懸不可發聲行不得語若欲語須住乃語行語令久失
氣人有四正坐正立正言正行正每須守五神肺脾腎肝心言最
不得浮思孤房獨処心想欲事故大要起邪每行至則峻坐家中
有經像行求先拜尊長十日一食葵滑所以通五藏
氣又是菜之主不用合心而食冬至日止可語不可言自言曰言
苔人曰語每交至日於北壁下厚鋪而卧云受元氣每八月一日後
微火煖足勿令下冷春凍未泮衣欲下厚上薄養陽收陰繼世
長生養陰收陽則滅門行欲之事每日送氣須臾勿食生
菜生菜小豆陳臭勿食濁酒食麵則塞氣孔不用鬼〇踏栗
又不用寢卧多言四月十月至足至頂不得入房陰陽純用事之
月也凡氣冬至起於勇泉足以下也十一月至膝十二月至股正
月至要脊各三陽成二月至頂純陽用事陰亦放此人當

靜嘉堂文庫所藏

食去煩惱如食五味必一不得暴嗔則令人神驚夜夢飛揚暴數
為煩假觸為惱人臥一夜當作五度反覆常逐更轉酒醉勿當風
陽令人發狂日初入後勿入房亦勿言語讀誦寧待平旦凡行
立坐勿背日縱誦讀言語常想聲在氣海中臍也冬日觸冷行
莫大語笑開口食說以手摩面令津液通流二月三月宜食韭大
益人心常勿外緣是真人初學道法能如此者可居溫疫之中无
憂疑也常當視五藏如懸磬了了分明勿輟也旦起欲專言善事
不欲先計較錢財極不厭踈意不厭舒臥先臥心後臥眼常李淡
食居處不得華麗乃患害之源但令雅淨免於風雨暑濕為佳衣
服器械勿用珍玉金寶增長過失厨膳勿使脯肉豐盈常令儉約
飲食勿多食肉生百病常以食肉多食飯心有所愛不用深愛心
有所憎不用深憎並皆損性傷神亦不用深讚毀常須運心於物
平等如覓偏頗尋則改正居貧勿謂常貧居富莫謂常富居貧之
中常須守道勿以貧富易志改性識達道理似不能言有大功德

勿自矜伐人年五十至於百年美藥勿離乎身善言勿離乎口乱
想勿經心常以深心至誠恭謹於物慎勿詐善以悅於人終身為
人所嫌勿得起恨當以道德自平其心勿言行善不得善報以自
怨尤居處莫令心有不足若有不足則自抑之勿令得起所至之
處勿得多求多求則心自疲苦夫人之所以多病當自不能養性
平康之日謂言常然縱情恣心所欲得則便為之不拘禁忌欺罔
幽明無所不作當自思念深生恥媿誡勸身心常修善事故曰攝
生者少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少
惡行此十二少事則形不勞多思則神殆多念則志散多慾則損
智多事則形疲多語則氣爭多笑則傷藏多愁則心攝多樂則
意溢多喜則忘錯昏乱多怒則百脉不定多好則專迷不理多惡
則憔悴無懽此十二多不除喪生之本也惟无多无少者幾於道

黄帝雜忌法第三

要記曰一日之忌暮無飽食一月之忌暮无大醉一歲之忌暮无

静嘉堂文庫所藏

遠行終身之忌暮无燃燭行房莫若常護氣宗茅屋漏水墮諸
脯肉上食之成癥結病凡暴肉作脯不肯干者害人祭神肉无
故自動食之害人飲食上蜂行住食之必害人鹹傷筋醋傷骨
飽傷肺飢傷氣久視傷血久卧傷氣久立傷骨久坐傷肉久行
傷筋○凡牆北勿安牀勿面向北坐久思不祥起莫怒目久視
日月失其明丈夫見十步直牆卧風利吹人發癲及體重凡大
汗勿偏脫衣喜得偏風半身不遂夜卧當耳勿有孔吹即耳聾
遠行疲乏而來勿入房為五勞虛損少子凡入水沉者食之得冷
病終不差人行汗勿跂牀懸腳久成血痺兩足重腰疼凡熱食汗
出勿盪風發痙頭痛令人目澁多睡欲眠勿訴不祥起眠勿大語
損人氣力人頭邊勿安火炉日久引火氣頭重目赤及鼻乾冬日
溫足凍腦春秋足腦俱凍此聖人常法夜卧勿覆其頭得長壽詩
人魘勿然燈喚之定死无疑闇喚之吉亦不得近而急喚人眠勿
以腳懸蹋高處久成腎水及損房足冷人卧訖勿張口久成消渴

及失血色正月寅日燒白髮吉凡寅日剪手甲午日剪足甲又燒
白髮吉旦勿瞋恚旦下牀勿叱咤咄呼勿惡言勿舉足向火對竈
罵詈夜飲勿過醉飽食勿精思為勞苦事損旦勿嗟嘆勿唱奈何
名曰請禍勿豎膝坐而交臂膝上勿令髮覆面皆不祥清旦常言
善事聞惡事即向所來方三唾之吉夜夢惡不須說旦以水面東
方噀之呪曰惡夢著草木好夢成寶玉即无咎上牀坐先脫左足
行及乘車不用迴顧則神去人勿殺龜蛇勿向陰霧中遠行欲
行求常存魁剛在頭上所向皆吉若欲征戰存斗柄在前以指敵
吉勿向北大小便亦勿向西北唾犯魁剛神凶北冠帶凶勿食父
母及自己本命獸肉令人命不長魂魄氣揚勿臘日歌舞凶旦起
著衣反者便著之○衣光者當三振之曰殃去殃去勿塞井及水
瀆令人聾盲旦起勿開目洗面令人目澁失明饒淚夫妻不用同
日沐浴晦日浴朔日　遠行途中觸熱逢河勿洗面生烏䵟凡炊
湯經宿洗人體成癬洗面无光作甑生瘡忍尿不便膝冷成痺忍

靜嘉堂文庫所藏

大便不便努，痔。小便勿努，令兩足及膝冷。大便不用呼氣及強努，令人腰痛目濇，宜任之。熱泔洗頭，冷水濯，亦作頭風。飲水沐頭，亦作頭風。飽沐發，不卧，食即卧，令人心虛多汗。勿咳唾，不用遠成肺病。令人手足重及背痛咳嗽。時行病新汗解，勿冷水洗浴，損心胞，不能復故。水銀不可近陰，令玉莖消縮，又不得近牙齒，令齒斷腫齒冷。硫黃二硇不可近陰，不起。礬石不鍊，生入藥，使破心肝。小粉不可治寸白。有鉛入腹成冷病。空腹不用見屍臭氣入鼻，舌上白起，口常臭。欲見屍，皆須飲酒，見之能辟毒。夏不用屋上露面卧，令面皮厚，喜成癬，一云作面風。勿飲深陰池冷水，必作瘧瘧。遇神廟慎勿輙入，入必恭謹，不得舉目恣意顧瞻，當如對嚴君焉，乃享其福耳。不爾速其禍。亦不得反首顧視神廟。忽見龍蛇，勿興心驚怪。勿注意瞻視。忽見光怪變異之物，即強抑勿怪之。呪曰：見怪不怪，其怪自壞。路行及衆中，獨有殊妙美女，慎勿熟視而愛之，此當是魑魅之物，使人深愛之。无問空山曠野稠人衆中，皆亦如之。夢之善惡亦勿說之。婦人月事來，不用食蓼及蒜，喜為血淋。熊猪二脂不可作燈，氣入目，光不能遠視。母淚不得墮子目中，睛即破生翳。小兒不用指月，兩耳後生瘡，喜斷，名月蝕瘡。一切瘡著蝦蟆末，不畏蟲盤食。産後不用見狐臭人，發腫。水有沙蝨處，勿在水中浴。度水者隨驢馬急度，不傷人。有水弩之處，射人影即死，欲度水，以物打水，其弩散，急度。古山水龍土中出泉者，不可以居，常食者作癭瘤諸病。山有孔穴入採寶者，惟三月九月，餘月山閉氣，交死也。人卧，春夏向東，秋冬向西，此為常法。人飢須坐小便，若飽立小便，慎之无病。餘虛損人。日在己食訖，則不須飲酒，終身无干嘔。

按摩法第四 自按摩法，每日三徧，一月後百病並除，行及奔馬，此是婆羅門法

兩手相捉細捩如洗手法　　兩手淺相叉翻覆向胷

兩手相捉共按䏶左右同　　兩手相重按䏶徐徐捩身

以手如挽五石弓力左右同　　作拳向前築左右同

如拓石左右同　　作拳却頓此是開胷左右同

靜嘉堂文庫所藏

大坐斜身偏欹如排岩左右同　兩手抱頭望宛轉胜上此是抽脊
兩手護地縮身脊向上三舉　以手反搥背上左右同
大坐申脚三用當相手反制向後左右同
兩手急相又以脚踏手中左右同　起立以脚前後踏左右同
大坐申兩脚用當相手向所坐脚著膝上以手按之左右同
右勢雖是老人日別能依此法三偏者如常補益延年續命百病皆除能食眼明輕健不復疲之
老子按摩法
兩手抱頭左右紐胷三偏　一手抱頭一手托膝三折左右同
兩手舉頭向三頓足　兩手相拽頭上過左右三偏
兩手抱頭三舉之　一手抱頭縱下向上三偏左右如之
兩手扣又托心前推却挽亦三偏　兩手相又著心亦三偏
曲腕築肋挽肘左右亦三偏　左右挽前技後各三偏
反手著膝手挽肘覆手　膝上挽肘左右亦三偏

手摹脊從上至下使徧左右同　兩手空拳築三偏
外振手三偏內振三偏覆手振亦三偏
兩手相又覆撹各七七偏覆手振亦三偏　却搖手三偏摩紐捫
亦三偏　兩手反搖三偏　兩手反又上下紐肘亦數罷用十
呼兩手上聳三偏　兩手相又頭上過左右申肋十偏
兩手拳反背上掘脊上下亦三偏搖指之也
兩手反捉上下直脊三偏　覆兩手振各三偏
覆掌摘腕內外各三偏　覆掌前聳三偏
覆掌兩手相又交橫三偏　覆手橫直三偏聳
若有手患者聳上打至下得熱便休
舒左脚右手永之左手捺脚亦爾
前後挨足三偏　左挨足右挨足各三偏　前後却挨足三偏
直脚三偏　紐胜三偏　左挨足右挨足各三偏　若有脚冷者打熱須休
紐胜以意少頓胜三偏　內外振脚三偏　前後却挨足三偏
却直胜三偏　虎據左右紐肩三偏

靜嘉堂文庫所藏

推天托天左右三編　左右排山負山推山各三編

舒手直前頓申手三編　舒兩手兩膝亦各三編

舒脚直反頓申左右紐要各三編　挨內脊各三編

調氣第五

每旦夕旦夕者是陰陽轉換之時凡旦五更初暖氣至頰申眼開是上生氣名曰陽息而陰消暮日入後冷氣至漸々然時乃至臣坐睡刻時是下生氣至名曰陽消而陰息暮日入後冷氣當出入天地日月山川河海人畜草木一切萬物躰中代謝往来一時休息一進一退如晝夜之更迭如海水之朝夕是天地消息之道面向午衾兩手於脚膝上徐々按摩脫節口吐濁氣鼻引清氣○凡吐者去故氣亦各生氣故老子經云玄牝之門天地之根綿々若存用之不勤言口鼻天地之門可以出納陰陽死生之氣也良久徐々乃以手左拓右拓上拓下拓前拓後拓瞑目張口叩齒摩眼押頭按耳挽髮扶腰欹側發陽振

萬雙作隻作反手為之然後制足仰屈數八十九十而止仰下徐徐定心作禪觀之法想見空中太和元氣下入毛除漸々下入項如雨晴云入山透皮人內至腦漸々下入腹中四肢五藏皆受其潤如水滲入地若澈則竟腹中有聲汩々然意專思存不得外緣斯須則元氣達於氣海須臾則自達於湧泉若徹則竟身躰振動兩脇踡跼亦有琳聲拉々然則名一通二通乃至日別得三通五通則自覺身潤澤面色光輝膚毛潤悅耳目精明令人食美力健百病皆去五年十歲長存不妄得十萬通則去仙不遠矣

調氣法

彭祖曰和神導氣之道當得密室閉戶安牀煖席高二寸半正身偃臥瞑目閉氣於胷膈中以鳴毛著鼻上而不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思如此則寒暑不能侵蜂蠆不能毒壽三百六十歲此鄰於真人也

彭祖曰道不在煩但能不思聲色不思勝負不思曲直不思得失心藥厚心无煩形勿極而兼之以導引行氣不已亦可得長

靜嘉堂文庫所藏

生千歲不死凡人不可無思當漸〻除之人身虛無但有遊氣〻息得理即百病不生若消息失宜即諸病競起故善攝養者須知調氣方焉　調氣療萬病方

大患百日生眉髮賁也餘百不足言調氣之法夜半後日未前氣生得調日中後夜半前氣死不得調〻氣之時仰臥牀鋪厚輒枕高下共身平舒手展脚兩手握大母拍節去身四五寸兩眸相去四五寸引氣從鼻入足則停止有力更取久住氣閉從口細〻吐出尽還從鼻細〻引入出氣一准前法若患寒熱及卒患癰疽瘭不問日中後患未發前一食間即調如其不得好差明日依式更調之若患心冷病氣即呼出若熱病即吹出若肝病呵出若脾病即嘻出若肺病噓出若腎病即呬出夜半後八十一雞鳴七十二平旦六十三日出五十四食時四十五巳時三十六欲作此法先左右導引三百六十徧

治病有四一冷二痓三風四熱若患者安心此法無不差也百病不離五藏事須識其相貌善以知之　心藏病者躰冷熱相法心色赤患者夢中見人著赤衣特赤刀杖火怖人療法呼吹二氣屬心呼療冷吹治熱　肺藏病躰冷熱皆滿脹四肢煩悶相法肺色白患者夢見美女美男作親附人共相抱持或作父母兄弟再〻子療法噓氣出鼻中入口中吐黃令聲相逐呼而吐之熱病者用大呼三十徧小呼三十徧細呼十徧鼻中引氣　肝藏病者躰冷熱相法肝色青夢見人著青衣捉青刀杖師子虎狼來恐怖人療法用呵氣出　脾藏病者躰上游風習〻徧身痛煩悶相法脾色黃通土色夢或作小兒擊歷人邪猶人或如旋風團樂轉治法用呼氣出用大呼三十徧細呼十徧腎藏病者躰冷熱相法腎色黑夢見黑衣及獸物此力士相怖用嘻氣出用大呼三十徧細呼十徧呼法鼻中引氣入口中吐氣出當令聲相逐呼字而吐之熱病者大吹十徧細吹十徧吹物之吹當使字氣聲小字心悶者大噓三

靜嘉堂文庫所藏

十徧細嘘十徧肝病者大呵三十徧心病者大唏三十徧細唏十徧有冷者大呬五十徧細呬十三徧此十二種調氣法若有病依此法恭謹用心無有不差皆須左右導引三百六十徧乃為之

居處法第六

凡人居處之室必須周密勿令細隙致有風氣得入久居不覺使人中風古來忽得偏風四肢不遂或如角弓反張或失音不語者皆由忽此耳身既中風諸病總集邪氣得便遭此致卒逢大飄風暴雨大霧者此皆是龍神行動經過所致宜入室閉戶燒香靜坐安心以避之待過後出不爾損人或當時雖未有苦於後不佳矣冬月忽大熱之時夏月忽大寒之時皆勿受之有患天行時氣者皆由犯此也寢室有風勿強久坐必須急急避之居家當戒約內外長幼有不快即須道勿使隱忍以為无苦過時不知便為重病遂成不救小有不好即按摩挼捺令百節通利泄其邪氣凡人無問有事無事常須日別蹋脊背及四肢一度頭項苦令熟蹋即風氣時行不能老人此大要妙不可具論人居處及遠行隨身常有熟艾一升備急丸辟鬼丸生肌藥甘濕藥丁腫藥水銀大黃芒硝甘草乾薑桂心蜀椒不能更畜餘藥黃藥等常不可闕少及一兩卷百一備急藥方并帶辟毒蛇蜂蠍毒藥隨身也人自覺十日以上康健即須灸三數穴以泄風氣為佳勿以康健便為常然常須安不忘危預防諸病也灸法當須避人神凡畜手力細累每春秋皆須與能轉瀉藥一度則不中天行時氣也

房中補益第七

論曰人年四十已下多有放恣四十已上即頓覺氣力一時衰退衰退既至眾病鋒起久而不治遂至不救所以彭祖曰以人療人真得其真故年至四十須識房中之術夫房中術者其道近而莫之行其法一夜御十女不泄而已此房中之術畢矣兼之藥餌四時勿絕則氣力百倍而智慧日新然此方之作也非欲務於淫佚苟求快意務存節欲以廣養生也非苟欲強身力多幸女色

靜嘉堂文庫所藏

以縱情也意已施寫此遂疾也亡夾中之道也是以人四十已下
即服房中之藥者皆所以速禍慎之慎之故年未滿四十者不足以
与論房中之事也貪心未止兼餌補藥倍力行房不過半年精
髓枯竭唯向死近少年極須慎之人年四十已上常服錬乳散不
絶可以不老又餌雲母足以愈疾延年人年四十已上勿犯瀉
藥常依補藥佳且暮常御女選取體柔骨軟肌膚細滑言語
聲音和調四肢骨節皆欲足肉而骨小者甚益佳不可極於相
者蓬頭蠅面椎聲大口鼻目精渾濁骨大硬髮黃少肉皆賊損
人壽也御女之道務欲先徐徐嬉戲使神和意感良久乃可交
接但數交而慎泄者謂病自愈恐不必成一度素女法人年二十者
四日一泄三十者八日一泄年四十者十六日一泄年五十者二
十日一泄年六十者閉精勿泄若體力猶壯者一月一泄氣力尚
有強盛過人者亦不可抑忍久而不泄致生癰疽若年六十而有
數旬不交接意中平可閉精勿泄之

御女法當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧雷電霹靂地
動大寒大熱虹出日月蝕若御女者則損人神不吉也欲御女取
益而精自止勿妄傳也一月再泄精一歲二十四泄精皆得二百
歲有顏色無疾苦加以藥則可長生也所患人年少時不知道知
道亦不能信行之至老乃知道便以晩矣病難養也晩而自保猶
自延年益壽若年少壯而能道者得仙速矣素女曰竊聞人年六
十當閉精守一為可爾彭祖曰不然男不可无女女不无男若念
真正无可思者則大佳長生也人能一月再泄精一歲二十四泄
皆得壽二百歲但數交勿泄御女之法時深内勿動徐徐出入
令女感動以口鼻引取女氣而吞之則氣力倍甚佳也昔貞觀初
有野老可年七十餘詣臣云近數十餘日來陽氣益盛思与家媼
晝夜寢處事皆成未知垂老有此為善惡耶臣答之曰是大不祥
子獨不聞膏火乎夫膏火之將竭也必先暗而後明明止則滅今
足下年逼桑榆久當閉精茲忽春情猛發豈非反常耶竊為足

靜嘉堂文庫所藏

下憂之耳其勉於後四旬發病而死此其不慎之効也節之輩非
一旦疏一人以自助將來耳所以善攝生者凡覺陽事輒盛必謹
而抑之不可縱心竭意以自賊也若一度制得不泄則一度火滅
一度火滅一度增油若不能制得縱情極寫即旦旦膏火將滅更去
其油可不深以自防還補之道交接精動欲出急以左手中指抑
陰囊後七孔壯士抑之長吐氣并琢齒十徧勿閉氣更泄精亦
不出但從玉莖後還上入腦中此法仙人口口相授〻時皆軟血
為盟不得妄傳〻者身受其殃○素女曰交接之事既聞之矣
敢問服食藥物何者易得而有効彭祖曰使人丁壯不者房室不
勞損氣力顏色不衰者莫過麋角也取麋角刮之為末十兩
用生附子一枚合之服方寸匕日三服大良亦可熬麋角令微
黃單服之亦令人不老然遲緩不及附子者服之二十日大
有効又濕石不生也彭祖曰當以夜半之後生氣時數咽垂盡
飲玉漿閉氣以心中數〻令耳不容聞恐有誤乱兼以手下籌能

至二十則去仙不遠矣人但閉氣則自然益矣

服食法第八

欽悟曰夫欲服食當審性理冝冷暖之適不可見彼得力我便服
之初藥皆先草木次石是為將藥之大較也所謂精麤相代階麤
以至精者也夫人從少至長躰習五穀卒不可一朝頓遣之凡服
藥物為益遲微則无充飢之驗然積之不已方能骨髓填實五
穀呑然而自斷今人多望朝夕之效平目下之應府藏未充便已
絶粒穀氣始除藥未有用多驅御其神与俗無別以此致敝并胡不
怪哉服餌大躰皆有次第一小失其次其力故服餌大法必先去三
服木藥好得力訖次服石藥石藥好得力訖次第乃得其藥性庶事安穩
可以延齡

去三尸蟲方

真法在三尸經中備述生地黃汁三斗東向竈草火煎三沸內

靜嘉堂文庫所藏

清漆二升以荊七攪之日乙一天内真丹三兩復移一尺内豆黄末三兩微火勿令焦候之可丸先食服如梧桐子大一丸日三服三旦濁止下蟲中三十日諸蟲皆下五十日百病愈面色有光澤

生地黄生虚勞百病方

生地黄五十斤擣之以水三斗煮取汁絞去滓微火煎減半内白蜜五升棗膏一升攪之令相得可為丸下之服如雞子大一枚日三服

天門冬方

天門冬一名顛棘生奉高山在東平名逢羊食在於中岳名天門冬在西岳名管松在南岳名百部在北岳名元不愈在源陸山阜名顛棘雖然処処異名其實一也在北陰地者佳取細切烈日乾之擣篩每服方寸匕日五六二百日治顏疾損拘急者緩羸瘦者強三百日身輕二年走及奔馬与松脂若蜜丸服之益善唯多冬佳 ○又方天門冬切三石擣取汁微火煎取五斗下白蜜一斗胡麻炊禾二升合煎攪之莫息可丸即下大豆黄末和為餅徑三寸厚半寸旦服一枚日三服百日已上得益此方最上妙苞衆方天門冬方令人長生氣力百倍治虚勞絶傷年老衰損羸瘦偏枯不隨風濕不仁冷痺心腹積聚惡瘡癰疽腫瘻疾重耳不可周身膿瘻鼻柱敗爛取爛服之皮脫蟲出顏色肥白此死功不治亦治陰痿耳聾自閉久服白髮重齒落生延年益命入水不溺服經三年心腹固疾皆去

餌松子方

七月七日採栢子栢子松子過時即落不可得治服方寸匕日三四一云一服三合百日身輕三百日行五百里絶穀服昇仙渴飲水亦可和栢脂服之若丸如桐子大服十九

松脂方 百鍊松脂下篩蜜和丸如梧桐子大服十九

一枝日三服漸二別服一斤延年仙經曰常以三月入衡山之

靜嘉堂文庫所藏

陰取不見日月之松脂鍊而白者服百日耐寒暑二百三五
藏補益服五年即見西王母
狗杞根主養陰愈蝕方
狗杞根方寸切二升水二斗煮取六升澄清煎取三升以小
麥一升半乾為擇內汁中漬一宿往反令汁盡曝乾搗末
酒服方寸匕一年之中以二月八月合一劑終身不老
西嶽真人雲母粉方
雲母粉一斤　茯苓　八兩　鍾乳　桂心各七兩　菊花　柏子仁　人參
續斷　乾地黃　十二兩
右九味為末天門冬十九斤取汁浸藥蒸二石二斗黍米
下米熟曝乾為天食後服方寸匕日三方倍五日血脈盛七
日勿輟十日面於十五日行及奔馬三十日夜視有光十七日
髮盡落齒皆去更取二十七七白蜜和搗二百杵丸如梧子
大作八十枚曝乾丸皆映徹如水晶珠欲令髮齒時生者吞七
枚日三即齒髮不白木落者且服散五百乃白前治脈已
白者餌藥至七年乃落入山日吞七丸絕穀不飢也

麋角丸方

取新當牛者為上不自退連腦須看角根有疏痕處亦即斑角
退角根下平者是不堪諸麋角丸方凡有二百二十方此特出最
方之外容成公玉服而羽化夫造此藥取角五具破四具三具
兩具一具為一劑先煮大一大寸即各長七八寸取勢截斷量把
鎊得即於長流水中以臣盛懸浸可十宿如無長流水處即於
淨盆中蒲著水浸其麋之即將出削去皺皮以利鎊一取白
朮至心即止以清水漬之經兩宿初經一宿即乾握去舊水
宜新給上曝乾淨澤去惡物雜骨皮及鎊不勻者即以矢灰矣
酒於大白瓷器中浸經兩宿其酒及器物隨藥多少其藥及
酒俱入淨釜中初武火一食久時後即又著火微前如爛日洗
以柳木篦長四尺搗三指徐徐攪之困即勿令不得住手

靜嘉堂文庫所藏

美酒以成煎為度煎乞皆須平旦下手不得經兩宿即佐
消似希膠即以牛乳五大升蘇一斤以次漸下乃後取之
秦膠　人參　甘草炙　肉蓯蓉　檳郎人
麋角一條（煎汁令黃為散与諸藥同制之）　通草　兔絲子（酒浸兩宿待乾別擣之各一兩）
右擣為散如不要補即不須此藥共煎又可一食時候藥以稠
粥即止火少時歇熱氣即共諸藥散相和攪之相得仍待少
時漸稠堪作丸即以新器中盛之以衆手一時丸之丸如梧子
大如不能衆手丸旋煖漸丸亦得若粘手著少蘇塗手其服法
空腹取三果漿以下之如无三果漿酒下亦得初服三十丸日
加一丸至五十丸為度日二服初服一百日内忌房室服經一
月腹内諸疾自相驅逐有微痢勿怪漸後多泄氣能食明目耳
補心神安藏腑填骨髓理腰脚能久立髮白更黑貌老還少
其患氣者加枳殼炙青木香准前各一大兩若先曾服丹石等
藥即以三黃丸食上散冷宣泄如飲酒食麪口乾鼻中氣粗

眼澀即以蜜漿飲之即止如不止乃加以三黃丸使微利諸如
此熱事酒一度間微覺發動已後方始調暢服至二百日面皺自
展光澤一年齒落更生強記身輕若風日行數百里二年常令人
肥飽少食七十已上却成後生三年動作觧聆預見未明四年
常飽不食唯自見仙人形曲昏曉知驗秘之三十已下服之不輟
顔一定其藥合之時須淨室中不得令雞犬女人孝子等見婦人
服之亦佳

孫真人千金方卷第二十八

靜嘉堂文庫所藏

孫真人千金方卷第二十九　針灸上

明堂三人圖第一　三陰三陽流注第二
針灸禁忌法第三　五藏六腑傍通訣第四
用針略例第五　灸例第六

明堂三人圖第一

夫病源所起本於藏腑藏腑之脈並出手足循還腹背無所不至往來出沒難以測量將欲指取其穴非圖莫可備預之要非灸不精故經曰湯藥攻其內針灸攻其外則病無所逃矣方知針灸之功過半於湯藥矣然去聖久遠學徒昧於孔穴出入莫測其經源濟弱扶危臨事多惑余慨其不逮聊因暇隟鳩集今古名醫明堂以述灸經一篇用補私闕庶依圖知穴按經識分則孔穴親疎居然可見舊明堂圖年代久遠傳寫錯誤不足指南今一依甄權等所撰為定云爾若依明堂正經人是七尺六寸四分之身今半之為圖人身長三尺八寸二分其孔穴相去亦皆半之以五分為

靜嘉堂文庫所藏

寸其尺用夏家古又司馬六尺為步即江淮吳越所用八寸小尺是也其十二經脉五色作之奇經八脉以綠色為之

偃人明堂

仰人頭面四十五穴遠近法第一

上星在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆　顖會在上星後一寸陷者中　前頂在顖會後一寸半骨陷中　百會在前頂後一寸頂中心　五處在頭上去上星一寸半　承光在五處後一寸不灸　通天在承光後一寸半　臨泣在目上眥直上入髮際五分陷者中　目窗在臨泣後一寸　正營在目窗後一寸　神庭在髮際直鼻不刺　曲差俠神庭傍一寸半在髮際　攢竹在眉頭陷中　精明在目內眥　迎香在禾窌上直鼻下孔傍　素窌在鼻柱端　水溝在鼻柱下人中　兌端在脣上端　齗交在脣內齒上齗縫　本神在俠曲差傍一寸半一云直耳上入髮際四分　陽白在眉上一寸直瞳子　承泣在目下七分直瞳子不灸　四白在目一寸　巨窌俠鼻傍八分直瞳子　和窌直鼻孔下俠水溝傍五分　地倉俠口傍四分　承漿在頤前下脣之下　廉泉在頷下結喉上舌本　頭維在額角髮際本神傍一寸半　上關在耳前上廉起骨開口取　下關在客主人下耳前動脉下廉合口有空張口則閉　頰車在耳下曲頰端陷者中　大迎在曲頷前一寸三分骨陷中動脉　絲竹空在眉後陷中不灸　瞳子窌在目外去眥五分　顴窌在面鼽骨下下廉陷中

側人耳頸二十穴遠近法第二

頷厭在曲周顳顬上廉　懸顱在曲周顳顬中　懸釐在曲周顳顬下廉　天衝在耳上如前三寸　率谷在耳上入髮際一寸半　曲鬢在耳上髮際曲隅陷中　角孫在耳郭中間開口有空　和窌在耳前兌髮下動脉　耳門在耳前起肉當耳缺　聽會在耳前陷中張口得之　聽宮在耳中珠子大如赤小豆　天容在耳下曲頰後　天牖在頸筋缺盆上直天容　後天柱前完骨

靜嘉堂文庫所藏

下髮際上　缺盆在肩上橫骨陷中　扶突在人迎後一寸半
天窗在曲頰下扶突後動應手陷中　天鼎在頸缺盆直扶突後
一寸　人迎在頸大脈應手陷中　水突在頸
大筋前直人迎下氣舍上　氣舍在頸直人迎俠天突陷中

胃部中央直下七穴遠近法第三

天突在頸結喉下五寸宛宛中　旋機在天突下一寸陷中仰頭
取之　華蓋在旋機下一寸陷中仰取　紫宮在華蓋下一寸六
分陷中仰取　玉堂在紫宮下一寸六分直兩乳間　中庭在膻
中下一寸六分陷中仰取之

胃部第二行六穴遠近法第四

俞府在氣舍下去旋機傍各二寸陷者中仰取之　或中在俞府
下一寸六分陷中仰臥取之　神藏在或中下一寸六分陷中仰
臥取之　靈墟在神藏下一寸六分陷中仰臥取之　神封在靈
墟下一寸六分　步廊在神封下一寸六

胃部第三行六穴遠近法第五

俞府在氣舍下去旋機傍各二寸陷中仰取　庫房在氣舍下
一寸六分陷中仰取　膺窓在庫房下一寸六分乳中禁不灸
屋翳在庫房下一寸六分陷中仰取　乳根在乳下一寸六分陷
中仰取

胃部第四行六穴遠近第六

雲門在巨骨下氣舍兩傍各二寸陷中動脉應手舉臂取　巾
府在雲門下一寸乳上三肋間動脉應手陷中　周榮在中府
下一寸六分陷中仰取　胸鄉在周榮下一寸六分陷中仰取
天谿在胸鄉下一寸六分陷中仰取　食竇在天谿下一寸六分
陷中仰取

膜俞鳩尾下至曲骨第一行十四穴遠近法第七

鳩尾在蔽骨下五分　巨闕在鳩尾下一寸　上管在巨闕

靜嘉堂文庫所藏

丁一寸去蹻骨三寸　中管在上管下一寸　建里在中管下一寸　下管在通谷上三下寸　水分在下管下臍上一寸　臍中禁不刺　陰交在臍下一寸半　氣海在臍下一寸半　石門在臍下二寸　關元在臍下三寸　中極在臍下四寸　曲骨在橫骨上中極下一寸毛際陰中

腹第三行十一穴遠近法第八

幽門在巨闕傍半寸陰中　通谷在幽門下一寸　陰都在通谷下一寸　石關在陰都下一寸　商曲在石關下一寸　肓俞在商曲下一寸直臍傍六分　中注在肓俞下一寸　四滿在中注下一寸　氣穴在四滿下一寸　大赫在氣穴下一寸　橫骨在大赫下一寸

腹第三行十二穴遠近法第九

不容在幽門傍各二寸五分在住脉二寸直四肋端相去四寸　承滿在不容下一寸　梁門在承滿下一寸　關門在梁門下一寸　太一在關門下一寸　滑肉門在太一下一寸　天樞去肓俞一寸半直臍傍二寸　外陵在天樞下二寸　大巨在外陵下三寸　水道在大巨下三寸　歸來在水道下三寸　氣衝在歸來下鼠鼷上一寸

腹第四行七穴遠近法第十

期門在第二肋端不容傍二寸半上直兩乳　日月在期門下三分　腹哀在日月下一寸半　大橫在腹哀下三寸直臍傍　腹結在大橫下一寸三分　府舍在腹結下三寸　衝門去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中

手太陰脉經十穴第十一

少商在手大指端內側去爪甲角如韭葉　魚際在手掌後陷者中　經渠在寸本節後內側散脉中　大淵在掌後兌骨下陷者中　列缺去腕上一寸半　孔最在腕上七寸　尺澤在肘中約上動脉　俠白在天府下去肘三寸動脉　天府在腋下

靜嘉堂文庫所藏

三寸　臑會在臂前廉去肩頭三寸
手心主心胞絡八穴第十二
中衝在手中指端去爪甲如韭葉陷者中　勞宮在掌中央動
脉　大陵在掌後兩骨間　間使在
掌後三寸兩筋間　郄門去腕五寸　曲澤在肘內廉下陷者中
屈肘得之　天泉在腋下三寸
手少陰心經八穴第十三
少衝在手小指內廉之端去爪甲如韭葉　少府在手小指大節
後陷者中直勞宮　神門在掌後兌骨端陷者中　陰郄在
掌後脉中去腕半寸　通理在腕後一寸　靈道在掌後一寸半
少海在肘內廉節後陷中一極泉在腋下筋間動脉之旁
足陽明胃經十五穴第十四
厲兌在足大指次指之端去爪甲如韭葉　內庭在足大指次指
外間本節後去內庭二寸　衝陽在

足踝上五寸骨間去陷谷三寸　解谿在衝陽後一寸半　豐隆
在蹋上八　下廉在上廉下三寸　條口在下廉上一寸　上廉
在三里下三寸　三里在膝下三寸　上廉在膝下三寸　胳外
俠大節中　陰市一名陰扉在膝上三寸　伏兎在膝上六寸
髀關在膝上伏兎後交分中　梁丘足陽明郄在膝上三寸兩筋間
足太陰脾經十二穴第十五
隱白在足大指端內側去爪甲如韭葉　大都在足內大指內本
節後陷中　太白在足大指側核骨下陷中　公孫足太陰絡在
足大指本節後一寸別走陽明者　商丘在足內踝下微前陷中
三陰交在內踝上八寸骨下陷中足太陰交　漏谷在內踝上六
寸骨下陷中　太陰絡地機一名脾舍　大陰郄在膝下五寸
陰陵泉在膝下內側轉骨下陷者中　血海在膝髕上
內廉白肉際二寸半　箕門在鼠蹊動脉
衝在陰股中動脉

靜嘉堂文庫所藏

伏人頭第一行五穴遠近法第一
後頂在日會後一寸半 腦戶在枕骨
上強間後一寸半不灸 瘖府在入髮際一寸大筋內宛中不灸
瘖門在頂後髮際宛宛不灸
頭上第二行四穴遠近法第二
胳却在通天後一寸半 王枕在胳却後七分半俠腦戶傍一寸
三分 起內拢骨上入髮際二寸 天柱俠項後髮際大筋外
廉陷者中
頭上第三行三穴遠近法第三
承靈在正營後一寸半 腦空在承靈後一寸半俠玉枕傍枕骨
下陷中 風池在項後髮際陷中
伏人耳後六穴遠近法第四
顱息在耳後青脉間 翳脉在耳本雞足青脉不灸 完骨在
耳後入髮際四分在外陰在完骨上枕骨下 浮白在耳後入髮

際一寸 醫風在耳後陷中按之引耳中
脊中第一行十一穴遠近第五
大椎在第一椎上陷中 陶道在大椎節間 身柱在第二椎
節間 神道在第五椎節間 至陽在第七椎下筋縮在第
九椎下間 脊中在第十一枕節下間不灸 懸極在第十三
枕下 命門在第十四枕節下 要俞在第二十一椎節下
長強在脊骶端
伏人脊第二行二穴遠近法第六
大杼在項第一枕下兩傍各一寸半陷中 風門名熱府在第
二枕下兩傍各一寸半 肺俞在第五枕兩傍各一寸半 心俞
在第五枕下兩傍各一寸半 督俞在第七枕下兩傍各一寸半
肝俞在第九枕下兩傍各一寸半 膽俞在第十枕下兩傍各一
寸半 脾俞在第十一枕下兩傍各一寸半 胃俞在第十一枕
下兩傍各一寸半 三焦俞在十三椎下兩傍各一寸半 腎俞

靜嘉堂文庫所藏

在第十四椎下兩傍各一寸
一寸半　小腸俞在第十六椎下兩傍各一寸半　膀胱俞在第
十九椎下兩傍各一寸半　中膂俞在第二十一椎下兩傍各一
寸半　上窌在第空骨闕下一寸　俠脊兩傍　次窌在第二空
俠脊陷中　中窌在第三空俠脊陷中　下窌在第四空俠脊
兩傍陷中　會陰在陰尾骨兩傍
皆第三行十三穴遠近法第七
附分在第二椎下附項內俞兩傍各三寸　魄戶在第三椎下兩
傍各三寸　神堂在第五椎下兩傍各三寸　譩譆在肓膏內廉
俠第六椎兩傍三寸　膈俞在第七椎下兩傍各三寸　陽綱在
第九椎下兩傍各三寸　胃倉在第十一椎下兩傍各三寸　意舍
在第十二椎下兩傍各三寸　胃門在第十三椎下兩傍各三寸
音門在第十三椎下兩傍各三寸　志室在第十四椎下兩傍
各三寸　胞肓在第十九椎下兩傍各三寸　秩邊在第二十

一椎下兩傍各三寸
手少陽三焦經十六穴第八
關衝在手小指次指
間陷者中　中渚在小指次節後間陷中　陽池在手表腕
上陷者中　外關在腕後二寸空中　三陽絡在臂上大交脉支溝上
陷中　會宗在腕後三寸空中　三陽絡在臂上大交脉支溝上
二寸　四瀆在肘前五寸外廉陷中　天井在肘外大骨後肘後
一寸兩筋間陷者中屈肘得之　清冷淵在肘上三寸申肘聚臂
取之　消濼在肩下外間按斜肘又下行　天宗在秉風大骨下
陷中　臑會在肩後大骨下俠　廉陷中　肩外輸在肩甲上
廉去脊二寸陷者中　肩中俞在肩中央曲甲陷者中應手痛
曲垣在肩中央曲甲陷者中
手太陽小腸經九穴第九
少澤在手小指端去爪甲下一分陷中　前谷在手小指外側本

靜嘉堂文庫所藏

節前陷中　後谿在小指外側本節後陷中
前起骨下陷中　陽谷在手外側
踝骨上　支正在腕後五寸　小海在肘内大骨外去肘端五分
肩貞在肩曲甲下兩筋骨間　肩髃在臑骨頭後陷者中
足太陽膀胱經十八穴第十
至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉　通谷在足小指外側本
節前陷中　束骨在足小指外側本節後陷中　京骨在足外側
大骨下去白肉際陷中　申脉陽蹻所生外踝下陷中容爪甲
金門在足外踝下一名關梁　僕參一名安耶在足跟骨下陷中
崑崙在足外踝後跟骨上陷中　承山一名魚腸一名傷山一名
肉柱在兌端陽下分肉間陷者中　飛陽一名厥陽足太陽絡在
外踝上七寸別走少陰者　承筋一名踹陽一名宜脉在踝腨中
央陷中不刺　合陽在膝約中央下二寸　委中在
文中動脉　委陽在足太陽之後出於膕中外廉兩

下　浮郄在委陽上一寸屈足得之　附門在肉郄下六寸　扶
承一名肉郄一名陰關一名皮部在足髀下陰陽交下文中

側人明堂

側人手陽明大陽經二十穴遠近法第一

商陽在手大指次指内側去爪甲角如韭葉　二間在手大指次
指本節前内側陷者中　三間在手大指次指本節後内側陷者中
合谷在手大指岐骨間　陽谿在腕中上側兩筋間陷中　偏歷
在腕後三寸　温留在腕後小十五寸大十六寸　下廉在輔骨
下去上廉一寸　上廉在三里下一寸　三里在曲池下二寸按
之内起兌肉之端　曲池在肘後輔屈時曲骨之中　肘髎在肘
大骨外廉陷中　五里在肘上行臂外三寸　臂臑在肘上行
七寸臑肉端　肩髃在肩端臑上舉肩取之　秉風候天髎
外肩上髃後舉臂自有穴　肩井在肩上陷解中缺盆上大骨
前　天髎在肩缺盆中上陷骨取之　陷中肩髃在肩端兩骨

靜嘉堂文庫所藏

間　巨骨在肩端上行兩叉骨間陷中
側胸十六遠近法第二
章門一名長平在大橫外直臍季肋端　京門在脅脊中季肋本
俠脊帶脉季肋下一寸八分　五樞在帶脉下三寸一云在水道
下一寸半　維道在章門下五寸三分　居髎在長平下八寸三
分監骨上　泉掖在掖下三寸死中舉肩得之　大包在淵
掖下三寸　輒筋在腋下三寸復前行寸著脇　天池在乳後
一寸掖下著脇直掖掫肋間
足少陽膽經十四穴遠近法第三
膽竅陰在足小指次指之端去爪甲如韭葉　俠谿在足小指次
歧骨間本節前　地五會在足小指次指本節後間去陷谷一寸
半不灸　臨泣在足外踝如前陷者中去陷谷
三寸　竒陽在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間　懸鍾一
名絶骨在外踝上三寸動者足三陽絡　光明在外踝上五寸別

走厥陰者　外丘在外踝上七寸少陽郄少陽所生　陽輔在外
踝上輔骨前絶骨端如前三分許去丘虛七寸　陽交一名別陽
足卻陽浮郄在踝上七寸取屬三陽分肉間　陽陵泉在膝下一
寸外廉陷中　陽關在陽陵泉上三寸輔骨下　陽市在膝上
上五寸分肉間　環跳在髀樞中外
足厥陰肝經十六第而
大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中　行間在足大指間
動應手陷中　大衝在足大指本節後二寸或一寸半陷中　中
封在足內踝前一寸仰足取之伸足乃得　蠡溝在膝內踝上五
寸別走少陽者中　中都在內踝上七寸骨中与少陰相直　膝
關在犢鼻下三寸陷者中　曲泉在膝輔骨下大筋上下
筋下陷中屈膝乃得　陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脉
在陰廉下二寸　陰包在膝上四寸股內廉兩筋間　五里
足少陰腎經十二穴第五

靜嘉堂文庫所藏

涌泉一名地衝在足心陷中蜜足捲指宛宛中 谷一名龍泉
在足內踝前起大骨下陷者中 大鍾在足跟後衝中別走太陽胳足少陰胳 水源在
陷者中 大鍾在足跟後衝中別走太陽胳足少陰胳 水源在
大谿下一寸在內踝下 照海陰蹻脉所生在足內踝下 復留
一名昌陽一名伏白在足內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間 築賓在內踝上端分中 陰谷
在膝內輔骨之後大筋之下小筋上按之應手屈膝而得之 會
陰一名屏翳在大便前小便後兩陰間
已上三百四十五穴

手三陰三陽穴流注第二

凡孔穴所出為井春 所注為俞長夏 所過為源
所行為經秋 所入為合冬
久刺大法 春取滎 夏取俞 秋取合 冬取井
肺出少商為井冬取手太陰脉也流於魚際為滎春取注於
大陵泉為俞夏取過於列缺為源行於經渠為經入於尺澤為合秋
心出中衝為井冬取手厥陰脉也流於勞宮為滎春取注於大
陵為俞夏取過於內關為源行於間使為經入於曲澤為合秋取
心胞胳手少陰脉出於少衝為井冬取流於少府為滎春取注於
神門為俞夏取過於通里為源行於靈道為經入於少海為合秋取
大腸出商陽為井冬取手陽明脉也流於二間為滎春取注於三
間為俞夏取過於合谷為源行於陽谿為經入於曲池為合秋取
三焦出關衝為井冬取手少陽脉也流於扵門為滎春取注於中
渚為俞夏取過於陽池為源行於支溝為經入於天井為合秋取
小腸出於少澤為井冬取手太陽脉也流於泉谷為滎春取注於
後谿為俞夏取過於腕骨為源行於陽谷為經入於小海為合秋取
足三陰三陽穴流注

胃出厲兌為井冬取足陽明脉也流於內庭為滎春取注於陷谷
為俞夏取過於衝陽為原行於解谿為經入於三里為合秋取

靜嘉堂文庫所藏

膽出竅陰為井木取足少陽脉出流於俠谿為
為俞夏取過於丘墟為原行於臨泣
膀胱出於至陰為井冬取足太陽脉出流於通谷為榮春取注於束
骨為俞夏取過於京骨為原行於崑崙為經入於委中為合秋取
脾出隱白為井冬取足太陰脉出流於大都為榮春取注於太白
為俞夏取過於公孫為原行於商丘為經入於陰陵泉為合秋取
肝出大敦為井冬取足厥陰脉出流於行間為榮春取注於太衝
為俞夏取過於中封為原行於曲泉為合秋取
腎出涌泉為井冬取足少陰脉出流於然谷為榮春取注於大谿
為俞夏取過於水泉為原行於復留為經入於陰谷為合秋取

針灸禁忌法第三十二

經云雲門刺不可深今則鄧心不刺孝者宜詳察之

大寒死治刺　月生死禹
新內死刺　月滿无補　月郭空无治
大怒死刺　已刺死內
大勞無刺　已刺無勞　大醉無刺　已刺無醉
大飽無刺　已刺無飽　大飢無刺　已刺無飢
大渴無刺　已刺無渴
脉微數大汗後並已忌刺
乘車來者卧而休之如食頃乃刺之
大驚大怒必定其氣乃刺之　步行來者坐而休之如十里乃刺
刺中脉三日死其動為噦　刺中心一日死其動為噫
刺中肺十二日死其動為欬　刺中肝五日死其動為欠
刺中胆十二日死其動為吞　刺中腎三日死其動為嘆
刺中膻一日半死其動為嘔　刺中膈為傷中不過一歲必死
刺中膽一日半死其動為嘔　刺中陰脉中大脉出血不止死
刺中跌大脉血脉出不止死　刺客主人內陷中脉為漏為聾耳
刺面中留脉不幸為盲　刺膝臏出液為跛
刺項中腦戶入腦立
刺舌下中脉太過血出為瘖　刺臂胫太陰脉出血多立死
刺足下布胳中血不出為腫　刺足少陰脉重虛出血為舌難以言

靜嘉堂文庫所藏

刺部中脉令人仆脫色
刺氣衝中脉血不出為腫鼠鼷
刺脊間中隨為偏
刺乳上中乳房為腫跟
刺缺盆中內陷氣泄令人喘逆
刺手魚腹內隱為腫
刺目匡上陷骨中脉中滿嗜
上關刺不可深　缺盆刺一云深
腋中禁不可刺　左角刺不可久留　雲門刺不可深
五里禁不可刺　伏兔禁不可刺
復留刺無見多血　承筋不可刺　三陽絡不可刺
灸禁法　然谷刺無見多血
頭維禁不可灸　承光禁不可灸　腦戶禁不可灸
風府禁不可灸　瞻門禁不可灸　下關耳中有脹祇無灸
耳門耳中有膿及適祇無灸　人迎禁不可灸
絲竹空灸之不幸使人目小及盲　承泣禁不可灸
脊中禁不可灸　乳中禁不可灸　石門女子禁不可灸
氣衝灸之不幸不得息　泉掖灸之不幸生膿蝕　天府禁不可灸
經渠禁不可灸　伏兔禁不可灸　地五會禁不可灸

五藏六腑變化傍通法第四

凡五藏六腑變化無窮散在諸經其文隱沒難得具知今纂集相附以為傍通令學者少留意推尋造次可見矣

五藏	腎	水	一	心	火 二
六腑	膀胱	小腸		肝 木 三	肺 金 四
五藏經	足少陰	手少陰		膽	脾 土 五
六腑經	足太陽	手太陽		大腸	胃 三焦
	手少陽	足厥陰	手太陰	足太陰	
	足少陽	手陽明	足陽明		

五藏脉　沈　洪　弦　孚　緩

靜嘉堂文庫所藏

五藏斤兩　一斤一兩　十二兩七銖　左三錄右四錄
六腑斤兩　九兩二銖　三斤二兩兩錄二斤三兩
六腑丈尺　縱廣七寸　二斤十二兩　二斤十四兩　三兩三銖
六腑所受　九升九合　長二丈四尺　廣二寸四分
三藏斗升　三斗五升　二丈二尺廣六寸　二尺六寸
五藏官　後宮列女水　二斗四升　三合
六腑官　水曹掾　上將軍　今大水丞相　帝王火　大尚書木
五藏俞　十四椎　五椎　丞諫議大夫土　監倉吏　將軍決曹
三藏墓　京門　巨闕　九椎　三椎　十一椎　期門　中府　章門　監倉掾　內臺吏

六腑墓　山陵　關元　日月　大樞　少府
五藏脈出入　涌泉　中衝　大敦　少商　隱白
流　然谷　勞宮　行間　魚際　大都
注　大谿　大陵　大衝　大泉　太白
過　泉源　內關　中封　列缺　公孫
行　復留　間使　中封　經渠　商丘
入　陰谷　曲澤　尺澤　陰陵泉　商陽　厲兌
六腑脈出入至陰　少澤　竅陰
流　通谷　前谷　俠谿　三間　內庭
注　束骨　後溪　臨泣　三間　陷谷
過　京骨　腕骨　丘虛　合谷　衝陽
行　崑崙　陽谷　陽輔　陽溪　解溪
入　委中　小海　陽陵泉　曲泉　二里
三陰脈出入　出關衝　流抶門　注中衝

靜嘉堂文庫所藏

入天井

五竅	耳 陰二	舌 口	眼	鼻	脣
五養	骨 精	血 脉	筋	皮毛 氣	肉
五液	唾	汗	泣	涕	涎
五聲	呻 噫	言	呼	哭	歌
五氣	吹	呼	噓	呬	呵
五神	志 精	神 性	血 魂	氣 魄	形 肉
五有餘病	脹泄	笑不止	怒	喘欬氣逆上	脹滿
五不足病	厥	憂	悲	息利少氣	
六情	好	惡	喜	怒	樂
五事	聽 聰	視 明	皃 恭肅	言 乂	思 睿
五常	智 謀	禮	仁 恭	義 乂	信 聖
五咎	急	恐	狂	僭	蒙
五響	吟詠	肆呼	諷	唱	歌

五音	羽 四十八絲	徵 五十六絲	角 六十四絲	商 七十二絲	宮 八十一絲
五色	黑	赤	青	白	黃
五味	鹹	苦	酸	辛	甘
五臭	腐	焦	羶 臊	腥	香
五畜	豕	羊	雞	犬	牛
五穀	豆	黍 麥	麥	稻 黃黍	稷 米飯
五宜	酸	甘	苦	鹹	辛
五數	一 六	二 七	三 八	四 九	五 十
五行	水	火	木	金	土
五時	冬	夏	春	秋	季夏
五形	曲	兌	直	方	圓
五菓	栗	杏	李	桃	棗
五菜	藿	薤	韭	蔥	葵

論曰假令人腎心肝肺脾爲五藏則膀胱小腸膽大腸胃爲五府也

靜嘉堂文庫所藏

陰為腎經足太陽為膀胱經下至十節生穴
長之他皆倣此

用針略例第五

夫用針刺者先明其孔穴補瀉得宜行針入
衛常行勿失其理
夫針者不離乎心口出入上下水火之氣針入二分
一分知天地之氣入二分知呼吸出入上下水火之氣也皮毛肉理者勿傷肌
知四時五行五藏六腑四時逆順之氣也皮毛肉理者勿傷血脈筋骨髓
肉針肌肉者勿傷血脈刺脈者勿傷筋骨髓針骨髓者勿傷肌肉
東方甲乙木主人肝膽筋膜
神　西方庚辛金主人肺大腸皮毛　北方壬癸水主人腎膀胱
下脉骨髓精　中央戊己土主脾胃肌唇肉　南方丙丁火主人心小腸血脉
針傷筋脉者令人悗視失神　傷血脉者令人煩乱失神
傷皮毛者令人上氣失鬼為狂　傷肌肉者令人呕吟失
志　傷肌肉者令人四肢不收失智
此為五乱因針所生若更失度者有死之憂也所謂針能殺人謂
愚人妄針必死不能起生人也
又須審候與死人同狀者不可為醫与亡国同政不可為謀雖至
智神人不能活死人存亡国也故曰君邦不入乱邦不居凡愚人
貪利不曉於治乱存亡危身滅族彼此俱喪亡国破家亦醫之道
君父之厄恥不能行孝申忠

凡用白針之法

凡人用針之法以補寫為先審呼吸之盈虚應江潼之潮海用為
補寫由如校量升斗酌經緯有法陰陽不相干觸震為陽氣
始火生於寅兌為陰氣終戌為土墓坎為太玄華冬至之日夜半
一陽爻生离為太陽精為中女之象欲補從卯南補不足地戸至
巽為地虚欲寫從酉北天門在乾針入因日明向寅至午針出隨
月光從申向午午為日月光之位如此思五行

息之是曰隨身針迹寳也

凡用鋒針者針除疾速也先補五呼刺入五分留十呼刺入一寸留二十呼隨師而將息之刺急者深入而久留之刺緩者淺內而疾發針刺大者微出其血刺滑者疾發針淺內久留之刺澀者必得其脉隨其逆順久留之疾出之疾壓其穴勿出其血諸弱小者勿用鋒針然氣不足宜調以百藥餘三針者正中破癰堅瘤結息肉也亦治久疾也大針亦用鋒針以油火燒之務在猛熱不熱即於人有損也隔日一報三報之後當膿水大出為佳巨闕大倉上下管此之一行有六穴忌火針也大癥塊當停針轉動須更為佳○每針常須看脉〻好乃下針脉惡勿乱下針也下針一宿發熱悪寒此為中病勿怪之大佳

灸例第六

凡孔穴在身皆是藏腑榮衛血脉流通表裏往來各有所主臨時救難必在審詳人有老少體有長短膚有肥瘦皆須妙思商量準而折之毋得一槩致有差失其尺寸之法依古者八寸為尺仍取病者男左女右手中指上第一節為一寸亦有長短不定者即取手大母指第一節橫度為一寸以意消息巧拙在人其言一夫者以四指為一夫又以肌肉文理節解縫會宛陷之中又以手按之病者快然如此仔細安詳用心者乃能得之耳

凡經云橫三間寸者則是三灸兩間〻一寸有三灸〻有三分三壯之處即為一寸黄帝曰灸不三分是謂從寃炷務大也小弱炷乃小作之以意商量

凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時孔穴不正無益於事徒破好肉耳若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此亦不得其穴矣

凡言壯數者若丁壯遇病〻根深篤者可倍多於方數其人老小羸弱者可復減半依扁鵲灸法有至五百壯千壯皆臨時消息之明堂本經多云針入六分灸三壯更無餘論曹氏灸方

靜嘉堂文庫所藏

者小品諸方亦皆有此乃須準病輕重 大凡灸當先
凡新生男女日以上周年以還不過七壯炷
陽後陰先從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下先上後
下皆以日正午已後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不著
午前平旦穀氣虛令人癲眩不可針灸也慎之其大法如此卒急
者不可用此例
灸之生熟法要腰以上為上部腰以下為下部外為陽部榮內為
陰部衛故藏府周流名曰經絡是故丈夫四十已上氣在腰老嫗
四十已下氣在乳是以丈夫先衰於下婦人先衰於上灸之生熟
亦宜撙節之法當隨病深淺大法外氣務生內氣務熟其餘隨
宜耳頭者身之元首人神之所法氣口精明三百六十五絡皆上
歸於頭頭者諸陽之會也故頭病必宜審之灸其穴不得亂灸過
多傷神或使陽精玄熟令陰魄再卒是以灸頭正得滿百脊背
者是體之橫梁五藏之所繫著太陽之會合陰陽動發冷熱成疾

直或煩悶恍惚恚怒無常或唇口青戴眼角弓反張始覺發動
即灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是其穴 次灸曲差
二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是其穴 次灸上關二處
各七壯一名客主人在耳前上廉陷者是其穴 次灸下關二處
各七壯穴在耳前下廉陷者中是其穴 次灸頰車二處各七壯
穴在曲頰端是 次灸廉泉一處七壯穴在當頭直下骨後
次灸顖會一處七壯穴在上星上二寸是其穴 次灸百會一處
七壯當頂上正中央是其穴 次灸本神二處各七壯穴在耳正
直上入髮際二分是其穴 次灸天柱二處各七壯穴在項後兩
大筋外入髮際陷中是其穴 次灸陶道一處一壯穴在大椎節下
間是其穴 次灸風門二處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸半
是其穴 次灸心俞二處各七壯穴在第五椎下兩傍各一寸半
是其穴 次灸肝俞二處各七壯穴在第
是其穴 次灸腎俞二處各七壯穴在

靜嘉堂文庫所藏

是其穴　次灸膀胱俞二壯各七壯穴在
次灸曲池二壯各七壯穴
寸半是其穴　次灸足三里二壯各七壯穴在
肘取之是其穴　次灸三陰交二壯各七壯穴在
間陷者是其穴　次灸太谿二壯各七壯穴在手大指內兩骨間
骨間是其穴　次灸合谷二壯各七壯穴在手大指虎口兩骨間
陷者中是其穴　次灸間使二壯各七壯穴在掌後三寸兩筋間
是其穴　次灸陽輔二壯各七壯穴在踝絕骨端陷者是其穴
次灸崑崙二壯各七壯穴在外踝後跟骨上陷者是其穴

孫真人千金方卷第二十九

靜嘉堂文庫所藏

靜嘉堂文庫所藏



靜嘉堂文庫所藏



所蔵 京大人文

靜嘉堂文庫所藏

孫真人千金方卷第三十 鍼灸下

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病數穴其有須鍼者直爾灸之然大法得鍼訖乃灸此為良方但恨下里間知鍼者鮮耳所以學者深須解用刺鍼燔鍼白鍼皆須妙體知鍼知藥因是良醫

頭病第一 頭面目鼻耳 舌病第二 齒咽喉臂肩背脇手

腰病第三 四肢腹心腸脹鳴不食嘔吐血欬逆 風病第四 失音暍大小便淋利黃疸消渴熱病癭癩

癲病第五 驚癇癲水病腫霍亂尸疰蠱惑 雜病第六 婦人

頭病第一

神庭 水溝 頭維 大陵主頭痛如破目痛如脫 崑崙

解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤 通里主頭眩痛 強間

竅陰主頭痛如錐刺不可以動腦戶 通天 百

濼主寒熱痙頸痛 攢竹 承光 督

王風頭痛　上星　天牖　風門　即
合谷　二處　王風頭熱　神庭　前頂　絡
頭痛　王枕　主頭半寒痛　天柱　陶道　天打　孔最　絡
主頭痛　目牖　中渚　完骨　命門　豐隆　大白　外丘
通谷　京骨　臨泣　少海　悉肋　主頭痛熱汗不出惡寒
項病
少澤　前谷　後谿　陽谷　完骨　崑崙　少海　攢竹　主頭
強急回不可顧　消濼　本神　強間　風府　瘖門　天柱
風池　齦交　天衝　陶道　外丘　通谷　王枕　主頭痛如破不
可左右顧　天容　前谷　角孫　完骨　支正　主頭腫項痛歷節汗出
面病
攢竹　齦交　玉枕　主面赤頰中痛　巨鬙　主面惡風寒　頰腫瘃
痛　上星　顱會　前頂　腦戶　風池　主面赤腫　天突　主面皮
熱　腎俞　內關　主面赤黑　行間　主面蒼黑　大衝　主面塵黑

角孫　主額頷柱痛　天牖　主頰腫痛　中渚　主顳顬痛　顱痛　面赤
眼目病
大敦　主目不視大息　頭維　大陵　主目如脫頭痛如破　大都
主目眩　天柱　陶道　崑崙　主目眩又目如脫　腎俞　內關
心俞　復溜　大泉　完骨　中渚　攢竹　精明　百會　委
中　崑崙　天柱　大杼　頷厭　通谷　曲泉　後頂　絲竹
胃俞皆主目眩眩不明惡風寒　掖門　前谷　後谿　完骨
神庭　百會　天柱　風池　天牖　心俞皆主目泣出
目翳
至陰　主目翳　竅陰　主視不精了目翳童子不見　後谿　主腎爛
有翳　前谷　京骨　主目中白翳　京骨　主目反白
始　精明　齦交　四白　風池　巨鬙　童子
皆主目疾出多眵瞼內皆赤痛洋生白翳
天柱　腦空　目牖　主目眩　天牖

靜嘉堂文庫所藏

王辛多患眼闇如雀目者灸肝俞主
大都　曲泉　俠谿　三間　前谷　陽
目急痛赤腫　攢竹　王枕主目系急目上転
目上転增風寒　承泣　巨鬁　童子鬁　上星
淚出多眵瞖内障　陽白主目童子痛痒遠視耳聾昏夜無所
見　承泣主目瞤動與頭項相引　申脉主目上視　三間　前谷
主目急痛　大衝主目脊痛
眼赤瘡
束骨主皆爛赤　陽谿　陽谷主目痛赤如朱砂　商陽　巨鬁
上關　承光　童子鬁　少商　絡却主青盲無所見　瞳子鬁
内關主目赤黄　曲泉主目赤腫痛　掖門主目澁羞明　前谷
京骨主目中白翳生　期門主目盲而嘔　二間主目盲
風池　腦戶　玉枕　風府主目痛不能視先取譩語後二穴天
瘭　天泉主目中白眼盲　俠谿主外腎赤痛逆寒泣出目痒

鼻病
神庭　攢竹　迎香　風門　合谷　至陰　通谷皆主鼻齆清
涕出　曲差　上星　迎香　素髎　水溝　齦交　通天禾髎
風府主鼻空喘息不利鼻鳴鼽多涕鼽衄有瘡　水溝　天瘭
主鼻不收涕不知香臭　齦交主鼻中息肉鼻齆瘡　承靈
風門　譩語　後谿主鼻鼽空喘息不通　腦空　竅陰主鼻
勞疽發為厲鼻　風門　五處主時時噦不已　肝俞主鼻中酸
中管　三間　偏歷　厲兌　承筋　京骨　崑崙　承山　飛
陽隱白主頭熱鼻衄鼽　中管主鼻間焦臭　復留主涎出鼻
孔　京骨　申脉主鼻中鼽血不止　消濼　厲兌　京骨　前
谷主鼻不利涕黄　天柱主不知香臭

耳病
上關　下關　四白　顱息　翳風　耳門
翳風　按門　中渚主耳痛鳴

靜嘉堂文庫所藏

中渚主耳聾嘈嘈若蟬鳴　天牖
前痛　曲池主耳痛　外關　會宗主耳
前谷　後谿主耳鳴停耳　偏歷　大陵　腕骨
竅陰　俠谿　主頷痛引耳中嘈嘈耳鳴無所聞
凡耳中風聾鳴刺商陽入一分留一呼灸三壯左取右右取左
食頃

○口病

勞宮主大人小兒口中腫臭　承泣　四白　巨髎　禾髎　上
關　大迎　頰車　頷厭主口僻頰言惡風寒不可以噤　外關　內庭
三間　大泉　商丘主僻不禁　水溝　齦交主口不禁漿水喝
僻　齦交　上關　大迎　翳風主口失欠下牙齒
大迎主口緩不收不能言　下關　大迎　翳風主口噤不開引鼻中　地倉
痛　膽俞　商陽　小腸俞主口舌乾食飲不下　勞宮　少澤
三間　少衝主口熱口乾口中爛　兌端　天牖　目牖　三營

耳門主唇吻強上齒齦痛　合谷　水溝主唇吻不收瘖不能言口
禁不開　大谿　少澤主咽中乾口中熱哇如膠　曲澤　章門主口
乾　陽陵泉主口苦嗌中介介然　商丘主口噤不開　曲鬢主
口噤　光明　臨泣主喜勃齒頰　京骨　陽谷主目勃齒唇　解谿

主口痛勃齒舌

○舌病第二

廉泉　然谷　陰谷主舌下腫難言舌瘖涎出　風府主舌縮瘖
不能言舌急語難　扶突　上廉　大鍾　竅陰主舌本出血　魚際主
舌下黃脅熱　尺澤主舌乾　大鍾　竅陰主舌本出血　魚際主
支滿　天窗　扶突　靈道主暴瘖不能言　中衝主舌卒痛
天突主灸舌縱脉青　復溜主舌乾不言

齒病

厲兌　三間　衝陽　偏歷　小海　合谷　內庭
齒　大迎　頰車　聽會　曲池主齒痛惡寒
不言　陽谷　上管主上牙齒痛　陽

靜嘉堂文庫所藏

四瀆主下齒痛　角孫　頰車主牙齒
齒風　完骨主牙齒齲痛　曲鬢　衝加
喉病
風府　天窓　勞宮主喉嗌痛　扶突　天突　天谷
忤氣哽　少商　大鍾　經渠主喉中鳴　魚際主咳上氣
水突主喉咽膺腫呼吸短氣如息肉狀　中渚　支溝　內庭主
嗌痛　復留　臨泣　太衝　中封主嗌乾　前谷主咽偏腫不可
以咽　涌泉　大鍾主咽中痛不可內食　然谷　大谿主嗌內
腫氣走咽喉而不能言　風池主喉咽僂引項攣不收
喉痺
完骨　天牖　前谷主喉痺頸腫不可俛仰頰腫引耳後
中府　陽交主喉痺胸滿寒熱　天容　缺盆　大杼　肺俞
雲門　天澤　二間　厲兌　涌泉　然谷主喉痺哽咽寒熱
天鼎　氣舍　萬俞主喉痺哽噎咽腫不得息食飲不下　天突

主喉痺咽乾急　旋機　鳩尾主喉痺咽腫水將尽不下　三間
陽谿主喉痺咽如鯁　大陵　偏歷主喉痺嗌乾　神門　合谷
主喉痺　三里　沮留　曲池　中渚　豐隆主喉痺不言　関衝
竅陰　少澤主喉痺舌卷口乾　凡喉痺脊止　鼻逆先取衝脉後
取三里雲門各寫之又刺手小指端出血立已
臂肘病
尺澤　開衝　外關　竅陰主臂不及頭　前谷　後谿　陽谿
主臂重肘攣　腨會　支溝　曲池　腕骨　肘窌主肘節痺
臂酸重腕急痛肘難屈申　腕急腕外側痛脫如拔　天井　外關　曲池主臂委不仁　大泉
經渠主臂內廉痛　巨骨　前谷主臂不舉肩窌
主臂痛　開衝　三間　攣柱滿　大陵主肘攣腕腫
廉痛　陽谷　曲池　開衝　三里　中渚
寒痺　○手病

靜嘉堂文庫所藏

掖門主手臂痛 巨闕主手清冷 唇
主手脚拘攣 少商主手中風热 大陵主手掣小偏
攣不申内關主手中風热 大泉 少衝 經
曲澤主手肩逆氣 中衝勞宮 少衝主手掣攣 曲池主手
手掌热肘中痛 神門 少海主手掣攣 内庭主四厥手足問
養老主手不得上下 地五會 陽輔 申脉 委陽 天池 臨
泣主腋下腫 中脘俞 譩語主腋攣 内庭主四厥手足問
腕骨 中渚主五指掣不可屈申 尺澤主瘛痛手不可申凡實
則肩背热皆汗出四肢暴腫虚則臂皆寒慄氣大人以息 前
腋主臂裏掌急手不上舉 曲池主手不拿腕重急 陽谿主
臂腕外側痛不拿 後谿主臂重肘攣 心俞 肝俞主筋急手
相引

胃脘病

然谷 章門 曲泉 期門 食竇 陷谷 食門主胃
脇支滿 本神 顱息主胃脇相引不得俯側 大杼 心俞主胃

中樞 肝俞 脾俞 志室主兩脇急痛 腎俞主兩脇引痛
神堂主胃腹滿 三間主胃胃滿脹鳴 期門 魄戶 三焦俞中熱
息奔脇下氣上 陽谿 天容主胃滿不得息 曲池 人迎神
道 章門 中府 臨泣 天池 旋機 府俞主胃中滿 支溝
主胃腋急痛 腕骨 陽谷主胃痛不得息 豐隆 丘虚主胃
痛如刺 竅陰主胃痛欬逆 臨泣 三焦下俞胃脘不得息
陽輔主胃脇頭痛 陽交主胃滿腫 環跳 至陰主胃脇痛无
常处腰脇相引急痛 太白主胃滿脹切痛 然谷主胃中寒欬
唾有血 大鍾主胃腸息脹 膽俞 章門主脇痛不得臥胃
滿歐无所出 大包 三焦俞脇中痛 垂盖 紫宮 中庭 俞藏
靈墟胃俞 俠谿 步廊 涌泉 陽陵泉 商陽 上廉 三里
上脘 然谷 涌泉 陽陵泉主胃脇柱滿 商
胃心痛膺窓主胃脇膺腫 雲門主
隱白 期門 肺俞 鬼門 大

逆巨闕間使主胸中澹澹大
中管 承滿主脇下脹痛 梁門主脇下
少商主脇下脹 經渠 尺澤主胸背急胸中
澤主短氣脇痛心煩 間使主胸痛皆相引 郄 郄門主胸
膺背不得息 少衝主胸痛吐熱 凡胸滿短氣不得息上走胸
手太陰以出汗

肩背病

天牖 顧盼 神通 大杼 天突 水道 巨骨主肩背痛
氣舍主肩腫不得顧 天井主肩痛瘈瘨不仁肩不可舉中肩
肉痲木 禹創 譩譆 京門 尺澤主肩背寒痛肩甲內廉
痛 肩貞 閭衝 肩髃主肩中熱主肩頭不可以顧上臂痛
不能動搖 支溝 閭衝主肩臂酸重 清冷泉 陽谷主肩
不亟不得帶衣 天宗主肩重臂痛 肩外俞主肩甲痛
而寒至肘 曲垣主肩甲周痺 後谿主肩膊痛 臂痠 養老 天柱主肩痛欲折 涌泉主肩背頸項痛 前腋主
肩腋前痛與胸相引 上巳主肩背寒慄氣不足以息寒厥
交兩手而務 ○臂肩病

神道 委中 臂俞 長強 大杼 鬲俞 水分 脾俞 小
腸俞 膀胱俞 二臂肩急強 臂俞 長強 膀胱俞 氣衝
上髎 下髎 召髎主臂痛 小腸俞 中膂俞 白環俞主腰脊
疝痛 次髎 胞肓 承筋主臂背
痛 志室 京門主臂痛脊急 三里 陰市 陽輔 髀關主
臂痛不可以顧 束骨 飛陽 承筋主
陽蹻主臂痛不能舉 崑崙主脊痛如折 申脈大衝
引腹 委中主臂攣脊沈沈然凡臂脊腳重痛於此刺
疹亦皆立已 委陽 胠門 大白 陰陵泉 行
可俛仰 扶突主臂尻臀股陰寒痛 陰谷主脊內廉言
大鍾主臂支痛

可以欬欬則筋縮諸節痛上下無所
萬關 扶承 京骨主背悪寒痛脊強
主脊痓反折脚病 崑崙主脚如結踝如別 京
商丘主脛攣行間主厥脛足下熱 衝陽主厥足經　淺不收
然谷主足不能安脛酸久立 中都主足下熱脛寒
痺不能行 陰陵泉主足痺痛 絶骨主髀樞痛膝脛骨酸不仁
丘虚主脚踝連骨中疼痛筋急脛不可屈申 承山 承筋主脚
脛酸脚急跟痛脚筋急痛兢兢 復留主厥後廉急不可前却足
跗上痛 京骨 然谷 腎俞主足寒 僕參主足跟中踝後痛
大谿主手足寒至節 大谿 次峁 膀胱俞主手足青不仁 地
倉 大泉主足委僻不能行 浮白主足緩不收 天柱主足不任
身 衝陽 三里 僕參 飛陽 復留 完骨主足委失履不收
條口 三里 承山 承筋主足下熱不能久坐 風府 委陽主足
不仁 丘虚主腕不收坐不得起髀脚痛 陽輔 陽交 陽陵泉主

髀樞膝骨痺不仁 環跳 束骨 交信 陰交 陰谷主髀樞中痛
不可舉 譩譆 三陰交主髀中痛不得行足外皮膚
凡髀樞中不可舉以毫鍼寒而留之以月生一死為息數立已
封主少氣身濕重膝腫內踝前痛 由脉 隱白 行間主脛中
寒熱 大衝 涌泉主脛酸 復留主脛寒不能自温 至陽主
脛疼四肢重少氣難言 厲兌 條口 三陰交主寒不得臥
內庭 環跳主脛痛不可屈申 陽關 環跳 承筋主脛痺不
仁 合陽主膝股重

○膝病第三

風市主兩脚攣痛引脇拘急彈臂或青或焦枯或黧黒如腐
木斗剋主髀筋瘈脛痛 曲泉主膝不可屈申 光明
不能起 陽陵泉主膝股外廉痛不仁筋急
前痛 解谿 條口 丘虚 大白主膝腫重
風水膝腫 犢鼻主膝中痛不收 梁丘
膝不得屈申不可以行 陰市主膝

靜嘉堂文庫所藏

不仁痺委不得屈由 俠谿 陽
脛熱不能行手足偏小 轉筋鼻主膝不仁步
引膻不可屈中連腰引喉嗌痛 涌泉 狀
如 付陽主膊外廉骨痛 至陰主風寒從足
凡癰鼻腫可灸不可刺若其不堅勿攻攻之即死

四肢病

竟門主四肢解惰書夜不息 曲泉 付陽 天池 大巨 支溝 小
海 絕骨 前谷主四肢不舉 列缺主四肢厥喜笑 後溪 豐
隆 大都主四肢腫 曲池主手不可舉重肘中痛 腕骨 中
主腋前廉兩筋痛手不上頭 照海主四肢淫樂 臂痛 復溜
中封 腎俞 承筋 陰包 承山 大鍾主四肢痛 委陽主小腹
疝氣游行五藏腹中切痛 石門 商丘主小腹堅痛下引陰中
關元 委中 照海 大谿主小腹熱而偏痛 商曲主腹中積聚
痔切痛 崑崙主腹痛喘暴滿 氣衝主身熱腹痛 腹結

左繞臍搶心 衝門主寒氣滿腹中積痛疼淫漯 問使主寒中
少氣 復留主腹厥痛 鳩尾主腹皮痛搔痒 水分 石門主
少腹中拘急痛 巨闕 上管 石門 陰蹻主腹中滿暴痛汗
出 中極主腹中熱痛 行間主腹痛而熱上柱心心下滿 大谿
主腹中相引痛 涌泉主風入腹中少腹痛 豐隆主胷痛如刺
腹若刀切痛

心病

支溝 大谿 然谷主心痛如刺甚者手足心寒至節 復留主心
痛如懸 臨泣主胷痺心痛不得反側 行間主心痛色蒼蒼然
如死狀終日不得息 通谷 巨闕 大倉 心俞 膻中 神封主
心痛皆灸百壯 通里主卒痛煩悶心中燠懊數欠噴呻吟
悲恐 期門 長強 天突 俠白 中衝主心痛短氣
痛彭彭然心煩心亂少氣不足 以息 腎俞
痛如懸 竟門主心痛而歐 大泉主
里主痛上推心不欲食 鳩尾主

靜嘉堂文庫所藏

心痛善噦心痂大息　上管主心
管主心痛難以俛仰　不容　期門主
凡心痛如針刺者手足寒至節有息者死
凡心實者則心暴痛羞則心煩惕然不能動
靈道主心痛恐相引欝癡　育門主心下大堅　門
如飢　郄門　曲澤　大陵主心痛　少衝主心痛而寒
凡卒心痛刺大敦出血立已

腹脹病

中極主少腹積聚堅如石小腹滿炙五十壯　通谷主結積留飲
僻囊胃滿飲食不消炙五十壯　膀胱俞主堅結積聚　胃管
三焦俞主少腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消　上管主心下
堅積聚冷脹炙百壯　三里章門　京門　厲兌　內庭　陷谷
崑崙　商丘　陰陵泉　曲泉　陰谷皆主腹脹　不得息　隱
白主腹脹逆息　解谷主腹大下重　大鍾主腹滿便　肝俞

包育主少腹滿　水道主少腹脹滿痛引陰中　日月　大橫主少
腹熱欲走大息　委中主腹堅腫　關元主寒氣入腹　懸樞主
腹中積上行　懸鍾主腹滿　脾俞　大腸俞主腹中氣脹引脊
痛食飲多而身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季肋　陰市主
腹中滿委厥少氣丘墟主大疝腹堅　京門主寒熱膜脹　商曲
主腹中積聚　育俞主大熱不安腹有大氣暴腹脹滿蹇淫太主衝藥羸瘦
衝主腹中大熱不安腹有大氣暴腹脹滿蹇淫太主衝藥羸瘦
恐懼氣不足腹中悒悒
凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝申一脚並氣衝針入三寸氣至
寫之　期門主腹大堅不得息腹痺滿少腹尤大大食
滿寒氣滿腹腹中積聚疼痛　巨闕　上管主胸
門主五藏脹心腹滿　中管主腹脹不通痺
聚腹中脹腫聚往來上下　陰交主
脹　大谿主腹中脹　三里　行間

靜嘉堂文庫所藏

喜噫　衝陽主腹大不嗜食
主腹滿喜歐　太白　公孫主腹脹
商丘主腹中滿鬱鬱焉然不便心下有寒痛
急　陰陵泉主腹中脹不嗜食脇下滿脹中盛
衝門主數噫恐悸氣不足腹中悗
凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿令得移以大
針刺中管久持之中不動乃出針　五里主心下脹滿而痛　上
氣　陰都主心滿氣逆腹鳴　陷谷　溫留　湧谷　復留　陽綱
主腹鳴而痛　上廉主腹鳴相追逐　胃俞主腹滿而鳴　章門
主腸鳴盈盈然　膂窓主腹鳴泄注　太白　公孫主腹鳴臍中
主腹中常鳴上衝於心　陰交主俞上無所不治羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤
取穴法　令人正坐曲脊申兩手以臂著膝前令正直手大指
與臍頭齊以物支肘勿令臂得動也　從甲骨上角模摸至甲骨
下頭其間當有四肋三間灸中間依甲骨之裏肋間空去甲骨
容側指許摩胎肉之表處案之自覺牽引胸尸中灸兩甲各一
壯至六百壯多至千壯當覺氣下龍龍然如流水狀亦當有所
下出若無停淡宿疾則無所下也若病人已困不能正坐當更令側
卧枕上臂令前求取穴灸之也求穴大較以右手從右肩上往指
頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正坐當
甲兩臂者亦可伏衣襟上甲兩臂令垸兩甲使相離不爾甲骨覆
穴不可得也所伏衣服當令大小常完不爾則失其穴也此灸訖
後令人陽氣康盛當消息以自補養取身體平復　穴近第
五推相准望取之
論曰昔和緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所不及
即此穴是也時人拙不能求得此穴所以殂喪若能用心
方便求之无疾不愈矣　○不能令
曹真隆主不能食　金門主不欲

嗜食　維道主三焦有水氣不　身黄有微熱不嗜
食　然谷　内庭　脾俞主不嗜食　腎俞主　大腹脹食
多身羸瘦食不下不能食　大腸俞　周榮主食不下　飲
陽綱　期門　少商　勞宮主食飲不下　章門主食飲不化入
腹還出熱中嗜食若吞而聞食臭飽身黄瘦　度中庭
中府主鬲寒食不下食寒賁主鬲中雷鳴察察　常有水
聲　巨闕主鬲中不利　上管　中管主寒中傷飽食飲不化
中極主飢不能食　凡食飲不化先取下管後取三里寫之
凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢　天樞　厲兌　内庭主食
不化不嗜食夾脅急

○嘔吐病

俞府　靈墟　神藏　巨闕主嘔吐胸滿　率谷主煩滿嘔吐
天容主欬逆吐沫　胃俞　腎俞主嘔吐　中庭　中府主嘔逆吐
食下還出　曲澤主嘔逆不止　陽陵泉主嘔宿汁　少商　勞宮
主嘔吐　絶骨主病熱欲嘔　商丘　幽門　通谷主喜嘔　大
鍾　大谿主煩心滿嘔　魂門　陽關主嘔吐不住多涎　隱白
主鬲中嘔吐不欲食　鬲俞主吐食灸一百壯　又章門一百壯
又灸胃管一百壯　大敦主噦噫灸十壯　又灸石關五十壯　巨闕
胸堂主吐食灸百壯　胸堂　脾俞　手心　胃管　大樞　肝俞主
吐唾血吐血各灸百壯　間使三十壯

○吐血病

凡内損唾血不足死膏肓　地五會主之刺入三分特忌灸
凡唾血寫魚際補尺澤　上管　不容　大陵主嘔血　魚際　勞
宮　有俞　大谿主唾血吐血　郄門主衄噦嘔血　大□　神門
主唾脹寒嘔血上氣　手太陰　陰郄主吐血　委中　□白主衄劇
不止　行間主短氣嘔血胸背　太衝主面脣□白時時嘔血
子漏泄　涌泉主衄不止　然谷主欬唾有血欬逆上氣

欬逆病

廉泉　天容　水突　氣舍　魄户　□□□主欬逆上氣□息嘔沫
齒噤　頭維主喘逆煩滿嘔沫　□俞　肝俞　巨闕主

欬唾血逆上氣灸期門五十壯 行間壯[illegible]灸百壯
維逆主嘔逆不止 天泉 然谷 金門[illegible]庭主胸[illegible]痛上搶
心 天府主氣喘不得息 扶突主欬唾上氣[illegible]喘[illegible]戶中
府主脇寒熱呼吸不得臥欬逆上氣嘔沫喘氣相追逐 肘俞 脅
俞主喘欬少氣百病 或中 石關主嘔逆上氣[illegible]多唾 大包
主大氣不得臥 天池主上氣喉鳴 天突 華蓋主[illegible]逆上氣喘
暴 紫宮 玉堂 天谿主短氣不得息不能言 輸府 神藏主
欬逆上氣喘 或中 雲門主呼吸喘悸坐不安席 靈墟 步廊主鬲上
不通呼吸少氣喘息 氣戶 雲門 天府 神門主喘逆上氣呼吸
肩息不知食味 庫房 中府 周榮 尺澤主欬逆上氣呼吸唾
沫膿血 中府主脇急欬輒胸痛 經渠 行間主喜嘔氣氣
無所出先取三里後取太白章門 鳩尾主噫喘胸滿欬嘔 期
門主喘逆臥不安席欬脇下積聚 經渠主欬逆上氣喘中熱
俠白主欬乾嘔煩滿 大陵主欬逆寒熱發滿欬喘刺曲澤出血

立已又主欬逆逆氣欬唾噫 少海主氣逆呼吸噫噦嘔 少
商 大陵主欬逆喘 天泉主喘不息 勞宮主氣逆噫不止
三里主欬嗽飧泄 支溝主欬面赤而熱 肩俞主上氣 前谷
主欬逆
風病第四
率谷主醉後風發兩目眩痛 完骨主風頭耳後痛煩心 天府
風池 列缺 身會主惡風邪氣泣出喜忘 陽谷主風眩驚手捲
泄風汗出 陰蹻主大風暴不知偏枯不能行 絕骨主風勞身
重 俠谿 大都主風逆四肢腫 解谿主風頭至足面目赤泣
臨泣主大風目痛 俠谿 [illegible]中寒如風狀頭[illegible]痛 崑崙
主仕陽主大風 至陰主風寒從小指起 付陽主[illegible]風頭重痛
漏[illegible]主大風入腹中 照海主大風默默不知所痛視如見星 內
關主[illegible]風熱 關衝 間使主頭身風熱 商陽主[illegible] 風 關衝
王[illegible]風 主大風默默[illegible] 主風
身[illegible]門主風寒身熱 陽[illegible] 風汗出

靜嘉堂文庫所藏

譩譆　上關主瘈瘲沫出寒　長強　腎
俞主瘈瘲痓反折　肝俞主筋寒熱痓反折　井　神
道　心俞主悲愁恍惚悲傷不樂　風門主瘈瘲　腹相
引　然谷主痓上氣失瘖不能言　大敦　靈道　曲鬢　扶邊主暴
瘖不能言　天容主頸項癰不能言　復留主舌卷不能言　大
谿主舌縱涎出喉咽不能言

濕痺病

曲池　列缺主身濕搖時寒　風市主緩縱痿痺腨腸疼冷不仁
中瀆主寒氣在分肉間痛苦痺不仁　陽關主膝外廉腫痛不仁
懸鍾主濕痺流腫髀筋急瘈脛痛　豐隆主身濕　陽陵泉主
髀樞膝股脛骨搖酸痺不仁　筋縮諸節酸折　崑崙主卒痺病引
臏下節　漏谷主足濕痺不能行　商丘　足五骨痺煩　中封
主痿厥身體不仁少氣身濕重　臨泣主身痺灑淅振寒　身會
三膝寒痺不仁風濕流腫手足偏小
凡身體不仁先取京骨後取中封絕骨寫之

大小便病

豐隆主大小便澀難　上廉下廉主小便難黃　通里主遺尿
列缺主小便白熱痛　前谷　委中主尿赤難　陽綱主大便下
節腹鳴注泄　京門　照海主尿黃水道不通　陰谷主尿難陰
委　大鍾主大便難　大谿主尿黃大便難　中封　行間主溲
白尿難痛　復溜主尿青黃赤白黑　青取井　黃取分　赤
取滎　白取經　黑取合　承漿主小便赤黃或時不禁　關元
主腸中尿血　小腸俞　陽綱　白環俞　膀胱俞主小便
難　膀胱寒　引痛　中極　石關　承山　太衝　中管　大鍾
大谿　主大便難　肓俞　主積聚下重不得小便　中管
主小腹熱尿　陰交　石門　委陽主小腹堅痛引陰中不得
小便　關元　胞轉氣淋　不得尿　主小便數　中極
蠡溝　漏谷　主小便不利　精出　曲泉　少腹
大便堅　大便乾腹　骨　大巨　期門主腹

靜嘉堂文庫所藏

[illegible]開明 少府[illegible]遺尿[illegible]腹
[illegible]道七十三 膀胱俞[illegible]大便[illegible]通 勞宮主大便血[illegible]不止
[illegible]黃小便如血 陰陵泉主心下[illegible]便
[illegible]會陰[illegible]諸病前後[illegible]痛不得大小便 期門
委中[illegible]遺小便 承扶[illegible]臚大便直出陰胞有寒
小便不利[illegible] ○淋閉病
陰陵泉[illegible]主失禁遺尿不知 曲骨主小便不利大便泄
[illegible]灸[illegible]百壯 大腸俞[illegible]泉主大小便利 石關主
大便[illegible]主淋 關元主[illegible]小便不通勞熱石淋灸
三[illegible]七十大小便不利灸百壯 陰陵泉 關元主
寒[illegible]痛[illegible]氣衝主腹中滿熱淋閉
不得小尿 扶[illegible]長強 小腸俞主癃閉下重大小便難
曲泉主癃閉[illegible]交信主氣[illegible]然谷主癃閉下疝 行間主癃
閉[illegible]淋腹痺膿血腹如痓狀 關元主石淋臍

下三十六疾不得小便灸三十壯并足太陽五十壯 曲泉主五淋
太衝主淋不得尿陰上痛 大敦 氣門主五淋不得尿 曲骨
主小腹而癃 ○泄痢病
京門 然谷 陰陵泉主洞泄不化 交信主泄痢赤漏血 復留
主腸澼大便膿血泄後重腹痛 脾俞主泄痢不食食不生肌膚
小腸俞主泄痢膿血五色重下腫痛 丹田主泄痢不禁小便絞痛
關元 太谿主泄痢不止 京門 崑崙主洞泄體痛 天樞主冬
月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛 腹哀主便膿血寒
中食不化腹中痛 尺澤主泄上下出兩脇下痛 束骨主腹澼泄
太白主腹食不化喜嘔泄有膿血 地機主溏瘕腹中痛藏痺
陰陵泉 隱白主胃中熱暴泄 太衝 曲泉主溏泄痛注下血
長強主頭重洞泄 腎俞 章門主寒中洞泄不化 會陽主腹
中有寒泄注腸澼便血 三焦俞 小腸俞 下窌 意舍 章門
主腸鳴臚脹欲泄注 中窌主 大腸俞主腸鳴腹䐜

靜嘉堂文庫所藏

凡暴泄心痛尤甚心痛尤甚此　灸刺大都并太白

黄疸病

然谷主黄疸一足寒一足熱喜渴　章門主傷飽身黄中封五
里主身黄時有微熱　太衝主黄疸熱中喜渴　脊中主黄疸腹
満不能食　脾俞主黄疸喜欠不可食脇下満　中管　大陵主
目黄振寒　勞宫主黄疸目黄　大谿主黄疸　又方　脾俞孔
孔胃管各灸二百壯　○消渴病
承漿　意舎　關衝　然谷主消渴嗜飲　勞宫主苦渴食不下
意舎主消渴身熱面目黄　曲池主寒熱渴　隠白主飲渴　行間
太衝主嗌乾善渴　商丘主煩中渴　○熱病
凡温病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取針若未満五
日者禁不可刺也　魚際　陽谷主熱病振慄鼓頷腹満陰委
色不變　經渠　陽池　合谷　支溝　前谷　内庭　後谿
腕骨　陽谷　厲兌　衝陽　解谿主熱汗不出　列缺　曲池主
熱病煩心心悶先手臂身熱瘈瘲唇口聚鼻張目下汗出如珠
中衝　勞宫　大陵　間使　關衝　陽谿　天窌主熱病煩心心
悶而汗不出身熱如火侵淫煩満　勞宫主熱病三日以往不得
汗怵惕　間使主熱病煩心喜噦胷中澹澹喜動而熱　曲澤主
傷寒病温身煩熱心口中乾也　通里主熱病先不樂數日　掖門
中渚　通里主熱病先不樂頭痛面熱無汗　三間主氣熱身熱
喘　温留主傷寒熱頭痛噦衄　曲池主寒熱頭痛噦衄主傷
寒餘熱未盡　上管　曲差　上星　陶道　天柱　上窌　懸釐　風
池　命門　膀胱俞主煩満汗不出　五處主汗出寒熱　攅竹　上
管　缺盆　中府主汗出寒熱　承漿主汗出衄血不止　巨闕主
煩心喜嘔　百會主汗出而嘔痓　懸顱主熱病頭痛身熱
玉枕　大杼　肝俞　心俞　鬲俞　陶道主汗不出悽厥惡寒
懸釐　鳩尾主熱病偏頭痛引目外眥　大椎主寒熱盛煩嘔
鬲俞　中府主寒熱皮肉骨痛　臥支満　神道　關元

靜嘉堂文庫所藏

主身熱頭痛進退往來　甘谷俞
墮不欲動搖身當濕不
能食　三焦俞主頭痛食不下　魚際主頭痛不甚汗出　腎俞
主頭身熱亦振慄要脊中四肢淫濼欲嘔　天井主振寒頸項痛
肩并　開衝主寒熱樓索氣上不得臥　尺澤主氣喜急嘔數欠
不得汗煩心急身痛　肩貞主寒熱項壓適　凡熱病刺陷谷足
先寒寒上至膝乃出針身痺灑淅振寒季脇支滿痛　委中主
熱病俠脊痛　大都主熱病汗且出厥清　太白主熱病先頭痛
煩身熱熱爭則要脊痛不可以俛仰　又病熱滿不得臥身重骨痛
不相知　凡好大息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃
衰即取公孫及并輸實則腸鳴切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不
嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食窒乱昆昌公孫主之　支正
少海主熱病先要脊脛酸喜渴數飲食身熱項痛而強振寒寒熱
衝陽主振寒而欠　後谿主身熱惡寒　光明主腹足青煩熱寒
汗不出　凡熱病寒心足寒青多汗先取然谷後取大谿大鐘間

動脉皆先浦之熱病先腰脛酸喜渴數飲身青青則項痛顛顬然
先取浦泉及太陽井榮熱中少氣厥寒多之熱去多浦泉三壯
煩心不嗜食多浦泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取俠谿
後留主寒熱燕所安汗注不止風逆四肢腫　引氣主胸厥利痛
汗不出皆多刺之此穴可以出汗　商丘主多寒熱汗不出　陽
主下部寒熱汗不出躰重　少澤　後谿主振寒小指不用目痛
曲泉主身熱項痛汗不出　列缺主寒掌中熱　○癰病
列缺　後谿　少澤　前谷主癰寒熱　陽谷主癰腕痛不得息
飛陽主狂癰頭眩痛痙反折　太鍾主多怒少熱　太谿主熱
多寒少　崑侖主狂癰振寒癰多汗　衝陽主癰先灑淅甚久
而熱熱去汗出　臨泣主目兩發　俠谿主癰及痛　然谷主癰
温汗出　天府主癰病　少海主癰背寒　天牖主癰振寒熱
盛狂　少商主振慄喜頷　商丘主多寒熱　陽
泄　神道　神門　前谷

靜嘉堂文庫所藏

陰都 少海 商陽 三間 中渚 瘧病 大泉 二穴

渠主瘧欬逆心悶不得臥寒熱 列缺 陽谿主瘧甚苦寒欬

嘔沫 大陵 腕骨 陽谷 少衝主寒熱瘧 合谷 陽池 俠

谿 京骨主瘧寒熱 譩譆 偏歷 支正 小海主風瘧 溫留 三

瘧面赤腫 五里 陷谷 俠谿 飛陽主瘧痎少氣 天井主瘧

食時發痛 少澤 復留 崑崙主瘧寒汗不出 厲兌 內庭主瘧

不嗜食惡寒 衝陽 束骨主瘧從腳胻起

凡腎瘧令人悽悽腰脊痛宛轉大便難手足寒刺足太陽少陰

心瘧令人心熱不已或不熱 刺手少陰神門是也

肝瘧令人顏色蒼蒼氣喘善太息刺足厥陰見血即已

肺瘧令人心寒甚苦驚如有所見刺手太陰陽明

脾瘧令人病寒腹中痛鳴汗出刺足太陰 胃瘧令人善飢而

不能食四肢脹滿氣喘刺足陽明太陽橫脈出血立差

凡一切瘧灸尺澤 又刺足少陰出血立已

癲疾方第十五

偏歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星 百會 聽會 築賓

陽谿 後頂 強間 腦戶 絡卻 玉枕主癲疾嘔 攢竹 小兒

溝 後頂主癇發瘛瘲不得臥心中煩 光明 交 八

迎 絲竹 聽會 天柱 商丘主癲疾嘔沫寒熱瘈瘲 夫

將 大迎主寒熱悽厥鼓頷癲痙口噤 上關主瘛瘲沫出寒熱

痓 絲竹 通谷主風痓癲疾從 煩 腦空 聽會 風府 聽宮

翳風主骨 狂瘈瘲口噤喉鳴沫出瘖不能言 人門 僕參主

癲疾馬癇 崑崙主癇 閉不得開 脈 主癲疾

氣 尺澤 然谷主癲疾手臂不得上頭 列缺 癇驚 有所

見 飛陽 太一 滑肉門主癲疾狂吐舌 長強 癲疾發如狂

者面皮厚敢 發者不治 長強 腎俞 寒熱痓

偏歷主癲疾多言耳鳴口僻 溫溜 僕參主癲 吐 狂

言見鬼 曲池 尺澤主瘛瘲癲疾 大井 小

靜嘉堂文庫所藏

海主癲疾羊癇吐舌鳴 顖會 骨主癲疾引舌
身柱主癲疾瘈瘲怒欲殺人身熱狂走譫言見鬼 筋縮細曲脊
陰谷 行間主驚癇狂走癲疾 風池 聽會 寒頸
天柱主卒癇眩 五處 身柱 委中 委陽 京骨強
折瘈瘲癲頭痛風府 崑崙 束骨 膀胱俞主癲疾頭痛
風府 崑崙 束骨 肺俞主狂惕多言不休欲自殺 大杼 臨泣
主狂惕多言不休目上反 支正 魚際 合谷 少海 曲池 腕骨主
狂言驚恐 溫留 掖門 京骨主狂仆 神門 陽谿 主若狂
通里主心中懊憹數欠癲心下悸 陽谿 陽谷主吐舌戾頸妄言
巨闕 築賓主狂妄言怒罵 衝陽主狂妄行登高而歌棄衣而
走 下廉 上廉主狂言非常 解谿 陽蹻主癲疾 商丘主癇
瘈 完骨主癲疾僵仆狂瘧 天衝主頭痛癲疾互引數驚悸 曲
澤主心下澹澹喜驚 陰交 少海 大巨主驚不得卧 唯 王卧
驚視如見星 大鍾 郄門主驚恐畏人神氣不足 然谷 陽陵

泉主心中怵惕恐人將捕之 解谿主瘈瘲而驚 少衝主大息
煩滿少氣悲驚 行間主心痛數驚心悲不樂 陽谷主風眩驚
手捲 厲兌主多臥好驚 掖門主喜驚妄言面赤 神門主數噫恐
悸少氣 間使主喜驚瘖不能言 三間 合谷主驚喜 陽谷主
驚瘈 通里主心下悸 大陵主心下澹澹驚恐 手少陰 陰郄
主氣驚心痛 天井主驚瘲 後谿主泣出而驚 腕骨主煩滿驚

癲疝病

曲泉主癲疝陰跳痛引臍中不尿陰痿 中都主癲疝崩中 大
谿主胞中有大疝 商丘主陰股內痛氣癰狐疝走上引腹痛
關元主癲疝灸百壯 肓井 旁肓 解與臂相接處主偏癲 陰谷
主陰痿不用 巨闕主狐疝 大衝主狐疝嘔厥 中管主衝疝冒死
不知人 臍中 石門 天樞 氣海主少腹疝氣遊行五藏疝繞臍
衝胃不得息 石門主腹滿疝積 關元主暴疝痛 四滿主臍下
疝積 天樞主氣疝噦嘔 大巨主[illegible] 氣衝主癲陰腫痛陰痿

靜嘉堂文庫所藏

辜中痛兩尤蹇痛不可仰臥
濕腹中餘疾 少府主陰痛實時寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴
痒氣逆卒疝小便不利 陰市主寒疝下至膝蹇痛如清水小腹
諸疝梭之下膝
凡卒疝暴痛男子謬灸刺大敦立已謬者左取右右取左中極主
失精 五樞主陰疝兩丸上下 少府陰交 石門主兩丸蹇 大赫
然谷主精溢陰上縮 大衝中封地機主癪疝精不足 曲泉主癪
疝陰跳痛引莖中不得尿少腹引陰內廉痛 交信主氣盛癪疝
陰急股樞踝內廉痛 照海主四肢淫燥身悶陰暴起疝 大敦
主卒疝痛陰跳上入腹寒疝疑出偏大腫 合陽由郄主癪疝崩
中腹上下痛陽辟陰暴敗痛 行間主莖中痛 大衝主兩丸
蹇縮陰望不得臥 ○水腫病
公孫主頭面腫 水溝主水腫人滿 胃倉主水腫脹食飲不下
惡寒 章門主身潤石水身腫 足竅陰主身腫皮痛不可近衣

守府 間使 合谷主寒熱腫 陰交 石門主水脹水氣行皮中小腹
皮敦敦然小便黃氣滿 關元主小腹滿石水痛 四滿 然谷主
大腹石水痛 關明主身腫身重 天樞 豐隆 厲兌 陷谷衝
陽主面浮腫 氣衝主大氣石水 天府主身脹逆息不得臥風
汗身腫喘息多唾 凡大腫引癰腫飲支滿刺陷谷出血立止
解谿主風面胕頹黑 豐隆主皮腫身濕 上廉主風水膝腫
三里主水腹脹皮重 陷谷列缺主面目癰腫 大敦主大腫腹
脹齊腹皆已 臨泣主脹下腫鬱中滿 天滿主乳腫鉄盆中腫
立死 陽蹻主脹下腫寒熱頰腫 崑崙主腰尻腫踹跟腫
復留 豐隆主風逆四肢腫 曲泉主腹腫 陰谷主寒熱腹偏
腫 列缺主汗出四肢腫 完骨 巨虛主頭面氣附腫 陽陵
泉主頭面腫 ○痹病
飛陽三持寒傷痛 支溝 章門主寒熱血出後
脹 商丘 復留主痹血出後 丘墟 臂臑主寒熱頸癭

痓　天突　天窓主瘍頸痛如〃〃　會陰主痔與陰相通
者死　竅陰主癰疽頭痛如錐刺不可以動動益煩心　俠谿　陽
輔　太衝主腋下腫馬刀瘻　承筋　承扶　委中　陽谷主痔痛
腋下腫　商丘主疥瘍瘡主痔骨蝕善癖夢　大陵　支溝主痂疥

瘤癭病

天府　臑會　氣舍主瘤癭氣咽腫　腦戶　通天　消濼　天突主
頸有大氣　通天主癭灸三百壯　胷堂次灸一百壯

賁豚病

章門　石門　陰交主賁豚上腹　關元主賁豚寒氣入小腹　中
極主賁豚搶心不得息　天樞主賁豚脹疝　歸來主賁豚卵上
入莖中痛　期門主賁豚上下　商丘主心下有寒痛又主脾虛
令人病不樂不好大息　隱白主腹中寒冷氣脹喘　然谷主胷
中寒脉代不至寸口　復溜主足寒不自溫　飛陽主下部寒
然谷主少氣不足以息

○霍乱病

凡霍乱頭痛胷滿呼吸喘鳴窮窘不得息人迎主之　巨闕　衝
支溝　水溝　公孫　太白　陰陵泉　主霍乱　凡霍乱泄自不自
知先取太谿後伍太倉之原　期門主霍乱泄注　太陰交　金門
僕參主厥逆霍乱　魚際主胃逆霍乱　三里　解谿主霍乱泄遺
矢又膝重脛筋轉退痺　大泉主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相
引病　金門　僕參　承山　承筋主轉筋霍乱脚酸急腫痛戰不能
久立附筋足攣　丘虛主足酸轉筋　然陰主手皮轉筋　委中委
陽主筋急身熱　飛尸遁注　天府主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語
遁尸　凡飛尸惡注旁廷主之在掖下四肋間高下与乳相當乳
後二寸　陷中俗名注市舉掖取之刺入五分灸五十壯主卒中惡
飛尸遁注胷脇滿又有九曲中府在旁廷陰市下三寸刺入五分灸
三十壯主惡風邪氣遁尸内有瘀血　豐隆主逆足卒青痛如刺
腹若刀切之悶大難〃　煩心往見鬼好笑卒面四肢腫　隱白主
卒尸厥不知人脉動如故　欲口息脉動如故其形无

靜嘉堂文庫所藏

所知狀如尸厥刺此之及足
刺兌骨之端各一痏立已不已
角髮方寸燔治飲以得酒一杯一日必已不能者灌之

卒中惡病

百會 玉枕主卒起僵仆 大杼主僵仆不能久立煩滿裏急胃不安席 中極主恍惚尸厥煩痛之厥熱腦痛腹脹皮痛者使人久持之 金門主尸厥暴死 大敦隱白主尸厥死不知人脉動如故

雜病方第六

凡腹中寒脹滿腸鳴腹痛胃腹中聚血小腹脹皮腫陰氣不足小腹堅熱病汗不出喜嘔壯熱身反折口噤鼓頷腰痛不可以顧頭而有所見喜悲上下求之尸僻乳腫胸痺痺不能言胃氣不足血食不化脅下痞滿不能久立瞀瞀寒熱中消穀苦飢腹熱身煩乳癰喜噫聞食臭狂歌妄笑恐怒失罵霍亂遺尿失氣陽厥婁慢惡寒寒顫以小便不利喜噫

五臣北少至三百壯 五里三里陽陷各并 厲兌二間三間主渚泪四肢不欲動搖 內庭主喜喘喉痺身熱痛脅脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩男子如婦體腫脅痛如解不食喘逆足下青至脛咽中痛不可忍瘡不能言小便不利腹痛風入腸出癲疾交齊痛急脅注滿痛卧不止五指端盡痛足不踐地凡二十五疾皆灸涌泉

○婦人灸方

少腹堅痛月水不通赤白下東急要腋刺帶脉六分灸五壯在季肋端一寸八分 通下者血閉不通逆 氣脹刺曲泉入五分灸五壯 膝臚上內廉白肉際二寸中 女子血案之如湯沃股中少腹腫陰挺出經水來下陰中腫或養青汁如葵羹血閉刺曲泉在膝內輔骨下大筋上大筋下小筋上橫紋中屈膝乃得之刺入六分灸三壯疝瘕案之如湯沃股內至

靜嘉堂文庫所藏

泉入二分灸三壯穴在膝内[illegible]自定刀俱之　經從逆
出四肢淫濼陰暴跳疝腹偏痛刺照海入三分灸三壯在内踝下容
爪甲少腹大字難嗌乾嗜飲刺中封四分灸三壯在内踝一寸半
申足取　女子不字陰暴出經漏刺然谷三分灸三壯穴在足側
起大骨下陷中字子若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙二穴五
分灸三壯在足外踝後跟骨上　月事不利見赤白而有身反敗
陰寒刺行間六分灸三壯在足大指間動應手　月水不利見血
而有身則敗刺臨泣入二分灸三壯在小指次指間去俠谿一寸
半　閉溺赤脊強身引反折汗不出刺譩譆入二寸留七呼灸二壯
第二、一椎節一間　絕子瘧寒熱陰挺出不禁白淋蹇脊反
折京上窌入三寸留七呼灸三壯穴在第一空署踝下一寸夾脊
赤白淋心下積脹腰痛不可俛仰刺次窌入三寸留七呼灸三壯
在第二空俠脊陷中　赤淫時白氣癃月事通汗刺中窌入二寸
留七呼灸三壯在第三空夾脊陷中　下倉汁不禁赤淋陰中痒痛

引少腹痛不可俛仰刺腰尻交者兩甲上以月生死為痏數刺立已
腸鳴泄注刺下窌入二寸留七呼灸三壯在第四空夾脊陷中　赤
白裏急瘈瘲刺五樞入一寸灸五壯在帶脉下三寸　拘攣腹疝
月水不下乳餘疾誕子陰痒奔豚上腨腹堅痛引陰中不小便刺
陰交入八分灸五壯在臍下一寸　腹滿疝積乳餘疾絕子陰痒
奔豚上腹少腹堅下引陰中不小便刺石門入五分忌灸絕孕在
血在内不下轉胞不得尿小腹滿石水痛刺關元入二寸灸七壯
在臍下三寸　引脅下脹頭痛身皆熱奔寒小便數泄不止子
門不端　小腹寒陰痒及痛奔豚搶心飢不能食腹脹經閉不通
小便不利乳餘疾絕子内不足刺中極入二寸留十呼灸三壯在
臍下四寸　下赤白沃陰中乾痛惡合陰陽少腹膜堅小便閉刺
屈骨入一寸半灸三壯在臍下四寸半　子藏中惡血内逆滿痛
刺石關入五寸在陰都下一寸[illegible]不通奔泄氣上下引腰脊痛
刺氣穴入一寸灸五壯四滿[illegible]息中痛惡血月水不以時

靜嘉堂文庫所藏

休止腹脹鳴氣上衝胃刺天
少腹腸滿痛引陰中月水至月
刺水道入二寸半灸五壯在大巨下二寸月水不利或暴閉腹脹
滿痛溏瀉乳難三上搶心若胞不出衆氣亂盡腹滿痛不及息正仰
臥居一膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動脉應
手產餘疾食飲不可下奔肫上下傷食脇滿刺期門入四分灸五
壯在府舍下去大橫五寸　乳癰鴈痾胞足跗不收跟痛刺下廉
入三分灸三壯在上廉下三寸　月水不利見血而有反折乳腫
刺臨泣二分灸二壯在小指　不字若胞不出刺崑崙命入五分灸
三壯　小腹腫漉泄蹇遺尿淋痛面塵嘿偏枯刺太衝入三分灸
三壯　赤白涎下暴少腹痛刺然谷三分三壯　女子不月水痼
刺然谷三分三壯　女子不月水痼
照海四分三壯在內踝下四分　又主女子淋陰挺出口四肢淫

癰瘕寒痛不可按 天[illegible] 大泉主婦乳
癰胷痛 石關 四滿主子藏中有惡血內逆滿痛月水不下亂
餘疾 ○絕子陰癢 曲骨主赤白沃下 陰中乾痛惡合陰陽
氣穴主月水不通奔泄氣上 大赫主女子赤沃 天樞主胞中
痛月水不時休止 水道主月水不通則腰脊痛胞中瘕子門寒
歸來主女子陰寒 氣衝主月水不利或暴閉塞 太衝 衝門
崑崙主乳難子上搶心不出衣胞 期門主產餘疾食飲不下
氣衝主無子少腹痛 支溝主女人脊急目赤 陰谷泉 曲泉
大衝主疝瘕按之如湯沃股中至膝 血海 陰谷 太衝 會陰主
漏下若血閉不通 行間主月事不利見赤白有反毀 大衝 蠡
溝 曲泉主疝少腹腫 陰廉主絕產若未曾產 中封主少腹
大字難咳乾嘔飲愛脊疝 蠡溝主赤白沃時多時陰跌少腹
暴痛 曲泉主無子不嗜食 築賓主大疝絕子 涌泉主男子
如蠱女子如阻身體腰脊如解不嗜食 水原 照海主不字

陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛 陰陵泉主陰病少腹
堅急重下濕不嗜食 涌泉主衆疝 氣衝主產乳難子上搶心陰疝

孫真人千金方卷第三十 終

靜嘉堂文庫所藏

嘉慶四年二月十九日至昭明巷老屋遇書友鄒鍾琳謂余曰
吾兄西山堂中有元板千金方中配明板者曾送閱乎余
曰未也因到彼閱之適主人不在从其夥取歸共十四冊
內配第六至第十第十六至十九仍缺第二十卷其餘皆宋
刻宋印非元板也越日遣人問其價需錢二兩四錢遂
如直与之余家舊藏錢述古抄本云是從宋閣本出者已
自修為善本今得宋刻勘之鮮有一處符合者初不解
其故後檢通考知晁所見者為千金方三十卷本其前類例數條林億等
新纂則知抄本即从宋閣本出已是經後人增損原

靜嘉堂文庫所藏

書故与宋刻原本多所不同也二本非特文義增減
即藥名分兩法製殊有不合前人之方忽經後
人以意改竄可信不可信乎錫鍈本所据今以補入
宋本之明本參校同出一原於明本𥳑板抄本皆
缺文宋閣本所出益未可信其說矣唯是千金方
宋刻昔人無有見及者所見亦千金備急要方故不
得不以此為祖本而於林億等纂例以前之本反
有不信余得此本雖殘缺亦自修為奇秘矣
持示五柳主人反以明刻為勝於舊刻而宋則
斷之乎其不信宜南山堂之以無意得之（其鬻余收於店門前而）
俾以無意去之也古書難識于今益信云云
歲在己未清明前五日棘人黃丕烈書于
士禮居

二月廿六洞庭鈕非石楓橋袁綬堦訪余余以此書出示相約以詩紀事用孫字禁押本事時同觀者有西賓夏方米謂余宜用杜老明妃詩例遂遵之率成五律四首并不重韻

奎偏易得宋刻儼然存備急誠為要重刊未足論混淆今世本（世行本為九十三卷）補綴舊時
痕晁志真堪據趙應陋振孫　開國滎陽鄭藏書到子孫（書中有滎陽開國世裔鄭氏家藏圖）
書幾時晦塵土頃刻抵瑤琨篹例曾經億鐮名卻避敦（此書遇敦字作𢻭避光宗嫌名）卅方嗟尚缺
何處覓仙魂　晁遺方屋半（劉詢子晁遺方五卷屋本書之半也人視之若全辟焉余所得朱文游藏旧）藏弆認錢孫（抄本有錢遵王孫慶增圖書）
插架分先後（晁遺方去歲所得）排籤並弟昆（敏求記方書門始以千金要方終以劉詢子鬼遺方）世增
收駿價仙感詒龍恩從此思明理都甦少風根　人命千金貴方書自古尊

靜嘉堂文庫所藏

所嗟求秘笈不盡出醫門本草心徒愛金板本草為袁氏五硯樓所收傷寒眼竟昏宋板龐安時傷
寒論為朱丈文游書單中物書賈以單示余余以醫書置之不知其有宋刻也惜哉殘編閱寶要千金寶要即從此千金方摘錄者珠重
付兒孫

千金唱和冊

題宋本千金方作限孫字禁押本事

黃丕烈

千金偏易得宋刻儼然存世傳千金方以述古堂抄本為最古宋刻則未之聞也今始於酉山堂書
肆得之備急誠為要重刊未足論混淆今世本世行本為九十三卷補綴舊
時痕原缺第六至第十第十六至二十以明刻補晁志真堪據題應陋振孫晁所見為千金
方陳所見已為重刊千金備急要方矣開國滎陽鄭藏書到子孫書中有滎陽開國世裔鄭氏家藏圖書幾時晦塵土頓
刻抵瑤琨纂例曾經億重刊本為宋仁宗朝林億等纂例校上嬾名却避敦書中避敦
作欽疑為光宗朝刻卅方嗟尚缺何處覓仙䰟
晁遺方匱半藏弄認錢孫劉消子晁遺方五卷匱原書之半去冬得朱丈文游家藏舊抄本有錢遵
王孫慶增兩家圖書插架分先後排籤並弟昆敏求記方書始以千金要方終以劉消子晁遺方
世增收駿價仙感活龍恩從此思明理都懃少夙根
人命千金貴方書自古尊所嗟求秘冊不盡出醫門本草心徒
愛金板本草為袁氏五硯樓所收傷寒眼竟昏宋板龐安時傷寒論朱丈文游家書也書友時以書單示余余以

靜嘉堂文庫所藏

醫書故忽視之知不為宋刻後亦歸于五硯樓殘編同寶要千金寶要即從千金方摘錄珍重付兒孫

夏文燾

人命千金重仙方幸勵存味從百草合價抵一壺論呵護龍宮意摩挲蠹簡痕可憐收駿骨過冀晚遺孫孫伯樂姓君每出必過書坊索覓舊本

重刊俾備急全豹燦然存志苦徵公武讀書志稱千金方與此本合題將笈振孫書錄解題作千金備急要方眼前都夙慧肘後漫同論千里毫釐失何人更返魂此書中用藥五分各一兩者作一至二存第一至三十為三分全書之二守缺有專殘編三剩二此本有訛作第二十一至三十一至十五君以此書玖信徵茫處門鱗君所藏宋槧元本雖殘缺甲亦護情若命怡情楮墨痕紙皆闊練定為宋印本我知緣早結君說價難論坊閭凡通行本閒君瞎鈔索易一易因相笈子部今標目君時方輯讀未見書齋書用何須高似孫

傷寒名論在君所藏醫書有影抄金板成無己傷寒論各種試同論本草推袁好碩

楼所藏金板本草君為訪覆

籤追鄴架秘笈傲醫門永作傳家寶珍藏到耳孫

袁廷檮

遺方矚顧存東城顧氏藏有宋槧鬼遺方君見而欲之矣不日當同觀賞牙

千金方卅卷龍府禁方存肘後真同調鬼遺可並論殘編琮宋刻秘笈聚吳門駿骨黃香市賞奇示愍孫

卷分始道藏次弟尚能存道藏內千金方併千金翼方共分為九十三卷此俗刻所本然方論次弟絳雲樓所書目所載名脩俗本尤清亂經急千金方要

篁竹略暨門篁竹堂書目醫書門但云千金天一將咨

訪須交范氏孫宋刻千金方九卅不記卷數題為簡略

碎玉何猶貴此書廛存十一闕藏書甲天下不知有

廬山面目存藥名都不誤詳方米詩註千金方卷當更訪之

源候好衆論陳振孫云千金方諸論多本之巢氏諸病源候論今

山谷校讎學義門活人精此術養老衛童

孫

本草金源舊傷寒麗論存昔君為介紿獨我愛研論予向愛藏醫家書時

靜嘉堂文庫所藏

得金板本草宋板傷寒捴病論君皆預有力焉其時君同不愛醫書也令作同心侶居然大匠門堪嗟多未見吳越國王孫錢遵王所藏古籍善本詳于敏求記而千金方僅有舊抄本今亦歸士礼居中較之宋刻遠遜且金板本草等書亦未有也

鈕樹玉

神農傳本草幾葉到雲孫九轉丹難覓千金方自存幡新迷故徹多疾誤醫門猶幸原書見原流好細論笈笈殘編在駸駸歲北奔辭華搜月窟雲錦織天孫烏馬謅三寫龍宮隱一痕誰能重付梓從此破塵昏

泥潦街如港春陰畫亦昏奇書開奥室舊雨集芳尊射覆思徵古分題韻限孫一酬兼一唱積悶已無痕不蓄三年艾難除痼疾根良工需利器鴻寶集吳門方說希兼載刀圭孰比論一編君幸得釁後惜桐孫

顧廣圻

秘笈書攤得龍宮認贗魂千金空定價半壁厘能存紙裂勞輕撿塵昏費愕論廿卷中尚多撿處褒池重續命好手只思孫舊時黙賞養拙諸家褒池手為孫有年其補綴乃如無縫天衣今多歸君插架神物憑誰護真人想舊魂唐書標目合晁志命名存謂皆云千金方也校正偏難據揆訛詎足論獨嗟錢述古屑屑重高孫語在讀書敏求記著錄多殘本無雙冟悅魂君撰讀未見書齋目錄擬以殘本別列一門無雙君印章用之例如汲古甲字飛来仙驟顯點去鬼長存謂舊本抄五卷劉涓子方餘興歸吟咏精心在討論君題詩之意在表章此本與重刊千金備急要方之不同也正宜鈐永保牧日近添孫君今春得此去冬得劉涓子方而於十一月生孫適在其間也仲氏君同志頻ニ惜逝魂謂家兄抱沖眼曾龐論過龐安時傷寒論先歸抱沖後以讓五硯樓主人君亦絕愛之也事尚外臺存宋槧王燾外臺秘要密行小字精工絕倫抱沖亦以賤價得于賈人云子部增新賞君初不喜醫家書丁年失細論抱沖終年四十五獨留貧儉客慚作世醫孫子于醫家書槩未能畜

瞿中溶

本草神農著醫方扁鵲論千金新顯迹十卷舊殘痕原闕十卷宋刻

靜嘉堂文庫所藏

原流在真人面目存（時本以千金翼方屬入失其真矣）惟無療貧藥一飯感王孫

開國遥ニ青猶留朱記痕翼方迳此別寶要不須存宜可追公

武讀書志惟晁氏有之徵魚以補孫闕十卷後人以明刻補足定名聲價重應與命

同論

我昧岐黄術鑒書少貯存字知譌日及（郭景純尔雅注日及見宋史田敏傳）

刻前（外舅竹汀先生云抱朴子内篇大椿六是日及之誤）筆於卧（龍街書坊中見戚無已注傷寒論齋吴）

似吴金元舊刻聞後六（歸君讀未見書齋吴）

君以舊抄劉消子思遺方見示并跋道方翁家藏本）新書雖盡讀未認補瘡痕（全書

論此書原委的是也

皆予前未見唱詩中所知之逮

魚有籯金貴宜遺好子孫新春欣靳獲（此本近時藏書家並未著録）舊雨共

重論復古諧殽韵（元唱定用老杜明妃詩例如門邨昏題詩記

爪痕（君擬之將以向此詩紀之以所得宋本書為之嚆矢也）活人書得所定與石長存晦

（有石刻竪方當皆取此韵中字音諧者為韵

是六朝時竪方物也）

藏書琳宋刻殘帙幾何存方重千金比傳爭片羽論周詳覆宋

用商略棗梨痕初本難忘祖重刊例喚孫

名士推江夏無雙渡耳孫才常羞後勃學莫怵先琨集古幽光

發搜奇夙好敦經方資博覽堆架氣魂魂

真本真人著摩挲贊外孫讀疑借東觀披似陟西昆漫羨登僊

術先資濟世思魯魚涖可辨知不誤金根

三分書有二空擁面南尊道藏扶持力儒宗法鑒門汗牛心未

愜窺豹眼非昏換骨金丹在丁寧洛誦孫

吴嘉泰

江夏無雙後遥ニ幾葉孫讀書繩祖武著録及鑒門方愛千金

古書憑世卷論開雕數時代闕畫儼雷痕

唐書頻攷信宋刻亦多門變古因林億沿譌始振孫至今行世

本空有要方存偏檢諸家録悠ニ揔目論

蔣寅

靜嘉堂文庫所藏

古本無人識塵埋入市門簡編嗟半脫面目幸重存一自歸清
閟真堪寶子孫何時購全壁都與校金根
興劇增心賞濡豪漬墨痕新篇高調發勝友古懽敦備數容傖
又徵辭乞外孫吟餘翻一笑散帚例同論

李福

宋槧誠難得千金方尚存缺殘神物護真贋麥光論（紙名宋紙皆潤連）
曬趁花辰暖翻嫌指甲痕裝池真妙手無縫補天孫
我慚書裹蠹君是阿香孫聯句元輸白先鞭迭蹴琨搜羅藏日
富窶主好同敦（謂澗泮方）況得龍宮秘真人返騰魂
十全堅乃上三世技傳孫仙授宅神妙思遺非弟昆（墨賞齋所藏思遺方）
（右冬得貯讀未見書齋）偶教研慮讀頗廣活人恩小道通儒理知君有慧根
從今排鄴架坐擁小侯尊論值緡償字求方鐵限門裝籤分甲
乙校字樂晨昏禱頌無他語流傳葉葉孫

周錫瓚

述古書曾借（舊抄本千金方）儲藏未足論笈他珍賡鳧羨子遇瑤琨石
碎嗟陳迹（明馬理云孫子之徒刻書華表石上後為壁者所毀）瓜分見割痕（道藏分九十三卷）一
朝呈祖本群刻子生孫
方技書多僞醫家最有原活人三卷足（薛氏金匱先生活人書三卷）藏宋
編尊板本草（寶墨留中藏余藏趙松雪書華他中藏經卷即據）本草一
（諱其方與時本稍異）如龍救術濟世不言恩（合論亦道藏中藏宋高孝兩朝集中所缺本內經序載他外孫鄧）
經方知晚好羅致子分門（雲中夢入他寢室授書）何
論乃編題標甲乙搜訪及亡存零落長沙本應求趙氏孫（或云非宋刊冯氏圖
（宋家藏北宋本傷寒見螺弟雅本草經疏）常熟趙太
畫臥歎扉掩雨餘竹長孫養疴懶肅客（余時患足疾）尋藥灌靈根片
楮三年刻（丁巳冬借錢本校勘兩刻葉之悔）殘珪一爨捫香知能續命何
日得還魂（書缺十卷）

靜嘉堂文庫所藏

嗜古如君少暨心過畢孫非關參玉版雅愛辨金根藏處芸為
閣披時几有纖情知珍宋槧未得一捫搎
書肆五充遍奇方得細掄殘休喚駿骨護已賴龍孫丸液何須
鍊風雷恐易徼千金題已賫何止抵瑤琨
名士宜知藥真人貴息踉鬼遺空歷〻神授自諄〻芝石忝爐
冐坤離辨父孫試將書十卷驗取返生䰟
傯笈能除病觀時眼不惛校寧訛亥豕熟笈鎮𥂝飩消暑心先
湛題詩韻戒惃吟成逢七夕何侶製雲孫

戈襄

未見書能讀黃香有遠孫題籤多宋本分部及醫門祖德君堪
述真人迹尚存傷寒莫嗟失秘笈已平呑
濟世心常切遺書啓鈍根神奇異鷁息呵護出龍孫命為生靈
惜功侔相業尊湯爊方術小此意頗採論

頤維

插架琳瑯富周裒真弟昆（謂香岩壽階）裝池搜古錦曝腹趁朝暾（和
作首推夏（此冊始和于方米）俗書心愧孫（蒐圃以聯吟書墊屬余作楷書未報適孫淵如觀察至篆
之聯吟還附驥始末竟全渾（此書余未及見）
賞鑑思吾祖芸編日夕温諸家推月旦定論豁塵昏真覺雲煙
過空嗟雪爪痕貽書零落盡不蠹愧賢孫

黃美鎬録

此千金唱和冊原本別藏奉命
三孫手録附後以便觀覽 [seal]

靜嘉堂文庫所藏

余既收得宋刻殘本千金方久藏篋
衍未暇裝潢也及後收得元刻全本
知汪宋閣本出自錢述古之舊物以為出
自宋閣本者據此也前云此記明本所
見未的後又收得明翻元刻宋本缺
卷為南所狗尾之續因合裝之宋
自宋元自元明自明亦不可擅離合
而觀者分不誤以偽亂真也丁丑白奇
復翁

士禮居藏宋刻孫真人千金方為黄蕘圃太親為手訂
初有缺帙以元明本足成之倩吴中諸名士題唱一時
聲價頓增清如伯安詩文書稿命名儀宋堂亦心
儀是書故也汪閬園中表深於醫理好古精鑒家
藏宋刻書三萬餘卷獨千金方宋刻無從得見訪求
三十餘年一旦割蕘翁之愛以白金三百兩易其值頗同
拱璧寢饋於斯數年治病輒有奇效臨歿戒後嗣勿為
餅金懸購庚申之變所藏書悉遭兵燹獨是籍僅
存惜域復没為三五好古家分散得之者之寶愛秘不示人

靜嘉堂文庫所藏

以故三載未能輯之合余心嘉久之多方購求至今春始得
全書彙集鏡厥重圖一時奇遇益信古今至寶自有
神物護持抑天不欲真人秘藏終失其傳也爰書此以
誌欣幸

丁卯春三月吳中慎獨生識

靜嘉堂文庫所藏



文庫所藏