

第九卷 第二册

紅藍花。本行血藥也。血暈解。留滯行。即止。過用能使血行不止而斃。世人所不知者。

牡丹味辛苦寒微寒無毒。主寒熱。中風。痲。癰。瘰。癧。驚。癇。邪氣。除癥。堅。瘀。血。留。舍。腸。胃。安。五。藏。療。癰。瘡。除。時。氣。頭。痛。客。熱。五。勞。勞。氣。頭。腰。痛。風。噤。癩。疾。

忌蒜胡荽畏兔絲貝母大黃

酒洗晒乾男妙用

疏○牡丹皮稟季春之氣。而兼得乎木之性。

陰中微陽其味苦而微辛其氣寒而無毒其
色赤而象火。故入手少陰厥陰足厥陰亦入
足少陰經。辛以散結聚。苦寒除血熱。入血分
涼血熱之要藥也。寒熱者陰虛血熱之候也。
中風癱瘓痙驚癇。皆坐陰虛內熱。榮血不足
之故。熱去則血涼。涼則新血生。陰氣復。陰氣
復則火不炎。而無因熱生風之證矣。故悉主
之。癰瘡者熱壅血瘀而成也。涼血行血。故療

癰瘡。辛能行血。苦能泄熱。故能除血分邪氣。及癥堅瘀血。留舍腸胃。臟屬陰。而藏精。喜清而惡熱。熱除則五臟自安矣。別錄并主時氣頭痛。客熱。五勞。勞氣。頭腰痛者。泄熱涼血之功也。甄權又主經脈不通。血瀝腰痛。此皆血因熱而枯之候也。血中伏火。非此不除。故治骨蒸無汗。及小兒天行痘瘡。血熱。東垣謂心虛。腸胃積熱。心火熾甚。心氣不足者。以牡丹

皮爲君。亦此意也。忌胡荽赤花者。利白花者
補。

主治參互

神不足者。手少陰。志不足者。足少陰。故仲景
腎氣丸用之。治神志之不足。究竟牡丹皮乃
入心經正藥。心主血。涼血則心不熱。而陰氣
得寧。用之腎經藥中者。陰陽之精。互藏其宅。
神志水火藏於心腎。即身中坎離也。交則陰

陽和而百病不生。不交則陰陽否。而精神離矣。欲求弗夭。其可得乎。入清胃散治陽明胃經血熱齒痛。潔古曰。葉爲陽。發生也。花爲陰。成實也。丹者赤色。火也。故能瀉陰胞中之火。四物湯加之。治婦人骨蒸。又曰。牡丹皮入手厥陰。足少陰。故治無汗之骨蒸。然須與青蒿子、天麥門冬、沙參、地黃、五味子、牛膝、枸杞之屬同用。始得其力。

簡誤

牡丹皮本入血涼血之藥。然能行血。凡婦人血崩。及經行過期不淨。竝忌與行血藥同用。京三稜味苦平無毒。主老癖癥瘕結塊。俗傳昔人患癥癖。死遺言令開腹取之。得病塊。堅硬如石。文理有五色。人謂異物。竊取削成刀柄。後因以刀刈三稜。柄消成水。乃知此可療癥癖也。黃色體重。狀若鯽魚而小者良。

疏○京三稜稟火土之氣。故本經味苦平。潔

李時珍云消積須用醋浸二日炒或煮熟焙乾良

古兼甘亦應兼辛兼甘故無毒入足厥陰亦

入足太陰從血藥則治血從氣藥則治氣老

癖癥瘕積聚結塊未有不由血瘀氣結食停

所致苦能泄而辛能散甘能和而入脾血屬

陰而有形此所以能治一切凝結停滯有形

之堅積也又主產後惡血血結通月水墮胎

止痛利氣者亦散血行氣之功用也潔古用

以治心膈痛飲食不消海藏用以通肝經積
血。皆與作者之意合也。

主治參互

同蓬莪茂青皮香附延胡索肉桂牡蠣鼈甲
人參則消一切堅癥老癖之積聚 同青皮

紅藍花當歸川芎生地黃芍藥桂心牛膝延
胡索五靈脂則治產後一切惡血停滯畱結

及引水凝蓄不通少復作痛不可安 司痛

皮青皮縮砂蜜紅麴山查麥芽人參肉苳菘
黃連則消一切食積并氣壅塞不利子母
秘錄治小兒氣癖三稜煮汁作羹粥與奶母
食日亦以棗許與兒食小兒百日及十歲已
下癩熱瘰癧皆理之合人參彌良

簡誤

京三稜潔古謂其辛苦甘無毒陰中之陽能
瀉真氣。真氣虛者勿用。此見諦之言也。故凡

用以消導必資人參芍藥地黃之力而後可
以無弊。觀東垣五積方皆有人參。意可知已。
何者。蓋積聚癥瘕。必由元氣不足。不能運化。
流行致之。欲其消也。必藉脾胃氣旺。能漸漸
消磨開散。以收平復之功。如祇一味專用克
削。則脾胃之氣愈弱。後天之氣益虧。將見故
者不去。新者復至矣。戒之哉。

薑黃味辛苦。大寒無毒。主心腹結積。疝疝下氣。

破血。除風熱。消癰腫。功力烈於鬱金。

疏○薑黃得火氣多。金氣少。故其味苦勝辛。劣。辛香燥烈。性不應寒。宜其無毒。陽中陰也。降也。入足太陰。亦入足厥陰經。苦能泄熱。辛能散結。故主心腹結積之屬。血分者。兼能治氣。故又云下氣。總其辛苦之力。破血除風熱。消癰腫。其能事也。日華子謂其能治癥瘕。血塊。又通月經。及撲損瘀血。蘇頌謂其祛邪辟

惡治氣脹及產後敗血攻心方書用以同肉
桂枳殼治右脇痛臂痛有效戴元禮云能入
手臂治痛何莫非下氣破血辛走苦洩之功
歟察其氣味治療乃介乎涼三稜鬱金之藥
也

主治參互

得當歸生地黃牛膝延胡索肉桂治一切積

血在腹中作痛
經論方治中寒心痛難忍

薑黃一兩桂三兩爲末醋湯服一錢 產寶

方治產後血痛有塊用薑黃桂心等分爲末
酒服方寸匕血下盡卽愈

簡誤

凡病人因血虛臂痛。血虛腹痛。而非瘀血凝
滯。氣逆上壅作脹者。切勿誤用。誤則愈傷血
分。令病轉劇。慎之慎之。

青黛味鹹寒無毒。主解諸藥毒。小兒諸熱驚癇。

發熱天行頭痛寒熱。並水研服之。亦摩傳熱瘡
惡腫。金瘡下血。蛇犬等毒。染澱亦堪傳熱毒惡
腫。蛇虺螫毒。

疏○青黛外國藍靛之英華也。稟水土陰寒
之氣以生。故味鹹寒而無毒。甄權謂其甘平。
以其得土氣之厚也。故可解諸藥毒。及小兒
諸熱驚癇。發熱天行頭痛寒熱。並水研服之。
亦磨傳熱瘡惡腫。金瘡下血。蛇犬等毒。波斯

國來及太原產者勝。如不可得，卽用染甕上沫之紫碧色者亦可。

主治參互

得蕪荑使君子肉胡黃連蘆會殺蟲除熱及
小兒一切疳積病 醫學正傳治心口熱痛
薑汁調一錢服之 聖惠方治內熱吐血青
黛二錢新汲水下 中藏經治肺熱咯血用
青黛一兩杏仁以牡蠣粉炒過一兩研勻黃

蠟化和作三十餅子方名青餅子每服一餅
以乾柿半箇夾定溼紙裏煨香嚼食粥飲送
下日三服 生生編治小兒夜啼青黛水研
服之 宮氣方治小兒疳痢歌云孩兒雜病
變成疳不問強羸女與男煩熱毛焦鼻口燥
皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃赤
白一般般眼澀面黃鼻孔赤穀道開張不可
看此方便是青黛散孩兒百病服之安 活

人書治傷寒赤斑青黛二錢水研服

簡誤

青黛既稟陰寒之氣而生。解毒除熱。固其所長。古方多有。用之於諸血證者。使非血分實熱。而病生於陰虛內熱。陽無所附。火氣因空。上炎。發爲吐衄咯唾等證。用之非宜。血得寒則凝。凝則寒熱交作。胸膈或痛。愈增其病矣。醫師宜詳辨之。

鬱金味辛苦寒無毒。主血積下氣生肌止血。破惡血。血淋。尿血。金瘡。

疏○鬱金稟天令清涼之氣。而兼得土中金火之味。故其味辛苦。其氣寒而無毒。潔古論氣味俱薄。陰也。降也。入酒亦能升。入手少陰足厥陰。兼通足陽明經。辛能散。苦能洩。故善降逆氣。入心肝胃三經。故治血積。氣降而和。則血凝者散。故主生肌止血。其破惡血治血

淋尿血主金瘡者調氣行血之功也單用亦
治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋磨服之
入心涼血故潔古用以涼心入足陽明故治
陽毒入胃下血頻痛其性輕揚能開鬱滯故
爲調逆氣行瘀血之要藥

主治參互

鬱金同韭菜番降香當歸生地黃童便能治
怒氣傷肝止血又治鼻衄唾血喉中血腥氣

及經脉逆行有痰方加竹瀝 鬱金七兩同

明礬三兩爲細末薄米糊爲丸梧子大每服
五十丸白湯下昔人曾治婦人癲狂十年不
愈初服此藥心胸間有物脫去卽神氣洒然
再服而蘇此驚憂痰血總聚心竅所致此藥
入心去惡血明礬化頑痰故也 龐安常傷
寒論云痘疹始有白泡忽搐入腹漸作紫黑

色無農日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半

水半碗煮乾去甘草切片微火烘燥爲末入
真片腦半錢每用一錢以生豬尾血五七滴
新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心
出如癱狀乃瘥此乃五死一生之候也 又
范石湖文集云嶺南有采生之害其術於飲
食中行厭勝法致魚肉能反生於人腹中而
人已死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺
人十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻

或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末
二錢服卽瀉出惡物或合升麻鬱金服之不
吐則下李巽巖侍郎爲雷州推官鞠獄得此
方活人甚多

簡誤

鬱金本入血分之氣藥其治已上諸血證者
正謂血之上行皆屬於內熱火炎此藥能降
氣。氣降卽是火降。而其性又入血分。故能降

下火氣則血不妄行。丹溪不達此理，乃謂其
上行治血則誤矣。凡病屬真陰虛極，陰分火
炎薄血，妄行溢出上竅，而非氣分拂逆，肝氣
不平，以致傷肝吐血者，不宜用也。卽用之亦
無効。

盧會味苦寒無毒。主熱風煩悶，胸膈間熱氣。明
目鎮心。小兒癩癩驚風，疥五疳，殺三蟲及痔病。
瘡癩解。巴豆毒俗呼爲象膽，蓋以其味苦如膽。

故也生波斯國似黑錫

疏○盧會稟天地陰寒之氣故其味苦其氣
寒其性無毒寒能除熱苦能泄熱燥溼苦能
殺蟲至苦至寒故爲除熱殺蟲之要藥其主
熱風煩悶胸脇間熱氣明目鎮心小兒癩癩
驚風療五疳殺三蟲者熱則生風熱能使人
煩悶熱除則風熱煩悶及胸脇間熱氣自解
涼肝故明目除煩故鎮心小兒癩癩驚風熱

所化也五疳同爲內熱脾胃停滯之證三蟲
生於腸胃溼熱痔病瘡癩亦皆溼熱下客腸
臟致血凝滯之所生故悉主之能解巴豆毒
亦除熱之力也詳其功用是足厥陰足太陰
二經藥亦可兼入手少陰經

主治參互

同厚朴橘紅甘草青黛蕪荑百草霜旋復花
爲末以砂仁湯吞治小兒諸疳一歲一分甚

効 衛生易簡方治脾疝與使君子等分爲

末每服一二錢米飲調下 李恂用以主小

兒諸疝熱 甄權單用殺疝虵及吹鼻殺腦

疝除鼻癢 蘇頌研末傅鬢齒甚効治溼癬

出黃水有神 治大便不通真蘆會研細七

錢朱砂研如飛麴五錢滴好酒和丸每服三

錢酒吞朝服暮通暮服朝通須天晴時修合

爲妙

簡誤

其味至苦其性大寒主消不主補凡兒脾胃
虛寒作瀉及不思食者禁川

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所
爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後
血暈暴血衝上因損下血或酒摩及煮服

疏○延胡索稟初夏之氣而兼得乎金之辛
味故味辛氣溫而無毒入足厥陰亦入手少

陰經溫則能和暢和暢則氣行辛則能潤而走散走散則血活血活氣行故能主破血及產後諸病因血所爲者婦人月經之所以不調者無他氣血不和因而凝滯則不能以時至而多後期之證也腹中結塊產後血暈暴血衝上因損下血等證皆須氣血和而後愈故悉主之也崩中淋漓利守不利走此則非與補氣血藥同用未見其可

主治參互

君當歸生地黃牛膝益母草童便則主產後
血暈有神 得四物湯白膠牛膝香附則主
婦人經阻少腹作痛或結塊 活人書治小
便尿血用延胡索一兩朴硝七錢半爲末每
服四錢水煎服非蓄血瘀滯者不可用 勝
金方治膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少
爲末猪胰一具切作塊子炙熟蘸末頻食之

聖惠方治熱厥心痛或發或止久不愈身

熱足寒者用延胡索去皮金鈴子肉等分爲末每溫酒或白滾湯下二錢 濟生方治婦

女血氣腹中刺痛經候不調用延胡索去皮

醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒

煮米糊丸梧子大每服一百丸空心艾醋湯

下 聖惠方治產後諸病凡產後穢汚不盡

腹滿及產後血暈心頭硬或寒熱不禁或心

悶手足煩熱氣力欲絕諸病竝用延胡索炒
研酒服二錢 直指方治疝氣危急用延胡
索鹽水炒全蝎去毒生用等分爲末空心鹽
酒下 又方治冷氣腰痛用延胡索當歸桂
心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進以止
爲度 聖惠方治墜落車馬筋骨痛不止延
胡索末豆淋酒服二錢日二服

簡誤

此藥性溫味辛能走而不能守故經事先期
及一切血熱爲病凡崩中淋露皆應補氣血
凉血清熱則愈一切辛走之藥法所應禁

肉苳蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹
脹痛霍亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒
乳霍糯米粉裹煨去粉搗碎忌銅鐵器

疏○肉苳蔻稟火土金之氣故味辛氣溫而
無毒入足太陰陽明經亦入手陽明大腸辛

味能散能消溫氣能和中通暢其氣芬芳香
氣先入脾脾主消化溫和而辛香故開胃胃
喜煖故也故爲理脾開胃消宿食止洩瀉之
要藥香能辟惡除不祥又中氣不虛則邪惡
之氣不能入故主鬼氣及溫中脾主中焦胃
爲後天生氣之本脾胃之陽氣旺則積冷心
腹脹滿霍亂中惡冷症嘔沫冷氣食不消洩
不止小兒凡霍諸證自除矣

主治參互

君人參補骨脂吳茱萸五味子砂仁爲治腎
泄及冷泄之聖藥 得縮砂蜜橘皮人參紅
麴山查肉霍香麥芽爲開胃進飲食消宿食
止瀉之上劑 獨用修事爲末以棗肉和丸
或爲末縮砂湯下名公子登筵散言服之卽
可赴席其開胃進食消導之功烈矣 百一
選方治久瀉不止用肉苳蔻一兩木香二錢

五分爲末棗肉和丸米飲下四五十丸又方
肉荳蔻煨一兩熟附子七錢爲末糊丸米飲
服四五十丸 瑞竹堂方治老人虛瀉肉荳
蔻三錢煨研乳香一兩爲末 全幼心鑑治
小兒泄瀉用肉荳蔻五錢乳香二錢半生薑
五片同炒黑色去薑研爲膏收入密器旋丸
菜豆大每量大小米飲下 聖惠方治冷痢
腹痛不能食者肉荳蔻一兩去皮醋和麩裹

煨搗末每服一錢粥飲調下

簡誤

大腸素有火熱及中暑熱泄暴注腸風下血
胃火齒痛及溼熱積滯方盛滯下初起皆不
宜服

補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨
髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故

紙

忌羊肉 諸血 及世世苦寒 葱甘辛

疏○補骨脂稟火土之氣而兼得乎天令之

雷公云此藥性燥毒須用酒浸一宿漉出以東流水浸三日夜蒸之性已至中晒乾用

陽故其味辛其氣大溫性則無毒陽中微陰

一法以鹽合炒用

降多升少入手厥陰心包絡命門足太陰脾

經能煖水臟陰中生陽壯火益土之要藥也

其主五勞七傷蓋緣勞傷之病多起於脾腎

兩虛以其能煖水臟補火以生土則腎中真

陽之氣得補而上升則能腐熟水穀蒸糟粕

而化精微脾氣散精上歸於肺以榮養乎五

臟故主五臟之勞七情之傷所生病風虛冷者因陽氣衰敗則風冷乘虛而容之以致骨髓傷敗腎冷精流腎主骨而藏精髓乃精之本真陽之氣不固卽前證見矣固其本而陽氣生則前證自除男子以精爲主婦人以血爲主婦人血氣者亦猶男子陽衰腎冷而爲血脫氣陷之病同乎男子之腎冷精流也大溫而辛火能消物故能墮胎

主治參互

三因方治精氣不固用破故紙青鹽等分同

炒爲末每服二錢米飲下 普濟方治小便

無度腎氣虛寒用破故紙十兩酒蒸茴香十

兩鹽炒爲末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒

下或以末糝猪腎煨食之 嬰童百問治小

兒遺尿膀胱冷也夜屬陰故小便不禁用破

故紙炒爲末每夜熱湯服五分 和劑方補

骨脂丸治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗縱
慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四兩炒
香菟絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮沉香
研細一錢半煉蜜丸如梧子大每服二三十
丸空心鹽湯溫酒任下自夏至起冬至止日
一服此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方
於南番人有詩云三年時節向邊隅人信方
知藥力殊奪得春光來在手青蛾休笑白髭

鬚 經驗方治虛勞男子女人五勞七傷下

元虛冷一切風病四肢疼痛駐顏壯氣烏髭

鬚用補骨脂一斤酒浸一宿曬乾却用烏油

麻一升和炒令麻子聲絕簸去只用補骨脂

爲末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三十丸

空心溫酒鹽湯任下 又方治腎虛腰痛用

破故紙一兩炒爲末溫酒服三錢神効或加

木香一錢 和劑局方青娥丸治腎氣虛弱

風冷乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利
或因勞役傷腎或溼痺傷腰或墮跌損傷或
風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間如
物重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮切
片薑汁炒一斤胡桃肉去皮二十箇爲末以
蒜搗膏一兩和丸梧子大每空心溫酒服二
十九婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏
髭鬚益顏色 夏子益奇疾方治玉莖不痿

精滑無礙時時如金刺拒之則脫此名腎漏
用破故紙韭子各一兩爲末每用三錢水二
盞煎六分服日三次愈則止 二神丸治脾
腎虛瀉用破故紙炒半斤肉苁蓉生用四兩
爲末肥棗研膏和丸梧子大每服五七十九
空心米飲下本事方加木香二兩名三神丸
直指方治打墜腰痛瘀血凝滯用破故紙
炒茴香炒辣桂等分爲末每熱酒服二錢

唐鄭相國自敘云予爲南海節度年七十五
粵地卑溼傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服
乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國舶
主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑
而未服摩訶稽首固請遂服之經七八日而
覺應驗自爾常服其功神効十年二月罷郡
歸京錄方傳之用破故紙十兩淨去皮洗過
曝乾酒浸蒸再曝搗篩令細胡桃瓢二十兩

湯浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴糖
瓷器盛之旦日以煖酒二合調藥十匙服之
便以飯壓如不飲酒人以煖熟水調之餌久
則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁芸臺
羊肉餘無所忌此物本自外番隨海舶而來
非中葦所有番人呼爲補骨脂語訛傳爲破
故紙也王紹顏續傳信方載其事頗詳故錄
之按白飛霞方外奇方云破故紙屬火收

歛神明能使心包之火與命門之火相通故
元陽堅固骨髓充實瀦以治脫也胡桃屬木
潤燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐破故
紙有木火相生之妙故語云破故紙無胡桃
猶水母之無蝦也

簡誤

補骨脂陽藥也凡病陰虛火動陽道妄舉夢
遺尿血小便短瀦及目赤口苦舌乾大便燥

結內熱作渴火升目赤易饑嘈雜溼熱成痿
以致骨乏無力者皆不宜服

縮砂蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤
白泄痢腹中虛痛下氣

疏○縮砂蜜稟天地陽和之氣以生故其味
辛其氣溫其性無毒入足太陰陽明少陰厥
陰亦入手太陰陽明厥陰可升可降降多於
升陽也辛能散又能潤溫能和暢通達虛勞

冷瀉脾腎不足也宿食不消脾腎俱虛也赤
白滯下胃與大腸因虛而溼熱與積滯客之
所成也辛以潤腎故使氣下行兼溫則脾腎
之氣皆和和則冷瀉自止宿食自消赤白滯
下自愈氣下則氣得歸元故腹中虛痛自己
也甄權用以止冷氣痛止休息痢消化水穀
溫煖肝腎陳藏器用以主上氣奔豚鬼疰邪
氣鬼疰必由於脾腎兩虛陰陽乏絕故也日

華子用以主一切氣轉筋霍亂轉筋霍亂必
由脾胃爲邪所干胃氣壅滯閉塞而成楊氏
用以止痛安胎氣結則作痛氣逆則胎不安
潔古用以治脾胃氣結滯不散皆下氣散結
溫中和胃入脾入腎入肝入命門入大腸之
故耳

主治參互

縮砂蜜氣味辛溫而芬芳香氣入脾辛能潤

腎故爲開脾胃之要藥和中氣之正品若兼
腎虛氣不歸元非此爲向導不濟殆勝桂附
熱毒之害多矣好古謂得人參益智則入脾
得黃檗茯苓則入腎得赤白石脂則入大小
腸也 得人參橘皮藿香白茯苓白芍藥炙
甘草治泄瀉兼嘔吐及不思食 得藿香橘
皮木瓜治霍亂轉筋腹痛吐瀉 獨用兩許
炒爲末入食鹽三錢滾湯一碗泡浸冷服治

乾霍亂累効

藥性論治冷滑下痢不禁虛

羸以縮砂仁爲末以羊子肝薄切糝之瓦上

焙乾爲末入乾薑末等分飯丸梧子大每四

十丸白湯下日二服 直指方治遍身腫滿

陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇等分研和老

酒服之 簡便方治痰氣膈脹用砂仁擣碎

以蘿蔔汁浸透焙乾爲末每服二錢食遠沸

湯服 簡便方治上氣欬逆用砂仁洗淨炒

研生薑連皮等分搗爛熱酒食遠泡服 溫

隱居方治子癇昏冒用砂仁和皮炒黑熱酒
調下二錢不飲者米飲下此方安胎止痛其
効不可盡述 孫尚藥方治妊娠胎動偶因

所觸或跌墮傷損致胎不安痛不可忍者用
砂仁熨斗炒熱去皮用仁搗碎每服二錢熱
酒調下須臾覺腹中胎動極熱卽胎已安矣
神効 婦人良方治婦人血崩用砂仁於新

瓦上焙研末米飲服三錢 直指方治牙痛

疼痛縮砂仁常嚼之良 事林廣記治一切

食毒用砂仁末水服二錢

百一選方治急胃噎砂仁甘草等分為末俾畏啣其汁當隨嘔吐也

簡誤

縮砂蜜氣味辛溫陽藥也凡腹痛屬火泄瀉

得之暑熱胎動由於血熱咽痛由於火炎小

兒脫肛由於氣虛腫滿由於溼熱上氣欬逆

由於火衝迫肺而不由於寒氣所傷皆須詳

察簡別難以槩用誤則有損無益勿易視也
本非肺經藥今亦有用之於欬逆者通指寒
邪鬱肺氣不得舒以致欬逆之證若咳嗽多
緣肺熱此藥卽不應用矣

蓬莪茂味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼
氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒磨服之
又療婦人血氣丈夫奔狔

得醋良

李時珍云醋煮入藥取其引入血分也

疏○蓬莪茂感夏末秋初之氣而得土金之

味故其味苦辛其氣溫而無毒陽中陰降也
入足厥陰肝經氣分能破氣中之血入氣藥
發諸香主積聚諸氣爲最要之藥與京三稜
同用之良心腹痛者非血氣不得調和卽是
邪客中焦所致中惡疰忤鬼氣皆由氣不調
和臟腑壅滯陰陽乖隔則疫癘疰忤鬼氣得
以憑之茂氣香烈能調氣通竅竅利則邪無
所容而散矣解毒之義亦同乎是其主霍亂

冷氣吐酸水及飲食不消皆行氣之功也故
多用酒磨又療婦人血氣結積丈夫奔狫入
肝破血行氣故也多用醋磨鬱金入心亦入
肝專主血分亦散肝鬱茂與三稜專能行氣
破積薑黃行氣破血入脾爲多

主治參互

得人參橘皮縮砂蜜京三稜肉荳蔻青皮麥
蘖穀蘖木香消一切飲食停滯積聚及小兒

癥癖甚良 楊子建護命方治一切冷氣瘧

心切痛發卽欲死久患心腹痛時發者蓬莪

茂醋煮二兩木香煨一兩爲末淡醋湯下半

錢 普濟方治婦人血氣遊走作痛及腰痛

茂同乾漆等分爲末酒服二錢腰痛核桃酒

下 保幼大全治小兒盤腸內釣痛以茂半

兩用阿魏一錢化水浸週時焙研紫蘇湯下

一字 十全普救方治小兒氣痛以茂炮熟

爲末熱酒服一錢 保幼大全治初生吐乳
不止用茂少許鹽二釐乳一合煎三五沸去
滓入牛黃二釐服之甚効 危氏得効方治
渾身燎炮每箇出水有靨一片如指甲大其
泡復生抽盡肌肉卽不可治用茂同三稜各
五錢爲末分三服酒調連進愈

簡誤

逢莪茂行氣破血散結是其功能之所長若

夫婦人小兒氣血兩虛脾胃素弱而無積滯者用之反能損真氣使食愈不消而脾胃益弱卽有血氣凝結飲食積滯亦當與健脾開胃補益元氣藥同用乃無損耳

白前味甘微溫蜀本云微寒無毒主胸脇逆氣咳嗽

上氣

雷公云以生甘草水浸一伏時去其頭鬚焙乾用
疏○白前感秋之氣而得土之冲味故味甘

辛氣微溫蘇恭又謂微寒性無毒陽中之陰

降也入手太陰肺家之要藥甘能緩辛能散
溫能下以其長於下氣故主胸脇逆氣咳嗽
上氣二病皆氣升氣逆痰隨氣壅所致氣降
則痰自降能降氣則病本立拔矣微溫微寒
見人參條下

主治參互

寇宗奭曰白前能保定肺氣治嗽多用以溫
藥相佐使尤佳 仲景金匱要略治嗽而脉

浮用澤漆湯中有白前苗似細辛而大根色
白亦似白微又似牛膝脆而易折不若白微
之可彎而不折也苦者非是 外臺方治久

嗽吐血用白前桔梗桑根白皮各三兩甘草
炙一兩水六升煮一升分三服忌猪肉菘菜

深師方治久欬上氣體腫短氣晝夜倚壁
不得臥常作水雞聲者白前湯主之白前二
兩紫苑半夏各三兩大戟七合以水一斗漬

一宿煮取三升分作數十服第進一服勿相
繼以須藥力之行

簡誤

白前辛溫走散下氣之藥性無補益凡欬逆
上氣欬嗽氣逆由於氣虛氣不歸元而不由
於肺氣因邪客壅實者禁用深師方中所主
久欬上氣體腫短氣脹滿當是有停飲水溼
溼痰之病乃可用之病不由於此者不得輕

施
白藥味辛溫無毒主金瘡生肌

疏○白藥稟天地清寒之氣而兼金水之性
故味辛經云氣溫日華子云冷當是辛寒之
藥無疑故無毒而能解毒金瘡出血過多必
發熱熱則作痛不得生肌矣涼血清熱則其
痛自止肌自生也又藥性論亦可單用味苦
能治喉中熱塞噎痺不通胸中隘塞咽中常

痛腫脹日華子云性冷消痰止嗽治渴并吐血喉閉消腫毒又云剪草根名白藥詳味二條所主皆解熱散結之功則其爲寒明矣入肺入胃不言可知

主治參互

施州人取白藥子并野猪尾二味洗淨去粗皮焙乾等分爲末酒調服二錢許療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不散者取生根

爛擣傅貼乾則易之無生者用細末水調塗
之亦可 崔元亮海上方治一切天行熱病
取白藥研如麵二錢漿水一大盞空腹頓服
之便仰臥一食頃候心頭悶亂或惡心腹內
如車鳴疴刺痛良久當有吐利數行勿怪欲
服藥時先令煮漿水粥於井中懸着待冷若
吐利過度卽喫冷粥一碗止之不喫卽困人
經驗方治妊娠傷寒護胎以白藥子爲細

末雞子清調攤於綿紙上可如碗大自臍貼

至臍下胎存生處乾卽以溼水潤之 衍義

又爲治馬肺熱藥有效 聖惠方治風熱上

壅咽喉不利白藥三兩黑牽牛五錢同炒香

去牽牛一半爲末防風末三兩和勻每一錢

水調服 又方治吐血不止白藥煨存性糯

米飲服三錢 又方治咽喉腫痛白藥末一

兩龍腦香二分此用一分五釐生蜜和九芡實大每含

嚙一丸 又方名鐵罩散治胎熱不安用白
藥子一兩白芷五錢爲末每服二錢紫蘇湯
下心煩熱入白砂糖少許 經驗良方治衄
血不止紅棗肉白藥各煨存性等分爲末糯
米飲調服二錢許

簡誤

苦寒辛散之物凡病雖有血熱吐衄等證若
脾胃素弱易於作泄者勿服

莎草根味甘微寒無毒主除胸中熱充皮毛久

服令人益氣長鬚眉

得醋反小使良

一名香附子

李時珍云須火燎去毛再以水洗淨石上磨去皮用童便浸透或生或炒或以鹽水浸或酒或醋

疏○莎草根稟天地溫燥之氣而兼得乎土

考治症刺者曰宜則上行胸膈外連皮膚○熟則下走肝腎外徹腰足○炒黑則止血○童便

金之味故其味甘應有苦辛微寒亦應微溫

浸炒則入血分而補虛○鹽水浸炒則入血分而潤燥○青鹽舍炒則補腎氣酒浸炒則行經

無毒入足厥陰氣分亦入手太陰經氣厚於

終藏○醋浸炒則消積聚○薑汁炒則化積飲

味陽中之陰降也血中之氣藥也能行十二

經八脉氣分得童子小便苦酒漬過良芎藭

為之使辛主散苦溫主降泄肝主怒而苦急

為之使辛主散苦溫主降泄肝主怒而苦急

為之使辛主散苦溫主降泄肝主怒而苦急