

陳脩園先生醫書七十二種

上海錦章書局
出版



十藥神書註解序

此葉天士家藏秘書也前此流傳皆為贗本余歸田後始得原書重為訂註附於傷寒論全匱要略之後蓋以傷寒論全匱要略為萬古不易之準繩而此書則奇以取勝也然奇而不離於正故可取焉

閩長樂陳念祖識

姑蘇葛可久先生精通方術與丹溪朱彦修齊名所著十藥神書專治虛損雖編中僅列十方而用藥之次第逐一條陳吳航陳修園謂其奇而不離於正誠哉是言也顧前此流傳皆成贗本修園解組後始得原書重加註解料列附於傷寒論全匱要略之後而未果乙卯歲蓋從舊書坊中得一抄本於今三年矣遍詢方家俱無是書蓋不敢私自秘藏因並作湯方俚歌亟謀付梓以廣其傳庶不負先生壽世壽人之意云爾

咸豐歲次疆圉大荒落季冬月後學林壽堂謹跋

程序

吾吳天士葉先生凡治吐血証皆祖葛可久十藥神書更參以人之性情病之淺深隨宜應變無過不及治無不愈然亦治之於初病之時與夫病之未經深入者若至五藏遍傳雖虛扁亦莫可如何矣家藏此書有年幾獲脈望故亟付梓然書中僅列十方世皆以方少忽之不知十方中錯綜變化有幾千百方故復探周氏之說使人粗曉葉是者更察虛損二字分自上而下自下而上自不致概以六味開手矣古吳瘦樵程永培識

葛氏自叙

夫人之生皆稟天地之氣而成形宜乎保養真元固守根本則一病不生四體輕健若曰不養真元不守根本病即生矣根本者氣血精液也予得先師之教萬病無如癆証之難蓋因人之壯年血氣充聚精液完足之際不能守養惟務酒色豈分饑飽日夜耽慾無有休息以致耗散精液則嘔血吐血瘦骨蒸煩熱腎虛精竭形羸頰紅面白口乾咽燥小便白濁遺精盜汗飲食難進氣力全無斯因火乘金位重則半年而斃輕則一載而傾况為醫者不究其源不通其治或大寒大熱之藥妄投亂進不能取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫者無察其情予師用藥治癆如羿之射無不中的余以用藥次第開列於後用藥之法遂一條陳如嘔血咳嗽者先服十灰散

揭住如不住者須以花蕊石散止之大抵血熱則行血冷則凝見黑則止此定理也血止之後患人必舒解其體用獨參湯補之令其熟睡一覺不要驚動醒則病去六七矣次服保真湯止嗽寧肺太平丸潤肺扶痿消化丸下痰疏氣保和湯分治血感威感喘感威感風感寒感六事加味治之餘無加法又服藥法曰三日前服保真湯三日後服保和湯二藥相間服之為準每日仍濃煎薄荷湯灌漱喉中用太平丸徐徐嚥下次嚥一九緩緩化下至上床時候如此用之夜則肺竅開藥必流入肺竅此訣最為切要如瘦壅却先用錫糖烊消化凡百丸吞下又依前嚥太平丸令其仰卧而睡嗽必止矣如有餘嗽可煮潤肺膏服之復其根本完其真元全愈之後方合十珍丸服之此謂收功起身藥也前藥如神之妙如神之靈雖倉扁再世不過於此吁世之方脈用藥不過草木金石碌碌之常耳何以得此通神訣要奇異之靈也余蒙師授此書吳中治癆何正千萬人而未嘗傳與一人今此書恐就泯失重次序一新名曰十藥神書留遺子孫以廣其傳時至正乙酉一陽日可父書於姑蘇養道丹房

余自警稚覺醫業道攷究方脈三十餘年遍歷江湖多學廣傳者不過言語文字形容之耳及至用藥治病皆不能捷是以日夜苦心用志務在中病後遇至人同處三月斯人極明醫道精通方術用藥如發矢無不中的余曰必神人也遂拜為師得授奇方一冊閱之或羣隊者或三四味者皆余目親至人用效者也使余如父早逢霖夜行得月中中豁然自此回至吳中一用一捷無不刻驗信乎奇方可錫梓者也余以三餘暇日將至人所授奇方併日用決效之法類成一帙名曰十藥神書蓋用效者輒記錄之今西浙大癘道人與余通家之好用禮求授故錄以奉養生濟人之功用爾時至正戊子春正月三陽日可父再書於姑蘇春先堂

姑蘇葛可父編

閩長樂陳念祖修國註
東治林壽堂潤甫續

甲字十灰散 治嘔血吐血咯血嗽血先用此藥止之

大蓷 小蓷

荷葉 偏柏葉

茅根

茜根

山梔

大黃

牡丹皮

椴櫚皮俗等

右各燒灰存性研極細末用紙色碗蓋於地上一夕出火毒用時先將白藕搗汁或蘆薈汁磨

京墨半碗調服五錢食後服下如病勢輕用此立止如血出成升斗者用後藥止之

十灰大小蓷大黃梔子茅根茜根側柏葉同荷葉等椴櫚皮並牡丹膏

陳修園按前散自註云燒灰存性今藥肆中止知燒灰則色變為黑而不知存性二字大有深義蓋各藥有各藥之性若燒之太過則成灰灰無用之物矣惟燒之初燃即速放於地上以碗覆之令滅其火俾各藥一經火煉色雖變易而本末之真性俱存所以用之有效人以為放地出火氣猶淺焉者也然余治証四十餘年習見時醫喜用此藥效者固多而不效者亦復不少推原其故蓋因製不如法亦因輕藥不能當此重任必須深一步論治審其脈洪面赤傷於融醉惱怒者為火載血而上行証余製有惜紅丸日夜三四服但須以麻沸湯泡服不可煮服為囑審其素能保養脈沉而細面赤淡白血來時外有寒冷之狀者為陽虛陰必走証余製有惜紅散加鮮竹茹日夜服三劑其藥之配合散見於拙刻各種中茲因集溢不能備登

乙字花蕊石散 五藏崩漏湧噴血成升斗用此止之

花蕊石研為粉

右用童便一盞燉溫調末三錢甚者五錢食後服下男子用酒一半女人用醋一半與童

便和藥服使瘀血化為黃水服此以後藥補之

花蕊石須火煨研地分酒醋和童便功能化瘀為黃水輕用三錢重五錢

舊註但煨熟云徐嗣氏所註然余以名醫為未得機治吐血者競推葛可父而先生首以二方止血明明剗劑毫無顧忌細玩始知先生

意之所到理之精也人生於陽根於陰陰氣虧則陽自勝上氣為之喘促效吐痰沫發熱面紅無不相因而致故

留得一分自家之血減得一分上升之火易為收拾何今日之醫動以引血歸經為談不過概用止血之味甚至

有吐出亦美壅反為害遂令連延時日陰虛陽旺煎熬不止至於不救果誰之咎執引經而緩時日冀復元神吾恐有形之血豈能使之連生而無偶之陽何法使之連降此先生所以急於止血之大旨也 陳修園按虛癆証金匱以桂枝加龍骨牡蠣湯從腎虛以立法建中湯從脾虛以立法黃耆建中湯從氣血兩虛以立法八味地黄丸天雄散溫其下元從脾腎氣血之總根虛以立法是以補虛為一大綱也以薯蕷丸治風氣百疾虛羸諸不足是以祛風為一大綱也以大黃蠶蟲丸治乾血成癆是以逐瘀為一大綱也三綱鼎足為此証不易之準繩今葛仙翁以花蕊石散繼於十灰散之後雖云止血寔欲使瘀血化為黃水而不見血也然自余思之吐血既止而離經之血蓄而不行不可不用此散化之若血來勢如泉湧相續不絕竟用此散令其盡化為水是令一身之血俱歸烏有尚有生理乎讀書不可死於句下此其一也且三大綱因虛而成癆醫書恒有治法而因風而致者言之頗罕而因瘀血而致者除仲景金匱大黃蠶蟲丸仲景小品百勞丸外未有發明其旨且金匱以薯蕷丸與大黃蠶蟲並舉意以風氣不去則足以賊正氣而生長不榮乾血不去則足以留新血而滲灌不周怯証種種所由來也余治吐血諸藥不止者用金匱瀉心湯百試百效其效在生大黃之多以行瘀也 附錄仲景百勞丸方當歸炒乳香沒藥各一錢人參分數闕蠶蟲十四個去翅足水蛭十四個炒桃仁十四粒去皮尖大黃四錢零丸如梧桐子大都作一服可百丸五更用百勞水下取惡物為度服白粥十日百勞水者杓楊百遍即甘瀾水也

丙字獨參湯

止血後此藥補之

大人參二兩

右每服水一盞棗五枚煎一盞細呷之服後熟睡一覺後服諸藥除根

功建三才得令名陰陽血脫可回生人參二兩棗五枚服後方知氣力宏

舊註凡失血後不免精神怯弱神思散亂前方雖有止血之功而無補益之力故有形之陰不能即復而幾微之氣不當意固乎頓使獨參湯不但脫血益氣亦且陽生陰長觀先生自註云熟睡一覺使心安氣和則煩除而自靜益人之精神由靜而生亦由靜而復也奈何今之醫者遇吐血家乃視參如毒耶 陳修園按神農本草經云人參氣味甘微寒無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智父服輕身延年經文只此三十七字其提綱云王補五藏以五藏屬陰也精神不安驚悸不止目不明心智不足皆陰虛為元陽所擾也今五藏

得甘寒之助則安之定之止之明之開之益之之效矣曰邪氣者非指外邪而言乃陰虛而壯火食氣火即邪氣也今五藏得甘寒之助則邪氣除矣細味經文無一字言及溫補回陽何後人信從宋元無稽之說而反疑開天明道之聖經邪此証用至二兩以失血之後藏陰大虛陰虛則不能維陽陽亦隨脫故用二兩任專力大可以頃刻奏功但人參雖有補虛之功而效嗽者忘之乘此大血甫止之際效嗽未作急急止之若得熟睡一夜則生沛然莫之能禦即所失成升成斗週時補之而有餘矣若睡未足而驚醒之則血亦停而不生矣若血止一二三日而始服之不徒無益而有害周氏舊註亦超但以人參為補氣之品未免囿於俗見然人參補陰與地黃龜板之一於補陰者不同按其字義參者參也其功與天地人並立為參且能入肺肺為一身之橐籥謂益氣却亦近道程山齡謂貧者以歸脾湯代之然不如取當歸補血湯二劑入童便二茶碗隔湯炖二炷香取汁頓服之丁字保和湯 久嗽肺痿成痲

知母 貝母 天門冬 欵冬花各三 天花粉 薏苡仁 杏仁

五味子各二 甘草 兜鈴 紫苑 百合 桔梗 阿膠

當歸 地黃 紫蘇 薄荷 百部各錢 右以水二盞生薑三片煎一盞入

飴糖一匙調服日三食後各進一鍾與保真湯相間服 血盛加炒蒲黃萬根藕節大釧小釧茅花當歸 痰或

加南星半夏陳皮茯苓枳實枳殼 喘盛加桑白皮陳皮蘿蔔子葶藶子蘇子 熱甚加山梔子黃連黃芩黃柏

連翹大黃欵冬花 風甚加荆芥防風菊花細辛香附子夜覆花 寒甚加人參桂枝蠟片芍藥

知貝欵天冬各三二錢杏薏味天花五分二百阿歸地紫苑兜蘇薄荷桔甘

加減歌

歸茅大小蘗蒲黃藕節萬根血盛當痰盛南星陳半入茯苓枳實殼須將喘加桑白陳皮等雜萬蘇蘇三子詳熟甚
苓連梔柏欵連翹合併大黃吞風加香附荆防細夜覆菊花六件良寒盛加參蕪牡桂芍加蠟片不須言 陳修園
按此方治久嗽不過類集順氣化痰清火解鬱之品以多為貴絕無把柄抑又思之先生有道之士也其方又得
之神人何以庸陋至此且蘇葉桔梗薄荷甘草散非久嗽所宜百部欵久苦溫非血後所宜兜鈴花粉杏仁亦為中

虛所忌知母貝母天門冬地黃河膠百合性寒而滯力亦輕微其去市肆中之間証立方搖鈴輩之僥就配合以零賣者幾希耶然此方不見於大家之書如明季龔太醫各刻及萬病回春壽世葆元等本亦載之但方名間有不同藥品偶有增減村醫用之往往見效余向以病人壽算未終總不歸功於此方亦隨見而隨忘之耳今得此書始知禮失而求諸野沾體塗足中大有入焉轉悔從前之肉眼也究竟於此方未得其旨大抵奇之弗去而耦之一方不去而復之如韓信將兵多多益善且其輕重大有法度加生薑之辛溫以潤肺餽糖之甘培土以生金卓然大家可知仙方非凡人可窺測也但喘盛加蘿蔔子與地黃相反臨時自當去取

戊字保真湯 治虛弱骨蒸體虛

當歸 生地黃 白木 黃耆 人參 赤茯苓 陳皮 赤芍藥 甘草

白茯苓 厚朴 天冬 麥冬 白芍藥 知母 黃柏 五味子 柴胡

地骨皮 熟地黃 每服水二盞薑三片棗子五枚煎與保和湯間服每日一服 驚悸加茯神遠志柏

子仁酸棗仁 淋濁加葶藶烏藥猪苓澤瀉 便澀加石葦扁蓄木通赤苓 遺精加龍骨牡蠣蓮心蓮鬚

燥熱加石膏滑石豨甲青蒿 盜汗加浮小麥牡蠣黃耆麻黃根

參耆歸地木三錢赤白茯苓朴草兼赤芍陳皮錢半等味柴白芍二冬編骨皮熟地和知柏各一錢加薑棗煎

加減歌

骨蒸又見悸和驚棗遠枝神柏子仁淋濁葶藶猪澤入遺精龍牡蓮鬚心小便澀要和石葦扁蓄木通共赤苓燥加

青蒿石滑豨麻根盜汗蠅浮者

舊註一名保和者因失血之後氣血未調率難把握然調血者以氣為主調氣者實肺為司故大旨以瀉肺中之伏熱益下焦之化源此其治也若和而失其所以為和則保亦失其所以為保矣至保真則氣血之味俱等大旨以甘溫為主甘涼佐之而苦寒又佐之未嘗禁用苦寒也而與今日之用寒涼者異矣曰保真者大補其正煎瀉其邪使生機活潑油油然而不已也兩方加法大備然非盡用亦姑列之以俟去取耳學者須知 陳修園按此方即十全大補湯去川芎肉桂加赤芍赤芍生地天冬麥冬五味子柴胡厚朴陳皮地骨皮知母黃柏是也氣血

雙補之中加柴胡地骨以疎肝邪肝火即雷火也知母黃柏以降腎火腎火即龍火也又合麥冬五味子為生脈散俾水天一氣又合天門冬為三才湯以位育一身最妙是陳皮厚朴甘草入胃寬中行滯導諸藥各盡其運動之力而協和共濟且藥品輕重得宜大有法度但芍藥以花之赤白別之其根則不可辨也藥肆中另有一草葉小根大與芍藥無異余家山中親見採藥人握取盈囊問之則曰藥舖所傳赤芍皆此種也始信本草崇原註云赤芍不知何草之根令外科小兒科習用害人之說非虛語也方中當去之

己字太平丸 治久嗽肺痿肺癰

天門冬

麥門冬

知母

貝母

款冬花略二

杏仁

當歸

熟地

生地

黃連

阿膠珠各一兩

蒲黃

京墨

桔梗

薄荷略一

白蜜四

麝香少許

右為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火入麝香略熬

三二沸丸如彈子大每日三食後細嚼一丸薄荷煎湯緩緩化下臨卧時如痰感先用飴糖拌消化丸吞下却嚼嚼此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除服七日病瘥凡效嗽只服此藥立愈

二兩三冬二母如歸連二地杏仁各需兩五餘皆兩京墨蒲黃薄荷桔梗

舊註太平丸非正方也先生意計周密恐人正氣漸復之後尚留一分未盡必有一分未安特於晏息之時嚼服此丸使人於靜中不知其所以然而藥力無不到此少許麝香之所以為神妙也 陳修園按方中潤燥化痰養液少佐薄荷以利氣無甚深義惟雜以黃連之苦寒麝香之走竄不幾令人駭而吐舌乎而不知令人駭處正是神仙妙用處神農本草經云黃連氣味苦寒苦為火之本味以其味之苦而補之而寒能勝火即以其氣之寒而瀉之一物而兼補心瀉心之妙故凡久嗽肺痿肺癰得此則火不尅金而金自受益矣本草經又云麝香主辟惡氣去二蟲蓋勞嗽不已則為瘵病而生蟲非尋常之藥所可治惟麝為諸香之冠香者天地之正氣也正能辟邪而殺蟲瘵病之有蟲如樹之有蠹惟先去其蠹而後培其根則發榮滋長矣况效嗽不離於肺肺有二竅一在鼻一在喉肺竅宜開不宜閉喉竅宜閉不宜開今鼻竅不通則喉竅將啟而為患必後麝香之香氣最感直通於鼻竅而開之則呼吸順而效嗽之病除也舊註未闡出所以然之妙今特補之

八味湯丸右歸飲丸皆為極品自此說一行而虛勞之証十患九死曷不思脾為諸藏之母當無病時常服補藥尚難進其飲食長其肌肉至虛損病篤之時將何法補其不足且能令其有餘以生金耶腎為壽命之根當無病之時服補藥尚難充其精氣強其腰膝至虛損病篤之時又何法補其不足且能令其有餘以濟火邪鄉愿德之賊吾謂康醫之陰毒更甚妄醫之陽毒也近日更有襲取葉天士一派遇有感冒即用前胡乾葛杏仁桑葉桔梗紫蘇防風茯苓橘紅蘇法夏神麩穀芽麥芽山查炭甘草為王方頭痛加川芎白芷身痛加羌活秦艽效嗽加紫苑百部口渴加麥冬花粉小便短少加滑石木通澤瀉猪苓腹脹加厚朴枳實薤白子砂仁殼皮膚作痒加蟬退白蒺藜連翹喉痛加元參射干牛蒡子貝母寒熱往來加柴胡酒苓腰膝痛加牛膝杜仲脚腫加木瓜防己病從佛營則加黑營金香附發熱不退加白薇地骨青蒿白芍藪日未愈曰當略調其氣血加當歸酒芍何首烏乾地黃丹麥沙參等出入互用至於久病虛人則以遼東海參燕窩鮑魚穀芽首烏艾草等為主其參朮者二地桂附吳萸炮薑等隨証加入而金銀花炭枸杞炭菊花炭白朮炭地黃炭鮮桑枝金銀花藤泡淡乾薑生薑渣泡淡附子泡淡吳萸炭秫稻根鬚蟹血柴胡五色石莖冬瓜子整令生扁豆黑檀豆皮綠豆皮西瓜翠皮之類曰我是葉天士一派與恒法不同而不知葉天士居江蘇該處人腠理較薄外邪易入而亦易出不用仲景正法故於傷寒論一部未得師授議論甚覺隔膜其於雜証胸中頗有書卷加以絕世聰明臨症甚多所以名噪一時而虛勞一証專祖十藥神書不必全用其方神而明之信手拈來頭頭是道何若輩僅於臨証指南中食其糟粕而詭託之也耶

辛字潤肺膏 久嗽肺燥肺痿

羊肺一具

杏仁淨研

柿霜

真酥

真粉略一

白蜜二兩

右先將羊肺洗淨

次將五味入水攪黏灌入肺中白水煮熟如常服食前七藥相間服之亦佳

真粉真酥並柿霜杏仁淨研兩平當蜜加二兩調黏用灌入肺中水煮嘗

舊註血去則燥燥則火旺肺必枯欲從腎源滋水而不先滋水之母有是理乎然肺為多氣少血之藏故一切血藥概不欲用以羊肺為主諸味之潤者佐之入所易能也若以真粉之甘寒不獨涼金且以培土人所未知也

陳修園按方中真粉即傷寒論猪膚湯之白粉也本文未明為何粉一說即天花粉主滋潤肺全取金水相生之義一說即粳米粉以少陰之水火交會於陽明中土粳米補陽明中土交水火而止煩燥而且藉土氣以生金二說俱有深義余每用則從後說今讀先生此方又閱周氏所註真白粉即天花粉無疑若慶丁巳歲余應興泉觀察阿公泉州郡伯張公聘主清源書院講席日者用天花粉一味藥舖送白粉一包其色瑩晶潔白迥出諸藥之上余傳問之答曰此物最賤而製造却難惟冬月葉落其氣盡歸於根掘取以法取汁和水淘洗澄之晒乾收貯纔有如此寶色若無此色恐偽物弗效不如止用天花粉片之較妥也今先生加一真字何等鄭重其辭推而論之全置於蟲病製有甘草粉蜜湯以殺蟲若虛勞久嗽為瘵蟲蝕肺鉛粉性毒能殺三蟲今雜於蜂蜜柿霜羊肺之中誘蟲食之旋而甘味盡毒性發而蟲患除矣此非正解亦可備之以啟悟機

壬字白鳳膏 一切久怯極虛德咳嗽吐痰咯血發熱

黑嘴白鴨一隻大京棗二升酒一瓶右將鴨縛定脚量患人飲酒多少隨量以酒浸濕將鴨頸剖開滴血入酒攪勻飲之直入肺經潤補其肺却將鴨乾去其毛於脇邊開一孔取去腸雜拭乾次將東子去核母個中實納參苓平胃丸末填滿鴨肚中用麻紮定以砂瓶一個置鴨在內四圍用火慢煨將陳酒者作三次添入煮乾為度然後食棗子陰乾隨意用參湯化下後服補髓丹則補髓生精和血順氣

參苓平胃散 一升京棗二升酒一瓶黑嘴白毛肥鴨一隻照方如法製來斟

陳修園按怯而日久虛極而憊而且效嗽不已則肺日因嗽而動擾矣吐痰不已則肺因痰而壅滯矣咯血發熱壯火食氣不特肌肉消瘦而且氣衰言微矣此為極證恐非無情之草木所能治故用黑嘴白鴨一隻為君蓋以毛白者味較清而入肺嘴黑者骨亦黑而入腎取金水相生之義亦資異類有情之物以補之也最妙入京棗二升取其甘溫以補胃平胃散一升取其消導以轉胃胃為五藏六府之本胃安則藏府俱安與保真湯佐以厚朴同義蓋天士於此書亦參透其旨但其方隨證加入以致學徒刊刻彙案用厚朴者於虛癆門止收一方意者中人以下不可以語上重其道而不輕傳歟修園則異於是

癸字補髓丹 久勞虛憊髓乾精竭血枯氣少服煎藥愈後服此藥

猪脊骨一條 羊脊骨一條 團魚一枚 烏雞一隻 四味製淨去骨存肉用酒一大碗於砂瓶內煮熟

搗細再用後藥

大山藥五條 蓮肉十斤 京棗一百 霜柿十個 四味修製淨用井花水一大瓶於沙笥內煮熟細

搗與前熟肉一處用慢火熬之却下

明膠四兩 黃蠟三兩 右二味逐漸下與前八味和一處研成膏子和平胃散末四君子湯末并知母黃

柏末各一兩共一十兩搜和成劑如十分堅硬入白蜜同熬取起放青石上用水搥打如泥丸如梧桐子大每服

一百丸不拘時候乘湯下

猪羊脊骨雞團魚者搗宜當去骨需霜柿十枚京棗百建蓮八兩五條著熟和前味熬文火黃蠟明膠漸入諸知柏

四君平胃末各加一兩製丸如

陳修園按父病虛憊髓乾精竭等証服煎藥愈後服此藥二十字是為虛癆既愈証善一善後之計實為虛癆窮
極証覓一回春之路也虛癆至六極之候凡和解溫涼補瀉之藥無不應試初服間或少效久之無不增劇名醫
俱束手無策然藥以治病食以養人二語參透大有妙義蓋得病日久日在藥中禾黍之腸改充雜草腸胃之所
惡者藥也若更以藥投之是重困之而不能堪矣先生用山藥蓮肉京棗霜柿取日食之果菜以悅脾胃之性情
用猪髓羊髓團魚烏雞牛膠日用之肉食以充脾胃之虛餒即扁鵲所謂損其脾者調其飲食內經所謂精不足
者補之以味是也惟方中黃蠟一味俗醫見之無不驚駭本草備要謂服此物著於陽胃令人瀉痢不止而不知
此物性溫豈能作瀉感喜丸用此鎔化為丸王晉三註云黃蠟性味緩濡續絕補髓之功專調斷喪之陽分理瀆
亂之精故為元陽虛憊遺瀉帶下之神品俗傳本草之害人往往如此況此丹儘屬骨肉有情之品溫養吾身之
氣血與無情之草木懸殊葉天士用人乳粉秋石霜血餘灰之類引人身之膏脂以為繼續之計亦由此方悟出
若紫河車污穢有毒服之無不發熱減食豈非惑於人補人之說忍心害理適以自戕也耶又按明膠是取嫩
肥黃牛皮以河水製造為之或用牛肉煎汁去滓再熬成膏每斤入薑製半夏末二兩名為霞天膏治勞傷又嗽
乾隆丁未余肄業藍峰書院孟瓶菴師言其督學四川時患嗽數月同寅製餽因素不食牛拜受而不敢嘗暑中

閱卷張友患痰証二十餘載喜而嘗之膠痰成塊吐出甚多半月全愈身體立見壯健附志之以廣其傳 舊註
人若色慾過度傷損精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午夜發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎池
血咯吐血或效血吐血血衄血身熱脈沉數肌肉消瘦此名癆瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲年然
必須病人惜命堅心定志絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根此謂內外交治可獲全功 周氏總註予
讀此十方俱出人意表其間次第緩急可為千百世法即不必十方並用要無能出其範圍者矣一方之中自得
肯綮即不必全用其藥亦可細推其理矣乃今日之治血証者輒用六味地黃增減冀其收功皆由醫者入手而未
嘗從神書體會者也彼之腎水衰則火炎為患壯水之主可鎮陽光孰知人之患此病者陰虛固多而他因者亦
復不少假如從勞役饑飽而得者其傷在足太陰矣從憂患而得者其傷在手少陰矣從嗜飲而得者其傷在手
太陰矣從憤怒而得者其傷又在足厥陰矣此足致吐血效血咯血等証豈一壯水可以勝其任乎總之以身之
血附氣而行者也一藏傷則氣必不調而血逆溢於外故逆則上出墜則下行滯則脹痛寒則凝熱則散此自然
之勢也後之君子於診視之際問問之餘斟酌而得其情否乎果能於此著眼視其病之所傷在何藏脈之所傷
在何部時之所在何季思過半矣曾治一咯血之人平日極勞每咯紫黑色俱成小塊者然必是飽食則多少
食則少不食或少或無余以薑汁重便製大黃治之二服而安後以補中益氣湯加血藥而愈知者以為怪妄予
謂極平常益實從神書究心而置醫費為談料者也

附平胃散方

厚朴薑汁

陳皮去白各五兩

蒼朮去皮米泔浸炒八兩

炙甘草三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃

散

四君子湯

人參

白朮

茯苓三兩

炙甘草一兩

烏鴉痧

白眼痧

蛇痧

啞叭痧

蜈蚣痧

鳳凰痧

珍珠痧

羔羊痧

魚痧

血流不止痧

鹿痧

象痧

獅子痧

蜈蚣痧

蜜蜂痧

母豬痧

免子痧

老鼠痧

鶻子痧

羴羊痧

狐狸痧

醋豬痧

莽牛痧

猿猴痧

纏絲痧

蜻蜓痧

血腥痧

老鴉痧

貓痧

鵝痧

鷹痧

螳螂痧

蚊蟲痧

蝴蝶痧

鴨子痧

雞子痧

喜鵲痧

鷓鴣痧

野雀痧

鴉鴿痧

黃鷹痧

海青痧

鷹嘴痧

蝎子痧

蝎虎痧

蚰子痧

秋蟬痧

蚯蚓痧

鱧魚痧

腳魚痧

螞蟻痧

豆喉痧

奔牛痧

雷公救疫丹

羊毛痧

擦雞蛋清方

雷擊散

霍亂

火疔證

發斑證

發狂發渴

以上各時疫證治

唇腫舌腫口爛各証

切實火喉病不論何名

一切虛火喉病不論何名

白喉證

喉中生泡生珠

喉痛破爛日久不愈

時疫結喉白纏序論

養陰清肺湯

地黃散

紫正散

吹喉藥方

辛烏散一名角藥散

捷妙丹治雙單蛾

嚴氏赤糜散

雄黃解毒丸

火刺仙丹

刻急須製用能起死回生

絳雪丹 治喉腫喉癰口舌生瘡

金鎖匙

真功丹

萬益丹

孚佑帝君救喉痛方

黃瓜霜

以上喉科急證

普濟散急痧方

神妙經驗痧藥良方

展子明傳接骨方

神驗刀瘡藥方

治痔瘡毒方

治鼠瘡方

鼠瘡膏藥方

治猪羊癩瘋方

千槌膏

解吞鴉片生煙毒方

哮喘奇方

仙傳百草霜丸治諸血證方

腹瀉初起

腹瀉痢疾方

午時茶方

瘧疾射藥方

萬應琥珀膏

化鬱膏

治癩方

洗癬方

牙疳芻棗散

擦牙散

疥瘡方

倪涵初先生治癩三方

久癩全消方

一切腫毒及大小外證方

老人飲食噎塞不通方

應驗如意散

傷寒初起病由

藿香正氣散

九味羌活湯

敗毒散

達原飲

白虎湯

小承氣湯

三消散

大承氣湯

調胃承氣湯

中暑中風中熱癰病治法

香薷飲方

蒿苓益元湯

六一散方

療牙止痛散

治耳內出膿血水腫痛方

治耳內出膿血水腫痛方

臙瘡方

金仙膏方

治喉牙紫砂散

純陽青娥丹

治牙關神驗方

回天再造丸方

記再造丸真方

急痧應靈散

閩長樂陳念祖原評

乾隆年間數中人多感異證病發輒立死方書不載治法有人於丹平山得神授奇方分四十九痧全活其最後此方傳至關中以治諸怪異急證無不奇驗道光壬午粵東奇証多有相似者偶得此方試之立效當經刊布今歲夏秋之間浙中時疫俗名吊腳痧亦頗類此爰急重梓以廣流傳至原抄本內字畫容有一二訛脫之處無從攷證姑仍其舊以俟知者咸豐辛亥仲秋上浣覺因道人識

烏鴉痧狗痧二證同治其證頭疼頭沉頭麻眼黑惡心發搐指甲青後遍身青上吐下瀉不能言語小腹疼痛不急治則死牙關不閉則已若閉急用著撬令病者捲舌視之舌根下或有紅黃紫黑等泡急用針刺破出血雄黃點之即愈如不愈再以松皮猪牙皂石竹子煎湯服之蓋被出汗忌風忌米湯三日

白眼痧其形長翻白眼治法將頂門上灸三艾如不愈再灸三艾即愈

蛇痧其形亂滾肚脹痛治法先挑肚臍三針次挑頂門一針左右脚心各一針用烟油拭之即愈

啞叭痧得病著地不能言語用鞋底蘸涼水輕打頂門女人分髮用手蘸涼水拍之即愈

蠟蟻痧其証肚脹治法肚臍圍挑七針小肚挑三針即好

鳳凰痧其形股脛搖擺急用鞋底打脚與腰再以雄黃水飲之

珍珠痧其病身上起泡似珍珠形用針刺破出血即愈

羔羊痧得病如羊聲滿口吐沫用雄黃白礬蟬退合薑汁涼水飲下即愈

魚痧其證惡心多飲水肚中疼脹用魚骨燒灰存性黃酒調服出汗即愈

血流不止痧得病血流不止治法用指甲頭髮各三纏住煨黃為末黃酒送下不論何處流血即此證

鹿痧其證口吐血渾身上發紫斑似梅花形用針刺破次用鹿角膠合黃酒送下

象痧得病流鼻心痛昏迷針挑兩肩膀尖出血雄黃點之即愈

獅子痧其証心荒頭疼渾身起大泡用針刺破雄黃點之再用鹽醋水飲之

蜈蚣痧得病頭出冷汗擁心吐黃水細看脊骨兩膀有紫筋用針刺雄黃點之

蜜蜂痧其証哭聲不斷惡心上吐下瀉舌下有紫疔針刺破用鹽點之即愈

母猪痧其形拱地先針刺舌根又兩手除大指其餘指將指甲邊肉上各刺一針後用猪食盆內剩泔水灌一大碗

即愈

兔子痧其形走荒野脚走不停即用炮藥搽舌擦止許走着治勿令坐卧或用濕土製如帽蓋頭上使聞土氣即愈

老鼠痧其形黑唇紫腫疼咽喉痛或胸膈膨脹鬚鬚角看心挑一針見血即愈

鵲子痧其形胸背腫痛小腹飽脹口渴身熱見食即嘔心中頓跳挑兩大腿腋摺見血一針即愈

羝羊痧其形脹滿似困似睡眼閉身轉呼哈俱疼痛尾巴骨上挑二針見血即愈

狐狸痧其形頭疼乾嘔不思飲食頭仰渾身出汗張口胡言針挑咽喉前後心窩見血即愈

醋猪痧其證心熱四肢厥冷渾身打戰心疼舌下有紫疔刺破小鹽點之

莽牛痧其證肚腹脇脹心疼將唇掀起挑沿唇上牙牀及唇面見血即愈

猿猴痧其證坐卧不安心腹脹滿口舌指甲色青小腹疼用針挑陰囊即愈

纏絲痧其證肚腹脹頭疼心煩前後心或有紫黑黃點子用針挑破以醋擦之即愈如覺遍體麻木無此點子者即

心痧子證將胎脾胃腿灣青筋針出紫血用炒鹽煎湯服之即愈

蜻蜓痧其形渾身打戰兩手張翼用掃帚著面頂一拍即愈

血腥痧其證食時即聞血腥氣看舌下有紫泡夾指窩亦有紫泡刺破雄黃點之

老鸛痧其證惡心舌根強硬嘔吐不止舌下有紫疔刺破火藥點之

猫痧其證鼻舌兩手扣地擁心用針挑兩鬢角出血以雄黃酒飲之

鵝痧其證長身伸脖用鵝毛三根燒反水飲之

鷹痧其形蹶嘴心疼昏迷用針刺臂脾胃灣出血雄黃點之

蝻螂痧其證頭斜心疼昏迷臂脾胃灣挑破用老鸛嘴裸燒反點之

蚊蟲痧其證吐痰昏迷用燒酒拍心口至紅住手

游蟻痧其證頭疼腫咽喉腫痰口內麻木用生薑汁和涼水飲之

鴨子痧其證抹嘴搖頭用針刺外咽喉出血即愈

雞子痧其證如雞鳴心荒不寧用雞肫皮煨黃為末黃酒送下

喜鵲痧其證頭疼心疼眼黑渾身痛舌下有紫疔刺破雄黃點之再以雄黃酒飲之

鴉鴉痧其證聲如鴉鴉舌下有紫疔用針刺破用死過鴉鴉煨燒灰黃酒送下

野雀痧遍身發紅前後心有紅黑紫點頭疼脇脹脈下三針髮際一針見血即愈

鶉鴉痧肚疼頭暈眼黑心脹用白礬水灌之再用針挑前後心及兩耳稍見血即愈

黃鷹痧肚腹之下反攪疼痛搥出胎脰用紅絲繩捆住兩大指甲各指甲邊肉上刺一針見血即愈

梅青痧頭疼打滾用帶將頭箍住以針在耳根眉際咽喉窩前後心挑之忌風三日

鷹嘴痧渾身發燒熱不可忍心口一塊滾上滾下針挑臍下並兩乳各一針見血即愈

蝎子痧其證扒地挺腿似蝎子蹶尾一般擁心用蝎虎子爪培黃為末黃酒送下

蝎虎痧其證搖頭擺手舌下有紫泡或口角強硬刺破烟油抹之

蚰子痧其證扒地擁心心疼兩手捧腮兩腿屈不能伸用老鴉嘴樛煨黃為末黃酒送下

秋蟬痧其證四肢筋青腦後有紫筋刺破用老鴉嘴樛煨黃為末黃酒送下

蚯蚓痧其證搖頭擺尾上吐下瀉用蚯蚓糞和黃酒送下

鯉魚痧其證腫頭腫腮用魚網燒灰和黃酒飲之出汗

腳魚痧其證病人自言頭搖又曰頭似核桃大用旁一人回言曰打破出血病人少愈當時仍前說旁一人打腳心

病人自言曰解解解自愈

螞蟻痧其證手足麻木用鹽水炒麩子遍身擦抹

豆喉痧其證咽喉腫痛不能飲食即用針刺大指甲旁半莖葉出血用蜘蛛網一個連蜘蛛夾棗內煨黃為末以竹

筒吹入鼻內

奔牛痧其證如牛抵人心頃不甯用麥稻水灌之或嚼麥稻

雷公救疫丹 此方專治各種異証其效如神屢試屢驗萬勿輕視

牙兒 三錢五分 硃砂 五分 明雄黃 五分 細辛 三錢五分 廣木香 二錢 廣皮 二錢 藿香 二錢

桔梗 二錢 薄荷 二錢 管眾 二錢 防風 二錢 半夏 二錢 桔梗 一錢五分 白芷 一錢

生草 二錢 此藥照分秤足共研細末裝入瓶內可治諸痧異証此病來時脈散牙關緊閉發慌手足麻木閉

目不言喉腫心疼醫多不知誤認喉瘋治之必死此證名曰硃砂証又名曰心經疔即將此藥秤三分吹入鼻內

再用一錢薑湯服之後用紅紙捻照前後心窩見有紅點即用針刺破挑出內面紅筋可保無事倘不在意命在

頃刻不可不慎也

又方用香附末食鹽生蔥搗爛共炒極熟用布二塊換熨冷者再炒分兩包痛止為度熨後不可受寒專治一切寒

熱腹瀉腹痛不可忍者及胃氣痛無不立效如香附蔥一時無有單炒鹽熨亦效

治羊毛痧七十二痧証時証麻木瘟疫病火疔發斑發狂發渴唇腫舌腫口爛喉痛等証經驗良方

羊毛痧

又名羊毛疔羊毛瘟心經疔硃砂證 此證及七十二痧證或頭痛肚痛或手足直硬麻木身發寒熱或不寒熱而

心胸脹痛神昏或喉痛腰腹作脹或腰中如一帶捆住或指甲青黑上吐下瀉或不青黑不吐瀉此極熱證亦有受

寒或食生菓而起者頭頂有細紅毛急拔去一面用多年熟烟筒又名旱烟袋取筒中烟屎油沖水食不是洋烟屎如味甜而

不辣暗或不甜或不辣即是對證多食為妙此方能散熱毒如寒熱相兼者亦能解散真是仙丹凡七十二痧証霍

亂吐瀉證火疔發斑發狂發渴唇腫舌腫口爛喉病用之皆有神功如食之味辣者即不可用又後有喉病滿天星

草方亦治各項熱證使火從小便出 以上各證忌食粥飯即米湯亦不可飲又米粉粘米糕餅湯圓粽子等

物均不宜食只可食蕎麥即花蕎麥細粉調藕粉百合黃瓜菜豆豆腐薯芋等物亦不宜多 又方用醋入瓦鉢內

用燒極紅赤木炭或瓦礫均可沖入醋鉢內向鼻薰之可散內熱如神然必擦雞蛋清方以除病根並服雷擊散為妙

擦雞蛋清方

新鮮雞蛋在蛋殼頂開一小孔專用蛋清不調藥擦前心背心兩腰眼尾脊骨連即起不共五處每處擦三四次每處用蛋清三四分放手心用輕力擦完為一次如有脹痛即在脹處擦之如擦後又脹再擦自安擦出黑白毛或如雞毛管樣不可拔動用新棉花鋪毛上又用綢子捆好其毛自落棉上擦後量力放生方免復發用別藥不如此方擦得透用頭髮和蛋清擦或用指頭擦亦不如手心擦得透有七十二痧証按經用刀針挑割總不如此方擦之百發百中且挑割不透病根難除此方多擦為佳別方不能拔出毛管

雷擊散

乾隆元年貴州省瘟疫盛行忽於丹平山有雷火擊書此方活人甚多凡羊毛痧七十二痧證瘧病時證軟脚瘟屢用如神

牙皂即猪牙皂

北細辛各二錢

土硫砂

明雄各二錢

蘇薄荷

蒼香各三錢

枯礬

白芷各一錢

桔梗

防風

木香

貫眾

陳皮

法夏麩

生甘草各二錢

共研細末收入磁瓶用蠟封口免洩氣隨帶身旁每用二三分吹鼻中再用一二錢薑湯沖服

睡片刻汗出即愈 有由脚麻木至心而死者名麻脚瘟又名軟脚瘟急服此藥並照前羊毛痧各方治之逆則難救 若痧症瘟病有受寒者照後霍亂証炒鹽飲方寒熱皆吐出立效如神

霍亂

霍亂

上吐下瀉名霍亂証要吐不吐要瀉不瀉名乾霍亂如兼兩腿轉筋名霍亂轉筋均用前烟尿方食之最妙

又方生鹽大半酒盃放無油瓦鉢內炒紅入童便大半茶盃減便亦煮一滾勉強飲盡或灌入口中越吐越妙寒

熱立除務要多飲下喉雖轉筋入腹霍亂已死皆有起死回生之功如服少未下喉吐不盡必死若用此方可以不

用烟尿至煎雞蛋清方必須用之以除病根

火疔證

此不是 凡火疔發寒熱或不發寒熱多與斑相同頭髮內耳後耳內舌下眼下肩甲面手灣脚灣脚心腎囊陰戶

巖門通身細看或細如蚊咬或如眼如錢疔外有數小或嘴唇四圍諸疔此毒都在頭面者亦重或有紅絲青絲若絲走至心

即死即將頭挑破若在眼皮上挑不必挑用前烟屎油點之絲即退縮再用烟屎四圍塗敷仍納食烟屎油或用後滿天星草方均神妙並用前雞蛋清方以去病根有絲無絲火疔皆極神妙或用油燈草在絲頭燒之絲亦退散惟頭面生疔切不可燒又方用大蒜切斷磨常行走門脚泥在絲頭敷之並敷疔頭四旁絲退而疔亦愈如治不得法或夫妻同房犯著或夜夢遺精疔形縮隘或發狂亂語或不知人事名曰走黃細看覺有小小芒刺即是疔頭先用烟屎在四邊塗敷再用鐵針挑破擠盡黑血見紅血為止仍服烟屎並用前蛋清方以除病根 若火疔或發斑色淡紅平塌不腫起者此是虛火若誤服涼藥必死惟用烟屎試之食之不辣即對證食之辣者即不可服或用真高麗參一錢用頂上黨參四五錢亦可元參三錢北五味分六錢麥冬五錢製附子一錢乾薑一錢水煎服火疔淡紅不起誤服涼藥神昏氣喘者服之亦效此皆陰寒虛火必用此藥方可有救性命屢試如神不必以薑附太熱遲疑自誤也 火疔與發斑熱極無脈者加味參麥散主之 生薑一錢或洋參一錢北五味分六錢牛蒡子四錢元參三錢水煎服神效

火疔與發斑眼珠突出手足冰冷

此心火熱極四肢齊來救心無血以養手足故冰冷也其疔色斑色必紅赤明亮浮起用前烟屎方及下滿天星草方最為對證仍擦雞蛋清以除病根 如火疔與發斑愈而復發者其根必深而難出最為兇險用巴豆去殼飯一粒捶爛貼疔頭斑頭過約三時其根自出根大者多用一二粒為妙

發斑證

斑如蚊蟲咬傷或如點如錢如雲即是又有如龍眼鳳眼或如小瘡小疔此即火疔而廣東各處曰斑頭斑外四圍有小斑者輕若大而色紫者重無論斑是疔 是風火同一治法有熱極無脈者有斑色淡紅平塌不起神氣虛弱者淡紅不起誤服涼藥神更昏氣更弱或氣喘者又發斑眼珠突出手足冰冷者均照前火疔各方治之最穩最妙 發斑熱極色紫黑者用滿天星草又名鬍子草遍地金錢形如芽菜葉而小又似如意頭其葉每用六七錢放粗碗內捶數百下不使汁水走散再加洗米水沖入去渣飲之渣敷疔頭斑頭火毒從小便出屢用如神其性太涼斑色疔色淡紅平塌不起者萬不可服

發斑發渴

發斑而兼發狂或兼口渴不止此是實火照前滿天星草方使火毒從小便出並照前烟尿熱醋方以解內熱仍必用前蛋清方以除病根。如尋常發狂發渴並非因火疔發斑而起者但見登高而呼披頭棄衣狂走大叫大罵阻壓不住面色發赤時時飲水亦是實火照滿天星草烟尿熱醋蛋清各方治之。如發狂阻壓得任或口渴而不喜飲冷水或要飲不飲或言語氣弱無力眼光無神而光白此是虛火萬不可用滿天星草及各涼藥以免禍生不測急用前引熱下行法並煎醋蛋清各方以去虛火仍請明醫治之。

唇腫舌腫口爛各證

嘴唇忽然腫大如猪嘴又有舌尖腫硬或黑或白均是大熱證舌白生毛者難治必要用刀在唇腫舌腫各處割破用銀簪刮盡黑血見紅血為止不可畏疼誤事如舌下生一小舌或生別塊亦刺破惟舌下正中處斷不可刺此兩證急服前烟尿方以解內毒急擦雞蛋清以除病根。至口中破爛或生白點輕者挑破用鍋底黑烟靛名百教之重者亦用前烟尿蛋清兩方治之。

切實火喉病不論何名

咽喉腫痛或生單蛾或生雙蛾痰壅氣閉牙緊面紅此多實火細看頭頂有小紅毛急拔去又一鼻上看至腦後及兩手虎口大指二指如各有紅紫或胸心有紅筋青筋黑筋要在紅紫處刺出血急用前烟尿方熱醋方治之用雞蛋清方擦之以除病根又用巴豆捶爛用紙捲成筒燒烟燻鼻喉腫即破牙緊即開又用燒酒拍打後頸窩以家用白麻一大皮從上往下順刮百數十下不可見有紅泡子或飛蛾形刺破出血取常行往來門脚泥塗敷立愈或用銅錢沾水在後頸窩括之不可倒刮

一切虛火喉病不論何名

喉病忽然而起面與舌多白色痰在喉中如睡卧呼鼾聲或如牽扯鋸木聲喉腫痛或不大腫痛或喉中無痰皆是虛火喉病其病寒盛於下虛火上炎又名格陽證若誤服涼藥難治宜用引熱下行法先用強而有力之人自將兩手心搓極熱然後擦病人兩腳心擦至大熱為止乘腳心熱時速用吳萸錢生附子錢共為末用少許灰麵粉和頂好醋做成兩餅或加麝香分更妙蒸微溫熱貼兩腳心安睡兩三時或半夜腳心發熱則火氣下行病自漸愈又方

熟地麥冬山萸肉各一製附子車前子北五味各一水煎一服立愈此石室秘錄仙方 一人喉痛半月頭面咽喉俱腫大氣壅聲啞口中生瘡痛極而不能睡此虛火上熱下寒即是格陽證用上引熱下行法又用前熟地麥冬等藥一服而愈 以上虛火喉病用前已豆熱醋蛋清三方均有神功

白喉證

惡寒發熱頭痛背脹周身骨節痛喉痛或不痛有初起即現白點白塊有二三日方現者滿喉皆白雖屬風熱不可用麻黃桂枝細辛羌活升麻柴胡蘇葉等藥急用烟尿方蛋清方百無一失

喉中生泡生珠

泡即瘡也有血瘤瘰癧唇瘤粉瘤之分切不可用刀針用前引熱下行法並已豆熱醋蛋清各方並分別虛實治之 又有異中生一紅線懸一黑泡子如珠樣垂掛喉門誤用刀針即死用前烟尿油數點滴鼻內二三反半刻珠破絲斷而安或用前已豆熱醋方及引熱下行法均神妙

喉痛破爛日久不愈

名爛痧喉此虛寒照前虛火喉病治之 又方萹菜根燒枯加頂上冰片一二分吹入即收口全愈

時疫結喉經驗良方原序

喉中起白如腐一證其害甚速乾隆四十年前無此證近來患此頗多小兒尤甚且易傳染誤治不救雖屬疫氣寬醫之未當也按白腐即白纏喉諸書未載惟醫學心悟言之証發於肺腎凡本質不足遇燥氣流行多食辛辣感觸而發初起如發熱鼻乾咳嗽等證鼻通者輕鼻塞者重聲音清亮氣息調勻易治音啞氣急難治近有無知輩過証於喉間妄刮其白並亂用刀針益傷其喉豈不謬哉治法總不外肺腎二經宜以養陰清肺為主養陰清肺湯此方極驗必須併服數劑始見功效切勿遲疑自誤

大生地二錢

麥冬二錢

元參一錢

丹皮分

生甘草伍

貝母分

薄荷伍

白藥分

不用引體虛加熟地 熱甚加連翹去白芍

燥甚加天冬茯苓

小便赤加木通 數日不大

便加元明粉

如有內熱及發熱切忌發表即照此方連服其熱自除 証重酌加分量藥味平淡用當通神

吹藥方 磁瓶收固切勿走氣

青蘘炭二錢

黃柏一錢

兜茶一錢

薄荷一錢

川貝母二錢

冰片五厘

風凰衣五分即初生小

之散內

右藥共研細末再加冰片細杵患處

喉間起白用藥切忌者如麻黃桑皮防風杏仁牛蒡山豆根黃芩射干花粉羌活荊芥皆大苦寒涼表散下降之藥切不可服最能誤病又凡喉症最不可發表而虛弱者尤不宜破此是臨證三思

乙丑年余家患喉症死者十人後得劉仙舟兄此方服之甚效因抄傳親友家皆驗不敢自秘敬刊濟世冀廣仙舟兄之德云

同治五年春月大興周敬一印送 丁卯冬月重刻

續刊喉證秘方 丁卯孟冬月周敬一又誌

丙寅春得劉仙舟錄傳養陰清肺湯諸方刊印行世救人頗效今復出原本見示書名重樓玉鑰係古歛鄒瀚樞扶氏所撰余喜仙舟公世之誠亟欲全刻廣傳惟集方甚多力所不及茲擇簡便者續刊十餘方以為救世之助使治方愈備疫氣全消誠所願也至刊布全書更所望於同志者與有力君子

紫正散

紫荊皮二錢

荊芥穗八分

北防風八分

北細辛四分去毛

地黃散

小生地二錢

京赤芍八分

蘇薄荷六分

牡丹皮八分

苦桔梗八分

生甘草六分

引加燈心二十

以上紫地二散每證合用勿煎用開水泡藥蒸服 如熱甚加連翹犀角頭痛鼻塞加開闔散即黃芩一錢煩渴加銀鎖匙即花粉八分潮熱加柴胡黃芩效嗽加麥冬知母小便瀦加木通大便秘加元明粉熱壅肺閉氣喘加麻黃五分先用水煎去沫再入藥同煎痰稠加貝母孕婦去丹皮加四物湯

辛烏散

一名角藥散

收入磁瓶勿走藥氣

赤芍稍一兩

草烏一兩

桔梗五錢

荊穗五錢

小生地五錢

赤小豆六錢

甘草五錢

紫胡五錢

連翹五錢

紫荊皮一兩

細辛五錢

皂角五錢

以上諸藥不經火炙日色內晒乾

燥共為細末臨用以冷水調含口內極為開風痰之聖藥如痰涎極盛加入燈心灰瓦用川烏尖乳鉢內磨濃汁調含連效凡項頸及口外紅腫用水調外敷立消或用荊芥煎水調藥頻洗洗後仍敷

捷妙丹 治雙單蛾神效

牙兒

打碎 絲瓜子二錢

新瓦文火炙乾為細末加冰片少許用時吹鼻中患左吹右患右吹左鼻中雙

患並吹取嚏數次即消

嚴氏赤磨散 專治一切喉痺纏喉單雙蛾又喉惡症吹之立吐痰涎取效如神只虛證喉癰瘡不治

真血竭五錢

巴豆七粒

明礬一兩

用新砂鍋煉至礬枯加梅冰片三分礬砂二錢

共研極細末收

固臨用時冷茶嗽口吹患處立效

雄黃解毒丸 治一切喉痺極危証

明雄黃一兩

川鬱金一兩

巴豆十四粒

共研細醋煮麪糊為丸綠豆大每服七粒清茶送下吐出痰

涎立效如至死者心頭猶熱搥口灌之下嚔可活

火刺仙丹 治一切喉痺纏喉命在頃刻急須製用能起死回生

用巴豆油塗紙上撰作條子於火上點着烟起即吹滅令病人張口急刺於喉間俄然吐出紫血即時氣足能

言並可立啖粥飲蓋咽喉一證最為危險頃刻腫閉水米難下雖用針刺吹藥恐一時難瀉毒熱惟用巴豆火

刺可救急危因熱則宣通故以火治之火氣熱處使巴豆油可到以火散結以巴油瀉邪熱以烟吐出痰涎此

誠一舉三善之技法也病輕可即愈矣證重亦可容再服諸藥

絳雪丹 治喉腫喉癰口舌生瘡

寒水石二錢

礬砂一錢

辰砂三錢

天梅片三分

兜茶三錢

共研極細末用少許放舌上津液

噉之或吹患處

金鎖匙 治喉痺纏喉痰壅如不閉

鐵硝五錢

礪砂五錢

片腦三分

雄黃二錢

白礪蠶一錢

共研極細收固臨用少許吹患處

真功丹 凡孕婦患喉證宜此

大梅片 一片

真熊膽 一錢

用特細蘆甘石 一錢用老活煎湯煎七次飛去脚晒乾

礪砂 一錢

牙硝 二分

研細吹患處 平即

硝牙

萬益丹 誤用刀致血流不止宜敷此

滴乳香 去油

真血竭 一兩

礪砂 一兩

沒藥 去油

研細用少許吹刀患處

附刻

孚佑帝君救喉痛方

陳皮

貝母

竹茹

木通

當歸

連翹

炙草

乳香

沒藥 各二錢

防風 錢

引燈心 三支

水煎

治纏喉風滴水不入奇方

雄黃

白礪

牙皂 去皮

藜蘆 去心各一兩

共研細末先令病人含水一口用藥少許吹鼻

內即將水吐出少時涎出立愈

黃爪霜 專治喉證奇效

鐵硝 八錢

白礪 二錢

將大黃爪取出納硝礪於內懸風處俟霜出刮下加水片少許研細用時吹患處

處立愈 吹藥時不可又服別藥

普濟散方

倭琉黃 五錢

上上猛桂心 三錢 母丁香 二錢

四十九製香附 二錢

當門子 一錢

以上各藥共研

極細末用磁瓶封藏 凡患吊脚痧者以此散一分五釐納入肚臍中外用暖臍膏藥封貼如証重逾時不效再

用單紙三四張鋪於膏藥面上以微火熨斗熨之或於膏藥面上鋪用食鹽加生薑一片以斷艾火之無不立愈

此藥峻猛斷不可吃孕婦忌用 道光初年浙中多患急証俗呼吊脚痧以此散治之立效今歲時疫相似用特刊傳咸豐辛亥仲秋覺因道人識

神妙經驗痧藥良方

茅山蒼木三兩米泔浸軟切片晒乾為末 麻黃三兩六錢去根節晒乾為末 明天麻三兩六錢切晒乾為末 甘草二兩四錢去微炒為末 錦紋大黃六兩切晒乾為末

公丁香六錢為末 真蟾酥九錢上好燒酒浸化 硃砂三兩六錢研細水飛為末 麝香三錢要上 雄黃三兩六錢研成末

右藥各研細末以好燒酒斤半和之丸如蘿蔔子大硃砂為衣候乾磁瓶收貯封固備用能治一切中暑中寒中風瘡瘍及各雜証每服九丸重者十三丸虛人孕婦忌用小兒輕用

展子明傳接骨方

用旱公牛角一個火燒乾一脛 榆樹皮白裏不拘數 楊樹葉不拘數 黃米麵不拘數 花椒七粒 共為細末以數年陳

醋熬成稀糊青布攤貼薄片纏住時刻聞骨內響聲不絕俟定即接如牛馬跌傷及樹木被風刮折亦能接上

神驗刀瘡藥方

生白附子六兩羌活五錢 生南星五錢 天麻子五錢 白芷五錢 防風五錢 共為細末過篩破

處敷上傷重者黃酒浸服五分重甚者再服五分青腫白酒調敷一切破爛乾敷亦愈其效如神

固齒神方

青鹽五錢 石膏五錢 補骨脂四錢 花椒一錢五分 白芷一錢五分 南薄荷二錢五分 旱蓮草二錢五分

防風二錢五分 細辛一錢五分 共為細末每早洗臉後擦牙用水頓嗽吐之治牙陳方甚多苦無大效昔有人四

十後病齒大牙已脫三個過德州盧南石相圖之弟傳此方用之動者復固齒病遂除即冬月食火鍋煎炒等

等牙縫裏出疔瘡用此末多擦一二次旋即消滅真第一效驗方也若於三四十歲即用之無間斷可保至老不脫永免牙患有此神方諸方可免矣

治痔瘡毒方

翻白草一兩 荷葉一兩 煎湯熏洗

治鼠瘡方

豆腐皮一錢 黃桓五錢 水銀五

人信二分

共為細末用香油調擦過六日起去藥再貼膏藥

開列於後

鼠瘡膏藥方

香油半勛 定粉二兩 頭髮四錢 黃丹四錢

先將油熬滾再下頭髮煎枯黑去渣離火入黃丹

再入定粉成膏用絹紙上攤貼患處十八日全愈

治豬羊癩癧時常跌倒不省人事竟成廢人二料除根奇效仙方

皂礬_{煨紅} 魚膠_{斷極妙} 鉛粉_{炒黃} 硃砂三錢

以上研極細末每早空心陳酒浸服三錢自愈經驗

千捷膏

鮮桃仁一兩 松香三兩 樟腦三錢

硃砂五分 先將桃仁搗碎入松香再搗後入樟腦硃砂同搗

成膏遇有大小火癩及初起紅腫疼痛麻癢之癩量其大小貼之一日一換輕者消化重者出頭去腐生新極為神效

解吞鴉片生烟毒神方 凡吞鴉片烟中毒者用礪砂五分以涼水調和灌下輕則一吐而愈重者則從大便瀉出

此方前從陝西傳來昨嘉興有中鴉片毒者照服已救數人真神方也祈流布或貼示為禱

同治十年十一月 雪門許瑤光識

哮喘奇方貼肺俞穴背脊中骨第三節風府門

川烏六錢 連翹八錢 當歸六錢 白芷八錢 木鱉子八錢 白芨六錢 官桂八錢

茯苓六錢 赤芍八錢 草烏六錢 白薇八錢 牙皂五錢 桑枝五錢 棗枝五錢

烏藥六錢 桃枝五錢 柳枝五錢 槐枝五錢 右藥同麻油三斤浸藥一宿熬焦去渣入飛黃丹

一斤如麥色急以桃柳棍二根攪至滴水成珠入乳香沒藥細末各四錢收膏攤貼三伏九九其病可以除根神效

仙傳百草霜丸神方 治一切吐血鼻血及七竅流血失血怪證遲者不治

百草霜三兩

陳墨二兩

薑黃一兩

桑葉二兩

三七一兩

連翹一兩

燈心炭一兩

各為細末糯米粥取汁為丸米如粟大每服一錢白溫水送下神效
腹瀉初起

陳茶二錢

燒核桃仁五個生薑三錢

紅糖五錢

水煎服食下即響響即下瀉紅柿核紙包水濕炭

火燒熟食四五個即止

又治腹瀉痢疾方

生熟車前子各一

生熟山查各一

共為細末用紅白糖紅白蜜滾水調服二錢如白痢用白糖蜜紅痢用

紅糖蜜若紅白痢紅白糖蜜均用若瀉之不出者多加蜜即效

午時茶方

茅朮十兩

陳皮十兩

柴胡十兩

連翹十兩

白芷十兩

川朴十五

枳實

查肉

羌活

防風

前胡

藿香

甘草各十

陳茶斤十

桔梗

麥芽

蘇葉各十

建麩十兩

川芎十兩

研細末拌勻宜五月五日午時

合糊成小塊每服三錢專治一切風寒感冒停食及不服水土腹瀉腹痛等證服時加葱薑少許煎熱服汗出即效

治瘧方

當歸一錢

陳皮二錢

單果一錢

知母一錢

川芎一錢

蒼朮一錢

半夏一錢

真烏梅五錢燒打碎

防風一錢

杜仲一錢

常山

甘草

檳榔

荊芥各一錢

共研末將藥放鍋內炒熟於瘧未發時用稀布包裏捆繫臍上臍內先以藥末三分填滿其發必輕再炒再捆無

有不效閉口瘧更效輕者一服重者兩服必愈老年人不肯服藥用此最效

萬應琥珀膏 專治一切癰疔結核瘡癩初起已破擦之生肌止痛并治刀傷出血及腐爛者擦之即可合口痛神

效無比

全當歸五錢

大黃四錢

上血竭四錢

川黃連四錢

小生地八錢

黃芩四錢

真琥珀四錢另研

生甘草四錢 大楓子肉四兩 黃柏四錢 林藜四錢 用好麻油一斤 將藥十味 煮枯油色紫紅 去渣入

琥珀末并黃蠟二兩 候化開 雜火用槐枝一根攪勻 冷定成膏 不可太老 埋入土內 退去火毒 一月取出 用時加
黃色三仙丹少許 調勻 隨時擦之 看瘡輕重 加之輕以少為妙 重稍多加 不可過多 金刃傷則不必加 三仙丹此
膏愈陳愈妙

化毒膏

歸尾六錢 鼈甲八錢 巴豆四錢 黃連四錢 三棱四錢 莪朮四錢 山甲二錢

指甲一錢 以上諸藥用麻油一斤半 淨丹半斤 熬膏

硼砂四錢 硃砂四錢 阿魏六錢 麝香一分 高麗參四錢 三七四錢 肉桂八錢

水蛭二錢 水蛭一味宜於黃梅時節 令婦人收取 堆乾研末 存留配 用若水蛭黃色不用 有一種色黑較細 猶大者便是 右藥共為細末 攪入膏藥內 用狗

皮攤貼 如無狗皮 貼時用皮硝 熬水棉花醃 擦患處 令透 拭乾 再切生薑片 搽擦 然後貼膏 忌食一切無鱗魚 麩

麥馬齒莧 黃瓜 生冷之物 如係血塊 另加臭蟲 四針 用香油浸透 搗爛 和入膏藥內 攤貼 無不內消

治癬方 雌黃為末 入輕粉和猪膏 擦之 又方豆腐乾 以麻油煎 取油塗之 又方皂荚 入醋煎 三日夜乾 為末

敷之 此方得效最速 而疼痛無比

又洗癬方

生地 陳皮 麥冬 赤苓各二 竹茹二錢 遠志一錢 柳枝十寸

甘草一錢 燈心一小 濃煎 頻洗

治牙疳 芫荽散

白芫荽梗炭 三錢 煨炭 兜茶二錢 紅棗炭一錢 五分 每棗一枚 剉開 大黃豆大 煨黃一塊 煨炭

人中白一錢 冰片二分 共研極細末 用瓶封固 收存 勿令走氣 每遇牙根爛腐 血肉自落 時時擦之 候滿

口涎水 用清水漱去 輕牙根疼痛 重連牙皆落 用此藥上之神效 無比 曾經效驗 因錄出傳

擦牙散

生大黃 熟大黃 生石膏 熟石膏各五錢 沒石子一對 青鹽一兩 共為極細末每早

擦之治一切蟲牙火牙久自有功效

治疥瘡神效方

硫黃一兩 輕粉三錢 先將硫磺入鍋內煉化候起烟將燃含冷水一口噴之再煉候起烟將燃再用水

如前噴之或三四次或五六次然後將輕粉放入攪勻放地上候冷即凝成塊研極細末加水片三分麝香半分用瓶蓋好搽一切疥瘡神效無比如畏痛用麻油調搽亦可不是真疥瘡萬不可用慎之慎之

倪涵初先生治瘧奇效三方

瘧之為患而人患之北人尤甚弱者患之強者尤甚雖不致遽傷大命然不治則發無已時治之不得其道則惡邪內伏正氣日虛久而久之遂不可藥倪油初先生所定三方甚為平易無奇絕不入常山草果等劑且不必分陽瘧陰瘧一日二日三日及非時瘧人無老幼病無久近此三方不用加減惟按次第服之無不應手而愈也

第一方

廣陳皮 陳半夏薑汁 白茯苓 威靈仙各一錢 蒼朮米泔水浸一日切片炒 紫厚朴薑汁

黃芩各八分 青皮 檳榔各六分 炙甘草三分 右咀片如法炮製加薑三片井水河水各一盞

煎九分饑時服其渣再煎服如頭痛加白芷一錢此方平胃消痰理氣除濕有疏導開導之功受病輕者二劑即愈勿再藥可也若三劑後病勢雖減而未全愈必用第二方少則三劑多則五劑而已

第二方

生首烏三錢 陳廣皮 白茯苓 柴胡 黃芩各八分 白朮炒 威靈仙各一錢

知母二錢 當歸一錢 鱉甲醋炙 炙甘草三分 右藥加薑三片井水河水各一盞煎八分加無

灰酒五分再煎一滾空心服二煎三煎并服此方妙在補瀉互用虛實得宜不用人參黃耆屏去常山草果平無奇却有神效即極弱之人癘極重之病十劑後立有起色定奏萬全所云加減一二即不靈應者即此方也

第三方

人參一錢 炙黃耆二錢 白木抄一 廣陳皮八分 炙甘草三分 柴胡六分 升麻四分

或加首烏二錢炒知母一錢或加青蒿子八分麥芽一錢 右藥加薑一片棗二枚水二盅煎八分半饑時服用

三五劑元氣充實永不發矣 方雖有三第二實為主方既不刻劑並不峻補功獨歸之其第三方專為有力者

及虛極者而設貧家只多服第二方可也

久瘧全消丸

威靈仙 蓮莖木醋炙 麥芽炒各 何首烏二兩 青蒿子五錢 全毛狗脊去毛炙

穿山甲水煎細片 黃丹各五 鱉甲酒炙 以上九味共為細末聽用 如小兒加黃雞肫皮

炙末五錢外用山藥粉一兩錫糖一兩 右加水一小碗為糊搗藥丸如菘豆大每半饑時薑湯送下二三錢

凡處暑後冬至前或間日或非時纏綿日久並治瘧母予嘗酌定此方服不半料遂全愈收功

倪涵初先生治痢奇效三方

痢為險惡之証生死所關不惟時醫治之失宜而古今治法千家多不得其道是以不能速收全效今立方何以為

奇不泥成法故奇也立論何以為妙不謬成說故妙也然其藥品又不外乎常用而已有識者切不可更改勿為庸

醫所誤遵而用之百試百效者也

初起煎方

川連去蘆 條黃芩 白芍 山查肉各一錢 陳枳殼去穢 厚朴去皮薑 檳榔

青皮去穢各 當歸五錢 甘草 地榆各五分 木香五分 紅花酒炒 桃仁去皮尖一

右咀片如法炮製用水二盞煎一盞空心服渣再煎服此方或紅或白裏急後重身熱腹痛者俱可服如單白者

去地榆桃仁加橘紅五分木香可用三分如帶滯濕甚者加大黃二錢用酒拌炒服一二劑仍除之若用一劑滯

濕已去不必又用大黃矣用大黃於年幼之人又不必拘用二錢也 此方用之三五日神效用之於旬日亦效

惟十日半月外則當加減矣方詳於左

加減煎方

川連酒炒六分生用四分條黃苓酒炒六分生用四分

白芍酒炒六分生用四分

山查肉一錢

橘紅

青皮

檳榔各四分

甘草炙三分生二分

當歸五分

地榆四分

桃仁粉六分

紅花三分

木香二分

右咀片如法炮製用水二盃煎一盃空心服渣再煎服如延之月餘覺脾胃弱而虛滑者法當補理其方於

左

補理煎方

川連酒炒

條黃苓酒炒

大白芍酒炒

橘紅六分

當歸五錢

人參

白朮土炒

炙甘草各五分

右咀片如法炮製用水煎空心服渣再煎服

以上三方如婦人有胎者去桃仁紅花檳榔

以上三方隨用輒效其有不效者必初時投參朮等補劑太早補塞邪氣在內久而正氣已虛邪氣益盛纏綿不已欲補而濕之則助邪欲清而疏之則愈滑遂至於不可救藥雖有奇方無如之何則初投溫補殺之也

微理妙論

古今治痢皆曰熱則清之寒則溫之初起熱甚則下之有表證則汗之小便赤濇則分利之以此五者舉世信用如規矩準繩之不可易余謂五者惟清熱一法無忌餘則犯四大忌不可用也今詳於後

一曰忌溫補

痢之為病由於濕熱蘊積膠滯於腸胃中而發宜清邪熱導滯氣行瘀血其病即去若用參朮等溫補之藥則熱愈盛氣愈滯而血亦凝久之正氣虛邪氣盛不可違矣此投溫補之禍為最烈也

一曰治大下

痢因邪熱膠滯腸胃而成與溝渠壅塞相似惟用磨刮疏通則愈若用承氣湯大下之譬如欲清壅塞之渠而注狂瀾之水壅塞必不可去無不岸崩堤塌矣治痢而大下之膠滯必不可去徒傷胃氣損元氣而已正氣傷損則邪氣不可除壯者尤可弱者危矣

一曰忌發汗

痢有頭疼目眩身發寒熱者此非外感乃內熱重蒸自內達外雖有表證實非表邪也若發汗則正氣既耗邪氣益

肆且風劑燥熱愈助熱邪表虛於外邪熾於內鮮不斃矣

一曰忌分利

利小便者治水瀉之良法也。以之治痢則大乖矣。痢因邪熱膠滯津液枯澀而成。若用五苓等劑分利其水則津液愈枯而澀滯愈甚。遂至纏綿不已。則分利之為害也。若清熱導滯則痢自愈而小便自清。又安用分利為哉。余於此證素畏其險惡。用心調治。經今三十餘年。百試百驗。既而身自患之。試驗益精。然後能破諸家之迷障。而為奇妙之方論。是用述其顛末。以拯斯人之苦疾。而悉登諸毒域也。山陰倪涵初并識。

附治痢奇效方

端午日用錦紋大黃數斤。切片貯砂器內。以無灰酒浸過頭三寸。每早置烈日內晒滿六十日。

如值陰雨或半日陰雨。以憲書圈註記。明必補足六十日。為度。曬足後。為細末。煉川蜜為丸。如菜豆大。如遇痢疾。有發熱惡寒者。先服表散藥一劑。停食者。先服化滯藥一二劑。兼証退後。即服此丸。三錢開水送下。得通利而愈。此方不拘紅白。噤口休息等痢。服之無不全愈。病久過二十餘日。虛弱者。用人參或三分或五分煎湯下。奇效。不能具述也。

附治一切腫毒及大小外證奇方

澤蘭葉一兩

白芨三錢

真黃明膠

三錢粉炒成珠

病在肚臍以上。加白芷一錢。病在肚臍以下。加川牛膝。

二錢。先將澤蘭等藥三味。用酒水各半。三滿盞同煎。至一盞。去渣。投黃明膠。再煎數沸。溫服。病重者。連服三四劑。此方得自藏經。曾用治發背。無能療者。及牙癰。癰危急等證。服之無不即愈。不可輕忽也。

治老人飲食噎塞不通。方經驗數人。凡由氣塞胃寒。以致食噎痰多。吐飯吐痰者。俱宜服。

新雞嗑子兩個。不去內物。外用濕紙數層。包裹泥封固。炭火煨一時。約內中焦熟。去泥紙。及不用同廣木香一錢。丁香一錢。真沉香一錢。四味共為細末。棗肉為丸。梧桐子大。噙化津嚥。下日三次。每服七丸。忌酒肉油膩等物。並須寬心順氣。淡嗜慾。薄滋味。靜養。則病自愈。

應驗如意散

專治男婦胃脫痛。應驗如神。

青皮

五靈脂

川棟子

山甲

八角茴香各二元胡索

良薑香油

沒藥去油

檳榔各一錢五分

木香

沉香各一錢

砂仁五分

以上共為粗末再將木鱉子一錢

分切片同粗末炒至焦色將木鱉子檢出不用將諸藥研極細末每服一錢引用大鹽一粒將藥同鹽先用滾水化開能飲酒者兌酒一小杯服之即愈如舊有此疾并可除根

人受四時不正之氣皆能致病輕者為感冒重者為傷寒或傳染為瘟疫或夏則中暑秋為瘧痢若初起之時用藥不當往往輕者致重重者致斃余竊憫焉因輯平日經驗簡便諸方並述辨證用藥之法使閱者明白易曉不致誤於歧途其亦濟世活人之一助云見前方

一傷寒初起其病發熱惡寒頭痛身痛遍體拘急六脈浮緊感胃界同治法亦無大異輕者用藿香正氣散重者用九味羌活湯

或敗毒散不過三貼即可全愈蓋世間真傷寒少而感冒病多辨證不真適用麻黃桂枝升麻等藥恐引病入陽明胃經必致胃火薰蒸胸硬便結發斑語謬矣適用黃連石膏等藥恐引病入陰經必致胃寒嘔吐腹疼便瀉手足逆冷矣適用大黃枳實等藥必致結胸旁流矣適用肉桂附子等藥必致邪熱騰熾矣不若此三方無論感冒

傷寒皆能治之萬無一失

藿香正氣散

藿香

紫蘇

大腹皮各一錢五分

白芷一錢五分

茯苓一錢五分

半夏一錢

桔梗八分

川厚朴一錢

甘草五分

引生薑三片中滿去白木傷食加神麩一錢

九味羌活湯

羌活

防風各一錢五分

白芷

川芎各一錢

細辛五分

蒼朮一錢五分

生地

黃芩各一錢

生甘草五分

引生薑三片葱白三寸有汗去蒼朮加白朮一錢胸滿去生地加枳殼一錢桔

梗一錢喘加杏仁一錢不出汗加蘇葉一錢

敗毒散

羌活

獨活

前胡

枳殼

柴胡

桔梗各一錢

薄荷八分

川芎

茯苓各一錢

甘草五分

引生薑三片葱白三寸口渴加黃芩一錢花粉一錢咳嗽加陳皮一錢半

夏一熱毒喉痛加山梔一錢牛蒡子一錢風熱上攻加荆芥一錢防風一錢蕪毒加全銀花二錢連翹一錢

一痘疫初起其証先憎寒而後發熱日後但熱而不憎寒矣惟寒壯熱初得之二三日其脈不浮不沉而數

大而晝夜俱熱日晡益甚頭痛身疼舌上胎如積粉布滿無隙則無胎起病在半表半裏之間起在初不可汗不

可下宜先服達原飲用三陽加法所感若輕一帖即愈矣如誤認為傷寒表證用麻黃桂枝等藥強發其汗徒傷

表氣熱亦不減用大黃枳實等藥先為下之徒傷胃氣其渴必甚如服達原飲後邪從內陷者舌根先黃漸至中

央宜三消飲若脈洪數大渴大汗通身熱宜白虎湯服不大口不渴若舌上純黃色胎宜承氣湯上焦病滿者小

者大承氣無病滿而傷寒有六經之證惟瘟疫有三陽而無三陰俱是大熱之証不可輕用熱藥

有乘熱者調胃承氣傷寒有六經之證惟瘟疫有三陽而無三陰俱是大熱之証不可輕用熱藥

達原飲

川厚朴一錢 草果五分 知母一錢 黃芩一錢 檳榔二錢 甘草五分 白芍一錢

引生薑三片午後服若脇痛耳聾嘔吐口苦者在少陽加柴胡一錢腰背項痛在太陽加羌活一錢目痛眉稜骨痛鼻

乾不眠在陽明加乾薑一錢

白虎湯

石膏一兩 知母五錢 甘草五錢 炒米一撮 薑三片

小承氣湯

石膏一兩 知母五錢 甘草五錢 炒米一撮 薑三片

大黃五錢 厚朴 枳實各一

三消飲 即達原飲加柴胡羌活葛根大黃

大承氣湯 即小承氣湯加芒硝

調胃承氣湯 即大承氣加甘草去枳實厚朴

一中暑初起輕則脈虛身熱口燥咽乾或吐或瀉重則卒然暈倒面垢冷汗喘滿口渴狀類中風此病切不可飲冷

或以皂角燒灰同甘草水調服此證有因靜而得之謂居深室謂之中暑其證頭痛惡寒大熱無汗宜服香薷飲動而得

之謂中行人及調謂之中熱其證頭痛大熱大渴多汗宜白虎湯若頭不大痛身不大熱僅心煩口渴小便不利

上海華英書局印

大便泄瀉者宜當苓益元湯難冷不可輕用熱藥若誤投之禍不在晚若一時無藥辨證不明不如多服六一散為妙

香薷飲

川厚朴薑汁炒 白扁豆二錢 陳香薷五分 川黃連薑汁炒 無引水煎冷服熱服作瀉手足搦逆加羌活
錢小便不利加滑石三錢 吐加藿香錢 嘔加薑汁匙 渴加花粉錢 瀉加白朮錢 下血加黑梔錢 鼻血加白茅根錢 轉筋加木瓜錢 煩燥加辰砂五分

白虎湯見上

當苓益元湯神香薷飲分兩減半加白朮茯苓梅苓澤瀉滑石各一錢辰砂甘草各五分煎服

六一散 滑石六錢 生草一錢 俱研末涼水沖服

擦牙止痛散 止蟲牙痛神效無比 牙硝三錢 硼砂三錢 明雄黃二錢 冰片一分 麝香五厘

共為極細末用瓶封固勿令走氣每用少許擦牙吐出涎水嗽盡痛止

治耳內出膿血水腫痛神效方

人手指甲殼二錢 煨火 上冰片二分 共研極細末用瓶封固勿令走氣遇証用藥吹數次自愈不論

左右輕重皆能取效

治腫瘡神效方

蘆甘石一兩 飛淨 用甘草水飛八九次或加水片三錢 聖院僧三錢 用豬油調攤油紙上貼瘡外用布條纏緊愈緊愈妙切勿開看十餘日後平復如常矣魯仲試親驗所傳

金仙骨方

生薑蔥白芷白蒜白各一斤白鳳仙花莖子葉根全株槐枝柳枝桑枝桃枝側柏枝各半斤薤菖子白芥子山

查子蘇子艾葉花椒萹蒲各二兩陳香櫟一兩小磨麻油五斤熬黃丹炒三十兩收白朮四兩大黃蒼朮二兩

生香附醋香附生靈脂醋靈脂生延胡醋延胡川芎白芍當歸柴胡薄荷羌活獨活防風白芷杏仁神麩麥芽

陳皮半夏大貝母肺南星前胡鬱金烏藥蒲黃炒赤苓澤瀉條芩黑山梔川烏草烏桔梗甘草枳殼枳實薑仁
大戟皂角官桂檳榔黃柏青皮木香靈仙砂仁川棟赤芍桃仁紅花沒藥乳香三棱莪朮煨廣蒼根良薑小茴
草果仁連翹殭蠶全蝎木鱉防己山甲木通車前子明雄明礬降香益智仁吳萸黃連細辛茵陳草麻仁厚朴
葛根生巴仁甘遂羌花黑白丑陳壁土輕粉等應各一兩肉桂丁香各二兩小磨麻油十斤熬炒黃丹收飛滑
石六兩牛膠四兩攪與前膏合併如油少酌加 治證詳後 開鬱消積和中諸方而推廣之能祛風寒化濕
熱并行氣血痰食凡效嗽哮喘惡心嘈雜噎氣吞酸嘔吐噎膈痞塊積聚腫脹黃疸瘧疾水瀉痢疾淋症汕氣
脚氣一切利肺平肝調胃健脾皆妙並治心腹脇肋諸痛周身走注氣痛乳塊腹癰腫毒初起皆可消散尋常
飲食不甘以此寬胸進餐勝服神效檳榔之屬治証甚多不能盡述老年小兒俱可貼婦人兼有解鬱調經之
功跌打損傷行瘀止痛亦效但此方具理氣理血升降之用孕婦忌貼

紫砂散統治一切喉痛單雙蛾子牙風牙疳等証

明月石一兩 淨牙硝五錢 紫荊皮 飛硃砂 大梅片各五分 當門子一分棟 共為細末磁

瓶收固勿令洩氣過証吹之神效 孕婦忌用

純陽青蛾丹專治雙單乳蛾喉閉等証立刻開關百試百效直救急之神方也

青魚膽不拘多少以生石膏和勻須乾濕得宜陰乾為末每一兩加上梅片一錢共研勻磁瓶收固過證吹之

立即開關實能回生之妙也陳者更妙勿洩藥氣勿輕視之

治喉閉神驗方

大蜘蛛一令 要活捉放銀罐內用白礬末八錢置罐內蜘蛛上另蓋小銀罐於上火煨存性取起稍冷除去

蜘蛛不要將枯褻細研為末收之如遇此證用礬吹入喉內功效實屬仙方效驗非常勿輕視也 韓協茂經

驗傳

回天再造丸

真斷蛇去皮骨並頭尾各三寸 兩頭尖條半條出在烏魯木非此真也如不得真

真山羊血五錢

北細辛 龜板醋炒 烏藥各一兩 黃耆二兩 母丁香去油 乳香各一兩 麻黃二兩

甘草二兩 青皮一兩 熟地二兩 犀角八錢 沒藥去油 赤芍 羌活各一兩

白芷二兩 虎脰骨一對 血竭八錢 全蝎去毒 防風 天麻各二兩 熟附子一兩

當歸二兩 骨碎補去皮 香附各一兩 元參酒炒 首烏製 川大黃各二兩 威靈仙二兩

葛根二兩 沉香一兩 白蔻仁 藿香各二兩 冬白木一兩 紅麴八錢 川草薢二兩

西牛黃二錢 草薹仁二兩 川連二兩 茯苓二兩 薑黃二兩 強靈一兩 松香五錢

川芎二兩 廣三七一兩 桑寄生一兩 冰片二錢 當門麝五錢 辰砂飛淨 桂心二兩

天竺黃一兩 地龍五錢 穿山甲二兩 右藥必須道地炮製亦必須如法共研成細末

擇天月二德日於淨室之內煉蜜和合搗五千杵為丸每丸重一錢全箔為衣外用蠟殼包裹 專治真中類中

痰迷厥氣左癱右瘓半身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足麻木筋骨拘攣步履艱難及小兒急慢驚風諸般危急

之症服之立見神效真有起死回生之功故名再造勿視為泛泛也 凡遇此証者旁人切勿驚惶先將開闔散

少許藥店或有靈寶如意丹七八粒研細吹入鼻中如能得嚏証輕不能嚏者證重倘牙關緊閉不可以銅鐵器撬

開恐傷牙及唇舌並恐驚其心用烏梅一兩個分開塞左右腮擦之自然開矣 如左邊疼痛不能運動用四物

湯藥舖三錢生地半川芎八錢 如右邊疼痛不能運動用四君子湯藥參三錢白朮一錢茯苓 如兩面

疼痛則兩方並用其桑枝只用三錢俱空心服此藥後神氣清爽漸思飲食間有一二處屈伸不利此乃熱

痰留於關節須用稀蒼草二錢防風一錢歸身一錢白芥子一錢紅花八分煎湯以新白布搥熱藥水搥一日

兩三次便能運動如常凡中風口開為心絕手撒為脾絕眼合為肝絕遺尿為腎絕鼻鼾為肺絕吐沫直視鬢直

頭搖面赤如妝汗綴如珠者不治或只見一二証尚可得生者急以此丸如法服之 小兒驚風本屬易見抱龍

丸平安如意散均可治之此丸力大勢猛未及雙週歲者筋柔骨軟究非所宜非十分險重者勿服孕婦忌服

記再造丸真方 古方再造丸為專治風痰偏痺之良劑流傳既久用多不驗或轉以致害識者疑之聞昔有醫士擅真方皆其藥奇

效獲厚利思祕之而以偽方應求者於真方內減去紅麴廣三七真山羊血三味而加入人參膽星紅花廣木香西
琥珀水安息六味人見其人參也輒色然喜追服之疾弗愈又反咎疾不與方宜於方固無尤也而其方竟傳後醫
士物故乏嗣或得之破篋中而真方乃稍稍出古人謂醫者意也歧黃復生其心若理與人同治水者不導水而先
修其防不潰決焉不止禦盜者不驅盜而先塞其竇不劫奪焉不止是方入人參即所謂修防塞竇也欲以治疾不
殺人不止余竊憂之求之三十年而始獲真方積數年而始獲全藥以起疾疾立瘳又行之十餘年而百不爽一至
是而益信古人立方之妙而復嘆偽方之流禍匪淺鮮也余自慚不能理陰陽噓枯生春登斯民於仁壽又未讀三
世之書如越人輩立起膏肓徒區區抱一方愈一疾所濟幾何所益幾何雖然宇宙大矣人之好善誰不如我果傳
其方於人人俾人人得轉傳其方以一人濟天下之人誠不如天下之人各濟天下之人況傳之日久偽方以燬真
方愈明從此千百世下有方之利無方之害也余之志也余之幸也爰書其梗概而錄其方於左咸豐十年庚申季
夏延川李宗沅記張早伯大令經驗傳

急痧應靈散

霍亂一證皆由寒邪鬱結氣閉不通因而吐瀉交作後至力之陰虛血液枯涸則筋脈攣急手足拘牽即俗名吊脚
痧也此證朝發夕死夕發朝亡無論藥力不及即重猛烈之劑而熱劑劫陰致於不救此散藥雖峻猛而納於劑中
自能溫通臟腑不致傷陰乃古名醫所傳試無不驗識者珍之治痢証能溫通減輕治陰症亦見效但須善其後耳
上猛桂心八錢母丁香二錢 倭硫黃五錢 生香附八錢 當門子四錢 右藥共研極細末每次二三分
納入肚臍中用膏藥封貼不論何症立即止痛但藥性猛烈斷不可婦忌用土硫黃不可用恐妨發腫
戊子夏旌德呂首知太守過滬出示此方並云光緒三年秋初余由蘇回揚忽患嘔口痢日數十遍腹痛不止至起
河而益劇醫士王醉亭持此藥代治登時止痛止吐瀉王醫謂余曰此方功大速效治痢之急不足盡其妙今瘡痍
痧四肢發冷用藥外以薑艾炙臍速效

急救奇痧方卷終

急救經驗良方

自序

霍亂急証也霍亂而轉筋則証之尤急者也然內經發其論先哲著其方矣奈往往有惑於吊腳痧之名而駭為奇特之病目眩心疑妄施治療抑何陋哉夫吊腳痧俗稱也以其上吐下痢之後筋轉於腓而筋掣與呼乾霍亂為絞腸痧同其比喻耳有指鹿為馬而好為大言以欺人者開口傷寒論動手四逆湯函莽滅裂似是而非更可歎矣若傷寒論乃金科玉律之書不得草草論過者觀其論霍亂首以熱多寒多分治是霍亂原有陰陽之殊也但五苓散外何竟無一言以及熱証之治豈聖人垂訓亦爾偏疎蓋由書傳兵火之餘難免遺亡之憾因此識彼在學者之自得也矧四逆湯條於既吐且痢之下緊接曰小便復利重申曰下利清穀是何如其叮咛而瞻顧耶苟不識此而徑敢妄援其例以誤人者不得藉口聖人而自卸其罪也且是証也每發於夏秋之間甚則流行似疫閭閻皆然謂非暑濕熱三氣之所釀抑何至於此極乎其間亦有陰寒之證者皆是安逸之人有自取之道不可因此而概彼也故雄謂霍亂之屬熱者主病之常也眾之所同也霍亂之屬寒者他氣之逆也人之所獨也憫世人之惑於俗証於古而未明夫常變之道也因述其大畧參以管窺而質之大方云爾

道光戊戌春三月上游武林王士雄孟武書於天台道中

武林王孟英先生抱個僕之才精軒岐之學年未冠游長山即以良醫聞迄今十餘年來車轍千里計指下所生全蓋不知若干人矣然視疾之外足不輟出戶手未嘗釋卷此其好學深思識有人所不能及者故能洞徹病情而投劑多效也如近行時疫俗有稱為吊腳痧一証古書未載舉世謂為奇病紛紛影射天札實多賴先生大聲疾呼曰此即霍亂轉筋之候也嗚呼先生其先覺者乎一言喝破堪回大地之春乃猶慮沉迷者之未盡覺也慨然作霍亂論一書鑄古銘今闢經斥異其有功於世人所共知矣至先生之為人尤世之所罕觀恂恂然不趨乎時不戾乎時望之可畏即之可親凡從而游者皆欽愛不忍離舍余得與合併兩數月而先生遽而言歸再圖把臂其在何時悵然久之因索其將鐫之稿一讀而叙此數言以致送別之依依即世之得讀是書亦可因此而想見其為人道光十有八年夏五月澱水諸葛令竹泉氏題於環山之挹翠軒

一是書以內經傷寒論為宗旨義有未備者采守真風遠等書以補之至一切偏談激論概不泛引以滋眩惑
一吊脚痧即霍亂之劇而轉筋者原非另有一証也然初立此名不過因其病狀而呼之孰知流行既盛互相傳訛
遂失其本來之真而以為奇異之病夫好立名目惑人聽聞他事且不可况醫道有關性命哉伊誰生其屬階天
枉不可勝數今取靈素傷寒全匱之文而發明之采昔賢論說治案以辨證之名曰霍亂論蓋欲世人之豁然心
目也

一乾霍亂俗呼絞腸痧由來久矣第古書皆無專條茲采郭氏論及張氏說以廣之然古人未聞有惑於絞腸痧之
名而失乾霍亂之治者奈今人一聞吊脚之說遂茫然無措而不知其即是轉筋霍亂何古今人相去之大遠耶
可慨也已

一采古案所以明其治之有據也綴以拙註所以廣其案之有法也附錄俚案所以實其法之有徵也或有未善就
正宗工

一霍亂雖非小證然偶合古法竟可不藥如飲水單方刻刻之類皆是集中備載不遺庶僻環征遂咸得按書救危
及其藥也允非粗工可辨故所列古方特不註分即求復丹等既善後諸方並略而不錄其醫者求其奧而悟且
微未可執一定之成方以應無窮之活病也

霍亂論目錄

上卷

諸葛序

自序

例言

總義

發明內經二條

發明傷寒論二條

熱證治例

發明內經二條

發明傷寒論二條

引釋原病式一條

引釋治暑全書一條

發明金匱書一條

引釋痧脹玉衡一條

寒証治例

發明內經一條

發明傷寒論四條

附傷寒少陰吐瀉二條

下卷

引釋古案九則

附錄俚業十則

列方

跋

總義

素問六元正紀大論云太陰所至為中滿霍亂吐下太陰濕土之氣內應於脾中滿霍亂吐下皆中焦濕邪為病第土無定氣分寄於四季又惟季夏為獨旺蓋大暑至秋分六十日是太陰司令恰與君相二火合化喻氏以三氣同推允為卓見故太陰所至亦不必拘定司天在泉而論也如霍亂一病每發於夏秋之間者正以濕土司氣而從熱化耳若其中陽素餘本已土不勝濕而復襲涼飲冷則濕從寒化而成霍亂者亦有之然熱化者天運之自然寒化者他氣之所逆知常知變庶可以治霍亂焉

靈樞經脈篇云足太陰厥氣上逆則霍亂 足太陰脾土臟也其應在濕其性喜燥鎮中樞而主升清降濁之司惟濕太盛而滯其升降之機則濁反厥逆於上清反抑陷於下而為霍亂雖有熱化寒化之分必以治中焦之濕為要領也

傷寒論云問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂 此設為問答以明霍亂之病謂邪在上者多嘔邪在下者多利邪在中焦上逆而為嘔吐復下注而利者則為霍亂霍亂者揮霍悶亂成於頃刻變動不安之謂也若上不能納下不能禁之久病但名吐利不得謂之霍亂也

又云霍亂頭疼發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之 霍亂該吐下而言頭痛發熱身疼痛則霍亂之表證也而有寒熱之分者以中焦土位乃陰陽之交而無一定之性從陰化則為寒每因寒涼而病始發冬月多有之從陽化則為熱因暑熱而病始發夏秋多有之然因寒者口必不渴稍渴者病必屬於熱仲景又云下利欲飲水者以有熱故也故寒熱二證即在此辨五苓散去水以泄熱理中丸填土以祛寒 推此例分列熱証寒証於左冀醫者判別陰陽庶不倒行逆施而蹈絕人長命之戒

熱證

素問六元正紀大論云土鬱之發為嘔吐霍亂 諸鬱之發必從熱化土鬱者中焦濕盛而升降之機乃窒其發也

每因吸受暑穢或飲食停滯遂致清濁相干亂於腸胃而為上吐下瀉治法如平胃散能宣土營而分陰陽連朴飲能祛暑穢而行食滯若厥傷飽食而脫脈脈滑或脈來濡數模糊胸口按之則痛者雖吐猶當以益湯擇吐吐盡其食然後以黃芩加半夏湯致和湯之類調之

又云不達熱則熱至熱至則身熱吐下霍亂 此明指霍亂有因熱而成者奈病源三因等書謂霍亂無不本之風冷遂致薛立齋張介賓輩專主於寒印定後人眼目凡患熱霍亂者皆為此數公等設之矣且不達熱三字亦非但以藥食為言如勞役於長途田野之間則暑邪自外而入矣宜白虎湯六一散之類甘寒以清之或安享乎醇酒膏粱之奉則濕熱自內而生矣宜梔鼓湯黃芩加半夏湯連朴飲之類苦辛以泄之其有著入傷元白虎湯可以加參氣虛拾暑用參朮必佐清邪昔賢成法自可比例而施奈昧者妄謂勞傷之病宜補膏粱之體必虛不容其常侈談其變信手溫熱輒動殘生良由讀書不明理反為書所蔽欺已欺人彼自不覺耳

傷寒論云問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復更發熱也 霍亂之病雖由內蘊濕熱而然但既有發熱頭痛身疼惡寒之表証則治法必當兼理其表此仰聖主五苓散之意也然表証又當分別如吸受風暑之邪巧廉煩燥而垢齒燥者宜平胃去木加梔鼓竹葉薄荷木瓜扁豆之類惟感胃風涼之邪者宜五苓散若兼冷食停滯而寒熱似瘧者宜十味香薷飲加減或六和湯之類若挾痰飲而兼眩暈者霍香正氣散加減蓋內蘊之邪每因外觸之氣而發也亦有暑暍直侵脾胃與內邪相協為虐逆裏氣和而吐利止則邪復還之表而為發熱者駕輕湯王之寒霍亂後表不解者有仰聖之桂枝法在

劉守真曰三焦為水穀傳化之道路熱氣甚則傳化失常而吐利霍亂火性燥動故也 此守真釋內經吐下霍亂屬熱之文也按嘉言云內經病機十九條叙熱病獨多賴河間逐病分詳明晰所以後世宗之故原病式不可不讀也夫以著陰病論之喻氏猶且折服如是其斷非一偏之見可知矣故徐洵溼有寒霍亂百不得一之說然不可謂竟無也間亦有焉要在臨証深加詳審耳乃薛立齋之流未窺至理故以寒多立論豈非甘獲罪於先賢矣

胎殃於後世也 張鳳達曰暑氣入腹惡心腹痛上吐下瀉瀉如水注 春分以後秋分以前少陽相火少陰君火太陰濕土三氣合

行其政故天之熱氣下地之濕氣上人在氣文之中受其蒸濕之氣由口鼻入而投其中遂致升降失司清濁不分所瀉者皆五臟之津液急宜止之然止非通因塞用之謂也濕甚者胃苓湯分利陰陽暑亦自去熱甚者桂苓甘露飲清其暑火濕亦潛消若火甚之體內本無濕而但吸受者邪者白虎湯之類宜之蓋臟性有陰陽之別陰虛者火旺雖病發之時適犯生冷而橘朴等僅宜暫用陽虛者濕勝雖寒潤之品非其所宜如胃苓湯已為合法縱或體氣極弱亦不過補氣清邪並用若因其素衷之虛而忘其現病之著進以丁附薑桂之劑真殺人而不轉眩矣且傷暑霍亂有身熱煩渴氣粗喘悶而兼厥逆躁擾者慎勿認作陰証但察其小便必黃赤舌苔必粘膩或白厚宜然照湯澄冷服一劑即現熱象此時若投薑附約轉見渾身清紫而死矣甚有手足厥冷少氣唇面爪甲皆青腹痛自汗六脈俱伏而察其吐出酸穢瀉出臭惡便溺黃赤者是熱伏厥陰也熱極似陰急作地漿水煎竹葉石膏湯服之又有吐瀉後身冷如冰脈沉欲絕湯藥不下或發噦亦是熱伏於內醫不能察投藥稍溫愈服愈吐驗其口渴以涼水與之即止後以駕輕湯投之脈漸出者生然暑之為病傷之驟者則發之暴傷之漸者則發之緩故九月時候猶多伏暑霍亂証醫者不可不知

全匱云轉筋之為病其人臂腳直脈上下行微弦經云諸暴強直皆屬於風也轉筋入腹者脾土虛而肝木乘之也雖生風則為轉筋其人臂腳直脈上下行微弦經云諸暴強直皆屬於風也轉筋入腹者脾土虛而肝木乘之也雖為木畜其矢微寒而能祛風濕以利脾氣故取以治是病焉雄按詳一說以轉筋與燥燥於筋則掣癭而痛火主燔灼躁動故也或以為寒客於筋者誤也蓋寒主收引然止為厥逆禁固屈伸不利安得為轉也所謂轉者動也陽動陰靜熱証明矣夫轉筋者多由熱甚霍亂吐利所致以脾胃土衰則肝木自盛而熱燥於筋故轉筋也夫發渴則為熱凡霍亂轉筋而不渴者未之有也張路玉曰嘔吐泄瀉者濕土之變也轉筋者風木之變也濕土為風木所剋則為霍亂轉筋平胃散加木瓜主之有一毫口渴即是伏熱種種燥熱藥誤服即死雖五苓散之桂亦宜酌用雄按張君此言可謂先獲我心矣蓋仲景雖立熱多雖飲水者五苓散主之之法然上文有頭痛惡寒之表証所以仍取兩解之義是桂枝原為兼有風寒者而設倘雖兼表証而非風寒之邪或本無表証而內熱甚者豈可拘泥成法不知變通而徒藉聖人為口實哉凡霍亂轉筋脈必蕪弦正以木

旺而侮其所勝也濕甚者平胃散加木瓜可矣火盛者木瓜湯送左金丸為宜雄又因雞矢白散之意而立雞矢湯一方屢收奇績方案附後

郭右陶曰先吐瀉而心腹絞痛者從穢氣而發者多先心腹絞痛而吐瀉者從暑氣而發者多然吐瀉之霍亂乃暑穢傷人氣分宜用油鹽刮其皮膚則痧不內攻若心胸脹悶腹中絞痛或如板硬或如繩轉或如筋吊或如錐刺刀割雖痛極而不吐瀉者名乾霍亂乃邪已入榮宜以針刺出血則毒有所泄然後再審其因而藥之若痧脹已極難於刮刺者又必先以藥救醒乃可以回生明此三法庶可十全 張路玉曰脾胃喜香燥而惡臭濕若素多濕滯而犯臭氣則正氣鬱遏腹痛乃作或上連頭額俱痛或下連腰腿俱痛有痛死不知人事少聞復蘇者有腹痛不時上攻水漿不入數日不己者甚至欲吐不吐欲瀉不瀉或四肢厥逆面青脈伏或遍體壯熱面紫脈堅但與生黃豆嚼之覺香甜者是臭毒也急以燒鹽揮吐或以童便製香附四五錢為末停湯頓服最妙舉其有用水到肩背及臂者有以苧麻水濕刮之者有以磁盤油潤刮之者有以磁鋒針刺委中出血者總欲使腠理開通之心耳其脈多伏或細小紫滯或堅勁搏指中帶促結皆陰逆陽伏之象不可誤認陰寒而投熱藥雖砂仁之辛溫香竅亦不可輕用若見面青唇黑脈紫搏指厥逆喘促多不可救也又有感惡毒臭氣之番痧証卒然昏倒腹痛面色黑脈不呼不叫如不急治兩三時即斃有微發寒熱腹痛麻昏嘔惡神昏者或濺灑汗出或隱隱發斑此毒邪燄發於表也有發即瀉利厥逆腹脹無脈者此毒邪內伏也所患最暴多有不及見斑而死者大抵與霍亂相似初覺即以收麥焙燥去殼取末三錢溫湯調服重者少頃再服即安蓋收麥能健腸胃滯穢降氣寬胸而治濁滯為痧毒之專藥其毒甚而里者急投委中穴去黑血以泄毒邪蓋發之病勿慮其虛非此急奪束手待斃倘無收麥或服之不應即宜理氣為先如香蘇散加薄荷荊芥辛涼透表次則辟邪為要梔子豉湯加牛蒡生甘草鮮毒安中表熱勢其清熱為急黃芩湯加連翹木通分利陰陽斑點深赤即用芩蔚湯下其血分之毒如見煩擾腹脹脈來數疾急投涼膈散如局方以竹葉易生薑則毒從下奪熱劇神昏雖合三黃多不可救煩渴引飲遺尿逆清陽明白虎湯加葱豉使毒從表化以上諸法在未經誤藥庶可挽回一二曾見一商初到吳會暢飲酣歌席間宴時不安索生薑湯一吸而逝又有朔客到楓覓混澡浴忽然眩暈嘔逆到舟即斃且有誤認傷寒而與發散固

身嫩紫如雲而死者亦有誤認麻疹而與櫻柳櫻桃核湯咽痛失音而死者蓋初起即昏瞶不省脈多沉匿不顯或渾渾不清故辨治最難也 王晉三曰痧者寒熱之濕氣皆可以為患或四時寒濕凝滯於脈絡或夏月濕熱鬱遏於經隧或鼻聞臭氣而阻逆經氣或內因停積而壅塞府氣則胃脘氣逆皆能脹滿作痛甚至昏憤欲死西北人以楊柳枝蘸熱水鞭其腹謂之打寒痧東南人以油盆或油線刮其胸背手足內脣謂之刮痧以益鋒及扁針刺舌下指尖及曲池委中出血謂之錮痧更服玉樞丹以治其內是皆內外達竅以泄其氣則氣血得以循度而行其脈即已實即霍亂耳非另有痧邪也 按方書從無痧証之名惟乾霍亂有俗呼絞腸痧者是世俗之有痧殆不知起於何時也至醫說始載葉氏用蠶退紙治痧之法而江氏瑩誤為解你証雖為杭蕘浦所譏然亦可見從前痧証不多故古人皆略而不詳也迨 國初時其病漸甚自北而南所以又有滿洲病與番痧之名右陶因龔雲林青筋之說而著痧脈玉衡一書推原極變其說甚辨而痧之証治乃俾路玉復分臭毒番痧為二者蓋謂惡氣更毒於穢氣也晉三又辨痧即外邪驟入阻塞其正氣流行之道之謂而痧之病義益明至情志多鬱之人稍犯涼熱即能成痧且不時舉發亦由氣血失其宣暢也郭氏雖有截痧方而用藥殊乖江氏以香附苓梔撫芎為劑最為合法若乾霍亂之治雖以探吐刮背為妙然有不因痰濕飲食之滯但為暑暍之氣擾亂於中者又當以新汲水地漿等治之其平常痧證及種種不同之痧與霍亂相殊者玉衡書具在茲不多贅

寒證

素問氣交變大論云歲土不及氏病飧泄霍亂 歲土不及則脾胃素虛之人因天運而更見其虛中陽既虛寒濕自盛以致朝食莫瀉而為飧泄甚加嘔吐而為霍亂觀其與飧泄並稱則知利者必是積穀而非臭穢吐者亦必澄澈而非酸濁小便之利口之不渴又從而可必矣如此纔是寒濕霍亂可以理中湯之類治之故讀書須以意逆其理自然觸處洞然無往而不貫矣且寒霍亂多見於安逸之人以其深居靜處陽氣不伸加以坐卧風涼起居任意水瓜果恣食為常雖在盛夏之時原不可謂之暑病王安道論之詳矣輕則霍香正氣散或平胃加木香生薑半夏藿香之類濕甚而四肢重者骨節煩疼者胃苓湯加木香藿香大腹皮之類七情鬱結寒食停滯者七香飲頭疼惡寒無汗者以香薷飲先解其表隨以大順散等調其裏如果脈弱陽虛腹痛喜得溫按瀉出不臭

者來復丹若吐瀉不止元氣耗散或水粒不入或口渴喜冷而不多飲或惡寒戰慄手足逆冷或煩熱發燥揭去衣被但察其瀉出不臭者乃內虛陰盛格陽宜理中湯甚則四逆湯加食鹽少許更有暴瀉如水冷汗四逆脈弱不能言者急進漿水散救之並宜冷服然此輩實由避暑而反為寒傷致病若誤投清暑之劑而更助其陰則頃刻亡陽莫挽矣前人有治此病而愈者尚未確識其為寒也遂謂夏月暑病通宜溫熱噫自己錯認面目而欲傳信後人何異癡人說夢耶

傷寒論云吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥逆者四逆湯主之 此陽虛之體寒邪得以直入而為霍亂也發熱惡寒者身雖熱而惡寒身熱為格陽之假象惡寒為虛冷之真諦也四肢拘急手足厥逆者陽氣衰少不柔於筋不溫於四末也首重汗出者為陽有外亡之象故經用四逆湯祛其既入之寒而挽其將去之陽若止見厥逆惡寒四肢拘急脈來沉細弦緊面如塵土瀉出不臭雖屬陰寒而無汗出之候者但宜冷香飲子治之寒主收引故四肢拘急乃筋強不能屈伸之謂與熱證之轉筋迥別臨診極宜分辨苟或顛倒誤施禍成反掌

又云既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之 此亦虛冷霍亂之候四肢拘急手足厥逆虛冷之著於外也下利清穀脈微欲絕虛冷之著於內也虛冷甚於內則反逼其陽於外矣故其外候每多假熱之象或煩躁去衣而欲坐地或面赤喜冷而不欲嚥或脈大虛弦而不任按是皆元氣耗散虛陽失守甚加喘噦最為危險惟四逆湯可以祛內勝之陰而復外散之陽但小便復利下利清穀八字皆最著眼靈胎所謂一證不具即當細審也倘熱霍亂因暑邪深入而滯其經隨顯脈細肢寒之假象者必有溺赤便臭之真諦臨證慎毋忽焉

又云吐下已斷汗出而厥四肢拘急脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯主之 尤在涇曰吐下已止陽氣當復陰邪已解乃汗出而厥四肢拘急而又脈微欲絕則陰無退散之期陽有散亡之象於法為較危矣故於四逆加乾薑一倍以救欲絕之陽而又慮溫熱之過反為陰氣所拒而不入故加豬胆汁之苦寒以為嚮導之用即內經或

者從之之意也 又云吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之 吐利止裏已和也身痛不休者表未解也故須

桂枝和解其外所謂表病裏和汗之則愈也但此為寒霍亂之兼有風寒表邪者而言熱霍亂後之表不解者不得妄引此例 雖擬駕輕湯最為合治然其意亦不敢出仲聖之範圍也詳其一日消息再曰小和之者蓋以吐利之餘裏氣已傷故必消息其可汗而汗之亦不可大汗而可小和之也况彼熱霍亂之後津液尤虛其可妄施汗法乎此確之所以但以輕清為制也

又云少陰病吐利手足厥冷煩燥欲死者吳茱萸湯主之 少陰病吐利煩燥四逆者死 寒中少陰吐利交作陰盛邪極而陽氣不勝也然先厥冷而後煩燥猶有陽欲復而來爭之兆故以吳茱萸溫裏散寒人參大棗益虛安中為治也若先煩燥而四逆者陽不勝而將絕也故死此二條本少陰中寒非霍亂也然既明霍亂之治不得不列其類證蓋恐後人遇此等病亦以霍亂法用之即仲聖列霍亂於傷寒論之意耳

霍亂論卷下

引案

羅謙甫治一蒙古因食酒肉澆乳而患霍亂從早至午精神昏憤脈皆浮數暑邪未去按之無力所傷之物已出矣精神

脈接無力不但食滯已出而正氣已虛即以新汲水調桂苓白朮散徐徐服之妙隨作地漿水澄取清者一杯再調服之吐瀉遂

止翌日微煩渴與錢氏白朮散時時服之而愈淋証如是而所傷之物已出則知中氣傷殘暑邪未去故用補正清和之治凡虛人受暑而病此者即以此案為法可也其理中四

逆等方皆治陰寒致病非治暑也此等界限不清亦何足以言醫耶

又治提舉公年近八十六月間患霍亂吐利昏憤終日不省人事暑邪內投脈洪大有力一息七八至火勢頭熱如火氣

逆奔不是足冷如冰肺氣不降非陽虛也半身不遂胃氣大亂不能主束筋骨牙關緊急非中風也遂以甘露散瀉熱補氣安神明加茯苓

苓以分陰陽水水冷灌漸漸省而諸證悉去後慎言節節飲食三日以參朮調中藥理正氣十日後方平復古之

惟恐麻證而純治瘵此病之所以能愈也自韓氏既以老少膏梁為虛寒之體而養發景岳承流楊波

汪石山治一人年三十餘形瘦弱忽病上吐下瀉水漿不入口者七日自死矣未曾識雖熱藥所以能可不死汪診脈八至而數

曰當夏而得是脈暑邪深入也提舉以八十之年而脈八至此以七日不吐瀉不納水殺邪氣自盛也遂以人參

白虎湯道半杯良久復進一杯覺稍安暑感元傷之三服後減去石膏知母而人參漸次加至四五錢黃柏陳皮

麥冬等隨所兼病而佐使一月後平復

一僕夫燕京人縱酒飲食無節病霍亂吐瀉轉筋煩渴幾殆時六七月霖雨晝夜飲簷溜水數升而愈千金方云輕者水啜良然良然古此偶合古方予目見其事後路途中及六合縣見一人脈新汲井水良愈禁其飲冷水者抑

何種

一人病霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉心腹絞痛故俗名之脈之沉伏如無痛脈每此乾霍亂也然較吐瀉者甚急令

鹽湯探吐宿食痰涎盈許上裏得開逆瀉但得吐瀉與六和湯愈

江篁南治從叔於七月間得霍亂證吐瀉轉筋足冷多汗囊縮一醫以傷寒治之增劇江診之左右寸關皆伏不脈

上下否塞又部極微口渴欲飲冷水又冷囊縮似屬厥陰口渴多汗症若少陰頭有汗則死矣乃以五苓散與之何

用桂苓覺稍定尚午猶渴以五苓加麥冬五味消石投之加藥始合法囊縮乃暑熱入於厥陰更以黃連香薷飲

冷進一服次早脈稍出按之無根且人脫形已虛呢手足厥逆飲食入口即吐伏熱大便稍不禁為灸丹田八

九壯囊縮稍舒手足稍溫繼以理中湯二三服伏熱得火矣已有瀉行之毒故囊稍舒而手渴猶甚咽痛熱不解

時或昏沉乾蓋助熱使然乃以竹葉石膏湯兼頭暈投之而愈此葉江氏初治虛但宜清補不應用外灸內

溫之法幸而不用附子試一見昏沉尚可掉頭以蓋前愆然亦危矣特采之以為証者有所警焉

江少微治一婦人於六月中旬病霍亂吐瀉轉筋一醫投霍香正氣散此治寒涼飲冷兼寒加煩燥面赤搗不卧地

霍香正氣散溫散之劑也誤施尚爾世之動輒即投附桂者每見下咽即昏沉厥冷身青紫而危替者搗云陰或已極此等大熱之劑尚不克救再遇此証仍以此法投之至老不悞而死者竟無從斷此權之所以注在

亂轉筋之治決為世告也江診之脈虛無力身熱引飲此得之傷暑宜辛甘大寒之劑瀉其火熱以五苓散加滑石石膏吐瀉

定再與桂苓甘露飲而愈著熱為病脈多虛微弦細其過瀉弱乃其本泉甚至隱伏不應搗或兩尺絕無皆熱

臨証極宜善察也張石頑云一少年新婚陡然腹痛必有欲吐不吐麻替通謂之番痧証其或令飲火酒半杯而腹痛轉劇旋增頭脹

身發紅點熱毒得酒愈熾若不即投與蘆根汁善解得吐痛解復有鼻衄口燥胸腹略見紅斑血分噉童子小便

稍安又稟煎蔥豉湯宜解毒仍入童便緩與之得大吐汗出而痊

葉天士治一人霍亂後中氣大虛肝風內動心中空洞身痛肢浮與異功散加木瓜薑棗按此以培中制木之劑而為霍亂善後之治最為可法若見身痛肢浮而誤用表散之品則內風愈動脾土重傷因而致殆者多矣夫霍亂雖是中焦土病然土病木必侮故治寒霍亂亦必首察其厥陰之動靜倘其人肝陰素虧內風暗動者甚附等極宜慎用即當用者亦須妥為駕馭毋使過劑若平投無節雖不似熱霍亂之立時殞命亦必增劇而纏綿難愈試觀仲聖治厥陰下利之用白頭翁湯其義自明蓋厥陰雖當兩陰交盡而具合晦朔之理陰之初盡即陽之初生其本陰其標熱其體木其用火是以獨稱剛臟而爵以將軍也顧名思義可以悟其治矣世有治肝氣恹崇剛燥者驟則變痙厥緩則成闕格人但知病之日深而不知藥之所釀併及之以為醫家病家兩鑿焉

附案

孟英治一鄭翁年六十餘於七月間患霍亂四肢厥逆周身寒凜煩悶燥擾口不甚渴舉家以為因寒致病子診其脈細而伏苔白而厚乃暑濕內盛以熾煎湯一服厥逆寒凜皆退吐瀉漸止隨以清理脾胃而愈

一貴婦年少體瘦初秋患霍亂轉筋舌絳目赤大渴飲冷脈左弦強而右滑大此肝胃之陽素盛而熱復傷榮也以白虎湯加生地丹皮木瓜一劑即減再劑而安丹溪謂轉筋屬血熱者此證近是

丁酉八九月間吾杭盛行霍亂轉筋之證有沈氏婦者夜深患此繼即音啞肢寒比曉其夫皇皇求子救治往診其脈細弦以瀋兩尺如無口極渴而沾飲即吐不已足腓堅硬如石轉時痛楚欲絕子仍仿全匱難矣白散之意為處薑炙湯一方令以陰湯水煎而涼服此藥入口竟得不吐外以好燒酒令人用力摩擦其轉筋堅硬之處擦將一時許其硬塊始漸軟散而筋乃不轉吐瀉亦漸減晡時復與前藥半劑夜間居然安寐次日但覺疲極而已與致和湯數服康復如常後治相類者多人悉以是法獲效惟誤服附子者最難救療

一陸叟年七十餘丁酉仲秋患霍亂自服丹方二三日嘔吐雖已而利猶不止且頻頻作噦聲不甚揚而赤目閉小便不通一醫視之以為高年戴陽証屬不治且延已數日縱投大劑回陽亦有所不及矣乃連子證之脈雖兩手虛濡並無脫象况舌赤而乾利下臭惡猶是暑熱內伏由氣分而擾及於榮慮其絡閉神昏此即難為力矣胡可妄議回陽以速其斃耶遂以紫血丹三分用枇杷葉鮮竹茹省頭草通草丹參連翹桔梗黃芩煎調涼服次早復

診則目開噦止而小便稍通仍以前方加石斛以仁服二劑利亦減能進清米飲矣隨用致和湯十餘帖竟得全愈

一丁姓者患霍亂苔色白薄且不甚渴但覺口中粘膩而已彼自知醫欲作寒濕治之子固爭曰中焦原有寒濕所以不渴然而粘膩豈非暑入而釀其濕為熱乎以五苓加川連半夏枇杷葉與之二帖霍然

一錢姓者患霍亂自汗肢冷脈無平日貪涼飲冷人皆謂其寒症而欲投以大熱之藥及予視之苔色雖白然厚而邊絳且渴甚頭大痛不可因其寒涼致病而竟不容其內有暑熱之伏也於是五苓散加川連厚朴木瓜扁豆為劑服後脈稍出汗漸收吐利亦緩轉方去肉桂加桂枝滑石甘草頭痛吐利皆止苔色漸黃隨用清暑和中數帖而愈

一少年體肥畏熱性情驕縱因酷熱午間以席鋪輒地而裸卧其上醒即飽咬西瓜數斤至晚覺頭重惡寒夜分吐瀉大作四肢拘急汗冷息微時時發燥黎明延予診之脈沉弱遂用漿水散加吳萸厚朴投之一劑而安次與厚朴生薑半夏甘草人參湯數帖而愈

己丑五月間天氣驟熱家慈患霍亂自汗肢冷脈微苔白腹大痛欲重按難進大劑理中湯加桂枝白芍一服而病如失此所謂舍時從症也

壬辰夏姊丈李華甫家人患疫子一以清解法治之獨其孀居在室之老姊患嘔吐下利而舌黑如煤人皆以為同時之疫予診之體豐脈弱畏寒不渴顯係寒濕為病遂與附子理中湯數帖而愈迨丁酉深秋又患吐瀉適余偶赴舜江乃延他醫診焉以為寒也己亦憶及壬辰之恙益信無疑且日飲薑湯代茗而吐瀉更甚漸以致劇旬日後余始返杭視其形已瘦削面黑色啞胸痞口燥煩躁不眠脈細如線舌赤如赭是伏暑也與大劑梔豉苓連二十餘帖始得向安

甲午秋全朗然之母新寡患疥瘍科過進苦寒遂成吐利更醫改投熱補吐利反甚而肌肉漸消月事仍斷延至末春杭越諸名家雜治病造極中之極矣略進湯飲隨即傾吐一空且洞泄不已時時自汗延予診視脈細皮寒五虛證具然細察左關隱然有弦出寸口之象是病雖誤於寒藥中而肝陽素旺前此每進滋陰則腸氣愈溜而

滑泄必增損投燥熱不入入口即吐抑且反有昏胃欲厥之象予以四君子加蓮肉陳倉米炒乾薑以溫其中復川連吳茱萸烏梅肉川椒以和其肝十餘帖吐勢漸減服至三十帖始能略受米穀而便猶澹乃令將參蓮湯者飯以資其生氣刺中減萸蓮加石脂餘糧以固其臟氣調至初夏中氣始安但偶觸寒怒則嘔吐必至于惟專以培中立法不為旁言易治而人皆謂吐瀉雖愈天癸久阻若不通經必成癆損子晚之曰血化於氣氣資於穀令病者胃中久無穀氣血從何處生來必待安穀半年胃氣漸立斯血有所化而經自來苟不知此而以破泄之藥強通之則內本無阻徒傷其正氣耳繼以黃耆建中去飴加參歸羊肉為丸服至仲冬而形體漸充經期亦至者木不計凡服參七八斤於是甫收全續因聯姻姪故明然為子之妹夫焉

此吐利藥附載以廣治例其脈溢上魚際者是其裏賊本然魏玉衡所謂令人

列方

五苓散傷寒論治霍亂吐瀉口渴欲飲水頭疼身痛發熱者

猪苓

茯苓

澤瀉

木

桂

右為末白湯和服

合平胃散名胃苓湯

雜按此仲聖治熱霍亂之兼有風寒表邪之方也然隅反化裁在人善用如證與本條適合者方中當用桂枝若內伏暑濕之邪而又過食生冷者方中當用肉桂其外無風寒之表內無飲冷傷中則桂可輕用哉此石頑之所以示戒而河間之所以加三石吳氏之所以有四苓也苟能因此而引伸其義則無窮活法皆可心領而神悟矣

白虎湯傷寒論

治暑火熾盛而霍亂者

石膏

知母

甘草

粳米

右水煎米熟湯成去渣服雜按治霍亂粳米宜用陳倉

者

人參白虎湯傷寒論

治証如前而元氣已虛者宜照前方加人參一味

竹葉石膏湯傷寒論

治體虛受暑霍亂吐瀉及暑邪深入等證

竹葉

石膏

麥冬

人參

半夏

甘草

粳米

右水煎

服 治熱極似陰之霍亂用地漿水煎更妙

霍

凡

論

卷下

上海錦華書局石印

黃芩加半夏湯傷寒論 治體虛伏熱之霍亂

黃芩

芍藥

甘草

半夏

生薑

大棗

右水煎服

梔子豉湯傷寒論

治暑熱霍亂之主劑兼解暑証誤服桂附而致殆者

梔子

香豉

右水煎服

雄按此傷寒吐劑也而予治熱霍亂獨推以為主劑蓋梔子性苦寒善泄

鬱熱豉經蒸腐性極和中凡霍亂皆由濕鬱化熱而擾攘於中宮惟此二物最為對症良藥奈昔人咸未之察

也且二物之奇匪可言罄如偶以竹葉清暑風配以蔻仁宣穢惡濕甚者臣以滑朴熱勝者佐以苓連同木瓜

扁豆則和中合甘草鼠粘而化毒其有誤投熱藥而致燥亂昏沉者亦必藉此以為解救厥功懋矣而古今之

治霍亂者從不錄用豈非一大闕典耶

雞矢白散

全匯

治轉筋入腹

雞矢白

雄雞矢乃有白臘月收乾之

葱豉湯

全匯

治乾霍亂發斑

葱白

香豉

水煎和童便服

蘆根湯

全匯

治霍亂煩悶

蘆根

麥冬

右水煎服

地漿針

治乾霍亂及霍亂轉筋

掘黃土地作坎深三尺以新汲井水沃入攪濁少頃取清飲三五盞即愈大忌米湯

羅謙甫曰霍亂乃暑熱內傷七神逆亂所致陰氣靜則神藏躁則消亡非至陰之氣不愈坤為地屬陰土曰靜順

地漿作於陰地坎中為陰中之陰能瀉陽中之陽也雄謂得羅氏此言治霍亂已思過半矣蔣式玉稱其勤求古

訓信不誣也按霍亂因無形之邪由口鼻吸入肺胃之絡而阻其氣道之流行乃否塞不通之病或清不能升而

泄瀉無噴濁不能降而腹痛嘔吐故用藥皆以清涼宣暢為法凡周時納一口米湯下咽即脈逆不可救者蓋以

殺氣入胃長氣於腸况煎成湯液尤能閉滯經絡也薑湯熱湯飲酒澡浴並忌者為其能助熱邪上衝也若吐瀉

既多元氣耗散內已無邪者須以清米湯涼飲之以為接續不可禁之大過而反致胃氣之難復也

柳州方柳子 治乾霍亂不得吐瀉甚至冷汗出而氣欲絕者
鹽用一撮放刃上 右以熱童便和服少頃即得吐下而氣通矣 雄按是方極易極效真神劑也或用新汲水和服亦可

藕汁聖惠 治霍亂吐利 生藕 右搗汁服

木瓜湯聖惠 治霍亂轉筋腹痛 木瓜一兩水煎服餘湯浸青布裏其腓本方加桑葉七片尤良一外台方用木

瓜根皮合煎湯服

扁豆散譜濟 治霍亂吐利 生扁豆 為末入少醋冷水和服 雄按木瓜扁豆皆治霍亂之主藥也於此二方

可見

桂苓甘露飲河 治暑熱霍亂之聖劑也

茯苓 肉桂 澤瀉 白木 甘草 滑石

石膏 凝水石 右為末每服三錢水調下 桂苓白木散即本方去猪苓加人參也

六一散 即益元散又名天水散 河間 治暑熱霍亂

滑石 甘草 右為粉水飛每服三錢新汲水下

左金丸 治霍亂轉筋火邪內熾

黃連 吳茱萸 右末之米飲丸梧子大每服三錢以陳木瓜五錢煎湯下此證因濕盛而風木行脾

者石頑主平胃散加木瓜矣若熱勝而火燔於筋者雄獨推是方為妙張雨農司馬聞之極為首肯云嘗在京師見杜石樵少罕亦以此藥救活多人也然昔賢皆未采用何左金丸之塞於遇乎

黃連香薷飲活人 治暑熱霍亂

黃連 香薷 厚朴 右水煎服

香薷飲 治夏月受風涼有表證之濕霍亂

香蒿 厚朴 偏豆水煎服若夏月無表證者切勿誤服香蒿以疎衛氣而招暑患

十味香蒿飲 治虛人伏濕復感胃食滯而成霍亂者宜此方加減治之

香蒿 厚朴 扁豆 人參 黃耆 白木 茯苓

甘草 木瓜 廣皮 右水煎服 本方去參者加蒼香蘇葉名消暑十全散治夏月久傷生

冷復重感風寒而成霍亂者

蒼香正氣散 治內停生冷外感風寒之霍亂亦主水土不服之病

蒼香 桔梗 紫蘇 白芷 厚朴 半夏 茯苓

陳皮 甘草 倉朮坊本作大腹皮誤 右為末每服三五錢水煎服

六和湯 治濕熱內伏外冒風涼霍亂吐瀉寒熱交作

香蒿 砂仁 蒼香 人參 甘草 扁豆 厚朴

平胃散扁 治濕熱內甚霍亂吐瀉

木瓜 杏仁 赤苓 半夏 右水煎服

救急良方 治暑熱霍亂吐瀉轉筋

蒼朮 厚朴 橘紅 甘草 右為末每服七錢水煎加木瓜治轉筋霍亂

新汲水 治暑熱霍亂吐瀉轉筋

陰陽水本草綱目 治霍亂吐利

新汲水 百沸湯 右各半和服 李瀕湖曰上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調和升降

周流則臟腑暢達一失其道二氣清亂濁陰不降清陽不升故發為霍亂吐利之病飲此即定者分其陰陽使得

其平也 傷暑霍亂方抱朴子 瓜葉一片 白霜梅肉一錢并核中 右研爛新汲水調服立瘥

全草露頭聖 治霍亂轉筋 偏頭葉一握 右搗絞汁一盞飲

四苓散 治濕熱霍亂胸悶溺瀉而渴者

茯苓 澤瀉 陳皮 右水煎服 雄按吳氏於五苓方去桂而治胃中濕熱

最為有見且以橘皮易木則無實中之弊而有利氣之功當變而變可謂善用古人之法矣

芫薺湯 治乾霍亂腹痛驟發深赤斑毒俗呼為香痧

益母草 右以水煎濃少投生蜜放溫恣服取效或加生蘆葦汁半杯良

煎煎湯 治暑穢史濕霍亂吐下脫痞煩渴外顯惡寒肢冷者

草果仁一錢 淡豆豉三錢 炒山梔二錢 省頭草五分 製厚朴一錢 半夏一錢 酒黃芩五分

滑石四錢 水煎涼服

連朴散 治濕熱內伏之霍亂兼能行宿食滌痰涎

川連一錢 厚朴二錢 醋炒半夏一錢 石菖蒲一錢 淡豆豉三錢 炒三梔三錢 水煎服

駕輕湯 治霍亂後餘邪不清身熱口渴及熱邪內伏身冷脈沉湯藥不下而發呃者

鮮竹葉四錢 淡豆豉三錢 炒山梔五分 冬桑葉二錢 金石斛三錢 生扁豆四錢 陳木瓜一錢

省頭草一錢 水煎服

致和湯 治霍亂後津液不復喉舌燥小水短赤

北沙參四錢 枇杷葉三錢 鮮竹葉三錢 生甘草六分 生扁豆四錢 陳木瓜一錢 金石斛四錢

麥冬三錢 陳倉米四錢 右水煎服

蠶天湯 治霍亂吐利轉筋腹痛口渴煩躁危急之症

晚蠶砂三錢 木瓜三錢 生苡仁四錢 大豆黃卷四錢 川連二錢 醋炒半夏一錢 酒炒黃芩一錢

通草一錢 吳茱萸六分 炒山梔二錢 右以陰陽水煎稍涼徐徐服之

文水湯 治霍亂大渴

冬水去皮

水煮清湯俟涼任意服之

雄按永類鈴方用陳倉米作湯今余改用冬水湯其功更勝蓋陳倉

米雖能清熱霍亂後用之頗為得宜若邪勢方張吐下未平之際服之猶嫌其守惟冬水甘淡微涼極清暑濕無論病前病後用以代飲妙不可言即溫熱病用之亦良

外治轉筋方

轉筋起於足腓俗呼腿肚但以好燒酒摩擦其硬處軟散即愈 一法以省頭草同炒鹽擦之亦良 一法作極鹹鹽

湯於槽中煖漬之 一法以棉絮浸酒中煎滾取出乘熱裹之 一法以醋煎青布搗脚膝冷復易之 一法男

子手挽其陰女人手揪兩乳 一法令病人偃卧將膝腕內以手蘸溫水輕輕急拍直待紅紫筋現起即右胸所

用磁鋒刺出血立愈並治乾霍亂 此名委中穴在膝後對面

刮法右 治霍亂痧脹乾霍亂

背脊頸骨上下及胸前脇肋兩背肩臂用銅錢蘸香油刮之或用刮舌刮子脚蘸香油刮之頭額用上用棉紗線

或麻線蘸香油刮之大小腹軟肉處用食鹽以手擦之 雄按張會卿曰凡毒深病急者非刮背不可蓋以五臟

之系咸附於背也又須自輕而重向下刮之則邪氣亦隨之而降矣

刺法右 治乾霍亂痧脹

嘗見古人遺言東南卑濕之地利用砭令以針刺出血即用砭之道也凡霍亂痧脹邪已入禁必有青筋紫筋或

現於各處或現於一處須以銀針刺之去其毒血然後據證用藥看其腿灣上下有細筋深青色或紫色或深紅

色者肌膚白嫩者方有紫紅色即是痧筋刺之方有紫黑毒血其腿上大筋不可刺刺亦無毒血反令人心煩腿兩邊硬筋上

筋不可刺刺之恐令人筋吊若臂灣筋色亦如此辨之其餘非親見不明白故不具載至如頭頂心一針惟取挑

破畧見微血以洩痧毒之氣而已不可直刺其指尖刺之太近指甲雖無大害當令人頭眩若一處刺法不過針

鋒微微入肉不可深入 雄按乾霍亂因毒邪入於榮分周身隨絡為之壅塞故又謂之痧脹失治即死惟用針

刺砭取惡血取效最捷益母草蘆葦汁之治番痧皆取其能散惡血也即古方搽吐以燒鹽和熱童便雖云性專

烈下亦為其涼血之功有獨擅耳惟腹雖痛極而喜得溫按唇口刺白者乃內虛陰寒之病慎毋誤用清涼安

針刺而遺人大殃也

理中丸論寒 治寒霍亂口不渴者 人參 甘草 乾薑 白木 右為末蜜丸亦河水煎服合五

附子理中丸論寒 治證如前而寒甚者 前方加附子一味

四逆湯論寒 治陰寒霍亂汗出而四肢拘急小便復利脈危欲絕而無頭痛口渴者

甘草 乾薑 附子 水煎服

通脈四逆加豬膽汁湯論寒 治陰寒霍亂愈後四肢拘急脈微欲絕者

乾薑 甘草 附子 豬膽汁和入 水煎服

桂枝湯論寒 治寒霍亂後身猶痛者 桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗 水煎服

厚朴甘草半夏生薑人參湯論寒 治虛寒夾濕之霍亂按古今治霍亂者從未論及此方子每用之以奏奇功

故錄之

吳茱萸湯論寒 治少陰吐利厥逆煩躁亦治厥陰寒犯陽明食穀即嘔之症

吳茱萸 人參 生薑 大棗 水煎服

漿水散論寒 治陰寒霍亂暴瀉如水汗多生冷氣少脈沉或脫者

桂枝 乾薑 附子 甘草 良薑 右為末每服三五錢地漿水煎服

大順散論寒 治寒涼飲冷陰寒抑遏陽氣而成霍亂水穀不分脈沉而緊者

甘草 乾薑 杏仁 桂枝 右妙如法為末每服二三錢湯和服

冷香飲子 治陰寒霍亂脈沉細或強緊無汗惡寒面如塵土四肢厥逆陽氣大虛之證

附子 陳皮 甘草 草果 生薑 水煎一滾即瀝井水浸冷服

七香飲 治七情鬱結寒食停滯而成霍亂者

高藥 香附 枳殼 厚朴 木香 陳皮 紫蘇 水煎服

神香散論寒 治乾霍亂腹痛之屬於寒濕凝滯脈絡者

丁香七粒

白豆蔻七粒

右為末清湯調下小腹脹者加砂仁七粒

王晉三曰此方治寒濕痧脹有神

功與益元散治濕熱痧脹可謂針鋒相對

灸法

治陰寒霍亂

以鹽填臍內上蓋蒜片安艾柱而灸之

外臺法以手拗所患脚大姆指當脚心急筋上七

壯利而拘急也

喻氏法凡卒中陰寒厥逆吐瀉色青氣冷凜凜無汗者用葱一大握以帶繫束切去兩頭留

白寸許以一面熨熱安臍上用熨斗熨炭火熨蔥白上面取其熱氣從臍入腹甚者連熨二三餅又甚者再用艾

柱灸關元氣海各二三十壯若腰理素疏陰盛逼陽而多汗者用附子乾薑回陽之不暇尚可熨灼以助其散越

乎 雄按讀仲聖傷寒論乃知病屬陰虛血少者概不可灸必陽虛氣弱者始可用灸今嘉言復辨陽虛者固可

以灸若陽虛至於外越者豈容再灸可謂發前人之未發足補長沙之未及也世之不別陰陽而妄施灼灸以傷

人者豈特霍亂為然乎吁可嘆已

附煖臍方 霍亂一證皆由寒邪鬱結氣閉不通因而吐瀉交作至於多利亡陰血液枯涸則筋脈掣急手足拘攣

即俗名吊腳痧也此證朝發夕死夕發朝死無論藥力如何即重用猛烈之藥而熱劑却陰終於不救此散藥雖

峻猛而由臍納入自能溫通臟腑不致傷陰虛屢試驗識者珍之

土搖桂心八錢

母丁香二錢

倭硫黃五錢

生香附八錢

當門子四錢

共研極細末每用三

分納入肚臍中外用膏藥封貼一時即愈藥性猛烈斷不可吃孕婦忌用

跋 術數家知天文者也堪輿家明地理者也而醫之為道察人病以究乎天地之運氣者也楊子云通天地人謂之儒

通天地而不通人謂之伎可見醫非伎比必儒而後可者也秦世之所謂醫者雖天地之常令且不知無怪乎其不

識人之病矣如近年夏秋間所行吊腳痧一證怪人事者未詳痧為何義昧天時者乃謂夏秋伏陰雜藥妄治母多

天橫余友孟英王君以通儒而隱於醫獨窺其微著霍亂論一編道破病情指陳治法救俗築於既往魁民困於

將來誠通人所未通之書也因德惠敢青任其筆。校并聞尚有著述未肯輕以示人然豐城之劍終不久埋予雖老

矣猶且拭目以俟焉 道光十九年己亥魏賓同郡謝家柱全堂謹跋

夫天之有日月即人之有眼目也天無日月則不明人無眼目則不見天之日月有時被雲霞雨暗而蓋之必
 須風以蕩之氣以蒸之如人之眼目亦然也一有遮蓋苟無良方妙藥焉足以滌蕩翳障而奏奇功也哉且人
 之七情六慾過則以傷五臟一經有損便形於目所謂胸中正則眸子瞭焉者也眼之症多端有五輪八廓七
 十二症之分肝經屬木亦曰風輪黑睛條焉心經屬火乃為血輪眼白之頭尾名大小皆者盡皆屬之脾經屬
 土是為肉輪上下眼胞統之肺經屬金氣輪是也近黑睛之眼白屬之腎經屬水亦名水輪黑睛之瞳人乃為
 所屬此五經分為五輪者也過與不及目患便從而生又有因七情所感者故凡喜怒哀憂思悲驚恐亦能至疾
 何則因喜則傷心其氣散怒則傷肝其氣緊憂則傷肺其氣聚思則傷脾其氣結悲則傷心胞絡其氣急驚則
 傷胆其氣亂恐則傷腎其氣怯故善養體者調其七情六經不但無眼目之患亦可身至強壯也一眼之所屬
 業是醫者必先辨其何經並分諸症虛實則術無餘矣如此用藥無有不應手而効者焉

一凡醫眼之法但有點膜者不論虛熱之症服藥不可
 用補藥若用滋補藥托實其點膜難退

一凡虛症者止可用平和之藥退其點膜然後能用滋

補藥若先用滋補藥其點膜種種難退

一凡配藥散必要自己親手配合不可文托別人誠恐

泡製不細其害不小也慎之慎之

五輪圖式

大皆赤者心之實也大小皆為血輪屬心火黑睛為風

輪屬肝木瞳人為水輪屬腎水白仁為氣輪屬肺金上

下胞胞為肉輪屬脾土小皆赤者心之虛也

八廓圖式

天廓屬大腸傳送肺金屬乾卦

火廓屬心抱陽命門經屬離卦

地廓屬脾胃水谷之海屬坤卦

水廓屬腎經會陰 屬坎卦

山廓屬胆經清淨 屬艮卦

風廓屬肝經靈化 屬巽卦

雷廓屬心小腸經關息屬震卦

澤廓屬膀胱經津液 屬兌卦

五臟者藏也精藏於腎神藏於心魂藏於肝魄藏於肺志藏於脾周禮疾醫九臟為正五臟胃膀胱大腸小腸心肝脾肺腎乃為五臟

六腑小腸胃胆大腸膀胱命門為六腑周禮疾醫以其受盛之腑胃為水之腑小腸為受盛之腑大腸為行道之腑膀胱為津液之腑胆為清淨之腑三焦為孤之腑是為六腑

除點去膜搽眼藥散經驗此藥得自石城石是聖堂三柏門釋火師眼藥此藥服亦名馳名

蘇珠二分 血珀二分 原射香一分 紅梅片二分 雲連

煨甘草五分 煨石蟹二分

煨仁肉五分 馬蹄粉錢 蛇蛻灰二分

加手甲共研極細末點眼頭或開乳汁調搽亦可

搽眼凡能清熱去點膜

煨透爐甘石四錢 正馬蹄粉五錢 大梅片五錢 川連頭末二錢 飛淨硃砂二錢 枯礬砂錢

加煨龍退灰一錢共研極細末用滾水開馬蹄粉糊為小丸

加梧桐子大用乳汁開搽

光明除點膜眼藥方虛寒非熱一切合用

熊膽四錢 硃砂四錢 礬腦四錢 硼砂四錢 川麝二錢

梅片六錢 血珀四錢 珊瑚四錢 川連四錢 石蟹四錢

麻雀屎水浸一日 生石羔四錢 入眼丹頭四錢 蘇六珠四錢 上磁黑粉四錢



共為塵細末凡眼紅痛兼之遠年膜點每日用此藥點五六次甚驗凡眼大痛刺搽前藥難受者宜用

芒硝五分 用鷄蛋白開硝搽之

凡眼打傷紅腫宜用

生南星錢 生半夏錢

共為細末用牛肉切薄片將藥末放在牛肉處

貼眼其眼先用紗綢先封貼眼後貼肉

凡竹木入眼難出用

牛膝三錢 糖不食草一撮片糖一的共搗爛敷眼處即出

摩風膏能去頭風凡眼刺或有點膜皆合治貼太陽穴即効

木香 防風 玉桂 各五分 當歸 白芷 藜本 各

五錢 薄荷錢 食鹽一錢 共為細末後用 猪油

鵝油 鷄油 各三錢 香油一兩 黃丹五錢

同煮成膏放前藥末和勻凡眼患貼愈

金刀割膜散

血珀 梅片 射香 珍珠 丹頭 羌粉

共為細末開搽如初發者去羌粉凡眼頭生蟹眼

以此散治之最驗眼內有生紐頭突起如珍珠者

粒如蟹眼形者用針挑破用珍珠末擦之可更光
明此是良醫無價寶濟人陰德不少也水障兩目
忽然刺痛無紅無腫如針刺如鬼怪世人每說犯
神鬼也此症皆因陰陽不和氣血相攻升降不調
氣虛者下午痛氣旺者上午痛下午痛宜服和血
湯上午痛酒調洗肝散煎服方見下篇照此服之
無有不愈

助陽和血湯治下午痛

蔓荊子錢 白芷五分 紫胡五分 北芪五分 芡
草五分 當歸五分

淨水煎服後即睡用被週身連頭蓋密出汗即愈酒

調洗肝散治 十痛

玄參三錢 生地半錢 川枳八分 知母半錢 枝子錢

黃芩錢 歸尾錢 熟軍八分 砂硝八分

共為細末早晚用酒開散二錢搽之

雀目症即係鷄盲症日中至申酉時不見物不紅不痛

乃係肝虛邪熱所傷陰陽不和榮衛不通宜服五胆丸

鎮肝丸便愈

五胆丸

熊膽錢 黃牛胆二錢 青魚胆三錢 鯉魚胆三錢

羊胆二個 石決二兩 麝香一分 夜明砂一兩

共為細末將胆汁為丸如綠豆大每服三十粒空
心服次用下丸鎮肝丸

熟石羔四錢 黃丹二錢 石決五錢 夜明砂五錢

蕪黎四錢 草羊肝二兩

共為細末米糊為丸每服三錢白滾水送服日服

一次內障雙目生花不能久視無紅無腫無痛此係腎

水虛也皆由酒色過度精神少頭暈昏眼花起生生花

宜服補腎還精丸方見下篇

補腎還精丸

黨參五錢 白朮四錢 白茯苓八錢 兒絲餅一兩

羌活四錢 七厘四錢 木賊四錢 牛膝肉六錢

菊花三錢 防風三錢 茯苓三錢 川芎四錢 遠

志肉五錢 蒙花四錢 青霜四錢 淮山八錢 甘

草四錢 大生地八錢 葛蒲五錢 大熟地兩

共為細末煉蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯

送下或酒色過度之輩忌食滑精之物

能遠視不能近視之症皆由氣旺血衰宜服補血滋腎

丸

地黃補血滋腎丸

大生地兩 丹皮四錢 澤瀉四錢 龜板兩 熟地

八錢 益志仁四錢 茯苓五錢 關沙苑四錢

共為細末蜜為小丸每日服三錢淡鹽湯送下
能近視不能遠視皆由氣血兩虛看物不明原無火也
宜服地芝丸菊花散亦者其清中補也

地芝丸

菊花 五錢 天冬 兩 川枳 五錢 大生地 兩

麥冬 兩

共研極細末蜜為小丸早晚服三錢淡鹽湯送下

菊花散

大生地 三錢 菊花 三錢 甘草 二錢 淮山藥 二錢

白蒺藜 三錢 北芪 四錢 白茯苓 三錢 黨參 四錢

共為末午後服散二錢老米湯開服

眼不紅頭目痛腫不痒此是氣衰腦虛七情結鬱皆由
酒色過度初起即要調醫日久則變睛盲內障不用搽
點眼藥宜服下方使愈也如起此症半年不調理便難

治云

透紅勻氣散

生地 三錢 羌活 錢半 當歸 三錢 白芷 錢半 澤

瀉 二錢 天仙藤 二錢 黑牽牛 二錢 細辛 錢半

沒藥 八分 甘草 錢 小茴 錢 川朴 錢 乳香 八分

玉桂 三錢

共為細末每日用酒開服三錢晚服下方

川芎散

川芎 菊花 細辛 石膏 七厘 各五錢 殭蚕 錢

共為末每服二錢米湯送下開服

偏正頭風外障忽然一眼腫起頭痛淚出難開因風邪
受於太陽經

先用通頂散吹鼻

川芎 一分 薄荷 一分 牙皂 二分 葛蒲 二分 白

芷 一分 細辛 一分半 七厘 一分 防風 一分 京

子 一分 藜蘆 一分

共為極細末口含氣將散吹鼻即服下方

石羔 錢 川芎 錢 草烏 錢 七厘 錢 菊花 八分

白芷 錢 北辛 錢 當歸 錢 甘草 八分 淨水煎服

二劑再服

清涼蓮睛丸

蒙花 八分 菊花 二錢 菊精 二錢 白芷 二錢 木

賊 二錢 薄荷 二錢 杞子 三錢 黃連 錢 石羔 二

錢 京芥 錢 當歸 錢 連翹 二錢 朴硝 二錢 金

退 二錢 黃芩 錢半 羌活 錢半

共為極細末為小丸每日吞三錢茶送下

倘或大痛難堪則用 單藥名

透骨消 五錢 射沙 五錢 有一味其效甚速

三位共為粗末用好醋濃瀉用乾布包實其藥候
滾熱剪頭目痛處即止痛也

星月聚散外障眼內黃人黑睛生白點睛似星月外入
烏睛此肝虛也久則風熱不能調順致風輪有翳似星
月痛若用退熱藥則散治法先服清金散紫金丹夜光
丸撥雲散夜服洗肝散便愈

清金退膜散

石羔兩 石決五錢 海漂消五錢 竹黃半錢 金
退三錢

共為細末每日用黃牛肝蒸散三錢食之或白粥
水開服亦可

次服紫金丹
草決 蒙花 竹黃各三錢 防風 枝子 石決
桑白 黃芩 甘菊各二錢 七厘二錢 金退 木
夕 京芥 川連 胆草 蔓京子 香竹 薄荷半錢

共為末用猪肝點散三錢茶送服小兒用錢半
夜光丸

谷精兩 元粉錢 充尉二兩 白菊兩 明沙二兩
羌活七錢 當歸兩半 熟地二兩

撥雲散
共為細末窰為小丸每日早晚服三錢用茶送下

連翹 甘草 川芎 石決 防風 羚羊 菊花
木夕 車前 京芥 七厘各錢半

淨水煎服

洗肝散

枝子 薄荷 羌活 當歸 防風 川芎 生地
甘草各錢半

共為末每日用滾水開服一錢五分

內障瞳人開大白人有紅筋有時好有時作此紅熱或
有淚皆由酒色過度傷胃水少火燥水不能濟火初服
濟火滋水湯次服還睛丸次服滋腎還睛丸

濟火滋水湯

淮山 當歸 桑白 知母 北味
黃柏 生地 蒙花 天冬
分 黃柏 桑白 知母 北味
錢 黃柏 生地 蒙花 天冬

淨水煎服連日服三劑 後服下方

滋腎還睛丸

淮山兩 遠志肉四錢 天冬兩 北味二錢
杞子兩 白茯苓八錢 絲餅兩 巴戟四
錢 茯苓兩半 歸身八錢 知母兩 黃柏五錢
白菊三錢 大生地兩 熟地兩 關沙苑兩
蒙花五錢 七厘六錢 桑白五錢 金退兩 木賊

上海錦章書局石印

共為末細蜜為小丸每日早晚食三錢益水湯送

腫人睛小如粟米名肝決不紅不痛或有的淡紅筋或
眼白無紅筋皆由勞傷肝火旺五臟虛火動宜服瀉虛
火湯眼睛向上為外障症若向下則為內障症也謹辨真

瀉火湯

黃柏半錢 元參半錢 大生地 三錢 木通半錢 羚羊錢

山枝錢 知母錢 甘菊錢 甘草錢 木賊錢 黃

芩錢 防風錢 川連八分 桔梗錢 犀角八分

淨水煎服一日一次二三日後將此藥單每味加

多的去羚羊犀角加入

夜明砂 三錢 防黨 五錢 淮山 五錢 絲餅 五錢

杞子 五錢

前後藥共為末蜜為丸每日服四錢茶送下

清風虛內障男女皆同此症因平日酒色過度將夜作
日此症忽然不見黑珠邊別有烏線其症不痛初由一
隻起日久變目失明有隻眼大有隻眼小宜服通真丸
後服還睛丸

通真丸

當歸 兩 川芎 兩 官桂 五錢 羌活 五錢 杏仁 二
兩 北味 四錢 白芷 兩 白芍 二兩 川練肉 三錢

良莖 二兩 小茴 三錢 七厘 三錢 沙仁 三錢 香

附三錢

米糊為丸每日服三錢 葱白煎水送下 再服

還睛丸 自然復明

黃芩 四錢 絲餅 兩 車前 五錢 草決五錢 麥冬

味 三錢 杞子 二兩 青霜 五錢 夫子 五錢 杏仁

五錢 亭力 兩 熟地半兩 草羊肝十二兩 杏仁

兩 李仁 五錢 桂心 五錢 澤瀉 五錢

蜜為小丸每早晚服三錢 淡鹽湯送下

烏風內障症初起至疾至痒頭不旋但覺漸昏暗如物

蓋睛全無翳膜眼白有的藍色眼睛此有的

腫人些大之象看物生花此乃肝經受實熱宜服瀉肝

散後服滋腎丸方俱見後篇

瀉肝散

麥冬 兩 熟軍 五錢 黃芩 兩 細辛 七錢 芒硝 五

錢 元參 兩半 桔梗 兩半

共為末每日每次用白糖煎水開散三錢食之

滋腎活肝丸

白芍 五錢 淮山 八錢 大熟地 四錢 麥冬 四錢

菊花 三錢 車前 四錢 酒岑 四錢 川芎 四錢 楮

實 五錢 充射 四錢 杞子 兩 羌活 三錢 絲餅 五錢

大生地八錢 益子

共為細末蜜為小丸每日早晚服三錢白滾水送下不用搽點眼藥

風弦爛眼症眼胞皮邊紅爛濕常流淚此症因幼時造痘出入太早受於風毒傷肝或遠年久症宜服通肝丸

通肝丸

蔓京子五錢 白芷三錢 當歸四錢 防風三錢

薄荷二錢 黃芩三錢 桔梗三錢 知母三錢 川芎三錢 白朮三錢 七厘二錢 熟地五錢 連翹三錢 白芍四錢

共為極細末蜜為小丸每日服四錢另用下方日

日洗之

洗風弦爛眼方

文及三錢 苦參二錢 京芥錢 甘草二錢 黃柏二錢 銀花二錢 防風錢半 白芷二錢 枯凡三

分 夷花五分 銅綠五分

共煎水去渣將藥水一日洗兩次連洗三四日洗

過搽眼約幾日間全愈永不紅濕爛也

黑風綠風內障相同黑風日久成綠風此症因腎經受

虛熱初睛烏色日久不痛眼白如墨膏山水之像其症

可早醫理日久難治也宜服瀉肝藥能治時行熱眼羞

明怕日疼痛

下方用合 大黃四錢 京芥三錢 枝子三錢 杏仁四錢 甘草三錢 卧硝三錢

共為細末每日用滾水開服三錢後再服下方

滋水還睛丸

木賊五錢 知母五錢 地骨五錢 七厘四錢

金退五錢 絲餅五錢 茯神八錢 生地八錢 杏仁兩 充尉五錢 當歸五錢 牛膝五錢 黃柏四錢 淮山兩 川芎四錢

共為細末蜜為小丸每日早晚吞三錢淡鹽湯送下另日間搽眼藥四五次便愈

白陷蓋睛外障症也其眼烏珠如魚鱗如蝦蓋烏白睛不紅不痛

看物朦朧此症因心肝脾肺四經受風邪宜服退風除膜丸

撥雲退風除膜丸

楮實五錢 薄荷四錢 甘草四錢 白芷四錢 蛇退兩 金退兩

瓜萸根四錢 白朮四錢 京芥三錢 川芎四錢 蒙花四錢 木賊五錢 蔓荊四錢

瓜萸根四錢 殭蚕四錢 川連四錢 明沙五錢 七厘五錢 白蒼朮

米水浸一日

共為末水糊為小丸早晚服三錢白滾水送下另每日搽退

膜眼藥五六次其白膜盡退也



眼 斗 竟 聖

上海錦章書局石印

色事過度瞳人淡白初欲成內障不痛不紅但視物不明耳或有遺精白濁或夢遺頻多初起似無妨碍但要即為醫治日久恐成內障兼之日久即成盲目

服宜下方

補肝補腎丸

北味二錢 金退兩 熟地兩 楮實兩 茯苓酒洗

明沙兩 杞子二兩 磁石兩 絲餅兩 石斛五

錢 川芎四錢 沉香五錢 大生地兩 益志仁兩

關沙苑兩 蓮志五錢 葛蒲五錢 淮山兩 珍珠

二錢 硃砂五錢

共為末蜜為小丸每日服三錢淡鹽湯送下不用

搽眼藥後服下方

救還睛丸

白朮二兩 當歸兩半 防黨兩半 玉桂兩 鹿茸

兩 杏仁兩 食鹽三錢 絲餅兩 川練子兩 淮

山兩半 故紙兩 續斷八錢 桑白八錢

共為末米糊為小丸每日服三錢

眼血貫瞳人乃肝肺二經受風邪熱至心血妄行上主

于目灌入瞳人即調退血散

退血散

川芎錢 黃谷錢半 桔梗錢半 川連錢半 麻黃錢

黃柏錢半 大黃錢半 白芷錢 赤芍三錢 防風
錢 胆草錢 桑白二錢 歸尾二錢 枝子二錢
紅花二錢 蘇木二錢 桃仁三錢

淨水煎服連服三日

當歸活血丸

當歸兩 北芪五錢 川芎三錢 蒼朮三錢 羌活

五錢 菊花四錢 麻黃五錢 熟地兩 木藹二錢

蜜為丸每日早服三錢薄荷湯送下又服下方

修肝丸

當歸兩 七厘五錢 大黃四錢 川芎四錢 羌活

四錢 黃芪八錢 防風三錢 赤芍兩 菊花三錢

川連四錢 薄荷五錢 連翹五錢

蜜為丸午後服三錢滾水送下

青盲內障不紅不腫不痛不痒無點膜不能見物此症

因少年酒色過度怒氣傷心腎虧血少

初服

北味三分 遠志錢半 天冬二錢 棗仁錢 歸身

錢半 丹皮一錢

淨水煎服或剉再服下方

益陰腎氣丸

天冬五錢 白朮兩 丹皮三錢 澤瀉五錢 絲

餅五錢 連志五錢 當歸五錢 大生地兩 柴

胡二錢 硃砂五錢 北味三錢 磁石八錢重便帶七次

蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯下又服下方

救睛丸 治青盲內障有翳膜用

歸身五錢 蒼朮二錢 金退四錢 草決五錢益木炒

川芎三錢 川只三錢 木賊三錢 白朮八錢 熟

地兩 笑草四錢 明砂五錢 谷精三錢 關苑兩

共為極細末蜜為小丸每日每夜服三錢淡鹽湯

送下

兩目紅腫痛如針刺流淚不止乃係肝脾肺三經受熱

宜服疎風除熱湯後服退紅除點丸

疎風除熱湯

羌活錢 元參二錢 防風錢 升麻三分 草決二

錢 黃芩錢 白芍二錢 生枝錢 川芎錢 荆芥

錢 木賊二錢 柴胡二錢 白朮錢 白桑三錢

蔓荊子二錢

淨水煎服即愈

退紅除點丸

七厘四錢 黃芩三錢 防風三錢 川連二錢 荆

芥三錢 蔓荊子三錢 川芎三錢 桑白五錢 紅

花三錢 金退五錢 升麻錢 歸尾四錢 柴胡四

錢 木賊五錢 生地五錢

共為細末米糊為丸每日早晚服三錢茶送下另

日日搭退點膜眼藥五六次愈

雙目全紅面痛無腫如有沙在眼內此症乃是肝肺二

經發燥熱宜服清肺肝火湯數日後便見奇功也

清肝肺火湯

柴胡三錢 青霜錢半 黃芩二錢 桑白三錢 七

厘錢 生地三錢 防風錢 川芎錢 元參二錢

金菊錢 胆草錢 川椒四分 荆芥錢 川只錢

木賊二錢 蒙花二錢 金退二錢

淨水煎服每日一次連服三日愈另日夕搭眼藥

四五次

雙目白下紅上不紅此因胃火燥熱上攻于目而痛也

宜服瀉胃火地黃湯愈

瀉胃火地黃湯

大生地三錢 黃柏錢 防風錢 京芥二錢 桑白

二錢 白朮二錢 干葛二錢 甘草錢 黃芩錢半

白芍錢 花粉二錢 升麻三分

淨水煎服每日一服三四日愈

雙目白上紅下不紅昏脾經胃經受熱火上攻之故也

宜服瀉脾胃火湯

瀉脾胃火湯

金菊錢 蒙花錢 木賊錢 桑白二錢 柴胡二錢

枝子錢 七厘錢 赤茯三錢 元參二錢 防風錢

荆芥錢 青霜二錢 花粉錢 金退二錢

淨水煎服三四劑全愈

眼頭紅眼尾不紅此症勞心太過初起症一年間見紅

其目日久眼頭吐出筋頭生膜食入黑睛遮蓋此名老

肉扳睛宜服此方

蒙花錢 桑白二錢 防風錢 七厘錢 柴胡錢半

荆芥錢 麥冬二錢 木賊二錢 連翹錢 金退錢

一連服劑另每日擦眼藥

除老肉扳睛退紅退膜丸

木賊五錢 元參四錢 龍退三錢 蒙花四錢 七

厘五錢 金退四錢 柴胡四錢 桑白四錢 菊花

三錢 防風三錢 荆芥二錢 川芎三錢 草決五錢

石決三錢 生地八錢 熟軍三錢

共為細末米糊為小丸每日早晚服三錢用茶送

下另日夕點擦眼藥三四次

眼尾紅眼頭不紅此由心經虛腎經虧氣血凝滯宜服

補心湯

蒙花錢半 杞子三錢 防黨錢半 綠餅錢 當歸

酒洗 熟地二錢 楮實二錢 茯苓二錢

連服數劑倘年深日久不見功效宜服下方

補心腎血丸

元參四錢 澤瀉三錢 茯苓兩 杞子兩 棗仁四

錢 遠仁四錢 黨參兩 熟地兩 天冬五錢 關

苑五錢 蒙花四錢 金退四錢 白菊三錢 大生

地八錢 杏仁五錢

共為細末蜜為丸每日服四錢鹽湯下倘有虛弱

日本點光明眼藥

左眼白紅痛難開淚出右眼不紅不痛此症由肝經火

燥盛宜服下方

瀉肝火散熱湯

生枝錢 元參錢 金退二錢 防風錢 胆草錢

荆芥錢 羚羊錢半 生地三錢 草決錢 白菊錢

桑白錢 木賊錢 柴胡錢 石決錢 羌活錢 川

連翹 川芎錢 荆子二錢

淨水煎服數劑倘或有點膜服三劑湯約將此方

各味加多的共為細末為小丸每日早晚服三錢 老茶送下日夕點擦眼藥幾日間便可全愈也 右眼紅痛難開左眼不紅不痛此症皆由肺經火盛也

宜服除火湯

除肺火湯

桑白三錢 黃芩半錢 荆芥錢 蔓荊子二錢 生地三錢 白芷四錢 防風錢 金退二錢 木賊二錢

細辛三分 麥冬二錢

淨水煎服 三劑全愈

肉內入水輪症眼白紅如血黑睛碧列白點數粒或睛
凹此係由肝肺二經受火熱宜服瀉肝肺火湯便合

瀉肝肺火湯

川連半錢 木賊二錢 紅花二錢 紫胡二錢 蔓荊子半錢 歸尾半錢 川芎錢 桑白二錢 防風錢 羚羊

羊先錢半 犀角九錢 生軍半錢 金退二錢 蛇退半錢

淨水煎服一日一服連服三日後將此方各味多

加重為末米糊為丸早晚服三錢茶送服全愈日

夕要點搭眼藥五六次

雙目紅赤不痛乃是肝熱膀胱凝滯之症宜服利水清

肝丸

利水清肝丸

赤芍三錢 白芍五錢 七厘三錢 蒙花四錢 黃

柏三錢 防風三錢 澤瀉四錢 羌活三錢 地骨

四錢 生枝三錢 元參三錢 車前三錢 赤茯苓

五錢

白菊三錢

共為細末米糊為丸每日服四錢白粥送下

雙目不紅痛刺難開皆由氣滯凝滯肝鬱風沖上腦目
宜服透紅勻氣散

透紅勻氣散

當歸 川朴 生地 澤瀉 香付 北辛 玉桂

乳香 羌活 白芷 黑牽牛 甘草

各一錢為末每日服三錢酒開服再服下方

川芎散

川芎 白菊 石羔 羌活 七厘 北辛各二錢

共為細末每日服二錢米湯送下

酒濕傷肝症双目眼白有的紅筋黑睛有的白膜無痛

眼白有黃色視物不明朦朧常出膠水行路迎風出淚

因平日好飲酒傷肝經至有如此之症也宜服羊肝除

酒患

羊肝除酒患丸

白羊肝八兩去淨筋用人乳汁浸一日曬乾或焙乾亦

得木賊四錢 白菊三錢 石決明三錢 七厘四錢

葛花四錢 防風三錢 大生地五錢 赤茯苓八錢

川連三錢 當歸四錢 藜蘆三錢 槐角三錢 楮

實五錢 洋參三錢

共為末煉蜜為丸早晚服三錢滾水送下另日夕
點退膜眼藥五六次

鷄冠蛇肉症双目白紅赤黑睛如開爛生開蛇一樣不
見眼黑珠止見黑睛凹下如生蛇肉之樣此症由心經
受大熱脾胃擁滯看見此症利害但不妨醫也宜服瀉
除心胃脾熱丸方見下篇

瀉除心胃脾熱丸

麥冬 四錢 木賊 四錢 蔓京子 四錢 川芎 四錢
桑白 五錢 七厘 四錢 黃柏 四錢 金退 四錢 地
骨皮 五錢 知母 四錢 元參 四錢 蛇退 四錢 川
連 三錢 甘草 三錢 石決 四錢 黃芩 四錢 蜂房
三錢 甘草水洗

共為末蜜為小丸早晚服三錢白滾水送下另用
人乳開退膜眼藥日夕點搽七八次

旋螺突睛大惡症也黑睛突高或突下此係風毒傷五
經心肝脾肺腎至攻出眼突高服下方如見功效便可
醫如不見功效雖有扁鵲華陀亦無能為也可善事多
為盡心忠厚者或奪天工宜用墜五經風毒散

墜五經風毒散

口決 三錢 血珀 三錢 朋沙 三錢 明沙 三錢 珍
珠 三錢 防風 三錢 山前 三錢 羌活 三錢 羌活 三錢

荆芥 二錢 荆子 三錢 桑葉清 三錢 金退 三錢
赤芍 四錢 升麻 五分 蒙花 三錢 柴胡 三錢

共為細末早晚每服一錢五分福柿半個煎水開
服突睛處用田螺肉搗爛取的水汁開除點眼藥
日夕搽七八次

双目無紅無腫無點膜者如好眼一式但眼睛些淡赤
的腫人些零細小的其患早朝痛過午後不痛乃是虛
火上升擁陽火盛陰火弱之故也宜服附子羌活丸

附子羌活丸

川芎 四錢 地骨 四錢 菊花 三錢 七厘 四錢 酒
芍 四錢 甘草 三錢 石羔 四錢 木賊 三錢 羌活
二錢 蔓京子 四錢 香附子 三錢

共為末末糊為丸每日早晚服二錢五分白滾水
送下

双目無點膜無紅腫腫人畧見大比午後有的痛視物
不明兩額頭亦有的刺痛常常湯風流涕此症就初起
時內障皆由色重傷腎也宜服補腎明目丸

補腎明目丸

川芎 三錢 知母 四錢 淮山 五錢 杞子 八錢
熟地 五錢 當歸 四錢 絲餅 四錢 山前 三錢 白
芍 四錢 葛蒲 三錢 黃柏 三錢 芙蓉 三錢 青

寤志內二 夫子三錢 巴戟三錢 北

味二錢 蘇蓉八錢 桑漂消四草水洗

共為末蜜為丸每日早晚服三錢淡鹽湯送下

垂簾下膜症眼黑睛上有白膜翳生下黑珠如蛾眉之
樣此症但視物有時暗此症因傷風受寒累夜不眠至
成內障症宜服退霞丸

退霞丸

木賊五錢 金退五錢 珍珠二錢 硃砂五錢 明

砂四錢

共為末每日服二錢米水開服午後服下方

補腎開鬱丸

木賊四錢 金退四錢 天冬五錢 北味一錢 大

生地八錢 蒼朮四錢 楮實五錢 當歸五錢

繚餅四錢 柴胡四錢 熟地八錢 貞子四錢

共為末蜜為丸午後服三錢淡鹽湯送下

迎風流淚皆由肝經虛也又有一種肝熱積熱勞苦受
鬱夜造工作過傷下方總管服丸止矣亦有症後肝經
受風毒亦同此症皆同治法服下方可能止淚

補腎丸

歸身五錢 七厘四錢 金退四錢 木賊四錢 川

椒 防風各四錢 羌活三錢 川芎三錢 蒼朮三錢

熟地八錢 白芍四錢 玉桂三錢

共為末蜜為丸每日吞三錢淡鹽湯下

虛眼火眼同服見効多次

當歸 京芥 柴胡 骨皮 牛子 甘菊 各一

芍藥 蟬退半兩 防風兩 連翹兩

共為細末每服二錢清茶送下

苦濕加 蒼朮一兩 石決一兩 痛加白芷五分 細辛

五分

風變內障症

此眼初患時頭旋目痛臍膈虛勞肝木風動或嘔吐傷

神毒風入眼仍兼腦熱致目失明初覺急宜服除風湯

補腎通明丸

除風湯

車前 芍藥 人參 茯苓 川黃 芒硝 黃芩 各

一錢 淨水煎服

補腎通明丸

車前 石決 桔梗 芍藥 川黃 細辛 各一兩

充蔚子 生地黃 各三錢

共為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九淡鹽

湯送下

氣結內障症

此眼初患時五臟虛勞肝氣不足熱氣冲目或因打着腦中惡氣流入眼中二三年間移成白翳蓋佳瞳人若見三光宜針其針法與澁翳同服鎮肝丸

鎮肝丸

石決 人參 山藥 充尉子 車前子 白茯苓 防風 柏子仁各三錢

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服卅丸空心

茶服

水靈翳障症

此眼初患之時因肺臟壅熱肝受毒風時常發歇不定致令烏珠生翳如葱白色濃淡如水靈之狀不宜劇洗釣割也合用陰二陽八射腦少許吹之服本方

服充尉子湯

充尉子 防風 黑參 細辛 大黃 知母 芒硝 赤芍

淨水煎服服二日後再服下方

車前 黑參 人參 白茯苓 桔梗 五味子 大黃 各一兩 黃芩 知母 各兩半

共為末煉蜜為丸

叢花內障症

此眼初患時頭旋眼中痒痛時常熱眼見飛花黃黑

不定翳在瞳人之中參差如鋸齒名曰叢花獨視三光可針服本方

服還睛丸

人參 茯苓 車前 黑參 防風 知母

共為末蜜為丸如桐子大每服卅丸茶送下

涼血散

當歸 胆草 黃芩 黃柏 枝子 連翹 赤芍 各

淨水煎服後服

漏睛膿血症

其症大惡之症皆由五臟多積風熱上攻黑珠黃仁生 出毒瘡常流膿血宜用 葱艾 白芷 生地 共搗 爛敷眼

點擦散

水片一分 乳香一分 輕粉二分 明凡一分 血 竭二分 川連五分

共為細末

消膿活血散

防風 錢 白芷 錢 乳香二分 生地 三錢 田七 錢

川連 錢 川芎 錢 桑白 錢 白芍 二錢 末藥一分

木賊 二錢 柴胡 錢半

共為細末每服一錢五分滾水開服

逆順生翳黃色赤色膜下垂此症因肝經虛損精鬱熱毒久則逆順生膜

修肝解毒散

大黃錢 鷄蘇錢 川連錢 連翹錢 麻黃錢 桑

酒錢 川芎錢 七厘錢 羌活錢 木賊錢 金退

錢 枝子錢 防風錢 赤芍錢 當歸錢 各精錢

霜子錢 共為細末每日早晚服二錢茶送下

橫翳內障初患時皆因五臟虛勞塵起毒氣充腦初患一隻後相牽一對其睛陰看則太陽看則小一日一看物不見不明此翳膜如紗紙之厚白雪色宜服還睛丸

還睛丸

人參 茯苓 連翹 元參 防風 充尉子 知母

錢一 車前五 細辛錢 北味錢 大生地錢 黃芩錢

共為末煉蜜為丸每日服三錢茶送下

珠血蔭翳退膜散

珍珠錢 血珀錢 明沙錢 硃砂錢 木賊錢 金

退錢 生朋沙錢 羊肝油兩

共為末每日用白粥開服二錢或蒸猪肉汁開食亦可

綠水灌瞳人與風綠障相內障症初患時頭頸骨痛眼內痛惡或惡心或作嘔吐紅白不定此乃肝肺受勞宜服下方倘有綠水入瞳人不嘔不須治此係廢症也不能醫云

先服羚羊湯

羚羊一錢 黃芩錢 車前五 防風錢 知母錢 桔

梗錢 白茯苓錢 元參錢 淨水煎服每日一次服三四日服下丸愈

補腎復光丸

生地一兩 人參錢 木賊錢 茯苓一兩 當歸錢 沉

香錢 楮實錢 知母錢 充尉子錢 杞子一兩 葵

藜錢 白羊肝油兩 煉蜜為丸

小兒科

小兒痘後患眼生點膜因熱毒攻心並轉肝經至傷眼目宜服

補助三砂湯

夜明砂一錢 望月砂錢 蚕砂錢 防風錢 木賊錢

白菊一錢 谷精一錢 金退錢 蚘粉一錢

淨水煎服每日一次連服三四日又連服下方

黃沙蚘散

黃沙蚘兩 木賊錢 涼粉草兩

共三味蒸蚘食止食肉汁渣不要

再用 香柚葉錢 塘蝦尺 馬蹄草三錢 如無用生馬

梅片分 鐵沙錢 共搗爛敷眼

小兒五疳傷眼者凡肚大臍凸髮疎落此二症入死症

不可與人包醫除此二症如閉目不開或有點膜或有

紅筋須重不妨也宜服下方

小兒退肝散

生地一錢 赤茯苓一錢 川枳一錢 川芎一錢 木賊一錢 胡

連一錢 地骨一錢 當歸一錢 天麻一錢 雷丸一錢 蕪荑

一錢 君子肉一錢 淨水煎服後服下方

開鬱救目散

夜明沙一錢 山渣一錢 車前一錢 朋砂一錢 硃砂一錢

推車草二錢 沙仁一錢 茯苓一錢 仙子一錢 金退一錢

海漂清一錢 蟾蜍五分 白朮一錢

共為細末每服一錢五分蒸羊肝食或粥水開亦可

小兒鳳眼瘡症由五毒傷肝而起眉頭有一小瘡次日又對眉
生一個三日間其小瘡自回其眼烏珠包灰之的其症十有九
盲而服下方三兩次或有應係天力所醫非醫者之功也

開毒疎風湯

川連一錢 生地一錢 石羔二錢 荆芥一錢 防風一錢 柴

胡一錢 桑白一錢 荆子一錢 黃芩一錢 犀角五分 羚羊

八分 元參一錢 淨水煎服一日一次連服三日

小兒兩目凸出或田螺或如爛眼或 凹些大惡之症

因五毒傷肝風毒入五輪須急治之如遲恐轉重症使

難治矣初服下方

疎風通腦湯

熟軍一錢 木賊一錢 夫子一錢 防風一錢 如母一錢 白

芷一錢 北辛一錢 元參一錢 菊花一錢 君子肉一錢

淨水煎服

又服 鷄蛋一只開小穴中入君子肉一錢 輕粉二分

二味入在蛋內用紙包蛋煨熟食一日一次連食三

四只蛋

小兒通睛因物打頭而起驚傷肝魄不應目風邪傷瞳

腫人開通直視不見

犀角通睛飲

犀角五分 人參一分 茯苓一錢 遠志一錢 黃芩一錢 北

味一分 菖蒲五分 淨水煎服後服下方

牛黃丸

附子一錢 牛黃一分 桂心一錢 全蠍五分 白芷一錢 川

芎一錢 藿香一錢 硃砂一錢 燕窩五分

共為細末煉蜜為丸每日服一錢五分

小兒眼双目流血上下眼皮展出自夜啼哭其血流落

連面爛令人失驚其勢雖惡種種不妨治此症者皆由

肝脾二經受風熱之毒也宜服下方

犀角地黃湯

羚羊一錢 犀角一錢 紫胡一錢 石羔一錢 木賊一錢 金退一錢

元參一錢 生地一錢 白菊一錢 君子肉一錢 蔓京子一錢 防風一錢 淨水煎服三二次全愈不用點眼藥

凡傷寒熱病傳經之邪比雜病不同必辨其脈證古表裡而汗下之庶不有誤蓋脈者血之府屬陰當其得病之初正氣相搏若真氣未衰脈必滑數而有有力病久熱甚氣衰脈必微細而無力方數甚也但可養陰退陽此識脈之要也或初病即惡寒發熱後必有渴水燥熱之證或逆厥而利乃熱症傳經之邪也若始終皆熱證惟熱而不惡寒故傷寒為病初則頭痛必無發熱惡寒渴水之證一病便有逆厥泄利或但惡寒而無發熱則是寒證此識證之要也如舌本者乃心之竅心屬火象離明人得病初在表則舌自紅而無白胎等色邪入於半表半裡之間舌色變為白胎而滑見矣切不可不明表證知邪傳於裡而未罷古見黃胎知邪已入於胃急宜下之胎黃自去而疾安矣至此醫之不依次誤用湯丸失於遲下其胎必黑變證蜂起此為難治若見舌胎如漆黑之光者十無一生此心火自炎與邪熱二火相乘熱極則有兼化水象故色從黑而應水化也若乃臟腑皆受邪毒日深為症必作熱證必宜下之瀉去胃中之熱否則其熱散入絡臟之中鮮有不死譬如火之自炎初則紅過則薪為黑色炭矣此亢則害承乃制今以前十二舌明著猶恐未盡諸證復作二十四圖并方治列於左則區區推源尋流寔可決生死之妙也至正元年一陽月上澣學士杜清碧題

傷寒一書自漢張仲景先生究其精微得其旨趣乃萬世之龜鑑也論中梓說難明王叔和成其章序成無擇明理論劉河間五運六氣參同仲景鈐法則病之所變預可知也陰陽傳變汗瀉圖局曰汗曰吐曰下死生吉凶棺墓圖局曰死曰生隨治隨效如響應聲則萬舉萬全矣元教氏辨舌三十六法傳變吉凶深為元妙舌乃心之苗心君主之官應南方赤色甚者或燥或澀為白為青為黑是數者熱氣淺深之謂舌白者肺金之色也由寒水甚而制火不能平金則肺金自盛故色白也舌青者肝木之色也由火甚而金不能平木則肝木自盛故色青也仲景法曰少陰病下利清穀色青者熱在裡也大承氣湯下之人謂色青為寒者訛矣舌黃者由火盛則水必衰所以一水不能制五火而脾土自旺故色黃也舌紅為熱心火之色也或赤者熱深甚也舌黑亦為熱者由火熱過極則反兼水化故色黑也五色應五臟固如此教氏以舌白者邪在表未傳於裡也舌白胎滑者痛引陰筋名臟結也舌之赤者邪將入也舌之紫者邪毒之氣盛也舌之紅點者火之亢極也舌之燥裂者

熱之深甚也。或有黑圈黑點者，水之萌發也。舌根黑者，水之將至也。舌心黑者，水之已至也。舌全黑者，水之體也。其死無疑矣。舌黃者，土之色也。邪初入於胃，則本色微黃發見。古黃且白者，胃熱而大腸寒也。舌之通黃者，胃寔而大燥也。以調胃承氣湯下之，黃自去矣。舌灰黑者，厥陰肝木相承，速用大承氣湯下之，可保。但五死一生矣。大抵傷寒傳變不一，要須觀其形察其色，辨其舌審其證，切其脈對證用藥，在於活法。如脈浮緊而滿者，日數雖多，邪在表也。汗之而愈。若脈沉寔而滑，日數雖少，邪在內也。下之而痊。其有半表半裡，傳至少陽一證，則小柴胡湯主之，無不效也。太陰腹滿自利，脈沉而細者，附子理中湯主之。太陰腹滿時痛，便鞭者，桂枝加大黃湯主之。少陰舌乾口燥，津不到咽者，人參白虎湯主之。少陰發熱而惡寒，脈沉而遲者，麻黃附子細辛湯助陽而汗之。厥陰舌卷囊縮，脈沉而弦者，為毒氣藏厥，沉而短者，用承氣湯下之。若厥冷耳聾囊縮，脈而弦者，少陽兩感不治之證也。此則三陰有可汗，可下，可溫之理。教君立法，辨古自為專門體認之精。當時嘗著點點金及金鏡錄二書，皆秘不傳。余于正德戊辰歲見一人能辨舌色用藥，輒效。因扣之，彼終不言。偶於南雍得金鏡錄歸而檢之，乃知斯人辨舌用藥之妙，皆本是書。惟點點金一書於傷寒家多有不切，其與仲景法奧旨同者，特金鏡錄爾。故余並刊於官舍，使前人之書皆得以行於世。而四方學者亦知所去取。云嘉靖己丑仲冬吉旦南京太醫院院判長洲薛己識。


夫人之受病傷寒為甚，傷寒之治，仲景為詳，人皆知之，而未必能行之者，豈非以其法浩繁有難卒貫者乎。蓋有叔氏金鏡錄一篇，專以舌色視病，既圖其狀，復著其情，而後別其方藥，開卷昭然，一覽具在，雖不期乎仲景之書，而自悉合乎仲景之道，可謂深而通約，而要者矣。予昔承乏留都，嘗刻之，太醫官舍本皆繪以五采，恐其久而色淪，因致謬誤，乃分注其色於上，使人得以意會焉。遂命工登梓，名之曰外傷金鏡錄。蓋寒之所傷，本自外至，見傷於內外有微焉，所以然者，人之一身皆受生於天心，名天君，故獨為此身之主。舌乃心之苗，凡身之病，豈有不見於此者。尚何內外之間哉。特患人之不化耳。嘉靖丙辰秋日，姑蘇薛己撰。

陽寒一證，傳變不常有本。傳越經傳，巡經傳，度傳，誤下傳，表裡傳，上下傳，頃刻之間，生死係焉。可以寄人死生者，惟醫馬耳。夫何脈理元妙，七表八裡九道，形似難辨，此庸醫所以接踵而殺人者多也。元若叔氏抱

獨見之明著金鏡錄一書只以舌證不以脈辨其法淺而易知試而輒效誠千載不偶之祕書也惟黑舌之證稍有未盡如舌之黑而紫黑而濕潤黑而濡滑黑而柔軟皆寒證也黑而腫黑而焦黑而乾澀黑而捲縮黑而堅硬黑而芒刺黑而拆裂皆熱證也學醫者推類以盡其餘則庶幾矣予在南都偶得此書深珍重之後會副憲篤齋湯公出是編示之極得其善已命工梓行會稽郡矣予患天下之人未盡知也復梓之以廣其傳云賜同進士出身大理寺左寺正陳栢書

教氏不知何許人有舌法十二首以驗傷寒表裡杜清碧又增定焉薛立齋再加潤色流行於世卷帙單薄雖傳不能久存也此法大裨傷寒家乃識傷寒之捷法人身傷寒氣從同類則腎水有餘而凌犯心火矣所謂人傷於寒則為病熱者此也故色見徵於心之苗苗者其舌也欲辨內外風寒者非舌不可為據救與杜雖能傳之似尚未達其所以然而予姑妄擬之如此傷寒唯視舌識病則風暑濕恐亦有定法當俟後之作者圖後取所載方出傷寒論故不復刻今特取嚏一方耳萬曆丁巳清明日錢塘盧復記

白胎舌



舌見白胎滑者邪初入裡也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之證宜用小柴胡湯梔子豉湯治之小柴胡湯 柴胡四 黃芩 甘草 人參 半夏各二右
 咬咀每服一兩水一盞半加薑三片棗二枚煎至一盞溫服按方書謂藥之粗者為商量斟酌之意也冠宗與曰咬咀有含味之意如人以口齒咀嚼雖碎而不磨古方多言咬咀此意也李杲曰咬咀古制也以口咬細合如麻豆煎之令人易於消化則以刀割細耳
 梔子豉湯 梔子十四枚香豉四合右二味以水三盞先煎梔子約減一盞半內香豉再煎至一盞溫服

將瘋舌



舌見純紅色熱蓄於內而病將發也不拘何經宜用透頂清神散治之 透頂清神散 豬牙皂角 細辛 白芷 當歸 右為細末各等分和勻病人先噙水一口以藥少許吹鼻內取嚏為度如未嚏仍用此藥吹入凡瘟疫之家不拘已患未患皆可用之

中焙舌




舌見純紅內有黑形如小舌者乃邪熱結於裡也君火熾甚及蕪水化宜涼膈散大柴胡湯下之 涼膈散 生甘草二大黃兩連翹兩山梔子 薄荷葉 黃芩 朴硝各一 每服一兩加淡竹葉二十片以水二盞煎至一盞去渣入生蜜少許不拘時溫服以利為度 大柴胡湯 柴胡四錢黃芩 芍藥 半夏各一錢枳實二錢大黃二錢 右咬咀每服八錢加薑三片棗一枚以水一盞半煎至一盞溫服

舌斑生



舌星紅



舌尖黑



舌圖裏



舌見紅色而有小黑點者熱毒乘虛入胃蓄熱則發斑也宜用元參升麻葛根湯化斑湯解之 元參升麻葛根湯 元參 升麻 甘草 葛根各等 右咬咀以水一盞半煎一盞溫服 化斑湯即人參 人參二錢石膏四錢知母五錢炙甘草一錢糯米一握 右咬咀每服一兩用水一盞半入糯米先煎後下諸味再煎去滓服之

舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所不勝者假火勢虛木則去所不勝者以下七字以侮脾土將欲發黃之候宜用茵陳五苓散治之 五苓散 澤瀉二兩茯苓猪

苓 白木各一兩肉桂五錢木通 滑石各一兩炙甘草一兩 右為末每服五錢入薑汁并蜜各少許用白滾湯調服按古方五苓散只是澤瀉茯苓猪苓白木肉桂五味耳於全方中加茵陳一味其分量倍加於眾味則謂之茵陳五苓散此條於治法則曰用茵陳五苓散於方劑則曰五苓散方中亦不列茵陳一味且於原方五味之外多木通通滑石甘草薑蜜五味後人因誤下藥酌而用之可也

舌見紅色尖見青黑色者水虛火實腎熱所致宜用竹葉石膏湯治之 竹葉石膏湯 竹葉二兩石膏半兩夏 甘草 麥門冬各二錢人參三錢梗米一握 水二盞煎服

舌見淡紅色而中有一紅暈沿皆純黑乃餘毒遺於心胞絡之間與邪火鬱結二火元極故有是証以承氣湯解之 調胃承氣湯甚本只承氣湯三字而為味則調胃補承氣二字於上以 大黃六錢炙甘草三錢硝石二錢芒硝二錢 右咬咀用水一盞先煎大黃甘草將熟去滓下芒硝再煎三五沸溫服

補承氣二字於上以 大黃六錢 炙甘草三錢 硝石二錢 芒硝二錢 右咬咀用水一盞先煎大黃甘草將熟去滓下芒硝再煎三五沸溫服

舌裂人



舌碎蟲



舌黑裏



舌陰厥



舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火熾灼熱毒炎上故發裂也宜用涼膈

十毛

亦有 散治之 涼膈散 方見前 此形

舌見紅色更有紅點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾甚火在上水在下不能相濟故也
以剛下十二字宜用小承氣湯下之 小承氣湯 大黃四錢厚朴三錢枳實二錢
右三味以水一盞半煎至一盞去滓服

舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有刺者此熱毒熾甚堅結大腸全受火制不能平木故也
虛本剛去全受 大刺以下十字急用調胃承氣湯下之 調胃承氣湯 方見前

舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥於肝經肝主筋故舌見如絃形也用理中合四逆湯溫之 理中湯 人參 炒白朮 炙甘草 乾薑各等 右咬咀每五錢水一盞煎六分不拘時溫服 四逆湯 附子一枚去皮生甘草六錢乾薑五錢 服法如前


舌見黑色水尅火明矣患此者百無一治治者審之薛立齋曰余在留都時地官主事鄭汝東妹婿患傷寒得此舌院內醫士曾穆云當用附子理中湯人或驚駭遂止亦莫能瘳因甚治棺曹與之鄰往視之謂用前藥猶有生理其

死現舌



致可數奈何世皆以為必不可用之藥竊視人之死而不救不亦哀哉至於火極似水之証用藥得宜效應不異不可便謂百無一治而棄之也

黃胎舌




舌見尖白根黃是表証未罷也須先解表然後方可攻之如大便秘者用涼膈散加硝黃泡服小便澀者用五苓散加木通合益元散加姜汁少許以白滾湯調服涼膈散方見前 五苓散方見前 益元散滑石兩甘草一兩 右為極細末 每服二三錢溫水下或新汲水下

黑心舌



舌見弦白心黑而脈沉微者難治脈浮滑者可汗沉實者可下始病即發此色乃危殆之甚也速進調胃承氣湯下之 調胃承氣湯方見前

舌五十



舌尖白胎二分根黑一分必有身病惡寒如飲水不至甚者五苓散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此亦危證也 五苓散 方見前 白虎湯 石膏四錢知母一錢甘草一錢糯米撮 右咬咀每服一兩用水一盞半入糯米先煎次下諸味再煎去渣服之加人參亦可 解毒湯 黃連兩錢黃柏一錢山梔子二十 右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓熱服

舌六十




舌見白胎中有小黑點亂生者尚有表証其病之來雖惡宜涼膈散微表之表退即當下之下宜調胃承氣湯 涼膈散 方見前 調胃承氣湯 方見前

舌七十



舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘胃與命門也宜急下之服解毒湯下三五次違則不治如初服加大黃酒浸泡量大小用之 解毒湯 方見前

舌八十



舌見微黃色初病即得之發譫語者此由失汗表邪入裡也必用汗下並行以雙解散加解毒湯兩傳主之 雙解散加解毒湯 防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 麻黃 連翹 芒硝各五 石膏 黃芩 桔梗各一 滑石三 甘草二 荆芥 白木 山梔子各五 右咬咀每服一兩水一盞半加薑三片煎八分不拘時服 一方有桂枝二兩

舌九

白胎
微黃

舌十二

微黃

舌一十二

黃色
本色

舌二十二

白胎
本色


舌中見白胎外有微黃者必作泄宜服解毒湯惡寒者五苓散 解毒湯 方見前
五苓散 方見前

舌見微黃色表証未罷宜用小柴胡湯合天水散主之可下者大柴胡湯下之表裡
雙除臨証審用 小柴胡湯 大柴胡湯 方俱見前 天水散 太原甘草二兩
桂林滑石兩 右為極細末每服五錢入生薑汁并蜜各少許白滾水調服如發表
用豆豉蔥頭煎湯調服按天水散即益元散又名六一散此條
條均味分量悉同而湯引微異故複記之 前

舌見黃色者必初白胎而變黃也是表邪傳裡熱已入胃宜急用調胃承氣湯下之
若下逆必變黑色為惡証為元害鬼賊邪氣深也不治 調胃承氣湯 方見前


舌左白胎而自汗者不可下宜白虎湯加人參三錢服之 白虎湯 方見前

舌三十二




舌右白胎滑者病在肌肉為邪在半表半裡必往來寒熱宜小柴胡湯和詳之
小柴胡湯 方見前

舌四十二



舌左見白胎滑者此臟結之證邪併入臟難治

舌五十二



舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之証兼有表者五苓散益元散方見前
益元散 方見前
盡此四字 方可下也 五苓散 方見前 益元散 方見前

舌六十二




舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未罷用雙解散如解毒湯相半微汗之汗罷急下
之如結胸煩躁目直視者不治非結胸者可治 雙解散加解毒湯 方見前

舌七十二



舌見黃色而有小黑點者邪偏六腑將入五臟也急服調胃承氣湯下之次進和解毒十枚四五 調胃承氣湯 方見前 和解毒 蒼朮三錢厚朴薑陳皮各一錢甘草五分藥本 桔梗各五錢 右吹咀水一盞半加薑三片棗二枚煎七分去滓不拘時服

舌八十二



舌見黃色而尖白者表少裡多宜天水散一服涼膈散二服合進之脈弦者宜防風通聖散 天水散 方見前 涼膈散 方見前 防風通聖散 方見前即雙料湯二方合用者是

舌九十二



舌見灰色尖黃不惡風寒脈浮者可下之若惡風寒者用雙解散加解毒湯主之三四下之見黑裏不治 雙解散加解毒湯 方見前

舌十三




舌見黃色中黑至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治宜用調胃承氣湯主之 調胃承氣湯 方見前

舌一十三



舌見灰黑色而有黑紋者脈寔急用大承氣湯下之脈浮渴飲水者用涼膈散解之
十可救其二三 大承氣湯 厚朴三錢枳實二錢大黃錢三錢芒硝二錢 右每服一
兩用水一盞半入厚朴枳實先煎候熟方入大黃同煎數沸入芒硝再煎三五沸去
滓熱服 涼膈散 方見前

舌二十三




舌根微黑尖黃隱見或有一紋者脈寔急用大承氣湯下之脈浮渴飲水者用涼膈
散解之 十可救其一二 大承氣湯 方見前 涼膈散 方見前

舌三十三



舌見黃而黑點亂生者其証必渴謔語脈寔者生脈滿者死循衣摸床者不治若下
之見黑糞亦不治下宜大承氣湯 大承氣湯 方見前

舌四十二



舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大承氣湯下之熱退可愈必三四
下方退五次下之而不退者不治 大承氣湯 方見前

舌五十三

微淡
黑紅
黃

舌六十三

純黃

舌根微黑去黃脈滑者可下之脈浮者當吞陰退陽若惡寒者微汗之用雙解散
若下利用解毒湯十生七八也 雙解散 方見前 解毒湯 方見前

舌見黃而澀有隔礙者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急宜用大承氣湯下之若身
發黃者用茵陳湯瘀血用抵當湯水 脇下用十棗湯結胸甚者用大陷胸湯痞用

大黃瀉心湯 大承氣湯 方見前 茵陳湯 茵陳大黃錢山梔子枳 右每

服一兩以水一盞半先煎茵陳半熟次入二味再煎去滓溫服 抵當湯 水蛭

桃木 蝨蟲七個炒 大黃三錢 桃仁三十個 右以水一盞半煎至一盞去滓溫服 十

棗湯 芫花細碎 大戟長流水煮 甘遂麩裏 右每服一錢弱人減半以水

一盞半加大棗十枚打碎煎取八分去滓溫服 大陷胸湯 大黃錢 芒硝錢 甘遂

右以水二盞先煎大黃至一盞去滓下芒硝煎三五沸再下甘遂末溫服取利 大黃瀉心湯 大黃錢 黃連

傷寒驗證之捷法臨證用心處之百無一失

傷寒驗證之捷法臨證用心處之百無一失

傷寒書莫先於張仲景亦莫詳於張仲景其言舌上白胎者五條未嘗及黃黑灰白純紅諸色元之慈氏始以

十二舌作圖驗證杜氏增以二十四舌明醇立齋極稱之謂其與仲景鈐法相協依此用藥多效可以補仲景

之所未及其後申斗垣輯觀舌心法推廣至一百三十七圖長洲張誕先刑其重複汰其無與於傷寒者定為

一百二十圖作傷寒舌鑑余嘗索而觀之不簡不支取杜氏三十六圖足矣夫太加分晰恐有毫釐千里之差反

致左而不驗奚必以多多為善耶虛不達先生謂傷寒可以視舌識病則風暑燥濕恐亦有定法斯言也誠足

為三隅之反然傷寒雜證同異不齊若膠柱鼓瑟而不善會其意竟以視傷寒之舌色推以驗雜証之舌色鮮

有不誤是又不可不知也 乾隆甲申七月二十六日處暑錢塘王琦跋

醫家十三科咽喉居其一誠以氣之出入生死之關事賢者不可不審求也內經曰喉主天氣咽主地氣敷論篇曰心效之狀效則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺厥論篇曰手陽明少陽厥逆於喉痺咽腫症脈解篇曰厥陰所謂甚則喘乾熱中者陰陽相薄而熱故喘乾氣管空論篇曰督脈生病治督脈治在脊上甚者在下營其上氣有邪客于足少陰之絡令人喘滿不可內食又曰喘中腫不能內唾時不能出唾考內經所言喉證者凡謂藏府之氣痹著于其地而已無所謂十八證三十六證也惟雲樞癰疽篇岐伯曰癰發于嗔中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不寫寒喉半日死則類喉科之乳蛾而屬之癰疽仲景去先聖未遠其金匱玉函所載雖病並無喉症正與內經相合李東垣劉河間為金元巨手所著諸書亦不載是證獨朱丹溪有喉痺一門第以臟腑為主分經施治則亦內經之支也孟河費君伯雄得喉科書一冊于其鄉之世業是醫者題為宋真僧所遺以其篇第考之即所謂十八證也先總論病態而繼以藥後詳方證復列以藥禁忌且以甘桔湯為喉證所忌一掃俗醫誤執成方之誤是能獨具手眼者以其喉證為火毒上升用藥清氣瀉火為主即靈樞猛疽之意也其以病起何經用何藥主治即內經丹溪之法也夫善讀軒岐書者固可隔垣洞見何待檢閱之煩然則此書之作蓋為俗醫設也且為無醫設也俗醫與無醫則此書之功偉矣伯雄因憤刻之託重勸而精梓之因括其大凡于左

光緒十年三月之望上海劉至喜書于春星草堂

或曰宋有異僧者寫抗之十佛寺去時遺一書予僧啟之得是書秘不欲傳今尚有能世其術者余曰唯唯否否夫方技之書類多托于畸人逸士隱僻怪誕者流神其說以炫人耳目是書苟宋時人所作也不應有棉花瘡云云此疾元時始入中國何先數百年已能言之鑿鑿如此邪第綜其方論凡夫喉證之虛實緩急辨析造微多所依據則知非近人所能苟非宋亦不出元明間一巨手耳余先後得四五寫本改竄塗乙各不相同因即數本中排比參校窮數月之力如理亂絲不啻數琴之而數折之也今春手錄定本不敢自秘爰授之手民以求庶傳簡首仍著曰宋僧原本亦疑意爾夫豈敢神其說以炫人耳目哉是為序

總論

通治用藥

牛黃解毒丸
紅內消散

保命丹餃子
紅水消毒散

水調散
玉清散

鎖喉第一

加減別防散解毒散
加減紫胡雙解毒散

重舌第二

氣癰第三

乳蛾第四

弄舌第五

纏喉第六

啞瘰第七

骨槽第八

懸蝦第九

爛喉癰第十

熱風喉癰第十一

弱證喉癰第十二

喉閉第十三

噎食第十四

發頤第十五

懸癰第十六

喉疔第十七

牙癰第十八

用藥禁忌

丸散方藥

詳於貝母膏
百寶丹
四順理中湯
四逆湯

加減當歸連翹散
涼血地
當歸連翹散
川桂散

加減千金肉桂散
高星膏

夫喉者吾生氣機出入之門戶瞬息存亡之際性命係焉偶一受病危在須臾迫不及待所貴醫者能識受病之原與夫虛實痰火風寒熱毒之異更于望聞問中參究脈理尤為先務之急自未業喉科者全不講脈所以治之鮮效今試論之假如其脈洪大而實其人氣粗而躁此有餘之證用藥則以散風下氣清火消痰散之者荊芥防風羌活紫蘇是也下之者枳殼枳實青皮厚朴山查前胡是也清之者山梔黃芩黃柏甚則犀角黃連消痰則以胆星礞石杏仁為王若脈洪大而浮輕無力或弦緩而澀其人氣萎而靜此不足之證用藥則以涼血生血滋潤消痰涼之者丹皮白芍是也生之者生地當歸是也潤之者以仁知母花粉是也消痰則以貝母葶仁杏仁兼用山梔黃芩黃柏犀角黃連或有純是陰脈者或有純是陽脈者當以病治病脈不與焉即以荊芥防風牛蒡射干黃芩枳殼銀花獨活生地丹皮花粉為治再以保命丹或紅內消同服日用吹藥夜用噴藥無不見效更有一種熱病而服熱藥火毒熾甚而發于喉間大寒大熱痰痛不止或血脹而未伸縮不能飲食難進其脈洪定有力大便不行宜急下之若脈洪注而浮無力宜涼血行血為主若過用疎風散火之劑恐變別證最稱難治又有一種出外急走遠路脫力而傷肺氣喘息難舒以致喉痛舌脹地閣下腫突如鎖喉之狀內視之非重舌外視之非痰毒寒熱大作痰涎湧六脈洪大中空面色發黃而浮初以防風通聖散探之或效一二即以涼血生血順氣之藥治之又有似喉證非喉證者其喉亦痛牙關緊閉胸膈痛四肢攣厥作痛腹痛固受有重傷或用力太過致形血凝滯當以行血破瘀為要初起可救過五六日不治又如弱證喉痺雖是肺經之病亦有兼他經而起者何以知之假如喉間紅燥作痛是肺經火盛之故若頸項之筋有時或左或右作脹而梗氣悶不快此怒氣傷肝左關脈必洪大而弦當清肝火以舒筋涼血為主用藥則以當歸牛膝佐以柴胡黃芩羚羊若兼右關微弱而緩乃脾胃有虧須兼用白芍茯苓此肝脾與肺共病也喉間紅燥作痛甚古紫色或生刺作痛或作木乾枯是心經受虧無血榮養以致虛火熾盛且兼思慮過度鬱氣所成左寸脈必浮洪當以犀角黃連為主佐以當歸白芍此心與肺共病也喉間紅燥作痛滿脣焦裂口熱如燒或作乾嘔是胃經虛火熾盛右關脈必洪弦且緊當以山梔黃芩為主佐以當歸白芍山藥此胃與肺共病也喉間紅燥作痛夜間舌乾口苦湯水不進或有嗽而無痰更兼消精者是腎水枯竭虛火上炎兩尺脈必洪數無力當以

山藥知母黃柏為主佐以花粉澤瀉白芍茯苓此腎與肺共病也若夫肺經獨病或吐血而成或嗜酒而發或脾瀉而生氣血消散嗽重聲啞喘急痰多聲如曳鋸睡臥不得六脈洪大而浮肺部更甚當以以仁山藥貝母黃芩葶仁牛蒡為主佐以當歸白芍熟地茯苓丹皮犀角黃柏知母服之喉痛雖止然不過待日而已更有六脈沉隱神脫氣散飲食不進步復不前盜汗自汗如雨脾氣滯泄死無疑矣若年老人喉間紅燥作痛或舌上生刺或破爛或木脹言語不清六脈微洪五至有餘飲食動靜形色神氣如常此血少火熾當以黃芩丹皮茯苓熟地當歸白芍為主佐以元參牛蒡枳殼銀花花粉山藥以仁甚則加犀角黃連不同前論若小兒痘後或瘡後患此當以犀角黃連其熱毒更以涼血補血健脾之藥佐之木草參芪斷不可用此外用藥與大人相同若女人胎前患此者先以安胎為主次以涼血為佐紅內消保命丹忌用餘藥無妨產後一月未滿者當以熟地當歸補血枳殼青皮下氣元參射干牛蒡元胡索銀花消腫少加黃芩花粉以清熱紅內消保命丹可用但不具多吹藥噲藥心之如經期通未當以破血下氣之藥為主涼血者少用紅內消保命丹噲藥服之亦無忌茲論其大畧如此餘詳各條

通治用藥

夫喉證回有二十六法今余列十八證名目雖簡而治法已備要之十八證中又可以風與痰與火概之凡遇此證無論緩急只以下氣消痰為主次則清火涼血若不分先後混亂用藥貽害匪淺今開用藥大概于左惟高明者臨時參用可耳

藥用防風前胡丹皮獨活各一錢杏仁葶仁山查各三錢車前木通各八分兩劑後加山梔胆星各一錢生地二錢如火未息加黃芩一錢以保命丹紅內消同服

誤用黃連半夏生姜桂梗之類難以收功照前方加羌活獨活服幾劑自愈
牙關難開須加真北細辛一分

單蛾雙蛾至八九日方可用鍼刺出毒血未滿十日萬不可刺

或有疔瘡根腳紅內消不可用之反凶煎藥中加地丁草七八錢自愈保命丹可服

頭爛瘡毒須加象貝母草河車猴姜若日久難愈以蝦蟆一箇研好珠砂五分灌于中說裏煨研末服之自消

用藥禁忌

古有甘桔湯乃清喉之要劑今有見有患喉症者即用之而無效嗟乎此猶抱薪救火非能愈疾而更增其疾矣何以言之夫喉證乃火毒上升所致須以降氣瀉火為要甘草補中而不得火既受其補則火愈熾病愈重矣桔梗引諸藥上行藥既上行則痰與火亦引之而上行勢必喉閉壅塞乎病更加重矣故小兒驚痰大人痰火桔梗是禁忌者本草云升麻引味中清氣上升又可代犀角似乎可用不知一用其痰火與氣一齊上湧于咽喉之間四肢逆冷喘急異常為害匪淺若在他證猶或可用如鎖喉服之則不治矣半夏雖消痰石喉證痰重者誤用之禍不旋踵蓋此乃脾家溼滯之痰至于喉症有痰總不外肺中熱火何可以半夏之燥烈治之乎考姜辛辣發散雖喉證亦以發散為主然過用辛辣之味則以火益火大非所宜此五者與喉證關係甚重故特表而出之至別藥之中亦多禁忌惟業醫者當擇用之茲不多贅

丸散方藥

牛黃解毒丸 即毒藥

治一切喉風喉閉咳嗽喘急痰涎壅塞胸膈迷悶並口舌等證無不見效

牛黃 五分 青黛 一兩 冰片 五分 雄黃 五錢 兒茶 三錢 官硼 五錢 薄荷 三兩 胆星 四兩 研細末

生薑和丸如芡定大每噙一九待其自化嚥下一日夜須噙四九小兒減半

紅內消散

治咽喉一切諸證並無名腫毒已潰未潰均可使用厥效如神

大蜈蚣 去頭足切斷同末 乳香 去油 血竭 另研 雄黃 象貝母 川山甲 炒 沒藥 去油 辰砂 水飛

麝香 去毛

右藥等分惟麝香少許研細末每服七分小兒減半和煎藥同服酒下亦可

保命丹錠子

治咽喉口齒新久腫痛並解諸毒磨服神效

麝香洗去毛皮 辰砂明透者水飛三錢 冰片梅花大塊一錢 珍珠研細末一錢 琥珀一錢 山豆根一兩煎汁另用 文蛤洗淨

山豆根洗去毛皮 雄黃鮮明大塊研淨三錢 千金子白者去油一兩紅毛大戟用去蘆根洗淨培乾為末二兩五錢

右藥研末以糯米粥和山豆根汁打糊為錠每重一錢病輕者一錢重者連服二錢

胆水消毒散 切起吹藥

血竭 一錢 胆礬 一錢 雄黃 一錢 乳香去油三錢 冰片 一錢 白占 二錢 燈心灰 不拘

冰硼散 收功吹藥

冰片 一錢 硼砂 一錢 山豆根 二錢五分

玉屑散 一名五馬散

治咽喉口舌頸項破爛諸痛皆效

薄荷二兩另研 官硼 五錢 雄黃 三錢 兜茶 一錢 冰片 三分

右藥研細末貼磁餅內臨用挑少許置舌上咀含片刻嚥下日用八九次如鎖喉風口內乾枯牙關緊閉不能咀

含者以無椎水灌下自能開關生津惟脾胃弱者不宜多用

鎖匙第一

此證因風熱植于胸膈或酒色及鬱怒所致其狀喉上下左右紅紫腫痛或帝丁焦黑腐爛頸項浮腫痰涎壅塞聲響如潮氣急發喘眼目直視額上有汗如珠身汗如雨或泄瀉清水四肢厥冷或腰脇疼痛肚腹脹痛法在不治痛脈六七至不論大小至數分明雖甚危險十中可救一二或脈洪大或沉細惟三部混亂即形色神氣如常終為難治初起用吹藥噴藥痰多以萬年青根搗汁和醋攪去痰涎或土牛膝汁或青魚胆汁俱可

加減荆防敗毒散取洪大七至用之 荆防風牛等連翹胆星獨活前胡枳殼蘇子蔓仁杏仁生地黃芩黃柏山梔元參加

原枝燈心二十根長流水煎和保命丹同服大便不行去荆芥防風加枳殼青皮大黃

加減紫胡雙解散取沉瀉或三至用之 紫胡前胡羌活獨活枳殼枳實川芎青皮蔓仁杏仁蘇子長流水煎和保命丹同服

冬月加麻黃

脈七八至而浮洪頭面皮肉浮腫色微紅涕淚交流語言暴澀或以防風蘇子銀花牛蒡杏仁姜仁枳殼枳實胆星
青皮黃柏黃芩山梔元參和保命丹同服亦有獲效者

服劑防敗毒散後肺管脹塞兼咳嗽者即如生地當歸白芍

服敗毒散一劑喉證遂減惟胸膈脹痛牽引脊背再服之即除服三黃湯亦有全愈

蜈蚣同白梅搗爛和丸噙之每見有效

誤用大黃巴豆瀉利不止喉證雖愈而胸膈脹悶飲食不進醫復誤作他證治者死

重舌第二

此證因平日喜食炙博熱毒之物積熱攻于心脾二經所致其狀舌下腫突生一小舌久之大舌及縮短或脹而紫
言語不清飲食不下微作寒熱口中清涎極多即用銅匙將舌捺定用三枚針刺大舌兩旁及舌下津液玉液兩穴
各一針可五分許再刺小舌兩旁或出紫血或待清涎盡方進吹藥論無次服煎刺自安

藥用荆芥防風連翹獨活前胡射干胆星枳殼元參生地黃芩黃柏銀花化粉長流水煎如刺破清涎出盡亦有弗
藥而愈者

氣癰第三

此證因惱怒傷肝肝血不和以致肺氣壅塞火熾上升發于喉間其狀帝丁之上紅腫作痛或有連及兩邊者寒熱
大作初起不宜刺破待六七日後方可針刺或有誤服升提之藥竟不能愈者或有服保命丹紅肉消其毒自出者
如痰多則以醋搗之強進飲食為妙否則恐變輕為重

藥用荆芥防風射干牛蒡連翹烏藥胆星前胡枳殼元參黃芩銀花長流水煎痰多加萸仁氣重加枳實青皮
大便不行加黃連甚則加大黃

乳蛾第四

此證因嗜酒肉熱物過多熱毒積于血分兼之房事太過腎水虧竭致有此證其狀或左或右或紅或白形如乳頭
故名乳蛾一連腫曰單蛾兩連腫曰雙蛾或前後皆腫曰腐作爛曰爛頭乳蛾初起必作寒熱用保命丹紅肉消兼

前刺治之

藥用荆芥防風射干牛蒡前胡枳殼連翹膽星生地丹皮元參黃柏黃芩銀花長流水煎如火盛加犀角黃連大便閉結加大黃寒熱不止加羌活獨活體虛痰多加杏仁杏仁貝母

有一種名根脚喉風其證日行一穴至七日行七穴喉間發泡時欲嘔吐或一年一發或半年一發或一二月數發根留于中不能盡去一時難愈或云先從脚跟發起至于喉間亦名脚跟喉風發時在左則左足酸軟陰痛有似筋觸掌入喉間在右亦如之治法同乳蛾證亦相似

今人每見發有紫泡以為毒物即用刀鍼割之豈知病之初起毒氣熾盛發之于泡若刺之出血非但不能愈疾加之破傷則病益重矣

或問曰亦有用刀鍼而得愈者何故答曰彼病勢淺火毒不重刺出血少則愈者其偶然耳倘病勢已深火毒極盛設以刀鍼刺之其誤事也可勝言哉

或以寒熱大作謬認感寒即用生薑半夏喉痛甚蓋姜夏喉證所大忌也

詳前用藥忌

弄舌第五

此證因風痰久積于內或勞役過度而生其狀舌出過唇不能言語患者以手時弄其舌故名初起用青魚胆汁攪去其痰宜以小布鍼刺少商穴在手大指內側之端去爪甲角如並兼許白肉際乃脾經穴也出血者易治出黃水者難治腫不消者亦難治藥用枳殼枳實牛蒡連翹射干青皮蘇子胆星防風生地犀角黃芩山梔銀花長流水煎

舌捲縮而不能言因乎風寒也舌長寸許而不能收因乎房勞也舌腫滿而不能消因乎七情也舌根腫脹者謂之重舌腫而不柔利者謂之木舌初起宜其醫治遲則不救舌腫滿口痰涎極多亦木舌之一種前方重加大黃芒硝下後自愈

纏喉第六

此證因風痰濕熱久積于內或食炙博厚味太多或房勞及抑鬱所致其狀耳下紅腫漸趨項下及結喉之間一邊青腫而連者重喉內帶丁左右帶丁如蛇盤之狀有黃白二色黃為黃纏白為白纏急且刺少商穴出血詳見次用

吹藥滿藥男子延至結喉下不治女子延至胸膈不治喉中聲響如雷者不治頸鼻有青紫氣頭低夜如膠者不治
藥用荆芥防風羌活獨活枳殼連翹胆星姜仁車前紅花丹皮黃芩元參前胡牛蒡銀花長流水煎和紅內消同服
再下保命丹服藥至四五日加當歸白芍生地黃柏土貝母其效甚速

喉癰第七

此證因風寒塵滯于咽喉之詞其狀口不能言牙關緊閉即用蟾酥化水滴鼻內即開仍以玉屑散吹之再將鴛翎
探入喉中搽去風痰即能言矣先連牛黃解毒丸次服荆防解毒散連進二三劑自愈如面紫舌青唇紫鼻流清涕
目赤多淚八甲俱青者不治

膏槽第八

此證因憂思鬱毒交乘結聚于太陽經絡或則恚怒傷肝致筋官緊急慮傷脾致肌肉結腫膏厚味致體
多臭穢其狀始于年項皮膚間隱隱有核漸如牛大便覺腫痛初則堅硬不消久則延爛難愈甚至齒牙墮落牙床
腐穢俱在不治初起先用鴛翎探吐風痰次以陳艾炙耳垂下五分七壯再服煎藥加減當歸連翹枳殼生地銀花
射干胆星赤芍元參牛蒡元胡索黃芩丹皮長流水煎

懸頭第九

此證因上焦熱毒結積風痰壅塞而生其狀上唇腫垂形如蛙腹或如雞卵咽喉閉塞痰涎滿舌初治用鴛翎探吐
風痰次以吹藥噲藥及荆芥散毒散加減日久服千金內托散

加減千金內托散厚朴荆芥防風連翹羌活獨活白芷胆星枳殼元參蘇子杏仁姜仁葱白

爛喉癰第十

此證因棉花燈毒未盡而結于咽喉其狀固圍紫漸至腐爛爛上則鼻平腐爛下則飲食難進多致不救初起不
覺或十日半月始知當以清熱涼血補脾為主佐以自營丹二三十服在虛弱痰多嗽重聲啞者不治

藥用生地花粉黃芩白芍黃柏丹皮銀花元參牛蒡射干防風肉桂散弱者加茯苓嗽重如山藥以仁知母姜仁杏
仁熱甚加犀角黃連十劑後服生羚羊貝母膏

實用犀角羚羊角丹皮各八錢當歸元參各五錢黃芩黃連黃柏防風射干荆芥各三錢牛黃八錢枳殼連翹各六錢土貝一兩茯苓以仁化粉各五錢煎汁約四大碗濃澤將汁再煎如稀糊納煉蜜半斤收貯磁罐日服四次在卯巳未亥四時每次半匙以燈心湯攪和送下忌生冷發氣之物薄弱者去黃連花粉加白芍陳皮石斛慈心砂仁湯送下如合丸藥去黃連羚羊角荆芥防風日進二次每次二錢

百寶丹牙皂一兩銀花三兩硃砂五錢研細末每服六分以冷飯塊三兩水二盞煎至盈半分作二服服在巳午兩時須二十餘服方能見效食時多服豬油麻油以潤肌膚臟腑忌茶酒牛羊麩食蔥蒜等物

熱風喉癰第十一

此證因勞心過度血衰火盛而致其狀喉間紅筋紅燥或帶丁雨等徵有疔瘡一起即覺非弱證喉癰可比時作寒熱若食熱毒之物而起不作寒熱于此為別

涼血地黃湯生地黃丹皮牛膝元參防風荆芥黃柏花粉赤芍火甚加山梔或犀角黃連

弱證喉癰第十二

此證因酒色過度或勞碌憂鬱所成其狀喉間紅筋紅燥蔓延而生津嚔疼痛夜間發熱口燥舌乾六脈洪數當以清熱補血為主若動靜飲食如常形色精神不脫無嗽無痰乃血分有熱須涼血破血不宜用補如嗽重聲啞痰多及盜汗不止者不治藥用白芍丹皮黃芩當歸元參生地黃柏銀花花粉大力子初起亦加荆芥防風連翹枳殼病久去之嗽重加知母射干胡土貝杏仁杏仁甚加紫胡黃連心火甚加厚角黃連肝火盛加羚羊角泄瀉加白朮茯苓腎水枯竭加山藥澤瀉枸杞子五味知母停散作嘔加砂仁虛甚加山藥伏苓當歸倍以白芍

喉閉第十三

此證乃寒邪直中下焦逼其無根失守之火發揚于上以致咽喉卒然喉閉四肢厥冷六脈沉微但必下利清穀口燥咽乾而不思湯飲方是寒證急宜刺少商穴出血註頭再服蔥熨若口燥咽乾而渴與此霄壤矣

四順理中湯人參白朮甘草乾姜

四逆湯附子肉桂甘草乾姜

倉食第十四

此證乃熱毒積于心肺二經咽喉乾燥而無津液是以喉中作痛而倉食難下也急用當歸連翹散加大黃利之若治稍遲則有飛尸癆瘵之患如痰喘治以川桂散加吳茱萸五七粒服後覺心肺悶刺痛仍用當歸連翹散

當歸連翹散當歸生地黃芩連翹山梔枳殼羌活防風荆芥按當用芥穗加減法

川桂散按此方原本藥品未載

發頭第十五

此證或傷寒發散未透餘毒積于經絡有與傷寒同發者有不與傷寒同發者其狀耳後紅腫頭重體倦急用千金內托散治之外散而星散若發于耳後一寸三分或鼻中流涕咽喉閉塞痰涎壅聚法皆不治而星膏按此方原本藥品未載發于耳後名發頭發于腮邊名穿腮發于地閣下名穿喉皆傷痰毒初起破血消痰降氣其後涼血生血涼陰降火惟燥熱之藥斷不可用刀鍼圍藥膏藥並忌吹藥嚼藥多用為妙

發癰第十六

此證乃脾家熱毒外感風寒而成其狀急于上脘生一紫泡垂下抵舌疼痛異常口不能言舌不能伸頭不能低仰面而立鼻出紅涕若不速治毒入于腦即死急以小刀刺破癰頭出盡紫血不可嚥下用菊花湯漱淨先以菊花葉搗汁一盃和酒送下次進牛黃解毒丸煎以荆防敗毒散加地丁半枚連薑效

喉菌第十七

此證因食膏粱炙煖厚味過多熱毒積于心肺二經上蒸于喉結成如菌面厚色紫軟如猪肺或微痛或木而不痛梗塞喉間飲食有碍須以針刺出紫血者可治鮮血者難治日刺日有漸如蜂窠者不治

藥用犀角黃芩丹皮僵蠶射干連翹銀花紅花生地黃連黃柏枳殼獨活元參赤芍大力子

或年幼之人患此不疼痛者當以丸藥治之日久自消切忌刀針藥用丹皮獨活防風連翹紅花生地荆芥射干牛蒡前胡枳殼山查犀角銀花花粉山梔黃芩黃柏元參元胡索蜜丸日服二次每次二錢用開水下

牙癰第十八

此證因勞心過度或食熱毒等物鼓動陽明胃經之火發于牙齦其狀如豆大或如指大紫色腫破疼痛難忍或頭
疼發熱惡寒先服紅內消次進荆防敗毒散和保命丹同服吹藥喻藥多用初起發散後則涼血如不愈乃是體虛
常用黃耆白朮當歸柴胡陳皮熟地丹皮芍藥黃芩石斛元參牛蒡山梔

凡牙痛或左或右痛無定處者煎藥亦治若誤服發散其痛更甚以水醋各半和熱水嗽之即止

余素未習醫咽喉一症尤屬茫然今年正月余三兒自至感注大令處染患白喉延同鄉某申醫診治據云此
喉痺也切不可破破則不治方用牛蒡桔梗僵蠶杏仁荆芥防風等藥一劑而汗出痰鼻塞矣再劑而熱退然
音啞矣又延診之則曰邪退其半矣以前方略加增減一劑而白塊自落矣再劑而鼻流鮮血矣大延診之則
曰邪皆外出矣又以原方去荆防杏仁加射干黃芩一劑而喉外展腫再劑而喉內全爛且頑痰上壅膏節漲
滿神志煩悶睡寤恍惚始知藥誤急改延某乙醫來視曰誤服表藥受患過深不可救矣姑以龍虎二仙湯灌
之卒無效未幾而汪之女及婢相繼患此鑒于甲醫之失不敢服藥用老嫗挖去白塊出涎血升許事愈幾不
解其何理嗣于友人處假得鄭梅湖先生重樓玉鑰一書閱之乃知白喉一症只可滋陰不可發表甲醫所用
之藥全在禁忌之列而鼻塞音啞與白塊自落鼻孔流血皆為誤表不治之症惟不可破一語則與甲醫相合
更無解于汪氏女婢之因破而愈也方思攝其大要刊布流行免世滋誤乃未一月而汪君亦病此仍不敢延
甲醫亦倩老嫗掘破而病不減另延某丙醫診治其所用藥與重樓玉鑰中所載養陰清肺一方大同小異因
未大效又復倍用生地惟尚不免有一二禁藥挽入服更不效病家以為生地之誤又另延一僑醫者全用藥
表散連劑並進而種種敗象一時俱見知為內陷仍歸咎于養陰亦改延乙醫觀之並未出前方相示乙醫以
為症由風邪失未表散亦投蠶蟬苦菊等藥竟不救余時亦未見僑醫之方近始索觀而知當日但謂病有兩
歧藥難一致前所欲摘要刊布者至此遂不敢下筆矣又一月而余妻亦病始則骨節疼痛渾身發熱時聞乾
痛而無白點乃立意延乙醫診視以其向治喉症類能分別透澈必可辨悉病源乃診脈象云是浮緊惡條風
邪鬱壓表散然一劑而音啞再劑而氣逆似覺不合適有某丁醫過訪請其覆按覆然曰此白纏喉也如何可
表連服養陰清肺湯方可補救時熱尚未退探視喉間微有白象余以乙丁之言迥然相反注無辜後乃齋沐
設壇敬請

洞主仙師刊斷所語悉如丁言並示白喉斷無發表之論命于養陰清肺湯中加蠶食過黃菓孔多者三片青麟丸
五分為引一劑之後即照原方不必加引至愈而止當即遵服次日即大解一次色赤黃並發斑疹遍體皆是

此種斑疹乃白喉症候有係喉痛見功浮邪外出乃是此時熱已全退而喉間白塊過滿矣余格遵

仙諭始終守方五日而瘳長次兩兒次第傳染審其情狀延亦相同深信不疑即以養陰清肺湯投服或便沾痰或

發斑疹服三劑而熱清喉間均稍寧白點不移時而退盡竟未大發乃堅信養陰息表四字為治白喉者應切

不磨之論乙醫為余年交長虛心而善悟見此不覺五體投地爰復迭次虔請逆覽實疑得

頌箴諭並命作表以喚迷津前後共三百餘言一片婆心流溢行間字裏自此濟人有術所活莫止恒河沙數哉

仙師廟在奉天前于戊子歲在奉降壇勸賑凡助賑求方者莫不藥到病除神妙不可思議偶立方論洞澈源流決

非凡手所能夢見此論一出歧黃家當可奉為金科玉律不致再入歧途爰敬錄之並將張善吾所著提要書

中語之相合者分注于下刊印行世焉

洞主先師前論 答耐修問

白喉古無此證故少專書世稱難治然非難也未明其理耳人但知肺之灼而不知由于胃之蒸人即知胃之熱而

不知由于腸之寒腸寒則下焦凝滯胃氣不能下行而上灼于肺咽喉一綫之地當其衝終日蒸騰無有休息不

急治與治之不當則腫且潰潰且閉矣捷要云白喉初起惡寒發熱頭痛背脹通身骨節疼痛喉內或極痛或微痛

點白喉白地甚至滿喉暗白者所治皆同治之法惟有以厚重之藥鎮其上層如以巨煎益鼎使熱不上騰復以清涼之藥潤其下層

如以濕棉禦火使火不內射極盛者再掃除其中宮以抽薪新開通其下道以漏炸灰醫者之能事畢矣夫自上至

中至下本有可通之路而必開其旁門反使四塞左矣邪毒之內蘊火也實烟也尋常表邪輕烟而已此則如蠻雲

毒霧紛紛鬱鬱一經表散僅能紛亂于經絡之中而不能透出于皮毛之外愈入愈深有入無出迨自知其誤翻然

改計不先追其藥毒而徒盡其當然無益也解表藥之毒春用蠶食過桑其孔多者三片夏用荷花蒂連殼者七個

秋用葶藶苗稍黃者九枝各寸許冬用生青果核磨汁或打碎五枚不必拘定四時但有現成鮮者可用即用之如

入養陰清肺湯中為引一劑後照全方服不加引捷要云如有辨症未清誤服升提開散辛溫之劑視病之輕重以

一脫先服後服藥則誤服之劑即能解除矣等語如以上四引不現成即用此法亦效此症起時發熱者多症之輕者脈不甚洪定初不見白醫者不察往往

誤為風邪用表藥而熱退方謂其效也及白點既見而病已增重大半矣捷要云白喉初起惡寒發熱乃毒氣初作

不服表藥其效亦自退也。如至改服養陰一二劑而不見速效，又復及覆改圖一誤，再認病其有不殆者乎？故誤症既的，尤以守方為第一義也。按要云：如有內熱及發熱，服方服去其熱，自除即白，有仍勿改，而表散愈謂風邪之症，亦宜清解，亦不宜于表散表之過當，不外出而內聚，勢為易也。且立意不用表藥，則中下之醫不能辨症于初起者，亦不致大誤而殺人。王鑰書中忌用諸藥，出于名醫手足，人嫌其選擇之過泥，吾猶謂其徵引之未全細，卒升麻桂枝蘇葉之不可用，固不待言，即雞驚蟬退馬勃守品治喉家所奉為至寶者，皆殺人之具也。各宜守之，如屬禁視之如敵，毒庶不誤矣。查汪某之病，亦是白喉，禁不誤于前，此之滋陰而誤于後來之表散，況黃芩一味涼入細數，獨投炭于瓶而嚴覆其口，火雖滅而烟留，再以厚重之藥並用，而鎮之愈塞愈緊，非特不能交濟其功，抑且相助為虐，其毒至死而不能出者，職是故也。至其女與婢之病，亦均經喉，惟係輕者，當體氣感故以挖破而效然，非通法不可為訓。若以治弱人則頃刻而靡矣。汪某之病，胡獨不誤于此耶？三郎所遇之醫學淺性泥更不足道，當其未診之初，白塊已遍滿，但稍經涉獵者即可辨認，況行道有年而猶妄用表散一再不已，是何故也？至三日而無效，已深難有神仙亦不能救，甚矣牛蒡射干等藥之為禍烈也。耐修此數端，聞吾言之大旨，當可明曉其擇近時喉症書之近穩者，細觀各方中之用藥，刪其應忘之品，不可容留一藥，以可用者分為正將、猛將、次將、三表，每表分作四層，上層為鎮藥，如龍胆草、石膏、生地、元參之類，次層為潤藥，如瓜蒌、貝母、丹皮、天冬之類，又次層為消藥，如厚朴、神曲、枳殼、麥芽之類，下層為導藥，如大黃、元明粉、車前、澤瀉之類，約藥四五十種，按症輕重分別施治，亦已足矣。其中消導之藥非熱極便結不可輕用，但能鎮潤得宜，則中下自會通暢，不可不知。表後列忌用諸藥，添入前人漏列者七八種，注明害處，俾盡人一目了然。然胸有成竹，設遇醫書開方，觀其所用之藥，如有不列于藥隊者，以及妄用禁藥者，或病輕而施用猛將者，皆不可服，更以服禁藥後所現不治症象，臚列于後，庶可觸目驚心也。稿成見質于吾，尚有要言。

遵定藥將三表

徐乙乙醫
某君書正

三將之中，以正將為定法，而以猛將取其重，次將取其輕，四層之中，又以鎮潤為定法，而以消藥去其滯，導藥利其行，鎮潤之中，又以養陰清肺湯為定法，而以他病藥濟之，偏頗輔方之不足，審定主賓，因症施治，若網在綱，有條不紊，至于禁忌之藥，萬不可以一試，即偶雜一二于良藥之中，猶致全壞，環沈專恃之，以為定法乎。

其不現種種敗象而遍問以覽者鮮矣法戒具備行道者其詳而審焉

白喉正將此係大中至正之藥極難極效難中下層

上層鎮藥

次層潤藥

中層消藥

下層導藥

大生地

天冬

大木通

郁李仁

元參

當歸

神曲

知母

煅石膏

白芍

焦查肉

生土牛膝兜

麥冬

丹皮

陳皮

澤瀉

貝母

砂仁

青甯丸

薄荷

生甘草

養陰清肺湯日服二劑重者日服三劑若病勢無增即

大生地 一兩

麥冬 六錢

白芍 四錢

薄荷 二錢

元參 八錢

丹皮 四錢

貝母 四錢

生甘草 二錢

此方乃治白喉之聖藥然凡柱顛扑不破其中但有鎮潤而無消導蓋所謂鎮潤而無消導蓋所謂鎮潤得宜下

元自會通暢無所用其消導也分兩悉脫原方不可輕重小兒減半守方服去自然全愈切勿中改如喉間腫甚者

大便燥結數日不通者加青甯丸二錢元明粉二錢 胸中脹悶者加神曲焦查各二錢 小便短赤者加木通一錢澤瀉知母各二錢 燥渴者加天冬馬兜鈴各三錢 兩赤身熱或舌苔黃色者加銀花四錢連翹二錢

白喉猛將非極重之症以及誤服禁忌之藥則見效矣

上層鎮藥

次層潤藥

中層消藥

下層導藥

龍胆草

瓜蒌

中朴

生大黃

生石膏

生梔仁

枳實

元明粉

犀角

連翹

萊菔子

川黃柏

馬兜鈴

藍草根

神仙活命湯

重者日服三劑病病
減仍服養陰清肺湯

龍胆草 二錢

元參 八錢

馬兜鈴 三錢

板藍根 三錢

生石膏 五錢

白芍 三錢

川黃柏 五分

生甘草 一錢

大生地 一兩

瓜蒌 三錢

生梔子 二錢

凡白喉初起即極疼且閉飲水即噎眼紅聲啞白點立見口出臭氣者方可照此方煎服或已延誤二三日症已危

急或誤服表藥現出危象非輕劑所能挽回者均須此方以洩其毒如有芒刺諸語神昏者加犀角二錢大便閉塞胸下滿悶者加中朴二錢枳實二錢

閉者再加枳實二錢生大黃二錢小便短赤者加知母三錢澤瀉二錢車前子三錢

白喉次將之症皆以此等藥清解之切不可於表劑不可收

上層鎮藥

次層潤藥

中層消藥

下層導藥

次生地

金銀花

小木通

車前子

粉葛根

冬桑葉

枳殼

燈心

蒼根

炒麥芽

蓮子心

枇杷葉

竹葉

紫苑

柿霜

陰瘟化毒湯

日服一二劑如症加重即服養陰清肺湯

粉葛根 二錢

金銀花 二錢

枇杷葉 一錢五分
去毛蜜炙

次生地 二錢

薄荷 五分

冬桑葉 二錢

小木通 八分

竹葉 一錢

貝母 二錢
去心

生甘草 八分

白喉初起症象輕而白未見即服此方俟一見白象白起時甚顯即改服養陰清肺湯勿違誤如不白即

白喉台去

次將 禁藥 敗象

三

上海錦章書局石印

此方均勿發表如大便閉者加瓜蒌二錢即李仁二錢 胸下脹滿者如炒枳殼

以上三方加味各法均須隨時斟酌若見症不甚重者或于所備二玉味中酌加一味或以分兩減輕庶無偏誤

白喉一切禁忌之藥白喉初起發熱居多往往眼此等藥而

麻黃誤用音症

桑白皮牌已虛

紫荊皮破血不

杏仁苦降不

牛蒡子通十二經

山豆根不可

射干

安用

天花粉不宜

羌活過表不

荆芥不可

防風不可

黃芩過降不

桔梗

宜用

柴胡升散不

前胡發散不

升麻升散不

薄荷不可

蟬退升散不

桂枝

辛散不

細辛辛散不

蘇葉不可

馬勃不可

蘇胡以下此次所增玉鑑論中有凡語喉症四字可見禁用此等藥不獨白喉也

白喉誤服禁忌諸藥所現各種敗象白喉症論中但指為無治之

七日滿白不退

服藥大便不通

頷下發腫不消

服藥嘔吐不止

音聲鼻塞

鼻孔流血

喉乾無涎

白塊自落

天庭黑暗

兩目真視

面唇俱青

角弓反張

痰壅氣喘

汗出如漿

藥不能下

肢漲神倦

以屬回以上各象重者用猛方輕者用正方

未服藥大便泄

用生地五錢參冬三錢丹皮錢半元參二錢半薄

服藥腹泄不止

用酒炒生地二錢麥冬二錢川貝二錢白芍二錢

洞主仙師後論 答乙賢某生問

白喉初起發熱此時鬱勃之火全集于肺胃二經故脉象未有不浮緊者迨熱退白現而肺虛之本象見一是始有

塌陷之形某生所見各症大半在二三日之後故僅知其塌陷而不知其先必從浮緊來也要車蠟疔亦屬子裏凡

肺之本色上現于喉始有此象豈有皮毛之症而能顯此形多于吭舌之間乎惟肺氣虛損未形故脉象浮緊之日

多輕者皆用表散尚不至于大誤或症本重或表散過當勢亦至于虛敗而脈塌陷表而愈者其暫表而誤者其常

故不如養陰而兼清解為速效而無弊也證異治同世醫有不言之者乎彼處云雙車蠟疔治之禍誠則其間不起

黃與白喉症異治同端不攝防轉為白喉為禍宜用生土牛膝引熱行大便閉結用大

甚室寒者既鎮且潤火毒自駁駁而下行原無所用其消導若火毒結下焦不通其勢不能不宣洩之蓋既鎮之

不使上行潤之不便旁達倘不入于胃不入于腸將安歸乎某生所謂恐毒陷胃者尚非探本之言按要云煩從上

中氣引至下焦從大小腸膀胱而出大便若其消而不消宜導而不導或消導而未能得宜既不能上又不能下則

惟內陷于胃而已矣耐下達之故並非流注之誤其症原必全歸腸胃大如無分而無須過慮此時鎮潤之

力已足謂開一勝即不可復救言更甚于初起時之表散汪病即誤于此至不上熱下寒者宜以熱藥冷服此指真

寒假熱而言白喉之症係真熱假寒何所忌于寒涼乎火毒既攻于中上則下元不寒而自寒朴曲查麥固皆帶溫

之品輔以清降之藥引使下行本最有益若熱極盛則非硝黃不足通道路猛藥疾馳而下裏熱以行性不流通腸

胃何致受病猶以一器盛沸湯而真水塊于中傾入一冷蓋內水熱固以大減而以手按冷蓋則反涼為熱矣此借

敵作導之法用其得熱以為行熱固不害于腸之假寒也惟非極險之症不必輕用此猛藥耳向來治瘟症者有涼

降無表散白喉乃溫症中最重之一端敵兵已至城下重兵以圍之猶慮不勝尚能以談言微中解其紛乎故諸溫

症中尚有參用蠶蟬苓桔荆防諸品者若用之強兵壓境如白喉勢直同于玩敵矣有不滋蔓燎原者乎故鎮之者

重兵以抗之也潤之者恩言以勸之也威德並用敵可解矣而猶未濟則惟有直掃其老巢仍留其歸路敵自不逞

而退矣此百戰百勝之法也若升提之則火以扇而愈熾表散之則火以分而愈多即或不然用清涼平淡之品以

澆洒之不能息其鼓抑且揚其烽而上下左右莫不受害矣其猶可剪除扑滅乎擬表安適二表之後可各立一方

正將後用養陰清肺湯此方出自大名醫之手不特藥味不可移易即分兩亦不可重輕如生地本條一再如用一

兩二錢則加二成如用八錢則減減八折是也人體有強弱病有重輕則藥不能無增損但原方如病有偏頗則

配分兩不可偏時耳玉輪原方本僅五成之一嫌其太輕不足敵病茲舉數方定數用者酌之如病有偏頗則

擇三表中應用之藥加一二味以為引足矣總宜以此方為坐守之考嘗決無喪師失律之大辱惟誤一二禁藥于

其中則害且變本而加厲慎之慎之某生欲以白芍易桑葉此大不可桑葉固有時可加白芍則萬不可去夫五臟

之密通肺胃者惟心與肝不有以護之害且立至白芍乃固守心肝之要藥具見立方者之苦心豈且移動耶猛將

後按神仙活命湯去其禁藥增猛潤藥以足之次將後按除瘟化毒湯去其禁藥增以潤藥以鎮之凡鎮藥宜重用

潤藥次之消導藥宜輕用猶之軍行為望但有一人一騎以為鄉導足矣多則紀律不整反滋事端三表中則猛將

宜輕用正將宜重用次將亦宜輕用蓋正將守其常接將出其變而次將用于暫也神而明之在乎其人吾言亦盡于此矣此症本不難治治之不善而種種敗象見非此症之本家寔投其藥者有以造成之也與生而致死同一戕幽微氣不能透因而逼覺其心不即死也故死于此症者最慘行醫者當思患病之人或為孝子之父母或為慈親之子女或為待育之壯丁或為守成之家督或為無父之孤兒或為數家之獨子當其病劇呼天籲地拜佛求神無所不至一經不起合門長幼痛哭失聲肝腸寸斷抱此奇慘而言及醫案猶以本有割股之心相諒置不與爭故醫者雖殺多人終不能自知其失然受害者諒之愈深遠孽者積而愈重雖曰無心而漫不經心之罪豈能擢髮數哉若一朝誤治退而深思以期萬一之當則死者雖不能生者猶可不死乃有始終執拗于一偏人命之大惜焉不加察吾不知其本心之仁要在自有此論而猶有固執己見視人命如草芥者直以有心殺人陰律有所不貸吾亦末如之何也已矣歐陽公曰求其生而不得則生者與我皆無恨高言治獄也而吾謂行醫亦然再定一吹藥方以成全璧

白填鴨散

此方以血內沖和酒金石寒則滋養于金水二令之調

虛實宜宜攻補無礙可殺命于身於時切勿等閑用過

用純白公鴨一隻自霜降日起每日用麩麩和蝸牛地龍柳霜瓜莖霜古錢醋煨為末各等分

卯酉時各填十二個關閉籠內不使多走所遺之糞另以一器收好至小雪日交節之日宰取喉頭骨連管肺管

及肺平時以刀刺取勿置瓦上培乾為灰存性另以一月內所遺鴨糞用清水漂去其垢澄去土土至淨為度帶水

研至極細澄定滲去水亦置瓦上培乾為炭存性與前灰置一處其研細末加蝸牛培黃四十九箇用舊壽州烟斗

口門七個用為起處一洗淨烟漬火上微烘二物同研極細再與兩炭合研拌勻磁瓶封固置依潮處以去火氣臨

用時加入米片礪砂人指甲蝦人中白鴨膽礮礮五種細末各少許此藥三頻頻吹之雖已閉之喉猶能開通

一錢即以蜜水沖少許服亦良佳真萬金之聖藥八洞之秘方也

此論專為濟急而設糾纏而設至善後之方用當歸茯苓玉竹女貞等藥時醫優為之吾可無須鏡舌矣

耐修子曰敬讀前後二論知昔人論白喉者以鄭梅湖先生重樓玉鑰所載最為謹嚴細慎特寥寥數語未能剖悉源流行醫家每多未見即見亦習焉不察耳近有專刻其卷除清肺一方印送者按此施治全活最多至

張善吾白喉提要蕭海雅白喉證論雖亦主于養陰清肺立論多中肯綮而所立各方中如種蠶蟬蛻且根黃
芩牛蒡馬勃諸藥猶未盡去時賢宗之流弊尚不能免此論一出誠如赤日當天無微不照利濟羣生豈淺
鮮哉余在奉天隨時賑埋一載習聞緒論而白喉秘旨及今始得聞之若早明此理三兒可不至死然猶幸余
妾之轉危為安長次兩兒之獲治即愈也北地此症盛行不救者大半皆服表藥之誤其得愈者皆守玉鑰書
中養陰清肺湯方者也如或攪入一二禁藥者雖服此而亦不治今得此論流傳家謝戶曉則此症雖危弗危
矣乙醫男子知過默契慈心下醫決于當幾暗合妙旨皆為當時賢者即如甲醫之久執一偏丙醫之未達一
聞苟見此書必當廢然思返油然有進堅持此意立心活人安知不終為

仙真所許可哉姑皆隱其姓名云光緒辛卯五月敬跋

子午香室主人曰白喉一證罕有能言具詳者即時醫中認症無差用藥不誤者亦但能行其當然而不能知
其所以然彼妄投表散殺人如草者更不知此證為何物矣此書一出使數十年之翳障昭若發矇上馬者可
臻變化之神下馬者更不致有歧途之誤即不行醫者按此治人或以自治亦可十不失一矣此症盛于北數
省有志濟人者能刊印流行遍及窮鄉僻壤其活人功德當不在散財施粟下也

善哉
壽民曰此後億萬人胸中各有養陰志表四字在則患白喉者皆可免倉皇無主之虞亦可免胡亂求醫之誤

乙醫曰其服養陰而未能速效者乃不知加味與加味不當之故宜細察其症之輕重照方後加味法斟酌施
治無有不效切勿改圖以致倚事間有服表散而若有效者乃體本壯或在本輕尚未受其症誤非藥之功萬
毋據其偶然者以為法余服膺

明訓嗣此謹守弗失願海內行道者共佩之幸甚

白喉症治養陰志表歌括

志表抉微書已成快復作是歌以便記憶刊此印布更易為力仁人廣傳功德無量

養陰清肺湯始終要守方隨症酌加味連服效自彰

養陰清肺湯 大生地一兩 麥冬六錢 杭白菊四錢 薄荷二錢 元參八錢 貝母四錢

丹皮四錢 生甘草二錢

此方為白喉大中正之藥不可妄擬增刪初起發熱者照方服去其熱自除即白加甚仍須守方如發斑疹

條藥見功始終服此至愈而止重者每日三劑輕者二劑切忌妄用表散 如胸下漲悶者加神曲二錢 焦查

二錢 大便燥結數日不通者加青膏丸二錢 元明粉二錢 小便短赤者加大木通一錢 澤瀉二錢 知母二錢 燥

渴者加天冬三錢 馬兜鈴三錢 面赤身熱或舌苔黃色者加銀花四錢 連翹三錢

如有脾泄之症勢甚兼顧脾土須酌為加減另立藥方

未服藥大便泄 用生地五錢 赤芍三錢 丹皮一錢 五分 元參二錢 五分 薄荷七分 加蒼香一錢 五分 砂仁二錢 研沖 炒麥芽三錢

服藥腹瀉不止 用生地酒炒二錢 麥冬二錢 川貝母二錢 白芍二錢 五分 甘草一錢 加蒼香一錢 五分 砂仁二錢 研沖 炒麥芽二錢

若過極重症或被表散誤神仙活命湯冀可得生路

神仙活命湯 龍膽草二錢 元參八錢 川黃柏一錢 五分 板藍根三錢 生石膏三錢 杭白菊三錢

生梔子二錢 生甘草一錢 大生地一兩 瓜蒌三錢 馬兜鈴三錢

凡白喉初起即疼痛且閉飲水即噎眼紅聲啞白點立見口出臭氣者方見險此煎服或已延服二三日症已危

急或誤服表藥現出白象非輕劑所能挽回者均服此方以洩其毒重者日二劑至症象見輕仍服養陰清肺湯

慎勿改服表散 如舌有芒刺謔語神昏者加犀角鎊二錢 連翹二錢 大便秘塞胸下滿悶者加中朴二錢 枳實

二錢 便秘甚者再加萊菔子二錢 生大黃二錢 小便短赤者加知母三錢 澤瀉二錢 車前子三錢

其或初本輕以及風邪侵口須候解藥除瘟化毒靈

除瘟化毒湯 粉葛根二錢 冬桑葉二錢 小木通八分 竹葉一錢 次生地二錢 金銀花二錢

薄荷一錢 生甘草八分 貝母二錢 枇杷葉一錢 五分 去毛蜜炙

凡白喉初起症象尚輕喉間尚未見白不能辨認是否白喉即服此方俟一見白象即改服養陰清肺湯如係

風邪之在則始終服此自然全愈萬不可以表散 如胸下脹悶者加炒枳殼五分 炒麥芽二錢 大便秘者加

瓜蒌二錢 郁李仁二錢 小便短赤者加車前子三錢 燈心一扎 凡是風濕即亦嘔症服此亦神效

雙車蛾治與雙蛾同 照方均可愈表散防終凶

雙車蛾亦屬子裏 惟肺家虛損較白喉稍輕若治之不當變為喉喉更不易救時人不察以為表症概用

升散蓋不可言凡治此症亦宜以養陰清肺湯為主日二劑重者用神仙活命湯與白喉治同均不手表散

一切禁忌藥避之如配毒入口難挽回千萬勿誤服

白喉一切禁忌之藥 麻黃誤用者毒 桑白皮肺已虛紫刺皮破血不可用 防風不可用 杏仁苦降更 牛蒡子能通十二

用山豆根不可用 黃芩過涼不可用 射干即喉花用不可用 羌活過發表宜升 荊芥不可用 柴胡不可用 前胡不可用 桂枝

辛散不可用 升麻升散不可用 蘇葉發散不可用 煙露涼散不可用 蟬退升表不可用 馬勃過散不可用 以上諸藥為時人常用而誤用者十

萬不可一試即于前列諸良方中偶獲一二亦立見大害漂之慎之

白喉誤服禁忌藥後所見各種敗象 七日滿白不退大便祕結不通未服藥大便泄服藥後連瀉不止領下發腫

不消音啞鼻塞服藥嘔吐不止白塊自落肢濕神倦鼻孔流血喉乾無涎天廐黑暗兩目直視面唇俱青弓反

張汗出如漿藥不能下

以上各家均極危險大都誤服表藥而成除脾泄二症前已另列方藥外重者用神仙活命湯輕者用養陰清

肺湯加入解表毒之藥為引一劑後去引服

解表藥毒法 春用藍食過秦葉孔多者三片 夏用荷化常連鬚者七箇

秋用羊薺苗稍黃者九枝各寸 冬用生青果核磨汁或打三枚

又方 以生萊豆碾細末重者一茶碗輕者一酒杯冷水調服再煮白米粥一碗先服粥後服藥則藥服

之劑即解除矣

總而言之切勿誤投表散症非難治一投表散則難治矣切戒切囑

急救喉痧要法

今庚申地喉病流行傷人過于 咸豐癸卯年浙省疫氣流行變患痘疹爛喉等病史酷且廣今將杭州周光遠所刊名醫王士雄先生醫案中保痘喉神效三方併論及治驗可法者三案指盡病機治法絲絲入扣暨抄近時上海諸善士印送白喉忌表書中之三方與王氏大意相同專主清降氣火敗改血毒無一味表散提透害人之藥合二書推治喉患實活命仙法濟人寶筏也今均照原刻抄錄于後

附論

上年秋燥冬暖霜雪稀少河井乾涸吾杭自九月間起天花流行十不救五小兒之孺子是者日以百計先生曰此痘疫也治法當與常痘有異惜幼科未之察耳且天公發泄不主閉藏入春多暍患特刊加味三豆飲方俾未嘗佈痘者預服免患將出者恐欲其輕又勸人預服青龍白虎湯以杜春末暍患不料其言果應三春不雨暍症甚多醫者猶不悟其致病之因僅知發散正如火上添油 先生胸有成竹一以仲聖白虎湯為救焚主劑藥若以及于營分者用晉三厚角地黃湯相機加減又刊青龍白虎湯暨錫類散方廣為印送賴此以活者不可勝數

附 加味三豆飲

生菜豆 生黃豆 生黑豆 或用生白豆亦可 金銀花 生甘草 水煎服

先生原刻自注云古方三豆飲為痘證始終可服之妙藥未出時常服痘可使稀將出時急服重可冀輕已出時恐服逆可轉順盡出時頻服毒可易清俗傳種痘是室室焚化更有初生小兒于十八日內服藥令其出痘之法是抵苗助長此等矯揉造作陰受其害者古今來不知幾恒河沙數矣至于種種稀痘之方皆無意義或以毒傷損人元氣或以穢物致生別恙慎勿為其所惑惟此方藥極簡易性最平和味不惡劣易服不必論其體質久服無弊誠盡善盡美之至道藥也杭人感于患痘不食豆之說甚屬可鄙今特辨明其人醒悟凡小兒能吸飲後即以此藥日日代茶誠保赤之首章高原方用赤豆性燥傷陰予以黑豆易之更有補陰之績雖燥令燥羅皆無礙矣再益銀花甘草而化毒之功尤勝或疑銀花性涼似難久用不知三豆皆穀也性能定脾得銀花以濟之更覺沖和況小兒體純陽極且此甘涼補除之味豈持稀痘尤能明目消疳不生瘡癩泄瀉等病其功未能殫述也

附 青龍白虎湯

椒欖 生蘆服 水煎服

先生自注云此予自製方也椒欖色青清足厥陰內寄之火風而靖其上膈之燭蘆服色白化手太陰外來之燥熱而肅其下行之氣合而為劑消經絡留滯之疾解膏粱魚鮪之毒用以代茶則龍馴虎伏臟腑清和豈但喉病之可免耶且二味處處皆有人人可服物易功優久任無弊定能弭木形之患勿以平淡而忽諸

附 錫類散

吹至喉間痛除為度惟治諸毒下疳梅毒疔毒亦神效賜六神丸十倍

西牛黃五厘 象牙屑培三分

飛淨青黛六分

人指甲六厘男女各三厘

真珍珠三分

梅花冰片三厘

壁錢

二十個

俗名香皂木板上不用

共研極細粉吹入患處流出惡涎即愈

先生自注云此專治爛喉癢疹之神

方也尤鶴年載于金匱翼云張瑞符傳此方以救人而得子故予名之曰錫類散

附治驗三素可法再與白喉忌表書中訪善法合推便治喉病之能事畢矣

段春木之室爛喉內外科治之束手姚雪蕉孝廉席先生視之骨瘦如柴肌熱如烙勢疾阻于咽喉不能咯吐須以飯帛攪而曳之患處紅腫白腐銀舌皆糜米飲不沾信事非期而至按其脈左細數右弦滑曰此陰虧之體伏火之病失于清降擾及于營先以犀角地黃湯清營分而調妄行之血續與白虎湯加西洋參等肅氣道而瀉燎原之火外用錫類散掃痰腐而消惡毒繼投甘潤藥齏餘熱而充津液日以向安月餘而起

吳雨峯明府家鳴兒科為其仲郎所出之兩孫種痘下苗二三日發熱咽疼醫以為痘之將形也投以升透之藥赤斑似錦喉爛如鼓半月之間聞家傳染諸醫莫敢入其家先生往診時見其二郎耕有四郎小峯尚未病亟曰已病者固當圖治未病者尤宜防患傳以青龍白虎湯代茶恣飲竟得無恙其令闈洪宜人及仲媳皆為之治愈此外如其長媳其令嫂其二孫其僕其探病之女感殞于是病者七人馬時雨峯筆巖雨喬梓咸官于外仲郎亦暮遊江右不料因種痘而釀此家禍益信先生勸人勿種痘之說可訓也

種痘之法以人巧而奪天工原屬妙法但須慎于擇時若疫氣流行之時感其氣者尚有腫頤爛喉之酷況又加以痘毒也此乃醫之不明未可盡歸咎于種痘也再張疹一門以護咽為第一要義一見咽痛即急清降大忌并

提何事是科而不知此耶

潘洪時託兒科為其仲郎春波所出之孫種痘下苗三日即咽痛醫與發熱斑斑七朝而大春波及其弟祥行皆染其病春波之證頗醫藥泉治而愈矣祥行之恙咽喉爛至于舌胸膈閉塞不通牙關緊澀小便淋瀝口吐紫黑血塊人皆謂其臟腑爛馬先生視之曰惡血毒液正欲其出吹以錫類散用板承其口流出血涎甚多咽喉牙環胸膈皆得漸舒投以犀角苦湯加元參銀化毒瀉腸汁竹黃花粉貝母石高蒲之類漸以向安繼與生津填補而附 白喉忌表書中之神效三方併盡證加味及誤服表藥解救引藥列後

養陰清肺湯

一日二帖重者三帖待病減減輕方分再服不必過疑危者致全無效矣

大生地一兩 帶心麥冬六錢 炒白芍四錢 薄荷二錢五分 元參八錢 川貝母四錢 丹皮四錢 生甘草二錢

兼病加味輕者涼加一二味勿必全加三方皆然 喉腫甚加煨石膏四錢 大便數日不通加青膏丸二錢元明粉二錢 胸脹悶加神曲二錢焦山查二錢 小便短赤加大木通一錢澤瀉二錢知母二錢口燥渴加天冬三錢馬兜鈴三錢 面赤身熱黃加銀花四錢連翹二錢

神仙活命湯

重者日三服病減減仍改服養陰清肺湯

龍胆草二錢 元參八錢 馬兜鈴三錢 板藍根三錢 生石羔五錢 白芍二錢 川黃柏一錢五分 生甘草一錢 大生地一兩 瓜蒌仁三錢 生梔子二錢

凡白喉初起即極痛且閉飲水即嗆眼紅聲啞白點立見口出臭氣者方可照此方煎服或已延誤二三日症已危急或誤服表藥現出敗象非輕方所能挽回者均須此方以速其毒 如謔語神昏舌起芒刺加犀角二錢 胸悶大便閉塞加川朴二錢枳實二錢 大便閉甚者再加萊菔子二錢生大黃二錢 小便短赤加知母三錢澤瀉二錢車前子二錢

除瘟化毒湯

初起輕者或解別未明或兼風邪皆以此方清解之不可發表表則不可散一日一二帖如痛加重即改服養陰清肺湯散之

粉葛根二錢 金銀花二錢 小木通八分 竹葉一錢 次生地二錢 冬桑葉二錢 薄荷五分 生甘草

八分 貝母二錢 枇杷葉一錢五分

大便閉如瓜蒌仁二錢 郁李仁二錢 胸脹開加炒枳殼一錢 炒參身二錢 小便短赤加車前子三錢 燈心一錢 再解誤表無毒用之為引 春加蟹食過食紫乳多者三片 夏加荷花蒂連蒂七個 秋加苦薺黃芩九枝 冬加青果 核打碎五個 各引加用一帖 不必多加 四物遇無隨便現成有者加用 不必拘時 今尚有善後諸方 吹藥多方 藥前便泄前後便瀉 諸善法白喉忌表書中具在 不能盡錄 有心保家濟世仁人 向由申昌畫善堂閱可也

又附 勸少吸紙捲諸烟再啟

今之患嗔病之劇殺人何也 猶如爐內薰烟暗燭釜中沸湯蒸騰 所以病起在寒初發紅腫痛閉後變白肉塊落始終不露燥烈之形者 熱極似寒也 亦緣是證之人 真陰早有所傷 或多吸紙烟 暗耗肺津不少也 肺屬金 最喜清養 而畏火刑 然烟性雖毒 惟香燥乎 熱載在典籍 其別名相思草 故人之不忘時 喜多吸夫香能耗氣 燥能傷陰 卒能助熱 熱必劫液 况又加以火乎 而藥性亦然 故服於散并提難救 由此也 夫鴉片烟是木膏熬成 古人尚言燥烈 耗神 毒熱灼精 人或有知之者 而香烟捲之以紙點之以火 時及烟皺 純是火氣 豈非日消肺金 如磨刀之石 諸烟皆然 而人不知 肺日傷 陰日衰 熱日熾 肺被火灼 不主清化 變生痰火 喘咳口瘡 鼻衄牙血 吐血者 有之 况今唐屬氣流行 不吸烟陰足之人 感其氣十傷其二 三陰損肺虛者 其害可想矣

西人于二十歲外尚不許吸烟 何故也 惜吾華舉國若狂 偏處男女老小 盡吸甚有幼年之人 暗傷生長 而不覺目擊 心傷可勝浩歎 今特為保生齋家君子 告馬少食戒食之 免生疾病 豈不快哉 哂笑我愚不計也

錫類散 寔方吹救白喉聖藥 惟方內瑩錢等 患者欲立辨難竟 欲速不能 遲必不救 且全料價大 貧病更無力 常有延誤 于心難安 于前月間 力商上海英大馬路馳名精製丸散之

董天順寶堂 概允預辨 配合備存 零售自月餘來 實吹救法 無數矣 望仁人留神 向彼號 購濟功德 無涯矣 終

醫不通其理不足以言醫通其理而未得其法則亦無術以處此也余家世讀書舉業之餘往往汎濫百家旁及靈素以故多能醫之士余自成童時挂名弟子負籍省闈再厲遂備未售深恐樛材生廢無補

昇平年來僑寓流濱假刀圭為肆應之具猥以謫迺獲信友朋池上有戊子春始爛喉疫形盛行牽連沾染天枉不可勝計雖死生有命載諸聖經母亦法有所未盡歎經余治者獲全居多同人疑其有秘不知至理自昭天壤苟得其旨亦何必私為枕中寶哉爰將體驗所存綴為一帙付諸剞劂倘易莫可採賅消此癘于無形則草茅微賤未始非仰體

聖天子仁壽斯人 至意千萬一云

光緒十有六年歲陽在上章陰在攝提格律中中呂日月會于定沈之次吳縣曹心怡叔培父敘于朗齋

例言

一醫之于病如射侯之有止鵠失其鵠率則折筭墜羽者有之是書以正的名雖無養由穿楊之技或少挽王良說過之風乎

一先哲有言醫者意也吾心能領之口不能言之又云治病當活潑潑地如珠走盤如或刻其舟而膠于柱則官禮且或誤養生別區區技術之畫哉世有趙括其人此則非余所敢知已

一著述之家畫不盡豈不盡學于輿氏云大匠誨人能與人規矩不能使人巧余固非哲匠也所望海內淹博之儒起而訂之

一醫業之刻所以佐運用之機宜是書辨論已錄無庸更贅

一是書甫脫稿即悉維揚張氏有舛味正義之刻不知與拙論同異若何以道遠未獲一讀為恨姑識之以俟高明選擇焉

喉痧正的目錄

自序一首

例言五條

喉痧源流總論

論因

論證

論脈

論治

驗舌

由禁

善後

防先

喉痧條治

喉痧備用各方

喉痧正的

吳曹心怡侯甫 著

受業鄭伯蕃 康佳 校

喉痧源流總論

古無有所謂爛喉痧者自雍正癸丑以來始有之見于吾吳葉天士先生醫案中余刻痲痧輯要採此案考葉氏行世諸書中俱無之想佚存本也

以解肌散表立法可稱千古隻眼而用藥則不詳嗣是以來散見于諸家雜刻中者類多風影之談惟虞山陳靜若瘦抄草及玉峯顧氏痧喉經驗圖解二書最為近是二書俱采入西漢外陳氏以疫名痧以有疫無疫辨痧喉之輕重所論頗屬精當惜其開手各方仍囿于辛涼解肌之成法以致近時採用者往往不驗至顧氏之書論證亦頗透切而立方終屬鮮效至友元和金保二先生握顧氏本而增刪之易其名曰爛喉痲痧輯要全氏得此書于冷攤書名則無考所增皆咽喉通治之法于痲痧初無干涉卷尾拮據各藥亦俱非紀律之師無怪乎覽之者之茫無涯矣也余自幼習聞先生緒論年來實無滲漶同人謬以此事相推不揣譎陋爰將因證脈治及忌驗各方條列于左以備參攷焉

論因

治病必先其所因喉痧之因都由溫厲之毒吸入肺胃又遇暴寒折鬱內伏腸胃膜原復觸時令之毒風而發其發

也。蘊蒸之毒瀰漫三焦，幸而獲治，則毒散而氣化，不致牽連，惟是不幸失治，則毒聚成疫，觸之即病。以次遞傳，甚至累年不已。如近日滬上情形，自戊子以來，二載未之或息也。陳氏之所謂疫者，信矣。然尚有二因焉：一因起居富厚之家，冬雖溫而不重其裘，甚則熾火圍爐，馬香患之，輩夏雖涼而不蔽其體，甚則風餐露宿，馬而房舍，竭其精嗜，欲損其形者，更難免矣。一因飲食麴糵，炙煇熏灼，臟腑瓜果生冷，水仗脾胃而餌金石，以為衛生，藉麥耳以資服食者，更宜審矣。其一則因街衢之穢，雜水漿之汙濁，耳駢肩摩，數汗露交流，潔井淤河，濁滄橫積，口鼻之所吸，受腸胃之所浸，淫貽毒，奇勝言哉。然此三者，凡疫皆然，亦凡病皆然，正不獨瘧痧一證耳。

論證

喉痧由厲毒內伏，其未發之先，必五內煩燥，手掌心熱，漸漸咽痛，憎寒發熱，胸膈口渴，渴有痧者，熱勢必壯，用大紅欬無此不說裏細草紙捲成絨，捲兩葉，煎米油或豆油，捲着覺者，以右手拈紙捲復，以左手掌逼住，火光照看，頭面頤項見有痧點，隱隱及遍身，膚滕通紅者，無論咽喉紅與不紅，腫與不腫，腐與不腐，但覺咽痛，或先曾痛過，發熱後反不甚覺痛者，此是初起時發過寒涼均屬疫痧急且按照後開各方暢為透達既透方清曾次不可挽越轉按不可呆鈍蓋後來風火之重變幻之速無有過于此證者一落呆相便多貽誤亦有偶然感觸內本無邪僅見咽痛寒熱不甚壯膚滕不紅胸膈口渴渴亦微者但須乘其初起之時按照後方急與疎解不至發痧熱退痛定亦就痊矣至于失治邪瀰則有腮腫頰車不開唇口紫小支體膚黑欲脫舌絳喉腐痧點半隱不透馴至神昏語謄氣喘腹瀉鼻煽鼻煤音啞煙厥不可為矣

喉痧發于肺胃，初起憎寒發熱為肺邪欲洩之象，所以必現咽喉腫痛者，咽喉為肺胃道路，顧氏謂熱淫浮越者是也。其瑣碎小粒者為痧痧者沙也，紅暈如塵沙而起，屬肺其成片如雲頭突起者為痲疹者丹也，或隱在皮膚之間，多起于手足身背之上，昔人謂屬脾以脾主肌肉故也。余則以為此正胃腑之熱淫外越耳。蓋陽明亦主肌肉，也有一見即化者有痧透後始化者，其如疔瘰癧者發則多痒而麻木，此係其人肝熱而兼濕痰藥宜稍佐洩肝發痰滲濕之品，至于失治邪瀰初瀰則在少陽陽明耳，前後腫陷之深則頰車不開唇緊膚黑陽明風毒極盛也。其舌苔黃者猶在氣分，至舌絳則直透營分矣。營分受邪通近包絡再陷則神昏語謄毒極益烈惡候並見不轉瞬而風火交

爛瘰癧立至鼻爛音啞肺陰告絕頃刻云云矣其氣喘腹瀉鼻燥之證微者可治甚者不可治當于後開各方中求之

論脈

喉痧之脈初起浮之瀉瀉按之沉滑此伏氣在內陰裏拂帶之象也或左兼弦緊者風勝故也右反沉者邪遏氣道也右寸伏者誤進寒涼喉已腐而肺氣不布也左寸亦伏者邪陷已深上焦氣道欲閉也左關獨弦者陰氣先傷邪氣乘虛而犯肝胆也男子奪精婦人經水適來者往往見之弦而兼動者火炎生風也苦治之得法一散之後便轉洪數或未甚暢者當再散之必六脈俱透內伏之邪盡洩然後清而和之則證靜脈和矣至于誤治之脈則似浮非浮似洪非洪似數非數脈既模糊不清證亦錯雜不齊難為力矣

論治

喉痧一證愚采鮮善治者以不敢發暢其表也不知此證重在痧子不重咽喉顧氏早已言及之矣溫厲之邪鬱之深而發之暴不能自出于表以至上竅咽喉尚非洞開毛竅何以洩其毒而殺其勢此關手所以必用麻黃也法有獨用者有變入

註數內者詳見後以余近年所見用麻黃者十治十生所不能生者為日已多誤治在前毒陷已深揚之不達耳

其甚者津液已枯屬邪與氣血交混此時散之無可散清之不能清難使偏倉後越恐謝不敏抑知致此之由半由

因循坐認半由縱橫雜治誠使循經按法詎主是哉愚請以一得之見為暢其義焉一曰解穢屬邪由口鼻而入其

穢濁不止之氣業已瀰漫于無形勢必芳香以解之如卧龍丹玉樞丹太乙救苦丹之類是也一曰開表痧屬陽腑

經邪初起必從表散疫痧受邪較重尤宜急與開達如麻黃且鼓之類是也一曰疏風疫痧每發于火旺風勝之年

且必觸時令之毒風而發故制法在所必需若已成火化者惡疾可參用焉一曰疎肺皮毛者肺之合肺氣開則皮

毛亦開自無壅滯不達之患且肺主一身之氣化清肅下行諸氣受治疫癘亦因而自潰故葶藶亦為要藥聖之甚

者紫寬當兼用焉其他如杏仁土貝之化痰人中黃之解毒桔梗之載藥上行西河柳之循經遠達皆為斯證不祧

之品此初起一二日之大槪情形也至于二三日間表邪已解裏邪方急則當用枳實元明粉下之此為釜底抽薪

之妙法肺氣一通痧火自息咽喉亦漸愈矣至于存陰清化諸法則有霍石科鮮生地羚羊角等味疎腑潤腸則如

上海醫學書局印

枳實導滯丸之類清洩餘火則如桑葉丹皮桑白皮等味善後調理則如西洋參製首烏等品當于後開各方中求之茲不具列

喉痧發表非難清裏為難清裏非難清裏過如其分為最難轉關之際有先一着不得後一步不能輕一分不救重

一毫不勝者此中消息非親歷者不能知茲姑約畧指示其一二馬大凡初起之時苦多白滑燥津不勻但

用溫散既散之後痧邪外達苔轉薄黃便當稍兼清洩以桑葉易荊芥可也若舌苔黃甚或達尖漸紅口必渴當參

用雀山石斛四五錢或六七錢不等是名白膏一劑後痧透透字着喉噴軟勢緩脈形俱暢證勢漸平黃苔亦化其半

舌前半俱紅尖上起刺以上截語此時可去麻黃不用祇用桑防敗射穿則杏貝土貝甘桔西河柳等味以透

餘邪而兼清化若大便不通者可加元明粉枳實下之一劑後痧透極足前云痧透此云痧而有化象黃苔盡化舌

本通紅或絳尖刺如楊梅此時痧毒盡洩痧火止熾當以羚羊角鮮生地等洩而化之以生地合豆豉即古方中黑

膏遺製也其餘並如前藥風勝者白蔞藜亦可加入便艱有滯者元明粉或枳實導滯丸均可用雷先元明粉繼

此以往白膏黑膏參用星香輕者一劑重者亦無過二劑極重者用至三劑足矣此時痧回脫皮通身習習作痛

道數本清熱火熾者切參發罕角量用羚羊為洩風化火之品病火甚或者用之或元明粉導滯丸酌互用之

用白膏一二劑三四劑均可發罕角量用與黑膏同用或與白膏同用隨證治之元明粉導滯丸酌互用之

初下當用元明粉試寒下降以撤火或一服或二服後大便已行或大便未行而火勢已緩當易至于善後之法不

以導滯丸之苦降下奪或其人內有燥火未盡腹中時痛腹一二日後再稍稍加元明粉下之

外清洩脾胃而已表裏俱澈可稍加清養以調之

喉痧有因食積後如房後遺而發者其邪易入少陽亦乙癸同源之毒皆氣一當參用仲聖四逆散法以赤芍易白

芍以甘中黃易甘草合之則柴胡赤芍枳實甘中黃是也仍當粵麻敗荊防等並用之內無風滯者可去枳實指尖

不甚厥冷者可并去赤芍但取淺邪結或初起先投麻敗荊防等一劑第二日再加入用之亦可痧未透齊可連用

兩劑或三劑當斟酌用之婦人經水通來亦當參用柴胡恐其熱偏經不甚暢者仍當兼用赤芍或少腹滿痛即桃

仁紅花等亦可加入血結胸者亦如之此證在喉痧中罕見以風火受知甚速生死不出六七日之間其他虛婦嬰

兒治法同前

喉痧發表為先其次即當下奪燎原之勢非杯水所能滅所以僅施滋清不為功仲景治傷寒有急下存陰一法正

合此病下之必用元明粉者以其有合于洪乾潤下作鹹之義分量不必過峻大率以一錢為準然不能拘證勢急者不妨酌加或後下性下或同煎性燥隨證當治可也設或一下之後火不甚殺不妨再下一二劑後火息其半可易以導滯丸二三服或火勢復熾使艱腹痛者仍參用元明粉一二劑其用下之法畧如吳又可治疫之意必大便行過數次脈靜身涼若轉薄白飲食漸復然後內無留邪火不復熾矣

喉痧有兼見洩瀉者證勢必重若因穢勢所侵當用太乙救苦丹若因挾食所致當用枳實查炭等消導之劑若因熱結旁流當通用但既瀉則表邪易陷必須參用粉葛根一味以升清達表為主一二劑後痧透瀉止證後火起反見便艱脈定者仍當用下若因誤治洞洩者難愈

喉痧用麻黃之法若時令嚴寒或證起數日表邪鬱積當急與解散者可獨用分量少只三分多至五分不過取其輕揚之性以達毛竅非若西北正傷寒之需重汗也或時令溫煖邪鬱不甚者可入豆豉內用之分宜少至三四錢同水更速彷彿仲聖麻沸湯之法然亦不可拘若時令雖煖而表邪甚急者仍當專用為捷若在暑月可用桑白皮監之或其人素有痰血或病中曾見衄血者俱宜兼用桑白皮此局方華蓋散之遺製也至于救逆諸法則有麻黃與白膏同用者如邪鬱數日已從火化苦黃口渴者以麻黃有與黑膏同用者如誤治在前表邪未透痧透不轉

地同用手足麻痺並有與石膏同用者如發于暑月而復發治痧火與暑邪交并起甚生風手足麻痺神昏或吐者可參用按以上三法黃苦者大為可致轉色而不動風者或可散已就風者難散若魚目混珠者亦按凡非時感以上三法黃苦者大為可致轉色而不動風者或可散已就風者難散若魚目混珠者亦

喉痧疎表不透邪陷少陽陽明二經證身身前後腫或壅痲將變出於頭疔惡之類當用防風白芷藜蘆胡葛根等散其風毒或但類車開閉不利祇加防風白芷藜蘆亦可若口唇紫小瘡黑欲蠅當用秦九白藜蘆等追其風毒若痧後餘毒內壅致頸項結核變成癰證未成膿者多用消風化痰解毒之品以散之如桑葉等前杏貝甘桔赤芍製蠶之類已成膿者可付瘍家治之

驗古

喉痧初起舌苔白滑者表有風寒也白而兼膩者內挾穢濁不正之氣微黃者漸從火化黃甚者痧火灼氣也尖絳

者邪熱通營純絳色鮮澤邊尖起刺痧已透者為營熱外洩未透者舌必紫絳而乾根邊多帶黃白厚膩之苔此表邪未達痧火已灼及營分為難治中心焦黑者痧火內燔津液枯竭也舌短縮者腎氣竭也乾絳而硬中心焦神昏者痧毒攻心也俱不治

申集

喉痧邪伏在裏初起切忌寒涼以斂則毒熾愈熾也不特涼藥不宜誤服即一切瓜果冷飲俱宜禁絕世人不知以為口渴咽痛為火恣嘆青果水梨子根西瓜皮等甚右或擅服西洋參麥冬元參石斛之類貽誤非淺不可不申其禁

善後

喉痧既愈之後周身膚蛻如麤氣血曾受剋削須善自保衛以復太和其道熱必須清洩淨盡然後可加培養病人須薄滋味節飲食謹嗜欲邪淨後尚具如素雨二旬其一切腥膻發物俱宜遠戒居室尤不可犯過四月方稱復元否則痧後餘波變怪百出慎勿輕身嘗試

防先

疫痧盛行之際室中宜熏除穢淨熏以名香或雜燒檀降香止之類以辟除其穢惡不正之氣入病人室宜啖團圓皮蛋一枚能飲者佐以高粱酒少許男婦老幼俱宜佩太乙辟瘟丹一顆以絳帛囊之當以懸挂不可近衣

喉痧餘治

久燠春寒邪鬱脾胃運火令火結而為伍上竅咽喉紅腫而痛或但痛不腫不紅憎寒發熱或壯熱或不甚熱或乍寒乍熱微者飲食如常甚則胸痞咽阻不能食脈形弦數或濡數或沉數或沉弦不數或右寸獨大或兩寸並沉或左部兼緊者皆邪鬱未伸之象也舌白不渴或微渴而苔滑膩者或渴甚而苔仍白滑者邪在表分也荆防麻豉湯主之胸痞咽阻者先與太乙玉樞丹或太乙救苦丹吹藥始終用玉倫起原方主之

荆防麻豉湯

荆芥 防風 麻黃水炙 豆豉 牛蒡子炒研便湯 桂梗 杏仁去皮尖研便 土貝母去心 甘中黃 西

河柳 痰濕盛而舌白膩者加紫菀重洩其肺 或其人素有痰血症及病中曾衄血者加桑白皮過暑月亦宜
加用 腹痛洩瀉者先服太乙散苦丹瀉甚者加粉葛根 扶食者加枳實查炭麥芽 婦人經水通未及男子
奪精房勞四肢厥冷加柴胡赤芍 舌黃者去荊芥加桑葉黃芩燥渴者加霍山石斛 耳前後掣痛或腫者加
柴胡粉葛根白蔞蓉 類車痲痛者去荊芥加蔞蓉 唇口緊小起焦黑者蔞蓉秦艽同用

服前藥既得汗則咽痛必寬痧必漸透或有轉變可參後方如證勢較得汗未暢前方再進一劑必痧透而咽痛
止矣如不止繼方加枳實元明粉下之

此證重在發汗使痧邪外達則不至釀成危證體虛者尤宜急退所謂無糧之師利于連戰也即使自有汗者仍
須汗之一汗不暢則再汗余經治曾有投四劑而始達者在此證中亦罕見總以舌苔化咽痛愈痧點至足心舌
尖起刺為度

痧透喉寬管黃尖絳脈轉洪數者桑防白膏湯主之便閉者可加枳實元明粉下之

桑防白膏湯

桑葉 防風 豆豉 霍山石斛二味 半夏子 桔梗 前胡 杏仁 土貝母 甘中黃 西河柳 其有

他證相兼者加減法同前

痧點逗留不化舌色純絳鮮澤尖上起刺者羚羊羊膏湯主之已下便未暢者仍加枳實導滯丸疎之

羚羊膏湯

羚羊角鎊先 豆豉 鮮生地二味 桑葉 白蔞蓉二味 牛蒡子 桔梗 前胡 杏仁 土貝母 甘中黃

熱甚生風者可加勾藤一握 便燥定痧火極盛須急下者元明粉大黃俱可用 其餘隨證加減 服此一二劑

痧回火勢漸退可參用白膏一二劑羚羊角元明粉導滯丸等仍可參用

東垣枳實導滯丸

大黃兩 枳實二錢 黃芩二錢 黃連二錢 神曲炒五錢 白朮炒土 茯苓三錢 澤瀉二錢 蒸餅為丸多寬量服

痧回熱退舌化脈和餘邪未盡時時手足心熱者桑丹瀉白散主之便未暢者仍加枳實導滯丸疎之或五仁湯潤

之病與大腸相為表裏故
病後以養通大便為務

桑丹瀉白散

桑葉 粉丹皮 桑白皮水炙 地骨皮 牛蒡子 前胡 杏仁 土貝母 生甘草

五仁湯按此與古方五仁丸不同古方用杏仁
批仁此新更定者以杏仁杏仁易之

大麻仁研 柏子仁去皮 杏仁去皮 瓜蒌仁研 郁李仁去皮
○按近時所用郁李仁蘇州中並然不去
是竟用核非用仁矣市肆之不效如此

痧後肺胃餘風未清者牛蒡前胡湯主之

牛蒡前胡湯

牛蒡子 前胡 桑葉 白蔘 杏仁 薑仁 枇杷葉去毛 餘可隨證加減

痧後胃燥者霍斛元參湯主之

霍斛元參湯

霍山石斛 元參切 杏仁 薑仁 餘隨證加減

痧後肝胃之陰不復者參烏湯主之

參烏湯

西洋參切 製首烏

喉痧盛行之際時令寒燥不常客邪侵肺咽間微覺有阻者荆防蘇散湯主之若薄黃者去荆芥易桑葉

荆防蘇散湯

荆芥 防風 蘇葉 豆豉 前胡 蒼朮 杏仁 象貝母去心

此肺邪之輕者服此則肺氣開而咽自和矣設或不愈當是伏邪仍前麻散法治之

喉痧備用各方

卧龍丹錄詳前編要方 此丹共
有三方此方最為靈效

治一切喉厥氣閉時疫痧脹諸般急證喉痧用此取效有喉者多生痰

