

喉科各症

自序

自仲景論傷寒而傷寒始有專書蓋傷寒治而諸症
無不可治故治病以傷寒為先傷寒有從二症從脉之分
故治傷寒又以辨舌色為要舌色辨而表裏虛實不啻
飲上池水而洞見癥瘕矣 先君子平生以活人為
心留意於斯者有年每欣蒼萃象說纂成一書而不
果不肖 蘇門 承 先人志讀古之暇特講求治傷寒
之學子窺見教氏三十六舌之說簡而能該復采擇

他書與教氏相發明者錄之閒附以鄙見云

先人志也。因付之梓，治傷寒者或不無小補云。

會稽蘭亭王蘇門輯

附方

舌燥澁水梅刺者，生姜切片，蘸蜜搯之，其刺即消。又舌上白胎，乾澁語言不可，先以生薑片蘸蜜搯之，次用薄荷自然汁與白蜜等分調勻敷之。良。又傷寒舌上生胎不拘青白黃黑，用井花水浸青布片洗淨，後用生薑切片，特以浸水擦之，其胎自退。凡見黑胎水芒刺者，此熱毒入深，相尅心火十有九死。又舌出不收者，用冰片少許，搽舌上即收。一方用麻黃湯洗淨，將冰片生黃麝香研末點舌上即收。又產後舌出不收，用破缺於產母床邊，跌响驚之，其舌即收。

舌底黑條尖白胎五苓白虎分汗渴



舌尖白二分根黑一分有心痛惡寒之症如飲水
不至其者五苓散自汗口渴者白虎湯下利者解毒湯此亦急症

舌根一帶黑到尖兩感死症多惡寒



舌見黃色中黑至尖者熱氣已深兩感見之十
當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治
調胃承氣湯主之

但見黑統舌一片黑瞬息之間到九泉

舌現死



舌見黑色水剋火明矣患此者百無一治當辨燥濕芒刺光滑大抵舌黑之症有大極似水者即為乾為炭之意也宜涼膈散之類以瀉其陽有水未剋火者宜理中湯以消陰翳又須老姜切片擦舌上色稍退者可治若不退者不治昔有人患傷寒得此舌于豆厥逆呃逆不止眾作大治幾致危

舌尖黑



舌尖青黑腎熱盛竹葉石膏投即愈

舌見紅色尖見青黑者水虛火寔腎熱所致宜竹葉石膏湯

舌圈裡



舌中紅暈沿比皆黑二火相鬱熱極症

古見淡紅色而中有紅暈沿比皆純黑乃餘毒遺於心胞絡間與邪火鬱結二火元極故有是症承氣湯下之

根心片黑名中焙涼膈柴胡祛火盛



舌見紅色內有黑形大小舌者乃邪熱結於裏也君火熾盛反見水化宜涼膈散大柴胡湯下之

舌根乾黑如小舌調胃速下大腸結


五十二

舌黑裡



舌見純紅內有乾硬黑色形如小長舌而有刺者此熱毒熾甚堅結大腸金受火制不能平木故也急用調承氣下之

舌上珠



此症因心脾積熱舌生白泡大小不一六脉洪大挑破出血搽

金不換服三黃湯加石羔在河車在地丁草在並服玉樞丹在一服六脉遲細者不可用前藥

舌下



舌下珠因脾腎兩虛之症六味湯加鹽水炒元參生地鹽水炒知母黃柏木通等分治之搽金不換在藥照前

珠



懸旗小舌



懸旗風生干小舌下垂尖頭變員粗如桂員核大紅如櫻桃此因


多食原味以致胃火鬱盛而發用六味湯加甘草

枳椇子不赤芍不河車不二服乃痊或刺出血吹金

不換亦好

胃脈浮洪者是

爛邊舌



舌見脾家濕熱不清大舌四邊蒼赤白點而爛用六味湯加

細生地不滑石不淡竹葉不米仁不猪苓不澤瀉

不車前不甘草稍不二服而愈只唇牙肉爛腫同治法

搽藥照前

紅點紫舌



此症因心脾二經熱極所致滿口紅點紫色作爛而二病或身

有黑斑用六味湯加熟石膏甘草根芍小川連
青黛山梔其甚者加大黃生用其為六脉不數者
不照此方 椽葉照前

純紫舌



此症因傷寒用葱酒散汗酒毒入心所致大舌純紫宜用升

麻子葛根枳椇子石羔川連芍滑石木
通人中黃水心煩不安加山梔淡豆豉
心欬吐恐防葛班加姜刃外用元姜冲燒酒指
背心為妙

舌焦黃



此症因嗜酒大多遇寒而起大舌乾黃用三黃湯加枳椇生石羔人中

黃身發寒熱用大柴胡湯加羌活羌活之出嘔惡心
煩脈象洪大加生地黃牛黃佐以生薑芍藥干葛之類
再無不應

舌癰生



點點黑星為癰元參升麻葛根入

舌見紅色而有小黑癰者熱毒乘虛入胃蓄

熱則發癰矣宜元參升麻葛根湯

即元參升麻湯
葛根外加

化麻癰湯即白虎湯加人參解之


白胎中間加里點調胃先投涼膈散

白胎小點黑



舌見白胎中有小黑點亂生者尚有表証其病
雖惡寒宜涼膈散微表之表退即用調胃承氣
湯下之

黑心舌




白胎中間有黑星亦宜急下不可慢

舌見沿白心里黑而脈沉微者難治脈浮滑者可汗沉
實者可下始病即見此色乃危殆之甚也速進
調胃承湯下之

黃色中間小黑星調胃解和須急行

舌見黃色而有小黑星者邪遍六腑將入五臟急

小黒星



宜調胃承氣下之次進解和散一救四解五
和散蒼朮厚朴陳皮甘草桔梗藁朮本

黃胎舌



尖白根黃各一船先表後裡通其澁

舌見尖白根黃表二症未罷宜先解表然後乃
可攻裡水大便閉者用涼膈散硝黃泡服小
便澁者用五苓散加木通合益元散入姜汁少許以

白滾調下

舌內黃多尖白少天水涼膈合進好若還診脉有弦象防
風通聖畧攻表

表少裡多



舌內見黃而尖少白者表少裡多宜天水散涼膈散二服合進之脈弦者宜防風通聖散

舌見黃色有隔瓣熱毒入胃心火炎承氣茵荳十束湯結胸甚者用大陷

隔瓣舌



舌見黃澁而有隔瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急宜大承氣下之身黃者用茵陳下之血用抵當湯水在脇內十束湯結胸甚者大陷胸痞用大黃瀉心湯

厥陰舌



厥陰純紅黑直係理中四逆湯溫之

舌見色內有黑紋者乃陰毒入於肝經肝主筋故見係狀也真理中合四逆湯溫之

沿白中黃



四圍皆見白中黃表盡方可用下利

舌四圍白而中黃者必作煩渴而嘔吐之症有表邪者五苓散益元散並服須待表盡方可

下之


滿舌比白黃表未罷或可散而或可下

五月廿五日

舌


七

微黃表未罷



舌見微黃色表症未罷耳小柴湯合天水散主之可
下者大柴胡湯下之

微黃失汗



更有失汗起譫語亦宜速解用王霸

舌見微黃色初病即得之發譫語者由失汗表
邪入裏也必汗下並行以速解散加解毒湯兩
停主之

白變黃今必變黑調胃承氣下宜急


古見黃黑色者必初見白色而變黃也由表而

黑將現黃



傳裏熱已入胃急下之若下遲必變黑色而惡
症為元害鬼賊和氣深也每多不治耳調胃承
氣湯下之

黃微外胎白



白胎之外見微黃五苓解毒防泄兆

古見中白胎外微黃必見泄耳服解毒湯惡
寒者五苓散


左邊白胎有一片人參白虎治自汗

舌左見白胎而自汗者宜白虎湯加人參

三才圖會


舌

左白胎自汗



錢服之愚按左白胎應改右白胎係陽明
自汗^故用白虎湯

左白胎臟結




又有 差名臟結此症難醫須辨別
舌左見白胎滑者此臟結之症邪併入臟難治
愚按左白胎亦應改作右白胎宣平縣尉患此
症見右白胎而殂

右邊白胎半表裏小柴內外相為治

舌右白胎滑者二病在肌肉為邪在半表裏

裏表胎迹右



必往來寒熱宜小柴湯解之 愚按右白胎

應改作左白胎蓋左為少陽邪在羊表羊裏故

宜以小柴胡湯以上三症應參者

碎裂紅紋人字樣涼膈治其心火盛

舌裂人



舌見純紅更有裂紋如人字形者乃心火燔

灼熱毒炎上故發裂也宜涼膈散

淡紅中間大紅星存欲發黃茵五苓

舌星紅



舌見淡紅中有大紅星是少陰君火熱之盛也而不
勝者假火勢以侮土將欲發黃茵之候也宜茵陳五苓散

虫碎舌

虫有虫蚀小承氣火水未濟熱毒深



舌見紅色更有深紅點虫蚀状者乃熱毒熾盛不在上水在下不能相濟故也宜小承氣湯下之

白胎舌

白胎滑色入半表梔子豉湯小柴胡湯



舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之症也宜小柴胡湯又梔子豉湯

治禽獸魚骨下喉

係

此証宜急治之若飲食難進餓到胃氣亦屬難救凡獸骨及
鷄鴨等骨卡者用狗一隻倒吊取涎緩一嚥下其骨即化屢
試山神以狗善食猪骨故也 又方虎骨研末用水調服亦
佳 又方魚骨卡者用螺螄或鴨子倒掛垂取涎令患人卧時
灌下其骨盡化 又方有人被魚骨橫梗胸中半月不下疼痛
叫喚用橄欖核磨濃汁滾水調服愈真化方也 又方灰麩
以兩用冷水調稠敷兩膝頭上一時之久不知其骨化在處真
奇方也一切禽獸魚骨皆治 又方有人一骨橫喉百藥不效
夢人告之服南硼砂最妙遂取一塊含之即愈也咽喉腫爛用

南硼砂加米片和勻吹入以可倘冰硼散不可用又方食山查
膏甚效煎濃汁服之亦可緣鷄骨入山膏查即化故能治
一切骨梗也 又方貫衆焙枯研末每服一二錢神效或
煎濃湯含口中緩々嚥下亦可 又方人指甲灰吹入極
效 又方白糖含口中令其自消則骨與俱化矣 又方魚
骨卡以本魚骨揷耳尖縫內左卡揷左右卡揷右或藏
髮中亦可神效 又方粟子內薄皮瓦上焙枯存性研末
吹入喉中即下粟子又名板栗 又方砂仁子草菓子威子灵
化加白糖及水煎服三の碗無論何骨神效 又方燈心炭
研極細末吹入三の次神效 又方魚胆飲冬天取鱖魚胆懸掛
陰乾遇有各骨卡喉即取一個大者半个小者一個水煎温し
下之少時嘔吐骨即隨出也尚未吐再服温酒以吐為度竹木卡
喉服之

面遊風燥^熱濕成面目浮腫癢行^虫膏起白屑而癢
極破津^炎水津血疼

此証生以面自上初發面目浮腫癢若虫行肌膚乾燥
時起白屑次次極癢抓破濕熱盛者津^炎水風燥盛者
津血稠^難堪由平素血燥^道食辛辣厚味以致陽
以胃經濕熱受風而成癢甚者宜服消風散甚者宜
服黃連消毒飲外抹摩風膏緩取效

癩風膏

麻^黃芩

羌活

白檀

升麻

白及

防風 用 天 曲 身 將 藥 浸 五 日 文 火 燻 即 撈 去 渣 加 芫 朮 干
溶 代 盡 用 絹 漚 通 攪 塗 抹 瘡 上 用 消 風 散
芫 連 消 毒 飲



脣風多在下脣生陽明胃經風火攻發癢色紅腫久裂流水火療疼

此證多生下脣由陽明胃經風火凝結而成初起發癢

色紅作腫日久破裂流水疼如火療又似無皮水風盛則

脣不轉動俱內以雙解由聖散服之外以芡連膏抹

之自愈 雙解由聖散

防風 當歸 連翹七心 荆芥 白芍伍灼 白朮伍灼 川芎

麻黃 黃芩 桔梗各一兩 薄荷 梔子各五片 石膏煨 甘草二兩生

滑石三粒 其研粗末每用五下水一鍾半煎八分渣渣

溫服

德合身居西字全錄

方 雙解通聖胃久風疎表清裏膏防荆歸芍

連翹 苦木 枯麻 黃梔 草薢 滑芎

黃連膏

見鼻部
鼻瘡

牙齦

牙齦牙縫內血出胃腎式經受實熱實多口臭

牙堅平

者反此當分別

注

此証由熱而成當分別

實無論大人小兒若經實熱者則血出湧口必臭而牙

不動宜服清胃湯甚則服調胃承氣湯或用酒製

大黃末三錢以枳殼半煎湯少加童便調服下黑糞即

愈若胃經受火者牙齦腐爛淡血滲流不已宜服芍藥

湯及補中益氣湯加黃連丹皮若經受者血則點滴而

出牙亦微痛口不臭而動牙或落者宜流胃有火者六味
地黃丸無火者七味地黃丸俱加猴薑隨手應效若疳積
氣盛並服薑膏丸外俱用小荊散擦牙隨用青竹葉
醋浸一宿含漱甚效 清胃湯

石高煨 黃芩 生地若下 黃連 丹皮若下 升麻若下

水三鍾莫少食飯服 方清胃陽何者黃火結口臭

相芎齒衄血考連生地升麻膏丹皮用煎火功敏捷

調胃承氣湯 酒浸 大黃若下 甘草若下 芒消若下

水三鍾煎一鍾去渣少少溫服 方調胃承氣實火功齒

衄口臭用之靈酒浸大黃共消草胃熱煎服立刻清

式秀錫 人參 元參 水煎溫服

方歌二秀錫 醫而火泛 齟腐淡流 血水淡人參 元參等分

水煎服下有神驗 蘆薈丸 芦薈 白雷丸

川連 鶴虱草 麝香 子青皮 白燕蕒 胡黃連

木香 共研末 蒸餅糊丸 出麻子大 每服 下空心清

米湯送下 方歌蘆薈丸 醫積氣盛 木麝香 青皮 胡黃連 燕

蕒雷丸 鶴虱草 川連 同蒸餅丸

小薊散 小薊 百草霜 蒲黃 附子 晒乾 浸

石研細末 用搽牙上 羊刻時 茶漱之 方歌小薊散 搽牙 血

方符黃炒 百草霜 相看附同 研為細末 搽牙 止血 功效強

補中益氣湯

見漢書

六味地黃丸

見面部

七味地黃丸

見面部

牙宣

牙宣初起腫牙齦日漸腐頰久露根惡熱惡涼當細

別胃經客熱風寒浸

此証牙齦宣腫齦肉日漸腐頰久則削縮以致齒牙

宣露總由胃經客熱積久受邪風寒涼相搏而成有

喜涼飲而惡熱者係客熱遇寒涼凝滯於齦肉之間

有喜熱飲而惡涼者係客熱受邪風留於齦肉之內

客熱遇寒者牙齦出血惡熱口臭宜服清胃湯客熱

受風者牙齦惡涼遇風痛甚宜服獨活散外有牙齦

腐臭齒根動搖者屬胃中受火而並腎齒乃腎之餘宜服三因安腎丸又有齲腐臭時津白膿者屬胃中濕熱宜服犀角升麻湯外俱用胡桐淚散擦之以食鹽沖湯漱口推牙齲動搖或並痛疼者日以李杲牢牙散擦之夜用固齒白玉膏貼之緩取效若齲肉腐爛露牙床骨者逆

獨活散 獨活 防風 薄荷 荊芥

羌活 川芎 生地 細辛

右為粗末每用平水煎澄渣食後服日用三服

齲獨活風毒注牙根齲腫痛涼痛莫禁羌活防風共

各子

生地舊何荆芥合苦草

三因安腎丸

補骨脂

茴香炒

續斷炒

杏仁炒

枳仁炒

胡蘆巴

炒

川棟子炒

山藥

白茯苓

共研細末煉蜜為丸水梧桐子大每服三十空心鹽湯送下

歌三因安腎丸火燥牙腐臭齒根搖山藥去苜荬骨脂胡

蘆巴細川棟枳

胡桐淚散

胡桐淚

川芎

震水名煨

青鹽炒

細辛

白芷各半

生地王

其研細末乾搽牙齒

患震傳頓飯時以溫水漱去少時再上

歌胡桐淚散

牙齦腫津血宣露或膿細辛寒水石生地青鹽白芷共川芎

李杲牢牙散

龍膽草 丹半 比浸

羌活

地骨皮 各丹

升麻 半

共研末先以溫水漱用少許搽之

方李杲牢牙搽齒病牙齦搖動或甚疼膽草升麻羌

地骨研末漱以搽有功

固牙白玉膏

宮粉 研

珍珠 末

陽起石

一兩用礮蚕四九個防風常山芎藭牙皂青鹽升麻白芷地骨皮各半細辛
藜蘆各二兩共研粗末長流水上五盞同藥入砂鍋內以用桑柴火熬藥三盞去
渣再入砂鍋內煎至一盞將龍骨陽起石火煨通紅入藥汁內淬之如此
上次去藥汁將丸骨陽起石焙乾研末

鹿茸 末

丸骨 末

象牙 末

用黃蠟三兩溶化濾淨再化離火候溫方入前藥和勻
乘熱攤紙上出膏冷將尉大斗燒熱仰放紙鋪尉斗底上

攤之用時先以溫水漱口將膏剪一小條貼於患處閉口勿語
歌固齒白玉貼牙效一切牙疼及動搖官粉珍珠陽起麝射九骨象牙黃蠟熬

清胃湯 見牙用

犀角升麻湯 見面部頰瘍

鑽牙疳

鑽牙疳在根生銀突出硬骨銳而鋒。痛如鍼刺殊難

忍。此由肝胃積熱成。

此証由肝胃二經積熱所致乃牙根肉內鑽出骨尖如刺
疼之痛異常小兒多有之法用鐵鍼就患處刺開好肉
連牙齦根取出若血出不止者以濕紙換貼二次即止肉

服蘆薈消疳飲外以水研散搽之戒厚味其牙生如舊
蘆薈消疳飲
蘆薈生
胡連以火
石膏

羚羊角鎊 梔子生研 牛蒡子炒研 銀柴胡

元參 桔梗 大芩 薄荷葉多 甘草三分

水二鍾淡竹葉五葉六分 辰遠服

蘆薈消疳清胃肝 羚羊高梔子 薄荷胡連銀胡桔梗

大芩 薄荷 甘草 元參 竹葉 煎

冰硼散 見口部驚風卷

牙疔

牙疔牙縫胃火成大腸濕熱亦可生腫大粟米連腮痛
若並麻癢即黑疔

此証由胃經火毒成大腸經濕熱皆可致之每生於兩牙
縫腫起一粒形如粟米痛以連腮項若舌麻癢破流血
水疼痲異常者即黑疔也屬腎火毒俱用銀鑽尖挑破
以見血為度搽拔疔散再以蟾酥丸噙化徐徐嚥之若
煩躁口渴者宜服黃連解毒湯即愈若失治毒反攻心
今人煩躁昏憤者逆

拔疔散

硃砂

白礬

硃砂

食鹽

用鉄鏹刀燒江將口礬食鹽放於刀上煨之

各等分擇丁日午時研為細末收之

方拔疔散治諸疔毒硃砂白礬食鹽硃等分研末搽患

處化硬搜根功效殊

蟾酥丸

見疔瘡疔苦連解毒湯可用

牙疔

牙疔胃熱腫牙床寒熱堅硬痛難當破流膿水末

收口候犯寒涼多骨妨

此证由陽回胃經熱毒所致生於牙床堅腫疼痛身發

熱腮頰浮腫初宜服荊防敗毒散若大渴煩嘔者蟾酥丸

汗之便秘者雙解貴金丸下之腫處宜刺破搽冰硼散若初

傳墜腫破流血久不收口過食寒涼者必生多骨候骨尖刺出

搖則內動始可取出其口方能收斂而愈

荊防敗毒散 見頰部腫疽

蟾酥丸 雙解貴金丸 冰硼散

走馬牙疳证不輕癰積疹痘毒火功牙根腐臭隨變黑

頑肉難脫不食凶

此证多由癰疾積火疹痘餘

毒上功最為迅速總因積火熱毒而成牙根作爛隨變黑

腐臭穢難聞者癰積毒火攻牙者初宜服蘆薈消疔飲脾胃
靈者量服人參茯苓粥若疹痘餘毒而中者宜清疔解毒
湯外勢輕者俱用弱白散搽之若骨硬青紫漸腐穿腮齒
搖者宜蘆薈散搽之出牙催黑腐不盡及腐爛深坑藥不
能到宜用勒馬聽徽線塞之再用法去其黑腐內見紅
肉流鮮血者去若取疔頭肉難脫堅硬腐爛漸開以致穿腮
破脣宜貼青蓮膏身熱不食者逆阻此証惟癰積功牙成
疔者好治易犯由積火疔上攻也惟在調理餘食得宜出山
藥栗子鴛鴦甜辣等物俱當禁忌若稍有疎忽必改復發
慎之

人參茯苓粥 人參 茯苓 白茯苓 共研末同煮

米一茶鍾熬成粥先以鹽湯將口漱淨後再食粥

方 致人吞痰考善扶解飲食短少服之直二味研末加粳米熬

漸食之理胃虛

清疴解毒湯

人中黃

川芎連

熱久不用

瀉得不用

實熱用

銀柴胡

知母

荊芥

防風

石膏

車

淡竹葉 下燈心 五十寸水二鍾煎八分食遠服

嘔加苦薑根草

溺白散

溺垢

白霜梅

燒存性

枯白礬

子

右研細末先用韭根松蘿茶煎成濃汁乘熱以鷄翎蘸洗患

處去淨腐肉見津鮮血再敷此藥日敷三次若爛咽喉盡筒吹

薑薈散

薑薈

黃蘗

人言少用紅棗五分去核西奉

共研細末先用米泔水漱淨疔毒後敷藥於堅硬及腐處

勒馬聽徹絲

白此末

麝末

青黛搗碎

青黛末

用天油拌勻用時先以清茶糖水漱口次用鑷尖將絲批少許塞於牙根縫內日三次易

輕粉末

麝末

白砒末

右為細末用天油調薄攤紙上

用錐搥實陰乾收之每於臥時以泔水漱淨拭乾隨二時証大小剪

膏藥貼之至晚揭去再以泔水將口漱淨吐之至晚再貼

蓋蓋消疔歟見鑽牙疔

齒齲

齒齲齒内生小虫胃經之濕風火凝口臭只緣胃火盛齒根腐

爛出血膿 用玉散

滑石 白芷 升麻 防風 甘草 地骨皮 川芎 細辛 烏本 椴花 各用半

生薑三片里三十粒內煎去渣候溫漱於則吐之若此方並服更效

印篆藥譜宗金鑑

齒齲

齒齲風熱容陽牙齦腫爛出膿遇風甚久宜露白馬懸蹄
塞八天 不用宜服清胃湯加羌活外用白馬懸蹄

舌部 紫舌脹

紫舌脹屬心經火熱盛血壅腫硬疼舌滿口宜鍼刺血
色紫重色紅輕

此証由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬疼痛宜衣鍼
紫筋頭上露鋒分許當舌刺數十刺令血出紅色者輕紫
色者重隨以溫水漱口搽冰硼散內用涼膈散去朴消大

黃加牛蒡子

倍用梔子服之甚效

冰硼散

涼膈散

疾包每在舌下結腫綿軟似匏形一腫舌下妨食語
火積稽之疾涎流注成

此証生於舌下結腫如匏光軟如綿塞脹舌下有防飲

食言語色黃木痲由火稽之疾涎流注而成宜用立剪者

色上剪破出痰涎如鷄子清稠黏不斷拭搽冰硼散服加味

或陳湯忌煎炒火酒等物 加味或陳湯

舌紅心火血分炎舌上生孔似鍼尖或如筋頭其色

紫甚黑腐爛血出泉 此証係舌上忽生孔小者

少鍼尖大者如筋頭其孔色紫屬熱甚色黑防腐爛

血出如泉湧由心火上升以致血熱妄行而成宜服升麻

渴並搽必勝散甚效

升麻湯

升麻

茜草

寒水石

小薊根

艾葉

必勝散

螺青研

蒲黃

各不炒

共合一處研細搽於患處以用溫鹽湯漱口

重舌

痰核

重脛

舌疔

舌証發於心脾經其証皆由積熱成重舌舌下血脈

脹痰核舌上一核生重脛生於口上脛時覺心煩梅

子疔舌疔舌上生紫炮其形如豆寒熱增

此証無論大人小兒俱可以生重舌者由心脾蘊熱循經

上冲舌木遂令下血脈脹起如小舌狀故若重舌
 宜用冰硼散搽之痰核者心脾痰涎鬱熱舌上生核
 強硬作痛宜用衣鍼點破搽冰硼散內服加味二陳湯
 重脞者心脾有熱以改上脞生瘡形如梅子外無寒
 熱內時作煩此屬熱極禁用鍼刺宜服芩連解毒湯
 加桔梗不時用紫雪散噙化舌疔者心脾久毒舌生
 紫艷其形如豆堅硬寒熱痰二病應心初起宜用蟾
 酥丸含於舌下隨化隨嚥或再服二粒以解內毒甚
 者刺之服芩連解毒湯並搽紫雪散及徐之嚥之
 紫雪散 犀角 石葛 升麻 甘草 木

犀角 石葛 升麻 甘草 木

中古人醫藥全監

古

生 木 到

羚羊角鑊

寒水石

元參

沉石

水五盞煎藥刺湯一盞將渣用絹濾去將湯再煎

滾投提淨朴消五分文火慢煎水氣將盡欲凝結

之時傾入盞內下硃砂冰片各五分金鉞一百張各預研

細和勻將藥盞安入涼水盞中候冷凝出雪為度大人每用

半小兒二三歲者五分徐々嚙之即效或用淡竹葉

燈心煎湯化服亦可咽喉腫痛等證吹之亦效

冰硼散

加味二陳湯

黃連解毒湯

蟾酥丸

舌疳心脾毒不成水豆苗茵陳爛紅漸苦泛蓮雞飲

食綿漬久變癭瘰癧風

此証由心脾毒火所致其証最惡初出豆次為菌頭帶
小又名舌菌二疾一病紅爛無皮朝輕暮重急用庭丹點
之自然消縮而愈若失調治以致喉腫突出泛蓮或有
狀如鷄冠舌本短縮不能伸舒妨礙飲食言語時津臭
涎再因怒氣上冲^然崩裂血出不止久之延及項領腫出
結核堅硬聾痛皮色常頂軟一點色暗木紅破後時
津臭水腐爛^也稀其証雖破堅腫痛仍前不退此為綿
潰甚至透舌穿腮渴水漏出是以又名瘰癧風也蓋舌
木屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生火思慮傷脾則
氣鬱^也甚而成斯疾其証外勢頗類喉風但喉風因

喉常腫滿水不能下嚥此証咽喉不腫以下嚥湯水胃中亦思飲食因舌不能轉動迭送硬食故每食不能充足致令胃中空虛而怯証悉添日漸衰敗初宜服導赤湯加芩連芩者服歸脾湯熱甚者清涼甘露飲合歸脾湯便溏者服歸脾湯異功湯領下腫核初起宜用錦地羅蘸醋磨濃敷之痰涎直水渣膏貼之自古治法雖多然此証百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已

清溪秘傳北庭丹 瓦上青苔 番硃砂 塘鷄矢

人中白 瓦松 各四五 用傾銀罐子或筒將藥裝在內將

口對嚴外用鹽泥封固以炭火煨候待三炷香為度候冷

開罐將藥取出入麝香六分水疔各一分共研細末用碎鐵刺破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

歸芍異功湯

人參

度陳皮

常歸身

甘草五分

白朮土炒

白芍土炒

白茯苓

燈心五分

水煎空

水澄膏

硃砂五分

白欬

蘇合生各五分

乳石各五分

白及

五倍子雄黃

石為細末米醋調濃以厚紙攤貼之

導赤湯見口部

歸脾湯見乳部

清涼甘露飲見唇部

緊喉風 附纏喉風

緊喉膏 梁風火成咽喉腫二痛難出聲出搜鋸痰壅

塞元刺少高吐下功

聲

此证由膏梁厚味太過致肺胃積熱復受邪風之故
相搏上壅咽喉腫痛聲音難出湯水不下痰涎壅塞之
聲頗似拽鋸而發暴速急刺手大指內側高穴出紫黑
血以瀉其熱二痰盛者以桐油錢道守吐之吐痰後隨用甘
草湯漱之解桐油之氣內服雄黃以解毒丸吐下之喉
中吹白降雪散俟閉之涎內直服清咽利膈湯按

法調治隨手應效者喉若而青脣黑鼻流冷涕者逆若

並頰外遠腫即名纏喉風其法雖與此证相同然殊屬

險惡難治 桐油錢 溫水羊盞加桐油の匙攪

勻用硬鷄翎毛蘸油探入喉內搵之連探の五次其痰壅

出再探并吐以人醒聲高為度

雄黃解毒丸

雄黃又

煅石膏子

巴頭

去曲皮

共研末酣糊為丸如黍粒大每服五分津液送下

白礬雪散

石膏煨

礞砂子

煅消

膽礬

各五分

元明粉三分

冰片二分

共研極細末以筆管吹喉內

清咽利膈湯

牛蒡子

煨研

連翹去心

荆芥

防風

梔子

桔梗

元參

苦連

生銀花

黃芩

薄荷

甘草

生

大黃

木通

各子

加淡竹葉

慢喉風

慢喉發緩體弱生微腫咽乾色淡紅由暴怒五辛或因

憂思過度成

此证有因平素體弱更甚暴

患或通食五辛而生者亦有憂思太過而成者俱屬體弱

病實其發緩其色淡其腫微其咽乾舌見滑白胎大便自利

六脉微細唇白發色若午前病者服補中益氣湯加清涼水

麥冬參桂梗牛蒡子服之若午作痛作渴身熱足冷者陰陽

而憂也忌用苦寒宜少陰甘桔湯以宣達之若面赤咽乾不渴

者其脉必虛大以甘露飲服之必效俱宜用冰硼散不加燈州

煨灰存性三分吹之立愈

甘露飲

補中益氣湯

少陰甘桔湯

冰硼散

天冬 生心
 熟地 抵杞 桑寄生 石斛 枳壳炒
 前陳 甘草 芍藥 中前飯服

喉閉肝肺火盛出風寒相搏腫咽喉甚則腫痛連項外又有酒毒
當細求。此証由肝肺火盛復受風寒相搏而成咽喉腫痛

面赤腮腫甚則項外浸腫喉中有塊如拳湯水難嚥言語不出暴
起身發寒熱急刺少商穴或鍼合谷穴以捫咽喉而直踈散服

荊芥敗毒散寒熱已退即用清利膈湯並吹紫雪散隨以姜汁

漱以宜其用醋劫或漱以稍積血痰壅塞者油錢探吐痰涎若腫發

於項外膿脹之痛者防透咽喉不可輕鍼急用皂角末吹鼻取嚏

其腫即破或並用皂角末醋調厚敷項腫須臾即破而腫時用生羊肉片貼之喉閉聲嘶者肺氣將

絕急宜獨參湯救之若卒然一喉啞吞吐不利係寒氣客於會厭

也宜蜜炙附子片含之勿嚥而終忌用苦寒之藥恐難消難

漬又有毒喉閉由酒毒蒸於心脾二經熱壅咽喉腫色黃其人面赤目睛上視以桐油餞導吐痰涎直服鼠黏子解毒湯亦用紫雪散吹之

鼠黏子解毒湯煎服

鼠黏子粘子研 桔板青白升麻 黃芩芍 花粉生甘草
生地各等分 元參 梔子生 芫連 連翹炒 葛根 白朮土炒 防風

預防敗毒散甚效

清咽利膈湯水 桐油餞水 紫雪散水 獨參湯水

啞瘖喉風

啞瘖喉腫痛咽牙喉 閉緊急不能言風痰湧塞咽膈

上火盛生痰風搏源

此証頗類喉由肺胃益熱積久生痰

外復受風邪與痰熱相搏湧塞咽膈之久而成斯之疾初起咽喉

腫寒痰痛湯水難嚥語言不出牙閉緊急此屬險候多用

雄黃解毒丸水化用細竹管將藥吹入鼻孔直達咽喉藥入

作嘔而今患者吐之其牙固頑松咽喉而稍開通先與米飲
飲之次服清咽利膈湯並吹冰硼散用藥不應者陰若唇
黑鼻流冷涕者逆

可用雄黃解毒丸

清咽利膈湯

俱見監喉風

冰硼散

見口部驚瘡

弄舌喉風心脾經實火外寒凝滯成舌出攪動因脹悶咽喉
作腫更並痰

此証由心脾實火與外寒替遏凝

滯而成咽喉腫痛痰涎嗜塞音啞言澀舌出不出時攪
動覺舌脹悶常欲以手扞之故名弄舌急刺少高穴在
兩手大指裏側去指甲角旁韭葉寬即是用三稜鍼刺
之有血者生無血者死噲蟾酥丸徐噬藥汁若痰涎上

湧不能噬藥者急用桐油餞探吐痰涎隨服清咽利膈湯
吹金鎖匙若喉內出松子及魚狀不堵塞者此屬虛陽上浮

急用蜜炙附子片噙嚥其汁即效

用金鎖匙

冰片三五分

雄黃五分

白姜五分

焰消五分

硼砂生

各研末共和等以細筆管吹入喉內腫痛靈

用

蟾酥丸
桐油餞

清咽利膈湯

喉疔初覺陰虛成噎乾刺痛急淡紅腎火炎上金受剋破爛

失音臭腐痰

此証一名陰虛喉疔初覺咽乾燥

出毛草常刺喉中又出硬物噎於咽下吐酸水噦出甜涎淡紅

微腫微痛日久其色紫睛不鮮頗似凍榴子色由腎液久

虧相火炎上消燥肺金薰燎咽喉腫痛口增破爛腐衣疊若

煨皮聲音唯瘰喘急多痰臭腐蝕延其疼倍增妨礙飲食
胃氣由此漸衰而毒火益熾煩躁者宜服知藥地黃湯若
吐酸噦涎者宜服甘露飲加川黃連便燥者並服萬氏潤燥
膏面唇俱白不寐懶食者宜歸脾湯加酒炒川黃連腫吹紫

雪散腐次八寶珍珠散其證拔方應病或者十全一二否則

雞救

翁氏潤燥膏

猪脂一斛切碎煉油去渣加煉通白蜂
蜜一觔攪勻候凝批服二匙日用三五次

八寶珍珠散

兒茶 川連末
官粉 芙蓉末

以貝母七匙研 青黛 各由
魚腦石微煨 琥珀末 各下
人中白煨 二

硼砂 冰片 京牛黃 五分

鹿筋 系

珍珠

各五分 豆腐者半粒 未時取出研末

各研極細末共兌一處再研勻以細筆管吹入喉內爛肉處

知藥地黃湯

而一味地黃丸加知母
黃藥見面郭雀翅

甘露飲

歸脾湯

喉癬咽乾生苔蘚初癢時增燥裂疾兩飲藥酒五辛

火燄爛延開蟻蛀形

此証一名天白蟻咽嗑乾燥

初覺時癢次生苔蘚色暗木紅燥裂疾癩時吐臭

涎妨礙飲食由過食炙博菜豆辛等物以致積於胃

胃又薰肺而成斯疾宜服廣筆鼠黏湯未潰吹礬精

散已潰吹清涼散患心寡慾戒厚葷物或者十全二失治

並調理不謹致生微爛延漫開大五直起腐衣旁生小孔若蟻

蛀蝕之狀多致不救

用廣筆鼠黏湯

生地黃辛 淋貝母辛 之類

甘草平

鼠黏子苦

花粉

射干苦 連翹苦

白姜蚕平

苦竹葉二十片少研 二盅八分飢時服

清溪秘傳養精散

白礬

不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅酒
此於磚上將礬末布於磚上以磁盤覆

四面灰攤一日夜蒸
乳盤上掃下用之

白霜梅

二個
去核

真川雄黃

子
穿山甲
炙

共研細末以細筆管吹入喉內

清涼散

硼砂

人中白

芙蓉末

煨
冰片

南薄荷

青黛

共研極細末吹入喉癰腐處

上腭癰若葡萄形少陰三焦積熱成舌難伸縮鼻

紅涕口難開合寒熱增

此証又名懸癰生於中上腭肉心膈經每三焦經積熱而

成形如紫葡萄舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕令

人寒熱大作宜苦連消毒飲加桔梗元參服之並吹冰硼

散或日久腫硬下垂不潰者以燒鹽散日點三五次並服射干丸

遇時失治飲食不入煩躁神昏者逆

用燒鹽散

食鹽燒枯白礬各等

二牙研末細筋頭蘸患上

用射干丸

杏仁麩炒

射干

川升麻

甘草各等

木鼈子

川大黃

各等炒

右研細末煉蜜和丸如小彈子每用一九草木鼈杏仁蜜丸彈

狀口中含

用芫連消毒飲

用冰硼散

鎖喉毒生因積熱外感風寒耳前結外似瘰癧漸攻喉心

与小腸聽會穴

此证由心与小腸積熱外感風寒

凝結面成初生於耳前聽會穴形如瘰癧漸攻咽喉塞

疼痛妨研飲食此須速治耳服牛黃清心丸開胃解熱

每服清咽利膈湯吹冰硼散投方應效能成功

牛蒡清心丸

丸轉膽星

雄黃

芫連末

二

茯神 元參

天竺黃

五倍子末

荆芥

防風

桔梗

犀角末

當歸各半

冰片 麝香

珍珠各五分
豆腐渣

京牛蒡

輕粉各五分

各研極細其和一度再研勻甘草

熬膏和丸水丸眼大珠砂為衣日晒乾收入磁瓶內將瓶口

堵嚴勿令出氣臨服之時一丸符荷湯磨服

方牛蒡清心鎖喉毒花輕冰犀射參雄竺珀倍荆防桔膽星

犀角歸連熟退速

用清咽利膈湯

冰硼散

乳蛾肺經積火成獲經單重喉旁生狀若蚕蛾紅腫

痛因前易治因後凶

此証因肺經積熱受風

凝結而成生咽喉之旁狀如蚕蛾亦有形若枣栗者紅

腫疼痛有單有雙准者輕單重生於咽前者形色易

見吹藥為到手法易施故易治生於咽後者難見形色藥

吹不手法難施故難治俱宜服清咽利膈湯吹冰硼散易見

者膿熟鍼之難見者用雞翎探吐膿血若龜二痰壅急聲

小探吐不出者險急用三稜鍼刺少高穴出紫黑血仍吹

服前葉緩之功 清咽利膈湯 冰硼散

喉疔疔熱屬肺經多語損氣相並成疔元眼紅經裏

成單或雙喉旁生 此証由肺經熱更甚多語

損氣而成疔元眼紅經裏或單或雙生於喉旁亦有

頂大帶小者不犯不痛或醇酒炙博或因患角喊叫犯之則

痢忌用鍼刀宜脹益氣清金湯以消瘤碧玉散點之即效

益氣清金湯

苦桔梗

黃芩

浙貝母

麥冬

牛蒡子

各五
炒研

白茯苓

人參

生梔子研

陳皮

甘草

炒

薄荷

紫蘇

竹葉三十片水三鍾前一鍾

食遠服渣再煎服

消瘤碧玉散

硼砂

冰片

膽礬

各三分

其研細末用時以筋頭蘸藥點患處

清涼膏

用石灰冷水多許化開次日水面上結衣如冰樣撩起半乳
又用桐油拌勻厚者好

推車散

用蜚郎俗名推車虫又名屎推虫
炙研極細末角不入乳姜末五分
要細水灰麩入瘡孔內次日自有骨出盡可醫或用蜚郎腦和灰麩

雷齧手散

用牙皂細辛各三分
硃砂雄黃各二分
桔梗防風木香貫衆陳皮蘇薄荷法半夏甘草各二分
各研細末貯瓶不可出氣治用
腹痛手足厥逆面色青黑
吐瀉痧止硃砂疰軟脚瘡

子龍丸

用製甘遂製法見藥物備要
大戟煮透去骨晒乾忌火炒
白芥子各等為末炒煉蜜為丸梧桐子大每服三分淡姜湯下
忌食甘草之藥同日而服此治痰之本痰之本水也濕也得氣火火則

人中白散

用人中白兒茶青黛硼砂小豆蔻荷元明粉馬尾勃
水片二分研末吹入病重者加犀黃三分珍珠五分
治男婦大小牙疳咽喉痛爛腐鼻紅赤舌腫齧臭淡膿等症極效

開關散

用牙皂辛 細辛辛 四維辛 法半夏辛 廣木辛 陳皮辛 桔梗辛 苜蓿辛
貫衆辛 白芷辛 防風辛 甘草辛 枯礬辛 各藥共研細末礬瓶收貯
用不可出氣 治硃砂症並治感冒風寒及各痧症可用

六味地黃湯

治肝腎不足真陰虧損精血枯竭腰痛足酸自汗盜汗遺精便血消
渴淋瀝舌燥喉痛腎火牙痛下部癰疽痔症
九製熟地 山茱萸 真山藥 雲苓丹皮 澤瀉

八味地黃湯

治命門火虧弱少氣尺脈弱者直服 附子 肉桂水煎服
同上方加二味

甘桔湯

治喉喉痛喉痺肺癰吐膿乾咳無痰火鬱在肺等症 金銀花辛 甘艸平
桔梗平 牛蒡子辛 水煎服

荊防敗毒散

治腫腮漏腮 荊芥平 防風平 羌活平 獨活平 柴胡平
枳殼平 桔梗平 茯苓平 甘草平 薄荷平 水煎服

紫蘆散

治小兒胎毒肉赤無皮或膿血淋漓及胎中受父母楊梅瘡
毒者並治婦女為丈夫通結梅毒瘡陰門楊梅石爛
蘆甘石平 入芫連汁煨三次 再用童便煨淨 用川芎柏木
猪胆汁塗七次 用紫甘蔗皮半燒 存性取淨末用粉兒
茶葉用芫豆研末七次 用赤石脂半燒 用冰片五分 共研末用

真麻曲二兩入雞蛋黃一個煎黑去黃候油冷透調敷 或重者
再加珍珠末 西牛黃三分

蝦蟆散

治一切無名腫毒惡瘡久不收口凡陰疽鼠瘻楊梅結毒等症
硫黃_子 胡椒_子 共研細末調勻取用 癩蝦蟆 一只紅眼腹無八字
紋者不用將藥納入口內用線將口捆緊不用黃泥包裹入炭火
中燒之候泥團紅透取出用碗蓋住候冷去泥將蝦蟆研末忌鉄
調麻曲調敷之

梅花點舌丹

治疔瘡及紅腫癰疔一切無名熱毒初起並實_牙疼喉痛喉
蛾喉風口舌諸瘡小兒驚風急風等症
製乳_子 製沒_子 礞砂_子 明雄_子 真熊胆_子 真血竭_子 苧蓆_子
真沉_子 冰片_子 真射_子 硃砂_子 珍珠_子 共研細末另用蟾酥
_子 以人乳化開和勻搗熔作大如茶豆大用金箔為衣用蠟丸_子

珍珠散

治口瘡牙根紅腫實又喉痛各症 礞砂_子 雄精_子 川連_子
兒茶_子 人中白_子 冰片_子 薄荷_子 黃柏_子 珍珠_子 各研極細
末和勻收入磁瓶不可洩氣

馬牙身丸

金素丹

又名芫靈丹

治一切癰疽大毒發背腰疽及一切腐爛黑臭並治牙疔
腐爛齒齦等症 生白礬各半 枯白礬各半 雄黃半
細研極細末收入磁瓶用

退管丸

用廟宇內陳年硫磺底三錢麩皮拌炒透辰砂四五錢研指甲
麩皮并炒真象牙末半錢蟬蛻五分炒製乳子製沒藥枯
礬各分研細末和勻用芫蠟二錢鎔化攪勻乘熱作速作丸水
芫豆大初服十粒逐日加一粒加至十二粒不可服用酒送服上身加川
芫下身加牛膝各分食忌葷心又方瀝魚甲炒研末麻回調敷即出

咽喉辨治緩急起病虛火之症速急取病實熱可臨咽喉
之患最為陰惡忽然頃刻而痛難思係屬寒症若悠緩
而痛為熱內經云去超非火緩起非寒虛寒實熱是在
明睿者知所區別乃所投而無誤耳此林屋山人妙論也又
凡喉症須於本門先依各方詳細參看斟酌用之為妙

單雙喉蛾

又名喉痺生於咽喉開上者輕開下者重此二症喉開片時即
不可救若男子從鼻梁中心尋至頭頂婦女則從後腦尋至
頂上小兒則看兩手虎口中有水泡紅子即用銀針挑穿喉蛾即破
忌見燈火一面用老蒜搗融蚕豆大敷經渠穴

穴在大指下手腕
廣寸脈汝即是

男左

女右用蜆壳盖^{馬六甲}上紮住片時起一水泡銀針挑破將水指淨以去毒

氣立刻安痊再服甘桔湯 以免後患無藥之處不服亦可此

方屢試屢驗其效無比 又方皂角研末醋調服^半或用

鵝毛蘸藥入喉攪動亦可並敷喉外乾則隨換少時吐出痰涎

即愈此係急症喉風九種喉痺第一方也^以必用甘桔湯調理

又方鵝毛一根粘桐油^{吹入}入喉搥攪痰隨油吐出^{服甘草水}又

方手指甲燒^{吹入}灰其^{吹入}破至便至神或用燈草燒灰吹入立效

又^{吹入}有癰喉症各方極效可用

風火上驚頸腫喉痛 厚^{馬六甲}為^半連翹^半 牛^{馬六甲}旁^半 馬^{馬六甲}勃^半

射干^半 生^{馬六甲}菓^半豆^半衣^半 小^{馬六甲}豆^半服^半 又^{馬六甲}方^半西^{馬六甲}瓜^半青^半皮^半連^{馬六甲}翹^半射^{馬六甲}干^半羌^{馬六甲}活^半石^半 雙^{馬六甲}皮^半 杏^{馬六甲}仁^半 薑^{馬六甲}大^半忌

喉痺治法喉蛾喉閉纏喉風皆曰喉痺者不仁也頃
刻而起危急之症痰在喉中作响々出鼻舌白而不
腫諸書皆稱肺絕不救蓋緣誤服寒涼之藥以致死耳
服桂姜湯立愈以桂姜湯治喉痺頃刻而起毫
無別恙者無別恙者此虛寒陰火之症肉桂炮姜甘草
各五分共歸碗內取滾水沖入乃碗頓於滾水內服藥許
慢慢嚥下立愈或以生附子切片塗白蜜炙透收貯
臨用取出某豆大棗粒口啣嚥津亦立刻愈

外纏喉風此症喉內熱結喉外腫大麻而且癢如蛇纏
頸身發寒執頭自腫痛者即是喉內之痰寒滿舌

有二痰護此痰不出齒作响如鼾喉痺候服涼藥有此
症也水丹遲痰寒鼻內氣無出入即死照前喉蛾皂角
桐油治之仍用姜桂湯見前調理而安

此症內纏喉風甚時惡寒惡熱內外無形出氣短促

胸前紅腫兩足畏寒乃腎經有熱水枯不能上潤也故

照前外纏喉風治法自愈心前出有紅且用針挑斷為要喉

關水雷鄉音者難治

錯喉風喉內無蛾痰聲不響喉內氣急不通者即是照前喉蛾皂

角桐油各方治之 又小兒錯喉風用芙蓉葉搥汁者雞蛋

一貼顛門一貼肚臍即愈

脚根喉风此症位脚根发起直至喉间或一年或半年或
 其病一日行一穴切忌热物老氣和起宜用绿礬砂元明
 粉子冰片子麝香子共研末吹入少许再用又方羌活獨活
 桔梗防风芫荽白芷甘草茯苓前胡柴胡白芍元参
 牛蒡子煎服水纏患起泡者難治

咽喉腫痛日輕夜重之疾出鋸聲乃陰毒也用熟地半茱萸半麥

冬子五味子子牛膝子茯苓子水煎服下喉一聲响亮火熱

俱消或照姜桂湯服之亦可

喉腫心膈閉目不语起首脈散牙緊舌謊手足麻木此名珠砂

疔又名心經疔非喉風急用紅紙捻燒燃心窩背心兩處

見有紅點用針破內有紅經挑出如無紅點少時再着或服並用雷擊子散治之

喉間作兩爛名曰此名爛喉痧用土茯苓並服湯時一服之

忌葷數日即愈又白濁湯加茯苓黃芪二十劑而安又方

服櫻桃數十粒即愈如無鮮者即蜜餞店內糖鹹亦可又方

用紅棗散吹入立愈又方或用人中白散治之立效

喉内生瘡鼻亦爛若作喉風立死用白鹽梅一個燒灰存性

枯礬不穿山甲共研末吹喉中神效或用人中白散治之

喉二瘡已破疔痛難食用猪腦髓蒸醋和食之

乳豆入喉生瘡凡喉瘡日久不愈恐是露天飲食乳豆落下食
之可致咽喉生瘡急用白礬巴豆燒灰吹入即愈或用巴豆
油燒烟薰之鼻孔之法亦妙

喉癰體虛多鬱者患之喉生苔癬色暗不紅不閉不腫氣出少
常微咳痰癢有碍飲食者即是此毒火淹纏難愈忌刺

畏補用頸胎黃牛屎放新瓦上並用瓦蓋周圍用文武火
煨至烟盡存性連瓦取下用鉢蓋住候冷研末用筆管吹入
自愈 又方冰片一分牛黃一分胆礬三分山豆根一分硼砂一分雄黃一分

兒茶一分共研細末另用鹽梅各一個搗融入藥和勻水丸眼大用

風火喉癰此証屢愈屢發並無一痕熱一咳嗽吐血等症惟止喉痛

紅赤或似蝦蟆皮色圈結喉中用秋蝴蝶花根或西即射干也山花梗
 花一樣但去間者花是藕合色秋間開黃花者為真不可誤認
 洗淨搗爛甜酒蒸汁啣口中漱三五次
 吐出再換再漱可以除根

喉内生肉垂者鼻其腫起不消多日方有臭氣透至

臭橘葉煎服數次即愈又方用綿裹快子頭蘸食鹽

點肉上五六次自消再用桔梗与苦連与枳實炒前胡

連翹去陳皮去防風去半夏去紫胡去南星去白附子去

牛黃子物研赤芍去蓬莪尤元參去甘草去煎服體

毒者忌服

喉中結塊不通水食危急欲死用百草霜布銅烟子以脚打燒
首十葉不用燒煤不用

和蜜為丸如芡實大新汲井水化一九甚者不通二丸此名百靈丸

又方胆礬啣片內鬼涎吐盡自愈

喉中忽硬塊如桂圓大吞吐不出不下厚和半夏花芒之

紫蘇甘草 毛姜二片煎服愈

喉中生珠丹溪云此非喉症乃是鼻中生一條紅線如髮懸

一黑泡方如櫻桃也珠垂掛到喉門而止如用刀針了死急活半

膝根獨條肥大者向生草為搗汁以好酒醱四五滴和勻滴入鼻

中或三次係斷珠破吐出瘀血立安或用針刺手腕中紫筋或

刺少商穴去其惡血為神妙

喉中生疔此疔生喉間兩旁或單或雙如桂圓大紅且相

果出痛因肺經受熱可致如忌刀針內服藥氣喘風

湯甘草 桔梗 川芎 當歸 生地 升麻 白芍 花粉

蒼朮 麥冬 前胡 赤皮 乾姜 葛根 車翹 防風 白

蒺藜 生煎服外用射_{各三} 冰片_三 川連_三 研末_時

吹入或刺腕中紫筋_或刺少商穴亦妙

喉間腫大又非癭痛忍二物忍止外現五色按之半空此痰結

用海藻_{各半} 沙夏_{各半} 白芥子 貝母 南星_{各半} 高麗參_三 茯苓_三

昆布 枳殼 甘草_{各半} 製附子_三 水煎服

喉中氣結如梅核_時有時無_時 中黃 梅子 每個用鹽_不 及_不

淹_不 一百一夜晒乾又淹又晒淹至鹽水盡為度每用_不 銅錢三個

夾鹽梅兩個用麻線捆住裝確瓶內封口埋地下百日取出每用
鹽梅壹個含口中嚥汁入喉半刻即消收一年者佳以陳以好

又方子龍丸服之最效

老勞喉痛用生鷄蛋白黃不用糯米根鬚車洗淨印甜桔梗白沙參石斛白麥冬炒

生甘草三分水煎服

穢濁上衝咽喉腫痛用連翹三分馬勃二分黑槐白杏仁七橘紅二分

川檉生五分牛蒡二分竹葉心白水煎服

喉中作癢此喉管傷寒也不可吃茶酒湯水用薄荷二分麝香一分厘

研極細末吹入喉中吐出涎水碗許再用陳米三合湯以之自愈

若先服茶酒等物則難治也又有咽喉癢痛聲嘶方也後

喉症各方

凡一切咽喉急症或閉或痛切忌刀針以免穿
手勒四五次趕血於大姆指取扎髮繩扎住用針刺在少商穴在
兩手大指內外甲縫之中不上不下即是處刺破出血立愈男左手女
右手重者兩手齊刺此百發百中救急第一方也 又方先於後頸窩
處搽油少許用銅錢一文刮之少刮妙樣要順刮切忌倒刮其痛稍
緩以便垂勢盡藥輕者不藥亦可此法極妙 又方用生附子
炮醋調敷兩腳心無論實火虛火俱極神效 又方獨蒜或枚
削去兩頭塞鼻中左患塞右右患塞左喉口中血出乃愈
又方治咽喉不通牙關緊閉不省人事用巴豆搗爛紙包壓

取油作捻點燃吹滅重鼻中使烟氣重入喉內即時吐痰涎惡
血便愈神效 又方凡喉症先一日胸膈氣緊出氣短
促忽然喉痛手足厥冷氣閉此係危症切忌牛黃入口不救惟
用前皂角末服之最效 又方家麻皮剪下七節每節寸長用

旱烟袋燒燃當烟吸食即破未破再食一次無不破矣 又方用

紅枣散 紅枣切去核燒枯 明雄七事女勿徑火 枯礬一 犀黃一 冰片一 銅綠一

麝香一 共研細末收入磁瓶勿令出氣遇喉風等吹入喉中

仰卧少時吐出濃痰可多為妙若烟喉二妙吹入過夜安矣神妙

又方 芙蓉霜嫩芙蓉有刺者不論幾朵于端陽午時切開頭

挖去瓜穰用皮硝裝滿仍將瓜頭竹籤蓋好將芙蓉掛檐下

勿令見日候爪外起霜刷下加水片共研末吹患處止痛如神
夏火喉痛忌用 又方鹽藕節 平時取新藕節烘乾用

鹽醃好固遇有喉痛者嚼汁咽之極為神效陰虛喉痛更妙

又方猪胆礬臘月八日取雄猪胆一個裝入白礬末陰乾研

末次年臘月八日再取猪胆入前水此三四次遇患者用一或分

吹之凡單乳蛾喉癰喉癭腫痛吞嚥不下命在須臾者屢

試如神夏火喉症忌用 又方蘿蔔饅 凡人間有喉症病

者皆因冬天寒氣鬱結不開至春始發須於 初二及冬時將

蘿蔔菜攤在瓦上掛在竹筴放霜天任他風霜露雨雪不收下

到立春前一日收下換掛在無日處陰乾到三月收未用切碎鹽好

收入餅內遇喉風等症煮湯服之甚效甚治痢疾

又方紫袍散治喉內十八症 即綠云散 又名石青散 症忌用 石青 石青

黛 硃砂 礞砂 冰片 明礬 人中白 元胡 山豆根 共

為細末收吹磁瓶內不可出氣用五六厘吹入喉中立愈

六味湯 治咽喉各症凡發火痢者忌服 荆芥穗 薄荷

炒僵蚕 桔梗 生粉草 防風 煎服

蘇子湯 皆治鎖喉纏喉乳蛾風火閉住 蘇子 前胡 赤芍 桔

梗 甘草 元參 連翹 浙貝 煎服

加減甘桔湯 實火宜用之立愈 川連 桔梗 牛蒡子 連翹

黃芩 花粉 射干 元參 赤芍 荆芥 甘草 防風

易水集

卷之八

喉內戳傷飲食不下 用鷄蛋壹個鑽一小洞去黃留白入半夏
壹個微火煨熟將蛋白服之

驚嚇失音不語 有人因受驚嚇失音不語用陀僧即爐底茶調服愈

忽然口不能言 附子研末吹入喉中即愈 又方豆豉煮湯加入好酒服之或

用人乳汁和好酒調服

咽喉聲啞用硼砂丹 元阿粉丹 胆星丹 訶子肉丹 冰片丹 共為末外加

大烏梅丹 梔子為丸服之愈 又方通草煎服或用桶皮煎濃汁冷服

咽喉癢痛聲啞肉桂丹 杏仁丹 為末蜜丸櫻桃大綿裹含化嚥汁

陰虛聲啞人之失音由於色慾過度元氣耗喪雖養首無

能為力惟有未破身十六七童男女五更早^起未食物之前不

必漱口爛嚼海南子栲栳一二個每病者服之換十人嚼至

十次其病自愈男病用童女嚼女病用童男嚼 又方新

好槐花放新瓦上慢火炒熟放身旁隨行隨坐間送一二粒

置口中咀嚼咽之使喉中常有氣味久之自通 又方生白礬

煉蜜為丸服之

喉外生瘰此二疔發於頸項結喉俗名喉結之上石結喉瘰發於結

喉兩旁名夾結瘰重則堵塞咽喉湯水不下若爛見喉難治

和起未破者內服黃連消毒散外敷二味拔毒散水將欲破即

癰毒各方治之

專治咽喉腫痛 月石 石 大生地 搗爛和藥為丸 桂圓核大入
口任其自化 薄荷 甘草 冰片 下西水霜一吹入
喉鴉方斷燈草數莖纏指甲就火薰灼候其燥將二物研細
更用火逼壁虱十個并搗入為末用管吹入患處吹之
可淡嘔吐膿血即愈

喉間方與見脹滿起泡者急以食鹽用搓手背手心鹽乾復易新

鹽搓之數刻即消極效

即臭花娘根

治爛喉痧症極效方 用牛膝根 秋間取之勿論多少水洗去

泥打自然汁尾盆晒乾將汁起入一調羹攪勻晒尾盆宜多

其汁不能通夜一日晒乾刮粉研細末入瓷瓶用時入冰片
少許吹喉吐出稠涎即愈

舌脹滿口此之症由經火盛以致卒然舌大腫硬咽喉閉塞即時
氣絕名曰嬰舌至危之症急用皂礬不拘多少放在新瓦上

火煨紅攤冷研細以礬調羹搗開牙關或用鹽梅擦之或用半

夏擦之自開將華猴之舌上塗效如神再用鍋底烟燒草柴可用冲酒送

服若舌腫而喉內有痰者即是喉風須查明喉各方治之

又方醋調鍋底烟子敷舌上下最效多敷更少 又方雄鷄冠

血擦舌上嚙下即愈 又方蒲黃研末搽之也因寒而得者須

斟酌調治為要

又方草薤子

早粒

紙上取油將油紙燒烟薰

舌上出血薑鼻中自止 又方諸藥不效者以針刺舌下兩旁乃血

出即消切勿刺中央刺則血出不止難救若已誤刺醋調百草霜塗之

舌忽腫出口外或長數寸此亦心火熱極所致用雄雞冠血一小盞以舌

浸之即縮或以舌腫方治之又方真川連半盞濃汁以舌浸之亦好

又方井中一桶令人提起一人引病人前未不可說以將近身即

劈面潑去其舌自收此方暑天始宜收以川連半盞服

傷寒熱病以舌出寸餘不收用冰片研細搽舌上應手而縮頰方效

舌出口角時々搖動此名嬰舌風翠鳥舌

舌頭取出
陰干備用

在兩額上點數點下愈

舌忽縮入銀針刺破舌尖至盡血以臘燭油搽之立愈

舌上出血舌忽出血如湧泉或紫或黑由心火上炎以致血熱妄行用不味

地黃丸加槐花辛並服立愈 又以上舌腫諸方治之 又方茅草

根 牛車前子亂髮為末吹擦立止 又方槐花炒研搗之或

或用頭髮燒灰醋調敷之

舌頭潰爛凡舌爛痛極飲食難進宜用吳茱萸黃辛研末好煎醋調

敷兩脚心用布捆好對時一換 或通用人中白敷治之

舌上生菌此惡症而起如豆漸大如菌之狀痛紅爛無皮朝輕夜

重由心脾熱毒所致用 硃砂人中白 瓦上青苔瓦松

溏雞糞子用傾銀罐子二個將藥裝入封固外用鹽泥封好以

炭火煨紅待三炷香為度候冷開罐取出入好水片麝香

共研細末臨用時先以磁針刺破血菌用藥少許點之再以
黃蘗黃末蓋之內服二陳湯加黃連黃芩芍藥荷煎服
即愈或用上方地尤吳茱萸塗足之法更妙又方取蛛
絲搓作線一條打圈在菌根上其虫自漸收緊收至極痛
忍耐片刻菌荷血虫用百草霜敷或蒲黃末敷俱好
再用六味地湯加槐花二煎服並治重舌甚效

舌硬生衣 用犀角一硃砂一玄精石二兩共研細末將舌尖

刺出紫血用藥搽之即愈

舌下重生小舌 照上舌菌第二方治之又方黃連 山梔 荊芥

黃芩 連翹 本通 薄荷 牛黃 子各一 甘草五分 燈心五分

水煎服小兒減半服

舌下細粒如豆此肺癰也查癰毒門肺癰方詳細辨別

治之

舌下生數夫或遍口生瘡如蓮花又如粟米患此症者飲

食減少氣喘生痰手足俱冷用針刺破兩邊尖者中間

斷不可刺切記切記

小舌生紅泡子每咽喉症不同用陀麻子二兩罐內燒烟吸入喉中可消

補舌法斷凡人遇合刀在口割斷舌頭已垂岸而未斷用雞蛋內白軟

皮套住舌頭另以天花粉三兩赤芍二兩姜黃一兩白芷二兩為末

蜜調塗舌根以白蜜調白蜡稀稠得宜敷在雞蛋皮上日敷數次

三日舌自接住去雞蛋皮再用蜜蜡勤敷七日全愈 又方

如跌撲穿斷舌心血出不止以鷲翎蘸米醋頻刷斷處其血即止

或用瘦猪肉片貼之更妙 仍用蒲黃 杏仁 礪砂 少許

為末蜜調成膏噲化而安又方活解虫 灸乾研末敷

即能生肌藥耳預製以備急用 又方活蟹燒灰乳末沒

藥之塗之即生肉如咬去唇舌用 川烏 草烏 研末攤紙

以桑以涼水調合貼之即不覺疼

此嘴唇生瘡，內生齒，此七情憂鬱，久動而生此怪症也。用柴胡

白芍辛 當歸辛 生地辛 川連辛 川芎辛 黃芩辛 天花粉辛 白果十枚

水服用殭蚕末辛 黃柏辛 共研末，搽之即愈。
或照下頭生白腫塊，治之必效。

口唇腫黑，痛癢不可忍，用大銅錢四片 于石上磨猪油，時時擦之，疔瘡治

口唇赤腫，黃癢或破爛，流涎，用銅青半 宮粉半 阿膠半 冰片一分 黃

連二兩 共熬膏，敷臨用，加麝香一分 厘冰片二厘

口唇緊小，照一唇菌治法必效。

嘴唇陡然翻突，形如猪嘴，此名唇菌症，乃心脾熱毒所致，對時必死。

無藥可救，急燒兩手少高穴，一面用活地尤 十條搗爛，吳萸研末

加灰麩少許，熱醋調敷，兩脚心用布捆住，半日一換，以愈為止。又用

活癩蝦蟆一個 又名癩團 破出血仍照上口唇緊小第一二方治之

用救唇湯服之亦可

口舌生瘡用吳茱萸去核研末好醋調敷兩足心通夜便愈性能

引熱下行故也 又方天门冬七麥冬七元參為末煉蜜丸如

菰豆大の粒雖連年不愈亦可斷根 又方三川連三生研末

吹入小兒並治切忌入喉 又方輕粉三硃砂三明雄七厘冰片四

為末黃先將茶漱口用藥吹入 又方用人中白散

兩腮赤腫俗耳風撐又名疔腮用燈火灯心毒根點曲燒之在大叉指之下

手背微窩處燒一下左燒右右燒左半日即消 又方皂角二兩

生南星二糯米二糯末二若為末姜汁調敷立效 又用大黃白芨

五倍子 共為末 鷄蛋清調搽

又牙 丝瓜燒灰存性研末水塗

頭面腫大 此名大頭瘟 自頸至頭頂 腫成一桶 咽喉閉塞 治法

見卷十五 瘟疫門 用蒼朮 良薑 枯礬 各等分 為末 每

用米泔葱白一大個 搗勻 塗手心 男左女右

痘必鼻常流涕臭不可聞 此名鼻淵乃熱毒乘

於肺經而熱蒸肺竅也用以瓜近蒂三對杏仁

牛蒡子 甘草同煮服 外用以瓜藤燒灰為末吹入鼻中

痘必唇不蓋齒 此氣血兩衰急宜大加培補斷不可服涼藥

否則必成慢驚之症則更費手須請名匠加意調理不可

忽畧若頂門下陷尤宜急治

痘必唇口生瘡 此証上唇有瘡虫食其臟其名曰狐下唇有

瘡虫食其腑其名曰惑由裏熱生虫內食臟腑乃有此瘡

形也必其人昏々好睡不思飲食其聲嘶啞而音不亮即

狐惑也此惡之候必致鼻崩毛落失聲而死宜用陳瘡

丸治之馬牙 苦連 蘆薈 使君子肉 白益蔓 蟬

退燒灰 川練子肉 共為末用真烏梅洗淨去核搗爛和末

為丸米湯下

痘必齒癢或出血 此餘毒留於胃經將成走馬牙疳也治其必

牙齦腐爛常齒癢之時急用連翹 牛蒡 慈菴菴 石膏

生地 銀花 紅花 甘草 煎水時含口內

痘必牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳 用人中白羊 銅錄羊 射

末一 共研末先將濃茶洗淨口牙必用藥吹入 又方生香附 生半夏 為末生鷄蛋白調作餅敷兩足心

痘必咽喉腫痛 用甘草桔梗不 防風之 麝子 升麻射干 益服

陰牙痛緩痛者是 枸杞 丹 蒸瘦猪肉食 二次神效之至

又方牛膝去心鹽水炒 猪腰 對要 猪頭生者 煮粥食立效

又方生附子研末 米調敷 兩脚心極效 又方核桃壳又名胡桃

四五筋打碎加川椒食鹽少許熬成濃汁攤冷時 漱齒極效

陰牙痛火上蒸牙痛連及頭頂此二症陽何有餘少陰不足宜

玉女煎熟地 麥冬 志 石膏 知母 牛膝 煎服

風熱上蒸牙脹頭痛連翹 滑石 銀花 西瓜青皮 生绿豆衣

活中蘆 煎服或煎成風火牙痛各方治之

風火牙痛 腮外發腫者是 生地搗爛加潮腦少許 不可捶勻貼患處吐出

涎水神效 又方陳鹽梅子含內吐出涎水數次即愈 又方五倍子末冷

水調敷腮甚效 又方木患子又名洗牙菜三四個去核用生鹽塞滿加

雄黃少許燒成炭末冷透火氣加米片和勻吐搽牙出涎水再搽再吐涎水盡

自愈極效 又方生白灰一條擦鹽少許又燒存性研末併擦涎盡即愈腮

腫用水調末敷之極效 又方菟菜根燒灰敷之甚效 又方北細辛三分

北五味三分共搗為丸塞痛處立效水沖

蟲牙作痛痛在一處齒縫有膿或無膿皆是 雄黃末五分麝香油五分調勻含口漱片時吐

出再漱數次即愈此治牙虫第一方也 又方雄黃末和枣肉為丸塞

牙縫日換數次極驗 又方五倍子煎濃汁含漱數次其虫立死其

患亦除

走馬牙疳凡大人孩一疔之凶及小兒痘疹之凶火毒流於

胃經致有此患勢甚急甚則手足穿腮透鼻一二日即
能傷命此症有身不治不吃爛舌根不治黑腐出筋不
若白色肉浮者為胃爛不治牙落穿腮鼻臭不堪聞
者石信山根上蒼紅點不治亦是凶險命須更急用生大
黃_三丁香_十粒菜豆_三共研末熱醋調敷兩足心最為神
仍照法金鞭散治之庶幾十可救五金鞭散綠礬_{四兩}煨_赤透人
中白_三雄_一麝_六冰片_一先將銀針批刮去腐肉
紫血在後將藥研末搽之吐去毒血惡涎方能愈也
又方赤痢散專治此证紅束一枚去核入白砒_一粒_炒燒
成炭研末加冰片_一又研細將腐處洗淨吹入神效

又方生南星一個當心剉空入雄塊麩裏燒候雄黃熔取出用

碗蓋在候冷去麩研末加麝香吹入甚好又方人中白並牙甘咽喉痛爛腫出血

等証人中白 兒茶 青黛 硼砂各半 薄荷 元明粉 馬勃各五分 加

冰片各共研極細極細搽之出病重者加犀角三分珍珠五分

甚效更速咽喉吹入一日三次

牙痛腿痛名青腿牙疳此証而腿形如雲片為紅或大小不一

痛而腫硬步履難行其毒上攻以致牙根腐爛甚云牙腮

破唇口前方治之腿上腫處用清涼膏

服六味地黃湯九製熟地 山茱萸 山藥 雲苓 丹皮

降瀉

盤根牙癭牙根破爛甚至牙骨通身脫落須用金素

丹生白礬石礬枯白礬石礬雄黃石礬研極細末用搽在牙骨

牙根腫痛紅腫痛甚者牙癭刺出毒血用珍珠散吹內

服龍瀉肝湯即愈 倘牙骨及腮肉疼痛不腫不紅痛連

臉骨者名骨槽風治法見後

牙腮疼痛初起不紅不腫久則潰爛或有骨出此名骨

槽風乃陰疽也初起有誤認牙二疼多服涼藥以致成

功爛至牙根延爛咽喉不救未潰爛者宜用二陳湯加陽和丸

並服或服陽和湯潰爛者用陽和湯犀黃丸每日早晚搽

服亦有骨在內用推車散吹入過夜其骨不痛自出候骨

出盡用生肌散吹入內服保元湯加肉桂
草收功屢試神驗

火鬱牙疼結核齒腫 夏枯草^水犀角^三黑

參^少知母^少連翹^平銀花^平生甘

牙縫出血此^{二三根}名牙宣^二症又名^一劔乃陰虛^一熱極^一

用黃豆渣^一用敷之立止^一黑豆無用^一再^一

或滿口牙齒出血用^一前豆渣^一治止^一又方用^一薑黃^一燒

又方^一芟^一菖^一含^一口內嚼^一之^一敷^一一^一則^一再^一換^一又用^一毛^一草^一

刺骨疽 此症一名朽骨疽多生腮腮牙床眼胞頰下手
足腿膊等處其之症与附骨疽大約相同亦陰症也又初生
小兒身內即有出脆骨者其人長大亦是處突腫生二疽潰
破骨脫其口方收 生附子為末調作餅如三個錢厚貼
瘡上以艾絨一團四五分燒之但令微熱勿令疼痛出餅乾
則再換藥餅燒之務以瘡口紅活為度餘如附骨疽及陰
疽各方治之 又方烏母鷄一只去肉取生骨燒成灰并取
鄰右三家所用甑底及砧案各刮下垢屑一而俱燒枯共研
末納瘡口其碎骨即出而愈

