

標
五
炎
歌
謹
治
括
合
編

劉亞農著

標病歌括暨五炎證治自序

夫人病宜求藥藥所以治病病不致死者多因誤藥而死者尤多誠能於初病時按經下藥審體施治（指天地人三才）易如反掌有症已深入者既察其病之複因並審其病之傳變譬舟師之行船然遇風轉舵旋運自如方能破浪而出險倘祇外測其某臟之發炎某部之損壞熱度之高低以爲診斷之根據抑亦末矣蓋人體五臟六腑互相連係方寸之間極易牽掣故古醫有肝旺迫肺肺熱移腸腎火上升脾濕下洩參以五行之理即所謂木能侮土火盛刑金水能涵木金能生水諸名詞皆臟腑相互乘傳之變化豈有某病祇逗留某部而無牽動流轉之虞乎西法以肺炎治肺膈炎治膈心房弱則注射強心針血液虧則注射他人血大抵就病之已發而遠於患處者施治是但治其然而未治其所以然與頭痛醫頭腳痛醫腳之謬何別又西醫往往指摘某病無藥某病以乏抵抗力無治與吾國病求其情藥期起死之說迥乎不同及其所患外發乃復汲汲於施用手術人但謂其刀圭之神不知若

標病歌括

二

早洞其源一七之勞可解不亦彼善於此乎嘗論治病拘於局部即誤藥誤治之見端凡涉局部之症其致病之因何在萬不可不知之即以瘡癆論非因濕熱蘊蓄於中毒火滯鬱於血乘暑氣外蒸其患何從而起能詳斯理必瞭然於傷風傷寒發痧發疹白喉赤眼及腦膜肋膜腹膜肺炎種種見病之所由來矣故西法重衛生爲防病於未然甚有可取消病之既發乃忽其所以然復因天時地理人事之殊不精求藥餌奏功祇希望體力抗病其曠日需費事倍功半有非中人以下之資力所堪任者人命至此亦一萬目傷心事也亞農襄朽餘生濟世乏術爰就管見所及亟編最淺近之標病歌括及五炎證治以公諸世俾未學醫者人手一篇略有醫藥常識知所去取並藉供現今貧弱社會之一助焉耳

民國二十八年己卯春月閩侯幼雪劉亞農序

標病歌括引言

劉蘭亭著

六淫之邪由外招

寒暑燥濕風火超

傷寒名論人莫解

何若定名爲病標

六氣之太過爲淫。（淫過也）淫即爲邪。故寒淫，暑淫，燥淫，濕淫，風淫，火淫。有因時令之寒暑燥濕風火襲人之深。有因其人自不慎。冒寒冒暑傷燥傷濕中風中火之深。而病生焉。仲景名其書曰傷寒雜病論。六淫之邪。包括其中。流傳之久。遺了雜病二字。是以後世學者。疑惑費解。不如症屬外感者名之曰標病。（標表也）症屬內傷者名之曰本病。

傷 風 證 治 歌

鼻塞嚏涕喉乾躁

桑菊薄荷竹貝熬

寒重荆防與姜蔓

熱重豆葛芩梔高

傷風鼻塞嚏涕喉乾躁或腥臊薄荷甘菊桑葉竹茹川貝即可愈之寒重酌加荆芥防

風生姜蔓荆子熟輕則加黃豆卷葛花熟重則加淡豆或葛根黃芩梔子以上藥之分量體虛者每味自數分至一錢體壯者自二錢至三錢以下之分量倣此酌之

傷風咳嗽桑枇杏

肺熱蘆竹益辛涼

寒鬱蘇覆前胡選

痰多陳半臍服商

輕傷風咳嗽桑枇葉杏仁或加桔梗熟甚加竹茹竹葉蘆根川貝知母桑皮花粉蜜馬兜鈴等鬱甚加桔梗玉金紫蘇旋覆花前胡等寒重加紫蘇梗細辛乾姜生姜芥子等

熱痰多加竹瀝川貝浮海石天竺黃桔絡菜菔子葶苈子等寒痰加生姜崔半夏胆南星白芥子等有濕加陳皮半夏茯苓薏仁（陳皮怕燥氣改用青鹽陳皮）或鮮橙皮

白芷獨味香汗散

善治頭痛與傷風

葱白姜豉漿麪可

藁本頭痛第一功

香汗散只白芷一味古方以之治傷風善發汗並治頭疼寒體宜之葱白生姜豆豉亦治傷風倘頭奇痛藁本爲良但火體並溫熱之病皆不相宜且其他頭痛不在此例

火盛辛燥不相宜

寒選芥防等味醫

竹貝蘆芩須制配

不然化燥防血癆

凡火體重傷風甘菊桑葉等表之無效如邪重加淡豆豉葛根黃豆卷青蒿梗荆芥防風羌活白芷等就其病體所宜者選一二味但須加川貝竹茹花粉麥冬以潤之火重舌苔黃燥者再加蘆根黃芩銀花滑石元參等以制其辛烈清其裏熱若多用辛燥

之肺熱肝熾或咯血耳聾鼻血喉腫痛生白糜煩熱等症

普通之法以輕騰

兩豆五葉葛根升

祛風發汗兼退熱

丹蘆翹通佐龍勝

近代治傷風重傷風不以荆芥防風羌活白芷等退熱發汗如黃豆卷淡豆或五葉飲
葛根佐以蟬衣蔓荆子鈎藤甘菊淡竹葉葛花丹皮蘿蔔連翹木通等清熱驅風而不
剛燥諸味隨症加減惟風寒重者須加荆芥防風羌活白芷一二味 五葉飲方

桑葉 桃葉 薄荷葉 淡竹葉（或用鮮竹葉） 青蒿葉（或用荷葉） 杏仁 連
翹 竹茹 枳壳 半夏等

小便短赤防腸炎

豆通車前六一添

大便結宜朴瓜郁

秘塞清甯方安恬

發熱小便短赤防小腸炎酌加赤小豆木通車前草通草澤鴻路路通六一散等洩其

膀胱熱氣如大便乾結輕則以川朴杏仁瓜萎未通加郁李仁如秘結須以清寧丸下之
六一散方 滑石 甘草 清寧丸方 大黃 生地

腸乾音啞是傷風

桑蠶桃杏最生效

寒涼辛燥不爲功 兩劑甘寒漸補充

腸乾每以熟治不知乃遊風黏上膍也音啞亦是傷風用元參麥冬生地等多致失音
喉痛或肺病蓋風寒往裏走不能外達宜以桑葉殼蠶桃葉杏仁表散上膍之風寒兩
三劑之後再加竹茹川貝蘆根麥冬知母元參乾地等品桑白皮治風火音啞最好

風寒時令癰癧疹

兩豆五葉並葛萍

再兼宣肺繼清解

銀翹藍紫及公英

時令風寒常發癰癧疹以黃豆卷淡豆或五葉飲等重則加宣肺如前胡桔梗紫蘇等
升表如葛根浮萍等均可選用清解如銀花連翹板藍根紫草芩搗牛蒡山豆根紫地

丁蒲公英等酌加之

兒童胎疹只一次

疹花滑潤異癩癩

俗傳夢寐與香菜

實在須請小兒科

胎毒出疹兒童只發一次亦有成人後方發者比諸風疹癩疹濕疹毒疹易發易謝者不同潮熱三五日方見於頭面六七日透脚紅淡疏密隨其稟氣之厚薄疹花成朵用手摸塗滑潤無刺俗以夢寐香菜（即芫荽）煎服令其透發解毒究之驗證甚多宜延醫診之且須避風禁口匝月

須知癩疹痧白喉

肺部瀰漫方出頭

鬆肌宣肺藥並用

透發清裏便無憂

凡癩疹痧等皆肺部發生瀰漫後方達於肌膚白喉亦由肺部發於咽喉故用藥宜宣肺鬆肌熱象重不必透發即須解毒清裏熱輕寒重宜先宣表而後清解

白喉原由風火毒

從來忌表怕升柴

火重養陰清肺可

風寒重亦表散佳

自喉原由肺胃有熱挾風寒而發忌表最怕升麻柴胡防其火氣上升如火之燎原不可遏制然火毒七成風寒三成者養陰清肺湯加解毒之劑如板蘭根山豆根射干銀

花紫草大黃馬勃黃芩梔子風寒七成火毒三成者專與甘寒苦降轉致寒邪下陷故

白喉忌表一書亦誤人不淺真白喉症重者兼注射西藥馬血清

標病脈象應滑浮

寒邪深入滯不流

解肌升表藥須重

藥後標病乃易瘳

風寒重則脈滯滯便知其邪已深入宜表散之而病轉劇則知其風寒已達表病象已現易於投藥（標病指傷風傷寒時令外感而言）

脈來濡緩屬虛寒

類似濁象分別難

虛甚傷風常自汗

桂枝玉屏服則安

凡濡鬱之脈與濡緩之脉極相似濡鬱爲邪實濡緩爲本虛指下分別不清人命係焉虛寒人傷風表虛自汗宜桂枝湯或玉屏風湯加減治之虛極寒極且加附子溫固之

汗方能止寒熱易退。(桂枝湯方 桂枝 药蘖 升草 生姜 大棗)

(玉屏風湯方 防風 白朮 黃芩)

風熱自汗屬陽明

虛實之間審病情

陽明自汗葛根症

傷寒論內法詳精

陽明病多自汗乃屬熱須用葛根以升表之內熱重加川連黃芩白芍丹皮梔仁傷寒

論陽明篇已詳言之

南方穀食人多濕

祛濕開胃病易瘳

通解三焦茵橙佩

二陳溫膽方常投

通解三焦方 玉金 川貝 遼翹 川朴 蔴仁 竹茹 川連 法夏 茯苓
桔梗 甘草 二陳湯方 陳皮 半夏 茯苓 甘草 寒者加生姜大棗 溫膽
湯方 竹茹 桔壳 陳皮 法夏 茯苓 甘草 濕輕者 茵陳 佩蘭 炒蔻
仁 橙皮等(橙皮卽鮮柑皮)

北地傷風呼傷火

土燥煤毒燒燶加 重則清瘡牛黃佳

北人每有風寒皆呼傷火蓋北地風高土燥春秋冬三季常不雨終年燒煤含硫磺氣
毒而辛喫烤餅則尤乾燥有病必以銀翹羚翹解毒丸進之重則清寧丸清心牛黃丸
等銀翹解毒丸 連翹 銀花 竹葉 桑葉 筍荷 生地 山楂 荆芥 桔梗
牛蒡 甘草 羚翹解毒丸則加羚羊角 清瘡解毒湯方 金銀花 元參 連翹
白菊花 桑葉 天花粉 淡竹葉 薄荷 桔梗 薄荷 桃仁 赤芍 牛蒡

浙貝 甘草 牛黃清心丸方 牛黃 玉金 黃連 山梔 黃芩 硫砂

蜀湘贛鄂水皆冷 荆芥羌桂喜溫辛

每逢溫病皆誤藥 葛鼓涼膈可回春

湘蜀山高水冷人蠶知之贛西鄂北亦然日以姜椒爲餉客必需品外感傷風必以荆

防飲九味羌活湯爲先重則桂枝湯遇風濕病濕熱病亦投此方每成昏睡乾焦之候而不知其誤藥也豆豉柴胡葛根芩連梔涼膈散皆不善用 荆防飲方 荆芥 防

風 枳壳 竹茹 川貝 甘草 淡竹 連翹 枳梗 苦杏 茯苓 黃芩 九

味羌活湯 羌活 防風 蒼朮 黃芩 川芎 白芷 甘草 生地 胡椒末

生姜 薤仁 葱白 或以細辛代胡椒末

燕翼地燥忌升提 火症升柴菲所宜

猩熟溫疹萍葛膈 越婢白虎最易施

北方土地高燥溫熱症其勢如火之燎原故最忌柴胡次忌升麻凡猩熱溫疹症只宜
羚翹葛根浮萍涼膈散重則越婢白虎芩連元參知母麥冬丹梔大青葉等涼膈散

方。梔仁、連翹、薄荷、黃芩、大黃、芒硝、越婢湯方。麻黃、杏仁、甘草、石膏

病重本非旦夕發 升表轉劇乃外揚

病家勿認醫藥錯 症象分明易立方

凡風寒邪重皆苦之已久而後發升表之後諸症並見似轉沈重乃邪熱外達症屬何
經較易下藥醫家下藥須耐守兩三日方知有無錯誤

表散藥物數十味 因症下藥選所當

經絡門戶認清楚 辛燥寒平自商量

表散之藥五十餘味拙著二十世紀傷寒論詳列一表病在何經分別選用之

以上初病退熱法 肌解舌濁胃不安

開胃鬱杏溫膽朴

清裏應該琴竹丹

凡肌熱不解而舌當渴口無味乃胃氣不降以鬱杏溫膽湯川朴等開胃黃芩淡竹葉

丹皮薏仁之類清其餘熱可也傷暑傷寒肌欲解時仿此

寒邪欲罷樞不轉

秘訣太陰啓膈宗

或以小柴湯和解

熱盛大小陷胸從

凡風寒熱度欲罷或已罷而口不知味胸膈鬱悶或嘔逆或痰濕未化或用升表之劑夾雜寒涼太過乃手太陰或少陽樞機未轉兼有濕鬱宜以啓膈飲或小柴胡湯加川朴杏仁轉其樞機內熱加淡竹葉連翹黃芩以清之熱重便秘酌加小陷胸大陷胸湯嘔逆加薤白桔梗法夏陳皮生姜竹茹枳壳等小便短赤加木通赤豆路路通等寒熱未退加五葉飲葛花茵陳等 小陷胸方。瓜蒌。川連。半夏。大陷胸方。大黃，芒硝，甘遂

風寒嘔逆氣不升

小半磨膈治最能

若用吳萸降其逆

邪引厥陰病反增

風寒嘔逆乃邪氣入於太陰清氣不能上升或挾積挾濕中焦樞機不能旋轉宜啓之

宜之若誤用辛苦降逆之吳萸或萸連則邪引入厥陰嘔逆更甚病苦難堪

傷暑證治歌

傷暑口鼻熱氣張

中喝從古本清涼

薄桑荷蓮藕諸品

六一白虎芩梔商

五葉飲以菊葉易荷葉加藕節蓮花等

六一散方見前

白虎湯方

竹葉石膏

甘草粳米

暑常挾濕愛芳香

橙佩藿香胃苓藏

若挾寒邪照前法

病重體質香薷良

暑如挾濕上方可加橙皮佩蘭藿香洩瀉加平胃散等暑重體質者非香薷不能發汗然亦不可重用 平胃散 藿香、陳皮 川朴 茵苓 荘北 甘草 或加姜

東 胃苓湯 加桂枝 漚瀉 猪苓

夏日人體驗井泉

冬溫夏凍似深淵

惡熱飲水貪瓜果

不是霍亂即痢瘕

常人不識夏日地氣下行中焦寒冷暑熱鬱蒸嚴威迫人渴則飲水肆啖瓜果不已入秋卽霍亂吐瀉輕則痢疾

霍亂根源半暑積

祇以桂附難回生

蘇合香丸加朴麴

鍼灸姜鹽速贍行

霍亂服平胃桂附理中難以回生其症奇猛以麝香加消積清暑之劑重則進蘇

合香丸煎服便利再取以生姜四斤鹽一斤炒焦黃輪流裹臍並取一盞沖童便飲使
姜鹽濃汁熱氣直入下焦亦神方也外須針灸刺內關（此穴最要）三腕氣海關元各
穴症重再灸各穴數十壯亦生效也。蘇合香丸方。蘇合香，安息香，犀角，冰
片，射香，香附，木香，沉香，丁香，薰陸香，白朮，蜜丸約二錢五分大硃
砂爲衣每服一丸至三丸

傷寒門

太陽經症治歌

風病在絡不在經 絡是橫形經直形

病入太陽經第一

頭痛項強說爾聽

太陽症寒熱頭痛或祇熱無寒或項背兀兀然是病入經之第一門戶也

治法却與傷風倫

休恃仲景麻桂湯

仲景生長限湘漢

地氣溫帶熱帶分

張仲景生於襄陽爲長沙太守足跡祇限一隅不知南方溫帶北方寒帶之風土所宜

桂枝麻黃不加清涼之藥下咽或鼻衄咳血釀成一切乾燥溫熱之候

陽明經症治歌

寒傷陽明寒熱重 第二門戶出汗當

葛根麻葛方加減

熱化寒化別辛涼

邪至陽明經則進第二門戶矣自宜發表令共出汗葛根湯或麻葛隨症加減

陽明旺於申酉戌

面赤胸痺頰燥多

挾濕二陳或溫膽

熱盛涼膈芩連和

凡陽明症而亦煩熱下午爲苦胸膈不舒乃熱氣上升也亦有挾濕者加以二陳湯或

溫膽湯損益之

陽明挾嘔多胃熱

積與熱并芩朴靈

胸痺瀉心與小陷

便閉下利裡熱形

小便閉用導赤六一散如下利亦屬熱以葛根芩連湯大便閉酌加大陷胸湯調胃承

氣湯

傷寒便結大腸炎

涼膈斐李瀉葉兼

重則白虎承氣繼

若至腸血病情嚴

傷寒肺移熱於大腸則發炎宜用涼瀉散酌加瓜萎郁李仁普瀉葉以瀉其火重則用

白虎加承氣湯若至腸血則難救矣

承氣虛弱不堪嘗

導下蜜箭却莫忘

皂角大黃加冬蜜

玻璃淋管注射良

標病歌話

仲景蜜箭導法比西法剉藥塞肛門勝得多蓋剉藥祇限於肛門及腸之下部蜜箭能灌入腸之上部覆臥一夜或數勾鐘則腸中之宿積一概被皂角洗滌乾淨大黃與冬蜜之涼潤隨大便而下予常加川連與紫草隨症候加減凡臍旁作痛且發現如指形多屬久積在胃腸之間雖用大劑大黃朴芒不能下之仲景用上藥參水以牛角管灌入肛門予改用西藥房注射自濁的玻璃管吸水一管插入肛門注射之射水入腸中後徐徐取出肛門口用棉花少許塞緊令其忍臥俟大便不能忍時入廁糞與滯積蜜下未盡隔日再施行之

狂熱白虎與涼膈

結胸大小陷胸湯

昏譫羚犀清心可

輕者紫雪亦專長

狂燥煩熱屬陽明症多結胸昏迷譫語可以犀角地黃湯涼膈散竹葉白虎湯葉氏清心牛清丸（北安宮牛黃丸勝得多）蓋牛黃清心丸太多金石之品輕者紫雪丹至

寶丹亦可選用但煩熱亦有戴陽症戴陽虛極陽越於上不能歸陰非桂附左歸右歸
湯不可

少陽經症治歌

少陽病是第三經

頭痛肌熱寅卯辰

寒熱嘔逆少陽症

小柴和解轉樞真

少陽症偏須以小柴胡湯和解之並轉其樞機到此症候卽北地亦不忌胡柴蓋非溫

熱之極不慮其升提也

少陽病症每挾鬱

鬱杏朴蔻薤宜

苦棟亦爲疏洩品

萼梅木瓜寄生隨

少陽屬肝肝屬木木易生鬱故少陽症多有滯鬱胸胃不舒嘔逆等症以玉金杏仁厚

朴蔻仁薤白瓜蒌苦揀綠萼梅木瓜桑寄生等且有肝移熱於肺之咳嗽非小柴胡不爲功

亦有瘴氣與寒滯

柴桂藿蔻姜夏先

不虞辛燥期化濕

積重神麌巴豆妍

柴桂各半湯藿香平胃散佩蘭玉金陳皮草葉姜夏川貝等以祛濕散寒治療氣似瘧
非瘧之候症到少陽即入陰經故曰半表半裡之間腸胃積加建神曲重則以巴豆

以上治法少言脈

太陽浮緊滑推詳

陽明洪數急其象

少陽弦急大兼長

此祇言三陽脈之本象如是

浮緊脈象非散數

洪大之脈豈濶虛

弦硬之脈非芤象

虛實疑似察宜徐

浮繁洪大弦硬皆屬實邪宜重表虛關芤脈皆屬虛症宜扶中指下最須審慎分別且有半虛半實浮繁兼散數洪大兼關虛弦中兼芤更宜神之又神參詳症候

三陽合併證複雜 雙解冲和陽旦選

寒涼雜錯方相宜
傷寒大論是吾師

三陽複雜之候非筆墨所能詳亦有投藥錯誤所致之症候宜熟讀傷寒論遵其法而治之姑選三方如下
雙解方 滑石 甘草 石羔 黃芩 桔梗 防風 川芎 當歸
白芍 大黃 麻黃 薄荷 連翹 荆芥 芒硝 白朮 橘子 生姜 葱白 (按此方錯雜不宜於今人宜揀選數味用之)
冲和湯方 羌活 荜朮 防風 川芎 生地 黃芩
葛根 白芷 紫胡 石菖 細辛 甘草 生姜 紅棗 (按此方亦宜減輕損益之)
陽旦湯方 桂枝湯加黃芩

半表半裏陰陽侵

先入太陰與厥陰

小柴通解爲要劑

太陰姜桂加鍼灸

邪在陰陽之交入厥陰者以小柴胡湯加減再施鍼刺期門氣海少商大衝少澤中醫巨闕等穴邪入太陰者以桂枝湯柴桂各半湯保和湯通解三焦湯加減再施鍼刺上中下三臟肺胃俞巨闕陽關公孫等穴

近代之人體澆薄

腎氣不沈易病溫

寒病變爲風溫症

熟讀條辨指南文

經云冬不藏精春必病溫近代人體沈實者少陽浮於上陰虛於下且精神過用淫慾無度故病溫者多宜宣葉天土臨症指南醫案種福堂公選天士醫案溫熱論暨吳鞠通溫症條辨

傷寒挾濕曰濕溫

濕邪祛滲貴芳芬

剛燥劫陰動火忌

大寒邪陷熱內焚

陽明爲水穀之海太陰爲濕土之臟濕溫多屬陽明太陰同病溫重宜側重於溫濕重宜側重於濕寒濕在氣分者輕則芩金薄荷佩蘭葉秋荷葉川朴法夏杏仁橙皮等寒濕在中焦者重則藿香香薷蒼朮良姜白芷姜夏羌活等火濕宜滑石木通薏仁粉葛青蒿茵陳炒荷葉通草土茯苓等濕熱侵入經絡隧道中症見四肢牽引拘急甚則角弓反張輕則葳靈仙豨莶草海桐皮秦艽蒼耳子絲瓜藤海風藤地龍滑石桑葉忍冬藤黃連知母丹皮梔仁等重則犀角地黃丸羚羊白虎湯等加減

二十世紀傷寒論

拙著側重天地人

溫病濕熱專篇附

拙著縷析費苦辛

拙著二十世紀傷寒論於內經察四時辨五方審形氣諸要旨特鄭重申明以補仲景所未及并附溫病篇濕熱篇可資參考

此是傷寒大模規

夾雜他候在兼治

遠因近因須審問

先後標本宜深思

凡治病必詳查其近因遠因探其病源治較易瘳至於宜先宜後顧標顧本或標本兼顧何法爲適宜神而明之在乎其人若夾雜他症非兼治不可

標病治法一盤珠

卅年經驗舉其隅

傷寒全書宜爛熟

指南條辨具規模

標病凡傷風感冒傷暑時病傷寒溫病濕熱各病之通稱傷寒論及臨症指南溫症
條辨各書宜詳細研究

五炎證治

肺炎症治歌

肺炎風熱尋常症

病未入經火上蒸

挾火挾痰兼氣喘

驚惶無措最堪增

風溫初步先入肺經肺爲華蓋最高之頭風邪由口鼻而入寒邪由肺俞而入兒童夜睡肩背往往外露肺俞穴最易受寒故此症兒童爲多風與火併祇限於肺胃之間肺炎則咳嗽作痰滯肺部則肺氣不通而喘作症輕者以桑葉枇杷杏仁前胡以散風宣肺風寒重者照傷風門選用淡豆豉黃豆卷葛根葛花一二味以表散之火重者加竹葉黃芩丹皮梔仁蘆根以清裏喘重者以旋覆花礞石并用最易生効但須加清化滌痰之品如天竹黃川貝法夏瓜萎竹瀝汁之類痰多則夢蘿子萊菔子風化硝牛黃萬金錠等須酌加之痰實而壅則膽星硼砂白礬礞石滾痰丸均所應投內熱重則川連

知母黃柏生地元參人中黃石蒸龍膽草大黃皆在應授之列蓋龍火上奔勢不可遏非苦寒甘涼與散風滌痰重劑並進不足以撲滅火燄而收其炎腫降其喘逆

普通治法費詳參

勢急麻杏石膏甘

痰在巢窠百不効 營寒衛熱此中探

痰在肺之巢窠及營寒衛熱之重症非用麻黃不能解肌通竅然麻黃辛溫故宜配以石膏之大寒佐以杏仁之降氣甘草之甘平以和緩之故麻杏甘膏湯適用之。

至於風重火重痰重照上條法加減如痰迷心竅症見昏迷譖語等可加牛黃清心丸紫雪丹等。照溫症治之。 麻杏甘膏湯方 麻黃 杏仁 甘草 石膏

亦有腎虛痰喘症 偶感風寒肺發炎

小青龍方加沉附 最妙輕表繼鍼砭

腎虛氣喘之人偶感風寒發熱氣喘肺亦發炎治法祇選用蜜欵冬紫蘇前胡桔梗杏

仁薑荊子加桔紅法夏茯苓蘇子等重則加芥子針刺肺俞風府少商少衝氣海丹田各穴更易見効倘外感重須以麻黃桂枝湯或小青龍湯酌加破故紙沉香附片以固腎前條各方不可輕試

氣管枝炎症治歌

(二)

氣管枝發炎乃最輕傷風之症外寒內熱乃寒火邪氣襲諸皮毛喉際與肺胃熱氣相乘症見咽喉痰嗽喉癢或有輕頭痛鼻塞惡風發熱治法見傷風證治第一第二兩歌

肋膜炎症治歌

(三)

肋炎之症多氣秘

肺氣不宣水不行

小青龍湯方第一

刀圭抽水最無情

傷寒寒水之氣壅於肺經肋膜則發炎作脹或咳嗽或不咳嗽宜遵金匱法以小青龍湯加減進之輕則旋覆花桑絡前胡桔梗桃葉川貝蜜兜鈴宣肺通絡可愈

小青龍湯方 麻黃 桂枝 白芍 乾姜 細辛 五味 甘草 半夏

肺部風邪往肋行

寒涼補濬症因呈

或因麻醉邪旁歛

宣化鬆機病自輕

肺受風邪本無此症多因外感未罷或誤補機滯或誤涼水泛致邪氣內歛或服麻醉劑止咳嗽肋絡之氣不舒以致發炎祇以宣肺行水法可以愈也

亦有肝氣沖肋膜

水氣上升脇上多

舒肝行水真妙訣

熟讀小柴舒肝歌

肝氣能冲胃亦能沖肋膜鬱滯化熱成膜以舒肝行水法治之小柴胡湯加金鈴子可也重者以舒肝丸加減 小柴胡湯方 柴胡 半夏 黃芩 甘草 茯苓 生

姜 人參。舒肝丸方 香附 茯苓 廣皮 姜夏 厚朴 枳殼 青皮 烏藥 元胡索

白朮 沈香 砂仁 檳榔 甘草 山楂 神曲 苦棟皮 黃芩 牛梔

腦膜炎症治歌

腦炎古話是驚風

風火血氣腦袋冲

算是風溫病之一

熱邪鬱遏自膻中

此症兒童最多，蓋兒童秉純陽之體，肝火素旺，飲食不化，痰積於膈，固屬尋常，遇春冬時令，感時氣則發，熱在中（在肺胃之間），鬱熱伏火上奔，腦際症見神識昏迷，頸項緊急，牙關閉目，上視壯熱驚悸，弄舌搖頭，弓角反張，或挾食積嘔吐，下利知其病源，開洩清解大約以桑葉白菊鈎藤丹梔芩連爲君，清解瀉火，重則羚羊犀角地黃白虎涼膈，各湯加減酌加芒硝大黃，以達下至紫雪丹玉樞丹萬氏牛黃清心丸至寶丹五瘤丸。

龍膽瀉肝湯硃砂安神丸等均可選用尚須加紫石英海浮石決明元精石等以降之心靈手敏方易生効

紫雪丹方 金箔 寒水石 滑石 石膏 磁石 射香 升麻 元參 甘草 星角 犀角 猩羊
沉香 木香 丁香 朴硝 辰砂 硝石 五薑丸方 硃砂 真珠 雄黃 水銀 黑鉛
蜜煉如蘋子大 每服三四丸 硃砂安神丸方 硃砂 黃連 生地 當歸 甘草 萬
氏牛黃清心丸方 黃連 黃芩 山枝 玉金辰砂 牛黃等 至寶丹方 星角 硃
砂 琥珀 珊瑚 牛黃 射香 雄黃 龍腦 箔金等

亦有少語頭劈痛 各病却與傷寒同

七味龍膽蟷黃引 莫用柴芷與荆葛

凡腦炎之症每因膽氣上逆故常見頭奇痛並無神識不清角弓反張之現象臨症不慎照重傷風治之則誤矣蓋其症微熱惡寒常昏睡若醒則呼頭痛卽此症也近醫傳

錢橘製七味龍膽湯一方十愈八九甚有見地方以龍膽草二錢濱菊花四錢半川連
二錢鮮生地歸身各四錢犀角三分回生丸半粒此方係本于金龍膽湯加減之但于
金龍膽湯有柴胡桔梗嫌其升提故易以濱菊花部見宜加桑葉鈎藤并蟬娘大黃較
易生効于金方主藥係大黃一兩蟬娘三枚蓋取蟬娘性喜撲火而腦膜炎之灼熱智
慧不清皆因風邪旺盛與氣與血合併上行蟬娘既善撲火且遇驚則伏頭縮脚而墜
則其性上升而又下降並加大黃若干相其症候與病體加之能使胸腔中之漿膿血
膿循腺道而排泄於腸胃又可知矣熟盛芩梔白蒺藜石羔知母石决明均可加減當
歸易治草風寒重頭項脊強痛者須重用冬桑葉與葛根以表散之

真寒厥逆症極少

相火氣血腦際奔

寒極續命與風引

麻桂通聖湯細論

真寒而厥遂見瘓症者類似中風寒重者以小續命湯加牛膝附子普通治法以千金

標病歌括

三〇

風引湯加減

小續湯方。防風 桂枝 麻黃 杏仁 川芎 白芍 人參 甘草 黃芩 防已 附子
風引湯方 大黃 乾姜 龍骨 牡蠣 桂枝 甘草 寒水石 滑石 赤石脂 紫石英
石羔 麻黃 桂枝 湯方 桂枝 麻黃 甘草 杏仁 黃芩 麥冬 知母 防風 枳殼
防風連聖散方 防風 荆芥 麻黃 連翹 薄荷 川芎 當歸 白芍 白朮 山梔大
黃 芒硝 黃芩 石羔 桔梗 甘草 滑石 生姜 青葱

上列腦炎法概略

變化症候處空疏

參究劉裁吾專著

痙病與腦炎全書

近人湘鄉劉裁吾著有痙病與腦炎全書治法詳上海中醫書局光華書局均有分售能多翻印袖珍本以廣流傳最妙

腹膜炎證治歌

盲腸炎附

腹炎証候費尋思

原因複雜不易知

陽症火積宜清導

陰症寒結在腎脾

腹膜炎之病最難診斷時邪溫病常見大腹奇痛或熱結或積滯隨其見症而追求之
問其得病之遠因近因觀其氣色之虛實察其疼痛之點喜按與否喜按則屬火屬
火則清之鬱則發之拒按則屬積屬實實者下之積者調之辨其脈之弦實滯澀（皆
實也）乳虛軟微（皆虛也）而施治之或有鬱血則去瘀行血或屬陰寒則須溫中
回陽並以艾丸灸氣海丹田臍中各穴道或屬氣結則舒肝行氣熱結者五仁丸加
涼膈散

積滯氣鬱輕者神曲香附山楂川朴枳壳麥芽五谷蟲木香青皮檳榔之類重者則五

積散木香檳榔丸加減

火鬱者越鞠丸去蒼朮加鬱金川棟枳壳木通連翹元胡索

實積者清導消滯若無效則以承氣湯木香檳榔丸下之

氣裏血血裏氣者以桃仁茜草當歸紅花香附元胡索烏藥蘇木沒藥乳香散其瘀行其血通其脈絡

肝鬱者以越鞠丸四逆散湯小柴胡湯加減

虛寒者以乾姜生姜良姜草撥川椒小茴香吳茱萸附子肉桂之類虛甚則桂附理中丸真武湯白通湯大建中湯等

五仁丸方。火麻仁 郁李仁 桃仁 瓜蒌仁 蒼米仁 涼膈散方 連翹 薄荷 黃芩 山梔 桔梗 甘草 竹葉 五積散方 白芷 陳皮 厚朴 當歸 川芎 白芍 茯苓

芩 桔梗 蒼朮 半夏 麻黃 乾姜 肉桂 木香 檀榔 青皮 陳皮

枳殼 黃柏 黃連 三稜 茴芷 大黃 香附 黑丑 芒硝 越鞠丸方 香附 蒼朮

川芎 神曲 山梔 四逆散方 柴胡 白芍 枳殼 甘草 小柴胡湯 方柴胡黃

芩 半夏 茯苓 甘草 附子 真武湯方 附子 白朮 茯苓 白芍 生姜 白通湯
葱白 乾姜 附子 人尿 猪膽汁 大建中湯方 蜀椒 乾姜 人參

肝胃痛亦牽腹部 治腹先治肝胃宜

有非腹疼乃腸痛 辨症下藥費遲疑

因肝胃痛引至腹部作痛發炎亦常有之當治其病因肝胃病除則腹部之炎亦已

發癰亦見腹疼痛 治法不與腹炎同

芳香解穢腸氣轉 隅升陰降百脈通

凡發癰腹奇痛以通關散吹鼻取嚏痛能漸已則屬癰症重者人事不省取白藜如黃

豆大七枚令嚼之不知藥味之苦。醫即屬痧症。他病即吃藥七枚亦無妨。但痧症輕者即嚼藥亦略知之。急救各方列下。

輕者太乙紫金丹每服壹錢。重者八寶紅靈丹。諸葛行軍散均可投。先以少許搗鼻再以三五分涼開水送下立愈。小孩減半。太乙紫金丹方。山慈姑，文蛤，大戟，檀香，安息香，蘇合香油，千金霜，雄黃，琥珀，冰片，射香。

八寶紅靈丹方。硃砂，射香，冰片，礞石，火硝，硼砂，金箔，雄黃，先用少許吹鼻取嚏再用一分溫湯調服。諸葛行軍散方。牛黃，射香，真珠，冰片，硼砂，雄黃，火硝，金箔。

霍亂腹痛多屬寒

認症下藥須慎重

轉側幾無片刻安

莫作腹膜一樣看

霍亂腹痛常兼嘔吐。有嘔吐而腹奇痛欲洩不洩或得瀉稍安治法難以概述參看拙

著霍亂證治。霍亂屬寒者多。腹炎屬火者多。以上藥均可選用。霍亂雖未別明寒積或火鬱。以蘇合香丸一大丸煎服多效。蘇合香丸方。蘇合香，安息香，犀角，冰片，射香，香附，南木香，薑陳香，沉香，丁香，白朮。

上條腹痛各丹丸統治霍亂均可選用

婦女經閉痛難拈

痛久腹膜腫而炎

癥瘕血結能作痛

法以通經破瘀兼

婦女痛經甚以致腹部發炎者多至於滯結成塊名曰癥瘕宜以沒藥乳香桃仁紅花

血竭三七紅絲烏藥香附茜草蘇木雞血藤蒲黃等通經止痛

胎死子宮腹作痛

胎在子宮外亦疼

兩種痛炎治其本

胎下痛已免憂忡

胎死子宮胎在子宮外腹皆疼痛欲死惟施刀圭割腹下胎其發炎之部分漸消除矣

婦女子宮炎牽引

腹中悶痛疑膜炎

子宮局部貴診察

腫愈炎消腹痛拈

子宮發炎或痺痛或不痺祇覺腹中疼痛乃子宮痛牽引所致凡婦科患此症者宜延

西醫診察內服天女掃蕩丸方 白朮 猪苓 草茯苓 黃柏 茯朮 銀花 香附 生地 白芍 澤鴻 當歸 知母 沙參 川芎 紅花 木通 海螵蛸

兒童腹痛挾病癥

根由肝火並貪饑

兼治蛔蟲並火積

表裏虛實在細探

小兒過食堅硬生冷及厚味停滯不化漸成痞塊而黃肚大脇肋硬滿腹中疼痛乃疳病之要候宜五花丸治之。

五花丸方 使君子 蘆薈 厚朴 黃連 山楂 香附 山稜 藁蓮 洋參 茯苓 白朮

六神曲 水蓼花子 麥芽 阿魏 青黛 木香 檳榔 千草 研末如粟米大 一歲者
每服十九二三歲者每服二三十九母兒大小加減之

腹痛偏右盲腸炎

須知隱患伏微纖

急性刀圭不可緩

慢性疏導喜可占

盲腸乃大腸外另有一短條并無甚作用發炎作痛亦能致命急牲者其痛難堪急往
醫院以愛克司光鏡探測若然立施手術其病若失若慢性盲腸炎每因積滯氣滯腸
氣不舒蔓延患此用破積疏氣之藥如香附川朴枳壳木香若棟皮鬱金川朴檳榔麥
芽等往往得効。

金石竹本吞腹部

宜用愛克司光看

今古單方如無效

須以刀圭叩其端

五金竹木石類黏於腹膜作痛發炎急以單方服之可愈如無效則宜開刀取出

標病歌括

三八



中華民國八年夏月出版

每部定價國幣參角

北京西單靈境胡同十三號

著作者
總發行所

閩侯劉亞農

西直門內後廣平庫二十三號吉宅

西城北溝沿三十號
地安門外寶鈔胡同淨土寺六號

北北京國醫月刊社
北北京救世新教會
北北京中央刻經院
北北京琉璃廠火神廟

分售所

天津法租界同善里
上海三馬路望平街
張相臣診所
北京琉璃廠火神廟
北京千頃堂圖書書局
北京琉璃廠火神廟
北京琉璃廠火神廟

歡迎翻印並圖解點加印註

井 41

721015

廿九年八月廿日

著毒附述

721016