

中華郵政特准掛號立券之新聞紙類

禿 瘡

傳染病小叢書之二

內政部衛生署編輯
本書刊物之三
冊籍類第三種



41
90

錄 目 著 禿

禿瘡目錄

第一章 總論

第二章 禿瘡的原因

第三章 禿瘡的症狀

第四章 禿瘡治療法

MG
R758.7
1



3 2167 7188 5

錄 目 著 者

禿瘡

第一章 總論

禿瘡是一種皮膚上的疾病，多半在頭頂上發生，使頭髮脫落，成爲禿頭，所以叫做「禿瘡」，又叫做「癩頭瘡」，又叫做「癩子」。

禿瘡可以分兩種，一種叫做「黃癬」(Tavus)，又叫做「鬚鬚」。一種叫做「錢癬」(Ring Worm)。這兩種症狀頗有不同，現在分別敘述於下。

黃癬除在頭頂上發生以外，也可在指甲上發生。錢癬除在頭頂上發生以外，也可在身體各處皮膚上及指甲上發生。現在我們專講禿瘡，專講頭頂上的黃癬同錢癬，其他各種，都不敘述。

第二章 禿瘡的原因

禿瘡的原因，是一種屬於植物界的微生物。這種微生物如果傳染到頭上，就會發生禿瘡。這種微生物的種類很多，黃癬有黃癬的微生物，錢癬有錢癬的微生物，兩種微生物是不相同的。

傳染的方法

禿瘡傳染的方法，有直接間接兩種。直接的傳染，就是與禿瘡病人的頭部直接接觸，而傳染了禿瘡的病。間接的傳染，就是用禿瘡病人用過的器物，而傳染了禿瘡的病。與禿瘡病人，互相換戴帽子，最容易發生間接傳染。這種病又可以由牛馬狗貓等家畜身上傳染於人。

理髮店同洗衣店，都常常是間接傳染禿瘡的地方。理髮店裏所用的器具，如剃頭刀，剪刀，梳，篦等，經禿瘡病人用過以後，就沾染了禿瘡的微生物。

物。如果不消毒，又被他人用了，這個人就發生禿瘡。禿瘡病人所用的衣服被單等，常常沾染了禿瘡的微生物。洗衣的時候，如果不留意，將這些衣服被單，與他人的衣服被單，一同洗晒，也可以將禿瘡傳染於他人。

年齡
的關係

無論男女，都可以發生禿瘡。但是兩種禿瘡（黃癬與錢癬）在年齡上却略有分別。黃癬是無論老幼都可以發生的，患了這病之後，若不設法治療，是永遠不會痊癒的。錢癬就大不相同。在十五歲以下的小孩，得錢癬最爲容易。這種患錢癬的小孩，到了成人之後，雖不治療，也會自然痊癒。年紀較大的人，得錢癬的比較很少。這兩種禿瘡，凡全身營養不良的人，都比較的容易發生。

地域
的關係

禿瘡的普遍與否，因地方而不同。在有些的地方，禿瘡很少。在有些地方，則極爲普遍。譬如江西南昌，禿瘡特別的多，所以有江西癩子的別名。各地方禿瘡有多有少的原因，是由於各地方特殊情形不同所致。黃癩的發生，在卑溼的地方，及人民不愛清潔不講衛生的地方，最爲容易。至於錢癩的發生，據沙氏 (Radouard) 的意見，與各地方的人所出的汗性質不同，也有關係。有些地方的人，所出的汗是酸性，這種酸性的汗，於錢癩的微生物不甚相宜。微生物既難在皮膚上立足，所以錢癩不容易發生。有些地方的人，所出的汗是鹼性，這種鹼性的汗，於錢癩的微生物比較相宜，所以錢癩容易發生。

第二章 禿瘡的症狀

禿瘡共有兩種，一種是黃癬，一種是錢癬，現在分述於後。

黃癬

黃癬最初起的時候，是小小的紅點，漸漸變為一點黃色的痂皮。二星期後，這個黃點漸漸長大，長成小豆狀大小，成黃色

臍窩狀的圓板，頭髮就在這圓板的中心。幾個黃癬圓板同時長大，融合為一，漸漸的滿頭都是黃癬，患黃癬部分的頭髮，極其脆薄，會易折斷，又易脫落。常常一塊一塊的脫落，變成禿頭，黃癬有一種特殊的臭氣，與老鼠的臭氣一樣，令人極其討厭。

錢癬

錢癬初起的時候，是紅色魚鱗狀的小點，漸漸蔓延，成一圓斑，這塊圓斑上的頭髮，極易折斷脫落，有完全脫去的，也有脫去一半的。患錢癬的病人，頭上有只有一個圓斑的，也有幾個圓斑的。這

禿

種圓斑，大小不等，小圓斑不甚引人注意，醫生診視時，常常忽略過去。殊不知這種小圓斑與大圓斑一樣的重要。若不診治，必難斷根。所以診視治療的時候，必須將頭髮剃淨，過細察看，一見有魚鱗狀小斑，即刻加以治療，以免後患。

第四章 禿瘡治療法

瘡

剃髮

凡已經患了禿瘡的人，頭髮必須剃淨，每隔數日，須剃淨一次。頭髮剃淨，有種種好處。

①頭髮長了，裏面污垢很多，微生物容易生長。如若剃淨，則頭頂可期清潔，微生物難得有藏身的地方，可以滅除微生物不少。

②頭上新起的禿瘡，總是很小的，不甚引人注意，倘若頭髮長了。更容

易模糊看過。治療這種禿瘡，總是愈早愈妙。若於新起的禿瘡，忽略過去，及至爲時已久，再行治療，很爲費力。爲隨時便於觀察新起的禿瘡起見，必將須頭髮剃淨。

③治療禿瘡，必須敷藥。若有頭髮敷藥頗不容易。所以爲便於敷藥起見，也應剃成光頭。

藥物

因爲禿瘡的病原，是一種屬於植物界的微生物。能殺滅這種

治療

微生物的藥物很有幾種。因爲這是醫學上專門的學問，現在這

裏不多說。凡患了禿瘡的病人，最好從早找醫生診治，萬不可遷延自誤。無論醫生是用那一種藥物治療禿瘡，有兩件事，必須注意。

①敷藥的時候，須特別注意，所有患處，皆須敷到。不可一處敷藥，一

處又不敷藥。新起的禿瘡，最容易忽略過去，更要注意。

◎治療禿瘡，不是一天兩天就可以好的，至少須十多天，甚至還要幾個月。所以醫生同病人，均須有極堅強的忍耐性，安心照法治療，天天敷藥。決不可因為幾天之內，沒有見效，就停止不治，或改用他法。如果立志堅忍，長久依法治療，沒有不見效的。

比藥物治療更有效的，是愛克斯光線治療。但是這種療法，非有專門技術的醫師，不能使用。

預防

傳染

禿瘡最容易傳染，或由患處傳染他處，或由病人傳染他人。

小孩禿瘡傳染的方法，由於互相換戴帽子的很多。病人帽子內面，沾滿了禿瘡的微生物。健康的小孩若錯戴了病人的帽子，就沾染了微生

物，於是就有禿瘡發生。所以凡患禿瘡的小孩，最好是不戴帽。若必要戴帽，可以用油紙或白布在帽內做一裏子，每天將舊油紙帽裏扯出燒掉，另換新的。如果是白布做的裏子，就可以每天取出，用開水泡過洗淨，晒乾再用。用這種裏子，必須將帽子內面做滿，不可只做頭頂上一部份，而帽邊仍舊沾染了微生物。大人患禿瘡的，也應當照這一樣，用油紙或白布做帽裏子，每天洗換。

凡禿瘡病人所用的剃頭刀，梳，篦，枕布，手巾等，必須另自一套，不可與健康的人共用，否則必有傳染的危險。凡梳篦等，經病人用過後，必須浸在百分之二十的石炭酸溶液內消毒。病人用的枕布手巾等，必須常常換洗，以期清潔，可以先用開水泡過，再行洗淨晒乾使用。

若

禿

民國二十年七月初版五千册
民國二十一年六月再版一萬册

閱後
請
轉贈

著作者 內政部衛生署

發行者 內政部衛生署

內政部衛生署衛生教育組出品目錄

⊖書籍

健康與經濟
 衛生教育講義
 衛生教育實施方案
 傷寒及其預防方法
 禿瘡
 蚊與疾病
 蒼蠅與疾病
 霍亂及其預防方法
 天花及其預防方法
 水與疾病
 瘧疾及其預防方法

定價一角
 定價二角

⊖圖表

兒童衛生習慣圖十一幅
 小號兒童衛生習慣圖十張
 健康與經濟圖八幅
 種痘圖

定價一元五角
 定價三角
 定價五角

未標明價值
 如承購買或
 巷內政部衛

一分文
 銀
 知為荷

D
 412408
 906
 :2