

十九年初版

上海普製藥廠敬贈

河南總經理處鄭州大善藥房

注射治療齒後

27751

海普牌注射藥是海普製藥廠成績之結晶。無論何種注射藥。所用化學藥品之性質。保證精純。含
量準確。不失毫釐。所用溶劑。都為化學純品。與新鮮重蒸溜之滅菌水。注射管為完全中性之硬
質玻璃所製。復經嚴密之清洗與消毒。故與內容藥液。絕不起任何之纖維變化。故本書所載各種
製品。俱係絕對可靠。且久藏不變。

為新醫界治療之利器

為提倡國貨之先鋒

興學術 振實業 舉國貨 救疾苦

請新醫界指名使用海普牌注射藥

凡例

- (一) 本書編纂匆促舛誤恐所不免深願讀者諒之并求加以指正
- (二) 本版出品雖常有加增以求供普遍之用然海內醫師本其淵博之經驗必尙有不敷應用之處如蒙指迷本廠當即照辦
- (三) 治療成績如能見示最所歡迎他日當編印專冊廣贈同仁以供互相參攷之用也
- (四) 醫師如欲先將本版某種藥品試用者本版極願照奉但請在處方箋書明藥名簽字蓋章寄至發行所即當寄上
- (五) 本版各種出品通稱海普牌注射藥故用者必須指明海普牌何種注射藥或所需用本注射藥之專名方不致與劣貨相混
- (六) 本版出品均不用原化學名稱而故意改易新名其故有三(一)因市售同種製品質劣者多本廠則力求精絕不願同流合污(二)名稱既同則國貨與洋貨易于混同今則聞名即知爲國貨矣(三)新名概爲一字流行之後反較原來冗長之化學名易于記憶也

海普製藥廠謹誌

發行所 上海北京路五定公司

分售處 上海各大藥房

目錄

中名	英名	頁數
浸留重蘇溜水	AQUA REDISTILLATA SPERULISATA "HYPOUR"	1
阿脫陸謨	ATRONOR "HYPOUR"	11
益多賜保命	ATROPERIN "HYPOUR"	11
庇宏	BION "HYPOUR"	16
白碎膏	CALRECYL "HYPOUR"	7
白碎膏	CALREZOL "HYPOUR"	7
卡爾克斯	CALCUS "HYPOUR"	7
匡爾生	CALBSAN "HYPOUR"	9
克陸莫沙	CHIONOSOL "HYPOUR"	11
格羅沙而	CHIOSAL "HYPOUR"	13
格羅沙卡	CHIOSOCA HYPOUR	15
可路羅	COCALOR "HYPOUR"	17
可路羅	COCCARENAL "HYPOUR"	18

寧卡林	DECALIN "HYPOULE"	十九
寧克沙而	DENOL "HYPOULE"	二二
愛美沙	DAMESOL "HYPOULE"	二五
愛番林	(段黃精注射液) EPHEBRIN "HYPOULE"	二六
番陸地	FERRODYL "HYPOULE"	二八
其地富隆	GHYPPHULON "HYPOULE"	三十
合留可統	GHYGOTON "HYPOULE"	三一
怪阿寇地	GUATACODYL "HYPOULE"	三三
海 鷗	HERON "HYPOULE"	三六
海克山	HENAM "HYPOULE"	三五
海特茲新	HYDRASIN "HYPOULE"	三七
德弗魯阿爾	INFELCOL "HYPOULE"	三八
沃度鈣而治	IODOKALZ	四十
伊拉而生	IRARSIN "HYPOULE"	四三
劍梅完	JARMER "HYPOULE"	四五

瘴可泯	JUKUMIN "HYPOULE?"	五十
嘉談	KAMOL "HYPOULE?"	五三
陸萬零	LOBELIN "HYPOULE?"	五四
邦脫綠地	NATKODYL "HYPOULE?"	五七
拿伏根	NOVOCAIN "HYPOULE?"	五九
拿伏蘭	NOVORENAL "HYPOULE?"	五九
巴巴佛	PAPAVIRPON "HYPOULE?"	六一
佛	PAVER "HYPOULE?"	六三
富待英	PEODPEN "HYPOULE?"	六四
批德立	PILORID "HYPOULE?"	六五
百莫陸	POMOLOR "HYPOULE?"	六七
歸	QURIN "HYPOULE?"	六七
歸	RENAL "HYPOULE?"	七十
撒羅貨	SALOPIN "HYPOULE?"	七二
撒沃	SALJODYL "HYPOULE?"	七四
斯可拉索	SCOLAMID "HYPOULE?"	七六

斯苦立飛	SCOLAPHIN "HYPOULE?"	七八
山可丁	SECRETIN "HYPOULE?"	七九
錫類僑生	SHERARSON "HYPOULE?"	八十
斯巴蘇爾	SPARSTL "HYPOULAE?"	八二
士的發	STYKAL "HYPOULE?"	八四
士的納	STVNTJ "HYPOULE?"	八四
試則必靈	STYPTIN "HYPOULE?"	八五
蘇拉脫林	SULATYRIN "HYPOULE?"	八七
脫綠慈靈	TROGERIN "HYPOULE?"	八八
脫陸芳	TROPHAN "HYPOULE?"	八九
烏來慶	URECHIN "HYPOULE?"	六八
維多命	VITTEPTIN "PYPOULE?"	九二
育勃談	YOBINUR "HYPOULE?"	九六

注射治療寶筏

滅菌重蒸溜水

АQUA REDDISTILLATA SPTERITSATA "HYPODIE"

(一)總說

蒸溜水，爲調製各種粉狀藥物成注射液之最適宜溶解劑。但其純粹度與滅菌之嚴密與否。與注射後之反應。極有關係。往往普通粗製蒸溜水。或消毒未經嚴密手續者。用作溶解劑後。常發現意外之副作用。令醫師莫明其所以然。不知實選擇蒸溜水不當之故也。

(二)形狀及性質

海普牌之滅菌重蒸溜水。爲完全透明清澈無色之純水。經兩次用玻璃器蒸溜。而再行嚴密之殺菌手續。所用玻璃管。本係中性硬質玻璃所製。亦另經洗淨。再用高熱乾燥消毒。至滅菌重蒸溜水裝入封口後。仍行高壓消毒。以防萬一之虞。故海普牌滅菌重蒸溜水。質地既爲絕對純水。消毒又萬分嚴密。雖永久貯藏。決無變性。用以調製各種粉末狀藥物而供注射之用者。惟以此滅菌重蒸溜水最爲可恃。決無纖微不幸之副作用發生。諺云。失之毫厘。差以千里。持此海普牌滅菌重蒸溜水以與他種粗製劣品相比較。其優劣真不可同日語也。

滅菌重蒸溜水

(三)用途

普通概爲調製粉狀藥物作注射藥之用。吾人已知。常行靜脈注射之時。有時病人無知。忽然將臂肘一動。致注射針頭脫出或穿過脈管。而使管內藥液往往有微量滲入皮下。致起劇痛者。此時頗與醫師以爲難。然若即刻在發痛局部之旁。注射(皮下注射)此滅菌重蒸溜水數西西(Chloroform, 1:100)者。則原來刺戟性藥物。既經稀釋。而吸收又因之加速。則痛覺之消失自易。又常調製易於分解或變性之藥劑如銀劑等。亦用此滅菌重蒸溜水。最爲可矣。

(四)包裝

分爲兩種

(一)每匣五管。每管十西西。

(二)每匣五管。每管二十西西。

阿脫陸謨 ATRAMOR "HYPODERM"

阿脫陸謨 Atromor 內含鹽酸莫非 Morphine Hydrochloride 與硫酸阿刀賓 Atropine Sulphate。製成注射劑二種。其分量請見包裝項下。夫莫非爲止痛、鎮靜、鎮咳藥。早爲醫界所知。惟其副作用甚爲強大。醫者使用。不免時多顯慮。如頭暈、嘔吐、惡心等現像。於病家不免有不快之虞。應用上殊感不便。惟本品阿脫陸謨 Atromor 因有阿刀賓之伍用。竟能使以上諸不快症像。一掃而空。反得愉快之感覺。臨症上之困難。亦可免除矣。原名冗長。不便簡寫。故特名之爲阿脫陸

膜 Atromor。

性質 鎮靜、止痛、鎮瀉、止咳、止汗、無興奮性。不礙便利。不阻礙粘膜分泌。能鎮靜亢奮機

能。同時因有阿刀賓之混合。故能兼收阿刀賓之功用。如止汗、與制止莫非發生副作用等。但於莫非固有之功效。並不稍失。是以阿脫陸膜 Atromor 之所以貴用也。

主治 神經痛、痙攣痛、筋撈盜汗、多汗症、一切疼痛、創口疼痛、失眠、咆哮、呼吸困難、氣

急、咳嗽、苦悶等症。以及一切莫非之適應症。無不合宜。

用法 皮下注射。每次一西西。視病情之需要。而反覆之。

包裝 阿脫陸膜 A 號 (ATROMOR "A") 每西西內含鹽酸莫非 〇・〇一五瓦硫酸阿刀賓 〇・〇〇

〇六瓦每匣十瓶每瓶一・一西西。

阿脫陸膜 B 號 (ATROMOR "B") 每西西內含鹽酸莫非 〇・〇〇八瓦硫酸阿刀賓 〇・〇〇〇

三瓦每匣十瓶每瓶一・一西西。

益多賜保命 ATOSPHEMIN "HYPOULIN"

(一) 總論

益多賜保命。係一種雄性壯健動物所特有之生殖腺 (又名青春腺) 所分泌之一種液體由精製而得之結晶品也。因生理之作用。得養殖其種族。而於身體之發育與新陳代謝機能。尤有極大之關係。其供醫藥之用者。當以生物體中所產出者為上。因此種腺體。原係生理的天然物品。而非其他人造與用化學藥品混合而成者所可並論也。

益多賜保命

(二) 形狀及性質

益多賜保命為無色或微黃色透明溶液。內含青春腺鹽基之鹽酸鹽百分之二。

(三) 功效

益多賜保命即為人體一部分之內分泌物質。於生殖有極密切之關係。而於新陳代謝機能與身體之發育。實與前者同其重要。其供藥用之目的亦在於此。故凡一切疾病之因缺乏此素而發生者。以之醫治。無不神效。

人體內本有一種普遍之抵抗力。凡一切疾病之侵襲。俱有天然之防禦作用得以消滅之。使恢復原有之康健。而本品之物質。亦即天然防禦作用之主要產物。故又可稱為天然之抵抗素。緣人體之發育與內臟之營養。一切智慧精神之發達。生殖慾之興旺。無不藉此素以啓發之。故凡人體對於此素之分泌缺乏。即現萎靡之像。而致於病。如腦之智慧精神減退慾望消失營養障礙發育不全等。相繼以起。明言之。因內分泌之減退。以致缺乏抵抗素。不足以供本身之應付。而發以上之現象耳。其唯一補救之道。即採宜於人類之動物抵抗素。直接增加於人體。以助內分泌腺之不足。使得正常之康健。益多賜保命實為天然最濃厚而純淨之人體補益劑也。

最近盛行之返老還童學說。亦不過根據內分泌腺之作用。使青春腺之分泌盛旺。生活若童年之狀態而已。故注射益多賜保命。實與行返老還童術同其效用。有過之無不及。因益多賜保命含量最濃。質地最純。而吸收最整也。

益多賜保命又有戒除一切習慣性之作用。故凡有麻醉藥以及鴉片習慣之人。注射之得以消失其癮

念。其奏效之故實非意想所及。大凡有嗜好習慣之人。其身體中已產生一種自然物質以抵抗其嗜好物之毒性。其所賴以安全不致中毒者。執是故耳。故不論任何嗜好物。一經久用。即有不得擺脫之苦。推原其故。實為體中於不知不覺間。所產生特異物質之分泌而發生種種不快現像。非有該嗜好物之刺激。不足以達愉快之境。

益多賜保命之效用。能將此種物質使之中和。而制止其分泌。因之癮念亦無從發生。倘能連續用之匝月。則體中積習掃除盡淨。可保永不再犯。用以戒除嗜好性與烟癮。實為萬妥萬驗之無上聖品。絕無副作用。因毫不旁舍雜質。故儘量應用。毫無顧忌。

(四)主治

營養不良、全身衰弱、顏色蒼白、失神創傷、病後失調、新陳代謝異常、佝僂病、腺病、惡性淋巴腺腫、腦力虧損、神經痛、頭痛、腦弱、精神萎靡、健忘、失眠、耳鳴頭重、聽覺錯誤、神經過敏、記憶力薄弱、神經性喘息、戒烟、陰萎、早洩、性慾缺乏、物起力減退、老衰、發育不全、夢遺、陽萎不舉、陰虛宮冷。

(五)劑量及用法

每日一管皮下注射如在重症則開始數日宜每日注射兩三次每次一管

(六)包裝

益多賜保命 (AUTOSPERMIN) 每匣四管每管二、二西西

益多賜保命

庇宏 BION "HYPOLE"

海隆 HERON "HYPOLE"

「庇宏」Bion 內含鹽酸愛知恩嗎啡 *Aethymorphine hydroch.* 又名地屋毒 *Dionine* 「海隆」Heron 內含鹽酸二醋酸基嗎啡 *Diaceethylmorphine hydrochloride* 又各海洛英 *Heroina* 以上兩藥。因其功效相仿。故合併說明之。以簡篇幅。

性質 此二種俱為鴉片有效成分嗎啡之誘導體。為白色無臭味苦之粉末。易溶解於水。其鎮痛止咳鎮靜作用。俱與嗎啡相似。而無不快之副作用。故得用為嗎啡之代替品。

功效 對於呼吸系統有特異之鎮靜作用。而以「海隆」為尤著。用於肺癆咳嗽與氣管支加管兒以及種種之咳嗽刺激。無不收效。作為止痛藥。如月經痛痛痛關節痛以及一切疼痛。以之注射。無不滿意。絕無不快現象。而於腸之蠕動。不起障礙。故無便秘之慮。

主治 見上述並請參看「克陸莫沙」*Chlomosol* 與「阿脫陸謨」*Atromor*

用法 皮下注射。每次一西酉

包裝 庇宏 (BION) 每匣十管每管一•一西酉每一西酉中含主藥〇•〇一瓦
海隆 (HERON) 每匣十管每管一•一西酉每西酉中含主藥〇•〇一瓦

咖啡茜 *CARFEXYL "HYPOLE"*

咖啡莎 CAFFEZOL "HYPOURIN"

咖啡茜 Cateoyl 即精製之水楊酸鈉咖啡精 Caffeine Sodio Salicylate 是也。咖啡莎 Catezol 者。卽安息香酸鈉咖啡精 Caffeine Sodio Benzolate 也。因此二種藥物。雖結合各異。而功用實同。故合並說明之。致於使用上。適應何種。均隨醫者之心得。任擇一種可也。其劑量請閱包裝項下。

性質 強心藥、利尿藥、本品咖啡精。因有水楊酸鈉及安息香酸鈉之伍用。對於神經痛。及一切頭痛。奏效異常迅速。其強心利尿功用。亦甚奇偉。

主治 疲勞衰弱狀態。及種種麻醉藥之中毒。作中樞興奮劑之用。對於酒精尤有拮抗作用。有擴張腦血管之功。故於頭痛。偏頭痛。及腦充血之頭痛。非常神效。又能興奮腎臟分泌機能。可用爲利尿劑。凡心臟衰弱、脈搏不整、以及虛脫等症。能增補心力。擴張心冠動脈。盛旺心臟實質之循環。減脈數。強眼力。奏效卓著。

用法 皮下注射每次一西酉

包裝 咖啡茜(CAFECOYL)每西酉內含水楊酸鈉咖啡精〇。五瓦每匣十瓶每瓶一。一西酉

咖啡莎(CAFFEZOL)每西酉內含安息香酸鈉咖啡精〇。五瓦每匣十瓶每瓶一。一西酉

卡爾克斯 CALCUS "HYPOURIN"

SOLUTIO CALCII CHLORIDI

(一) 總論

卡爾克斯

卡爾克斯。爲使血液凝集性亢進之改良注射藥。故其止血之效。迅速確實。一方又因其成分中鈣伊洪之游離。故又適用於石灰療法。

(二) 形狀及性質

卡爾克斯。係用化學的最純淨氯化鈣。溶解於新鮮製造之重蒸溜水中。經嚴密之消毒手續而成。係透明無色之液體。其成分中。除 $CaCl_2$ 之外。絕無含有金屬。質最安定。永久不變。

(三) 功用

善能止血。非特能直接作用於出血部而見效。即遠隔部之內出血。亦奏同一之效果。蓋一經用後。全部血管。皆增進其凝集力。故凡當行手術時。先注射此卡爾克斯者。頗有預防出血之良果也。此外鐵離炎症。制止喘息。促進瘢痕組織之生成。制止滲出物。增加骨部鈣質。使病癒石灰化。其效之大。比之內服藥物。均不可同日而語。

(四) 主治

肺結核 各種內出血 丹毒 滲出性皮膚病 枯草熱氣喘 骨軟化症 巴塞多氏 (Basedow) 病
各種手術後之預防出血及石灰療法之適應症

(五) 劑量

卡爾克斯共分四種。即

卡爾克斯甲號 CALICUS "A" 爲一成 (1%) 氯化鈣溶液

卡爾克斯乙號 CALICUS "B" 爲三成 (3%) 氯化鈣溶液

卡爾克斯內號 CALCUS "C" 爲五成(5%)氯化鈣溶液

卡爾克斯丁號 CALCUS "D" 爲十成(10%)氯化鈣溶液

(六)用法

靜脈注射。每日隔日或隔二日注射一次。先用弱劑。漸更強劑。或按病情而定之。

(七)包裝

凡卡爾克斯。不論何種。均每匣五管。每管五西西(5 c.c.)。

(附)注意

尋常氯化鈣注射後。往往腦及四肢有暫時感熱之反應。卡爾克斯雖最爲純粹。然因病人感受性之各異。難免不有此現象發生。是可毋用顧慮。如注射時能愈緩慢最佳。如此則庶幾此反應在卡爾克斯可以免焉。

匡爾生

CARSAN "TYPOURIE"

AQUOUS SOLUTION OF GAMPION

▲濃厚樟腦水溶液

▲救急之聖劑

▲遼勝樟腦油

(一)總說

樟腦本爲最有力最佳良之強心劑。所惜者因其性不溶於水。故自來專用油劑。惟樟腦油入身。不

匡爾生

易被吸收。往往失其功效。殊非憾事。最近發明因有機性溶劑之輔助。始可將樟腦製成水溶液。本廠即根據此理。製成匡爾生。奏效神速。功力優於樟腦油數十倍。病人虛脫時用之。立刻見效。洵急救之聖劑。回生之靈藥也。

(二) 形狀及性質

匡爾生為透明液體。樟腦之氣味極著。係用有機性溶劑之輔助。將樟腦製成水溶液也。於是樟腦之功用益顯。樟腦之聲價益隆。在治療界中。實供獻不少利便焉。

凡樟腦在水溶液中。較之油液。如其濃度相同。則其治療作用約強四十倍。而功效之發見。在靜脈注射者。尤為迅速而完全。當一針終了時。即已見脈搏之改觀。匡爾生之為急救聖劑誠非誣也。且以水液之故。可用細針注射。更宜於婦人小兒。及虛弱神經性病人。凡樟腦油之弊。一掃而空。

且注射時。雖以樟腦之故。不免仍稍有疼痛。然以輔用有機溶媒之故。乃變為極輕微。注射後。局部略按摩。即隨之消失。

(三) 功用

樟腦之應用。在強心劑中。本最廣泛。但樟腦油吸收遠不如水溶液。殊失注射之本旨。且以功效之發顯。皮下亦不如靜脈注射之速。向因樟腦油不適於靜脈注射而又須用粗針。故尤不宜於婦女小兒及虛弱病人。

匡爾生可用細針注射。毫無不便。毫無顧慮。

爾爾生可行靜脈注射。功效神速非常。

又樟腦原爲豁痰良藥。注射樟腦油時已能使肺循環強健。肺氣健活。止哮喘。今爾爾生之功力尤強且速。其法即以爾爾生十成水溶液。在股際行肌肉注射。立見喘定痰豁。心強脈滿。故肺癆病人哮喘虛脫時用之尤佳。

凡遇靜脈注射可用爾爾生二成溶液。肌肉注射。或皮下注射。則用十成溶液。

(四) 主治

血行障礙及呼吸障礙。虛脫、暴死、猝倒、肺炎、深部氣道缺乏祛痰作用，幽門筋痙攣，麻醉藥中毒。酒精中毒。及一切樟腦適用諸症。及各種病之經過中。

(五) 劑量

爾爾生分十成(0.1%)及二成(2%)溶液兩種。

二成溶液。供靜脈注射。裝入黃瓶。每瓶二、二西西。

十成溶液。供肌肉或皮下注射。裝入白瓶。每瓶一西西。如此庶不致誤用也。

(六) 用法

肌肉注射。皮下注射。或靜脈注射。全由醫師之志意處理之。每次注射。注射針須以酒精或以脫水時。亦宜將靜脈注射用爾爾生加入一二管。自能均等溶解。免除一切副作用。縮短虧復期。惟不可將皮下用者加入。切須注意。因樟腦有析出之虞也。

(七)包裝

靜脈注射者爲二成溶液。每匣十管。每管二·二西西。皮下注射者。爲十成溶液。每匣十管。每管一·一西西。

克陸莫沙

CHLONOSOL, "HYPOLINE"

克陸莫沙 Chlonosol 內含精純之鹽酸莫非。(Morphine Hydrochloride) 製成注射劑三種。其分量請視包裝項下。此種精純莫非異常名貴。爲不易多得之佳品。質淨精良。配合準確。不失毫厘。是以功效與市售品不同。卽更爲確實而強大。醫者使用。務宜注意。對於婦女孩童以及神經質病者之應用。務宜以最小之量試之。庶免發生副作用。但於雅片習慣之人。則雖用大量。並無妨礙。夫莫非之有副作用。爲其固有之本能。欲避免之。全在用者之斟酌適宜劑量耳。如是則庶幾得心應手矣。

性質 止痛，鎮靜，鎮痙，止咳。與阿脫陸談大致相仿。因爲單純劑。是以無阿刀賓之功用。

主治 神經痛 暈車痛 肺癆咳嗽 一切疼痛 創口疼痛 失眠 氣喘 呼吸困難 咳嗽等等以及本劑之一切適應症

用法 皮下注射。每次一西西。憑醫者之意志。得繼續注射之。

包裝 克陸莫沙 A 號 (Chlonosol "A") 每匣十管。每管一，一西西。每一西西中。含主藥鹽酸莫非 〇·〇一瓦。

克陸莫沙 B 號 (Chlomosol "B") 每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含主藥鹽酸莫非 〇·〇一五瓦。

克陸莫沙 C 號 (Chlomosol "C") 每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含主藥鹽酸莫非 〇·〇二瓦。

格羅沙而 CHLOSAL "HYPODERM"

濃厚純淨綠化鈉(精製食鹽)注射液

(一)總說

綠化鈉之止血作用。自古所知。功效確實。至今爲醫林所推賞。最近經東西洋諸醫家之試驗。知綠化鈉對於肺疾患有特殊之治療作用。於是其價值更爲可貴。然凡副作用之重輕。與原料之精粗。大有關係。惟格羅沙而毫無副作用。在同類製品中尤爲最良。所以然者。繫於綠化鈉之純淨與絕對純水之功者。可知非謬也。

(二)形狀及性質

格羅沙而爲無色透明溶液。係以化學的純淨綠化鈉溶解於新鮮製造之重蒸溜水中。復經嚴密之消毒者。內含綠化鈉十成。可以永久貯藏。決不變性。

(三)功用

格羅沙而

可大別之爲二。卽一以止血之目的可應用於各種出血。一以治療之目的用於各種肺疾患及各種炎症性疾患。故十威食鹽水之靜脈內注射。不僅可應用於咯血。卽對於腸傷寒之腸出血。子宮出血等。均呈著明之止血作用。又當肺結核治療時。有種種危險症狀者。例如腸結核喉頭結核等之炎症狀著明時。如用食鹽水。亦能見相當之效果。此在注射後。因咯痰中排出死菌現象之著明增進而可以知之。然惟格羅沙而殆足以副吾人之望焉。此因副作用之不發生。所以助治療之進步也。

(四)主治

(一)以止血之目的應用者 咯血，胃出血，腸出血，子宮出血，腎出血，膀胱出血，頰血及其他出血。

(二)以治療之目的應用者 重症肺結核或因混合感染所成之肺結核，急性肺炎等。

(五)用量及用法

(一)當出血時。因病之輕重而異其用量。重症一回量用三瓦。比較的無危險之輕症可用十瓦。

(二)在治療之目的。雖因病之輕重而用量不同。然對於病人之個性。亦有重要關係。例如某病人注射九瓦時。則始見熱度下降食慾增進。其他他覺症狀輕快。而注射八瓦或七瓦。則竟無效者。又有他病人惟注射三瓦始見效果。或多或少均不奏效者。故用種種之量。至其作用達有效時。則自此以下。無論何回。皆應準是量注射之。

(三)以止血之目的。不妨每日注射。應其必要而用可也。

(四)以治療之目的注射者。當注射之後。以至熱度降下爲度。及見其再昇上而有復發之傾向時。

更注射之。在肺結核則每隔三四日或一禮拜注射一次。

(五) 關於注射時注意。極爲簡單。除對於止血之目的並無特記者外。關於應用於治療目的者。若無效果時。即當思用量或未適當。應改以少量或大量試之。凡注射後如見熱度上昇。炎症狀加盛。咳嗽咯痰增加等者。可以視爲用量太多之故。則次回注射。宜略減其量。

(六) 當震亂流行時。如不及製生理食鹽水者。可即以格羅沙而與尋常蒸溜水稀釋後應用之。每一千西西(1000 c.c.) 蒸溜水。和格羅沙而一管可也。

(七) 不論何種應用。均爲靜脈注射。

(六) 包裝

格羅沙而(CHIOSAL)每匣五管。每管十西西。

格羅沙卡 CHIOSODA HYPODERM

(一) 總說

上述卡爾克斯 Calceus 及格羅沙而 Chiosal 兩種注射藥。對於肺結核與各種內出血之治療。已知其效卓越。然根據臨診醫家之理想。苟合氯化鈣及氯化鈉二者於一劑之中。則其效必更偉大。可以斷言。本劑格羅沙卡。即根據此理製成。將氯化鈣及氯化鈉二者。各依一定濃度之比例配合之。故其治療上之效果。易引起顯著之血管收縮。同時兼有血液凝固作用。而其促進止血之功。實過於他種單純劑之上也。

格羅沙而

(二)性質及形狀

格羅沙卡爲無色透明。反應中性之注射液。內含五成(5%)氯化鈣及十成(10%)氯化鈉。性質安定。永藏不壞。

(三)功用

格羅沙卡既含氯化鈉及氯化鈣兩藥而成。而其濃度之比例。又經研究。使支配於最能迅速確實奏效之程度。全無副作用。凡經注射後。止血之功。無論對於何種情形之出血。悉能超越鈣劑或食鹽之單獨使用者。又能使咳嗽減少。營養佳良。而藥效能完全發揮之佳劑也。

(四)主治

咯血 吐血 胃出血 腸出血 子宮出血 鼻出血 以及其他各種內臟出血。均奏奇效。

(五)用法及用量

靜脈注射。每次一管。每日隔日或每星期二次注射。遇重大出血。宜先注射五西西。次日增量。注射時以徐緩爲佳。愈慢愈妙。每管以十分鐘速度注射完了爲標準。

(六)包裝

每匣五管。每管十西西。每管中。計含純淨氯化鈉(Sodium Chloride)一瓦及純淨氯化鈣(Calcium Chloride)〇·五瓦

可嘉祿 OCCALOR "HYPOLE" 局部麻醉藥

(一)總說

可嘉祿 Coclor 內含精純之鹽酸科卡因 Cocaine hydrochloride。製成注射液三種。其分量各異。請閱包裝項下。此種製劑。質地精良。絕無代替品摻入。功效確實。不失毫厘。其有因用自製、或市售品而無效險者。採用本品。定得滿意。

(二)形狀及性質

可嘉祿爲無色透明。曾經嚴重消毒之注射液。係用精純鹽酸科卡因製成。反應中性。遇光不變。

(三)功用

可嘉祿爲最良之局部麻醉藥。外科手術、以及眼、耳、鼻、齒科等。無不應手。吸收易。麻醉速。絕無局部刺激。而其特點尤在一方面能收縮血管。抑制手術時之出血。惟此特點。無論何種代替品均無之。實爲可嘉祿固有之特長。故爲局部無痛手術之無上珍品。

(四)主治

可嘉祿 Coclor 爲局部麻醉藥之效力最佳、功用最速者。因其對於末梢神經之麻痺。一經接觸。立能將痛覺、溫覺、觸覺同時麻醉。而無不快之感。其於局部組織。毒性甚少。亦無反射應響。故凡一切局部手術之前。以本品注射之。不獨毫無痛苦。亦能收縮局部之血管。減少分泌。有腫脹者。腫脹亦可減退。藥用少量。亦收宏效。故凡咽喉、鼻腔、眼、耳、齒科一切手術。無不應

用。其效力約互四十分鐘以上之久。如度手術不能完竣。可在手術時間中。繼續注射之。普通均忌科卡因之毒性。其實在一定量之下。決無顯慮之必要。若能保持使科卡因之總量。不超〇・〇五瓦時。非過時異質者。並無意外也。

(五)用法及用量

皮下注射。用量多寡。全視病情而定。少者一管。多者數管。惟注射地位。宜周遍而廣泛。

(六)包裝

可嘉蘇 A 號每匣十瓶。每瓶一・一西酉。每西酉內含鹽酸科卡因 (Cocaine Hydrochloride) 〇・〇一瓦。

可嘉蘇 B 號每匣十瓶。每瓶一・一西酉。每西酉內含鹽酸科卡因 〇・〇一五瓦。

可嘉蘇 C 號每匣十瓶。每瓶一・一西酉。每西酉內含鹽酸科卡因 〇・〇二瓦。

可嘉蘭蘇

COCARENAL "HYTOLIN"

可嘉蘭蘇 Cocarenal。係由可嘉蘇 Cocolor 與蘭蘇 Renal 合併而成。因可嘉蘇為最良局部麻醉藥。而止血之功尤嫌不大。且麻醉之時間。限於數十分鐘。有時仍須繼續注射。不免使醫師操心過甚。惟本劑因合併蘭蘇而成。其優點。在一、止血作用。著明增強。二、麻醉時間。特別延長。三、麻醉效力。格外透達。四、制止副作用之發生。如分別注射。於手續上不免過於麻煩。故配合於一劑。非但得收兩全之效。而功用益為顯著。緣二藥本有其特殊之效。因混台施用。其

效果更為宏大。而不可意謂。遠非單純剋制所可比擬。且曾試用。定知不虛。請再參看可嘉祿[○]。
color 與蘭那 Renal 項下。

形狀 為澄明無色之液。

功效 為局部麻醉藥。因有蘭那 Renal 伍用。功效更為確實而宏大。如收縮細血管、止痛、止血等。凡二藥本有之功能。無不備有。本劑能以少量。收可嘉祿大量之功。故臨診上最受歡迎。

歡迎。

主治 一切局部手術。所當應用麻醉而兼止血之效者。本劑最為合宜。非但能將痛覺、溫覺、觸覺立時麻痺。兼有防止科卡因發生毒作用之弊。又能收縮血管。減少分泌。退去腫脹。一切請再參看可嘉祿與蘭那條下。

用法 皮下注射。用量請參看可嘉祿項下。

包裝 「海普牌」可嘉祿每匣十管。每管一。一西西。即阿特察那林一比一萬之溶液 (Solution Adrenalin 1:10000) 每西西內含有鹽酸科卡因 (Cocaine Hydrochloride) 〇・〇二瓦。

臺 卡 林 DECALIN "TYPOLEF"

(一) 總說

臺卡林 (Decalin) 為止血、強心、營養、解毒、利尿之良劑。應用之範圍。最為廣泛。

臺卡林之主成分。為精純葡萄糖及氯化鈣。故凡鈣之止血、消炎、鎮靜、解毒。及抑止滲出諸作

臺 卡 林

用。葡萄糖之強心、營養、利尿、解毒諸作用。均能合併而盡量發揮之。

(二) 形狀及性質

臺卡林為澄明無色之注射液。經嚴重之殺菌手續製造而成。反應中性。絕不變質。此種製劑。曾經用培養方法。經過細菌學的嚴密檢查。證明絕對可恃。方始發行。非市售他種劣質可比也。

(三) 功用

臺卡林能完全發揮氯化鈣及葡萄糖兩劑之功用。故用途極廣。夫鈣與葡萄糖二者。均為輔助細胞原形質。增加其生活作用之補劑。故臺卡林之營養功效。乃絕對的。而非治標的。蓋因根本上能與病人以新生之旺盛生機。則全體之抵抗力。自然勝於病魔之侵襲。故愈使強心、解毒、利尿諸功用。易於發顯。而收速效。一方使鈣之止血、消炎、鎮靜等作用。確實而加強。故愈使病之經過短縮。而又力能抑制病機之危象。使消潛甚速。

由是觀之。凡注射血清、伐克辛。而虛功效不能確實者。應注射臺卡林以輔之。又如丹毒、橫痃等。當施行其療法時。苟同時施行臺卡林注射者。其成效亦決能迥異尋常。所以然者。甚於臺卡林有賦與細胞原形質活潑能力之性質也。

(四) 主治

- (一) 肺癆及其他各種瘰癧。
- (二) 渗出性炎症諸疾病。

如肋膜炎 氣管支炎 慢性腹膜炎 子宮內膜炎 子宮附屬諸器官炎

(三) 急性及慢性皮膚炎症。

丹毒 濕疹 蕁麻疹 皮膚搔痒症 水泡症 渗出性紅斑 凍創 橫痃

此等情形時。尚宜併用他種療法。

(四) 在急性傳染病及慢性各病之經過中。由心臟衰弱、營養障礙、新陳代謝障礙等所生之中毒症。

如傷寒、虎疫、赤痢、肺炎、藥物中毒等時之心臟衰弱。滋養物不能由口攝納時。營養不調

衰弱 盜汗 尿毒症等。

(五) 妊娠嘔吐 中毒性或神經性之頑固嘔吐

(六) 治療或預防因注射血清或伐克辛所生之副作用。及救濟麻醉藥處置後之神志失常。

(七) 出血性諸病

如咯血 腸出血 玻璃體出血 血友病 壞血病 紫斑病等

(八) 氣管支喘息 精神病 神經衰弱 神經痛 破傷風等

(五) 用法及用量

普通每日或隔日注射一次。每次一管。其在癆症諸疾患。則宜隔日或隔兩日注射一次。每次一管。

均為靜脈注射。注射時愈緩愈佳。

臺卡林

(六)包裝

臺卡林每匣五管。每管十四西。內含氯化鈣 (Calcium Chloride) 五成 (5%) 及葡萄糖 (Glucose) 四十五成 (45%)。

臺克沙而 DENOL "HYPOCLER"

(一)總說

臺克沙而。為化學的純淨葡萄糖之注射溶液。功能強心、利尿、滋養、解毒。(請參觀臺卡林 Denol 條下。)所用原料。最為純粹。製法謹嚴。不同凡品。故效力最為確實。遠非同類製劑所可比擬。

(二)形狀及性質

本劑為無色澄明之注射液。所用葡萄糖。事先必經化學的檢查。以圖精製。製成注射液後。必經細菌學的檢查。必待確實證明絕對可用。而後發行。

(三)功用

臺克沙而。一經注入身體後。其首要之功用。即使人體細胞原形質之活動能力亢進。是以普通增進天然之生機抵抗力。而益其滋養力之價值又殊有可稽。第一。能可高心筋中筋澱粉 (Glycogen) 之含量。能對於全身細胞。與以平均之滋養。故不論因何種原因所生之營養障礙。均以注射臺克沙而為對症療法也。對於滲出性疾病。則力能抑制滲出作用。促進滲出液質之吸收。一方又因其

化毒之性甚大。故體內蓄積之有毒物質。則毒性隨消。當重劑傳染病之經過中。注射毫克沙而。則既解毒性。又使體溫下降。促進利尿。故毫克沙而之功用。總括言之。則如下述。

(一)可作注射用之人工營養料。其效之優於生理食鹽水及林格爾氏液 (Ringer's Solution) 等者。自不待言。

(二)如遇食道或齒門狹窄等時。營養物不經由口攝納者。可從肛門注入之。以收非經口的營養法之效。

(三)凡急性傳染病。及其他因水分缺乏失血過多。而致陷於急性營養不調。心臟衰弱者。毫克沙而立可挽救之。

(四)凡各種慢性病。心臟瓣膜病。慢性心筋炎等時。有長期的營養障礙。全身衰弱及心臟衰弱者。毫克沙而能持續積漸確實救濟之。

(五)尿滋養、解毒、強心、利尿諸作用外。同時能依物理的作用。打破血液與組織液兩者間之平衡力。遂因所生滲透作用。使組織液流入於血液之中。於是組織中蓄積之有毒物質。乃逐漸移行於血中。其時適富利尿作用增強。乃溶入尿中。而儘速排出於體外。

(六)使細胞原形質之活動性長進。故注射後。中性嗜好性白血球增多。

(四)主治

神經衰弱 心筋營養障礙 因創傷或手術所生之營養障礙 心臟衰弱 豫防手槍危險 急性傳染病(如傷寒 虎疫 丹毒 肺炎 腸炎 淋病等) 藥物中毒症 因新陳代謝生食之中毒症 肝

毫克沙而

膿病 子宮內膜炎及其他附屬器官之炎症性疾痛 浮腫諸病 滲出性諸病 天庖瘡 搔痒皮膚病
尿毒症 疲勞性陣痛微弱 腦病 預防注射疫苗、血清、因蘇林、梅毒劑及麻醉劑等之危險與治療

(五)用法及用量

(一)皮下注射 全無化學的或物理的刺戟。故毫不疼痛。宜專用臺克沙而A號。注射時以緩為佳。
• 注射部位。以大腿皮下為最宜。

注射次數及容量。全憑醫師斟酌病情而定。普通一回一管。每日一次。然亦不妨每日數回。
或隔日注射一次。注射量尤不妨增至數管一頓注入。

(二)靜脈注射 注射時務宜徐緩。每次一管至數管。

(三)灌腸 臺克沙而灌腸。能完全吸收。尿中無糖反應。每日灌數回。每回一至二管。連續用之。
• 直腸毫無刺戟。

靜脈內注射。如必須同時注入數管時。全量宜使稍溫。凡靜脈注入後。如有極輕度之惡寒戰慄發熱等情者。但須令病人安靜。其速甚速。如輔以其地富隆(Gidyparion)注射者。尤為有益。

如遇心臟著明肥大之病人而患心筋衰弱。致血液循環受障礙者。此時如行臺克沙而靜脈注射。須先放血。欲注入臺克沙而若干西西者。即放出血液若干西西可也。

(六)包裝

臺克沙而分成兩種劑量。

- (一) 壹克沙而A號 每匣五管。每管二十西西。內含精純葡萄糖 (Glucose) 二十五成 (25%)。
 (二) 壹克沙而B號 每匣五管。每管二十西西。內含精純葡萄糖五十成 (50%)。

愛美莎 ENESOL "HYPODIE" 痢疾特效劑

總說

愛美莎 Enesol 內含最純粹之鹽酸愛美丁 Imetine hydrochloride。絕對無惡法林 Cephaline 之混雜。故於治療上效力一致。而且真確。查惡法林 Cephaline 亦係含於吐根之中植物擬蘇質。惟其功用。與愛美丁絕不相同。且含毒性。於治療上實不相宜。故凡精純之愛美丁。俱不應有此惡法林以及其他之混合物。而於注射劑更當以不含此質為合理。凡市售品之惡劣者。大率對於此點。俱未研究。醫者不識。每為所欺。其於病家之危害。豈淺鮮哉。務宜注意及之。惟本劑並無以上之弊。保證清淨。功效準確。為阿米巴痢病之特效劑。製成注射藥四種。請閱包裝項下。

功效及主治

本品為吐根中之主要植物鹽基。製成白色鹽酸鹽之溶液也。能撲滅赤痢菌。而尤適用於阿米巴性痢疾。因其殺菌之功。非常強大。故雖稀薄至萬倍溶液。尚不失其殺菌之力。實為治痢藥中之無上特效劑。

用法與用益

皮下注射。輕症用A號B號。重症用C號。劇症用D號。一日注射一次或二次。每日或間日注射。

番陸地

包裝

「海普牌」愛美沙 A 號 每匣十瓶。每瓶一〇西。每西內含鹽酸愛美丁 (Ephedrine Hydrochloride) 〇・〇一瓦。

「海普牌」愛美沙 B 號 每匣十瓶。每瓶一〇西。每西內含鹽酸愛美丁 〇・〇二瓦。

「海普牌」愛美沙 C 號 每匣十瓶。每瓶一〇西。每西內含鹽酸愛美丁 〇・〇三瓦。

「海普牌」愛美沙 D 號 每匣十瓶。每瓶一〇西。每西內含鹽酸愛美丁 〇・〇六五瓦。

考市售愛美丁製劑功效之所以不良者。實因所用愛美丁惟貨價廉。絕不檢查其成分之純粹與否。其貨利之甚者。更有意將別種廉價而無開治效之物質摻入。以圖漁利。致醫師治療方面。大受其影響。往往使病之經過。過分延長。醫師病家均受其害者。均匪淺也。蓋真正純淨愛美丁。價值甚昂。惟海普牌注射劑。全基於科學原理製造。故本劑愛美沙。確實含有足量純淨之主藥鹽酸愛美丁。所以有獨到之宏大治效。決非劣品可比也。

愛番林

(麻黃精注射液) EPHEDRIN "HYPOLITE"

(一) 總說

愛番林 (Ephedrin)。為麻黃 (Ephedra vulgaris) 主成分植物鹼。性質愛非特盛之硫酸鹽 (Ephedrine Sulphate)。將其製成注射液也。功效極似副腎精 (Adrenalin) 而過之。因其毫無副作用而効力持久。專治哮喘及枯草熱。靈効異常。此外白脈循環障礙、皮膚病及嗎啡、鴉片等中毒症。用愛番

林治之。亦收效極宏。

(一) 形狀及性質

愛番林爲無色透明會經消毒之注射溶液。內含最爲貴重之麻黃主成分硫酸愛非特靈 [Aphetrine Sulphate (Ca H₁₅ N O₇ · 1/2 H₂SO₄)]。此藥非特靈。真自麻黃中製出。對於分極光綫之反應爲左旋性。對於試驗紙之反應爲中性。注射絕無刺激。功力靈準。眞非人造品可比。

(二) 功用

考麻黃在中國之供藥用也。其歷史悠久。已逾數千年。然向來但知爲發汗劑。不能盡麻黃之用。自日人長井長武氏始究以來。始知麻黃之功。全基於愛非特靈。其功效極類似於副腎精而優良過之。因後。世界學者。聞風繼起。互相研究。而能確定愛非特靈之生理作用。加之以實驗而不差累黍者。不能不歸功於我國陳克俠博士。於是愛非特靈。我國亦有人能自麻黃中製出之矣。有爲者亦若是。雖謂國無人哉。徒以舊醫之毒。中於全國上下。社會事業。百廢莫舉。生計日迫。使有志於專攻之學者寒心。惟賴有此發明。爲吾人一吐氣耳。雖愛非特靈之功效。極與副腎精相似。然藥力持久。見効迅速而確實。其主要用途。厥爲治療哮喘各症。而注射之優於內服者。即爲避免因服藥之故。由物理學的加重炭疽性氣管支之刺激。使喘息之度更行增進。凡注射愛番林。毫無苦痛。而見効迅速。遠勝內服。

(四) 主治

哮喘 枯草熱 氣管支炎 異物過敏性皮膚癢症 風疹 濕疹 疥癬 各種皮膚病 血毒病 一切

愛番林

過敏反應之症。咖啡中毒。衰弱中毒。血脈循環衰弱。亞迪松氏病。急性傳染病之心臟衰弱。流行感冒性肺炎。

因愛番林有刺激呼吸器官中樞之作用。及使血壓增高之作用。故對於上述各病。均能異常奏效。

(五) 用法及用量

皮下注射或肌肉注射。每次一管至二管。最初注射。應用一管已足。視其反應。如無心跳手顫等情。固後可逐漸增量。或增加注射次數。

(六) 包裝

愛番林每匣六管。每管一·一西西。每一西西中。含硫酸愛非特靈 $\text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{五}$ 瓦。

番陸地 FERRODYL "HYPODIL"

(一) 總說

鐵之為補血專劑與砒之為強壯良藥。已為醫林所皆知。本劑番陸地。即為有機性砒鐵之注射液。其性易溶。故善吸收。含砒鐵之量最高。故効力最宏。

(二) 性質及形狀

本劑為淡黃色透明之注射液。每一西西中。含主要加可地爾酸鐵 [Iron Cacodylate $(\text{CH}_3)_6 (\text{AsO})_2 \text{FeO}_2$] $\text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{三瓦}$ (即半英厘)。其百分中。砒之含量為四十八成 (48%)。鐵之含量為十二成 (12%)。

(三) 功效

具有砒鐵兩種之功用。而絕無砒之毒性。及鐵之副作用。入於組織。極易吸收。鐵之含量雖豐。然殊無過剩之患。並不排泄於體外。此非特驗大便之色澤。可以知之。即按諸全身狀態。亦絕無鐵之副作用發生。考常人每日自體中消費之鐵量。平均為0.0035克(35mg)。此微量之鐵。全恃自所攝食物中補充之。蓋鐵廣佈於動植物界。常源源供給於吾人。然貧血之人。體中鐵之含量既驟少。而胃納又迥不如常人。新陳代謝之機能不全。單恃食物。決不能奏恢復之效。其有待於適量藥物之救濟者。自無待言。故番陸地之注射。自為最良之對症療法。凡欲求砒鐵之效者。當以此為最有把握。

(四) 主治

萎黃病 貧血 慢性皮膚病 乾癬紅苔癬 濕疹 多發性疣 天疱瘡 白血病 假性白血病 惡性淋巴腺腫 瘰癧(其在惡性侵面性或癩後瘦削尤為合宜) 舞蹈病 神經痛 神經性嗜息 神經衰弱 佝僂病 骨軟化症 紫斑病 放線菌病 梅毒病人及肺癆病人之消復

(五) 用法及用量

皮下注射或靜脈注射。每日或間日注射一次。每次一管。惟靜脈注射時。斟酌病情。可以一頓注射三管。

(六) 包裝

每匣十管。每管一。一西西。

番陸地

其地富隆 GIDYPICTION "HYPOURIN"

總說

其地富隆 Gidypiction。爲毛地黃葉中之主要成分狄吉他林 Digitaline 是也。而本品內含之狄吉他林。尤有特異之點。因製法得宜。易溶於水。注射後。並不起局部刺激。排洩易。因蓄積蓄作用。效力迅速而準確。實爲毛地黃製劑之佳品。

性質

爲最優良之強心劑。毒性最弱。積集作用最小。故不妨連用。

功效主治

心臟衰弱、心臟的器質疾病之代償機能障礙、脈搏不整、功氣腫、肺鬱血、血管硬化症、腎萎縮之動脈系血行障礙等症。能亢進血脈。緩慢脈搏。旺盛肺脈之血流。因有血脈亢進之效。而血管並不起收縮。心臟之振動正常。凡有血行循環障礙之慢性心臟衰弱。肺脈之血壓下降。靜脈起鬱血。均有優良之成效。急性熱性病在始作時。能預防心臟衰弱。又以肺炎爲尤宜。得亢進心臟機能。減少肺充血。其他如萎黃病所發之心臟擴大衰弱。發作性連脈。神經性心悸亢進等。無不相宜。因心臟障礙而起之水腫。用本品兼收利尿之效。

用法 皮下注射。視病之需要。得反覆注射之。

包裝 「海普牌」其地富隆。每西西內含精純之狄吉他林 0.02 瓦。每匣十瓶每瓶一。二西西。

合留可統

GINCOPON "HYPOLE"

(一) 總說

本劑爲效力強大之百補注射液。其成分中含磷、含硫、(均在有機性狀態) 含士的年。夫磷爲健腦力補神經之要藥。硫爲長精神強細胞之妙劑。而更輔之以士的年。提神益虛之作用。故其功效。乃溢互相表裏。相得益彰。誠補虛、養損、健腦、養神、助長、強身之聖劑也。

(二) 性質及形狀

本劑爲透明無色溶液。其成分中。含有甘油基磷酸鈣 (Calcium Glycerophosphate)、加可地爾酸鈉 (Sodium Cacodylate)、及士的年。製成強壯二種劑量。(請閱包裝項下。) 用者宜先試弱劑。後更強劑。

(三) 功用

合留可統之成分。既如上述。故作強質藥、健胃藥、興奮藥及強壯藥之用。用途廣泛。收效最宏。其功能使造血機關。增加造血之能力。增加血色素。一方使貧血旺盛。食量加增。其故因新陳代謝之作用增健。營養物質。可以多量吸收。

自來磷劑。最難應用。蓋以磷化合物入身後。大都仍全行排出。不能補充一切器官之建築材料。故其結果。往往等於浪費。惟此合留可統中之磷質。與人體原有之磷。完全相同。一旦入身。極易同化。且絕無毒性。毫無流弊。吸收迅速。更加以與士的年之輔助。故其効力。乃益爲偉大。而見功愈爲神奇耳。

合留可統

三一

合留可統

三三

(四)主治

皮膚病結核 消化不良 瘡疾 神經衰弱 歇斯的里 病後失調 一切衰弱 神經病 神經痛
軟骨病 鑄骨或鑿骨手術之後 婦女崩經 憂鬱過度 風濕 貧血 以及一切跌打損傷等症

(五)用法及用量

皮下注射。每日一次。每次一管。輕症用A號。劇症用B號。

(六)包裝

分爲兩種劑量。即

(一)合留可統A號 (Glycolon "A") 每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含有下列各種成分。

甘油基磷酸鈉 (Sodium Glycerophosphate) 〇·一瓦

加可地爾酸鈉 (Sodium Cacodylate) 〇·〇五瓦

硫酸士的年 (Strychnin Sulphate) 〇·〇〇〇五瓦

(二)合留可統B號 (Glycolon "B") 每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含有下列各種成分。

甘油基磷酸鈉 〇·一瓦

加可地爾酸鈉 〇·〇五瓦

硫酸士的年 〇·〇〇一瓦

怪阿瑟地 (GUAINACODYL "HYPOITE")

結核病之專劑

(一) 總說

去怪阿瑟 (Guainacol) 製劑。向因其對酸內酸之力薄弱。不如幾阿蘇 (Crosole) 之甚。可以長時間服用大量。故為歷來醫師所喜用。其効在充進食慾。增加體重。使全身普遍之抵抗力旺盛。以間接的收治療癆瘵之功。然內服藥物。終不如注射之便捷。向以怪阿瑟不能注射。故有時對於結核治療。醫師病家。成苦時間過分持長之爲難。往往中道而斷。良可惜也。自有怪阿瑟地出世。於是怪阿瑟製劑始可注射。注射之優點。在(一)手續便捷。(二)治療時間短縮。(三)吸收尤爲整齊。(四)尙可引用他種內服藥物之輔助。(五)本劑絕無副作用。(六)成績最優。(七)因怪阿瑟地中旁含砒素。故按作新陳代謝之作用益甚。而使上述種種優點。愈爲確實。

故注射怪阿瑟地以治結核性疾患。可以全治。雖怪阿瑟地不能直接撲死癆菌。然制止其產生之力則極強。而間接的從種種方面。使病者全身症狀。積極佳良。抵制病處之力日盛。致殘餘癆菌。由生理的全歸淘汰。則可以信任者也。

(二) 性質及形狀

阿瑟地。爲加可地爾酸怪阿瑟 [Guainacol Cacodylate As (CH₃)₂O₂ (C₆H₅OCH₂)₂] 之注射液。係無色透明。氣味類似怪阿瑟。

怪阿瑟地

(三) 功效

怪阿地注射後。極易從組織吸收。普通八至十次注射之後。即見食慾亢進。體重增加。自覺症狀日見愉快。即熱度、咳嗽、嗜睡等情。亦日見減輕。此非對於瘰癧直接有殺滅之作用。其主要原因之一部分。為促進胃之機能。防癒腸胃。使食物之消化吸收佳良。於是日得營養之方。一方又因振作全身細胞之活潑力。鼓勵其新陳代謝作用。增強其抵抗力。故瘰癧在環境上。日趨於不適宜生存之狀態。乃對於逐漸自滅。遂使諸病症狀。因之消除。微諸事實。信而可見。即如吾人持續使用。至及長時期。決不發生些微副作用。而注射處亦絕無刺戟。決無疼痛或硬結等事。因是醫師病家無不稱頌。凡此皆為怪阿地足以治癒瘰癧之因也。

(四) 主治

各期瘰癧 各種結核病 腺腫 癩癧 虛弱 盜汗 不眠 氣促 胃呆 潮熱 嗜血 咳嗽多痰 等等

(五) 用法及用量

皮下注射。隔日一次。

(六) 包裝

怪阿地。每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含加可地爾酸怪阿地 $O_2 \cdot O_3$ 瓦。

海隆 HEBRON "EXPOLLE"

見庇宏 (BION) 條下。

海克山 HEXAM "EXPOLLE"

40% SOL. HEXAMETHYLENTETRAMINI

尿道消毒劑

(一) 總論

夫海克撒明 (Heximethylentramine) 或烏羅透品 (Urotrypin) 者。吾人固已知其同爲由蟻酸 (Formaldehyde) 及氨 (Ammonia) 所凝縮之化合物也。然在市場販賣者。不問其名稱之爲何。要亦可透視爲化學的純品。容含過分之藥性。容含過分之銨。果爾。則非特治療作用減弱。抑且勞生枝節。益增糾紛矣。惟有海克山者。因其所用之烏羅透品。在製造成消毒液之前。必經化學檢查。常加以嚴密之精製。必使其純爲 $C_6H_{12}N_4$ 而後已。故用海克山之效果。可以斷言。較同類之他種製劑爲優也。

(二) 性質及形狀

海克山爲四十成之烏羅透品溶液。完全透明無色。對於鹼性反應。所含烏羅透品爲絕對純品。完全有 $C_6H_{12}N_4$ (即烏羅透品之化學式) 之符號。此外並無雜質。更無未化合之銨或蟻酸。每管中含烏羅透品二瓦 (2 Gram)。經嚴密之消毒與檢查後。始發行之。

海克山

(三) 功用

海克山中。既如上述。決不含過分之鹼性。亦決不含過分之酸。故絕無副作用。毫不刺激腎臟。在平常狀態促進尿之分泌。溶解尿酸之力甚強。當其輸入於人之尿中及一切分泌液內（如血液、唾液、乳汁、骨髓液、乳汁、痰、唾等）時。始將尿酸緩緩分解析出。因生持續性消毒之功。其在酸性尿中。則分解作用更強。因之其效尤著。一方殺滅細菌。制止發生。又抑遏尿酸之。而毫不損害泌尿器。同時就動全身細胞。生普遍之強大抵抗力。使各種傳染病之經過縮短。至用藥之久暫。宜悉隨病狀而轉移。縱連亘數月而用之。亦正無妨。決不發生有害副作用與他種反應也。然事實上。固無論何病。不需連續用海克山至數月之久。但期用者瞭然於其毫無毒性。故言之如此。

(四) 主治

各種腎臟病及一切尿道細菌病。如腎盂炎，膀胱炎，攝護腺炎，腎盂兼腎臟質炎，磷酸尿，鉍發酸尿，尿酸病，尿道傳染病，傳染性腎臟炎，尿酸結石，痛風等。及各種傳染病。如傷寒，腦膜炎，流行性感冒，猩紅熱等。用海克山合併治療。則體內抗毒力驟增。功效顯而易見。症狀輕快而治癒迅速。又常以探尿管插入尿道之際。先用海克山注射。則有預防發生膀胱炎之利。

(五) 用法及用量

靜脈注射。每次一至二管（即 1-2cc.）。

(六) 包裝

每匣五管。每管五西西(即 Gr. c.)。

海特拉新

HYDRASIN "HYPODERM"

(一) 總論

本品係坎拿大所產之金印草 (*Hydrastis Canadensis*) 根中有有效成份金印草精 (*Hydrastin*) 之分解產物。其名爲海特拉新替寧 (*Hydrastinin*) 有收縮血管與止血之效。而本品較之金印草精。尤爲優強。

(二) 性質及形狀

海特拉新。係用淡黃色結晶性粉末之海特拉新替寧。溶解於水。作爲注射劑。透明微黃色。顯螢石彩。在治療上最爲相宜。因其奏效特速也。確爲止血之專劑。

(三) 功效

本品對於血管運動中樞。興奮最早。故治療上用其少量。已能縮小血管。得其止血之效。非若金印草精。僅能活動於血管中樞。此則又能直接活動於血管壁也。其於子宮出血，與子宮內膜炎之子宮出血。及月經過多。用之使子宮與血管起收縮。而收止血之效。其他用於咯血、衄血、血崩、血瀉、痔血、子宮纖維腫，以及種種急性之大出血。以本劑皮下注射。其奏效之速。有非他種止血劑所可比擬。然於後產期之子宮出血。則不如山可丁之有卓效。(請參看山可丁 *Secorlin*)

(四) 主治

海特拉新

帶血、吐血、咯血、胃出血、血崩、血崩、痔血、子宮出血、子宮內膜炎、月經過多、產後子宮無力、以及種種之出血症。而於收縮子宮。亦有卓效。

(五)用法及用量

皮下注射，每次一西西·或二西西·得視病情之需要，而繼續注射之。

(六)包裝

海普牌「海特拉新」。每西西內含鹽酸海特拉新 $\text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{O}$ 一瓦。每匣十瓶。每瓶一。一西西。

應弗魯阿爾 INFECTOL "INJECTION"

(一)總論

夫肺炎流行性感冒等症。俱為一時即發急性高熱之病。病者身當其衝。既受切身之痛苦。既憂危重之重篤。其心中急欲首先解決之事。自然厥為退熱。而醫師遇此等劇重傳染病時。欲求縮短病之經過。維持病者之全身機能。亦惟有早謀退熱之法。然內服退熱劑。普通之供應用者。其功效之不足以副吾人之望。已昭昭在人耳目。羣知其不可恃矣。乃不得不故事迂迴曲折。以收治療之功者。甚非醫家之本旨也。茲所稱應弗魯阿爾者。即為矯正是弊而作。其製造之原理。全基於藥物之合併作用而成。故其藥力之偉大。比之各個單體不可以道里相計。而內服之效。亦迥不如注射之奏效為益敏確實而偉大。故應弗魯阿爾者。肺炎流行性感冒之特效注射藥也。

(二)形狀及性質

應弗魯阿爾爲透明無色完全滅菌之注射液。反應殆爲中性。其主要成分爲鹽酸奎寧(Quinine Hydrochloride) 咖啡精(Caffeine) 及烏來唐(Urechin)。每一西西(One Cubic Centimetre = 1 c.c.) 中各種成分之含量如下。

- 鹽酸奎寧 〇・〇六八〇瓦
- 咖啡精 〇・〇一七五瓦
- 烏來唐 〇・〇一四五瓦

應弗魯阿爾係製成二・二西西溶液者。故其每管中之含量。均爲上列各成分之二倍強。

(三) 功用

應弗魯阿爾之功效。全基於上述各成分併之程。故能奏退熱，強心，利尿，鎮痛之功。此等單體之功用不必贅述。就中奎寧作用之發顯。更爲著明強大而又迅速。其各種成分含量之微。並不關於溶解度之問題。實緣依據治療之結果以衡之。無須再事增加也。就他種情形而言。儘有單用在甯時。雖達大量。並無而効。而在應弗魯阿爾中。則因他成分配伍之故。乃以此微量。竟收全功。似出於常理之外。其實不然。吾人應知。(一) 應弗魯阿爾中成分之總量。每二西西中已達〇・二瓦。並不過少。(二) 以宜於注射之故。吸收完全。故見效迅速。而藥力優於內服。(三) 依合併療法之理。二藥相互表裏之結果。必勝於二藥分用効力之總和。故其能收奎寧所不能奏效之功者。自信而有徵。則應弗魯阿爾之爲特效藥，流行性感冒等之特效劑也。自非偶然矣。故當遇是等劇症時。應速注射應弗魯阿爾。無用猶豫。其尤能與吾人以可信仰之處者。即一次或二三次注射

沃度鈣而治

四〇

之後。無論若何高熱。必見其迅速下降。設非停頓注射。則熱度必不再昇。更爲應弗魯阿爾唯一之特徵。而一方因高熱既速退。心臟機能又得維持。故咳嗽，沉悶，脈痛，頭痛等症狀，潛消甚速。病之經過。自然佳良。短縮易。治愈易。恢復亦易也。至其無若何副作用者。猶其餘事耳。

(四)主治

肺炎 流行性感冒 瘧疾 扁桃腺炎 口瘡炎 神經痛 偏頭痛 結核熱 傷寒 百日咳 及奎寧之一切適應症

(五)用法及用量

皮下注射或靜脈注射。均無不可。皮下注射亦並無疼痛。不生硬結。

成人一回二管。一日注射一—三次。或一次注射一—三管。一日一回。小孩每次一管。嬰孩每次半管。(即一西西。)小孩嬰孩，宜皮下注射。成人宜靜脈注射。

(六)包裝

應弗魯阿爾每回十管。每管二。二西西。

沃度鈣而治 TOLDOKALIN

(滅菌氯化鈣注射液)

(一)總說

碘劑及鈣劑在治療上之價值。自來爲人重視。至應用之策略。尤以同時能收碘鈣兩劑之効。始爲最合理之法。故碘化鈣之注射治療。遂爲醫林所推賞。凡結核性疾病及各種急性慢性炎症疾患。均無不以注射碘化鈣爲相當之治療法。顧如原料之品質不純。製造之手續未週者。則是等製品對於治療經過與其結果。頗生影響。歷來應用碘化鈣。未能盡理想上之能事者。均以此也。惟「沃度鈣而治」。原料既絕精純。製造之法。又處處嚴格。在同類製劑中。無與倫比。欲求碘鈣兩劑能盡量發揮治療本能而絕無流弊者。常用「沃度鈣而治」。

(一) 性質及形狀

(一) 「沃度鈣而治」爲無色透明及微黃色透明絕對消毒之注射溶液。裝入玻璃管中。久藏不壞。

(二) 「沃度鈣而治」之原料碘化鈣最爲精純。絕無雜質。

(三) 溶液爲新鮮重蒸溜水。再行滅菌法後供用。玻璃爲硬質中性玻璃。洗滌清淨。製成「沃度鈣而治」後。尚經嚴重之滅菌消毒方法。故絕對可靠。

(四) 本劑常呈中性反應。決不變化。

(五) 對於血球無溶血作用。

(六) 凡「沃度鈣而治」其每一成碘化鈣溶液中。碘與鈣之百分率含量。爲碘〇、七成鈣〇、一成。

。即A號「沃度鈣而治」一百西西中。含碘〇、七瓦含鈣〇、一瓦是也。

(二) 功效

(一) 「沃度鈣而治」在治療上之價值。既足以代表碘鈣兩劑。而其功效實優越迅速。勝過他種鈣

劑礦劑。故對於慢性的發病性機轉。因促進病的產物之吸收。制止分泌作用。遂使治癒病症之機轉異常旺盛。其結果。在最短時間。祛除病情。恢復健康。

(一) 對於結核性疾患。不僅能使病竈治癒。且能使其密質變化。極有效驗。故凡結核病一經注射「沃度鈣而治」後。自覺症狀即著明輕快也。

(二) 「沃度鈣而治」吸收迅速。雖皮下注射。並無疼痛。即連日使用至綿亘數月之久者。亦決無藥物的副作用。無論局部或全身。必不發生有害的反應。

(三) 對於慢性病。目的在用礦素作變質藥者。亦惟「沃度鈣而治」最為適用。

(四) 在發熱時行注射。並無妨礙。

(四) 主治

肺癆及其他各種癆症 嗜息 肋膜炎 腹膜炎 尋九炎 關節炎 子宮內膜炎 肺氣腫 肺膿瘍
慢性氣管支炎 化膿性耳炎 角膜炎 妊娠惡阻 腺病質 萎黃病 梅毒 風濕 動脈硬化症
佝僂病 其他各種急慢性炎症疾患。

(五) 用法及用量

皮下注射或靜脈注射。各從用者之便。然如一頓欲注射大量時。終以行靜脈注射法為宜。
每日或隔日一次。或每星期中注射兩次。

從用「沃度鈣而治」A號一管注射起。可任意增加濃度與其全液之容量。雖一頓注射「沃度鈣而治」E號至五管時。即最濃液十八西酉者。亦並無妨礙。所以須漸次增量者。因病人之感受性及

其素因。當然有顯慮之必須。故逐漸增加濃度增加容量。以視病情。至認為最妥之程度時。宜常用是量注射之。如有時認為用量起越過速者。當酌減之。用沃度鈣而治注射。千百人中。雖有一人發生磷質瘰癧 (Cod Aene) 者。設或遇之。可以休藥四五日。俟消穩後。再行注射可也。

(六)包裝

- 沃度鈣而治 A 號 (TODOKALIZ "A") 每匣十管。每管三西西。每一西西中。含主藥磷化鈣 〇、〇一瓦
- 沃度鈣而治 B 號 (TODOKALIZ "B") 每匣十管。每管三西西。每一西西中。含主藥磷化鈣 〇、〇二瓦
- 沃度鈣而治 C 號 (TODOKALIZ "C") 每匣十管。每管三西西。每一西西中。含主藥磷化鈣 〇、〇三瓦
- 沃度鈣而治 D 號 (TODOKALIZ "D") 每匣十管。每管三西西。每一西西中。含主藥磷化鈣 〇、〇四瓦
- 沃度鈣而治 E 號 (TODOKALIZ "E") 每匣十管。每管三西西。每一西西中。含主藥磷化鈣 〇、〇五瓦

伊拉而生 IRARSEN "HYPOPHOSPHORUM"

(一)總說

伊拉而生

伊拉而生

四四

伊拉而生因內含砒與鐵。且亦在有機性狀態。故其效力與番陸地 (Ferrodin) 頗多類似之處。雖伊拉而生中砒與鐵之含量。不如番陸地中含量之多。然其恢復同化異化兩作用機轉之力。則並不薄弱。故最適合於恢復期之用。妙在能使脂肪組織層加厚。皮膚發養佳良。赤血球與血色素之新生力著明增進。固與番陸地有異曲同工之妙也。

(一) 性質及形狀

伊拉而生為黃色澄明之液。其所合成分為質地純淨之有機性檸檬砒鐵 (Iron Arsenite)。此檸檬砒鐵中。含亞砒酸之當量為一·四成 (1.4%)。鐵之含量為十五成 (15%)。

(二) 功效

請參觀番陸地條下。

(三) 主治

請參觀番陸地條下。

(四) 用法及用量

靜脈或皮下注射。每日或隔日注射一次。

(五) 包裝

分為三種分量：

(一) 伊拉而生 A 號 (IRAKSEN "A") 每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含檸檬砒鐵 〇·〇一瓦。

(二)伊拉而生B鹽 (IRARSEN "B") 每匣十管。每管一。一西西。每一西西中。含磷酸砒鐵〇

〇二瓦。

(三)伊拉而生C鹽 (IRARSEN "C") 每匣十管。每管一。一西西。每一西西中。含磷酸砒鐵〇
〇三瓦。

剷梅毒 贾里尼爾 "HYPODIE"

最新改良梅毒特效藥 根治各期梅毒

砒、汞、碘合併療法之專劑

功力遠勝於最流行之舶來治梅毒劑

用法簡易 毒性最弱

(一)總論

梅毒 (Syphilis) 一症。無論中外醫師。均知其爲害之烈。故研究治療之方法者。亦日求其完善。自來治梅毒之劑。砒、汞、碘三者並稱。然此三者。性質既殊。効力亦各不同。大抵砒劑適用於初期梅毒。汞劑尤適用於二期梅毒。碘劑則宜用於三期梅毒。

對於梅毒病原螺旋菌 (Spirchaete Pallida) 之砒、汞二者。固同有殺滅之力。然砒劑對於腦與神經中病原菌。不生作用。而平常用之。反有驅逐螺旋菌直入腦與神經之弊。其性質遠與汞劑絕端相反。至碘劑之功效。則並不能直接作用於病原菌。惟在梅毒第三期時。身體各部之組織內。逐漸

剷梅毒

發生慢性炎症。至有生成所謂橡皮腫者。其時毒礦劑能制止炎症。破壞增殖之組織而促其吸收。凡硫、汞所不能奏效之組織變性。亦惟硫砒能恢復之。蓋所謂最良之對症療法也。今吾人易言以申明之。則欲求根治梅毒。猶賴汞劑。苟欲僅望之於一種砒劑或一種礦劑。則終成泡影耳。夫汞之爲梅毒特效藥。自古以來。已爲世人所知。至其價值。亦至今沿用未衰。惟固向來汞劑。毒性皆大。往往治療未終。劑作用發生。致令不得不休藥以俟反應之終。遂令受治者望而生畏。使治療不能貫徹者。往往而是。然吾人應知。此乃因製劑未達一定適當之域。副作用妨害之故。投以忌器。故應用難終。若汞之藥性。汞之効力。固依然未久也。

自艾利氏發明砒劑六〇六以來。治梅毒之一新。世界學者。開風繼起。同類製品。一時雲湧。德、法、日、瑞。無不自製。其優長之處。在一二期梅毒。經注射之後。症狀之消除甚速。而毒性較小。可以運用大量。在不明學理之病者視之。一二次注射之後。病症常見輕快。往往色然以喜。醫師一方本苦於處置汞劑之爲難。一方又必須細及加察之愆。則隨手一針六〇六或九一四。乃爲順水推舟之舉矣。

然若欲求根治梅毒。則一針、十針以至於百針之六〇六。其結果。仍注射自注射。梅毒自梅毒。是病之螺旋菌。必依然盤據於神經及腦之中也。此其故。因六〇六或九一四之力。一方固足以殺菌。而事實上決無一網打盡之理。則殘餘毒菌。遂竄入神經與腦。迨其既經竄入神經與腦之後。則無論若何再注射新砒劑者。其間即不能與螺旋菌再生作用。故結果終等於浪費而已。此時惟有改用汞劑。則始可將其已竄入神經與腦之毒質。逐漸搜出。再入血液及其他組織之中。而移換

法之。故新劑應用以來。雖至今未衰。然不滿意於其治効者亦日衆。一方研究改良之工作亦日增。其結果則更增數種類似之毒劑。與若干種。夫與其就在化學上之地位相當。本來則多類似之處。但目前則尙未見有重要之價值耳。其有能獨出心裁。另闢蹊徑。融冶此汞鹽於一爐。製爲專劑。同時輸入人體。以求根治梅毒之効。則未之前見。有之曰「副梅毒」始。

夫新劑効力之不足恃。今已彰彰明甚矣。世界醫師要用以來。均異口同聲曰：「若欲梅毒之根本治癒決不能求之於是。」而新劑之製造廠家。固亦嘗鄭重聲明。謂一劑至少須注射七八次至十餘次矣。由一劑而二劑而三劑而四劑……之並不爲多矣。苟血清反應而未盡確實斷定根治者。則此方法仍得反覆應用之。又嘗說於衆曰。治療之期間。有須二三年矣。有須四五年矣。而一方又反覆叮嚀。對於二期三期梅毒。除注射新劑之外。必須伍用汞劑及碘劑也。夫治療時間。既須其數年之久。治療方法。又如彼其麻煩。而効力之結果。則雖數千百針之新劑効力。殆等於一針。不得不有待於汞劑碘劑之相助者甚大。其爲徒耗時間經濟。無補於事實無疑。所以應用未衰者。僅恃其適應一針。足以明示病者以藥力之故也。惟「副梅毒」者。係本於汞劑根治梅毒之學理而成。故成分中含汞之量亦最多。而又輔之以碘、磷。既足以增強其藥力。不論身體各部組織之內。及血管腺神經等。其中所潛伏之梅毒螺旋菌。皆能搜盡而撲殺之。使決不留餘孽。又以預質之故。能恢復組織之發達。增進新陳代謝之功。使全身抵抗力加強。故用「副梅毒」治梅毒。無有不斷根者。且以吡、汞、磷三者融合於一劑。故用法又異常簡便。謂非獨一無二根治梅毒之聖劑者。不可得也。

(一)性質及形狀

「剉梅毒」之主要成分。爲有機性之砒、汞、碘複合體之鈉鹽 (Jodquecksilberäthylmethylinarsinsures Natrium)。「剉梅毒」每百分中。含此複合體之鈉鹽約爲四分。即「剉梅毒」每一西西中。含此 Jodquecksilberäthylarsinsures Natrium $O \cdot C$ 四瓦是也。而此鈉鹽中三要素之含量。則汞爲 $10 \cdot 5$ 成 (10.5%)。碘爲八。三三成 (8.33%) 砒素以亞砒酸表示之。則其含量爲六。三一成 (6.31%)。故「剉梅毒」每一西西中。汞之含量爲 $O \cdot C$ 四二瓦。碘之含量爲 $O \cdot C$ 〇三三瓦。而亞砒酸之含量則爲 $O \cdot C$ 〇二五瓦。是等成分。在溶液中。其實安定。卽遇稍高之熱。亦不變性。「剉梅毒」卽確實含有是等成分之澄明注射液也。

(二)功用

「剉梅毒」爲功力最偉大用法最便捷効驗最確實之治梅毒劑。包可根治梅毒。而費時極短。迥不可與流行之砒劑相提並論也。但觀其砒、碘、汞三成分化合於一劑之中。則對於各期梅毒之治療。已省却不少手續矣。而其因合併作用之理。更應互相增強殺菌力。使毒菌無法逃免。無虞規避。注射後。局部既無疼痛。毒性又弱。毫無反應。故「剉梅毒」者。不愧爲最新改良完全剷除梅毒之聖劑也。

(四)主治

專治各期梅毒、楊梅瘡、瘰癧、瘡疾、腫眠病。及其他碘砒之各種適應症。

(五)用法及用量

皮下注射。隔日注射一次。在開始三星期。宜用「劇梅完」A號。(即共注射九次。每次一西西。)
嗣後繼續三星期中。則宜用「劇梅完」B號。(即再注射九次。每次二西西。)
故用「劇梅完」A全劑。計共注射十八次。前後費時六星期。已足。如是休藥三星期後。再如前法。照式反覆一次。
經二全劑注射之後者。無論若何重篤梅毒。無有不斷根者。

故在一全劑「劇梅完」治療期中。共用汞之總量○。一一三四瓦。碘之總量○。○八九一瓦。亞砒酸當量之總量○。○六三三五瓦。其各個之分量雖微。而效力則極大。副作用幾全無。注射後之結果。徵之於瓦氏反應 (Wassermannsche Reaktion) 即可知其優越於單獨使用銻劑者萬萬也。

(六)包裝

「劇梅完」分為兩種裝置如下。

- (一)「劇梅完」A號 (JARMER "A")。每匣十管。每管一·一西西。
- (二)「劇梅完」B號 (JARMER "B")。每匣十管。每管二·二西西。

(七)禁忌及注射時應注意之點

「劇梅完」中因伍用碘質之故。故對於肺癆病、心臟病、血管病、及神經質等患者。均無禁忌。但對於汞毒有特異質之患者。則應時時顧慮及之。最好當守下列條件。

- (一)受治療時間。病人身體。應保安靜。禁止刺激性飲料與食物。
- (二)口腔應使絕對清潔。每位後均應拭牙。牙刷須軟毛製者。嗽口水可用稀薄鹽澗水 (Sol. Potassii)

(Chloran)。嗽口次數愈多愈佳。

(二) 每日宜在空氣清新之處。緩步若干時。臥室中空氣須使流通無阻。不可居於污穢氣悶之處。

(四) 沐浴不必太勤。可間時行之。而內衣則宜絕端清潔。時時更換。

(五) 身體勿使受過峻過冷。

又當注射之後。宜在注射處按摩稍久。以促其吸收。如經發現汞毒特異質者。宜即休藥。照上法處理之。候其全愈。再由小劑更試行之。

瘡可混 JUKUMIN "HYPODIE"

濕疹注射藥

皮膚搔癢症之專劑

(一) 總論

皮膚病之療法中。最費技術又且特為臨診醫家之所窮於應付者。厥惟濕疹療法。濕疹之症狀。千變萬化。並無定型。有時背陰部之皮膚。對於外用藥劑或應銳敏。常反因刺戟而難收治療之效。而其惟一主要症狀之癢痒。不但病者所最難堪其苦痛。醫師亦常欲求首先所以除去之也。夫癢痒因臥時衣被之溫度而增劇。於是或為故意的或為無意識的搔撓其局部。或因摩擦等。病症為之增惡。荏苒而不癒。而濕疹療法遂更陷於困難之地矣。

濕疹之療法。向來雖使用泥膏。軟膏或塗布藥等治療。而使其癢痒消散之藥物則無之。誠為憾事。要之對於濕疹療法。若速使其癢痒鎮靜。則患者可免不堪之苦惱。且癢痒既除。則濕疹之治癒轉歸。勢必良好。是為當然之理。亦係醫家所公認者也。止痒劑之對於濕疹。既如此之重要。故

金雞納果的確之止痒劑之出現。乃醫家之夙願也。

最近以臭化鈉溶液對於濕疹、蕁麻疹、紅色疥癩疹、蕁麻疹樣紅斑、施行靜脈內注射。以阻治療。竟確認其功效有異於尋常外用藥者在。據可混者。即應運而生之止痒專劑也。

(二)性質及形狀

本劑爲含有二成氯化鈣及五成臭化鈉之溶液。施嚴密的滅菌法而製成之注射液也。本劑以其臭化鈉之鎮靜作用與氯化鈣之消炎作用。即依此二者之共同作用而使各種濕疹症狀速就治癒者也。而其重要之特徵。即在注射後。即能制止發癢。與病人以鎮靜。因使治療之經過短縮。本劑爲無色透明之液。性質安定。遇光不變。

(三)功用

本劑之功效。因臭化鈉對於神經系之靜脈內注射發顯卓著之鎮靜作用。注射後數分鐘。病者頗呈安靜。若與臭化鈉之經口投與後所顯之效果相比較。則注射之效。迅速而確實。對於癢痒速爲鎮靜。亦可減退局部之炎症症狀。病者遂得安眠。又可大縮短其濕疹之經過。且不認何等之副作用。誠堪推崇。如此向來作爲鎮靜劑經口的投與之臭化鈉。今得應用於靜脈內。而使其濕疹之主症癢痒容易消散。誠藥劑療法之一進步也。

凡既往之治療法。就大體論之。液體類之藥品。多刺戟強而使用困難。軟膏 *unguentum* 劑等。因脂肪之分解。而污染局所。每當每日行洗滌。因之糜爛面受刺戟。不易新生。或方新生。又遭破壞。而治愈愈形困難。其他轉地湯泉等療法。事實上患者又感不便。尤以糖尿病患者之頑癢。癢痒難

禁。醫者病家均甚焦灼也。惟有用撲可混。則其效果遠比用別種製劑爲優。故綜合撲可混之特徵如下。

(一)迅速減退其痒感及發赤。大縮短其患疹之經過。

(二)注射後並無發熱及其他之反應症狀。又無神經系之機能障礙。

(三)因係靜脈內注射。不障礙胃腸。於尿亦不起變化。

(四)主治

(一)皮膚癢痒症、濕疹、蕁麻疹、紅色柑棘疹、其他伴有癢痒之各種疾患。

(二)神經性泌尿器疾患、一般神經性疾患。

(三)各種之內出血。

對於內出血之功效。一因氯化鈣之作用。一因溴化鈉本爲食鹽之同列化合物。一般性質頗有類似之處。故除溴素鎮靜作用之外。其止血作用。亦幾同於同濃度之食鹽溶液也。

(五)用法及用量

靜脈注射每次一管。依症狀之如何。每日或隔日注射之。

(六)包裝

每匣五管。每管十西酉。每管中含溴化鈉○·五瓦及氯化鈣○·二瓦。

嘉謨 KAMOL "HYPODIE"

(一) 總論

嘉謨 Kamol 以質地最為精純之洋橄欖油作為溶劑。溶入提煉純粹之天然樟腦而成。製成注射劑一種。

(二) 形狀及性質

嘉謨為透明淡黃色油狀注射劑。作強心藥，與奮樂，因所用溶劑之純粹，與樟腦之精製。故絕無刺激。吸收迅速，確實能達到預期之效驗。此本品與他種樟腦製劑不同之優點也。

(三) 功用及主治

能興奮呼吸中樞、血管神經中樞、及心臟之肌肉。故用之於急慢性心臟衰弱。及一切虛脫。可以興奮其呼吸。與心臟之動作。使脈搏充實。血壓亢進。又刺激迷走神經及呼吸中樞。使脈搏徐緩。而起深呼吸。故對於一切心臟障礙。無不神驗。

(四) 用法及用量

皮下注射。每次一管。斟酌病情，得於十五分至三十分鐘間，作第二次之注射，或照此以法至三、五次者，絕無其他之顧忌也。

(五) 包裝

「海普牌」嘉謨 A 號 (Kamol "A") 每匣十瓶。每瓶一。一西西。內含十成樟腦。

「海普牌」嘉謨 B 號 (Kamol "B") 每匣十瓶。每瓶一。一西西。內含二十成樟腦。

陸萬客 LOBELIN HYPOCISTIS

回生聖劑

起死靈藥

生死存亡

一針救命

呼吸中樞之惟一興奮劑

凡人之暴死。其病因雖有多端。其當前要害。不外呼吸系與循環系停止工作二者。蓋呼吸循環兩系人命之大本也。故俗稱人死曰斷氣。醫言危殆曰脈絕。終言人死曰脈息全無。脈即脈搏。乃循環系表之徵。息即鼻息。(呼吸氣。)乃呼吸系之現象。循環系壞而脈停。呼吸系壞而息斷。兩系俱壞。脈息全無。而人死矣。故曰。呼吸循環兩系人命之大本也。

今世俗所謂救命針者。在醫家謂之興奮劑。質言之曰強心劑。蓋皆徧於循環系之方面者也。惟對病人因呼吸中樞麻痺氣斷而死者。殊少挽救之方。強心之藥。既屬隔膜。人工呼吸。亦徒勞無功。常有皮膚刺激及純養氣吹鼻等法。亦皆聊盡人事而已。殊鮮確效可言。

惟自陸萬客發明以來。乃專門興奮呼吸中樞之藥。遇窒息垂危之症。或痰湧氣閉之時。如及時注射。確有起死回生之功。

陸萬客係路俾利亞草 (Lobelia inflata) 葉中之結晶鹼基。可以久藏。乃最新之發見。此藥用時。行皮下或肌肉注射。能於數分鐘間。使已斷之呼吸復反其常。并因新鮮空氣吸入肺後。運行身中。間接使其他各官能皆活潑有意。其中尤以循環系器官受益最大以此陸萬客一藥。竟為暴死猝斃症之救死靈方。返魂聖藥。

又當危急存亡之際。其循環系受傷已深。血脈運行無力。藥物功效亦受其阻滯。其時將陸萬零由肌肉內注入。恐不能即被吸收。而得其功力。故須救急。不妨用靜脈注射。每隔數分鐘注射一次。並無絲毫危險。自今以後凡醫師藥室中。當常備此藥。視為不可暫缺之品矣。

(二) 性質及形狀

陸萬零係無色透明澄清之消毒注射液。含有路俾利亞草藥中之主要據據質陸萬零結晶 (Lobelin Crystall)。具有 $C_{12}H_{13}NO_2$ 之化學記號。質地最為純淨。除此主成分以外絕不含有其他無效擬雜質及配糖體等。故陸萬零注射液。在路俾利亞製劑中。功效靈卓偉大而迅速。絕無流弊決非他種可比也。

(三) 功用及治療範圍

(一) 內科用

凡遇急性傳染病如肺炎、腦膜炎之類。突起呼吸麻痺。痰塞喉沉。一息將絕。他種藥不及見功者。惟陸萬零可以救死。上述各急病。能使呼吸系暴厥者。在小兒科為數見不鮮之事。尤以乳嬰為甚。小兒死於呼吸暴絕者。每歲不下千百萬。今有陸萬零注射液發明。可以救活暴死小兒。陸萬零為兒科醫所不可不常備之物。一切內病至危急時。起呼吸短促。面漲唇紫。或息微脈弱。潛欲虛脫者。急為之注射陸萬零。大多數不過一針。即能於數分鐘間。使氣舒脈起。頗有轉機。且因此病情轉佳。藥力得達。而歸於全愈。

即如或因氣管有壅塞而致呼吸困難。或窒息將絕者如尚未斷氣。亦可注射陸萬零以救之。往往因

此復活。並可省却氣管開窗等手續。小兒出痲喉腫或患白喉喉腫等。呼吸閉塞。血中滿蓄炭酸。以致呼吸麻痺者。如早與以陸萬零注射。不獨可免氣管開刀之麻煩及危險。乘亦可挽回危機。故在瀕死將絕之時。陸萬零之功效。實遠勝樟腦油注射。

(二) 外科用

凡外科用蒙藥時及用蒙藥後。因蒙藥之毒力過甚。每起生命之危險。往往病人在開刀檯上。忽然窒息而死。最與醫生以難堪。往往正行手術時。病人呼吸停止。致逼迫醫生停刀而行人工呼吸。至於我輩工夫而仍然不救者。亦為數見不鮮之事。惟有注射陸萬零。可使呼吸復活並不須人工呼吸而使麻藥之毒全解。並免開刀後除毒作用之危險。凡上蒙藥時或上蒙藥後。即與以陸萬零注射者。能催病人早醒。而預防劇吐及肺炎等之危險。故陸萬零為解蒙藥中毒之唯一聖劑。外科醫生宜時時備之。

(三) 產科用

除於各種產科手術時。應照其他外科上所規定。早用陸萬零注射以防呼吸系中毒外。此外凡遇胎兒出產時窒息不啼者。速與陸萬零注射亦可代替人工呼吸。而收較靈較速之功效。如心臟過弱者。爰可用其他強心劑同時注射。

(四) 中毒用

一切毒藥。凡足以使呼吸系麻痺者。如鴉片嗎啡煎茄精炭養氣煤氣各種安眠藥以及飲食中菌毒宿肉毒等。皆可以陸萬零解救之。

尤以對於因中煤氣毒及其他毒氣毒而死之人。爲最見功效。緣注射陸萬零直接與呼吸系中樞。能使呼吸復振。呼吸既振。自然毒去身安。其功效勝人工呼吸遠矣。

(四)用法及用量

陸萬零係專供救急起死回生之用。故爲製成之注射液。陸萬零每管內含 $O \cdot O \cdot O$ 三瓦。

小孩用一管。皮下注射或肌肉內注射。

成人用二管。可行肌肉內注射及靜脈注射。

每隔數分鐘注射一次。亦可同時注射強心劑。以收心防變救之效。

(五)包裝

陸萬零 (Lobain) 每匣六管。每管一·一西西。每一西西中。含主藥 Lobain $O \cdot O \cdot O$ 三瓦。

菲脫綠地

NATROLYL "HYPOEM"

(一)總論

本劑卽俗所謂清血針也。凡欲圖作砒素療法者。均宜用此。以本劑用途廣。効力宏。毒性弱。在砒素劑中足爲表率也。

(二)性質及形狀

本劑係無色透明。曾經消毒之注射液。反應中性。其主要成分爲加可地爾酸鈉 Sodium Canebylate

菲脫綠地

。質地最爲純粹。絕無絲毫雜質。故砒素之含量最爲準確。其化學的集成。爲 $(CH_3)_2AsO_2Na$ 將其製成強弱兩種劑量。以供普通之應用。(請觀包裝項下。)

(三) 功用

砒素劑之所以見效。其故殆皆由於亞砒酸伊洪或砒酸伊洪。故其流弊乃至毒性太強。惟加可地解酸納乃爲砒素之有機酸中性鹽。並無他種砒化合物之毒性。而有亞砒酸伊洪之治效。故自來爲世推重。而本劑那脫綠地。尤足爲同類製劑中之表率。

本劑注射後。漸次吸收於體內。酸化分解而營亞砒酸伊洪之作用。持長應用時。則使同化作用旺盛。脂肪組織肥厚。皮膚營養佳良。赤血球血色素之新生尤進。同時骨髓部充血甚著明。至呈血赤色。功效靈速。性質和平。毫無不快之副作用。惟本劑堪稱獨步。

(四) 主治

慢性皮膚病中如乾癬。紅苔癬尤宜。頑固濕疹。多發性疣。天疱瘡。白血病。假性白血病。惡性淋巴腺腫。腺腫等。行皮下注射。使症狀迅速減輕。對於瘡疾。宜與規那並用。對於惡性或假面性癩疾及癩刺利亞性瘦削。雖單用且效勝于規那。神經痛各型皆適用。舞踏病神經性嗜思神經衰弱等。有時可得意外之好結果。佝僂病。骨軟化症。范爾霍夫氏紫斑病。放線菌病等。有推獎試用之價值。對於梅毒或肺癆病人之瘦弱。有恢復營養之效。其仕萎黃病。續發性貧血。惡性貧血等。可與番陸地。伊拉血生。錫類爾牛等同用。極易收補血之效。於最短时间内恢復健康。

(五) 用法及用量

普通均爲皮下注射。先用弱劑。後更強劑。此法最爲可恃。每次一西酉。間日或每日注射均可。腺病有時亦用組織內注射法。

(六)包裝

那脫綠地分成兩種劑量如下。

(一)那脫綠地 A 號 (Narodyl "A")

每匣十管。每管一·一西酉。每一西酉中。含主藥加可地爾酸鈉 〇·〇五瓦。

(二)那脫綠地 B 號 (Narodyl "B")

每匣十管。每管一·一西酉。每一西酉中。含主藥 〇·一瓦。

拿伏根 NOVOCAIN "HYPODERM"

拿伏蘭那 NOVORENAL "HYPODERM"

(一)總論

「拿伏根」內含奴佛客因 Novocain。「拿伏蘭那」內含奴佛客因與蘭那 Renal。因其功效極相類似。不過一爲單純。而一爲複劑。後者功能稍爲優勝耳。應用上之合宜與否。悉隨醫者之意。擇其有用者可矣。

(二)性質及形狀

拿伏根 拿伏蘭那

爲外科小手術以及眼・耳・鼻・齒科之局部麻醉藥。吸收甚易。而無毒性。故絕不起局部刺激。排洩頗速。因無積蓄作用。故無中毒之虞。「拿伏爾弱」因有蘭那之合用。其麻醉時間較爲持久。並有止血之效。兩者均係透明消毒液體。極便應用。尤爲臨床醫家不可不備之劑也。

(三) 功效

拿伏根爲近世最普遍應用之局部麻醉藥。因其絕無不快之副作用。故雖用大量。並無妨礙。凡有外科小手術之應用科卡因之處。均可代用。其於婦人小孩以及虛弱病者之手術。更爲相宜。因排洩之易。故麻醉時間較短。且不妨連續注射。絕無中毒之慮。

(四) 主治

一切局部小手術。眼・耳・鼻・齒等科。無不應手。

(五) 用法及用量

皮下注射。得視手術之需用。任意增加之。毫無顧慮。

(六) 包裝

「海普牌」拿伏根 Novocain 每西西內含奴佛客因〇・〇二瓦。每匣十瓶。每瓶一・一西西。

「海普牌」拿伏爾弱 Novoronal 內含二成奴佛客因與十萬倍之蘭那溶液。(2% Novocain in Sol. Arsenalin 1:10000) 每匣十瓶。每瓶一・一西西。

巴巴佛澎 PAPAVERON "HYPOUR"

Containing total Alkaloids of Opium

● 鎮痛獨一 ●

● 鎮靜無副作用 ●

● 止痛優於鴉片 ●

● 止咳適用於各型 ●

● 連用無習慣性 ●

(一) 總論

巴巴佛澎之優點。在善能使大腦灰白質之疼痛感受性麻痺。對於其他中樞神經系之機能。並不生若何變化。能在用藥後數分鐘之內。使疼痛之感受性全失。絕不波及于觸覺或溫覺等。其効力之偉大而普遍。勝于嗎啡。而毒性則較弱。對於下痢。其効勝于阿片。對於不眠症。其原因為疼痛性者。本劑有卓効。

(二) 性質及形狀

巴巴佛澎為黃赤色透明之注射液。其每一西酉中含鴉片之總植物鹽基。(即鴉片中各種擬嗎基之總量。)為〇.〇二瓦。

(三) 功用

巴巴佛澎

巴巴佛澎因含有鴉片中之各種有效成分，植物鹽基。故作用優盛於任何麻醉品，而無其缺點。在用後五分鐘內即見效力。不起惡心，頭暈，便秘，嘔吐，暈眩等之有害副作用。而連續用之又不成習慣性。故以鎮靜，鎮痛，鎮咳，催眠，及止痛之目的而實用者。無不滿意。蓋因其即在少量。能使中樞神經系。對於疼痛之感受性卓卓。然一方與鎮痛作用同時使疲勞，病的不快，煩苦之感消除去。而發生愉快之情。故各不同之原因而在各前邊情形者。則催眠甚易。而說退呼吸中樞之興奮性。即在少量。可以見功。故對各種呼吸困難或興奮性呼吸運動。有鎮靜之效。其時即見呼吸緩慢。增其深度。至其制止腸運動之作用。則與鴉片頗有相似之處。茲不贅述。

(四) 治療範圍

- (一) 凡與寒，刺戟，睡眠障礙等症。各種頑固性疼痛。或各種疾患上之疼痛。如疝痛，潰瘍，虫樣突起炎，癆腫等之疼痛。及火傷，創傷。繃帶交換時之疼痛等。
- (二) 肺結核，氣管支炎，咽喉炎，嗜息，百日咳，呼吸困難，痙攣性呼吸及其他疾病之呼吸刺戟。
- (三) 單純下痢，赤痢，霍亂，傷寒初期，腸出血，腸穿孔，腹膜炎，盲腸炎等。但在急性腸閉塞，鉛毒性疝痛，大便滯閉等。則用巴巴佛澎後。因緩解腸壁之痙攣。反有便通之利。
- (四) 代用各種催眠劑而試用於各種不眠症。

(五) 用法及用量

皮下注射。每日或間日一管，或由使用者之意志處置之。

(六)包裝

每匣十管。每管一，一西西。

柏佛

PAVER "ANTIPAIN"

制止腸道及下腹部疼痛之特效藥

止痛鎮痛優于阿片

(一)總論

柏佛爲制止腸道疼痛及下腹部各種疼痛之聖劑。其止痛之效力。優于阿片。而毒性則遠弱。故爲臨床醫師所常用。良以効力既宏。而絕無害顧慮。爲別種麻醉劑所不可及也。

(二)性質及形狀

柏佛係將鴉片中揮鹽基帕維甯 (Eupaverin) 製成注射液也。其成分有 $(C_{17}H_{17}NO_2 \cdot HCl)$ 之化學記號。係帕維甯之鹽酸鹽。無色澄明。反應中性。決不旁含鴉片中之別種成分。故効力專一。而毒性甚微。

(三)功用

考阿片成分中 各種擬鹽基之毒性。以帕維甯爲最弱。而其鎮痛作用。頗多類似嗎啡之處。而尤以對於腸管知覺神經末梢之作用爲尤著。不啻其疼痛之原因如何。或由于病的發動。或由于機械的刺戟。或由于化學的刺戟。惟帕維甯得以制止之。今本劑柏佛之成分。係化學的純粹鹽酸

柏佛

富待英

六四

帕印維甯。質地既精，含量又準確。故其功效。自與理想中的純品相符合。凡腸道疾患。及下腹部各種疾患之疼痛。惟注射帕印。能即刻止痛。凡在瑪琍所不能奏效之處。亦惟帕印始能奏效。至論其止痛之功用。則對於成人。不如用巴巴佛澎。對於小兒。則奏效往往出于巴巴佛澎之上。且亦宜將其用于小兒。因其毒性最弱也。

(四)主治

一切腸道諸疾病之疼痛。一切下腹部各種疾患之疼痛。及小兒下痢。

(五)用法及用量

皮下注射。每次一管。斟酌病情。一日中得反覆注射數回。小兒用量。減半或一管之三分之一。

(六)包裝

柏佛 (Paven) 每匣十管。每管一，一西西。每一西西中。含主藥帕印維甯 〇・〇二瓦。

富待英 PHODEN "HYPODIN"

(一)總論

本品為鴉片中之副植物鹼嗎啡之甲完鹽 (Methyl ester) 也。名可代英 Codeine。而本劑所用者。乃其磷酸鹽 Codeine phosphate 也。

(二)性質及形狀

本劑係無色之注射液。味苦。反應中性。爲最溫和之麻酔藥，鎮咳藥，鎮痛藥。爲用頗廣。其效用略似嗎啡而無其強烈。

(三) 功效主治

凡可用嗎啡及鴉片諸症。本品俱可代用。而於呼吸管之咳嗽刺激。氣管粘痰加於兒所發之咳嗽。肺癆病之咳嗽。用以鎮咳。其效甚偉。而無便閉之害。其他如下腹部之疼痛、腸疝痛、神經痛、胃痛、不眠、精神亢奮等。均可用之。其餘功效。一如嗎啡。請參看「克陸莫沙」與「阿脫陸漢」項下。

(四) 用法及用量

皮下注射。每次一西西。

(五) 包裝

「海普牌」葛待英 (Pilocain) 每西西內。含磷酸可代英 $O \cdot O \cdot 5$ 瓦。每匣十瓶。每瓶一。一西西。

批羅立 Pilocrin "HYPOURIN"

(一) 總論

本品爲一種植物鹼，乃匹立亭 Pilocin 之誘導體批羅卡品鹽酸鹽 Pilocrin Hydrochloride 是也。極易分解。而失其本有之功用。故不良之製品。尤易分解。而含作波林。與批羅卡品顯然呈反對之作用。不能顯其醫治效用者。惟本品因選製精良。配合得宜。永無以上之弊病。醫者使用

批羅立

。務宜謹慎選購也。

(二) 性質及形狀

批羅立 Irontal 對於種種分泌腺消化器系生殖系等平滑肌中所分佈之副交感神經末梢。僅見輕微之刺激。而不起麻痺。故種種分泌物爲之增加。如發汗流涎之增加。而於發汗爲尤著。故通常用爲發汗劑。本劑透明無色。性質安定。

(三) 功效

本品爲發汗劑及增加吐沫分泌之藥物。用於腎臟炎等之水腫。以排洩身體之水分於體外。用以吸收炎症產物。眼科中因虹彩炎所生之炎症產物。更爲有效。用本品注射於皮下。經數分間。唾液之分泌異常亢進。繼覺顏面溫暖。面皮之血管非常擴張。頸動脈之搏動增加。約經十分間。前額先始發汗。繼起全身皮膚之血管擴張與發汗。「批羅立」與他種發汗劑作用相異。此蓋因刺激分泌神經而發汗也。故此時雖不復被着衣。亦能發汗。分泌之亢進。約連續一時至二時間。其分泌之量。實堪驚駭。唾液至有半立特。出汗至有一至二立特者。用於腎臟炎。不僅使之發汗。減退水腫。且使尿毒亦與汗同時排泄。故可以減去尿毒症。本品如用之過多而發中毒之徵象。得以「蘇拉脫林」解除之。

(四) 主治

腎臟炎水腫尿毒症。以及臨症上需用發汗之處。皆得用本品達其發汗之目的。虹彩炎與眼科上應

用之結膜藥。作爲點眼劑。

(五)用法及用量

皮下注射。每次一西西。眼科上用管用以點眼。

(六)包裝

「海普牌」世羅立 (PHOKID) 每西西內含鹽酸批羅卡品 O·O 一瓦。每匣十瓶。每瓶一，一西西。

百莫陸

POMOLOR "HYPOLE"

(一)總論

本品內含精製之鹽酸阿坡嗎啡 *Apomorphine Hydrochloride*。爲人工的植物鹼。其販賣之製品。多不純淨。內含 *Chloromorphid*。此物極有毒性。對於呼吸中樞，有麻痺作用。務宜謹慎選擇。惟本品質地精良。可免顧慮。

(二)性質及形狀

爲催吐劑。絕無副作用。功效迅速而確實。注射部不起刺激。

(三)功用

本品有特異之作用。授以少量。其唯一之症狀爲嘔吐。此於人類與肉食獸及其他凡能嘔吐之動物

百莫陸

。可以使之必發也，所以然者。以其直接刺激延髓之嘔吐中樞也。故注射於皮下或血管中。其作用之發現。較內服為尤速。凡應用催吐劑。當以本品為第一。注射於皮下。毫不起炎症。奏效又非常迅速。此其優點。凡狂人或自殺等。不肯服吐藥及拒絕洗胃者。用以注射。實為獨一無二不可缺少之良法也。

(四)主治

專為催吐之用。

(五)用法及用量

皮下注射或靜脈注射。

(六)包裝

「海普牌」百莫隆 (Ponolor) 每西酉內含鹽酸阿坡嗎啡 O·O 一瓦。每匣十瓶。每瓶一·一西酉。

歸萍 QUININE HYPOURATE

烏來慶 UREOLIN "HYPOURATE"

(一)總論

此二種製劑。俱係金雞納製品。雖結合各異。而功效實同。故合併說明之。以簡編幅。歸萍 Quinine 內含鹽酸規甯 Quinine Hydrochloride。而烏來慶 Ureolin 內含尿素鹽酸規甯 Quinine

is Urea hydrochloride。每種各製成注射劑二種。請閱包裝項下。

(二)性質及形狀

俱爲各種瘧疾之特效藥、解熱藥。因所含質地之純淨。故無刺激性。而吸收甚易。本品爲注射劑。於治療上更爲便捷。功效確確。得達預期之目的。兩者均爲微綠黃色之透映注射劑。質地稠厚。微顯酸性。注射處不起硬結。尤爲優點。

(三)功用

規常爲各種瘧疾之特效藥。固爲人人所知。其因何作用。而有此顯著之功效。萬試而萬驗。此無他。蓋其對於粘液濁蟲。Plasmodium (設拉斯莫心) 卽瘧疾原蟲。有特殊強大之殺害作用。雖溶至二萬倍之溶液。其殺滅之力。並不稍減。故不論何等重症之瘧。甚至起昏睡者。以本品注射於皮下。或靜脈。立可救急。如瘧發前二三小時。預先注射之。可以制止發作。不獨此也。卽假性瘧疾。如定型性神經痛。偏頭痛等。凡瘧疾性之疾病。皆得以本品撲滅其病原。使之全治。又可除脾臟肥大。神經痛。粘膜炎等之續發症。對於中樞神經系。有減弱知覺中樞之感受性。故能制止風寒。濕痺性之疼痛。及神經痛。

(四)主治

一切瘧疾 日日瘧 間日瘧 瘧疾 產後熱 肺炎 稽留熱 弛張熱 惡性瘧 以及一切熱性病

(五)用法及用量

歸 萍 烏 來 靈

皮下注射。尤適於背部與臀部之肌肉注射。每次一管。必要時可反覆之。一日量以不過一瓦為度。

(六)包裝

「海普牌」歸澤 A 號 Quinim "A." 每西西內含重鹽酸規管〇・二五瓦。每匣十瓶。每瓶一，一西

西。

「海普牌」歸澤 B 號 Quinim "B." 每西西內含重鹽酸規管〇・五瓦。每匣十瓶。每瓶一，一西

西。

「海普牌」烏來慶 A 號 Urechin "A." 每西西內含尿素鹽酸規管〇・二五瓦。每匣十瓶。每瓶一，一西

西。

「海普牌」烏來慶 B 號 Urechin "B." 每西西內含尿素鹽酸規管〇・五瓦。每匣十瓶。每瓶一，一西

西。

蘭那 RENNAL "HYPODERM"

(一)總論

蘭那 Renal 普通市售品，均稱蘇拉乃林 Suprarenin 或阿特來那林 Adrenaline 卽副腎精是也。市售品種頗繁多。品質不一。醫家使用。更無一定之標準。以致功效全不一致。今海普廠特製最精良之副腎液精。配成溶液。再經完善之消毒。而製成注射劑。是以功效異常準確。因不願

與市售品含污。故特立名目。以便醫家識別。因名之爲蘭那 Renal。製成注射劑。分千倍 1:10
與萬倍 1:10000 兩種。

(二)功效

蘭那 Renal 功能強心止血。增進血壓。收束血管。強壯子宮。一切病的或手術的出血。無不需用。所治範圍甚廣。請分別述之。

(三)主治

吐血，腸胃出血，赤痢，傷寒便血，肺出血，產後出血等症。俱係異常危急。用副腎精內服。奏效較慢。不能立致功效。如用海普牌蘭那 Renal 注射於皮下。可以立刻見效異常準確。注射多寡。均隨醫者之意志。依病情而增減也。

氣急，咆哮，呼吸困難，虛脫等症。行靜脈注射，或皮下注射。有強心，止喘，呼吸正常之功。奏效異常神速。

行局部手術前注射蘭那 Renal。可以免除過量之出血。

眼耳鼻喉科等之手術。用之得預防出血之效。

(四)用法

皮下注射。得隨時應用之。必要時行靜脈注射。務宜緩慢格外審慎爲妥。

(五)包裝

「海普牌」蘭那 A 號 Renal "A" 係一比一千之溶液。1:1000 Solution 每匣十瓶。每瓶一·一西。

「海普牌」蘭那 B 號 Renal "B" 係一比十萬之溶液。1:10000 Solution 每匣十瓶。每瓶一·一西。

撒羅賓 SALOPTIN-HYPOHITE

泌尿器及尿道消毒劑

(一) 總論

本劑為專治膀胱炎腎盂炎等之藥劑。凡泌尿器宮之疾患。無論患者之尿。或為鹼性。或為酸性。皆發生充分功力。且以本劑專供注射之用。故絕無損害腸胃之虞。

(二) 性質及形狀

撒羅賓為淡黃色澄明消毒注射液。內含烏魯透品 (Hexamethylentramin) 四十成 (40%)。水楊酸鈉 (Sodium Salicylate) 十六成 (16%) 及水楊酸鈉咖啡精 (Coffein Sodio-Salicylate) 四成 (4%)。曾經嚴重消毒。性質安定。遇高溫不變質。惟與強烈光綫之長時間接觸。應可能的求避免之。

(三) 功用

撒羅賓為最新發明注射用之尿道消毒藥劑。統治泌尿器一切傳染病症。如腎盂膀胱炎之類。(結核性除外) 按向來尿道消毒藥劑者有三大弱點。其一。凡泌尿器發炎時。小便多為鹼性。而該藥

等僅在酸性液中能發生功力。故每見失效。其二。倘該藥能在鹼性液中發生功力者。服藥後即不免大傷腸胃。其三。向來此等藥品皆缺乏利尿作用。不能將腎盂及膀胱中之沙石。及其他汚濁菌類膿液等沖洗出外。故全失消毒殺菌之效用。惟有撒羅賓係用三種名藥化合而成。除具有極強消毒殺菌之功力外。能使尿液變為酸性。且因本藥能供注射之用。可不經腸胃。故毫無損傷腸胃之虞。加以所含之咖啡精。具有極大之利尿作用。故能兼具滲瀉尿道。排除雜質之功力。又凡患腎盂炎或膀胱炎者。小便每溺濁短少。多含細菌。注射撒羅賓後。即可於顯微鏡下證明細菌盡歸消滅。且本品不獨能殺菌。兼能使尿液變性。使其中病菌失去榮養基礎。因之毒性漸減。繁殖漸稀。故消毒作用非常透徹。非常持久。用後莫不效驗立見。本來溺濁之小便。注射後完全澄清。本來鹼性之小便。注射後完全現酸性反應。本來小便中富於細菌者。注射後完全消滅。此外寒熱疼痛以及一切病狀。皆漸次消退。而恢復其康健常態。又按撒羅賓中所含之烏魯透品。具有抵抗傳染病之偉力。其療治血中毒症腸窒扶斯單雙喉蛾以及瘁症等之特效。久為醫界所稱賞。以此烏魯透品在本品中實有兩重功用。次之。本品所含之柳酸鈉亦有兩重作用。即除通過尿道時發生殺菌功用外。在血中亦有極強之內消毒力。此外咖啡精利尿力極強。有沖洗泌尿器之妙用。凡沙石渣滓停滯于腎盂輸尿管及膀胱中者。皆極易排出。總此觀之。撒羅賓實為泌尿器消毒劑之最完備者。誠不愧為腎臟之聖藥也。

(四) 主治

一切尿道傳染病症。如腎盂炎 Pyelitis 腎盂腎管炎 Pyelonephritis 膀胱炎 妊娠腎盂炎 因攝護腺肥

撒羅賓

大而生之慢性膀胱炎預防攝除後膀胱炎。凡由葡萄球菌菌釀成之腎盂炎膀胱炎等症。以本品爲小便消毒劑。尤爲佳妙。本品治急性攝除膀胱炎。退熱消腫清尿等功效。非常靈速。治男子後尿管急慢性白濁。亦非常靈效。兼能排除女子尿道之沙石。手術後小便閉塞。用撒羅賓利尿。神效異常。又能治肝臟及膽道各種炎症如黃疸之類。靈驗異常。

(五) 用法及用量

撒羅賓專供靜脈注射。每日或間日注射一管。(即五西酉。)直至尿液澄明及現酸性反應爲止。絕無副作用。如治療尿道白濁。應每日注射一次。每次一管。凡在手術後欲求預防小便閉塞。可于手術後之當晚。注射一二管則必通暢。小兒每次用一西酉至半管。每日或間日注射一次。

(六) 包裝

每匣五管。每管五西酉。每管中含烏魯透品二瓦(2 Gm.)。水楊酸鈉 〇・八瓦。(0.8 Gm.) 水楊酸鈉咖啡精 〇・二瓦(0.2 Gm.)。

撒沃 碘 SAJODYL "HYPODYL"

最新改良水楊酸製劑

痛風・關節炎之特效藥

(一) 總論

本劑係最新發明。專治痛風及關節炎等。其止痛消炎祛風退腫之效。益華偉大。迅速異常。其尤妙者。入身以後。極爲安全。絕無從前水楊酸劑之副作用。尚痛風之聖劑也。

(二) 性質及形狀

撒沃碘。係以水楊酸鈉及碘化鈉之複合體製成。曾經嚴密消毒。專供注射之用。反應中性。無色透明。縱久貯決不起變化。因其所用原料純淨。故效力靈速確實。而無副作用。

(三) 功用

夫水楊酸裂劑之爲瘡風良藥。而碘劑之爲變質。消炎。促進吸收之聖劑。自來應用已久。其功效之偉大。亦早爲醫界習知。但從前專供內服之用。且絕少兩者合用之時。其缺點爲效力單薄。非重劑不可。而內服之易生碘素中毒症。及水楊酸劑之敗胃。又均爲醫者病家兩方面所忌。往往治療期未終。早經副作用之故。逼迫停藥。其例殊不在少數。今撒沃碘合兩者之長于一劑之中。而又用于注射。論功效。則以小劑而顯神驗。爲時之速。迥不可與內服相比。論作用。則盡關藥特之所長。絕無須顧慮副作用之發生。故其鎮痛。解熱。消炎。退腫。促進吸收等之大作用。皆理別加強。決非單劑所能望其項背。一經試用。必有驚其效力之有異於尋常者在也。

(四) 主治

急性關節痛風 慢性及亞急性關節痛風 僵麻質斯 僵麻質斯性腎臟炎 僵麻質斯性急性扁桃腺炎之有關節痛者 尿酸性關節炎 副等九炎 淋毒性關節炎 神經痛 漿液性肋膜炎 甲狀腺肥大症 各種渗出性疾病 肺炎及氣管支疾患 神經性氣喘 動脈瘤心臟之纖維性及脂肪性變性血管灰硬 伴發心症之冠狀動脈硬化 梅毒及梅毒性神經痛 放線菌病 乾癬 催進鉛汞等慢性中毒之排泄等等

撒沃碘

斯可拉米

七六

又膽石症 加等兒性黃疸 破傷風 腦脊髓膜炎等亦可用 用于糖尿病身使其搔痒，煩渴，多尿等症狀輕化

(五)用法及用量

靜脈注射，每次一管。每禮拜注射二次。

(六)包裝

每匣五管。每管二十四西(2cc.)，內含碘化鈉(Sodium Iodide)及水楊酸鈉(Sodium Salicylate)各一瓦。

斯可拉米 SCOLAMID · HYPOHEIN

中樞神經之鎮靜劑

精神病之對症良藥

(一)總說

茄科植物如莨菪、莨菪鹼等，皆號為毒物，然其中所含植物鹼鹼質。若阿刀便(Atropin)與莨菪精(Scopolamin)等，均廣供醫藥之用。效驗頗宏，為世所重。本劑斯可拉米，係由莨菪精製成。其散大瞳孔之作用。與阿刀便(Atropin)及非沃斯精(Hyoscyamin)相同，由其特色。乃在對於中樞神經之鎮靜作用。縱以小量，已見偉効。而其鎮靜之狀態。並不與催眠藥相同。故當精神病者之興奮期。最宜于用本劑。惟若用量過多。則因其毒性極猛。應時時注意及之。

(二)性質及形狀

斯可拉米味苦而奇辣。無色透明。反應弱酸性，原料精純。不含雜質。故効力最偉。

(三) 功用

斯可拉米對於末梢神經之作用。雖與蘇拉脫林相似。但其特異之點。乃在對於中樞神經之作用。蓋有一定之腦髓機能被其麻痺也。此現象發顯迅速。即以本劑一管注射之後。骨顯安靜狀態。次示睡眠。然其作用實不與催眠藥相同。即識官刺激之知覺機能麻痺較後。而運動中樞之興奮性則先減。故如遇運動不安之病人。注射本劑。立即現著明之鎮靜作用。筋肉弛緩。喉帶弛緩。呼吸喘鳴。發音運動亦受障礙。終至任人搬動而不能自主。但其意識並不至于全消失。視官等之知覺亦尚存。然至最後入于睡眠。則同時往往發幻覺言語。或發散瞻調節麻痺。及口腔咽喉等之乾燥等現象。

(四) 主治

一切運動不安之症。最適于震顫麻痺 酒客震顫 多發性腦脊髓硬化症之震顫 運動亢進 精神病之發揚期 亦可作瞳孔散大藥

(五) 用法及用量

皮下注射。每次一管。必要時可反覆之。一日之極量為三管。用其毒性極猛。故宜最初即加之以注意焉。作散劑之用者。破管滴點之。其效比之蘇拉脫林發顯速。消退亦速。

(六) 包裝

每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含溴酸莖菪精 (Scopolamine hydrobromide) 〇·〇〇〇五瓦。

斯可拉米

斯苦立飛 SCOLAPHTIN "HYPODLE"

特種之鎮痛鎮靜良藥也

(一) 總論

本品爲克陸莫沙(Chloro-oil)與溴酸苄基精(Benzylamine Hydrobromide)之合劑。故不但並顯兩藥之功。抑且又呈特殊之効。凡用他藥而不能收鎮痛鎮靜之効者。允宜注射此斯苦立飛一針也。

(二) 性質及形狀

爲無色透明澄清之注射液。略顯弱酸性反應。

(三) 功用

請參觀前節斯可拉米條下。本劑効力雖大。毒性並不猛烈。故較爲安全。

(四) 主治

最適用之病症。如神經性運動不安，震顫麻痺，酒客震顫，多發性腦脊髓硬化症之戰抖。又當用局所麻醉行手術時。先注射本劑。則使病人意志恍惚。更無痛苦。當行吸入麻醉之前。注射本劑。則可免各種之危險。如氣道分泌限制。迷走神經反射麻痺。及縮短發揚期。且可減少吸入麻醉藥之量。其在產婦。則用此注射。可得無痛的分娩。

(五) 用法及用量

皮下注射。通常每次一管。每管一西西。手術前注射者。宜在兩小時及一小時以前之期間各注射一針。必要時。在三十分鐘前不妨更注射一管。

(六)包裝

每匣十管。每管一。一西酉。每 西酉中。含鹽酸瑪啡 (Morphin hydrochloride) O, O 一瓦及沒
酸莫替精 (Scopolamin hydrobromide) O, O C O 三瓦。

山可丁 SECORPIN "HYPODITE"

最良之麥角劑 產婦科之要藥 有效成分精純而含量一定故效力偉大確實永久不變

(一)總論

本品爲麥角之有效成分。係採取新鮮之麥角製成之麥角精 Ergonin 是也。因製法精良。檢定嚴重。故所含有效成分。即對於治療生作用之植物擬鹼質。其含量乃一定。且永不變性。絕少刺激性。功效確實。爲麥角之最佳製品。爲應用最廣之子宮收縮藥及止血劑。故尤適用於產婦科。對於子宮之緊縮與止血之功能。具有特異之作用。決不似麥角生藥或他種効力未經檢定者之治效難測也。

(二)性質及形狀

本劑爲暗赤色注射液。內含麥角之惟一有效成分偏多。注射玻璃管若未經開口。決無變質之虞。其効力最能持久。

(三)功用

收縮子宮以及收縮子宮之血管。使子宮內之血液壓出。故用於月經過多。及種種子宮出血。用於

山可丁

慢性子宮質發炎。以去其炎性。又能促炎性產物之吸收。又可以用於子宮肌腫。不特能止出血。又有收縮子宮之效。因起貧血以妨害肌腫之營養。肌腫發育有因之中止者。而於產出後之後產期。則本品之應用最大。如子宮弛緩無力，子宮出血，胎盤面出血用之。可以喚起子宮之收縮。一則可以止血。一則可以促子宮之復舊也。

(四)主治

肺，胃，腸，子宮之出血。而對於子宮尤俱特效。在生產際出期，因陣痛微弱。常可使用。後產期及分娩後子宮無力，有收縮子宮及止血之效。子宮出血，及筋腫，慢性子宮質發炎，赤痢，腸加答兒，動靜脈瘤，尿崩症等，亦頗有相當之效果。不負試用之價值。

(五)用法及用量

皮下注射。或腎筋注射。每次一管至二管。

(六)包裝

「海甘牌」山可丁每匣十管。每管一·一西西。每一西四中。合精純麥角精(Meserin) C, O一瓦。

錫類爾生 SERRARON "LYPOLLE"

補腦·補血，強身聖劑

統治諸虛百損

功力靈速 毫無流弊

(一)總論

錫類爾生。為補血，治癆，補血，穩質之良藥。係最新發明。統治諸虛百損及病後調理之用。扶

本，固元，補髓，益氣。無絲毫刺激性與副作用。洵當今最佳之砒，鐵強壯劑也。

(二) 性質及形狀

本品乃有機性砒，鐵與士的年之複合體。非特兼有是三劑之治效。且益加強焉。溶液之色淡黃。反應中性。其每一西西中。鐵之含量，等於C，C〇五瓦。亞砒酸之含量，等於O，C〇四瓦。士的年之含量，則為O，C〇一瓦。

(三) 功用

夫砒劑本為神經系及旺盛新陳代謝機能之要素。而鐵則為補血專劑。近已婦人皆知。自來內服者。功力不准。且往往傷害消化器官。致令病家未受其益。先見其害。故惟注射。始無流弊。

本劑錫類爾生。所含砒鐵，均為有機狀態。故入身極易吸收。完全同化。而注射處又無刺激。原為療治諸虛百損及病後調理之聖藥。更兼加入強心健腦藥士的年。其作用遂相得益彰。其功效之發顯。乃益復加強而速。緣夫病人之心理作用。對於治療方面之影響。本來甚大。如砒鐵之各個單純劑其效在用藥後。發現甚緩。病人往往當初受治療。常抱滿腔慾望。及經若干時間而未睹其效者。遂喪失望與灰心。治療因之益難見功。其實時期未到。藥效未達耳。嗚本劑錫類爾生。則功用迅速。數針見效。每能令病人自覺藥力之勃生。色然以喜。精神上先受愉快。則其日身滋潤力之進步亦愈速。而愈使功效之發顯益復偉大而完備耳。

(四) 主治

(一) 內病 肺癆 貧血 萎黃 白血病 內傷虛損 先天不足 營養不良 病後失調 癆瘵脫形

錫類爾生

虛弱消瘦 陰疽寒疾 惡性瘧疾 劇痛人氣鬱 肝陽旺盛 經期不調及經淨後各種疾患

(2) 神經病 腦力不足 神經衰弱 怔忡健忘 頭暈心悸 小兒驚風 偏正頭風 梅毒瘰癧風痺

抖顫 舞踏 癩瘡等症

(3) 外病 淋尿管瘤 肉瘤 關節炎神經創傷等症

(4) 皮膚病 魚鱗瘡 紅苔瘡 狼瘡 以及各種頑瘡惡毒種種慢性皮膚病

(五) 用法及用量

每二日注射一管。即一西西。皮下或肌肉內注射均可。二十針後。休藥十日。再行一週。

(六) 包裝

每匣十管。每管一·一西西。

斯巴蘇爾 SPARSCEL "HYPODIE"

異軍突起之強心劑 心筋疾患之良藥

(一) 總論

斯巴蘇爾之強心作用。妙在不與毛地黃(Digitalis)劑及類番斯(Strophantus)劑相同，有時是二劑所不能奏效者。用斯巴蘇爾則奇效立見。且以兼有利尿作用。故用治水腫等症。亦易于收效。誠有一舉兩得之妙也。

(二) 性質及形狀

本劑係用硫酸斯巴太因(Sparteïn Sulphate)製成。曾經嚴密消毒。係無色透明之注射劑。反應弱酸性。

(三)功用

強心劑之必要條件。正面言之。須其效驗迅速確實。反面言之。須無副作用。蓋非然則其效未竟。而其害先見也。故自來使用強心劑。往往勤更換。正慮其副作用也。而尤以凡植物製劑如浸劑酞劑等爲尤甚。蓋以成分複雜。含量不一。缺陷自多也。

本劑係由蝴蝶花科植物 *Spartium Scoparium* L. 之主要植物鹽基製成。此鹽基即斯巴太因是。其硫酸鹽有 $C_{14}H_{17}N_2O_4S_2$ 之化學記號。絕對純粹。決不旁含別種成分與無機雜質。故効力偉大而又確實。乃必然之勢也。

其尤妙者。乃其作用並不與毛地黃等劑相同。更能使血管收縮。而對於病的心臟。若明使其機能充進。故頃刻能使脈搏改整。血壓上騰。而無積密之患。凡用毛地黃劑胡番斯劑時。其効難見者。更用本劑。有時往往立見奇效。且其利尿作用。亦頗優越。故又適于用作腹水腫脹等之利尿藥。更有進者。則爲其對於心筋疾患。蓋其疾若用他種強心劑。殆全無効驗。惟有本劑適用之也。

(四)主治

請參觀嘉模(Kamo)及其地富隆(Gidrynton)項下一切心臟疾患 心筋疾患 心臟內膜炎 心悸怔忡 搖擗 心動過速 心跳失序 水腫 腹脹等症

(五)用法及用量

斯巴蘇爾

士的納 士的發

八四

皮下注射。每次一針。適應病情。一日中得反復注射之。

(六)包裝

每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含主藥硫酸斯巴太因(Spartein Sulphate) 0·01瓦。

士的納 STYFAP "HYPODIA"

士的發 STYFAP "HYPODIA"

(一)總論

本品爲番木甙(即馬前子)之主要植物礫士的年(Strychnin)是也。士的納所含爲硝酸士的年(Strychnine nitrate)。而士的發所含爲硫酸士的年(Strychnine sulphate)。各隨醫者之習用。任擇之可也。均爲最廣泛應用之興奮藥與強壯藥。

(二)性質及形狀

本品均爲無色透明之注射劑。反應中性。

(三)功用

本劑在中樞神經系爲興奮。與增加其感受性。而尤甚者爲脊髓。及腦之反射機能亢進。次於延髓。起脈管運動中樞。及心動抑制中樞之興奮。因見血壓增昇。及脈搏遲緩。末梢神經與知覺神經亦受影響。固有觸覺亢進。嗅覺敏銳。視覺增加其能力。在消化器用小量則促進消化。增加唾液

分泌。對於延髓之呼吸中樞。用微量能增進其興奮作用。凡因抱水克羅拉耳鳴與酒精之麻醉以致被却呼吸中樞之興奮者。得利用此藥使之亢進呼吸與血管中樞。又有增強視覺之作用。故於黑內障弱視。注射本品。於眼之附近。效力甚為顯著。所以起此作用者。蓋腦中光覺中樞之興奮性為之增強。此外又能由接亢進網膜之對光的興奮性故也。

(四) 主治

虛脫症。急性熱性病，腹膜炎，脈搏呼吸微弱，顏色蒼白意識瀉濁，以至失神，創傷，或神經幹損傷時之昏曠，知覺喪失，黑內障，弱視各種疾病經過中之衰弱狀態。與營養不良，貧血等。

(五) 用法及用量

皮下注射，一日一管至五管。斟酌病態。得一頓注射或反覆之。

(六) 包裝

「海普牌」士的納。每西西內含硝酸士的年〇，〇〇一瓦。每匣十瓶。每瓶一。一西西。
「海普牌」士的發。每西西內含硫酸士的年〇，〇〇一瓦。每匣十瓶。每瓶一。一西西。

試則必靈 *SEYPPIN "HYPOURIN"*

痛經之特效藥

鎮痛，鎮痛之力確實可恃

止血之功應手奏效

(一) 總論

本品係止血藥。鎮痛藥及止痛藥。故應用之範圍殊廣。尤其對於，痛經。月經困難。子宮出血。

試則必靈

貼出血等。最為特效。其收縮子宮之作用亦強。故產後欲固子宮位置速行復原者。亦惟有用本劑。凡為產婦人科醫師者。允宜常備此品于藥囊中焉。

(二) 性質及形狀

試則必靈為淡黃色之注射液。反應中性。係鹽酸鹽他而寧 (Oclarine hydrochloride) 之十成溶液。有 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ 之化學配號。其他而皆本為鴉片鹽基而古丁 (Narcotin) 之誘導體。故其鎮痛鎮痙之作用。頗有似于那而古丁。但性則空無。効力則更強盛。且兼有著明之止血作用。故其治療範圍乃更廣。

(三) 功用

試則必靈之止血作用。對於胎反子宮最為著明。鎮痙鎮痛。則頗有似于那而古丁。而優良過之。妙在注入人體後。不生蓄積作用。故藥效隨時可見。而又決不成習慣性。于治療前途。決無容顧慮。收縮血管作用強大而持久。鎮痛不牛副作用。故在產婦人科實為妙劑。其連帶所顯作用之影響。概能明示吾人以消炎鎮靜之効。其優于金印草精者。為應用廣汎而見效確實。

(四) 主治

痛經 月經不調 經水過多 月經困難 產後子宮回復不全 子宮弛緩 子宮出血 膀胱出血
貼出血 以及其他產婦科病症

(五) 用法及用量

皮下注射。每次一管。必要時得反覆之。一日以注射至二管為度。

(六)包裝

每匣十管，每管一·一西西。每 西西中，含鹽酸蘇拉脫林，〇·一瓦。

蘇拉脫林 SULAFRIN "HYPODERM"

(一)總論

本品內含硫酸阿刀賓 (Atropine sulfate) 爲最精淨之製品。遠非其他阿刀賓所可企及。作制汗藥。鎮瀉藥。其在眼科爲散瞳藥。應用廣泛，惟須改用點滴法。對於便秘。腸蠕蠕。先注射而後下藥。効果確實。

(二)性質及形狀

本劑係無色透明之注射液。

(三)功用

蘇拉脫林有特殊作用。一則犯中樞神經系。一則作用於末梢之臟器。於中樞神經系。初則興奮。繼以麻痺。然於末梢臟器。則始即麻痺。是其概要。對於腸之蠕動。有麻痺腸壁迷走神經末梢之效。故能制止腸之蠕動。凡平滑肌之臟器。如胃脾膀胱子宮之平滑性收縮。有麻痺平滑肌纖維速動神經末梢。得以制止其蠕蠕。於肺臟絲，氣管，支氣管之疾患，如咳嗽喘息等，得以弛緩之。又極有減少各腺之分泌機能。如腺液胆汁之減退。結核患者之盜汗。唾沫之分泌旺盛。乳汁過多。用以皮下注射。以遏止過量之分泌。對於中樞神經系。得作爲興奮劑。如神經病，精神病，嗎啡中毒等之一般腦之麻痺狀態。皆可用之。

蘇拉脫林

(四)主治

時疫及虛弱患者之盜汗，神經痛，空曠痛，流涎，神經性喘息，麻痺期心臟靜止之預防，瑪菲中毒，頑固便秘，疼痛性胃腸炎，膽石痛，酒客諸妄症，及比魯喀爾賓中毒，非莎斯靈可明中毒等症。其在一切眼疾，可作點眼料用。

(五)用法及用量

皮下注射。每次一管，或假管作點眼料。

(六)包裝

「海普牌」蘇拉脫林每西丙含硫酸阿刀賓 C·O·O 一瓦。每匣十瓶。每瓶一·一西丙。

脫畢悉靈 TROGEMIN HYPODERM

血管擴張藥

解除血管痙攣

專治狹心症

功效最迅速

一經注射即止神痛

(一)總論

凡血管痙攣或收縮過甚者。則生種種之苦痛。世最著者。為心痛頭痛。其症發作危急時。往往使病者轉輾反側。坐臥若非。面無人色。痛不欲生。見之慘然。此時惟一之救急方法。惟有止痛。欲求止痛。惟有使血管擴張解除其痙攣或收縮之程度。則自然痛止神清矣。然此等症狀。尚屬于局部。若其發于全身者如各種中毒時所見者。則病者每人事不知。血液或灌注于心腔。致陷心臟於機能不全。漸至循環系全壞。而流于致命。其危險甚。則此時之血管擴張藥。當用尤佳。蓋血

管非純增大。則不防兩臟之血不能澆流于全身也。

血管擴大藥。自來推而亞硝酸化合物。此因亞硝酸化合物能與血管運動中樞相作用。而使之麻痺。故全身之血管遂擴張。吾人可於其血壓下降。脈搏頻數也而證實之。本藥時常發靈。就其化學構造上言之。雖為硝酸甘油化合物。然一經入身。吸收後。還元生成亞硝酸。然後始呈其作用。故効力最強而最能持久。實為各種血管擴大藥中之最優良者。治心電病半頭痛等。其効如神。

(二)性質及形狀

本品為硝基甘油 (Nitroglycerin) 之水溶液。無色澄明。反應中性。味微甘。嗅之無異氣。

(三)功用

本品雖為硝酸甘油之化合物。然其入于人體之步。其既吸收也。由還元作用。生成亞硝酸。乃開始發揮其作用。故就其生理上之作用言之。實同于亞硝酸阿米爾 (Amylin Nitrosin) 及亞硝酸鈉 (Natrium Nitrosin)。惟脫羥素靈則吸收可速。並雖亞硝酸之發生亦早。故其効易于發現。且其作用稍強。而持續之時間又長。故收効最確。無論病的遠近。屬于全身或屬于一部。或出于中樞性。或出于末梢性。惟用脫羥素靈。立刻可以救濟之。因其迅速作用于血管運動中樞。而隨即便之麻痺。於是空靈作用。失其主宰。故病的血管遂得規復正常循環。而現擴大之狀。但觀血壓下降。脈搏次數增加。殆在注射後數秒鐘間。即可見之。他若顏面潮紅。自覺溫熱。及頸動脈大搏動。均在在可以證其擴大之程度。非特此也。即腦膜及腦管內之血管。亦受幾許擴大。要之。其功效之強大與迅速。實足令人詭奇。故當危急存亡之際。洵所謂一針救命也。

但如全身血管之硬化程度已經甚高者。此時所發之狹心症。因其冠狀血管硬化。慮有招致腦出血之虞。用本劑宜審慎。就經驗上言之。不如先用「啡苗」(Cafeyn)以試之。如其狹心症之原因。爲冠狀血管阻塞者。仍以速用本劑爲妙。

本劑之副作用。在亞硝酸劑中爲最弱。幾于從不發見。故毫無危險。即或誤用大量。致生惡心嘔吐。甚至幾于失神厥脫者。概爲一過性。僅須令其呼吸新鮮空氣。瞬時即可復原。若爲慎重起見。不妨注射陸萬容 (Lobelin) 一次。但在規定劑量之範圍中用之。無論如何。決無此等副作用現象發生也。

(四)主治

各種血管症 心胸絞窄痛 神經痛 偏頭痛 船暈 癩癩 喘息 冠狀血管阻塞 急性疹 心臟
癱瘓症 土的年中毒 高根中毒 鉛毒性痛痛 尿毒症

(五)用法及用量

皮下注射。發作時注射一管。必要時一日得用二次。

(六)包裝

每匣十管。每管一·一西西。每一西西中。含硝基甘油 (Nitroglycerin $C_3H_5(NO_2)_3O$ 、〇〇〇五瓦。裝入黃色注射玻璃管中。應常避光線貯藏之。并勿置于熱度過高之處。

脫陸芳 TROPILAN "TYPOLINE"

(一) 總論

本品爲斯第落方斯子之有效成分。卽斯第落方精(Strophanthin)是也。乃白色結晶之粉末。而製成之注射劑也。

(二) 性質

爲奏效迅速之強心藥。用於急性性心臟衰弱。與他林古立同等之地位。其功效之速。奏效之驗。有過之無不及。

(三) 功效

本品作用於心臟肌肉。增大其收縮力。使脈搏徐緩。血壓昇騰。然同時狹窄末梢血管者少。又增加其抵抗力。其他由此心臟之作用。而奏利尿之效。又於中樞神經系似有直接之鎮靜作用。故犯胃腸粘膜。實較他林劑爲少。且不致積蓄作用。

(四) 主治

心臟衰弱，心臟瓣膜障害，肺氣腫，腎臟炎，並其繼發之水腫，呼吸困難等，其效多迅速而確實，於心臟衰弱之呼吸困難，減呼吸之數及深度，以之注射，片時即皆退消，水腫則隨利尿而消失，其作用不如他他利斯之強烈，於急性病之心臟衰弱，及老年人之肺炎，尤爲有效。

(五) 用法

皮下注射。每次一西西。

(六) 包裝

「海普牌」脫降芳每西內含斯篤落方精 (Strophantidin) C, C C C 五瓦。每匣十瓶。每瓶一。一西西。

烏來慶 URECHIN "HYPOURIN"

見歸譯 (Quibin) 條。

維多命 WITKRAMIN "HYPOURIN"

補腦 補血 健胃 滋陰 變質

健康幼羊之青春腺製品

有機性氫鎂化合物製劑

內分泌腺體之聖品

刺激療法之新成功

功效優越

遠勝一切人造品及用浸液稀釋之單純劑

(一) 總論

夫刺激療法之在今日。羣知其在治療學上占有重要之地位矣。故蛋白質製劑乳製劑。以及類脂肪製劑等。均經學者倡導。以圖喚起人體中本來之抵抗力。而加以發揮強大之。其如臟器製劑中之圖增加或刺激內分泌作用。以振作一種官能或全身之強壯狀態者。亦為世人所知。學者之研究。亦至今未衰。日益精進。此維多命者。即為用藥丸內分泌腺體中之精質。加以精製。去其蕪雜。再加以化學藥品而製成。故其效力乃更偉大。持此以視其他同類製品。其精和良窳。乃真不可同日而語矣。

考藥丸精質之成分中。其主要者。厥為賜保命。(Shemin C₁₂H₁₇N) 其性屬鹽基。故可與酸類相

結合。其對於人體。能防止學丸萎縮。能增強其內分泌。能制止老衰。能恢復體力與智力。能抵抗疾病之侵襲。功效之餘大。令人可驚。故當初巴黎大學教授醫學博士勃朗等丸特 (Prof. Dr. Brown Sequard)。即本此為理想。而盛唱賜保命藥而之法 (Serravallo's therapy)。如其時出製法未精。事實上其効難達。故漸失信仰。一時不復為世所重。

嗣後。再經普爾博士 (Prof. Dr. Poell) 之引用。加以改良。於是賜保命藥法之說再興。其用漸廣。然當時之製法。仍僅達于製成學丸投資。而不能將賜保命液離。因之其効力仍極薄。非久用大量。不見其功。此其故。由于學丸稍質中。其所含成分。除賜保命外。尚有 *Oestrin*, *Yeastin*, *Testin*, *Yastidin*, *Teston* 及 *Hawley Tympu* 等質。此等物質。其効與賜保命懸殊。其在生物體中。殆所以供調節之用。一旦供諸藥用。非特無益。且反足以減損賜保命之効。當時學者。卒知其故。而無法使此等成分與賜保命相分離。賜保命之用途。仍令人懷疑。直至于今。所謂賜保命者。均製成投資為止。而仍含有 *Oestrin* 等無益之成分也。

惟本劑維多命中所用之賜保命 (*Serravallo's*)。係賜保命之單純結晶。將其製成鹽酸鹽而用之。維多命中。決無 *Oestrin* 等存在。故其効獨偉。而真能將勃朗雪瓦氏之理想見諸事實者也。

(二) 性質及形狀

維多命為黃色澄明之注射液。其中所用賜保命之製造。及與 *Oestrin* 等雜質分離之手續。極為嚴重。必由富有經驗之藥師與化學師執行及鑑定之。至製成維多命後。其純固學的檢查。則由專門

細菌學家任之。故用維多命絕對能實現其效驗。而又絕對穩妥。其每一西面中。含有各種成分及重量如下。

鹽酸膽保命結晶	Spermin hydrochlor. Cryst.	$C_5H_{14}N_4 \cdot HCl$	0, 0, 11瓦
有機性檸檬酸砒鐵	Iron Arsenite Fe ₂ (AsO ₄ C ₂ H ₃ OH) ₂ (COONH ₄) ₂ + 6H ₂ O		0, 0, 11瓦
硝酸士當年	Strychnine nitrate	$C_{21}H_{22}N_2O_7 \cdot HNO_3$	0, 0, 011瓦
鹽酸古列那	Corynan. hydrochlor.	$C_{12}H_{16}N_2O_4 \cdot HCl$	0, 0, 035瓦

(三) 功用

由上述四種主要成份觀之。「膽保命」為青春腺中之主要成份。功能使白血球增殖。血液增進濃度。組織內之養化作用充進。增補牛殖腺內之分泌物質。振作全身新陳代謝機能。已久為世人所知。而「有機性檸檬酸砒鐵」者。因其砒與鐵皆在有機狀態。故絕無砒之毒害。而應用微量。因吸收完全。故凡組織細胞內因病的現象而致異化同化兩作用。不為正常時。極易恢復適當之轉機。故能使脂肪組織厚。皮膚之營養佳良。同時因含有「有機狀態鐵質」之故。赤血球與血色素之新牛力。益著明增進。夫鐵鹽知之補血功能。早為事實。然大都氣味惡劣。刺激力甚強。內服則傷胃。而不能完全吸收。注射則劇痛。而令人生畏。惟本劑所含之鐵。其量雖少。對於粘膜上。絕無刺激作用。又因其為有機體。故吸收迅速。同時與砒顯其卓越之功用。並無絲毫排洩於體外。蓋其儘量吸收而儘量同化也。若「士當年」之性質。已久為醫界所知。毋庸贅述。不過在是劑。其與新健胃之作用。將更著明。而與砒鐵收相得益彰之功。「古列那」者。略能刺激腰髓神經。用之其目

的在補助照保命及士的年之作用。使能發覺盡致耳。綜觀上述四種。各有特殊之功能。因混合使用。得其相輔互助之作用。其效力益為偉大矣。是藥各種劑量之配合。均幾經研究。再加以實驗。方臻盡善。故其效力乃遠勝於其他任何各藥。單純劑。一經試用便知非虛。要其所以能如此者。全基於所用照保命係單獨析離之純粹結晶。既非如法質浸出液之含量稀少。成分不定。故其治療之效驗。始終不變也。

(四)主治

維多命之應用範圍極廣。功效偉大。所治病症甚多。茲分別述之如下

(內症)

貧血，萎黃病，白血病，假性白血病，內傷虛損，營養不良，全身衰弱，顏色蒼白，失神創傷，病後失調，新陳代謝異常，佝僂病，軟骨症，梅毒及肺癆病之消瘦，氣促，虛脫，瘧疾（其在急性假面性或病後瘦削尤為合宜）急性熱病，腦病，惡性淋巴腺腫，慢性下痢，易感疲勞，心臟衰弱，酒精萎靡，健忘，失眠，耳聾頭重，聽覺

(神經系統患)

腦力虧損，神經痛，頭痛，腦弱，精神萎靡，健忘，失眠，耳聾頭重，聽覺錯誤，神經過敏，心悸，怔忡，偏正頭風，記憶力薄弱，神經性喘息，舞蹈病等

(性病)

陰萎，早泄，性慾缺乏，勃起力減退，老衰，發育不全，遺精，夢遺，陽萎不舉，陰虛宮冷，經痛，月經不調等

(皮膚病)

乾癬，紅苔癬，濕疹，魚鱗癬，紫斑病，慢性皮膚病，以及一切皮膚病疾患。

維多命之應用範圍極廣，難以殫述。以上不過舉其大要。蓋在使用者之得心應手。善為利用耳。

(五)用法及用量

皮下注射。任何部分均可。絕無痛覺。縱因各人之感受性不同。或有稍覺刺痛者亦瞬時即消。如行肌肉注射。亦得同樣之效果。當更為穩妥。每次注射一管。每日或隔日。注射一次。注射器宜行煮沸消毒。切勿簡用酒精抽插於注射管。以代消毒。因維多命遇酒精。即起沉澱作用也。務請注意。

(六)包裝

每匣十管。每管一，一西西。即 1 c.c.。

(七)禁忌

並無禁忌。無論老幼男女。均可注射。惟在泌尿器發急性炎症者。宜暫顯慮之。

育勃謨

YOBIMUR "TYPPOLIN"

腰髓勃起中樞之興奮劑

陰虛陽萎之補藥

(一)總論

本劑善於排除腰髓機能之障礙。振作勃起中樞之興奮性。故功能壯陽道。健筋力。兼能固精種子。功力之發顯迅速確實。而持續之時間又長。故為固本壯陽惟一之妙劑。

(二)性質及形狀

本劑之成分。為鹽酸育勃賓 (Yohimbine hydrochloride)。係一種透明無色之注射劑。原料純粹。

含量準確。故功力最大。

(三) 功用

育亨賓。乃存于育亨賓樹皮中的一種植物鹽基。育亨賓樹皮。自古以來。其在非洲。已早為其土人所知。用作壯陽藥。其功效之信而有徵。由來已久。惟是樹皮之為物。其効力之大小。殊難捉摸。此因關於產地之不同。樹木之老幼。貯藏之久暫。以及育亨賓含量之多寡。均與所期功用發生絕大影響。蓋育亨賓樹皮中。除主要成分育亨賓 (Yohimbine) 之外。尚含育亨賓甙 (Yohimbine) 鞣酸。膠質等各種雜質成分。其於治療上之作用。毫無所益。故凡用育亨賓皮。育亨賓浸質或育亨賓甙等所製成之藥。其功用均不十分可恃。因其効力無標準也。本劑自勃護。係用精製育亨賓所成。質地既絕對精純。含量又十分充足。故其効力劃一標準。最為可恃。

凡陰萎。及糖尿病或酒精中毒等症經過中所生之性慾不振症。或由神經性。如因腰髓機能障礙。而致勃起中樞之興奮性減退。難行房事者。育勃護自奏確效。雖其微量。能與勃起中樞相作用。而允進其機能。又使海綿體充血。故治官能的陰萎。最為有效。其藥効之持長。可以達兩月之久。而其尤妙者。則雖連續用之。不生副作用。故其固本壯陽之功。能使人黍谷回春。而獲強身種子之益也。

(四) 主治

情慾不振 無論生理的 或心理的皆可治 陽痿不舉 舉而不久 精冷早洩 精神憊倦 怔忡心悸 手淫過度 腰酸脚軟 小殖器發育不全 酒色虧耗 精竭不固 見色即洩 無夢自遺 一切

育勃護

九七

與慾失常之症 與男女天閣不知人道 以及婦女陰虛宮冷 不孕不育 用本劑立能恢復生人樂 趣其效如神

(五)用法及用量

每次注射一管，皮下注射。一日一回。

(六)包裝

育物謨每匣十管。每管一·一西西。每一西西中，含鹽酸育亨賓 (Yohimbine hydrochloride) O，
C O 五九。

海普牌注射藥

是

醫學家藥學家化學家細菌學家共同研究之成績。

最合于科學原理管導下之出品。

中國第一個注射藥品專門製造者。

化學的細菌學的製造品。

製法嚴嚴分量準確。

用科學的方法以管理玻璃管之洗滌乾燥與內容液之消毒。

爲首屈一指之質地精純可掙之注射藥。

確能保障醫家治療成績。

價廉物美。

良醫須用良藥

海普牌注射藥 治病最捷

乃良醫之信徒

亦病家之福星