

溫熱經緯目錄

太虛

海甯王士雄孟英纂

卷一

內經伏氣溫熱篇

卷二

仲景伏氣溫病篇

仲景伏氣熱病篇

仲景外感熱病篇

仲景溼溫篇

仲景疫病篇

卷三

葉香巖外感溫熱篇

葉香巖二時伏氣外感篇

卷四

陳平伯外感溫病篇

薛生白溼熱病篇

余師愚疫病篇

卷五

方論

溫熱經緯卷五

海甯王士雄著纂

定州楊照藜素園

烏程汪曰楨謝城

評

錢塘任源殿華參金匱

寒方論

甘草湯 甘草兩 水三升 煮取一升半 去滓溫服七合 日二服

王晉三曰 一藥治病是曰奇方

徐洄溪曰 大甘爲土之正味 能制腎水 越上之火

王樸菴曰自靈素至漢晉宋齊諸古方凡云一兩者以

今之七分六釐準之凡云一升者以今之六勺七抄準

之

汪按唐人之方則一兩當古之三兩雄按鞠通凡引古方輒改定其分兩而輕重甚未當也學者審之

雄按傷寒類要治傷寒心悸脈結代聖濟總錄治舌腫
塞口外科精要治一切癰疽諸發及丹石煙火藥發兵
部手集治懸癰直指方治痘瘡煩渴及蟲毒藥毒金匱
玉函治小兒撮口及小兒羸瘦得效方治小兒遺溺皆
以一味甘草爲方妙用良多總不外乎養陰緩急清熱
化毒也

汪按亦兼取和中利水

桔梗湯

桔梗一
甘草二

水三升煮取一升去滓分

溫再服

鄒潤安曰腎家邪熱循經而上肺不任受遂相爭競二三日邪熱未盛故可以甘草瀉火而愈若不愈是肺竅不利氣不宣泄也以桔梗開之肺竅既通氣遂宣泄熱自透達矣

雄按雖以桔梗名湯而倍用甘草以爲駕馭後人改稱甘桔湯是矣但須審證而投不可泥爲通治咽痛之方也黃錦芳醫案求真嘗論之醫者不可不知

三 豬膚湯

日 豬膚

一斤 雄按以

猪皮去其肉肥刮如紙

名曰肉鮓可以充饌

水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合

卽是米粉熬

香和令相得溫分六服

王晉三曰腎應彘而肺主水液下泄不能上蒸於肺致絡燥而爲咽痛者又非汗早所能治矣當以豬膚潤肺腎之燥解虛煩之熱白粉曰蜜緩中俾豬膚比類而致津液從腎上入肺中循

復從肺出絡心注胸中而上中下燥邪解矣

四黃連阿膠湯

黃連四兩

黃芩

芍藥二兩

阿膠三兩

雞子黃

一枚

水五升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內

雞子黃攪令相得溫服七合日三服

鄒潤安曰尤氏云陽經之

爲熱則歸於氣陰經之

寒變爲熱則歸於血陽經或有歸於血者惟陰經之熱
則必不歸於氣故三陰有熱結證不用調胃承氣小承
氣而獨用大承氣諸下利證不已必便膿血是其驗也
心中煩不得臥熱證也至二三日以上乃心中煩不得
臥則非始卽屬熱矣始卽屬熱心中煩不得臥者爲陰
虛陰虛則不得瀉火今至二三日以上始見則爲陽盛
陽盛則宜瀉火然致此陽盛亦必其陰本虛故阿膠芍
藥雞子黃無非救陰之品瀉火則惟恃芩連而芩止一
兩連乃四兩此黃連之任獨冠一方而爲補劑中瀉藥
矣

五豬苓湯

豬苓

去茯苓

澤瀉

滑石

阿膠

各一
兩

水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊消溫服七合

日二

周禹載曰熟盛膀胱非水能解何者水有止渴之功而無祛熱之力也故用豬苓之淡滲與澤瀉之鹹寒與五苓不異而此易朮以膠者彼屬氣此屬血也易桂以滑石者彼有表而此爲消熱也然則所蓄之水去則熱消失潤液之味投則渴除矣

鄒潤安曰松之概挺拔勁正楓之概柔弱易搖松之理龐疏楓之理堅細松之葉至冬益蒼翠而不凋楓之葉

至冬遂鮮赤面節落是其一柔一剛顯然殊致茯苓屬
陽治停蓄之水不從陽化者豬苓屬陰治鼓盪之水不
從陰化者是故仲景以豬苓名方者其所治之證曰少
陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯主之若五
苓散則其治有渴者有不渴者至茯苓入他方所治之
病則不渴者居多蓋渴者水氣被陽逼迫欲得陰和而
不能也與之豬苓使起陰氣以和陽化水譬之楓葉已
丹遂能卽落也

六 大承氣湯 厚朴去皮炙入兩 枳實炙五枚 大黃四兩酒洗 芒硝三合
水一斗先煎二物取五升去滓內大黃煮取二升去

淳內硝更上微火一二沸溫再服得下餘勿服

鄒潤安曰柯氏云厚朴倍大黃爲大承氣大黃倍厚朴爲小承氣是承氣者在枳朴應不在大黃矣但調胃承氣湯不用枳朴亦名承氣何也且三承氣湯中有用枳朴者有不用枳朴者有用芒硝者有不用芒硝者有用甘草者有不用甘草者惟大黃則無不用是承氣之名固當屬之大黃况厚朴三物湯卽小承氣湯厚朴分數且倍於大黃而命名反不加承氣字猶不可見承氣不在枳朴乎自金元人以順釋承而大黃之功不顯考本經首推大黃通血再以六微旨大論亢則害承乃制之

義參之則承氣者非血而何夫氣者血之帥故血隨氣行亦隨氣滯氣滯血不隨之滯者是氣之不足非氣之有餘惟氣滯併波及於血於是氣以血爲窟宅血以氣爲禦侮遂連衡宿食蒸逼津液悉化爲火此時惟大黃能直擣其巢傾其窟穴氣之結於血者散則枳朴遂能效其通氣之職此大黃所以爲承氣也

雄按此余夙論如此鄒氏先得

我心注按大黃本血分之藥故知此說確不可易

七白虎湯 石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合水一斗
煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

方中行曰白虎者西方之金神司秋之陰獸虎嘯谷風

冷涼風酷暑消神於解熱莫如白虎石膏知母半甘而
寒辛者金之味寒者金之性辛甘體寒得白虎之體焉
甘草粳米甘平而溫甘取其緩溫取其和緩而且和得
伏虎之用焉飲四物之成湯來白虎之嘔嘔陽氣者以
天地之疾風名也風行而虎嘔者同氣相求也虎嘔而
風生者同聲相應也風生而熱解者物理必至也抑嘗
以此合大小青龍真武而論之四物者四方之通神也
而以命名蓋謂化裁四時神妙萬世名義兩符實自然
而然者也方而若此可謂至矣然不明言其神而神卒
莫之掩者君子慎德此其道之所以大也

汪按飲四物之成湯以下

數行語多支離牽強必官削去夫白虎湯清熱乃甘雨
非涼風也既備四方之神朱鳥一方何以獨缺且熱劑
而名真武名與實爽矣醫者不能研究醫理乃附會經
義以自文其淺陋甚且衍先天論太極以欺人實則無
關於辨證處方也自明以來庸醫陋習大率如此學者戒之

八 白虎加人參湯

原方加人參三兩煮服同前法

鄒潤安曰傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白

虎湯

汪按洞溪云無汗二字最爲白虎所忌

渴欲飲水無表證者白虎加

人參湯主之可見白虎加人參湯之治重在渴也其時

時惡風則非常常惡風矣背微惡寒則非徧身惡寒矣

常常惡風徧身惡寒者謂之表證時時惡風背微惡寒者表邪已經化熱特尙未盡耳謂之無表證可也然熱

邪充斥津液消亡用栝蔞根生津止渴可也何以必用人參靈樞決氣篇腠理發泄汗出溱溱是謂津津爲水陰屬也能外達上通則陽矣夫是之謂陰中之陽人參亦陰中之陽惟其入陰故能補陰惟其爲陰中之陽故能入陰使人陰中之氣化爲津不化爲火是非栝蔞根可爲力矣

雄按朱奉議云再三汗下熱不退者以此湯加蒼朮一錢如神

丸黃芩湯 黃芩三兩甘草炙一兩芍藥各二兩大棗十二枚 水一斗煮取二升去滓溫服一升日再夜一服

鄒潤安曰或問黃芩湯治何等證其證腹痛與否若腹

痛何以用黃芩若腹不痛何以用芍藥

汪按腹痛因乎
熱者甚多謂腹

痛必因寒者前人拘滯之見也曰其證身熱不惡風亦不惡熱或下利

或嘔腹則不痛蓋芍藥甘草大棗桂枝湯裏藥也以不

惡風故不用薑桂黃芩甘草大棗小柴胡裏藥也以不

往來寒熱故不用柴胡以其常熱故不用人參若不嘔

則併不用半夏生薑至芍藥則並不因腹痛而用以桂

枝湯證原無腹痛也亦不心下痞鞕故不去大棗也又

厥陰篇云傷寒脈遲與黃芩湯除其熱腹中則冷不能

食可知黃芩湯證之脈必數黃芩所治之熱必自裏達

外不治但在表分之熱矣然仲景用黃芩有三耦焉氣
分熱結者與柴胡爲耦血分熱結者與芍藥爲耦溼熱
阻中者與黃連爲耦以柴胡能開氣分之結不能泄氣
分之熱芍藥能開血分之結不能清迫血之熱黃連能
治溼生之熱不能治熱生之溼譬之解鬥但去其鬥者
未平其致鬥之怒鬥終未已也故黃芩協柴胡能清氣
分之熱協芍藥能泄迫血之熱協黃連能解熱生之溼

也

汪按前人方解不過望文生義必如鄒氏諸條始覺有味可咀矣

黃芩加半夏生薑湯

原方加半夏半升生薑三兩煮

服法同前

鄒潤安曰嘔而脈數口渴者爲火氣犯胃不宜加此

雄按董虛谷云生薑性熱僅能治寒不可泛

於諸感

也

江按傷寒一百三十三方用薑者五十七則禁劑然溫暑證最宜慎用用之不當或致

人洞溪

味原非

謂雖與芩連同用亦尚有

害是也又古時未有炮製之法凡方用半夏無不兼用薑者義取制半夏

炮製之人洞溪

毒其所

以治病者功在半夏不在薑也今所用半夏

製可不必兼用薑矣後人不察但見古方用遂不論何證隨手妄施其中

先已薑

者不少

必有誤人而不自覺者戒之

十一 桔子豉湯

桔子一枚

十四

香豉四合

縣裏

水四升

日服

先煮桔子得二升半內豉煮取升半去滓分爲二服

進一服

得吐止後服

徐洄溪曰此劑分兩最小凡治上焦之藥皆然按此湯

加減七方既不注定何經亦不專治何誤總由汗吐下之後正氣已虛尙有痰涎滯氣凝結上焦非汗下之所能除必在汗吐下後也既非汗下可除尤忌妄投補劑

經所云在上者因而越之則不動經氣而正不重傷此

爲最便乃不易之法也古方梔子皆生用故入口卽吐

後人作湯以梔子炒黑不復作吐全失用梔子之意然服之於虛煩證亦有驗想其清肺除煩之性故在也

按汪

欲取吐者必宜生用

十二物瓜蒂湯 瓜蒂二個 水一升煮取五合去滓

頓服

尤在涇曰暑之中人也陰虛而多火者暑卽寓於火之中爲汗出而煩渴宜白虎加人參以清熱生陰陽虛而多溼者暑卽伏於溼之內爲身熱而疼重故暑病恆以溼爲病而治溼卽所以治暑瓜蒂苦寒能吐能下去身而四肢水氣水去而暑無所依將不治而自解矣此治中暑兼溼者之法也

十三炙甘草湯

一名復脈湯

甘草

四兩

生地黃

一斤麥冬

麻

仁

各半斤

桂枝

生薑

各三兩

人參

阿膠

各二兩

大棗

三十枚方

中行曰地黃上不當有生字

清酒

七升水八升

先煮八味取三升

去滓內膠烊消盡溫服一升日三服

沈亮宸曰此湯爲千古養陰之祖方也

鄒潤安曰地黃分數獨甲於炙甘草湯者蓋地黃之用在其脂液能榮養筋骸經脈乾者枯者皆能使之潤澤也功能復脈故又名復脈湯脈者原於腎而主於心心血枯槁則脈道泣澀此傷寒論所以脈結代與心動悸並稱金匱要畧又以脈結悸與汗出而悶並述至肺痿之心中溫溫液液涎唾多則陰皆將盡之孤注陽僅膏覆之殘焰惟此湯可增其殼內絡外之脂液也

十四爪帶散

爪帶

熬

赤小豆

各一分

汪按赤小豆乃小

黃

赤小豆

各一分

赤豆俗名米赤者是也

勿誤用
相思子

各別擣篩爲散已合治之取一錢匕以香豉

一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之
不吐者少少加得快吐爲止諸亡血虛家不可與之
盧子絲曰瓜象實在鬚蔓間也帶瓜之綴蔓處也性偏
蔓延末繁於本故少延輒腐爾雅云其紹瓞疏云繼本
曰紹形小曰瓞故近本之瓜常小近末之瓜轉大也凡
實之吮抽津液惟瓜稱最而吮抽津液之樞惟蒂是以
瓜蒂具徹下炎上之用乃帶味苦而瓜本甘以見中樞
之所以別於上下內外誠涌泄之宣劑通劑也

十五麻黃連芍赤小豆湯

麻黃 連芍

甘草

炙生薑

各二兩 赤小豆 生梓白皮

各一升

杏仁四十個

大棗十二枚

桂枝一枚

潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日服盡

鄒潤安曰本經臚列連翹之功以寒熱起以熱結終此條瘀熱在裏句適與連翹功用不異郭景純爾雅注一名連苕苕軺聲同字異耳而今本傷寒論注曰連軺卽連翹根遂以本經有名未用翹根當之陶隱居云方藥不用人無識者故唐本草去之豈仲景書有此六朝人皆不及見至王海藏忽見之耶噫亦必無之事矣

十六梔子檗皮湯 梔子十五枚 黃檗二兩 甘草一兩 水四升 煮取升半去滓分溫再服

鄒潤安曰梔子大黃湯茵陳蒿湯大黃消石湯梔子檠皮湯證其標皆見於陽明陽明者有在經在腑之分發熱汗出懊憹皆經證也腹滿小便不利皆腑證也梔子大黃湯證經多而腑少茵陳蒿湯證有腑而無經梔子檠皮湯證有經而無腑大黃消石湯證經少而腑多

雄按金鑑云此方之甘草當是茵陳蒿必傳寫之譌也

十七茵陳蒿湯

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩

水一斗

先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小

便當利溺如皐角汁狀色正赤一宿腹減病從小便去

也

徐洄溪曰先煮茵陳則大黃從小便出此祕法也

鄒潤安曰新感之邪爲素有之熱結成黃疸此證已所謂因陳矣故傷寒金匱二書幾若無痘不因陳者然梔子檗皮湯證有外熱而無裏熱麻黃連軺赤小豆湯證有裏熱而無外熱小建中湯證小便自利小柴胡湯證腹痛而嘔小半夏湯證小便色不變而噦桂枝加黃耆湯證脈浮梔子大黃湯證心中懊憹消石礬石散證額上黑日晡發熱則內外有熱但頭汗出齊頸而還腹滿小便不利口渴爲茵陳蒿湯證矣第腹滿之治在大黃內熱之治在梔子惟外復有熱但頭汗出小便不利始爲茵陳的治其所以能治此者以其新葉因陳幹而生

清芬可以解鬱熱苦寒可以泄停溼也蓋陳幹本能降
熱利水復加以葉之如絲如縷挺然於暑溼蒸逼之時
先草木而生後草木而彫不必能發散而清芳揚溢氣
暢不斂則新感者遂不得不解自是汗出不止於頭矣
故曰發熱汗出此爲熱越不能發黃也

十八抵當湯 水蛭熬蟲足翅去皮尖各三十個大黃三十個兩酒浸右爲末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下
再服

徐洄溪曰凡人身瘀血方阻尙有生氣者易治阻之久
則無生氣而難治蓋血旣離經與正氣全不相屬投以

輕藥則拒而不納藥過峻又能傷未敗之血故治之極

難水蛭最喜食人之血而性又遲緩善入遲則生血不

傷善入則堅積易破借其力以攻積久之滯自有利而

無害也

雄按王肯堂云人溺蜂蜜皆制蛭毒

章虛谷曰經言陽絡傷則血外溢陰絡傷則血內溢外溢則吐衄內溢則便血蓋陰陽手足十二經交接皆由絡貫通連細絡分布周身而血隨氣行必由經絡流注表裏循環是故絡傷則血不能循行隨陰陽之部而溢出其傷處卽瘀阻久而蓄積無陽氣以化之乃成死血矣故仲景用飛走蟲藥引桃仁專攻絡結之血大

黃本入血分再用酒浸使其氣浮隨蟲藥循行表裏以導死血歸腸腑而出豈非爲至妙至當之法哉由是類推失血諸證要必以化瘀調經絡爲主矣余每見有初治卽用呆補之法使瘀結絡閉不能開通終至於死良可慨也

雄按王清任論虛勞亦主瘀阻蓋本大黃蠅蟲丸之義而言也

十九文蛤散 文蛤五兩 為散以沸湯和一錢匕服湯用五合

二十文蛤湯 文蛤 石膏各五兩 麻黃 甘草 生薑各三 杏仁五十粒 大棗十二枚 水六升煮取二升溫服一升汗出卽愈

鄒潤安曰文蛤卽海蛤之有文理者吳人謂之花蛤

雄

王晉三云若黑色無文者服之令人狂走赴水夏小正季秋之月雀入于海爲

蛤安氏云雀羽蟲也羽蟲屬火火炎上故鳥上飛曷爲

入海而爲蛤蓋九月火伏於戌十月純陰金水之令故

羽蟲感之而化也蛤屬水水性下故下潛秋冬水勝火

雀爲蛤象火之伏於水也又離爲火爲雉爲蚌雀雉之

二類蛤蚌之類外剛內柔皆離之變化也因而思傷寒論

反以冷水澆灌之證非火厄於水而何金匱要畧吐後

渴欲得水之條非火之溺於水而何惟其火在水中而

病故以火入水中而生者治之然厄於水者惡水惡水

則火與水未相浹也故直以是使水中之火仍暢茂得
生而可已溺於水者喜水喜水則火與水漸相浹矣故
必合麻杏甘膏加薑棗以清發之乃能已也

二十五苓散

澤瀉

一兩六銖

豬苓

茯苓

白朮

各十八銖方中

行曰朮上不當有白字雜按二十四銖爲一兩每銖重

四分二釐弱六銖爲鎰卽二錢五分十八銖卽七錢五

分桂枝

牛兩

爲末以白飲和服方寸匕日三多服緩水

汗出愈

沈果之曰中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲
飲水水入卽吐者名曰水逆五苓散主之蓋表證爲太
陽不足故用桂以宣陽氣通津液於周身卽內經水精

四布五經並行之旨非用之以通水道不出也裏證爲
三焦之氣化不宣故用瀉尤二苓以通三焦之閉塞非
開膀胱之溺竅也夫下焦之氣化不宣則腹膨而小便
不利水蓄膀胱是爲胞溼此乃水蓄於膀胱之外不能
化入膀胱故用五苓以化之至小便不利汗出而渴者
亦主以是方而不渴者茯苓甘草湯主之蓋渴爲陽氣
不足水不上升也不升則不降故用桂以升之二苓澤
瀉以降之而用尤以爲中樞乃注者莫不以渴爲熱入
膀胱津液被劫所致如果熱入而復用桂尤以溫液耗
津又加苓澤以滲之是熱之又熱耗之又耗速之斃矣

且不渴者反不用五苓而用茯苓甘草湯可知不渴則無須桂朮之蒸騰津液而桂朮之非治太陽而治三焦更不待言矣

三十二 小陷胸湯

栝蔞實大者一枚黃連兩半夏升

水六

升先煮栝蔞取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫

三服

鄒潤安曰觀仲景之用栝蔞實在此湯曰小結胸正在心下按之則痛在栝蔞薤白酒湯曰喘息欬唾胸背痛短氣而其脈一則曰浮滑一則曰寸口沈遲關上小緊數是皆陰中有陽且踞於陽位者也夫胸背痛較按

之方痛則甚痺則較結爲輕欬唾喘息是其勢爲上衝而居於心下按之纔痛似反靜而不動此其機總緣氣與飲相阻寒與熱相糾熱甚於寒者其束縛反急而爲結寒甚於熱者其蔽塞自盛而爲痺是故結胸之病伏胸痺之病散伏者宜開散者宜行故一則佐以連夏之逐飲泄熱一則佐以薤酒之滑利通陽枯裏實之裏無形攢聚有形使之滑潤而下則同能使之下似是治實之方僅能使之下不能使其必通又非純乎治實之道矣何以知不能使之必通蓋有停飲痛甚至不得臥卽當加半夏若兼胸滿脇下逆搶心則仍加枳朴桂枝倘

竟能通又何必如是哉是知栝蔞實之治大旨在火與痰結於陽位不純乎虛亦不純乎實者皆能裏之而下此其擅長矣

二十三日散

桔梗

貝母

各三分

巴豆

一分去皮心膜熬

黑研如脂雄

按古

人以六銖爲一分分字去聲卽二錢五分也

爲末內巴豆更於臼中杵之

以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈

下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯

汪按半錢

者以銅錢取藥末僅沒錢文之半卽半錢也

匕而省

匕字非若今人以五分爲半錢也

鄒潤安曰寒實結胸無熱證者治以白散散中用桔梗爲疏通氣分之主夫開導胸中之氣仲景於大承氣湯

溫病卷五
栀子厚朴等湯莫不用枳朴此偏不用何哉蓋病有上
下治有操縱結在上者宿痰停飲也故凡結胸無論熟
實寒實甯用甘遂葶藶巴豆不用枳朴如大陷胸湯丸
白散是也結在中下始熱與實淡氣隨熱化則於瀉滌
邪穢中疏利其與邪爲伍之氣大小承氣諸湯是也况
桔梗之用使氣上越而不使氣下泄今病在至高固宜
操上而縱下不使中下無過之地橫被侵陵故曰病在
膈上必吐在膈下必利也熟邪與停飲結治以巴豆而佐
之者反用桔梗貝母於寒因熱用熱因寒用之中反佐

以取之可謂精義人神以致用者矣

二十四調胃承氣湯

大黃四兩去皮

甘草二兩

芒硝半升

清酒浸

甘草炙

芒硝半升

升

水三升先煮大黃甘草取一升去滓內芒硝更上火

微煮令沸少少溫服之

徐洄溪曰芒硝善解結熱之邪大承氣用之以解已結之熱邪此方用之以解將結之熱邪其能調胃則全賴甘草也

二十五升麻鼈甲湯

升麻

當歸

甘草各二兩

蜀椒炒

去

汗一兩

鼈甲手指大

一片炙

雄黃半兩

水四升煮取一升頓服

之老小再服取汗金匱要畧陽毒用此方陰毒去雄黃

蜀椒肘後千金方陽毒用升麻湯無鼈甲有桂陰毒用甘草湯卽本方無雄黃活人書陽毒升麻湯用犀角射干黃芩人參無當歸蜀椒鼈甲雄黃

徐洄溪曰蜀椒辛熱之品陽毒用而陰毒反去之疑誤活人書加犀角等四味頗切當

二十六百合知母湯 百合一枚七兩 知母三兩 先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水別以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升後合煎取一升五合分溫再服

王樸莊曰百合入藥以野生極小者爲勝

二十七百合雞子黃湯

百合一枚

雞子黃一枚

先煎百合

一枚

如前法了而雞子黃攪勻煎五分溫服

二十八百合滑石代赭湯

百合一枚

滑石三兩碎

絲裹代赭

三兩碎

石如彈丸大一枚

碎絲裹

先煎百合如前法別以泉水二升煎

滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升

五合分溫再服

再服

二十九百合地黃湯

百合七枚

生地黃汁一升

先煎百

合如前法了內地黃汁煎取一升五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

三十百合滑石散

百合一枚

滑石三兩

爲散飲方寸匕

三十百合滑石散

百合一枚

滑石三兩

爲散飲方寸匕

七

日三服當微利者止服熱則除

鄒潤安曰玩百合知母湯可以見汗則傷氣邪搏於氣分爲消渴熱中也玩百合雞子黃湯可以見吐則傷上邪擾於心爲煩懊不寐也玩百合代赭湯可以見下則傷血邪搏於血分爲血脈中熱也玩百合地黃湯可以見不經吐下發汗則係百脈一宗悉致其病無氣血上下之偏矣所謂曰脈一宗者何平人氣象論曰胃之大絡名曰虛里出於左乳下其動應衣爲脈宗氣是最近於心乃著邪焉是以見證行臥不安如有神靈皆心中輾轉不適之狀口苦小便數身形如和其脈微數皆心

中熱鬱氣挽之徵以此例之本經百合主邪氣腹滿心
痛蓋有若合符節者而治法始終不外百合則以心本
不任受邪心而竟爲邪擾則不責將之謀慮不審卽責
相之治節不行今邪阻於上而不下行爲肺之不主肅
降無能遁矣故欲徵其愈期極宜驗其小便凡溺時必
肺氣下導小便乃出今氣柱於頭卽欲下行上先有故
則肺形之軒舉不隨氣之支結不降亦又何疑乃頭中
之不適復分三等其最甚者至氣上柱而爲痛其次則
不痛而爲淅淅然又其次則因小便通而快然卽此驗
其軒舉支結之淺深微甚旣瞭如指掌矣况合之以百

合地黃湯下云大便當如漆百合滑石散下云微利者
止服熱則除則百合之利大小便又與本經胎合矣

三十一
桔梗牡蠣散

桔梗根 牡蠣分熬等爲細末飲

服方寸匕日三服

鄒潤安曰百合病至一月不解而變成渴以百合湯洗
之而仍不差則病爲傷中上之陰無疑雖然僅曰渴不
曰欲飲水且不煩不熱究竟病無駐足之所僅渴之一
端爲得所依藉耳於此見昔之百脈一宗悉致其病者
今則上焦已化而在下者尙未化也上焦已化百脈之
病已蠲其半百合遂無所用之而下焦之未化者不得

不選用牡蠣使之召陽歸陰而其主腦尤在治上焦之
已化者故方中配以從陽化陰之栝蔞根兩物等分標
名則升栝蔞於牡蠣之上爲一方之統攝也

三十二甘草瀉心湯

甘草

四兩

黃芩

人參

乾薑

各三

兩半夏

半升

黃連

一兩

大棗

十二枚傷寒
論無人參

水一斗煮取六

升去滓再煎取三升溫服一升日三

王晉二曰甘草瀉心非瀉結熱因胃虛不能調劑上下

水寒上逆火熱不得下降結爲痞故君以甘草大棗和

胃之陰乾薑半夏啟胃之陽坐鎮下焦客氣使不上逆

仍用芩連將已逆爲痞之氣輕輕瀉卻而痞乃成泰矣

三十三 赤豆當歸散 赤小豆

三升浸令
芽出曝乾

當歸

十
分

杵爲

散漿水服方寸匕日三

汪按赤小豆乃赤豆之小種今
藥肆以半紅半黑之相思子爲

赤小豆醫者亦多誤用然相思子不能出芽即此方可證其謬

三十四 二妙散 茅山蒼朮

生

川黃檗

炒

爲末擣生薑

煎沸湯調服

王晉三曰此偶方之小制也蒼朮生用入陽明經能發二陽之汗黃檗炒黑入太陰經能除至陰之溼一生一熟相爲表裏治陰分之溼熟有如鼓應桴之妙

三十五 生薑瀉心湯 生薑

四兩

甘草 炙人參 黃芩

各十二

三兩

半夏升黃連 乾薑

各一升

大棗

十二枚

水一斗煮取

升去渣煎取三升溫服一升日三

徐洄溪曰汗後而邪未盡必有留飲在心下其證甚雜而方中諸藥一一對證內中又有一藥治兩證者亦有兩藥合治一證者錯綜變化攻補兼施寒熱互用皆本內經立方諸法其藥性又皆與神農本草所載無處不合學者能於此等方講求其理而推廣之則操縱在我矣

三十六半夏瀉心湯 半夏半黃芩 乾薑 甘草炙人
參各二兩 黃連一大棗十二枚 水一斗煮取六升去渣再
煎取三升溫服一升日三

方中行曰半夏乾薑辛以散虛滿之痞黃芩黃連苦以泄心膈之熱人參甘草甘以益下後之虛大棗甘溫潤以滋脾胃之液曰瀉心者言滿在心膈而不在胃也

三十七 大黃黃連瀉心湯 大黃二兩 黃連一兩 麻沸湯二升

瀉心之須臾絞去滓分溫再服

尤在涇曰成氏云此導虛熱之方也按所謂虛熱者對燥矢而言也蓋邪熱入裏與糟粕相結則爲實熱不與糟粕相結則爲虛熱非陰虛陽虛之謂本方以大黃黃連爲劑而不用枳朴等藥者蓋以泄虛熱非以蕩實熱也

雄按不但不用枳朴等藥也二味僅以麻沸湯瀉須臾卽絞其味甚薄乃可泄虛熱若久瀉味厚雖無枳

朴亦能下走腸胃也注按尤氏解釋
極精妙夢隱更以前法釋之亦妙

三十八附子瀉心湯 大黃酒浸黃連炒黃芩炒各附子

酒浸二兩

黃連一兩

黃芩一兩

附子

一枚去皮
別煮取汁

以麻沸湯二升漬三味須臾絞去渣內附

子汁分溫再服

徐洄溪曰前方乃法之最奇者不取煎而取泡欲其輕揚清淡以滌上焦之邪此法更精附子用煎三味用泡扶陽欲其熱而性重開痞欲其生而性輕也

雄按觀此可知用藥

之道

鄒潤安曰心之爲體於卦象離今被邪逼則外陽內伐內陰沸騰故半夏甘草生薑三瀉心湯治陰邪之未化

者也大黃黃連附子二瀉心湯治陰邪之已化者也陰
邪已化不逼心陽則在內之沸亂畧定惟在外之邪氣
尙阻則取二黃之泄熱蕩去其邪邪去正自安矣惡寒
汗出者在上之陰邪纔化在下之陰氣復逆故輕取二
黃之氣以蕩熱除穢重任附子之威以追逐逆陰使之
異趨同歸相成而不相背也其未化者陽餒胸於陽位
而恣肆於陰分邪盤踞於清道而潰泄於下焦非乾薑
半夏生薑之振散陰霾不足以廓清心之外郭非人參
黃連之養陰泄熱不足以安擾心之內訌也

又曰余治瘧發時先嘔者用半夏瀉心吐瀉交作者用

生薑瀉心胸痞下利者用甘草瀉心皆應如桴鼓

三十九 小承氣湯

大黃

四兩

厚朴

二兩

枳實

三枚

水四升煮

取一升一合去滓分溫三服初服湯當更衣不爾者盡

飲之若更衣勿服

雄按於大承氣湯既去芒硝而減枳朴復以大黃同煎而緩其蕩滌之性古人謂之和胃之劑故曰小承湯

四十牛黃清心丸

陝西牛黃

二分

釐鏡面硃砂

一分

生黃

五分

金

一錢

連錢黃芩

山梔

各三錢

鬱金

二錢

爲末蒸餅爲糊丸如

黍米大每服七八丸

王晉三曰此丸古有數方其義各別若治溫邪內陷包

絡神昏者惟萬氏此方爲妙蓋溫熱入於心包絡邪在
裏矣草木之香僅能達表不能透裏必藉牛黃幽香物
性乃能內透包絡與神明相合然尤在佐使之品配合
咸宜萬氏用芩連山梔以瀉心火鬱金以通心氣辰砂
以鎮心神合之牛黃相使之妙是丸調入犀角羚羊角
金汁甘草人中黃連翹薄荷等湯劑中頗建奇功

雄按周公謹云局方牛黃清心丸止是前八味至蒲黃
而止自山藥以後凡二十一味乃補虛中山芋丸當時
不知何以誤併爲一因循不曾改正貽誤後人匪細凡
此之類讀書者不可不知也一方用牛黃雄黃黃連黃

芩梔子犀角鬱金硃砂各一兩眞珠五錢冰片麝香各

二錢五分研煉蜜丸每重一錢金箔爲衣蠟匱功效較

萬方爲勝

注按萬方太輕此方較有力

四十一至寶丹

生烏犀角

生琥珀

琥珀

鏡面硃

砂

研飛各一兩

西牛黃

五錢龍腦

麝香

研各一錢

安息香

一兩

五錢爲末酒研飛淨

金箔

銀箔

各五十片研細爲衣

先

將犀璫爲細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮凝成

後入諸藥中和搜成劑丸如梧子大蠟護臨服剖用人

參湯化下三丸至五丸本事方有人參南星天竺黃

王晉三曰此治心臟神昏從表透裏之方也黃犀璫珀

以有靈之物內通心竅殊雄二箔以重墜之品安鎮心
神佐以腦麝安息搜剔幽隱諸竅東垣云冰雄牛麝入
骨髓透肌膚抱朴子言金箔雄黃合餌爲地仙若與丹
砂同用爲聖金餌之可以飛昇故熟入心包絡舌絳神
昏者以此丹入寒涼湯藥中用之能祛陰起陽立展神
明有非他藥所可及徐氏云安神定魄必備之方真神丹也若病因頭痛
而卽神昏不語者此肝虛魂升於頂當用牡蠣救逆以
降之又非至寶丹所宜輕試

四十二涼膈散

一名連翹飲子

連翹

四兩

大黃

酒浸

芒硝

甘草

各二

各二

兩黃芩

酒炒

薄荷

梔子

各一

爲粗末每服三五錢加

竹葉七片水一椀半煎一椀去滓入生白蜜一匙微煎

溫服與四物各半服能和營泄熱名雙和散本事方加

赤芍乾葛治諸熱累效玉機云輕者宜桔梗湯

汪按此方與第二方桔梗湯方與第

二方桔梗湯名同實異

卽木方去硝黃加桔梗舟楫之品浮而上

之去膈中無形之熱且不犯中下二焦也

雄按此方加減法詳宣明

論

徐洞溪曰此瀉中上二焦之火卽調胃承氣加疏風清
火之品也

余師愚曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃
芩竹葉薄荷升散於上大黃芒硝推蕩其中使上升下

溫病新編卷五
行而膈自清矣余謂疫疹乃無形之熱投以硝黃之猛烈必致內潰因去硝黃加生石膏桔梗使熱降清升而疹自透亦上升下行之義也

雄按法本宣明剪裁甚善

四十三犀角地黃湯 邇羅犀角磨汁連翹各三錢生地五錢甘草五分水二鍾武火煎三物至八分去滓入犀角汁和服

王晉三曰溫熱入絡舌絳煩熱八九日不解醫反治經寒之散之攻之熱勢益熾得此湯立效者非解陽明熱邪解心經之絡熱也按本草犀角地黃能走心經專解營熱連翹入心散客熱甘草入心和絡血以治溫熱證

熱邪入絡功勝局方

四十四導赤散 生地 木通 甘草梢

各等分雄按生地木通不應等

分 水煎服或加淡竹葉

汪按古方淡竹葉卽竹葉也

淡竹葉草是小青之別種性能涼胃不能清心醫人每多誤用雄按本方去甘草加黃芩蜜丸名火府丹亦治心熱溺澀淋渴等證本方加升麻黃連丹皮名升

麻清胃湯輕清涼血乃秦皇士透化斑疹之良劑

四十五理中丸 人參 甘草 炙尤 乾薑

各三兩

搗篩

爲末蜜和爲丸如雞子黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四服夜二服腹中未熟益至三四丸
雄按二字須著眼腹中不冷者其可服乎然不及湯湯法以四味依兩數切用

水八升煮取三升去渣溫服一升日三

徐洄溪曰此仲景治寒多霍亂之方也蓋亦傷寒之類後人以暑月之吐利當之而亦用此方更造爲大順散者皆無稽之論也

四十六 四君子湯

人參

白朮

炒

茯苓

各二錢

甘草

炙一錢

生薑

三片

大棗

二枚

水煎溫服

徐洄溪曰此補脾之主方

四十七 玉女煎

生石膏

三五錢

熟地

三五錢

或一兩

麥冬

二錢

知母

生牛膝

各一錢

水

一鍾半

煎七分服

雄按陳修園力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之一齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏

引用決不泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四十八四物湯

生地

當歸

各三

芎藭

一兩

芍藥

二兩

㕮咀每服四錢水二盞煎八分去滓溫服

張路玉曰四物爲陰血受病之專藥非調補真陰之藥

也

汪接調補真陰宜集靈膏一百一十二不宜四物而人多誤會

四十九小柴胡湯

柴胡半黃芩

人參

甘草

炙生薑

各三半夏半升大棗十二枚

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱不得聚而游其部故脇滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出烏能自愈耶

沈再平曰今人治瘧必用此湯若非此湯卽不足以爲治者故致輾轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之也夫柴胡爲少陽表藥

若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輾轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡爲治瘧主藥吾開手卽用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧而竟不效眞其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎雄按內經論瘧旣分六經又分臟腑並不泥定

少陽一經
醫家繹之

雄按本方柴半各八兩準今得六錢零八釐參草芩葛各三兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏

謂和藥取其各藥氣味之相和余謂和者取其氣緩味厚斯爲補正托邪之劑故惟風寒正瘧邪在少陽者可以按法而投則參甘薑棗補胃充營半夏利其樞柴芩解其熱病無不愈矣猶之今人於瘧發之先飽啖羊肉酒飯亦能取效汪按瘧疾寒來之時強食過飽往往一寒不能復熱而死吾見甚多不可不慎蓋風寒自表而受胃腑空虛自能安穀治必先助中氣托邪外出卽禦外邪杜其內入誠一舉兩全之策也若溫熱暑溼諸瘧邪從口鼻而受肺胃之氣先已窒滯病發卽不飢惡穀脘悶苔黃苟不分別但執此湯奉爲聖法則參甘薑棗溫補助邪驟則液涸神昏緩則邪留結

痞且有耗傷陰血而成瘧勞者卽不用全方而專以柴

胡爲治瘧主藥亦惟營陰充裕或溫熱暑溼之邪本不

甚重及兼感風寒之表邪者始可見功

汪按治正瘧必宜此湯溫暑亦

有正瘧不獨風寒方用黃芩是清熱非祛寒也且柴胡主少陽半表半裏黃芩裏藥亦非以治表邪但當辨其

是否正瘧耳若似瘧非瘧妄用柴胡必提成長熱不退或兩耳大痛甚至神昏更或引動肝風痙厥立至生平

見之屢矣故倪涵初所定三方亦愈病者稀而加病者多也

汪按瘧疾強止變成臌脹者多不救而人但知其臌脹而死未嘗歸咎於治瘧之不善故醫者終身誤人而不知雖告之不信也世人凡患瘧不究病因輒以薑棗湯灌之其

弊類此羊肉亦然凡屬時瘧雖愈後亦忌食食則必復此時瘧之所以異於正瘧也可不察哉

五十桂枝紅花湯 傷寒桂枝湯加紅花

原方桂枝芍藥生薑各三兩甘草炙二兩大

棗十二枚

五十一葱豉湯 葱白

一握

香豉三合 水煎入童子小便一

合日三服

雄按蘆根桑葉滑石蕨根之類皆可隨證佐用

張路玉曰本方藥味雖輕功效最著凡虛人風熱伏氣發溫及產後感冒靡不隨手獲效

尤拙吾曰溫邪之發陰必先傷設有當行解散者必兼滋陰之品於其中昔人於葱豉湯內加童便於梔豉湯中加地黃麥冬亦此意也

雄按二方加減古法最詳

華岫雲曰在內之溫邪欲發在外之新邪又加葱豉湯

最爲捷徑表分可以肅清

鄒潤安曰梔子與葱白一係泄熱一係通陽泄熱者縱通陽者橫縱則能通上下之道此所以宜於汗吐下後表邪已解之時橫則能達外內之情此所以宜於病初起卒難辨識之際而豆豉擅開發上焦鬱抑宣導陰濁逗留故在先在後咸藉以奏功也

雄按葉氏春溫篇於新邪引動伏邪亦主是方蓋此湯爲溫熱初病開手必用之劑鞠通不察舍近而圖遠遂爲喻氏臆說所惑以桂枝湯爲初感之治仍不能跳出傷寒圈子矣意欲紹述仲聖平則祖上之門楣不可誇

爲自己之閥閱也拘守其迹豈是心傳尤氏云桂枝湯爲傷寒表病而裏和者設溫病伏寒變熱少陰之精已被劫奪雖有新舊合邪不可更用辛溫助熱而絕其本也吳氏殆未之聞耶

五十二清心涼膈散

一名桔梗湯

卽涼膈散

四十

去硝黃加

桔梗余氏又加生石膏爲治疫疹初起之良劑

五十三葦莖湯

葦莖

二斤

薏苡仁

瓜瓣

各半斤

桃仁

五十枚

水一斗先煮葦莖得五升去滓內諸藥煮取二升服
一升再服

一雄按鄒氏續疏云葦莖形如肺管甘涼清肺且有節之

物生於水中能不爲津液閼隔者於津液之閼隔而生
患害者尤能使之通行慧以色白味淡氣涼性降秉秋
金之全體養肺氣以肅清凡溼熱之邪客於肺者非此
不爲功也爪瓣卽冬瓜子冬瓜子依於瓢內瓢易潰爛
予不能浥則其能於腐敗之中自全生氣卽善於氣血
凝敗之中全人生氣故善治腹內結聚諸癰而滌膿血
濁瘀也桃仁入血分而通氣合而成劑不僅爲肺癰之
妙藥竟可瘳肺癰之危疴

五十四瀉白散 桑白皮 地骨皮 各一
兩 甘草 五錢 為粗
末每服一二錢入粳米百粒水煎

徐洄溪曰此方能治肺中之飲

雄按此瀉去肺熱而保定肺氣之方也若肺不傷於熱而傷於風寒者誠有如鞠通所謂必將邪氣戀定而漸成勞怯矣故用藥必先議病也

五十五草庵大棗瀉肺湯

草庵

熬令黃色擣丸如雞子大

大棗十二枚

水三升煮棗取二升去棗內草庵煮取一升頓服

雄按外臺用草庵杏仁各一升大棗六十枚合杵如膏

加蜜作丸桐子大桑白皮湯下六七十丸以大便通利爲度本事方無杏仁有陳皮桔梗棗肉丸梧子大每服

五七丸飲下名棗膏丸元戎於本方加麻黃五味子

按汪

此二味並用似嫌夾雜並治痰實飲閉而爲喘脹者余治虛弱人患實痰哮喘者用葶苈炒黃煎湯去渣以湯煮大棗食之亦變峻劑爲緩劑之一法也

五十六竹葉石膏湯

竹葉

握生石膏

斤半

夏

洗半斤

人參

半斤

雨甘草

炙兩

麥門冬

斤半

梗米

半升

雄按陳修園

曰傷寒

汗吐下之後亡其津液

論用人參者有數方皆因

故取甘涼以救其陰也

水一斗

先煮六味

取六升去

滓內梗米煮米熟湯成去米溫服一升日三

加生薑治

集驗此方

嘔最良雄按余用此方治暑瘧極妙

徐洄溪曰此治傷寒解後虛羸少氣之善後方也蓋大病之後必有留熱治宜清養後人但概用峻補以留其

溫病編卷五
邪則元氣不能驟復愈補愈虛矣

惟按此理惟喻氏知之葉氏精之

五十七清燥救肺湯 經霜桑葉

三錢去筋

杏仁七分去皮尖炒黃

麥門冬一錢二分

生石膏二錢

人參七分

阿膠八分

胡麻仁一錢

枇杷葉去毛筋

甘草一錢

水一椀

煎六分食遠服痰多加貝母

枯蓼血枯加生地熱甚加犀角羚羊角或加牛黃

柯韻伯曰古方用香燥之品以治氣鬱不獲奏效者以火就燥也惟繆仲淳知之故用甘涼滋潤之品以清金保肺立法喻氏宗其旨集諸潤劑而製此湯用意深矣

汪按此治秋燥證之神方勝於東垣清燥湯多矣

五十八妙香丸

一名大聖丸

巴豆

三百十五粒

去皮心膜炒熟研如麪

牛黃

研

膩粉

研龍腦

研麝香

研各辰砂

飛九

金箔

九片研

研勻

煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉令勻爲丸每兩作三十

丸白湯下二丸日二

宣明有水銀硼砂

此丸治驚癲百病亦

治傷寒潮熱積熱結胸發黃狂走躁熱大小便不通

徐氏

云三分一丸難於下咽宜作一分一丸每服三丸爲安

五十九

六一散

一名天

膩白滑石

六兩飛甘草

一兩炙

爲

細末每服三錢溫水或新汲水調下日二暑溼內侵風

寒外襲者豆豉五十粒葱白五寸水一盞煮汁調下卽

解甚者三服必愈催生下乳溫水擂胡麻漿調下併可

下死胎解斑蝥毒加辰砂少許名益元散加黃丹少許

名紅玉散加青黛少許名碧玉散加薄荷葉末少許名
雞蘇散

李灝湖曰熱散則三焦甯而表裏和溼去則闢門通而
陰陽利完素以之治七十餘證讚爲凡間仙藥不可缺
之雄按小溲清長者勿服

六十大順散

甘草

三十斤剉寸長乾薑

杏仁

去皮尖

肉桂

去粗皮各半

四斤

先將甘草同白砂炒及八分黃熟

王晉三曰白砂

卽河砂或云是

白砂
餚非

次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作

聲爲度篩去砂後入肉桂一處擣爲散每服二錢水煎
溫服如煩躁井華水調下不拘時沸湯調亦可

王安道曰此方甘草最多乾薑杏仁肉桂次之除肉桂外三物皆炒者原其初意本爲冒暑伏熱引飲過多脾胃受溼嘔吐水穀不分臟腑不調所立蓋溫中藥也內有杏仁不過取其能下氣耳若以之治靜而得之之證吾恐不能解而反增內煩也世俗不明類曰夏月陰氣在內此等方爲必用之藥吁誤矣夫陰氣非寒氣也蓋夏月陽氣發散於外而陰氣則在內耳豈可視陰氣爲寒氣而用溫熱之藥乎陰果爲寒何以夏則飲水耶按

若夏月必宜溫藥則冬月必宜涼藥乎且大熱煩躁而更以薑桂之燥熱助之不得已而用井華水欲使相濟不知井華水之力不能制也尤爲進退無據矣

徐洄溪曰此治暑月內傷飲冷證非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非法此等病百不得一偶用之耳而製藥四十二斤又止服二錢其意何居其方本不足取而世之庸醫竟以此治燥火之暑病殺人無算可勝悼哉

六十一 紫雪 黃金

一百兩徐云以飛金
萬貞代之尤妙

寒水石

慈石

石膏 滑石

各三斤

以上並搗碎用水一斛煮至四

斗去滓入下藥

羚羊角屑

犀角屑

青木香

沈

香

各五

丁香

一兩徐云

宜用二兩

元參

升麻

各一

甘草

八兩

炙

以上入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下藥

朴

硝

十斤

石

四斤徐云二硝太

多宜用十分之

一

味入前藥汁中微火

上煎柳木箆攬不住候有七升投在木盆中半日欲凝

入下藥

硃砂

麝香當門子

一兩二錢五分

二味入前藥

中攬調令勻瓷器收藏藥成霜雪而色紫新汲水調下

雄按雞峯方無慈石滑石硝石其二角祇用各十兩了

沈木香各五兩升麻六兩朴硝三斤麝香卻用三兩餘

六味同又薛公望云方中黃金不

用亦可汪接宜用飛金箔不可去

徐洞溪曰邪火毒火穿經入臟無藥可治此能消解其效如神

六十二禹餘糧丸

卽鍼砂丸又名蛇含石丸

蛇含石

卽蛇黃大者三兩以新鐵鉗盛

入炭火中燒石與銚子一般紅用鉗取蛇黃傾入醋中候冷研極細末聽用

砂五兩以水淘淨炒乾入餘糧一處用米醋二升就銚內煮醋乾爲度後用銚併藥入炭火中燒紅鉗出傾

藥淨甄上
候冷研細

以三物爲主其次量人虛實入下項藥

羌活 川芎 木香 茯苓 牛膝 桂心 白豆蔻

大茴 蓬虆 附子 乾薑 青皮 三棱 白蒺

藜 當歸 酒浸一宿各五錢 為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅

捩去水和藥再杵爲丸梧子大食前溫酒白湯任下三十丸至五十丸最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥卽於小便內旋去不動臟腑而能去病日三

服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也

雄按此乃治水腫寒積之

方今人輒用以治脹然脹有寒熱二證設熱脹誤服貽害非輕丹溪云溫熱之藥太多宜有加減不可徒執其

方魏玉橫云陰虛內熱而爲
脹脹誤服燥熱石藥必死

徐洄溪曰此方兼治有形之積塊

六十三牡蠣澤瀉散

牡蠣 澤瀉

蜀漆

洗去腥

枯萎根

葶藶子

商陸根

熬海藻各等分

異擣下篩爲散

更入曰中杵之白飲和服方寸匕小便利止後服

雄按古云

商陸水煎能殺人

華岫雲曰葉氏雖善用古方然但取其法而並不膠柱觀其加減之妙如復脈建中瀉心等類可知至用牡蠣澤瀉散祇取此二味故案中有但書用某方而不開明藥味者決非盡用原方必有加減之處觀者以意會之可也

雄按此論通極諸方皆當作如是觀

鄒潤安曰牡蠣澤瀉散證水蓄於下上焦之氣不能爲之化故類萃商陸葶藶以從上下降澤瀉海藻以啟水中清氣上行栝蔞牡蠣則一以上濟其清一以下召其濁而使之化耳

又曰牡蠣澤瀉散治腰以下水氣不行必先使商陸葶藶從肺及腎開其來源之壅而後牡蠣海藻之軟堅蜀漆澤瀉之開泄方能得力用栝蔞根者恐行水之氣過駛有傷上焦之陰仍使之從脾吸陰還歸於上與常山之蛇擊其首則尾應擊其尾則首應者不殊也

六十四 越婢湯

麻黃六兩

八兩

石膏三兩

生薑三兩

甘草二兩

大棗二十

枚

水六升煮麻黃去沫內諸藥煮取三升分三服惡

風加附子一枚

留置之脉脉丸或金神丸藥之類同

喻嘉言曰越婢湯者示微發表於不發之方也大率取其通調營衛麻黃石膏二物一甘熱一甘寒合而用之脾偏於陰則和以甘熱胃偏於陽則和以甘寒乃至風熱之陽水寒之陰凡不和於中土者悉得用之何者中土不和則水穀不化其精悍之氣以實營衛營衛虛則或寒或熱之氣皆得壅塞其隧道而不通於表裏所以 在表之風水用之而在裏之水兼渴而小便自利者咸必用之無非欲其不害中土耳不害中土自足消患於

方萌矣

六十五甘遂半夏湯

甘遂

大者三枚半夏

十二枚

芍藥

五枚

甘草

一枚

如指大一枝一本無甘草汪按王氏雖強爲之釋究當從一本去甘草爲是

水二升煮取

半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八分頓服之

王晉三曰甘遂反甘草反者此欲下而彼欲上也乃以

芍藥約之白蜜潤之則雖反而甘遂仍得下滲靈樞有

一言約方如約囊甘遂半夏逐留飲彌漫於腸胃之間雖

利而續堅滿苟非以甘草白蜜與甘遂大相反者激而

行之焉能去其留著之根相反爲方全賴芍藥之酸可

勝甘約以監反庶不溷亂中焦而爲害然學識未優者

不可輕試於人也

六十六控涎丹

一名妙應丸

甘遂

去

大戟

去

白芥子

各等分

爲末蒸餅糊丸每服五七丸至十九臨臥薑湯服

雄按余治

虛人欲證每以六君子湯去甘草送服甚妥達可謂之子龍丸云治流注竄毒甚效

王晉三曰控引也涎讀作羨湎涎也水流貌引三焦之

水湎涎流出於水道也芥子色白入肺而達上焦甘遂

色黃入脾而行中焦大戟色黑入腎而走下焦故曰芥

子走皮裏膜外之水飲甘遂決經隧之水飲大戟逐臟

腑之水飲三者引經各異湎涎於水道則同故複之爲

方而名控涎也

汪按涎卽次之俗字亦作漩本指口唾引伸爲痰涎王說未當

六十七 又控涎丹治諸癇 生川烏 半夏

洗殼蠶

炒各半兩

生薑汁一宿浸研

三錢全蝎

二錢半麪裹煨各半

爲細末生

薑自然汁爲丸如綠豆大硃砂爲衣每服十五丸生薑湯下二方俱忌食甘草

六十八

五子五皮湯 卽五皮飲

五加皮 大腹皮 地骨皮 茯苓皮 生薑皮

加易陳皮一方

五加易柔白皮 加杏仁蘇子葶藶子白芥子萊菔子

無杏仁芥子有

香附車前子

六十九

桂苓丸 桂

一兩

茯苓

二兩

爲末蜜丸沸湯下二錢

作湯名桂苓飲

七十禹功丸

卽禹功散

黑牽牛頭

入磨一次不復再磨四兩

大茴香

炒一兩

爲細末以生薑自然汁調服一二錢或加木香一兩

七十二防已茯苓湯 防已 黃耆 桂枝各二兩 茯苓六

甘草二兩 水六升煮取二升分溫三服

王晉三曰余治太陽腰髀痛審證借用此方如鼓之應

桴

七十二中滿分消湯 半夏一錢厚朴 黃連

黃檗俱薑製

川烏

乾薑

俱炮開口吳萸

炒

草豆蔻

研木香

人參

各五

分茯苓

澤瀉

各一錢半生薑五片

水煎稍熱服大忌房勞

生冷炙燙酒麪糟醋鹽醬等物身熱脈浮喘滿有表證
加麻黃五分血虛至夜煩熱加歸身黃耆各五分陽氣

下陷便溺赤澀加升麻柴胡各三分脾氣虛弱飲食不
磨去黃檗加益智仁畢澄茄青皮各二分

七十三中滿分消丸 厚朴 半夏 黃連

俱薑汁炒黃芩

枳實 白朮 同枳實拌溼炒焦 乾生薑 荀苓 豬苓 澤瀉

人參

各五錢

甘草

炙一錢

湯浸蒸餅爲丸梧子大每服

百丸沸湯下 脾胃氣滯食積脹滿加陳皮砂仁各五

錢經脈溼滯腹皮酸臂痛不可拊者加片子薑黃一錢
肺熱氣化不行溺閉喘渴者加知母三錢

張路玉曰東垣分消湯丸一主溫中散滯一主清熱利
水原其立方之旨總不出內經平治權衡去菀陳莝開

鬼門潔淨府等法其湯方主中滿寒脹乃下焦陰氣逆
滿抑遏中焦陽氣有似乎陰之象故藥中雖用烏頭之
辛熱宣布五陽爲辟除陰邪之嚮導卽用連翬之苦寒
以降泄之苟非風水膚脹脈浮證起於表者孰敢輕用
開鬼門之法以鼓動其陰霾四塞乎丸方主中滿熱脹
用黃芩之輕揚以降肺熱則用豬苓澤瀉以利導之故
專以潔淨府爲務無事開鬼門宣布五陽等法也

七十四小青龍湯

麻黃去節芍藥

細辛

乾薑

甘草

炙桂枝各三兩

五味子

半夏升各半

水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

徐洄溪曰此方專治水氣蓋汗爲水類肺爲水源邪汗未盡必停於肺胃之間病屬有形非一味發散所能除此方無微不到真神劑也

七十五木防已湯 木防已兩桂枝兩人參四石膏如雞子大枚水六升煮取二升分溫再服虛者卽愈實者復發去石膏加茯苓芒硝

尤拙吾曰防己桂枝一苦一辛並能行水氣而散結氣而痞堅之處必有伏陽吐下之餘定無完氣書不盡言而意可會也故又以石膏治熱人參益虛於法可謂密矣其虛者外雖痞堅而中無結聚卽水去氣行而愈其

實者中實有物氣暫行而復聚故三日復發也去石膏
加芒硝者魏柏鄉云以其旣散復聚則有堅定之物留
作包囊故以堅投堅而不破者卽以更投堅而卽破也
加茯苓者亦引飲下行之用耳

鄒潤安曰防已之莖如木故名木防已後世以其出漢
中因又名漢防已非二物也如仲聖但以防已名湯則
曰木防已湯連他物以名湯則除去木字以便稱謂耳
後人以莖爲木以根爲漢及治風治水之分均屬臆斷

七十六藿香正氣散

厚朴

陳皮

桔梗

白朮

半

夏爾

各二

大腹皮

換檳榔亦可或用蒼朾

白芷

茯苓

蘇葉

藿

香各二
兩

爲粗末每服三錢薑三片棗一枚

煎熱服

注按蘭臺軒
飴無白朮

七十七不換金正氣散

蒼朮

油浸去皮麻油拌炒黃四兩

厚朴

去皮薑汁

炒陳皮

去甘草

炙各三兩

藿香

半夏

各二兩

爲粗末每服

三錢水煎溫服或加香豉

雄按一方皆治風寒外感食滯內停或兼溼邪或吸穢氣或傷生冷或不服水土等證的是良方若溫暑熱證不兼寒溼者在所切禁今人謂其統治四時感證不審病情一概亂用殊可笑也

七十八六和湯

香薷

二

人參

茯苓

甘草

炙

扁豆

厚朴

薑製

木瓜

杏仁

去皮尖

半夏

各一錢

藿香

砂仁炒研各六

分生薑

片大棗一枚

水煎熱服一方無香薷有白朮

按汪

宜用香薷爲暑月受涼閉汗故表之也

雄按此亦治暑月外感風寒內傷生冷之劑香薷飲之万不一主治畧同皆非治暑之藥也用者辨之

七十九

五積散

蒼朮

厚朴

陳皮

桂枝

炮薑

半夏

茯苓

枳殼

桔梗

芍藥

當歸

川芎

白芷

生薑

葱白

爲粗末每服三

錢水煎服

汪按麻黃亦爲閉汗而設

雄按此治外受寒溼內挾冷食之劑

八十益黃散

陳皮

青皮

下食入太陰之倉

丁香

去脾胃中寒各二錢訶

子肉

五錢能開胃消食止痢

甘草

炙三錢

爲末每服

一二錢水煎

錢仲陽用治脾土虛寒嘔吐泄瀉

方似宜末服

不必水煎

八十一又益黃散

人參

陳皮

去白各一錢

黃耆

二錢

生甘草

炙甘草

各五分

芍藥

七分

黃連

少許

爲末每服

二錢水一

杯煎五分服

李東垣用治慢脾風

八十二星附六君湯

卽六君子湯

皮半夏

是也加製南

星白附子

附連香飲

缺

俟考

雄按本論主治熱氣深伏煩渴嘔逆必以黃連之苦降
泄熱爲君或謂卽香連丸則木香與火升作嘔者非所
宜也若寒嘔則石蓮子香飲甚妙

八十三黃連竹茹橘皮半夏湯

藥卽湯見

雄按此方於橘皮竹茹湯去生薑之溫甘草之甘加黃
連之苦寒以降諸逆衝上之火半夏之辛開以通格拒
搏結之氣用治嘔噦其效如神

八十四來復丹 太陰元精石 舶上硫黃 硝石

各一兩用

硫黃爲末微火炒成砂子大橘紅 青皮去五靈脂澄去砂炒令
白煙盡各二錢

爲末醋糊丸豌豆大每服三十九白湯下

八十五七香餅 香附

丁香皮

各一兩

甘松

八錢

益智仁

六錢砂仁

蓬蘽

廣皮

各二錢

爲末

神麴糊調勻捏成

餅子每重一二錢乾之用時杵碎水煎服

八十六平胃散

茅山蒼朮

去粗皮米泔浸五兩

紫厚朴

去皮薑汁炒

陳

皮

去白各三兩

甘草

炙二兩

爲末

每服一錢水一盞薑

片同煎七分溫服

柯韻伯曰內經以土運太過曰敦阜其病腹滿不及曰卑監其病留滿痞塞二承氣湯調胃土之敦阜此方平胃土之卑監也培其卑者而使之平非削平之謂猶溫膽湯用涼劑而使之溫非用溫之謂也

雄按柯氏此論雖已超越前賢而義猶未暢也三承氣
湯調胃土之敦阜贊矣若卑監者乃是脾德有慚土不
勝溼健運失職陽氣不升非胃病也夫脾字從卑原爲
陰土其性惡溼燥補相宜旣知脾溼去而不滯脾得補
而健運則是方也乃調脾土之卑監而名曰平胃者以
脾氣健而升則胃自平而降耳本非削平之謂也

八十七胃苓湯 卽平胃合五苓也

八十八桃核承氣湯 桃仁

五十個去皮尖

大黃

四兩

甘草

桂枝

翁芒硝

各二兩

水七升煮取二升半去滓內芒硝更上

火微沸下火先令溫服五合日三服當微利

徐云微利則僅通大

便不必定
下血也

徐洄溪曰熱甚則血凝而上干心包故神昏而如狂血得熱而行苟能自下則邪從血出亦能自愈但小腹急結是蓄血見證宜此主之

鄒潤安曰瘀血一證傷寒論金匱要畧論之最詳大凡已見熱標而無熱證脈無熱象者瘀也有所阻則應有所不通有所阻而氣化仍通者瘀也並無所阻而自謂若有所阻者瘀也有燥象而不渴不應渴而反渴者瘀也蓋氣以化而行血以行而化氣已行而結者猶結則非氣病況血應濡而不濡實非枯而似枯是非有瘀何

由得此哉

雜按余治李氏婦崩後溺滯暨顧氏婦產後小便不通皆以瘀行而愈可見病機多幻雖

聖人亦有所不能盡也故許知可治毘陵貴婦用桃仁煎而愈古之人有行之者矣王清任論病專究瘀血卽葉氏所云病久入絡義皆本於仲景也

八十九 白虎加桂枝湯

石膏一斤知母

六兩

甘草

炙二兩

梗米

桂枝三

合桂枝

二兩

剉每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服汗出愈

鄒潤安曰或問桂枝與白虎寒熱天淵安可兼用且論中諄諄以表不解禁用白虎既可兼用則何不加此而必待表解乎曰表不解不可與白虎條上文言脈浮發熱無汗乃麻黃證非特不得用白虎且不得用桂枝矣

白虎證者脈大也汗出也煩渴欲飲水也三者不兼卽非是今云其脈如平身無寒但熱時嘔皆非白虎證亦未必可用桂枝特旣與白虎則三者必具再加骨節煩疼之表則無寒不得用柴胡有汗不得用麻黃熱多又不得用附子不用桂枝和營通絡而誰用者且古人於病有分部非如後世多以陰陽五行生克爲言議藥不議病之世
雄按因
界積重難返奈何傷寒有傷寒用藥之例溫瘧有溫瘧用藥之例蓋傷寒自表入裏故有一毫未化之寒卽不可與全入者並論溫瘧自內出外裏旣全熱但有骨節煩疼一種表證卽不得全認爲熱而單用白虎故必兼

桂枝使之盡化而頤刻致和矣

九十四獸飲 卽六君子湯加草果爲散每服四五錢生

薑三片鹽少許烏梅一个水煎服

九十二露薑飲 人參 生薑等分

陰陽水煎去滓露一

宿再煎數沸溫服

葉香巖曰瘧疾之發由於受暑者多若驟用溫補截之
爲害不淺松江趙嘉柱瘧發數次用此法變血痢而死
雄按此方必邪衰正餒而纏綿不已者始可用以截之
白露降而炎暑消故取秋露以滌餘邪若秋前露自地
升不能取也

九十二鼈甲煎丸 龜甲

十一烏扇

卽射干燒

鼠婦熬

乾薑

黃芩

大黃

桂枝

石韋

毛厚朴

紫葳

阿膠

各三

分

柴胡

蜣螂

熬各六分

芍藥

牡丹皮

蘆蟲

熟各五分

草懋

熬半夏

人參

各一分

瞿麥

桃仁

各二分

蜂窠

四分炙

赤硝

分十二

爲末取鐵罐下灰一斗清酒一斛五斗浸灰俟

酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠膝絞取汁內諸

藥煎爲丸如梧子大空心服七丸日三服

雄按凡用介類之藥入丸

法皆當仿此聖

庶無流弊

王晉三曰鼈甲煎丸都用異類靈動之物若水陸飛潛升者降者走者伏者咸備焉但恐諸蟲擾亂神明取鼈甲爲君守之其泄厥陰破癥瘕之功有非草木所能比

者阿膠達表息風鼈甲入裏守神蟄蠅動而性升蜂房
毒可引下蠭蟲破血鼠婦走氣葶苈泄氣閉大黃泄血
閉赤硝煎堅桃仁破結烏扇降厥陽相火紫葳破厥陰
血結乾薑和陽退寒黃芩和陰退熱和表裏則有柴胡
桂枝調營衛則有人參白芍厚朴達原劫去其邪丹皮
入陰提出其熱石韋開上焦之水瞿麥滌下焦之水半
夏和胃而通陰陽龍灰性溫走氣清酒性喫走血統而
論之不越厥陰陽明二經之藥故久瘧邪去營衛而著
臟腑者卽非瘧母亦可借以截之金匱惟此方與薯蕷
丸藥品最多皆治正虛邪著久而不去之病非彙集氣

血之藥攻補兼施未易奏功也

雄按有形癥瘕按之不移者卽非瘧母亦可借

以緩

消

九十三六神湯

卽四君子湯加山藥扁豆

雄按二陳湯去甘草加旋

覆花石菖蒲膽南星亦名六神
湯治顛狂昏厥諸痰證極效

九十四三黃湯

黃連

酒煮

黃芩

酒炒

大黃

酒浸各等分

金匱

大黃名瀉心湯

麻沸湯一升漬之須臾絞去滓分溫再服爲末煉白

蜜丸梧子大名三黃丸去大黃加黃檗等分煎名金花

湯更加梔子名梔子金花湯

卽黃連解毒湯爲末

蜜丸名金花

丸金花湯爲末蜜丸名三補丸三黃丸加黃檗等分滴

水丸名大金花丸

張石頑曰金花湯止芩連檗三味作丸名三補金花丸
較湯多梔子作湯名解毒更加大黃則名大金花湯湯
丸雖異功用不殊但取急攻則用湯緩祛則用丸微有
區別耳

九十五甘露消毒丹

一名普濟
解毒丹

飛滑石

十五絲茵陳十
兩

兩淡黃芩

十石菖蒲

六川貝母

木通

各五
兩

藿香

射

干連翹

薄荷

白豆蔻

各四
兩

各藥曬燥生研細

見火則藥
性變熱末

每服三錢開水調服日二次或以神麴糊

丸如彈子大開水化服亦可

雄按此治溼溫時疫之主方也六元正紀五運分步每

年春分後十三日交二運徵火旺天乃漸溫芒種後十
日交三運宮土旺地乃漸溼溫溼蒸騰更加烈日之暑
燥石流金人在氣交之中口鼻吸受其氣留而不去乃
成溼溫疫癘之病而爲發熱倦怠胸悶腹脹肢痠咽腫
斑疹身黃頤腫口渴溺赤便閉吐瀉瘧痢淋濁瘡瘍等
證但看病人舌苔淡白或厚膩或乾黃者是暑溼熱疫
之邪尙在氣分悉以此丹治之立效並主水土不服諸
病汪按普濟消毒飲用芩連陳皮元參連翹甘桔升柴
病馬勃鼠黏薄荷板藍根僵蠶或加人參大黃今附載

九十六神犀丹

烏犀角尖磨汁

石菖蒲

黃芩

各六兩

真懷

生地

冷水洗淨浸透搗絞汁

銀花

各一斤如有鮮者搗汁用尤良

糞清

連翹

各十

兩

板藍根

九兩無則以飛淨青黛代之

香豉八兩

元參兩

七

花粉

紫草

七

各四兩

各生曬研細

忌用火炒

丸

切勿加蜜

如難

丸

每重三錢

涼開水化服日二次

小

兒減半如無糞清可加入中黃四兩研入

雄按溫熱暑疫諸病邪不卽解耗液傷營逆傳內陷痙厥昏狂譫語發斑等證但看病人舌色乾光或紫降或圓硬或黑苔皆以此丹救之若初病卽覺神情昏躁而舌赤口乾者是溫暑直入營分酷暑之時陰虛之體及新產婦人患此最多急須用此多可挽回切勿拘泥日數誤投別劑以償事也兼治痘瘡毒重夾帶紫斑危證

暨痘疹後餘毒內熾口糜咽腐目赤神煩諸證
方中犀角爲君
銙而煎之味極難出磨則需時緩不及待抑且價昂非
貧人所能猝辦有力者預爲合就施送則患者易得救
活必多貧者重生陰功亦大或存心
之藥鋪照本製售亦方便之一端也

九十七溫膽湯 竹茹 枳實 半夏各一兩 橘紅一兩
芩七錢甘草炙四錢 茯苓五錢 每服四五錢生薑一片紅棗一枚水
一鍾五分煎七分服

羅東逸曰膽爲中正之官清靜之府喜甯謐惡煩擾喜
柔和不喜壅鬱蓋東方木德少陽溫和之氣也是以虛
煩驚悸者中正之官以熇熱而不甯也熱嘔吐苦者清
靜之府以鬱久而不謐也痰氣上逆者土家溼熱反乘

而木不得遂其條達也如是者首當清熱及解利三焦
方中以竹茹清胃脘之陽而臣以甘草橘半通胃以調
其氣佐以枳實除三焦之痰壅使以茯苓平滲致中焦
之清氣且以驅邪且以養正三焦平而少陽平三陽正
而少陽正膽家有不清甯而和者乎和卽溫也溫之者
實涼之也晉三亦云膽氣退熱爲溫非謂膽寒而溫之
也雄按此方去薑棗加黃連治溼熱挾痰而化癥者甚妙古人所未知也

九十八 麻黃杏仁甘草石膏湯

藥師湯見

醫經指掌錄

張石頑曰此大青龍湯去桂枝越婢湯加杏仁也

雄按彼二

方有薑棗專祛上焦溼熱痰氣與芩桂朮甘湯互發彼藉芩

尤專祛心下之支飲此藉石膏專祛膈上之溼熱也

汪按

此語可商石膏除
熱非祛溼之品也

尤在涇曰汗出而喘無大熱者其邪不在經腠而在肺中故非桂枝所能發麻杏辛甘入肺散邪氣肺被邪鬱而生熱石膏辛寒入肺除熱氣甘草甘溫安中氣且以助其散邪清熱之用乃肺臟邪氣發喘之的劑也

又曰大青龍主散表寒而兼清裏熱故麻黃多於石膏此清肺熱而兼散肺邪故石膏多於麻黃

九十九白頭翁湯 白頭翁二兩 秦皮 黃連 黃檗各三兩 水七升煮取一升去滓溫服一升

柯韻伯曰三陰俱有下利證自利不渴者屬太陰是臟
有寒也自利渴者屬少陰以下焦虛寒津液不升故引
水自救也惟厥陰下利屬於熱以厥陰主肝而司相火
肝旺則氣上撞心火鬱則熱利下重溼熱穢氣奔迫廣
腸魄門重滯而難出內經云暴注下迫者是矣脈沈爲
在裏弦爲肝脈是木鬱之徵也渴欲飲水厥陰病則消
渴也白頭翁臨風偏靜長於驅風用爲君者以厥陰風
木風動則木搖而火旺欲平走竅之火必甯搖動之風
秦皮木小而高得清陽上升之象爲臣是木鬱達之所
以遂其發陳之性也黃連瀉君火可除上焦之渴是苦

以發之黃檗瀉相火可止下焦之利是苦以堅之也治
厥陰熱利有二初利用此方以升陽散火是謂下者舉
之寒因熱用法久利則用烏梅丸之酸以收火佐以苦
寒雜以溫補是謂逆之從之隨所利而行之調其氣使
之平也

雄按徐氏亦云烏梅丸治久痢之聖方也

一百縮脾飲 縮砂仁 烏梅肉 草果仁 煨各四兩
乾葛 白扁豆 各二兩 每服四錢水一椀煎八分水澄
冷服以解煩或欲溫欲熱任意服

雄按脾爲陰土喜燥而惡溼食涼飲冷則脾陽爲溼所
滯而緩縱解俟不能宣運如常矣故以砂仁草果快脾

而去其所惡之溼臣以甘草扁豆甘淡以培其正氣卽
佐葛根烏梅一以振其敷布之權一以縮其緩縱之勢
况梅能生液溼去津生最爲可法

一百二十三甲散

鼈甲

並用酥炙黃爲末各一錢

龜甲

如無酥各以醋炙代之

穿山甲

土炒黃

蟬蛻洗淨

白僵蠶切生

牡蠣煅爲

當歸

各五分

白芍

酒炒

甘草三分

蠭蟲三個

乾者擘碎鮮者杵爛

用

末

當歸

分服其滓入諸藥同煎

水二鍾煎八分瀝去滓溫服

雄按此方從金匱鼈甲煎丸脫胎

一百二白虎加蒼朮湯 卽白虎湯加蒼朮一味

葉香巖曰知母氣味苦寒入足陽明甘草氣味甘平入

足太陰石膏氣味辛寒入手太陰足陽明蒼朮氣味苦
辛溫入足太陰梗米氣味甘平入手足太陰此治暑溼
相搏而爲溼溫病者以苦寒辛寒之藥清其暑以辛溫
雄烈之藥燥其溼而以甘平之藥緩其中則賊邪正邪
皆卻病自安矣

一百三清暑益氣湯 人參 黃耆 白朮 廣皮 神
麴 澤瀉各五分 蒼朮 升麻各一錢 麥冬 炙草 葛根
當歸 黃檗各二分 青皮二分半 五味子九粒 水二盞煎
一盞去滓溫服雄按治法彙止用參耆朮草歸身橘皮
五味麥冬黃檗九味加薑棗汪按東垣
此方洞溪已譏其用藥雜亂此去蒼朮升麻葛根
是矣然猶不免近雜用此方者加減尚宜斟酌

王晉三曰此治膏粱之體因避暑而襲涼飲冷內傷脾胃抑遏真陽之劑故方中以清解與補益兼施

尤拙吾曰元氣本虛而又傷於暑溼以致四肢倦怠精

神短少懶於動作胸氣短促不思飲食脈浮緩而遲者

雄按其脈如是乃氣虛溼盛兼吸微暑也

可用此方若體實脈盛或雖虛而不甚及津涸煩渴多火者則不可混投也

雄按溼熱病篇第三十八

條後余有清暑益氣法可用也汪按夢隱所定清暑益氣方用西洋參石斛麥冬黃連竹葉荷梗知母甘草梗米西瓜翠衣十味較東垣之方爲妥然臨證尚宜加減斟酌又按傷暑倦怠投參麥五味立效然必審其無外感者若有暑邪投之其

危立至不可不慎也

雄按東垣專事升陽徐洄溪章杏雲皆深非之此方亦

從補中益氣加味魏柳洲云補中益氣湯爲東垣治內傷外感第一方後人讀其書者鮮不奉爲金科玉律然不知近代病人類多真陰不足上盛下虛者十居八九卽遇內傷外感之證投之輒增劇非此方之謬要知時代稟賦各殊耳陸麗京嘗言陰虛人誤服補中益氣往往暴脫司命者審諸今人吸煙者多陰液既已耗傷痰氣極易升逆按丹溪云素無疾者服升柴不致滿悶孫文垣云經謂升降浮沈必順之又曰天時不可伐雖宜升提之病而冬之閉藏實爲春令發生之本天人一理若不顧天時而強用升提之法是伐天和而泄元氣根本旣虧來春何以發生此等至理皆不可不知也余謂東垣立方命名本錯設當時立此培中舉陷之法名曰補中升氣湯則後人顧名思義咸知其爲

升劑矣原以升藥舉陷乃旣曰補中復云益氣後人遂
以爲參朮得升柴如黃耆得防風而功愈大旣能補脾
胃之不足又可益元氣之健行凡屬虛人皆堪服餌而
忘其爲治中虛兼外感之方再經立齋之表章每與腎
氣丸相輔而行幸張會卿一靈未泯雖好溫補獨謂此
方未可浪用奈以盧不遠之賢亦袒新甫甚矣積重之
難返也惟葉天士謂立齋用藥每執死法未免有不中
肯綮者汪按洞溪亦以立齋爲庸醫之首

一百五香薷飲 方見溼熱病篇第三十九條

五物香

燭飲 十味香薷飲 並見溼熱病篇第四十條

一百六 真人養臟湯 人參 白朮 炒焦各半錢 肉桂 詞子
肉 木香 肉豆蔻 罂粟殼 各五分 水煎溫服一方
有白芍甘草甚者加附子五分

雄按此治久瀉而脾腎虛寒、臟氣不攝之方也
汪按此方謂子
肉罌粟殼並用較益黃散更潤亦宜末服不宜煎服又
按此方必純屬虛寒者方可用若用以治暑熱之病則
必噤口告危
殺人如草矣

一百七 冷香飲子 附子 炮 陳皮 草果 各一錢 炙甘草 一錢
五分 生薑片 五分 水一鍾煎滾卽瀝井水頓冷服
雄按此方與大順散皆治陰寒冷溼之氣客於太少二

陰而爲霍亂吐下之方也多由畏熱而浴冷臥風過啖
冰瓜所致乃暑月之中寒證非病暑也若痢疾門中可
用此方之證甚屬罕見苟諦審求確切須慎之萬一誤
投噬臍奚及洞溪云如有暑邪者薑斷不可用雖佐芩
連不可救也況薑附同用而無監制之品者乎俞東扶
云昔羅謙甫治商參政與完顏小將軍二案俱用熟藥
俱不名曰暑病又吳球治遠行人一案雖在暑月直曰
中寒蓋恐後世誤以熱藥治暑特舉病因以稱之可謂
名正言順矣蓋寒暑者天地一定之陰陽不容混淆隆
冬旣有熱病盛夏豈無寒病故辨證爲醫家第一要務

辨證既明自然不惑於悠悠之謬論而無倒行逆施遺人天殃之慮矣

一百八敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

枳殼

桔梗

茯苓

甘草

薄荷

爲細末

每服二

錢水一盞

煎七分溫服或沸湯點服亦得

雄按此卽活人本方去人參薑加

薄荷

余師愚曰此足三陽藥也羌活入太陽而理遊風獨活入太陰而理伏邪兼能除痛柴胡散熱升清協川芎和血平肝以治頭痛目昏前胡枳殼降氣行痰協桔梗茯苓以泄肺熱而除溼消腫甘草和裏更以薄荷爲君取

其清涼氣味皆薄疏導經絡表散能除高巔邪熱方名

敗毒丸有以也疫證初起服此先去其爪牙

雄按爪牙者表邪之

謂也無表邪者不可用也使邪不盤踞經絡有斑卽透較升葛荆防

發表多多矣如口乾舌燥加黃芩喉痛加山豆根倍甘

桔

雄按雖加苦寒之品終嫌升散必惡寒無汗者始可用也

古方引用生薑生薑性太熟與疫證不宜以葱白易之可也

雄按喻氏論疫推服此方爲第一極言其功效之神後

人從而和之然羌獨柴芎類屬溫升考活人書治傷寒

瘟疫風溼風眩拘踠風痰頭痛目眩四肢痛憎寒壯熱項强睛疼則所治者原是風寒溼障雜感之傷寒瘟疫

並非兼治暑燥之病者余氏因熊氏先翦爪牙之說遂謂溫熱之疫初起亦當先服此方雖每服二錢尙是小劑但必外挾風寒溼之表邪者始爲合拍否則熱得風而愈熾能無亢逆之憂乎惟桔梗湯五十最爲申穀用者審之

一百九清瘟敗毒飲

生石膏

大劑六兩至八兩中劑二兩至四兩小劑八錢至一錢

兩二
錢
小生地

大劑六
錢至一
兩中
劑三
錢

至五
錢小
劑二
錢至四
錢

烏犀角
大劑六
錢

至八
錢中
劑三
錢至五
錢小
劑二
錢至四
錢

真川連
大劑四
錢至六
錢中
劑二
錢至四
錢小
劑一
錢

至一
錢半
梔子

桔梗

黃芩

知母

赤芍

元參

連

翹

甘草

丹皮

鮮竹葉

先煮石膏數十沸後下

諸藥犀角磨汁和服

此十二經泄火之藥也凡一切火熱表裏俱盛狂躁煩心口乾咽痛大熱乾嘔錯語不眠吐血衄血熱甚發斑不論始終以此爲主方蓋斑疹雖出於胃亦諸經之火有以助之重用石膏直入胃經使其敷布於十二經退其淫熱佐以黃連犀角黃芩泄心肺火於上焦丹皮梔子赤芍泄肝經之火連翹元參解散浮遊之火生地知母抑陽扶陰泄其亢甚之火而救欲絕之水桔梗竹葉載藥上行使以甘草和胃此大寒解毒之劑重用石膏則甚者先平而諸經之火自無不安矣若疫證初起惡

寒發熱頭痛如劈煩躁譫妄身熱肢冷舌刺脣焦上嘔
下泄六脈沈細而數卽用大劑沈而數者卽用中劑浮
大而數者用小劑如斑一出卽加大青葉併少佐升麻
四五分引毒外透此內化外解濁降清升之法治一得
一治十得十以視升提發表而加劇者何不俯取芻蕘
之一得乎雄按觀此說則初起不必用翦爪牙之法也
又秦皇士治斑用升麻黃連生地丹皮甘草木通名升麻清胃湯輕清涼血亦是透化斑疹之妙法誤食葷腥者加山楂砂仁

乾隆甲申余

客中州先君偶染時疫爲羣醫所誤抱恨終天曷其有
極思於此證必有以活人者公之於世亦以稍釋余懷
因讀本草言石膏性寒大清胃熱味淡氣薄能解肌熱

體沈性降能泄實熱恍然大悟非石膏不足以治熱疫
遇有其證輒投之無不得心應手三十年來頗堪自信
活人所不治者筆難罄述然一人之治人有限因人以
及人無窮困著爲疫疹一得公之於世使天下有病斯
疫者起死回生咸登壽域余心庶稍安焉桐城余霖漫
識

吳種芝曰甲寅夏久無雨暑氣盛行人多疾病病則必
死醫家齊束手不治師愚輒予以石膏黃連等劑無不
立效其得之則生不得則死者不可更僕數而余門下
奎氏兄弟一存一天尤屬明徵然存活日多而謗者日

益衆謂師愚非石膏不立劑是誣人甚至以謗師愚之
故并謂石膏爲斷不可用豈不更誣藥哉誣人旣已不
可誣藥而愚者信焉妄者傳焉雖遇熱證凶危仍以柴
葛當之不效則投以丹芩又不效則投以人參桂附按雄
粗工伎倆大率如此至於一誤再誤死而後已醫者猶詡詡得意
曰非我也命也是以謗師愚之故而累及無辜置人之
生死於弗顧也豈不大可歎哉

莊製亭曰此方分兩太重臨證時不妨量裁一二味或
減輕分兩如石膏由三五錢以至二三兩皆可取效按汪

石膏體重若止用
三五錢似嫌太少

雄按余君治祁某案後云此方醫家不敢用病家不敢服甚至藥肆不敢賣有此三不敢疫證之死於誤者不知凡幾紀文達公於癸丑年曾目擊師愚之法活人無算而謂其石膏有一劑用至八兩一人服至四斤因而疑爲司天運氣所值未可執爲通例余氏書中亦羅列運氣之說然則甲子甲申戊子丙午癸丑甲寅等年歲運並不同何以案中治法皆同乎此司天在泉之不可泥但察其時之旱潦見證之宜否爲可憑也道光中歸安江筆花治一時疫發斑用石膏至十四斤而斑始透蓋深得師愚之法者而王予中太史白田集有石膏辨

云目擊受石膏之害者甚多深以繆仲淳袁體庵爲不可法賢者尙爾無怪乎庸耳俗目之謗師愚也夫停食不消因而致死者多矣豈可歸罪於五穀以爲神農后稷作俑而令天下人辟穀耶況物性之中和莫如穀矣而霍亂痧脹一口米湯下咽卽難救治蓋一病有一病一之宜忌用得其宜硝黃可稱補劑苟犯其忌參朮不異砒硇故不可舍病之虛實寒熱而不論徒執藥性之純駁以分良毒也補偏救弊隨時而中貴於醫者之識病耳先議病後議藥中病卽是良藥汪按凡藥能治病者誤用則能移人參朮與硝黃無異也貴於中病而已乃世人無病者偏好服藥及有病又不議病而議藥醫者欲其道之行藉以謀

生相率阿世取容偶有特立之士力排衆論別出心裁
如師患者且羣目爲怪物矣欲求醫學之昌明何可得
乎此數語乃醫者之良箴處方之軌範吾願世之醫人取而三復之然讀書以明理明理
以致用苟食而不化則粗膚偏謬貽害無窮非獨石膏
爲然矣搢紳先生博覽之餘往往涉獵岐黃家言或筆
之於書或參贊親友之病世人因信其知儒遂併信其
知醫孰知紙上談兵誤人不淺呂晚村是其尤者也安
得如徐洄溪者一一而砭之哉

汪按洄溪有涉獵醫書誤人論言皆切中可以垂戒而醫貫砭一書尤極有功於醫學無如世

之庸耳俗目推尊晚村者終不肯信也可歎

一百十錫類散 象牙屑 珍珠各三分 飛青黛六分 梅花冰
片三壁錢俗名喜兒窠二十个用泥 膩上者木板上者勿用 西牛黃 人指甲

男病用女女病用男
分別合配各五釐

研極細粉密裝瓷錠內勿使泄

氣專治爛喉時證及乳蛾牙疳口舌腐爛凡屬外淫爲患諸藥不效者吹入患處瀕死可活

雄按此方尤鶴年附載於金匱翼云張瑞符傳此救人而得子故余名之曰錫類散功效甚著不能殫述

一百十二硃砂安神丸

透明硃砂

另黃連

各五分

生地

三錢

當歸

甘草

各二錢

爲細末酒泡蒸餅丸如麻子大卽

以硃砂爲衣每服三十丸臥時津液嚥下

葉仲堅曰經云神氣舍心精神畢具又云心者生之本神之舍也且心爲君主之官主不明則精氣亂神太勞

則魂魄散所以寤寐不安淫邪發夢輕則驚悸怔忡重
則癡妄顛狂硃砂具光明之體赤色通心重能鎮怯寒
能勝熱甘以生津抑陰火之浮遊以養上焦之元氣爲
安神之第一品心苦熱配黃連之苦寒瀉心熱也更佐
甘草之甘以瀉之心主血用當歸之甘溫歸心血也更
佐地黃之寒以補之心血足則肝得所藏而魂自安心
熱解則肺得其職而形自正也

一百十二集靈膏 人參 枸杞子各一斤 天冬 麥冬

生地 熟地各二十兩入兩 懷牛膝四兩酒蒸 甜水砂鍋熬膏將

成加煉白蜜六兩滾數沸收之白湯或酒調服

雄按先大父云此方始見於廣筆記云出內府又載於治法彙而無牛膝方後注血虛加當歸四兩脾弱加白朮四兩或半斤且云治一切氣血兩虛身弱欬嗽者罔不獲效凡少年但覺氣弱倦怠津液少虛火上炎急宜服之後惟魏玉橫善用此方續名醫類案內極著其功效實卽人參固本加味也或又加仙靈脾余謂峻滋肝腎之陰無出此方之右者若兼帶下遺精者宜去牛膝加黃檗大便易滑者亦去牛膝重加生薏仁理虛元鑑治勞嗽用本方去人參牛膝加元參甘桔

一百十三麥冬湯

麥冬

一兩

炙甘草

二兩

鮮竹葉

十五瓣

北棗

肉枝

兩

爲細末每服五錢粳米湯盞生煎至一盞溫服

不能服者縣漬點口中如加人參更妙

雄按此海藏方也卽金匱要略冬湯去半夏加竹葉治房勞復之氣欲絕者服之大效然外臺於此證主一味竹皮湯以竹皮堅韌能固氣液之脫而清虛火方中似不可缺又枸杞子純甘多液能補精神氣血之耗傷凡氣喘吸促根蒂欲漓者可加入兩許殊勝人參熟地也卽不因房勞而氣液兩虧不能受重劑峻補者余亦用此法接續其一綫之生機每多獲效推而廣之可以養心營可以潤肺燥汪按嗽證肺雖虛而尚有邪者麥冬究宜慎用可以緩肝急

可以補脾陰其用多矣宜易其名曰小復脈湯

小復脈湯

溫熱經緯卷五