


欽定四庫全書

子部

肘後備急方卷一



詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

子部五

肘後備急方

醫家類

提要

臣等謹案肘後備急方八卷晉葛洪原撰初  
名肘後卒救方梁陶弘景補其闕漏得一百  
一首為肘後百一方金楊用道又取唐慎微  
證類本草諸方附于肘後隨證之下為附廣  
肘后方洎元世祖至元間有烏某者得其本

于平鄉郭氏始刻而傳之段成已為之序稱  
葛陶二君共成此編而不及楊用道此本為  
明嘉靖中襄陽知府呂顯所刻始並列葛陶  
楊三序于卷首書中凡楊氏所增皆別題附  
方二字列之于後而葛陶二家之方則不加  
分析無可辨別案隋書經籍志葛洪肘後方  
六卷梁二卷陶弘景補闕肘後百一方九卷  
亡宋史藝文志止有葛書而無陶書是陶書

在隋已亡不應元時復出又陶書原目九卷  
而此本合楊用道所附祇有八卷篇帙多寡  
亦不相合疑此書本無百一方在內特後人  
取弘景原序冠之耳書凡分五十一類有方  
無論不用難得之藥簡要易明雖頗經後來  
增損而大旨精切猶未失稚川本意云乾隆  
四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官 臣陸費墀

肘後備急方序

醫有方古也古以來著方書者無慮數十百家其方殆未可以數計篇帙浩瀚苟無良醫師安所適從况窮鄉遠地有病無醫有方無藥其不罹夭折者幾希丹陽葛稚川夷考古今醫家之說驗其方簡要易得鍼灸分寸易曉必可以救人於死者為肘後備急方使有病者得之雖無韓伯休家自有藥雖無封君達人可以為醫其以備急固宜華陽陶弘景曰葛之此製利世實多但行



之既久不無謬誤乃著百一方疏于備急之後訛者正  
之缺者補之附以炮製服食諸法纖悉備具仍區別內  
外他犯為三條可不費討尋開卷見病其以備急益  
宜葛陶二君世共知為有道之士於學無所不貫於術  
無所不道然猶積年僅成此編蓋一方一論已試而後  
錄之非徒採其簡易而已人能家置一帙遇病得方方  
必已病如歷卞和之肆舉皆美玉入伯樂之廐無非駿  
足可以易而忽之邪葛自序云人能起信可免天橫意

可見矣自天地大變此方湮沒幾絕間一存者闕以自  
寶是豈制方本意連帥烏侯夙多疹疾宦學之餘留心  
于醫藥前按察河南北道得此方於平鄉郭氏郭之婦  
翁得諸汴之掖庭變亂之際與身存亡未嘗輕以示人  
迨今而出焉天也侯命工刻之以趣其成唯恐病者見  
方之晚也雖然方之顯晦而人之生死休感係焉出自  
有時而隱痛惻怛如是其急者不忍人之心也有不忍  
人之心斯有不忍人之政矣則侯之仁斯民也豈直一

方書而已乎方之出乃吾仁心之發見者也因以序見  
命特書其始末以告夫未知者至元丙子季秋稷亭段  
成已題

次定回車金書

肘後備急方

救卒中惡死方第一

方取...

故...

晉 葛洪 撰

絕皆是中惡救用此方  
若入七八寸若使目中  
中葛嘗言此云吹鼻

次定回車金書

肘後備急方

一

金匱要略卷一  
又方令二人以衣壅口吹其兩耳極則易又可以筒吹之並捧其肩上側身遠之莫臨死人上

又方以葱葉刺耳耳中鼻中血出者莫恠無血難治有血是候時當捧兩手忽放之須臾死人自當舉手撈人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻中令入七八寸餘大效亦治自縊死與此扁鵲方同

又方以綿漬好酒中須臾置死人鼻中手按令汁入鼻中并持其手足莫令驚

又方視其上唇裏絃絃者有白如黍米大以針決去之  
又方以小便灌其面數迴即能語此扁鵲方法

又方取阜茨如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣

又方灸其唇下宛宛中承漿穴十壯大效矣

又方割雄鷄頸取血以塗其面乾復塗并以灰營死人  
一周

又方以管吹下部令數人互吹之氣通則活

又方破白犬以搗心上無白犬白鷄亦佳

又方取雄鴨就死人口上斷其頭以熱血瀝口中并以竹筒吹其下部極則易人氣通下即活

又方取牛馬糞尚濕者絞取汁灌其口中令人喉若口已禁者以物強發之若不可強者乃扣齒下若無新者以人溺解乾者絞取汁此扁鵲法

又方以繩圍其死人肘腕男左女右畢伸繩從背上大椎度以下又從此灸橫行各半繩此法三灸各三即起

又方令爪其病人人中取醒不者捲其手灸下文頭隨  
年

又方灸鼻人中三壯也

又方灸兩足大指爪甲聚毛中七壯此華佗法一云三

七壯

又方灸臍中百壯也

扁鵲法又云斷狫尾取血飲之并縛狫以枕之死入須

臾活



又云半夏末如大豆吹鼻中

又方搗女青屑重一錢七開口內喉中以水苦酒立活  
按此前救卒死四方并後尸癘事並是魏大夫傳中正  
一真人所說扁鵲受長桑公子法尋此傳出世在葛後  
二十許年無容知見當是斯法久已在世故或言楚王  
或言趙王兼立語次第亦參差故也

又張仲景諸要方搗薤汁以灌鼻中

又方割丹雄鷄冠血管吹內鼻中

又方以鷄冠及血塗面上灰圍四邊立起

又方猪脂如鷄子大苦酒一升煮沸以灌喉中

又方大豆二七枚以鷄子白并酒和盡以吞之

救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮消以漬脚令

沒踝

救卒死而目閉者騎牛臨面搗薤汁灌之耳中吹阜莢

鼻中立效

救卒死而張目及吐舌者灸手足兩爪後十四壯了飲以

五毒諸膏散有巴豆者

救卒死而四支不收矢便者馬矢一升水三斗煮取二斗以洗之又取牛洞一升溫酒灌口中洞者稀糞也  
灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯差

若救小兒卒死而吐利不知是何病者馬矢一九絞取汁以吞之無濕者水煮取汁

又有備急三物丸散及裴公膏並在後備急藥條中救卒死尤良亦可臨時合用之凡卒死中惡及尸魔皆天

地及人身自然陰陽之氣忽有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可治而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可以符術而獲濟者

附方

扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者為治皆參用此方

搗菖蒲生根絞汁灌之立差尸廢之病卒死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是也亦此方治之

孫真人治卒死方以阜角末吹鼻中

救卒死尸魔方第二

尸魔之病卒死而脉猶動聽其耳中循循如嘯聲而股間暖是也耳中雖然嘯聲而脉動者故當以尸魔救之方

以管吹其左耳中極三度復吹右耳三度活

又方搗乾菖蒲以一棗核大著其舌下

又方灸鼻人中七壯又灸陰囊下去下部一寸百壯若

婦人灸兩乳中間又云爪刺人中良久又針人中至  
齒立起

此亦全是魏大夫傳中扁鵲法即趙太子之患又張仲  
景云尸一蹙脉動而無氣氣閉不通故靜然而死也

以菖蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下又  
云扁鵲法治楚王效

又方剔左角髮方二寸燒末以酒灌令入喉立起也

又方以繩圍其臂腕男左女右繩從大椎上度下行脊

上灸繩頭五十壯活此是扁鵲秘法

又方熨其兩脇下取竈中墨如彈丸漿水和飲之須臾三四以管吹耳中令三四人更互吹之又小管吹鼻孔梁上塵如豆著中吹之令入差

又方白馬尾二七莖白馬前脚目二枚合燒之以苦酒丸如小豆開口吞二丸須臾服一丸

又方針百會當鼻中入髮際五寸針入三分補之針足大指甲下肉側去甲三分又針足中指甲上各三分

大指之內去端韭葉又針手少陰銳骨之端各一分  
又方灸臙中穴二十八壯

救卒客忤死方第三

客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞  
痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人救之方

灸鼻人中三十壯令切鼻柱下也以水漬粳米取汁  
一二升飲之口已噤者以物強發之

又方搗墨水和服一錢七



又方以銅器若瓦器貯熱湯器著腹上轉冷者撤去衣器親肉大冷者易以熱湯取愈則止

又方以三重衣著腹上銅器著衣上稍稍少許茅於器中燒之茅盡益之勿頓多也取愈乃止

又方以繩橫度其人口以度其臍去四面各一處灸各三壯令四火俱起差

又方橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯  
又方真丹方寸匕蜜三合和服口噤者折齒下之

扁鵲治忤有救卒符并服鹽湯法恐非庸世所能故不載而此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之

已死者搗生菖蒲根絞取汁含之立差

卒忤停尸不能言者桔梗燒二枚末之服

又方末細辛桂分等內口中

又方鷄冠血和真珠丸如小豆內口中與三四枚差

若卒口噤不開者末生附子置管中吹內舌下即差矣

又方人血和真珠如梧桐子大二丸折齒納喉中令下  
華佗卒中惡短氣欲死灸足兩拇指上甲後聚毛中各  
十四壯即愈未差又灸十四壯前救卒死方三七壯已  
有其法

又張仲景諸要方麻黃四兩杏仁七十枚甘草一兩以  
水八升煮取三升分令咽之通治諸感忤

又方韭根一把烏梅二十箇茱萸半斤以水一斗煮之  
以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死煮得三升與

飲之

又方桂一兩生薑三兩梔子十四枚豉五合搗以酒三升攪微煮之味出去滓頓服取差

飛尸走馬湯巴豆二枚杏仁二枚合綿纏椎令碎著熱湯二合中指捻令汁出便與飲之炊間頓下飲差小量之通治諸飛尸鬼擊

又有諸丸散並在備急藥中客者客也忤者犯也謂客氣犯人也此蓋惡氣治之多愈雖是氣來鬼鬼毒厲之

氣忽逢觸之其衰歇故不能如自然惡氣治之入身而  
侵尅藏府經絡差後猶宜更為治以消其餘勢不爾亟  
終為患今有時輒發

附方

外臺秘要治卒客忤停尸不能言細辛桂心等分內口  
中

又方燒桔梗二兩末米飲服仍吞麝香如大豆許佳

廣利方治卒中客忤垂死麝香一錢重研和醋二合服

之即差

治卒得鬼擊方第四

鬼擊之病得之無漸卒著如人刀刺狀胃脇腹內絞急  
切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名鬼  
排治之方

灸鼻下人中一壯立愈不差可加數壯

又方升麻獨活牡桂分等末酒服方寸匕立愈

又方灸臍下一寸三壯

又方灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取差

又方熟艾如鴨子大三枚水五升煮取二升頓服之

又方鹽一升水二升和攪飲之并以冷水噀之勿令即

得吐須臾吐即差

又方以粉一撮著水中攪飲之

又方以淳酒吹內兩鼻中

又方斷白犬一頭取熱犬血一升飲之

又方割鷄冠血以瀝口中令一咽仍破此鷄以揜心下

冷乃弃之於道邊得烏鷄彌佳妙

又方牛子矢一升酒三升煮服之大牛亦可用之

又方刀鞘三寸燒末水飲之

又方燒鼠矢末服如黍米不能飲之以少水和內口中

又有諸丸散並在備急藥條中今巫實見人忽有被鬼神所擺拂者或犯其行伍或遇相觸突或身神散弱或愆負所貽輕者因而獲免重者多見死亡猶如燕簡輩事非為虛也必應死亦不可要自不得不救爾



附方

古今錄驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕即言實也

治卒魘寐不寤方第五

卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而多唾其面即活又治之方

末皂角管吹兩鼻中即起三四日猶可吹又以毛刺鼻孔中男左女右展轉進之

又方以蘆管吹兩耳并取病人髮二七莖作繩納鼻孔  
中割雄鷄冠取血以管吹入咽喉中大效

又方末竈下黃土管吹入鼻中末雄黃并桂吹鼻中並  
佳

又方取井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名即  
便起也

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口  
中

又方以鹽湯飲之多少約在意

又方以其人置地利刀畫地從肩起男左女右令周面以刀鋒刺病人鼻令入一分急持勿動其人當鬼神語求哀乃問阿誰何故來當自乞去乃以指滅向所畫地當肩頭數寸令得去不可不具詰問之也

又方以瓦甌覆病人面上使人疾打破甌則寤

又方以牛蹄或馬蹄臨魘人上亦可治卒死青牛尤佳  
又方擣雄黃細篩管吹納兩鼻中桂亦佳

又方菖蒲末吹兩鼻中又末內舌下

又方以甌帶左索縛其肘後男左女右用餘梢急絞之  
又以麻縛脚乃詰問其故約勅解之令一人坐頭守  
一人於戶內呼病人姓名坐人應曰諾在便蘇

卒魘不覺灸足下大指聚毛中二十一壯

人喜魘及惡夢者取火死灰著履中合枕

又方帶雄黃男左女右

又方灸兩足大指上聚毛中灸二十壯

又方用真麝香一子於頭邊

又方以虎頭枕尤佳

辟魘寐方取雄黃如棗核繫左腋下令人終身不魘寐  
又方真赤燭方一尺以枕之

又方作犀角枕佳以青木香內枕中并帶

又方魘治卒魘寐久書此符於紙燒令黑以少水和之  
內死人口中懸鑑死者耳前打之喚死者名不過半

日即活

魔卧寐不寤者皆魂魄外遊為邪所執錄欲還未得所  
忌火照火照遂不復入而有燈光中魔者是本由明出  
但不反身中故耳

附方

千金方治鬼魔不悟卓焚末刀圭起死人

治卒中五尸方第六

五尸者

飛尸 遁尸 風尸 沉尸 尸  
注也今所載方兼治之

其狀腹痛脹急不得氣

息上衝心胸旁攻兩脇或礫塊涌起或攣引腰脊兼治

之方

灸乳後三寸十四壯男左女右不止更加壯數差

又方灸心下三寸六十壯

又方灸乳下一寸隨病左右多其壯數即差

又方以四指尖其痛處下灸指下際數壯令人痛上爪其鼻人中又爪其心下一寸多其壯取差

又方破鷄子白頓吞之口閉者內喉中搖頓令下立差  
又方破鷄子白吞七枚不可再服

又方理當陸根熬以囊貯更番熨之冷復易雖有五尸

之名其例皆相似而有小異者飛尸者遊走皮膚洞穿藏府每發刺痛變作無

常也遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作也風尸者淫躍四肢不知痛之所在每

發昏恍得風雪便作也沈尸者纏結藏府衝心脇每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沈重精神錯雜常

覺惛廢每節氣改變輒致大惡此一條別有治後藥也凡五尸即身中屍鬼接引

也共為病害經術甚有消滅之方而非世徒能用今復

撰其經要以救其敝方

雄黃一兩大蒜一兩令相和似彈丸許內二合熱酒



金匱要略卷一  
中服之須臾差未差更作已有癰者常畜此藥也

又方乾薑桂分等末之鹽三指撮熬令青末合水服之即

差

又方搗蒺藜子蜜丸服如胡豆二丸日三

又方粳米二升水六升煮一沸服之

又方猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相和頓服即

差

又方掘地作小坎水滿中熟攪取汁服之

又方取屋上四角茅內銅器中以三尺布覆腹著器布  
上燒茅令熱隨痛追逐蹠下痒即差若瓦屋削取四  
角柱燒之亦得極大神良者也

又方桂一尺薑一兩巴豆三枚合搗末苦酒和如泥以  
傅尸處燥即差

又方烏白根剉二升煮令濃去滓煎汁凡五升則入水  
一兩服五合至一升良

又方忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如鷄子一

枚日二三服佳也

又方燒亂髮熬杏仁等分搗膏和丸之酒服桐子大三  
丸日五六服

又方龍骨三分藜蘆二分巴豆一分搗和井花水服如  
麻子大如法丸

又方漆葉暴乾搗末酒服之

又方鼈肝一具熟煮切食之令盡亦用蒜齏

又方斷鼈頭燒末水服可分為三度當吐如肉者不盡後

發更作

又方雄黃一分梔子十五枚芍藥一兩水三升煮取一升半分再服

又方梔子二七枚燒末服

又方乾薑附子各一兩桂二分巴豆三十枚去心並生用搗篩蜜和搗萬杵服二丸如小豆大此藥無所不治

又飛尸入腹刺痛死方凡犀角射罔五注丸並是好藥

金匱要略卷之八  
治尸注鬼注方第七  
別在大方中

治卒有物在皮中如蝦蟆宿昔下入腹中如杯不動搖  
掣痛不可堪過數日即煞人方

巴豆十四枚龍膽一兩半夏土瓜子各一兩桂一斤半合  
搗碎以兩布囊貯蒸熱更番以熨之亦可煮飲少少服之  
此本在雜治中病名曰陰尸得者多死

治尸注鬼注方第七

尸注鬼注病者葛云即是五尸之中尸注又挾諸鬼邪

為害也其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝怵怵默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復傳之旁人乃至滅門覺知此候者便宜急治之方

取桑樹白皮曝乾燒為灰得二斗許著甑中蒸令氣泆便下以釜中湯三四斗淋之又淋凡三度極濃止澄清取二斗以漬赤小豆二斗一宿曝乾乾復漬灰汁盡止乃濕蒸令熟以羊肉若鹿肉作羹進此豆飯

初食一升至二升取飽滿微者三四斗愈極者七八斗病去時體中自覺疼痒淫淫或若根本不拔重為之神驗也

又方桃仁五十枚破研以水煮取四升一服盡當吐吐病不盡三兩日更作若不吐非鬼注

又方杜蘅一兩莖一兩人參半兩許瓠子二七枚松蘿六銖赤小豆二七枚搗末散平旦溫服方寸七晚當吐百種物若不盡後更服之也

又方獺肝一具陰乾搗末水服方寸匕日三一具未差  
更作姚云神良

又方朱砂雄黃各一兩鬼白茵草各半兩巴豆四十枚  
去心皮蜈蚣兩枚搗蜜和丸服如小豆不得下服二  
丸亦長將行之姚氏燒髮灰熬杏仁紫色分等搗加  
脂豬脂和酒服梧桐子大日三服差

又有華佗狸骨散龍牙散羊脂丸諸大藥等並在大方  
中及成帝所受淮南丸並療症易減門女子小兒多注



車注船心悶亂頭痛吐有此疾者宜辟方

車前子車下李根皮石長生徐長卿各數兩分等麤搗作方囊貯半合繫衣帶及頭若注船下暴慄以和此共帶之又臨入船刻取此船自燒作屑以水服之

附方

子母秘錄治尸注燒亂髮如鷄子大為末水服之差食醫心鏡主傳尸鬼氣咳嗽瘰癧注氣血氣不通日

漸羸瘦方桃仁一兩去皮尖杵碎以水一升半煮汁  
著米煮粥空心食之

治卒心痛方第八

治卒心痛桃白皮煮汁宜空腹服之

又方桂末若乾薑末二藥並可單用溫酒服方寸匕須  
臈六七服差

又方驢矢絞取汁五六合及熱頓服立定

又方東引桃枝一把切以酒一升煎取半斤頓服大效

又方生油半合溫服差

又方黃連八兩以水七升煮取一升五合去滓溫服五合每日三服

又方當戶以坐若男子病者令婦人用一杯水以飲之若婦人病者令男子用一杯水以飲之得新汲水尤佳又以蜜一分水二分飲之益良也

又方敗布裹鹽如彈丸燒令赤末以酒一盞服之

又方煮三沸湯一升以鹽一合攪飲之若無火作湯亦

可用水

又方閉氣忍之數十度并以手大指按心下宛宛中取  
愈

又方白艾成熟者三升以水三升煮取一升去滓頓服  
之若為客氣所中者當吐出蟲物

又方苦酒一杯鷄子一枚著中合攪飲之好酒亦可用  
又方取竈下熱灰篩去炭分以布囊貯令灼灼爾便更  
番以熨痛上冷更熬熱

又方蒸大豆若煮之以囊貯更番熨痛處冷復易之

又方切生薑若乾薑半升以水二升煮取一升去滓頓

服

又方灸手中央長指端三壯

又方好桂削去皮搗篩溫酒服三方寸匕不差者須臾  
可六七服無桂者末乾薑佳

又方橫度病人口折之以度心厭下灸度頭三壯

又方畫地作五行字撮中央土以水一升攪飲之也

又方吳茱萸二升生薑四兩豉一升酒六升煮三升半  
分三服

又方人參桂心梔子擘甘草炙黃芩各一兩水六升煮  
取二升分三服奇效

又方桃仁七枚去皮尖熟研水合頓服良亦可治三十  
年患

又方附子二兩炮乾薑一兩搗蜜丸服四丸如梧子大  
日三

又方吳茱萸一兩半乾薑淮上桂心一兩白朮二兩人參橘皮椒去閉口及子汗甘草炙黃芩當歸桔梗各一兩附子一兩半炮搗篩蜜和為丸如梧子大日三稍加至十九十五丸酒飲下飯前食後任意效驗

又方桂心八兩水四升煮取一升分三服

又方苦參三兩苦酒升半煮取八合分再服亦可用水

無煮者生亦可用

又方龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服

又方吳茱萸五合桂一兩酒二升半煎取一升分二服  
效

又方吳茱萸二升生薑四兩豉一升酒六升煮取二升  
半分爲三服

又方白鷄一頭治之如食法水三升煮取二升去鷄煎  
汁取六合內苦酒六合入真珠一錢復煎取六合內  
末麝香如大豆二枚頓服之

又方桂心當歸各一兩梔子十四枚搗爲散酒服方寸



七日三五服亦治久心病發作有時節者也

又方桂心二兩烏頭一兩搗節蜜和為丸一服如梧子大三丸漸加之

暴得心腹痛如刺方苦參龍膽各二兩升麻梔子各三兩苦酒五升煮取二升分二服當大吐乃差

治心疝發作有時激痛難忍方真射菌吳茱萸分等搗末蜜和丸如麻子服二丸日三服勿喫熟食

又方灸心鳩尾下一寸名巨闕及左右一寸並百壯又

與物度頸及度脊如之令正相對也凡灸六處

治久患常痛不能飲食頭中疼重方烏頭六分椒六分

乾薑四分搗末蜜丸酒飲服如大豆四丸稍加之

又方半夏五分細辛五分乾薑二分人參三分附子一分搗末苦酒和丸如梧子大酒服五丸日三服

治心下牽急懊痛方桂三兩生薑三兩枳實五枚水五升煮取三升分三服亦可加朮二兩膠飴半斤

治心肺傷動冷痛方桂心二兩猪腎二枚水八升煮取

三升分三服

又方附子二兩乾薑一兩蜜丸服四丸如梧子大日三服

治心痺心痛方蜀椒一兩熬令黃末之以狗心血丸之如梧子服五丸日五服

治心下堅痛大如椀邊如旋梓名為氣分飲水所結方枳實七枚炙朮三兩水一斗煮取三升分為三服當稍軟也

若心下百結積來去痛者方吳茱萸末一升真射蔴如  
彈丸一枚合搗以鷄子白和丸丸如小豆大服二丸  
即差

治心痛多唾似有蟲方取六畜心生切作十四瓣刀蹤  
橫各割之以真丹一兩粉內割中旦悉吞之入雄黃  
麝香佳

飢而心痛者名曰飢疝龍膽附子黃連分等搗篩服一  
錢七日三度服之

附方

藥性論主心痛中惡或連腰臍者

鹽如鷄子大青布裏燒赤內酒中頓服當吐惡物

拾遺序延胡索止心痛末之酒服

聖惠方治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雄黃二兩好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下

又方治九種心痛妨悶用桂心一分為末以酒一大盞

煎至半盞去滓稍熱服立效

又方治寒疝心痛四肢逆冷全不飲食用桂心二兩為散不計時候熱酒調下一錢匕

外臺秘要治卒心痛乾薑為末水飲調下一錢

又方治心痛當歸為末酒服方寸匕

又必效治蝟心痛熊膽如大豆和水服大效

又方取鰻鱺魚淡炙令熟與患人食一二枚永差飽食

彌佳

經驗方治四十年心痛不差黍米淘汁溫服隨多少

經驗後方治心痛薑黃一兩桂穰三兩為末醋湯下一

錢七

簡要濟衆治九種心痛及腹脇積聚滯氣筒子乾漆二

兩搗碎炒煙出細研醋煮麵糊和丸如梧桐子大每

服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服

姚和衆治卒心痛郁李仁三七枚爛嚼以新汲水下之

飲溫湯尤妙須臾痛止却煎薄鹽湯熱呷之

兵部手集治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜  
醞醋煮頓服之取飽不用著鹽

治卒腹痛方第九

治卒腹痛方書舌上作風字又畫紙上作兩蜈蚣相交  
吞之

又方搗桂末服三寸匕苦酒人參上好乾薑亦佳

又方粳米二升以水六升煮二七沸飲之

又方食鹽一大把多飲水送之忽當吐即差



又方掘土作小坎水滿坎中熟攪取汁飲之

又方令人騎其腹溺臍中

又方米粉二升水二升和飲

又方使病人伏卧一人跨上兩手抄舉其腹令病人自縱重輕舉抄之令去床三尺許便放之如此二七度止拈取其脊骨皮深取痛引之從龜尾至頂乃止未愈更為之

又方令卧枕高一尺許挂膝使腹皮踈氣入胃令人抓

其臍上三寸便愈能乾咽吞氣數十遍者彌佳此方亦治心痛此即伏氣

治卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死方搗沙參末篩服方寸匕立差

此本在雜治中謂之寒疝亦名陰疝此治不差可服諸利丸下之作走馬湯亦佳

治寒疝腹痛飲食下唯不覺其流行方椒二合乾薑四兩水四升煮取二升去滓內飴一斤又煎取半分再

服數數服之

又方半夏一升桂八兩生薑一升水六升煮取二升分  
為三服

治寒疝來去每發絞痛方吳茱萸三兩生薑四兩豉二  
合酒四升煮取二升分為二服

又方附子一枚椒二百粒乾薑半兩半夏十枚大棗三  
十枚粳米一升水七升煮米熟去滓一服一升令盡  
又方肉桂一斤吳茱萸半升水五升煮取一升半分再

服

又方牡蠣甘草桂各二兩水五升煮取一升半再服

又方宿烏鷄一頭治如食法生地黃七斤合細剉之著甑中蔽蒸銅器承須取汁清旦服至日晡令盡其間當下諸寒癖訖作白粥漸食之久疝者下三劑

附方

博濟方治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疔刺山梔子川烏頭等分生搗為末以酒糊丸如梧桐子大每服

十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香蔥酒任下  
二十九

經驗方治元藏氣發久冷腹痛虛瀉

應急大效玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已上滾細研  
以蒸餅為丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食  
壓之

子母秘錄治小腹疼青黑或亦不能喘苦參一兩醋一  
升半煎八合分二服

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出以丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢七佳

治心腹俱痛方第十

治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕方取梔子十四枚豉七合以水二升先煮豉取一升二合絞去滓內梔子更煎取八合又絞去滓服半升不愈者盡服之

又方浣小衣飲其汁一二升即愈

又方桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無

桂者著乾薑亦佳

又方烏梅二七枚以水五升煮一沸內大錢二七枚煮得二升半強人可頓服羸人可分為再服當下便愈

又方茱萸二兩生薑四兩豉三合酒四升煮取二升分為三服即差

又方乾薑一兩巴豆二兩搗蜜丸一服如小豆一丸當吐下差

治心腹相連常脹痛方狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸

如梧子大日一服一丸二日二丸三日後服三丸再  
一丸至六日服三丸自一至三以常服即差

又方吳茱萸一合乾薑四分附子細辛人參各二分搗  
篩蜜丸如梧子大服五丸日三服

凡心腹痛若非中惡霍亂則是皆宿結冷熱所為今此  
方可採以救急差後要作諸大治以消其根源也

附方

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五



金定山房全書  
卷一  
合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐更服  
孫真人方治心腹俱痛以布裏椒薄注上火熨令椒汗  
出良

十全方心脾痛以高良薑細剉炒杵末米飲調下一錢  
七立止

治卒心腹煩滿方第十一

治卒心腹煩滿又胸脇痛欲死方以熱湯令灼灼爾漬  
手足復易秘方

又方青布方寸鹿角三分亂髮灰一錢七以水二升煮  
令得一升五合去滓盡服之

又方剉薏苡根濃煮取汁服三升

又方取比輪錢二十枚水五升煮取三沸日三服

又方搗香菜汁服一二升水煮乾薑亦佳

又方即用前心痛梔子豉湯法差

又方黃芩一兩杏仁二十枚牡蠣一兩水三升煮取一

升頓服

治厥逆煩滿常欲嘔方小草桂細辛乾薑椒各二兩附  
子二兩炮搗蜜和丸服如桐子大四丸

治卒吐逆方灸乳下一寸七壯即愈

又方灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸  
兩手中央長指爪下一壯愈

此本雜治中其病亦是痰壅霍亂之例兼宜依霍亂條  
法治之人卒在此上條患者亦少皆因他病兼之耳或  
從傷寒未復或從霍亂吐下後虛燥或是勞損服諸補

藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲挾毒或服藥失度並宜各循其本源為治不得專用此法也

附方

千金方治心腹脹短氣以草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯下半錢

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿方厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑為度搗篩如麴以陳米飲調下

二錢七日三服良亦治反胃止瀉甚妙

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胸滿悶

不蛀皂角去皮子塗好醋炙令焦為末一錢七巴豆  
七枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大  
每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸  
以利為度如常服消酒食

梅師方治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷即  
易之

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令  
軟時時含一棗大嚙津



肘後備急方卷一

總校官進士臣朱鈺

校對官中書臣趙秉淵

謄錄監生臣孫承基