

三因極一方



十五
十六

耳	口	頭疼	瘡 ^{去十六}	癩風	腸癰	癩瘡 ^{卷十五}
齒	眼	丹毒	癬	五疔	癩瘤	
舌	鼻	癰癧	妬精瘡	辯腸風論	附骨疽	
咽喉	唇	胡臭	大風	瘡瘍	丁腫	

庫	文	閣	內
三〇〇	函	一五三九	漢書
架	冊	號	類

漢	一三五三九	冊架函號類
內閣文庫	番號	漢 12539
	冊數	8 (7)
	函號	300 209





三因經一病證方論卷之十五

夫九漏形疹皆瘰癧於項腋之間發作寒熱其根在臟腑千
 金所叙雖名九漏別錄方證其名更多狼漏根於肝得之憂
 怒鼠漏根於胃得之食鼠毒蜂蝮漏根於大腸得之食菓蜂
 漏根於脾得之飲流水有蜂毒虬蟬漏根於腎得之食中有
 虬蟬毒疥蝨漏根於心得之喜怒哀泣浮蛆漏根於膽得之
 思慮瘰癧漏根於腎得之新沐髮轉脈漏根在小腸得之驚
 臥失枕此等因證文義不明末知所始若以理例較之怒根
 在肝鼠毒在胃食瓜菓在大腸蜂蝮在脾姑且通俗易曉如
 轉脈因驚根當在膽却云在小腸浮蛆因思慮根當在脾却
 云在膽瘰癧因沐髮亦不當在腎名義不通似難者據又况
 哭怒得疥蝨之名思慮則浮蛆之名此尤不可曉也其外更

有以漏冷漏蝎^下漏蛭^下漏蛆^下漏蝮^下漏等名状不一漏上
諒皆出於上俗隨象命名耳難以者據治之法觀其未着於
肌内而外為膿血者從本引末可使裏去針之矣之傳之角
之從其所因宣通本臟皆有成法千金又有决死生及其目
視其中有赤脉從上下貫童子見一脉一歲死見一脉半一
歲半死二脉二歲死三脉三歲死赤脉不下貫童子可治虫
有是說驗之病者少有是證亦難攻據此徑是三陽傳諸
陰經方有之若本臟發未必有是象者知之
必勝丸治癩瘡不以年深日近及腦後兩邊有小結連復教

个兼勞瘵腹内有塊

鯽魚

一个去腸肚并子入雄黃一立雞子大硃砂一糸在腹内
仰安魚於炭火上燒烟尽取出以全蜈蚣一条蓬术半升槐
子五个皂角二挺並燒草麻子五个去皮灯上燒更用黃明膠
文皂角二挺去皮酥炙

右為末別用皂角二挺去皮槌碎以水三椀揉汁去滓

煮精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研
成膏和菜末丸如菽豆大朱砂為衣温酒侵晨下十九
日一服至晚下由疔疽子若項有五个則以五服菜取
之視其所生多少以為服數既可更進教服如熱毒瘡
瘡未有頭腦者一服亦須消散

白花蛇散治九漏癩癰發於項腋之間增寒發熱或痛或不

白花蛇 酒浸軟去皮骨 焙乾秤二兩 生犀 鎊半 黑牽牛 生兩半 生半炒 青皮 兩

右為末每服二錢賦粉半錢研勻五更糯米飲調下已
時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌發
瓜壅熱物如已成瘡一月可效用之神驗

四聖散治癩瘡用花蛇散取轉後須用此補之求去根本

海藻 洗 石決明 煨 羌活 霍麥穗 各等分

右為末每服二錢米湯調下日三服下清水尽為佳

蝸牛散治瘰癧瘻與未潰皆可貼

蝸牛 不拘多少以竹索串
尾上曬乾燒存性

右為末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量病大小貼之
一法以帶殼蝸牛七個生取肉入丁香七枚於七殼內
燒存性與由同研成膏用紙花貼之

早蓮子丸治少長臟氣不平憂怒驚恐諸氣柳鬱結聚瘰癧
滯番項腋及外傷風寒燥濕飲食百毒結成諸漏發作寒
熱遍千項腋元問久近悉主之

早蓮子 連翹子 威灵仙 何首烏 蔓荊子

三稜 醋浸温 赤芍藥 各一兩 木香 二兩 大皂角 三塊粘去皮碎矣
元酥用半兩矣

右為末糊丸梧子大建茶清下三十九至五十九日三
服小兒量與之食後服

瘰癧證治

夫血氣凝滯結瘰癧者與癰疽不同所因一也瘰癧多着於
肩項痛則隨氣凝結此等皆年教深遠浸大浸長堅硬不可
移者名曰石瘰皮色不變即名由瘰筋脉露結者名筋瘰赤
脉文絡者名血瘰隨憂愁消長者名氣瘰五瘰皆不可妄決
破決破則膿血崩潰多致大柱痛則有五骨痛脂痛由瘰膿
瘡血瘡亦不可決潰由瘡尤不可治人則殺人唯脂瘡破而
去其脂粉則愈

破結散治石瘰氣瘰勞瘰土瘰真瘰等證

海藻洗 毒膽 海蛤 通草 昆布洗
礬石 粘 松蘿 各三分 麥麩 四分 半夏

右為末酒服方寸七日三忌鯽魚猪肉五辛生菜諸雜
毒物十日知二十日愈

白膏治一切風熱毒腫及臟氣鬱結丹石發動結為癰疽瘰

癰諸瘡腫未破即令消散九漏浸陰膿汁淋漓諸治不羗者
患主之

白欵 白薇 白及 白芷 薤白 各半 西對

洗以清油一斤 至半斤 黃芪 甘松 藿香

零陵香 防風 當釀 各半兩 再入藥油 十上大綿 去滓入

定粉 二兩 黃蠟 三兩 寒水石 二兩 研細

右再藥滴水成珠為度磁器盛之腦子少許糝其上以上
藥時忌鐵器以柳枝梳

附骨疽證治

附骨疽與白虎飛尸癰即風骨相類歷節則走陸不定白虎
飛尸痛浸按之則硬附骨疽痛深按之无益又一說白虎飛
尸亦能作膿著骨而生及其腐清碎骨出尽方愈如是則附
骨疽與白虎飛尸是一病但深淺不同耳白虎飛尸又俗名

瓜然病附骨疽少有骨出者宜按執不可一向泥互香毒
連翹漏芦之屬當先濕腎如君室膏乃神藥唯在針烙淺深
刺按其毒根則易愈不尔則順脉流走遍体洪腫卒致不救
蟾蜍膏治附骨疽又不羗膿汁敗壞或骨從瘡孔出

大蠍蟻 一枚 乱髮 一塊 雞子大 猪脂油

右同藥二物畧尽瀝去滓凝如膏貼之丸欲貼瘡須先
以素白皮烏豆葉湯淋洗拭乾以蠶骨煨為粉糝瘡四
边令易收然後方用貼藥

黑鯽膏治附骨疽腫熱未破已破或膿出不愈

黑色鯽魚 一斤 去腸肚入白

右釀石器中煮一盞木尽魚乾焦為末脂油調傳已破
則乾糝少痛勿怪

赤木丸治附骨疽膿出淋漓久不羗已破未破皆可服

赤木 二斤米泔浸三宿取出洗淨曬乾再入大麻膏

煮黑油出洗 破故紙 炒 川練 剉炒 茯苓

船上茴香 炒 杜茴香 白芷 桃仁 去皮尖炒 各半斤

右為末煉蜜丸梧子大每服五十九丸溫酒鹽湯任下

一方用櫛樹皮燒灰為末飲方寸匕

一方用蜜陀僧為末以猪脊骨髓調傳之兼治痔漏不愈

丁腫證治

世醫謂傷寒在諸凡之上癰疽冠雜病之先言此二病重大
急切然方論丁腫又在癰疽之前其意謂急切甚矣但江左
少見此病醫者不以為事病源既有不可不知且依千金類
例具列于後恍不能究其源亦不敢妄有改作一曰麻子丁
由上起頭如黍米色稍黑四邊微赤多癢忌食麻子及麻衣
并入麻田中行二曰石丁皮由相連色烏黑如黑豆甚硬刺

之不入由陰人微疼忌瓦礫磚石之屬三日雄丁炮頭黑廔
四畔仰瘡胞漿起有水出色黃大如錢孔忌房事四曰雌丁
瘡頭稍黃向裏廔亦似灸瘡四畔胞漿起如錢孔心凹色赤
忌房事五曰火丁狀如湯火燒灼瘡頭黑廔四邊有胞漿起
如赤粟米忌火炙燥六曰爛丁色稍黑有白班瘡中潰人有
膿水流出瘡形大小如匙面忌沸熱食爛帛物七日三十六
丁頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日生二
三日生三若滿三十六葉所不治俗名黑炮忌噴怒蓄積愁
恨八曰蛇眼丁瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大舛
硬忌惡眼看之并嫉妬人見及毒藥九曰鹽膚丁狀如匙面
四邊皆赤有黑粟粒起忌鹹食十日水浸下形如錢或如錢
頭白裏黑廔汁出中硬忌飲漿水水洗渡河十一曰刀鎌丁
瘡闊狹如薤葉大長一寸左側由黑如燒燥忌刺及刀鎌切

割鐵刀所傷可以藥治十二浮漚丁瘡臄曲田少許不合長而狹如蕪葉大內黃外黑黑處刺不痛內黃處刺之則痛十三曰牛狗丁肉飽起指不破此十三證約發必先痒後痛先寒後熱熱定則寒四肢沈重頭痛心驚眼花大重者嘔逆嘔逆則難治麻子丁始末唯痒所錄忌者不得犯犯即難治浮漚丁牛狗丁無忌縱不治亦不殺人欲知犯觸但脊強瘡痛極甚不可忍者是犯之狀也治十三種丁皆以此方治之

以緋帛壹片裹藥取匝為限亂髮雞子大攤布帛上午黃如梧子大及鉤棘針貳拾壹枚赤小豆柴粒為末並布髮上捲緋帛作團外以髮作繩十字縛之罨斗中急火燒灰研篩細以枸杞或子或根皮枝葉隨得為末用枸杞末二匕緋白灰一匕共成三七研勻分二服空腹

酒調下

蒼耳散治一切丁腫神良方

蒼耳

根莖苗子俱取一色便可用

右燒為灰醋泔淀和如泥塗上乾即易之不過十度即核相出

腸癰證治

癰疽初無定處隨其所發即命名在外則為發背發腦在內則為腸癰內癰心癰腎癰肺癰臍癰等治得其法則生失法則死外證易識內證難明不可不備述也腸癰為病身申錯腹皮急按之濡如腫狀腹無聚積身無熱脈數此為腸內有膿久積陰冷所成也故金匱用附子溫之小腹腫痞按之痛如淋小便自調發熱身無汗復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血洪數者膿已成不可下此以內結熱所成也故

金匱用大黃利之甚者腹脹大轉側聞水色或遠臍生瘡或膿從臍出或大便出膿血不治必死其如五内生瘡亦止分陰陽利而已不北外癰須依四節入事之次第也千金引官羽林婦病醫診之其脈滑教滑則為實教則為熱滑則為榮教則為衛教下降榮滑上升榮衛相于血為敗濁少腹痞衛堅小便或澁或復汗出或復惡寒膿為已成設脈遲緊即為瘀血血下即愈更內經所載有息積病此見有得之二三年遍身微腫續乃大腸與臍連日出膿遂致不救此亦腸癰之類也不可不審

腸癰

薏苡仁附子敗醬散治脈教身无熱腹无積聚按之濡此為利為效
薏苡仁 二兩 附子 炮半兩 敗醬 一分
右剉散每服四錢水一盞半煮七分去滓空心服小便

利為效

大黃牡丹湯治腸癰小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈洪教者膿已成不可下

大黃 半兩 牡丹皮 一錢 桃仁 半兩 瓜子 三分 芒消 二錢
右為剉散作一服以水三盞煮取八分盞去滓入芒消再煮沸頓服不以時

薏苡仁湯治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澁婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑是便可服就有毛互亦無害

薏苡仁 伍兩 牡丹皮 各三兩 桃仁 各三兩 瓜子 四分 芒消 二錢
右為剉散每服四大錢水一盞半煮七分去滓不以時

五痔證治

經云腸癰為痔如大澤中有小山突出世為崎人於九竅中凡
有小肉突出者皆曰痔不特於肛門邊生亦有鼻痔眼痔牙
痔等肛門中證狀不一方書分出五種曰牡曰牝曰肺曰腸
曰氣牡痔者肛邊腫痛突出一枚五六日後潰出膿血自愈
牝痔者肛邊發癢教个如粟乳狀脈痔者无頭脈中逆小竅
注下清血腸痔者生在腸內更衣時非按搦不入氣痔者遇
憂怒則發肛門腫疼氣散則愈治之之法切勿用生砒毒藥
入腹及至奄忽近見貴人遭此痛不忍言因書以戒後季
互沃散治互痔不問內外牡牝寒溫勞濕悉主之

鱉甲治牡 蝟皮治牝 猪左足懸蹄甲治腸痔
蜂房治肺痔 蛇蛻治氣痔
右燒存性隨證倍一分為末并花水調二錢空心臨卧
時一服

薰法

蝟皮方三指 大功 熏黃秦大 研 熟艾雞子大
右為末用甌器以沃實一半知燒香法安長桶內坐其
上薰之煙氣從口出為佳凡三度薰永差勿犯風冷忌
雞由毒物

洗法

海桐皮剉 蛇床子各一兩 香南藤剉 葱白切各三兩
右用水一斗入藥五兩藥減半去滓候溫着手輕洗
以絹拭乾一法上用槐白皮藥湯淋涼最佳

貼藥

芎藭子半兩 蟬蛻五個 檳榔一個並
右用棗三枚取肉研細搜和藥末如膏硬滴少蜜研成膏
量大小貼於病處

辯腸風論

夫有五痔人奏圍則下血或點滴或滲箭或清或濁面黃唇
白心忪脚弱頭目眩暈此因飽食坐久腸癖所為亦有飲酒
房室過度所致世醫多指此為腸風臟毒然腸風臟毒自屬
滯下門截毒即是截中積毒腸風即是邪入截純下清血謂
之風利今五痔下血是酒痔脈痔其血自肛門邊別有一乃
竅如針孔大滴淋而下与洩物不共道不可不知
烏連湯治脈痔下血不止量冷熱加減法

黃連去積 烏頭炮去皮去

右為剉散每服二錢水一盞半藥七分去滓空心服
則加蓮連冷加烏頭

酒連丸治酒痔下血伏暑久治不效

黃連不以多炒燻去積酒浸銀器中重

右為末以餘酒為丸如梧子大每服五十九丸米湯下
加味四君子湯治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴脚弱氣之
口淡食不知味

人參 茯苓 白朮 甘草 黃芪

白扁豆蒸各

右為末每服二錢七湯點服此方人未之信服者頗効
所謂看不上手面自有奇功

荊芥散治脈痔下血

荊芥穗 槐花炒佳各 石葛蒲一兩

右為末米飲調下二錢食前服日二服

白至丹治久年腸痔下血服百藥不效者

凝水石不以多少煨紅研細

右糯米糊丸如梧子大陳米飲下五十九丸只一服愈

又方單服白梅亦効

瘡瘍證治

瘡疥魚不害人浸淫不已亦有數年不愈者多因心腎不至
寧傷神失志或飲食不節積滯腸胃致氣血凝滯發於肌肉
皮膜之間色目極異所謂馬疥惡露及花癩瘡種狀不同或
痒或痛汁水淋漓愈而復發諸法不美要當調養心腎去腸
間苑莖理无不愈

升麻和氣散治瘡疥發於四肢臂髀痛痒不常甚致增笑發

枳殼刺疼痛浸淫浮腫及癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛者

蒼朮二兩米泔浸三宿 桔梗 升麻 乾葛各一兩 陳皮六分

甘草 芍藥各三分 半夏湯七次 當歸 白芷

茯苓各二分 枳殼 厚朴姜製 乾姜各半 大黃莖半

右為對散每服四大錢水一盞半姜三片灯心十五莖

剪七分去滓食前服

大麻葉治風毒入胃及心腎經絡攻注百節疼痛頭目虛腫

痰涎不利下注腰脚緩弱生瘡婦人血風男子癩風及風

濕脚氣攻注皮膚瘡痒癩癧偏正頭風

川烏頭洗淨灰炒製去皮尖 草烏頭水浸三日洗去皮各四兩

荆芥穗半斤 乾薄荷五兩 杜當歸水浸三日曝乾一斤功

右為末醋糊丸梧子大茶清下三十九丸此方子癩癧門

加味烏荆丸相類但此方入草烏并過製衣不同尔

殺疥藥

羊蹄根生切一兩 姜一分 礬石半斤 硫黃一分 草烏頭一分

右以米泔淹一宿研極細入醞醋和勻入浴時抓破瘡

傳之遲須以溫湯洗去絕妙

百草膏治一切惡瘡不問乾濕痛痒日近年深百藥不毛

羊屎 不拘

右一味上下以瓦盛蓋柴木燒令煙尽末之麻油調傳
痒者入輕粉少許痛者入麝香少許神效

一法用杏仁輕粉最殺虫

癩風證治

男子精血不調外為風冷所襲致陰下濕痒搔之不已流淫
子脚悉生瘡瘍名曰癩風世謂腎臟風者乃認癩為腎也癩
屬宗筋系於肝胃陽明養之陽明主肌肉稍經流入四肢故
使四肢生瘡云謂之癩風非腎藏風也

四生散治癩風上攻下淫耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下
注陰濕四肢搔癢遍体生瘡及婦人血風

白附子 沙苑蒺藜 黃芪 羌活 各等分

右為末每服二錢鹽酒調下有人將猪腎破開入鹽糝

藥於其間煨脹亦佳癩屬宗筋胃陽明養之故有是證

烏頭煮鹽丸治无臟氣虛癩風入胃上攻頭疼眼赤眵淚昏

淡口乾咽燥下淫四肢疼痛麻節重着陰下濕痒足脛腰
膝過生瘡瘍及風水浮腫

川烏頭 洗淨大者破用 蒼朮 吳茱萸 各四兩

京三稜 半兩 白鹽 十二兩用水煮四味候

右為末米糊丸梧子大每服五十丸空腹温酒鹽湯任
下丸水病必忌鹽此藥用鹽无所忌

升麻和氣散治如前 方見瘡瘍門

天麻藥治如前 方見瘡瘍門

癬證治

凡癬種類亦多所謂苔癬瓦癬荷葉癬蚘以皮膚氣血凝滯
所為或有風濕搏成者或為人傳染得之者種狀不同治之

各有方

昨葉荷草散治一切癬无問爪濕氣血与支相染而生者

昨葉荷草即尾上曬乾一兩 枯礬一分 雄黃半分

右為末以羊蹄菜根先蘸醋搗癬上令痒破即以藥末
乘濕塗傳不過三兩次即愈

妬精瘡證治

夫羅慾人多患妬精瘡者以婦人陰中先有宿精男子与之
交接靈熱即成初發在陰頭如粟拂之則痛甚矣兩日出清
膿作曰孔蝕之大痛婦人亦有此病生在玉門內正似疳蝕
瘡不痛為異耳

麝香散治妬精瘡

麝香 黃礬 青礬各等分

右為末小便後傳之

白散子治妬精瘡痒不可忍者及皮膚諸瘡手足疽瘡

晉礬不拘多少 輕粉

右研勻搽瘡上立見如治漏瘡每挑一錢入黃礬末一
錢輕粉半錢

津調散治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連 款冬花各等分

右為末以地骨皮蛇床子煎湯洗用軟帛搥乾以津調
藥傳之最忌不得用生陽洗諸瘡皆然

蒲黃散治陰蝕瘡

蒲黃三兩 水銀一兩

右研勻先以猪油湯浸洗搥乾以藥搽之一方治男女
陰瘡以硫黃末傳之

大凡叙論

經所載癩風者即方論中所謂大風惡疾癩是也。雖名曰風，未必皆因風。大卒多是嗜慾勞動，氣血熱發，汗泄不避，邪風冷濕使淫氣與衛氣相干，致肌肉憤脹，氣有所凝，則肌肉不仁。榮氣泣濁，則肘腋不利，故色敗皮膚腐潰，鼻梁塌壞，千金所得自作不仁，極猥之業，雖有悔言而无悔心，良得其情。然亦有傳染者，又非自致，此則不謹之故。氣血相傳，豈宿業緣會之所為也？原其所因，皆不外涉外所因而成也。證候多端，并見諸后。

大風治法

凡治大風，須推其所因。凡因風寒濕熱，勞逸飲食，與夫傳染，不可混濫。散寒濕風，濕清熱調和，氣血類類不同。若例以浮風藥治之，則失其機要矣。昔見一僧得病狀如白癩，卒不成瘡，但每旦起白皮一升許，如蛇蛻。醫者謂多痰癘，燒所致，與局

方解毒雄黃丸三四服，而愈。豈非得其因邪治之第一浴法。

麻黃根

地骨皮

草烏頭

各二兩

右為剉散，研朴消二兩，勻和。每用藥二兩，木一桶，椒一合，葱三十莖，艾葉一兩，同藥十沸，入米醋一中盞，打勻。去滓，坐溫室中，且用手巾搭四肢，候湯可浴，即浴令汗透，面上如珠流，更坐室中，或睡片時，尤佳。候汗解，方着衣避風，而出五日，再浴如此。兩上浴，便脫換骨丹。

換骨丹

九助鱉甲

去帽

海蜈蚣

細剉各半兩

右以鹽泥固濟，候乾火煨存二分性，為末。巴豆半兩，去皮膜，順手研青州棗七個，去核，入巴豆膏在棗中火燒令集存。巴豆五分性，將棗巴豆爛研如泥，入前二味末。

同研勻以醋煮糊為丸如菜豆大每服七丸者四五
丸用溫薑汁下候利惡物如膿血爛魚腸即住即些
兩服未利更加一二九次服遇仙丹

遇仙丹

人參 紫參 各一兩
苦參 白僵蚕 去嘴各二兩

右為末白麵糊丸梧子大每服三十九丸溫鹽湯吞下食
前日二次服疎風散

疎風散

山梔子仁 一兩
大黃 白滑石 熟地黄 懸豆 酥炙佳黃 各二兩

右為末入朴消半兩令勻每服一分食後淡茶清調下
次以佛手膏去瘡

佛手膏去黑紫瘡核

班猫翅 七斤去
巴豆 七粒 杏仁 二七斤 紅娘子 二七斤 去翅足 去皮

砒霜 一分 盆硝 一分 黃蠟 半兩 韶粉 半兩

瀝青 半兩 硫黃 黃丹 各三分 膩粉 炒半

菜豆 合 槐角 三條 麻油 四兩 乳髮 雜子大一兩

右用油煮令發化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐味
下焦者滌出方下硫黃盆硝及丹粉等以筆子不佳手
僥令勻滴水成珠為度用時先將針輕手刺瘡核用藥
一粟米大放針處次日撓瘡有黑臭膿血出三兩日血
漸少次服去毒丹

去毒丹

赤芍藥 甘草 滑石 各半 巴豆 去皮炒別 研後入

黑牽牛 一兩半 朴消 大黃 一分

右為末麵糊丸菜豆大臨時服十五丸金銀薄苛湯
下加至二十九次服甘草散

甘草散

甘草

滑石

各半

山豆根

一兩

大黃

一分

右為末每服一分蜜熟水調下日二服次服解毒丸

解毒丸

苡蔞根

三兩

甘草

半兩

大黃

一分

朴消

一分

右為末麵糊丸如菘豆大每服二十九至三十九白湯

下次服福神丹

福神丹

訶子

四個

巴戟

炒

黑牽牛

生各半兩

甘遂

三分

赤小豆

四十九

右為末麵糊丸如菘豆大每服十九至二十五丸薄苛湯下

次用水膏藥

水膏藥傳貼破處及面脚上瘡令生肉

陳皮

去灰土十斤炒累色

陳麥末

半斤炒紫

藿香

馬蹄香

各一兩

麝香

一分別研

右同為末入麝香用冷水調掃傳瘡上有膿處如損破即藥槐枝湯洗再上藥此十方乃倪處士秘傳曾用有驗大要病人須能如法將息理會敬而信之

通天再造散治大風惡疾

鬱金

半兩

大黃

一兩

白牽牛

六分半

皂角刺

一兩炮經

年黑大者

右為末每服五錢日未出面東以无灰酒下盡量為度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌毒半月但食稠粥軟飯漸生眉毛皮膚膏如常甚者不過三病次須將理不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢馬等肉犯者死不救

三濟丸治如前

當眼 熟地黄 川芎 荊芥穗 各二
防風 細辛 各一 桂心 一分

右為劑教先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黃一斤搗汁浸一宿焙乾酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黃汁釋蒸餅為丸如梧子大用好川烏頭一個炮裂剉荊芥穗半兩浸酒三升旋溫下藥五十九

八葉濕淋凍大風瘡

桑葉 荷葉 地黄葉 皂角葉 蕩葉

蒼耳葉 葛蒲葉 何首烏葉

右等分曬乾燒存性為末如面藥洗手面身體

料藥

大風惡疾瘡疾荼毒膿汁淋漓眉鬢墮落手足指脫頑痺痛

瘡顏色枯瘁鼻塌眼爛齒_下厚揭病證之惡无越於斯頁此證病者百无一生猶且愛恋妻孥復着名利不仁之行仍欲更作死而无悔深可悲傷凡遇此疾切須斬盡及一切口味公私世務悉屏置能不文俗事絕慶平幽隱林下依清瘴瘳非但愈疾亦能因是而至神仙所謂因禍而得福也

三因極一病證方論卷之十五

三因極一病證方論卷之十六

斑瘡證治

夫斑瘡病內經與張仲景皆不載尋據方論蓋自魏朝方有以白頭赤根者俗呼為豌豆即斑瘡也細粟如麻者俗呼為麻即膏疹也又有大者俗呼為羊為萍此皆輕重之不齊故命名異耳百問云悔不得轉利以瘡疹發於表利之則毒集入裏龐安常云身疼壯熱須少解散開毒攻非利不愈必令汗下初虞世亦云瘡疹發於肌由屬陽明古人治法皆以承氣湯利之諸說矛盾不無疑誤今皆存之要當分其未發已發為治若其始發必作寒熱如傷寒狀方證所載耳冷尻冷痰嗽者皆瘡疹證又小兒初得手足搐搦如風癩者亦瘡疹候便可與宣熱拔毒必須利之千金治豌豆瘡初發欲發者單煮大黃脹之即明文也若其已發只須解肌用升麻紫

草葷是也如是分之諸說自津又此病多因傷寒失於汗用
或時氣勝復截主客及天行疫病長幼相染者當隨因辨氣
證治之其間唯倒壓散危且早為治

三豆飲子治天行豆瘡但竟有此證預服則不發

赤小豆 黑豆 菜豆各一 甘草半兩

右淨淘豆入甘草以水煮熟逐日空心任性食豆飲汁

七日瘡自不發

升麻湯治大人小兒傷風寒溫疫頭痛寒熱身疼斑瘡已發

未發可服

升麻 乾葛 甘草 芍藥各等分

右為剉散每服秤五錢重水二盞藥七分去滓挹服小

兒量與一法加紫草茸莢

鼠粘子散治傷寒斑瘡毒氣咽噎不利舌不出疼痛

鼠粘子炒 丹參 升麻 甘草各 乾薄荷

右為剉散每服三錢水一盞半藥七分去滓不拘時小

兒量與之

龍腦膏治斑瘡癩

猪心血調腦子成膏以紫草茸莢湯解開稀稠得所服

無腦子用辰砂一法白翦葉燒灰為細末每服二錢入

麝香少許沸湯調下

仙靈散治斑瘡入眼

仙靈牌 藏靈仙各等分

右為末每服二錢食後米湯調下

豆皮飲治小兒因小兒因出瘡毒入眼生翳

真葉豆皮 白菊花 真穀精草去根各等分

右為末每服一大錢乾柿一个粟米泔一盞同藥候泔

尽只将乾柿去核日服三次

丹毒叙論

經云諸痛癢瘡皆屬心心虛寒則痒心實熱則痛丹毒之病由心實熱也心生血主於脈血熱肌浮陰滯於陽即發丹毒方論有云以其色赤加丹砂塗故得丹名然又有水丹白丹五色油丹豈專以赤為名也又有赤硫天火殃火尿窻癩窻野火茅古方以為小兒出入游行觸犯所致此因客或有之若小兒在襁褓中未能出入亦患此者是豈因觸犯耶大率皆血熱之所為也叙例于後

丹毒證治

天火丹者由中忽赤如丹塗之色痛痒不定甚至遍身白丹者由中腫起痒痛如吹狀鷄冠丹者赤若菜莖用由上粟起如雞冠水丹者偏腫熱起黃色如水在皮中五色油丹者赤

名油腫赤硫丹腫熱赤色流入四肢以上皆不問大小如天火膏火殃火尿窻朱田野火茅丹多着少小但自腹內生出四肢者則易愈自四肢生入腹者則難治香架皮湯治諸種丹毒發於四肢腹背頭面或赤或白或痒或痛或寒或熱

香架皮 一兩

右以一大碗水同藥取半碗以翎毛刷患處神效
伏龍肝散治少小諸種丹毒

伏龍肝 不拘多少

右為末以鷄子白和傳之日三次

金花散治一切丹毒

鬱金

黃芩

甘草

山梔

大黃

黃連

糯米

右七味各一两生為末蜜和冷水調以鵝毛上患處

料簡

治丹毒方千金外甚多無出用至冷物无過藻菜如有患丹毒熱腫等取渠中藻菜細切熟搗傅丹上厚三分乾則易之最良

癰癧證治

世醫論癰癧無不謂是皮膚間風然既分冷熱冷熱即寒暑之證又有因浴出湊風冷而得之者豈非濕也則知四氣倫矣經云諸痒痛瘡皆屬於心心實熱則痛虛寒則痒又陽明主肌内屬胃与大腸亦有冷熱分痛痒不可不審世人呼白者為孽膜赤者為血風名義混散當以理境内則察其臟腑虛實外則分其寒暑風濕隨證調之無不愈如味羌活飲治風寒暑濕外搏肌膚發為癰癧增寒發熱遍

身搔痒隨臟氣虛實或赤或白心連悶亂口苦咽乾

羌活 前胡各一兩 人參 桔梗

甘草各 枳殼各 川芎 天麻

茯苓各半兩 蟬蛻去頭 薄荷各三錢

右為末每服二大錢以一盞姜三片茶七分不以時候

加味烏荊山治癰癧上攻頭面赤腫搔痒搔之皮便脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如虫行

川烏烏麻浸三五次去皮尖焙乾研 荊芥穗各半斤

土當散焙乾研一斤 薄荷五兩

右為細末好醋煮米粉糊為丸梧子大每服五十九溫

酒茶清下

麴木湯治因浴出湊風冷遍身癰癧搔之随手腫突及眩暈

嘔噦

白朮 一兩 神麴 二兩 甘草 一分
右為末每服二錢米飲調下 一方以上末研炒冷酒調下 二錢不飲以茶調下

傳藥

景天一斤細搗取汁傳上挾灸手摩之再三度毛

胡臭漏腋證治

胡臭與漏腋雖不害人性命而害人身奉親事者乃至交遊皆非所宜修身之士務為清潔者或得此患不可不思有以去之夫胡臭者多因勞逸汗清以手摸而嗅之致清氣道中受此宿穢故傳而為病方論有天生具之說恐未必皆然多見為人相染者蓋其氣吸上元官遂散百脈多相沾染忌之為得漏腋者亦由腋下挾汗致汚衣教重皆透然未必臭以二證致之其病自別古方共作一病未為至論

蜘蛛散治胡臭熏人不可嚮逐者

大蜘蛛

一個以黃泥入少赤石脂搗羅極細入塩少許炒煉為一室蜘蛛在內旋以火近燒令通紅候冷剝開

右一味研細臨卧入輕粉一字用醎醋調成膏傳腋下明早登廁必浮下黑汁臭穢不可聞於遠僻處傾棄埋之免致染人神良

六物散治漏腋腋下足心手掌陰下股裏常如汗溫汚衣者

乾枸杞根

乾薔薇根

甘草

各半兩

胡粉

高蔞根

滑石

各一分

右治下篩以苦酒少許和塗當微汗出易衣更塗之不
過三著便愈或一歲復發又塗之

頭痛證治

頭者諸陽之會上丹產于泥凡宮有神所棄凡頭痛者乃足太陽受病上連夙府眉角而痛者皆可藥愈或上穿夙府陷

入于泥九宮而痛者是為真頭疼不可以藥愈多發且死且
發夕死責在根氣先絕也原其所因有中風寒暑溫而疼者
有氣血食飲厥而疼者有五臟氣鬱厥而疼者治之之法當
先審其三因三因既明則所施無不切中
芎辛湯治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭疼如破兼眩暈欲倒
嘔吐不定

附子生去皮臍

烏頭生去皮尖

天南星

乾薑

甘草炙

川芎

細辛

各等分

右為剉散每服四大錢水二盞姜五片茶少許薑七分去滓食後

藿香散治傷風挾涎飲上厥頭疼偏正夾腦諸風

藿香半兩

川烏頭

乳香

草烏頭

右為末每服一字薄荷茶清調下食後服

惺惺散治傷寒發熱頭疼腦痛

石膏

甘草生

麻黃

去節湯各等分

右為末每服二錢水一小盞茶半錢葱白三寸

三五沸先嚼葱白細嚥下去枕仰卧如發熱再投一服

出汗立愈

玉屑散治傷寒發熱涎澀上厥伏番陽經頭疼眩暈不可忍者

石膏煨

右研細每服葱白點茶調下二錢小兒量大小加減与之

芎木湯治着濕頭重眩暈苦極不知食味暖肌補中益精氣

川芎半兩

白木半兩

附子生去皮尖半兩

甘草

桂心

一分

右為剉散每服四大錢水二盞姜七片棗一合葱七分去滓食前服

救生散治外傷風冷內積憂思氣鬱聚涎隨氣上厥伏番陽
經頭疼壯熱眩暈或胃膈寒痞兼服寬中回并攻之

菊花帝 川芎 石膏煨各一兩 甘草一分

右日乾為末每服三錢姜葱湯調下如覺胃痞即服此
下寬中回不計時服

寬中回治氣滯不快飲食不消胃高痞塞凝痰聚飲狀如傷

寒頭疼胃痞

大附子炮去皮臍 木香炮 青皮 大黃溫紙裹煨各等分

右為末醋煮糊回梧子大每服十回姜湯下頭疼甚則
調救生散送下

天南生回治腎厥頭疼不可忍

硫黃 石膏 天南生

右為末糊丸如梧子大每服三十回空心食前溫酒下

硫朱丹治腎厥及痰厥頭疼諸藥不效

硫黃 川烏頭炮去皮各半兩 朱砂二兩 天南星炮裂一兩

右為末薑汁煮糊回梧子大每服十五回生薑薄荷下

葫蘆巴散治氣攻頭痛如破者

葫蘆巴炒 三稜剉滯浸一兩 乾薑炮一分

右為末每服二錢生薑湯或酒調下

雄黃回治八般頭風及眩暈惡心吐逆諸藥不治

通明雄黃一兩 川烏頭生去皮尖一兩半

右二味為末滴心白如梧子大每服十九煨葱白茶清

下即用後藥搐鼻

搐鼻藥

草撥 良薑各一分 白芷一錢 細辛半錢

右為末每服一小字先含於一口分搐鼻內吐即止

大附子治元氣虛壅上攻偏正頭疼不可忍

大附子炮去皮
臍一枚

右為末葱汁糊田菜豈大每服十山至十五山茶清下
一法以川烏頭炮去皮尖為末用韭菜自然汁和同治
風虛痰涎頭疼

如聖餅子 治氣厥上盛下虛痰飲風寒伏雷陽經偏正頭

疼痛連腦顛吐逆惡心目暝耳聾常脹清頭目消風痰暖
胃氣

川烏頭生去
皮 天南星 乾薑各一兩 甘草

川芎二兩 天麻 防風 半夏洗去滑
各半兩

右為末湯浸蒸餅和丸雞頭大稔作餅子曬乾每服五
餅日荊芥三五穗細嚼茶酒任下熱水亦得不拘時候

眼叙論

夫眼者五臟之精明一生之至寶如天之有日月其可不保

護之然骨之精為瞳子屬腎筋之精為黑眼屬肝血之精為
絡果屬心氣之精為白眼屬肺肉之精為約束屬脾稟筋骨
血氣之精与脉并為系系上屬於腦後出於項中故六淫外
傷五臟內鬱飲食房室遠視悲泣抄寫雕鏤刺繡悞奕不避
煙塵刺血發汗皆能病目故方論有互輪八廓內外障等各
各不同尤當分其所因及臟腑陰陽不可混雜如其決其面
者為兌背屬少陽近鼻上為外背屬大陽下為內背屬陽明
赤脉從上下者大陽病從下上陽明病從外走內者少陽病
此三陽病不可混也清色赤病在心色白病在肺色青病在
肝色黑病在腎色黃病在脾色不可名者病在胃中此五臟
三陽病不可混也仍叙三因于后

三因證治

病者喜怒不節憂思兼并致臟氣不平鬱而生涎隨氣上厥

逢腦之虛侵淫眼系蔭注於日輕則昏淡重則障翳眩淚努
由白膜漫睛昏內所因或教胃風寒不避暑濕邪中於項柔
虛稍系以入於腦故生外翳醫論中所謂青風綠風紫風黑
風赤風白風白翳黃翳等隨八風所中變生諸證皆外所因
或嗜慾不節飲酒无時生食五辛挾灸炙燻馳騁田獵冒涉
煙塵勞動外精喪明之本所謂恣一時之游使為百歲之固
愆皆不內外因治之各有方

千金補麴田明目百歲可讀細書常服益眼力

神麴 四兩 磁石 二兩煨醋 光明砂 一兩

右為末煉蜜為丸梧子大米飲服五丸食前日三服
羌活散治風毒氣上攻眼目昏淡翳膜生瘡及偏正頭疼目
小黒花累々者

羌活 川芎 天麻 旋覆花

青皮 天南星 炮 藁本 各一兩

右為末每服二錢以一盞薑三片薄荷葉葉七分食
後服一法入牽牛末二兩以生薑汁煮糊田如梧子大
酒任下二三十回

白蒺藜散治腎臟風毒上攻眼目赤腫熱淚昏淡妨由攀睛

白蒺藜 炒去 防風 甘草 生 疆蚕 去絲角各一兩直者

南星 一兩半兩豆二合青鹽半兩 煨石 出焙秤不用鹽豆

右為末每服二錢以甘草湯下食後服忌炙燻

洗肝散治肝熱赤脈貫精淚痛衝風淚下兼治熱血攻心

白蒺藜 一兩 防風 羌活 各半 馬牙硝 二兩 甘草 一分

右為末每服二錢以白湯調下食後服

椒紅田明目暖久臟神虛方久服駐顏縮小便

川椒 紅 巴戟 去心 金鈴子 炒 茴香 炒

附子 炮去皮脐 各一两

右为末山茱三三两为末酒煮糊搜为固格子大空心盐
隔下三五十九

煮肝散治眼赤有耳痒證則用四生散入羊子肝煮甚妙
四生散 方見頽風州 每服四錢匕盐酒入羊子肝煮空心温

脹 羊子肝即羊肝 上小片子者是

驅風散治風毒上攻眼腫痒流痛不可忍或上下臉赤爛
翳肉侵睛

五倍子 一两去 蔓荊子 一两

右为剉散每服三錢匕二盞銅石器内炙及一盞澄清
热洗番滓二服再炙

治風毒攻眼及時眼隐流眵明腫痛

黃連 秦皮 去蘆 甘草 等分

右为剉散每服四錢水一盞棗一枚燈心七莖葉煎沸
去滓以新羊毫筆蘸刷眼候温即用手洗之一法不用
黃蘗甘草有黃芩防风

神仙藥水膏治瘡翳

蠟 一两 黃丹 一两 蛇蛻 一分 水銀 一錢

初生烏雞殼 一两

右用柳木槌研細滴蠟為餅臨卧用之候天明將水照
眼藥鹽水中膜尽去

礬竹瀝膏治一切赤眼障翳

慈竹壹段 黃蘗

右用磚對立置竹磚上兩頭各安淨梳以乾竹火燒令
漚出尽收之以叙股銅筋繫

通利膏治眼赤流翳膜遮障時多热淚

杏仁

乳香

輕粉 一字

右旋入口中都嚼候津液滿口吐出麤器中置火上令四邊沸以綿瀘別盞中入生腦子皂子大研勻再瀘過以鈎筋點之

通神膏治眼生翳膜赤脈發出流痒疼痛有淚

沙蜜 四兩

青鹽

麝香

各一

乳香

硃砂

枯礬

各半

當敗

半

黃連

一錢

右件乳

破月蜜入青竹筒內蜜封閣定煮半日

厚綿瀘過藥眼

蛤蚧日治雀目不拍久近但日落便不見物

上色蛤蚧

黃蠟

等分

右館蠟搜粉為丸如棗大每用猪肝一片二兩許批開

至濕契肝以知為度

鼻病證治

肺為五臟華蓋百脈取氣於肺鼻為肺之閻闔吸引五臭衛養五臟外降陰陽故鼻為清氣道或七情內鬱六淫外傷飲食勞傷致清濁不分隨氣壅塞遂為清涕鼻洞濁膿腦絲衄血息由久而為齶雖種不同未始不涉三因有致泥丸阻亂變生諸證

羊肺散治肺虛壅鼻生息由不聞香

羊肺

乙具

白朮

四兩

菴蓉

木通

乾薑

川芎

各乙

兩為

右以水量打稀搗得所灌肺中煮契細研焙乾為末食後米飲服一二錢

細辛膏治鼻塞腦冷清涕世不已

細辛 川椒

乾薑 川芎 吳茱萸

附子 去皮臍 各三分

皂角 屑半兩 桂心 七兩 猪脂 六兩

右炙猪脂成油先一宿以苦酒浸前八味取入油炙附子黃色止以綿惹塞鼻孔

通草散治鼻齾氣息不通不聞香臭并有息由

木通

細辛

附子 炮去皮臍 各等分

右為末蜜和綿裹少許內鼻中

一法以苾蒂為末綿裹內鼻中或吹入亦可

一法以枯礬研為面脂和綿裹少許內鼻中教日息由

粉黃膏治肺熱鼻發赤癩俗謂酒皸

硫黃 一分 為末

蘿蔔

切去蓋剉作瓮下入硫黃在內以竹針蓋定正安糠火煨一宿取出研細

輕粉

烏頭尖

各少許為末

右研勻以面油調卧時傳早晚洗去以酥調尤佳

一法用乳香硫黃細辛輕粉等分為末為調傳

一法梔子為末蝎丸小彈子大茶酒任下一丸

凡鼻頭微白者亡血也赤者血熱也酒客多有之若時行衄血不宜新之或出至一二升不已即以龍骨為末吹入凡九竅出血皆用此法甚良餘衄方見失血門

唇病證治

唇者脾之候也意舍之所榮燥則乾熱則裂爪則瞶動寒則揭氣鬱則生瘡血枯則濡而无色治之之法內則隨證調其脾外當以藥傳之

清脾湯治意思過度溫熱於脾口乾唇燥腐裂無色

黃芪 香白芷

升麻

人參

甘草

半夏

陽去情 等分

右為剉散每服四錢水一盞半姜五片棗二斤小麥三

十粒藥七分去滓不以時服

羌活散治風溫入脾致唇口爛動搖頭疼日眩及四肢浮腫如風水狀

羌活 三兩

茯苓

薏苡仁

各一兩

右為末每服二錢水一大盞藥七分入淡竹瀝一匙許再服

菊花山治脾肺氣虛憂思過度榮衛枯耗唇裂濡緊或口吻

生瘡容色枯顏男子失精女子血衰患主之

甘菊花

枸杞子

肉蓯蓉

巴戟

去心各等分

右為末蜜丸梧子大每服三五丸米湯下

青灰散治唇緊燥裂生瘡面無顏色

青布

燒灰

右研細以猪脂調核傳睡一法以頭垢傳之

凡濡唇緊唇上生瘡唇裂並以甲藥傳之亦效

口病證治

走口乃一身之都門出入榮養之要道節宣徵表病必生焉故挾則苦寒則鹹宿食則酸煩燥則淡虛則淡疰則甘五味入口藏於胃脾行其精華分布津液於五臟臟氣偏勝味必偏應於口或勞鬱則口臭凝滯則生瘡不可失睡失睡則增龍石散治上高壅毒口舌生瘡咽嗑腫痛以少許搽患處

寒水石

兩

辰砂

三錢

研

生肌子

半字

右為末日夜敷次用小兒瘡癩攻口先以互福化毒丹掃却用此藥搽立効

治口瘡疼痛

互梧子

一兩

黃蘗

蜜塗炙

滑石

各半兩

右研細末每服半錢許搽患處嚙津不妨便可飲食

綠靈膏治口瘡臭氣癢爛久而不羸

黃檗 半兩 螺青 二錢

右研細臨臥置一字在舌下不妨嚥津寔明羸
一法以釧綠烏螺青

兼余散治蘊毒上攻或下虛邪熱病口生瘡

細辛 各等分 黃連 各等分

右為末以熱水搵帛揩淨按藥患處良久涎世吐之
杏粉膏治口瘡以涼藥傳之不愈者

杏仁 拾粒去皮尖 輕粉 一字

右研杏仁細調勻臨臥傳瘡上少頃吐之勿嚥
生香膏治口氣口臭

甜苾子 去殼

右一味研細蜜熬少許調成膏食後含化或傳在齒間

一方用香附子炒去毛為末每早晚揩許牙上

齒病證治

齒為閔門腎之榮骨之餘也腎衰則齒豁精固則齒堅又大
腸支脈在牙斷主灌注於牙大腸壅則齒為之浮大腸虛則
宣露挾風則攻日頭面疔蟲則齩脫為痔皆氣鬱而生諸證
不同治之各有方安腎丸八味回生治虛壅牙齒疼痛浮腫
安腎回 方見暖疼門 八味回 方見脚氣門
西嶽連葉峯神傳齒藥方

猪牙皂角及生薑 西國外麻熟地黃

木律旱蓮槐角子 細辛荷葉要相當 荷葉心用

青鹽等分同燒燉 研細將來使最良

揩齒牢牙髭鬚魚 誰知世上有仙方

常用齒藥牢牙去風冷虫蠕宣露不問老少用之甚効

槐枝 柳枝

皂角

鹽

右同入瓷瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法有石佛庵主年七十餘云祖上多患齒疼脫落得此方効救世用之齒白齋齋乃良方也

至池散治風虫牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣

地骨皮

香白芷

川升麻

防风

細辛

川芎

槐花

當歸

菁本

甘草

各等分

右為末每用一字許揩牙或大段痛即取二錢分一盞半黑豆半合生姜三片煎至一盞稍溫嗽候冷吐之殊効或用金沸草散黑漱亦佳

舌病證候

舌者心之官主審五味以榮養於身資於脾以分布津液於五臟故心之本脉係於舌根脾之絡脉係於舌傍肝脉循陰

器絡于舌本凡此三經或為風寒濕所中使人舌卷縮而不能言或憂怒思恐所鬱則舌腫滿而不得息心熱則破裂生瘡肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪諸證雖異治之各有方外麻柴胡湯治心脾虛熱上攻舌上生瘡舌本強頰兩邊痛

柴胡

外麻

芍藥

梔子仁

木通

各一分

黃芩

大青

杏仁

去皮火

石膏

煨二分

左為剉散每服四大錢分一盞姜五片棗七分去滓食後服

金沸草散治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒浮舌腫

荊芥穗

四兩

旋覆花

前胡

麻黃

去節各三兩

甘草

炙

芍藥

再者

半夏

右為剉散每服四大錢水一盞半姜七片棗二分棗七分去滓嗽口吐一半喫一半世醫用此發散傷風傷寒

及加杏仁五味子治咳嗽皆効得未知治舌腫牙疼辛
末年有人患舌腫如吹滿塞其中粥藥不入其勢其危
大藥一劑乘執以紙籠氣重之遂愈又一婦人牙疼治
療不羗致口頰皆腫亦以此藥重漱而愈故特記之

烙腫法

凡舌腫舌下必有噤虫狀如蜂蛰卧蚕有頭尾頭小
白可燒鐵烙烙頭上即消

黑散子治舌忽然腫破

釜底煤 研細

右以瀉調傳舌上下晚去更傳能先决出血竟傳之弥
佳一法用鹽等分調

薄荷蜜治舌上生白胎乾淡語話不真

薄荷自然汁 白蜜 等分

右先以生薑片蘸水揩洗竟傳之良

文蛤散治熱壅舌上出血如泉

互焙子 淡 白膠香 牡礪粉 各等分

右為末每服少許搽病處或燒鐵筆熟烙孔上

礬石散治風濕寒舌強不能語

枯礬石 桂心 各等分

右為末每一錢安舌下或用正舌散治之方見中風門

凡失欠頰車蹉但閉不能合以酒飲之令大醉睡中吹藥搗
其鼻連透即自正

咽喉病證治 要附

夫喉以候氣咽以嚥物咽接三腕以通胃喉通五臟以系肺
氣殺收分皎然明白有為水喉殺喉之說者謬說也千金復
云喉嚨候脾胃咽門喉肝膽亦非至論智者當以理推不可

強存乎人矣諸臟挾則腫寒則縮皆使喉閉風燥亦然五臟
久咳則色嘶嘶者喉破也非咽門病咽腫則不能吞乾則不
能嚥多因飲啖辛挾或復嘔吐咯傷致咽系乾枯之所為也
与喉門自別又有懸癰暴腫閉塞喉嚨亦如喉閉但懸癰在
上腭俗謂鴛翁又謂之鵝聚俗語色訛不可不備識
小續命湯治卒喉痺不得語 方見中風門

加杏仁去皮尖七片葉其効

治風挾喉痺及纏喉風

焰消半一兩 鵬砂半兩 腦子一字 白殭蚕一分

右為末研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

神效散治喉閉挾腫語色不出

荊芥穗別為末 草麻生去皮別

右入生蜜少許丸如皂子大以綿裹含化急則嚼化

一法用朴消不用荊芥

審學治膈寒咽門閉不能嚥

大附子生去皮臍

右切作大片蜜塗炙令黃含燕津甘味尽更塗良用

玉屑無憂散治纏喉風咽喉疼痛語聲不出嚥物有礙或風
涎壅滯口舌生瘡大人酒癥小兒疔癰或慢吞骨屑噎塞
不下

玄參 貫衆 滑石 縮破仁

黃連 甘草 茯苓 山豆根

荊芥穗各半 寒水石煨 鵬砂各三錢

右為末每服一錢先抄入口以新水嚥下此藥除三尸

去八邪殺人中辟瘟療傷

荊芥湯治風挾肺壅咽喉腫痛語色不出喉中如有物哽嚥

之則

荆芥穗 半兩 桔梗 二兩 甘草 一兩

右為剉散每服四錢或一盞薑三片棗六分去滓溫服

一法去荆芥穗名如聖湯

解毒雄黃山治纏喉^喉及急喉痺卒然倒仆失音不語或牙關

緊急不省人事或上高壅執疾涎不利咽喉腫痛

雄黃 一分 欒金 一分 巴豆 去皮出油二

右為末醋糊山菜豆大挾茶清下七回吐出頑涎立者

未吐再服如未至死心頭尚溫灌藥下喉尤

乾薑散治懸癰壅執卒暴腫大

乾薑 半夏湯洗去

右為末以少許着舌上嚥津

一法用鹽抹筋頭張口挂之日五六次

麻仁散治殺賊尸咽喉中癢此因誤吞穀芒槍刺痒痛

脂麻 炒不以

右為末湯點服凡穀賊屬咽馬喉風屬喉不可不分

馬鞭草散治馬喉痺洪腫連頰吐氣教者

馬鞭草根

右搗自然汁每服噉一合許一法用馬嚼鐵汁服亦妙

凡治噎之法皆以類推如鸚鵡治魚噎磁石治針噎髮灰治

髮噎狸處治骨噎亦各隨其類也

蜜綿薤白通治諸噎

煮薤白令半熟以線繫定手提線少嚼薤白噉之度

薤至噎處數牽引噎即出矣

一法綿一小塊以蜜煮用如食薤法

玉屑無憂散治一切物噎 方見前治纏喉風下

耳病證治

腎雖寄竅於耳當知耳為聽會主細五音外則宮商角徵羽
內則唏噓呵吹咽一內關五臟外合六淫故風寒暑濕使人聾
聾耳鳴憂思喜怒多生內塞其如勞逸不言而喻復有出血
生膿聾耳底耳或眵睡上直庚切不出飛走投入諸證既殊
治各有法

葛蒲山治耳卒痛及聾塞不聞色

葛蒲

附子

炮去皮臍
各等分

右為末以醋丸如杏仁大綿裹內耳中日二易之

補腎山治腎虛耳聾或勞頓傷氣中風虛損腎氣升而不降

致耳內虛鳴

山茱萸

乾薑

炮

巴戟

芍藥

澤瀉

兔絲子

酒浸

遠志

去心

桂心

黃芪

石斛

乾地黄

細辛

附子

炮

當歸

牡丹皮

蛇床子

甘草

菴蓉

酒浸

人參

各二兩

葛蒲

一兩

防風

一兩

茯苓

半兩

羊腎

二枚

右為末以羊腎研細酒煮麩糊為圓如梧子大食前鹽

酒任下參拾圓至五十圓

蠟彈山治耳虛聾耳

白茯苓

二兩

山藥

炒三兩

杏仁

去皮尖炒

黃蠟

二兩

一兩半

右以前三味為末研勻鑄蠟為丸如彈子大鹽湯嚼下

有人止以黃蠟細切嚼點好建茶送下亦效

乾蠟散治耳聾因腎虛所致十年內一服效

乾蠟

黃色小者

右向晚勿食初夜以酒調作一服至二更以末徐徐盡

量飲五更耳中聞百十積聲響便自此聞色

解倉飲子治氣虛熱壅或失飢冒暑風熱上壅耳內龍耳閉微
痛膿血流出

赤芍藥

白芍藥

當歸

甘草

大黃

木鱉子

右為剉散每服四錢分一盞煎七分食後臨卧服

麝香散治聾耳底耳內膿出

桑螵蛸

一個煨火炙及

麝香

右為末研令勻每服半字擦耳內如有膿先用綿拭紙

以藥擦之一法用染極枯礬等分為末以葶管吹入耳

中即食或入麝香更佳

諸百虫入耳用麻油灌之即効

諸耳中出血以龍骨末吹入即止

三因極一病證方論卷之十六

