

用量 大人ニハ〇、二五—一、〇ヲ毎日「小兒ニハ年齢ニ從ヒ〇、〇一—〇、一ヲ毎日投シ
舍利別又ハ麥芽越幾斯トナシ用ユベシ

○紫根(ムラサキ)

本品ハ即チ紫草ノ根ニシテ古來膏藥トナシ皮膚病ニ用ヒラレタリ澤田玄弘氏ハ火傷、凍傷、
濕疹、水泡疹、淺在潰瘍ニ用ヒ效ヲ得タリト華岡膏方便覽ニ掲クル紫雲膏ノ調製法左ノ如シ

紫根二十匁 當歸二十匁 萬真鹿四匁 黃蠟八十匁 胡麻油四合

右五味ヲ取り先ツ蠟油ヲ煮次キニ當歸萬真鹿ヲ煮後ニ紫根ヲ少シツ、入レ泡沫ノ消ユルヲ
見テ火ヲ去リ且暖ナルキ濾ス可シ

○芍藥

本品ハ猪子氏ニ由レバ興奮作用アリ長井博士ハ本品中ニ安息香酸ノ存在スルヲ檢明シ次ヲ
伊藤脩郎氏ハ約五%ノ安息香酸アルヲ定量セリ猪子氏ハ安息酸ヲ用ユル場合ニ芍藥ヲ適用
スベシト 量ハ三、〇—八、〇ナリ

○シムロ實 *Simulo*

本品ハ南米ニ産スル「カバリスコレアチエア」ナル植物ノ果實ニシテ赤褐色ノ堅キ被殻アリテ
小豆大ノ苦味アル種子ヲ抱圍セリ

此種子ヨリ製セル丁幾ハ鎮痙藥及癩癩藥トシテ賞用セラル即チ此丁幾四五、〇ト甘味葡萄
酒五〇〇、〇トノ混合物ノ一酒蓋宛ヲ毎朝夕ニ服用セシムベシボウレー氏ハ急性及亞急性

喇叭管兼卵巢炎ニ此丁幾(一日三、〇—四、〇)ヲ賞用セリ本品ハ炎症及熱度ヲ減退シ化膿ヲ
減少セシム

○「シズ」 *Siza*

本品ハ熱帶國ニ産スル灌木屬ニシテ其種々ノ種類ヲ清涼、收斂及強壯劑トシテ應用セラル「シ
ダフロリブンダ」葉ヲマルチネー氏ハ驅蟲劑トシテ賞用セリ其作用ハ器械的ニシテ本品ノ葉
ニ附著セル絨毛ノ内臟等ヲ刺戟スルニ由ル者ナリ

○「ジグスベッキア、フリエンタリス」(發汗及變質藥トシテ梅毒、癩病其他皮膚病ニ
用ユ)

○「シムフリカルプス」(變質藥及利尿藥)

○硝基偏利設林(「ニトログリセリン」ヲ見ヨ)

○「シスム」實 *Schism-Semen*

「シスム」實ハ埃及ニ於テ眼病ニ稱用スル「尚ホ「ジクエリチー」ノ如シ就中粉末トナシ同量
ノ糖分ト混和シ毎夕極少量ヲ眼中ニ撒布スルヲ良トス

○猩紅熱血清

フォン、ライデン氏ハ本病患者ノ無熱トナリシ後第五日乃至八日ニ刺絡ヲ施シ其血清ヲ取り
十五名ノ患者ニ注射セリ其量ハ二十乃至四十立方仙迷ナリシカ一モ不快ノ副作用ヲ呈スル

「ナカリキ十五名ノ内五名ニ於ケル結果著シク佳良ニシテ注射ノ次日惡寒ノ初メヨリ算シテ第五日ニ熱ハ常度マテ下降シ全身状態ハ佳良ナリキ其他ノ者ハ效果著明ナラサリキ本血清ノ無害ナルハ明瞭ニシテ小兒ニハ五乃至十立方仙迷ノ少量ヲ以テ十分ナルベシ（治療新報第三號）

○「ヒッピ」*Hippi*

「ヒッピ」ハニュー、ジールランドノ土語ニシテ種羊ノ義ナリ本品ハ顆粒狀帶褐色膠樣物質ニシテ純羊肉精ヨリ成リ頗ル滋養ニ富ムノミナラス芳香ヲ有シ味佳ナルカ故ニ熱性病其他ニテ食氣ナクリービヒ氏肉精ヲモ斥クル如キ患者ノ口ニモ適スベク又能ク保存ニ耐ユ開罐後少クモ一週間ハ變味腐敗等ヲ起スコトナク且其四角入罐ヲ開カハ能ク數人分ノ美味ナル「スーブル」ヲ得ベシ

成分 多數ノ人ノ分析ニヨリ本品ハ次ノ諸成分ヲ有スル固定越幾斯ナルコトヲ證明サレタリ

水分 三五、二〇% 有機成分五六、三八% 鹽成分八、四二%
之ヲ分析スルニ有機物ノ成分ハ次ノ如シ

全蛋白量三八、二二% 肉鹽基分一六、六〇% 脂肪一、五六%

冷水ニ不溶性ナル蛋白質量ハ七、七二%ナリ而シテ其内一、二一ハ煮沸シテ數滴ノ醋酸ヲ點加スルキハ沈澱ス羊肉ハ牛肉ニ比シ纖維細小纖弱ナルカ故ニ牛肉ニ比シ消化容易ナリ羊肉

ノ缺點ハ其脂肪ノ牛脂ヨリ硬固ニシテ消化シ惡ク又往々多量ニ含蓄サル、コトナレド本品ハ其製造中大部分ノ脂肪ヲ失フカ故ニ上表ニ於ケルカ如ク只一、五六%ノ脂肪ヲ有スルノミ斯ク本品ノ各成分ノ含蓄比例ハ其滋養物トシテ上乘ナルモノナルヲ示シリービヒ氏肉精等ヲ嫌忌スル患者ニ之ヲ代用シテ可ナリ

○華澄茄酸 *Acidum cubebium*. $C_{28}H_{30}O_7$

白色蠟狀ノ物質ニシテ空氣ニ遇ヘバ褐色トナリ酒精及依的兒ニ容易ニ溶解ス淋疾ニ丸劑トナシ一日數回〇、三—〇、七五ヲ與ヘ一回極量一、〇」一日極量五、〇ナリ

○「アドロベニン」*Hydroberberin*. $C_{20}H_{21}NO_4$

本品ハ無色或ハ黃色ノ顆粒狀或ハ針狀ノ結晶ニシテ水ニ溶ケズ嘔囉仿謨、酒精、硫化炭素ニ溶解ス麻刺利亞、脾腫及胃腸熱ニ用ユ

○「ヒマフィラ」葉 *Chinaphila*

「ヒマフィラ、ウムベルラタ、ヌット」木ノ葉ニシテ長徑五仙迷、幅員一仙迷アリ短莖ヲ具ヘ鋸齒狀ヲナシ無臭ニシテ初メ甘味、後チ收斂苦味ヲ覺フ單寧及「アルブチン」ノ外、黃色結晶物即チ「ヒマフィリン」ヲ含ミ水ニ溶ケズ酒精、依的兒、嘔囉仿謨、揮發脂油ニ溶解ス利尿劑トシテ浸劑丁幾劑トナシ或ハ越幾斯ヲ丸劑トナス用量ハ浸劑ニハ一分ト十分或ハ一分ト二十分トナシ越幾斯ニハ一日量〇、五—五、〇ヲ與フ

○「キノリン」*Chinolinum* C_9H_7N

利尿劑

滋養劑

性状及作用 本品ハ微黄色苦扁桃油様香氣アル氣ニシテ強ク光線ヲ屈折シ亞兒加里性反應アリ二百三十七度ニ沸騰シ水ヨリ重クノ水ニ溶ケス酒精、依的兒、嘔囉仿謨、偏陳ニ容易ニ溶解ス光線及空氣ヲ防キ善ク閉鎖セル瓶ニ貯フベシ
本品ノ〇、二―〇、四%ノ溶液ハ防腐ノ性アリ内用スレバ體温及脈搏ヲ下降シ大量ハ麻痺ヲ來タス又惡心ヲ起シ易シ

應用及用量 防腐及解熱劑ニシテ齒科ニ於テ齲齒ノ療法ニ用ユ大量ニ用ユレハ解熱ノ效、確實ナレモ心臓麻痺ヲ起シ虛脱スルノ恐アルヲ以テ現今用ユル人ナシ
〇グットマン氏ノ實驗ニ由レバ「ヒノリン」ハ解熱ノ效力微弱ニシテ服後屢嘔吐スルヲアリト
〇グコツフ氏ハ酒石酸「ヒノリン」ヲ痙咳ニ用ヒ良效ヲ得タリ其用量ハ一回〇、五―一、〇以下トセリ又當今一%乃至五%ノ液ヲ實布淫里ニ塗布及ヒ含嗽料トス
塗布ニハ五%ノ酒精水溶液、含嗽水ニハ一分水五百分(酒精ヲ加フ)トス内用スルハ稀ナリ内用ニハ次ノ製劑ヲ良トス

(イ) 酒石酸「ヒノリン」ハ無色稍系糖光輝アル結晶ニシテ微ニ苦扁桃臭アリ空氣ニ觸ルトモ變化セズ本品ハ薄荷糖ノ味アルヲ以テ小兒ニ適ス〇、五―一、〇―二、〇チ一日數回散劑トシテ「チアラート」ニ包ミ用ユ間歇熱ニハ一、〇チ二三回ニ分チ發作前三時ニ投ス
(ロ) 撒里矢爾酸「ヒノリン」ハ白色ノ粉末ニシテ水ニ溶ケ難ク酒精、依的兒、脂肪ニ溶ケ易シ防腐藥ニシテ大人ニハ一日數回〇、五―一、〇小兒ニハ此半量乃至三分一量ヲ投ス

處方

(ハ) 鹽酸「ヒノリン」ハ無色粘稠物ニシテ不快ノ味アリ水ニ溶ケ易シ防腐藥トシテ「ヒノリン」ノ如ク用ユ
〇純「ヒノリン」五、〇 餾水五〇、〇 酒 〇酒石酸「ヒノリン」一、〇 餾水五〇、〇
精五〇、〇 〇單舍利別五〇、〇
右咽喉塗布料(實扶淫里)
〇純「ヒノリン」五、〇 酒精三〇、〇 餾水三〇〇、〇

右含嗽料(實布淫里)

〇「ヒノソール」Chinosol (チキソール) (チノソール) (ト呼ブ者アリ)

防腐藥

本品ハ黄色ノ結晶性粉末ニシテ芳香且收斂性ノ味及「サフラン」様ノ臭アリ水ニ溶解スレモ酒精及依的兒ニ溶解セズ「善良ノ防腐藥」ニシテ其殺菌作用ハ石炭酸、昇汞ニ劣ラス其之ニ優ルハ蛋白ヲ沈澱セサルト毒性ナキト皮膚及粘膜ヲ刺戟セサルトニ在リ本品ハ溶解シ易キ且不快ナラザル微臭アル錠劑トナシ販賣セラル襪衣及手モ本品ノ爲メニ黄染セラル此染色ハ冷水ヲ以テ容易ニ洗除セラル、ヲ得ベシ
本品ハグルネル氏ニ從ヘハ殺菌及其發育制止ノ作用ハ頗ル石炭酸ニ優ル所アリトセリ蓋シ之ヲ四萬倍ニ稀釋スルモ尙其作用アルヲ認ムレバナリコッスマン氏ハ本品ヲ以テ殊ニ産科ニ於テ手ノ消毒藥トシテ昇汞及石炭酸ニ代用スルニ宜シク創傷ニ撒布スルニ更ニ之ヲ腐蝕セザルヲ以テ甚適當ノ品トスジャワノ癩病院長ミユルレル氏ハ本品ヲ癩病ニ用ヒテ著效ヲ

收メタリ肺膿癩ノ一例ニ本品〇、五—一、〇ヲ與ヘタリ又癩病性無力性ノ潰瘍ニ撒布末(本品一分澱粉九分)巴布(一分ト五百乃至千分)トナシテ用ヒ癩性鼻加答兒ニ千倍ノ液ヲ用ヒテ著效アリ用法ハ合劑又ハ丸劑トナシ用ユ

○「ヒノソール」二、〇 水二〇〇、〇 橙
皮舎七〇、〇

右每一二時一食匙

○「ヒノソール」五、〇 屈利設林一五、〇

水二五、〇

右塗布料

○「ヒノソール」〇、一 餛水一〇〇〇、〇

右點眼料

○「ヒノソール」錠 *Chinosol-Tablette.*

本品ハ強力ナル殺菌消毒劑ナリ稀薄ナル溶液克ク諸種ノ病原菌ヲ斃シ其產生物タル毒素ヲ破壊スルニ足ル其效力ハ石炭酸ニ四十倍シ而カモ人畜ニ全ク無害ナルハ諸他ノ殺菌劑ニ優リタル所ナリ之レニ由リテ本品ハ口中、齒牙ノ癩藥トナスヲ得又止血性ヲ備フルガ故ニ綑帶材料トナスベシ其ノ一般用法ハ次ノ如シ各一錠ハ一瓦ノ「ヒノソール」ヲ含有ス之レヲ一麥酒壘或ハ葡萄酒壘量(即四分三「リートル」)ノ水ニ溶解セル者ヲ定規ノ「ヒノソール」水ト

○「ヒノソール」一、〇 水二〇〇、〇

右一食匙ヲ一杯ノ水ニ入レ含嗽セシム

○「ヒノソール」二、〇 白糖四、〇

右爲二十包、「アブラート」ニテ每一二時一包

○「ヒノソール」二、五 薔薇蜜二五、〇

右塗布料

名ク其用ニ應ジテ或ハ之ヲ二倍、三倍、四倍、適宜ニ稀釋シテ含嗽、洗髮、腋臭防止、腔洗滌、創傷洗滌等ノ諸劑トシ或ハ其他一般ノ消毒劑トシテ應用スベシ尤モ古キ潰瘍及ビ肺癆患者痰壺ノ消毒ニハ定規溶液ノ強度ニ二倍セルモノヲ用ウベク點眼用ニハ「コップ」ノ水ニ一二匙ノ「ヒノソール」水ヲ混ゼルモノヲ適セリトス要スルニ點眼用ハ輕ク結膜ヲ刺戟シ患者ガ快感ヲ覺ユルヲ度トシ稀釋スベシ細菌ニハ錠劑ノ一片ヲ填充シ又食品保存劑トシテハ二萬乃至五萬分一ヲ加フベシ

本品ハ固形ノ小塊ニシテ強效ヲ有シ水ニ溶解シ易キガ故ニ取扱ニ便ニシ或ハ家庭藥囊中或ハ救急材料中ニ備ヘ或ハ旅行家、運動家、軍人、技士等ノ携帶用トスルニ適ス但茲ニ注意スベキコトアリ本品ハ鐵ニ觸ル、トキハ之レヲ黑色トナラシメ曹達、石鹼、石灰其他ノ亞爾加里性劑及水銀トハ結合變性シテ不溶、無能トナル硬水ニ溶クトキハ絮狀ノ沈澱ヲ生ジ滷濁ヲ呈ス但ソハ應用ヲ碍グズ(醫事新聞六百四十五號抄出)

○「アヘリン」 *Cholinum, C₈H₁₅NO₂.*

遊離セル「ヒヨリン」ハ製造ス可ラザルヲ以テ水溶液トナシ應用スルノミ纖維素膜ヲ容易ニ溶解スル性質ヲ具フルヲ以テ五%ノ「ヒヨリン」液ヲ實布埜里ノ局所療法ニ用ヒ義膜ヲ溶解スル效アリ

○「ヒボカスターニー」越幾斯 *Extractum Hippocastani.*

本品ハ栗實ヨリ得タル品ニ「グリコーゼ」四十五%「サポニン」三十六%強苦味アル樹脂四

%ヲ含メル鮮褐色苦味アル舍利別様物質ヲナシ水ヲ加フレバ白色乳様ノ液トナル酒精ニハ溶解スシユルマイエル氏ハ五%酒精溶液或ハ純品或ハ二十%硬膏ヲ筋肉及關節痲質斯并ニ神經痛ニ有效ニ無害ノ劑トシテ賞用セリ輕症痲質斯、關節ノ運動制限等ニハ本品ノ稀薄酒精溶液ニ嘔囉仿謨ヲ加ヘテ一日數回塗擦スレバ足レリ又頑固ニ劇痛アル者例之、關節痲質斯、坐骨神經痛、腰痛等ニハ稀釋セサル本品ヲ塗布或ハ塗擦ス即チ患部ニハ海綿ト溫湯トヲ以テ塗擦シ次ニ本品ヲ塗リテ綿ヲ被ヒ之ヲ下在部ニ固著シ尋常ノ繃帶ヲ施ス而シテ疾患強劇ナルキハ數回本品ヲ塗擦シ次テ更ニ塗擦スルニ先チ水ニテ既ニ粘著セル層ヲ洗除シ新ニ塗擦スル本品ヲシテ皮膚ト直接ニ接觸セシムベシ輕易ノ場合ニハ硬膏ヲ貼シテ數日放置スベシ蓋シ本品ハ皮膚ヲ刺戟セス毫モ濕疹ヲ發セズ副作用ナキヲ以テ長ク放置スルヲ得ベシ

○「ヒドラスチス」流動越幾斯 *E. Hydrastis fluidum.*

本品ハ黃褐色ノ液ニシテガブリロウイチユ氏ハ本品ヲ肺出血ノ素質アル者ニ持長シタリ氏ハ出血後直チニ之ヲ投シ四週ニ及ヘリ即チ二週間ハ毎日三回三十滴宛、次ノ三週間ハ毎日二回三十滴宛又次ノ四週ハ一日一回三十滴宛ヲ用ヒタリ

○「ヒドラスチン」 *Hydrastinum, C₂₂H₃₅NO₆.*

「ヒドラスチス、カナデンシス」ノ根ヨリ得タル類鹽基ニシテ光輝アル稜柱狀無水ノ結晶ヲナシ苦味アリ水ニ溶ケ難ク酒精、依的兒、嘔囉仿謨ニ溶ケ易シ此根ノ流動越幾スト同ク止血

止血、強壯、
消化藥

藥、強壯劑及消化藥トナシ用ヒ子宮出血ニハ麥角若クハ「エルゴチン」ノ如キ效アルモ痲痛ヲ發スルコトナシ用量ハ一日量〇、〇二—〇、一ヲ丸劑トナシ初メ少量ヲ用ヒ漸ク增量ス

○鹽酸「ヒドラスチン」ハ結晶性鹽類ニシテ水ニ溶解ス膽汁分泌藥、健胃劑トナシ其他、膿

創、月經閉止、淋疾及白帶下ニ〇、〇三—〇、一五ヲ用ユ

○硝酸「ヒドラスチン」ハ結晶性鹽類ニシテ水及酒精ニ溶ケ易シ〇、〇五—〇、三ヲ投ス

○「ヒドラスチン」 *Hydrastinum, C₂₂H₃₅NO₆.*

性状 「ヒドラスチン」ハ純白色針狀結晶ニシテ酒精、依的兒、嘔囉仿謨ニ極ク容易ニ溶解シ溫湯ニ溶ケ難シ許多ノ酸類ト化合シ水ニ溶ケ易キ鹽類ヲ生ス此品ノ水溶液ハ甚亞兒加里性ヲ呈ス

收斂藥

應用 本品ハエ、ファルク氏ニ從ヘバ子宮內膜炎或ハ子宮肉腫ニ係ル子宮出血ニ皮下注射シ良效アリ殊ニ充血性月經過多及子宮ノ組織變化ニ係ル月經過多ニ頗ル良績ヲ收ム即チ將ニ來ラントスル月經ニ先ツコト六乃至八日ニシテ此療法ヲ行ヒ毎日十%ノ液半筒(即チ〇、〇五)ヲ皮下注射ス可シ尙出血スルキハ其全ク閉止スルニ至ルマテ毎日全筒ヲ注射シテ可ナリ不正ニ來ル出血ニハ每週二乃至三回〇、〇五ヲ注射スレバ足レリ

○鹽酸「ヒドラスチン」 *Hydrastinum hydrochloricum, C₂₂H₃₅NO₆H Cl.*

本品ハ黃色強苦味アル粉末ニシテ水ニ容易ニ溶解シ溶液ハ弱キ螢石移ヲ放ツ

血管收縮ヲ致ス者ニシテ最初ニ血管ニ作用スルヲ以テ爲メニ血壓亢進ス同時ニ脈搏ハ迷走

ヒドラスチス 流動越幾斯 ヒドラスチン ヒドラスチン 鹽酸ヒドラスチン

神經中樞ノ刺戟ニ由リテ緩徐トナル血管ノ收縮ハ「ヒドラスチン」ヨリモ強ク且持長シ弛緩状態ヲ夾ンテ斷續セズアルク氏ハ本品ヲ子宮内膜炎或ハ子宮肉腫ニ由來スル子宮出血ニ用ヒテ良效アリ其他充血性月經異常、月經過多ニ投ス〇ゴットシヤルク氏ハ本品ヲ子宮ノ充血状態、萎黃病、子宮内膜炎ノ子宮出血、喇叭管化膿、卵巢炎、卵巢腫瘍、滲出物ニ用ヒテ良效ヲ得タリ

皮下注射ニハ十%ノ溶液〇、〇五—〇、一ヲ用ヒ内用ニハ〇、〇五—〇、一ヲ丸劑、膠囊トナシ投ス不整ノ出血ニハ二日間、月經過多ニハ豫期スル月經前六乃至八日ニ〇、〇五ヲ與ヘ出血スルヤ直チニ其閉止スルニ至ルマテ〇、一ヲ處スベシ〇ゴットシヤルク氏ハ一日三回〇、〇五ヲ超過ス可ラス然ラザレハ胃腸障碍ヲ發シ易ケレバナリ内用ハ皮下注射ヨリモ有效ナラス

〇鹽酸「ヒドラスチニン」〇、五 甘草末
及膏 適宜 〇鹽酸「ヒドラスチニン」一、〇 餾水一〇、〇

右爲十九、一日一二丸、出血アルキハ
毎日二丸、豫期スル出血前毎日一丸
宛

右半筒乃至一筒皮下注射

〇「ヒドラチエトン」Hydrachinum.

「アチエチルフェニールヒドラチン」
「フエンアチエチルヒドラチン」

本品ハ白色板狀ノ結晶ニシテ冷水及依的兒ニ溶ケ難ク熱湯、酒精、噶囉仿謨ニ溶ケ易シ無臭

處方

解熱劑

ニシテ殆ト味ナシ内服ニハ解熱劑及鎮痛藥ト用ヒ外用ニハラエストライヘル氏ハ鱗屑疹ニ賞用セリ本品ハ血液ニ對スル毒物ナルヲ以テ之ヲ用ユルニ當リテ殊ニ内用時ニハ注意ヲ加フベシ劇熱ニハ一日量〇、〇五—〇、一—〇、二ヲ投シ關節痲痺質斯及坐骨神經痛ニハ〇、二—〇、三ヲ與フ外用ニハ華攝林或ハ「ラノリン」ヲ以テ二十%ノ軟膏トナス

〇「ヒドラゴギン」(種々ノ利尿劑ノ集成物ニシテ利尿劑トス)
〇「ビドラルギロール」(防腐藥)

〇「ヒドロヒノン」Hydrochinonum. $C_6H_4(OH)_2$ 「パラジチキン」
「アチエチルフェニールヒドラチン」

性状及應用 「ヒドロヒノン」即チ異性ニ水酸化偏蘇兒ハ無色三稜ノ結晶ニシテ酒精、依的兒、沸湯ニ溶ケ易ク冷水二十分ニ溶解シ且ツ攝氏百六十九度ニ溶解ス防腐及解熱作用ヲ有シ其效力「レゾルチン」ノ上ニ位ス即チ「ヒドロヒノン」〇、八ハ「レゾルチン」三、〇ト同一ノ效アリ且ツ「レゾルチン」ノ如キ副作用ヲ發起セズブリーゲル氏ノ説ニ由レハ〇、八—一、〇ヲ與ヘ始メテ副作用ヲ發スル者トス本品ハ解熱時間短クノ再ビ發熱シ且ツ呼吸促進、眩暈、耳鳴、虛脫等ヲ發スル故ニ近來大ニ其用ヲ減セリ淋疾ノ注射料、傳染性眼炎、淋毒性結膜炎ノ療法トシ内用ニハ石炭酸ノ如キモ毒性ハ之ヨリモ少シ本品ヲ解熱劑トス

用量 「ドクトル」フェルスタル氏ハ該品ヲ眼科の防腐藥トシ稱用セリ即チ百倍乃至五十倍ノ「ヒドロヒノン」リント「及」ビ綿絮トナシ諸種ノ眼科手術後綳帶品ニ供用ス又百倍乃至五十倍ノ溶液ハ眼球ニ觸ル、モ刺戟症ヲ發起セサルヲ以テ洗眼用ニ適スベシ解熱劑トシ一日

ヒドラチエトン ヒドロヒノン

數回〇、二—〇、四—一、〇ヲ用ヒ他ノ目的ニハ〇、二ヲ散或ハ水劑トナシ與ヘ又ハ十%液
二、〇ヲ皮下注入料トス一回ノ極量ハ〇、八一日ノ極量ハ一、五ナリ

○「ヒドロナフトール」 *Hydronaphtholum*

本品ハ無臭ノ物質ニシテ水ニ溶ケ難ク酒精、依的兒、呀囉仿謨、屈利設林ニ溶解ス防腐藥トシ
腸内制腐ニ〇、一—〇、二ヲ丸劑トナシ用ユ

○「ヒドロキシールアミン」(甚シキ還元性質アリ詳細ハ鹽酸「ヒドロロキシールア
ミン」ヲ見ヨ)

○「ヒメノジクチオン、エキステルスム」(強壯劑及解熱劑)

○「ヒベコウムプロクムベンス」藥(發汗劑)

○「ヒドロナフチラミン」 *Hydronaphthylamin. C₁₀H₇O₄NH₂*

本品ハ甚シク瞳孔ヲ散大スルノ性アリフイレーネ氏ニ從ヘハ弱溶液(一分乃至五分水百分)
ヲ點眼スルニ瞳孔散大ス若シ溶液ノ少量ヲ試ニ皮下注射シ吸收セラル、キハ頗ル甚シキ瞳
孔散大ヲ來スベシ此作用ハ亞篤魯必涅ニ優レル者ニシテ之ニ由リテ散大ノ極點ニ至レル
モノヲ更ニ「ヒドロナフチラミン」ニ由リテ尙一層散大セシムルヲ得

○「ヒメネア」皮(鎮靜、收斂劑トシ、咯血、血尿、下痢、赤痢ニ流動越幾斯十乃至二
十滴ヲ投ス)

○「ヒグロファイラ、スピノーサ」草(利尿劑トシ水腫六〇、〇煎劑トナシ二十四時

間内ニ服用セシム

○「ヒドルアミール」(防腐藥)

○「ヒドルアミール、エーテル」(知覺麻酔藥)

○「ヒドランゲア、アルホレア」(膀胱結石劑)

○「ヒドロコチーレ、アジアチカ」(癩病及其他ノ皮膚病其他利尿、變質劑トシ〇、
二—〇、五ヲ内用ス)

○「チノヨジン」 *Chinoidin.*

「チノヨジン」ハ黄色結晶形ノ粉末ニシテ沃度ヲ含有ス消毒藥トナシ且ツ皮膚諸病ニ稱用ス
其法等分ノ珪酸苦土ニ和シテ散布シ或ハ其一分ヲ三分ノ脂肪或ハ華攝林ニ加ヘ塗布料トス

○「チノピリン」 *Chinopyrin.*

本品ハ白色ノ粉末ニシテ水ニ溶解シ苦味アリサントツツン氏ハ麻拉利亞ニ皮下注射シタリ内
用スルキハ中毒ノ恐アリ、

○「チノラー」 *Chinoral.*

本品ハ油様稠厚ノ液ニシテ強苦味アリ催睡藥トシ大量ヲ酒客譴妄〇、〇五—〇、一ヲ用ユ外用
ニハ無毒ノ防腐藥トシ同強度ノ昇汞液ニ優レリ

○「ヒプノン」 *Hypnon. C₆H₅COCH₂CH₂CH₂NO₂* 「アチエトフエノン」「メチー
ルフェニール」「アチエトン」

性状及應用 純粹ノ「ヒプノン」ハ強ク光線ヲ屈折スル流動シ易キ中性反應ニシテ苦扁

麻酔藥

ヒドロナフトール ヒドロナフチラミン ヒノヨジン チノピリン ヒノラーヒプノン

桃臭アル無色ノ液體ヲナシ水ニ溶解セスト雖モ依的兒、酒精ニ容易ニ溶解シ攝氏十四度ニ於テ結晶狀ニ凝結シ百九十八度ニ於テ沸騰ス不快ノ臭氣ヲ放チ之ヲ服スレバ安靜ナル熟睡ヲ起ス故ニドユ、シャルダンボーメ氏及バテット氏ハ神經質ノ不眠症ニ賞用ス

マイレットコンベマン兩氏ハ本品ノ無効ナルヲ説ケリ然レモ一日〇、一五—〇、四五ヲ用ヒ運動、興奮減スルヲ實驗セリ是レ運動中樞ヲ毒スルニ由ルト説明セリ又本品服用後ハ著シク體重ヲ減シ且ツ血中ニ「ヘモグロビン」ノ減少スルヲ實驗セリ

ボボフ、ネンキー氏ノ説ニ由レハ血中ニ於テ安息香酸及炭酸ニ分解シ膠糖ト抱合シ馬尿酸ニ變シ尿中ニ排泄スト而シテ其效用ハ嘔囉仿謨ニ劣レモ「バラアルデヒット」ニ同シ「ヒブノン」ハ精神病ノ不眠、興奮ニ用ヒタリト雖モ諸家ノ經驗ニ由レハ其效、確實ナラス

用量 〇、二—〇、五ヲ屈利設林或ハ扁桃油ト混合シ膠囊ニ容レ或ハ乳和液トナス

〇「ヒブノン」一滴 酒精一、〇 橙皮舍利別六、〇

右頓服

〇「ヒブナル」 *Hypnolum*. 格魯利兒安知必林

「ヒブナル」ハ無色無臭無味ノ引濕性結晶狀ノ粉末ニシテ水十五分ニ溶解シ酒精ニ容易ニ溶解シ五十八度乃至六十度ニ溶解ス催眠劑トシテ疼痛及咳嗽ニ由テ來ル不眠、精神病患者ノ輕キ興奮狀態、初起ノ酒客譫妄ニ良效アレモ重症興奮狀態ニハ抱水格魯拉兒ヨリモ奏效少シトス殊ニ小兒科ニ適當ス又神經痛ニ皮下注射ス用量ハ一、〇—三、〇ヲ膠囊或ハ水溶液トス

〇「ピクリン」酸 *Picrinsäure*. $C_6H_7(NO_2)_5OH$.

性状 本品ハ鮮黄色光輝アル小葉狀結晶ニシテ冷水ニ溶ケ難ク沸湯ニ溶ケ易シ其他酒精、依的兒、嘔囉仿謨ニ溶解ス皮膚、絹絲、獸毛ヲ黃染ス

應用及用量 本品ハ味極メテ苦ク稍、酸性ニシテ收斂ス下等動物、内臟蟲ノ劇毒物ナリ人ニ於テハ惡心、嘔吐、下痢、疲倦、羸瘦、血球ノ固有ノ變化ヲ發起ス内用スルハ全組織及結膜ノ黄色ヲ呈ス内臟蟲、旋毛蟲、間歇熱、瘧疾、痲瘋質斯、神經痛ニ〇、一—〇、二ヲ丸劑或ハ溶液劑トナシ投ス

〇「アントロビン」 *Chinotopin* 規那酸「ワトロマン」

本品ニ二種アリ第一號「ヒノトロビン」ハ規那酸七十三%ト「ウロトロビン」二十三%トヲ含ミ第二號「ヒノトロビン」ハ規那酸八十%ト「ウロトロビン」二十%トヲ含ム

此兩抱合物ハ白色ノ粉末ニシテ水ニ溶解シ其水溶液ハ酸味アリ故ニ爽快ナル「リモナーデ」トナスニ足ル〇ニコラエー氏及ヒハーゲンベルグ氏ハ尿酸體質ニ賞用セリ第一號ノ品ハ一日量三、七—五、五トシ第二號ハ一日量五、〇—七、五トス大量ノ本品ヲ用ユルトキハ膀胱ヲ刺戟ス

〇「カロール」 *Chirrol*.

本品ハ澄明ノ液ニシテ多量ノ層ヲ見ルハ黄色ヲ呈ス本品ハ其中ニ含メル溶解劑ノ蒸發ヲ防止スルカ爲メニ密栓シタル壘ニ貯ヘサル可ラズ若シ時日ヲ經ルニ從ヒ稠厚トナルハ之ヲ

ヒブナル ビクリン酸 ヒノトロビン ヒロール

再ヒ流動セシムルニハ少許ノ依的兒ヲ加フレバ足レリ
本品ハ古魯胃膜及消毒劑ノ代用トシテ外科手術者等ノ殺菌且乾燥シタル手ヲ蓋護スルニ用
ユ即チ粘膠ナラサル全ク殺菌シタル薄膜ヲ以テ被ハレ且其膜ハ剝脱又ハ龜裂セス容易ニ除
去セラル、ヲ得ル者タリ

麻酔鎮靜藥

○菲沃斯失亞密涅 *Hyoscyaminum. C₁₇H₂₃NO₃.*

ラーデンブルク氏ハ菲沃斯ヨリ菲沃斯失亞密涅ヲ製シタルク氏ハ菲沃斯失涅ト稱スル類鹽
基ヲ製セリ此者沃度水素酸ト化合スレハ沃度水素酸菲沃斯失亞密涅ヲ生ス

性状 菲沃斯失亞密涅ハ星芒狀或ハ束薪狀ノ結晶體ニシテ絹絲様ノ光澤ヲ有シ或ハ透明ナ
ルアリ不快ニシテ苛烈ノ味ヲ有シ冷水ニ溶解シ難シト雖ヒ熱湯、酒精、依的兒、嚼嚙仿膜ニ
容易ニ溶解ス

菲沃斯失亞密涅ノ作用ハ全ク亞篤魯必涅ト同一ナリ即チローラン氏ヘルマン、ブライエル
氏ハ本品〇、二ヲ兎ニ與ヘシニ呼吸困難、促進及瞳孔散大ヲ發シ二十四時乃至四十五時間ニ
斃レタリシユロフ氏ノ試驗ニ由レハ菲沃斯失亞密涅ノ瞳孔散大力ハ亞篤魯必涅ヨリ強劇ニ
シテ人體及兎ニ試ミルニ散大ヲ始ムルヲ速ニシテ且ツ久シク其效ヲ持續ス兎ニ於テハ已ニ
〇、〇〇八ニテテ效ヲ奏スベシ

瞳孔散大藥
トノ眼科ニ
應用ス

應用

ラーデンブルグ、ゲルツ、ライシゲル、ホーノルド等諸氏ハ亞篤魯必涅ニ同シク
瞳孔散大藥トシテ稱用シ左ノ如キ報告ヲナセリ即チ本品ハ其性強烈ノ瞳孔散大藥ニシテ一滴ヲ

點眼スレバ七八分時ノ後チ瞳孔著シク散大シ調節力ヲ麻痺セシメ二三滴ヲ點眼スレバ精神
不安、言語澁滯、頭痛、咽頭乾燥、歩行踉蹌ヲ發起ス用法ハ二百倍乃至三百倍ノ溶液ヲ點眼ス
ルヲ良トス該品ハ亞篤魯必涅ヨリ其效迅速ニシテ其力大ナリトエルメルト氏ノ説ニ由レハ同
量ノ亞篤魯必涅ヨリ五倍ノ散瞳力ヲ有ス故ニ亞篤魯必涅ノ效ナキ者及亞篤魯必涅ヲ用ユル
ヲ能ハサル場合ニ適スヘシツウユデー氏ハ臭素水素酸「ヒヨスチアミネ」ヲ瞳孔散大藥トシ
稱用セリ是レ沃度水素酸「ヒヨスチアミネ」ノ如ク遊離ノ沃度ヲ含有セサルヲ以テ刺戟スル
ヲナク速ニ散瞳ノ效ヲ奏スレハナリ同氏ハ二百倍ノ者ヲ點眼セリコーリンズ氏ハツウエデ
ー氏ノ法ニ從ヒ比較的試驗ヲ施シ左ノ如ク報告セリ即チ其效、亞篤魯必涅ヨリ強ク速カニ
ノ長ク持續シ「エゼリネ」ニ由リテ容易ニ抑壓セラル、等ノ害ナシ故ニ高度ノ散瞳ニ要スル
際、稱用スベシ又本品ハ亞篤魯必涅點眼ニ由リ生スルカ如キ咽頭ニ不快ノ感ヲ發セズ且ツ
「ヂユボイジネ」ニ由テ誘發スルカ如キ中毒症ナシト

○チルンベルゲル氏自體ニ試ミ鎮靜催眠ノ效アルヲ證セリフロンミユルル氏ハ咳嗽ニ因
スル不眠症ニ效アリトシウ・ノモント氏ハ汞毒顫慄及ヒ神經痛ニ偉效アリト其他癲狂及五
官錯亂、恐水病等ニ效アリトネストアー、チイライト氏腎臟病ノ不眠症ニ沃度水素酸「ヒヨス
チアミネ」ヲ皮下ニ注射シ良效ヲ得左ノ報告ヲナセリ(一)本品ハ莫兒比涅ヲ用ユルヲ能ハ
サル腎臟病者ノ不眠ニ用ヒ良效アリ殊ニ他ノ麻酔藥ノ效ナキ者ニ用ヒ良效アリ(二)〇、〇
〇六ヲ皮下ニ注入スルキハ煩躁及譫語ヲ發シ亞テ安眠セリ故ニ此ノ如キトキハ用量ヲ減

鎮靜催眠ノ
效アリ

少スベシ(三)其奏效速ニシテ使用後十分乃至二十分時ノ後睡眠スルヲ常トス(四)注入後強劇ノ譫言妄語ヲ發スト雖モ安眠ヲ得ルヲ以テ抱水格魯刺兒及ビ貌魯謨加留謨ニ由テ生スル一少時間ノ睡眠ニ比スレバ心身共ニ爽快ニシテ注入部ニ更ニ刺戟症ヲ發セサル者ナリト〇
リース氏ハ舞蹈病ニ〇、〇〇一〇、〇〇三ヲ一日數回皮下注射シ良效アリテ嘔吐ノ他、不快ノ副作用ナシト

「ドクトル」ウオーカー氏ハ「ヒヨスチアミン」ヲ喘息、胃瘧、疝痛、膀胱痙攣ニ用ヒ良效ヲ認メタリ用量ハ症ニ應ジ異ナリト雖モ痙攣ノ全ク退却スル迄毎半時或ハ毎時〇、〇〇〇五ヲ服シ若シ奏效速カナランヲ欲セハ同量ヲ皮下ニ注入スベシ通常二三回ニテ效ヲ得タリ
本品ノ市場ニ販賣スル者ハ其效力、種々ナルヲ以テ用ニ臨ミ検査スルカ或ハ少量ヨリ試用シ漸次増量スルヲ安全ナリトス用法ハ丸劑、散劑トナシ或ハ皮下注入トス世上最モ行ハルルメルク氏ノ菲沃斯失亞密涅ヲ催眠藥又ハ鎮痛藥トシテ用ユルニハ〇、〇〇一〇、〇〇三「精神病者」ニハ〇、〇〇三〇、〇〇四「皮下注入」ニハ〇、二五ヲ縮水、屈利設林各一五、〇ニ溶解スル者ヲ良トス

處方

〇沃度水素酸「ヒヨスチアミン」〇、一 縮水二〇、〇
右臨臥二筒皮下注射(不眠)

〇「ヒヨスチン」 Hyosinum. $C_{17}H_{23}NO_6$

麻酔鎮靜藥

性狀 半流動舍利別様ノ結晶セザル物質ニシテ冷水ニ溶ケ難ク酒精及依的兒ニ容易ニ溶解

應用及用量 「ヒヨスチン」ハ亞篤魯必涅及菲沃斯失亞密涅ノ如ク瞳孔ヲ散大シワルタル氏ニ從ヘハ「ヒヨスチン」ノ散瞳作用ハ亞篤魯必涅ヨリモ速ニ現ハル、モ長ク持續セス調節筋麻痺ノ持續ハ稍同一ナルモ一般作用ハ亞篤魯必涅ノ如ク危險ナラズ眼科ニハ一分ト

精神病及振
頭麻酔ニ效
アリ

千分乃至一分ト四百分ノ液ヲ用ユ、甲八十乃至十五滴乙ハ四乃至六滴ヲ短キ間歇時ヲ以テ點眼ス近時精神病ニ「ヒヨスチン」鹽ヲ用ユルヲ稍廣ク行ハレ定期性癲狂ニ姑息藥トシテ

〇〇一〇、〇〇二ヲ與ヘ又振頭麻痺ニ皮下注射シ效アリ

〇グナツク氏ハ鎮靜催眠ノ目的ニテ用ヒ效ヲ得タリシカ鎮痛ノ效ヲ見ズ奏效ハ用後十二分時ヲ要ストクニ一氏ハ八十八名ノ精神病ニ三千回試用シ其ノ八十二、二%ハ服用後一乃至二時間ニシテ睡眠シ六乃至八時間熟睡セリウード氏ハ八名ノ精神病ニ用ヒ催眠ノ效アルヲ證セリフランシスコ氏ハ酒客譫妄症ニ用ヒテ良效ヲ得又ソルト氏モ良效アルヲ報セリコーペルト氏ハ鹽酸「ヒヨスチン」〇、〇〇〇五—〇、〇一ヲ皮下注射シ百回以上實驗シ毎回催眠ノ效ヲ奏シ少シモ副作用ナシ睡眠ハ注射後十分乃至十二分ニテ現ハレ五時乃至八時間ノ長キニ至ルクルウエツタル氏ハ一回量〇、〇〇一〇、〇〇二(鹽酸鹽)ヲ皮下ニ注射シ良效ヲ得タリ

〇醫學士島村俊一氏ハ沃度水素酸「ヒヨスチン」ヲ皮下注入或ハ内用トシテ一回ノ極量〇、〇〇一〇、〇〇二ト定メ只、兩三回〇、〇〇〇五—〇、〇〇〇七ヲ躁暴狂或ハ躁狂患者三

ヒヨスチン

十有餘名ニ試用セリ即チ興奮症狀盛ナルノ時皮下ニ注入スルトキハ毎回必ス催眠ノ功ヲ全
 スルヲ得タリ殊ニ該藥〇、〇〇二ヲ縮水ニ混シ内用セシメタル時モ催眠作用ハ少シモ異ナ
 ルヲナシ只就眠時間ニ遲速アルノミ即チ三十分ヨリ四十分ヲ經サレハ鎮靜催眠ノ效ヲ見ル
 克ハス是レ諸學士ノ説カサル所ナリ之ニ反シ皮下注入スルキハ毎回必ス十分乃至二十分ヲ
 出テスシテ卓絶ノ奏效ヲ實驗セリ沃度鹽モクルウエツタル氏等カ用ヒタル鹽酸鹽モ鎮痛
 催眠ノ效少シモ異ナルヲナシ安眠熟睡スル時間ハ六時ヨリ八時ニ至リ醒後著シキ副作用ナ
 キハ明瞭ナリ加之余ハ該藥ヲ數回連用シテ興奮躁暴狀ヲ鎮靜シ二三ノ患者ヲシテ全治セシ
 メタリ〇ウオード氏ハ遺精ニ奇拔ノ功アリ其他喘息、癆咳、胃痛、疝痛、三叉神經痛、癩癩、震
 顫麻痺、心臟神經痛ニ奏效アリ

○諸學士副作用ハ稀ナリト説ケリグナツク氏ガ副作用トノ記スルハ咽頭ノ乾燥、瞳孔ノ散
 大、歩行蹣跚、倦怠ノ感覺、頭部ノ壓重、時トノ戰慄、溫感、惡心、呼吸不利等ナリ

主トシ眼科
ニ應用ス

(イ) 貌魯漢水素酸「ヒヨスチン」 *H. hydroblonicum.*

無色菱形ノ結晶ニ水及酒精ニ容易ニ溶解シテ無色ノ液トナリ藍色「ラクムス」紙ヲ微ニ紅
 變シ苦味把抓様ノ味アリ依的兒及嘔囉仿謨ニ僅ニ溶解スルノミ點眼水トシテ外用スルモ稀ニ
 ノ屢、一日二三回〇、〇〇〇五ヲ丸劑或ハ溶劑トナシ内用シ又神經病ニ於テハ皮下ニ注入ス
 ルヲアリ

一回極量〇、〇〇〇五ニ一日極量〇、〇〇二ナリ

(ロ) 鹽酸「ヒヨスチン」 *H. hydrochloricum.*

本品ハ無色ノ大結晶ニ容易ニ溶解ス主トシ眼科ニ應用シ内用スルハ稀ナリ

(ハ) 沃度水素酸「ヒヨスチン」 *H. hydrojodicum.*

本品ハ黃色或ハ褐色ノ細小堅硬稜柱狀結晶ニ水ニハ溶ケ難シ多クハ散瞳藥トシ〇、〇〇
 〇五―〇、〇〇一五ヲ内用セシメ或ハ十分一「ミリ」瓦乃至二分一「ミリ」瓦ヲ皮下注射ス

○沃度水素酸「ヒヨスチン」〇、〇一―〇、〇一 〇鹽酸「ヒヨスチン」〇、〇一 縮水一、〇

○四 水七〇、〇 橙皮舍三〇、〇 右三分一筒乃至半筒注入(振顫麻痺)

右一日一乃至二回一茶匙

○「ヒステリオニカ、バイルエン」 *Hysterionica Baylunen.*

本品ハ智利ニ産スル植物ニ揮發脂肪ヲ含ミ特異ノ臭氣ト刺戟スル味及單寧ヲ含メル褐色
 酸性ノ樹脂ヲ存在ス本品ハ赤痢、肺癆家ノ下痢、呼吸器、泌尿器病ノ加答兒ニ浸劑(十分ト千
 分)トナシ一日數鐘ヲ用ヒシム

○「ビビトツアホイン」酸(黃金様黄色ノ結晶ニ酒精、依的兒ニ溶ケ易シ利尿劑
 トシ〇、〇二―〇、〇三ヲ投ス)

○「ピロツオン」 *Pyrosom.*

本品ハ硫酸依的兒ニ溶セル五十%ノ過酸化水素ノ溶液ヨリ成ル皮膚ノ斑點(雀斑、母斑、疣
 等)ヲ脱色セシムルニ用ユ

貌魯漢水素酸「ヒヨスチン」 鹽酸「ヒヨスチン」 沃度水素酸「ヒヨスチン」 「ヒステリオニカ、バ
 イルエン」 「ピロツオン」

○「プロサール」 *Pyrosal*. 撒里失爾酸醋酸安知必林

本品ハ無色小板狀或ハ針狀結晶ニシテ苦味ナラザルモ酸味アリ水、酒精、依的兒ニ溶ケ難シ安知必林五十%撒里失爾酸三十七%ヲ含ム○解熱劑殊ニ肋膜炎、多發關節炎、重症流行感冒、偏頭痛ニ投スルモ副作用ナシ○一日二回乃至六回○、五ヲ「プロサール」ニ包ミ或ハ乳汁、咖啡、柯々阿酪等ニ加ヘテ用ユベシ

○「ピカラ」草(強壯利尿ノ效アリ)間歇熱及淋疾ニ○、○ニヲ水一五、○ノ浸劑トシ頓服セシム之ヲ一日二回反覆ス)

○「ビペロナール」(解熱及防腐劑トシ)一、○—三、○ヲ用ユ)

○「ピクロナール」(消毒藥)

○百部(「ホトヅラ」)

本品ハ咳嗽ヲ鎮メ皮膚ノ寄生蟲ヲ殺ス效アリ用量二、○—六、○ナリ

尿器病藥

○「ピチー」木 *Pichi*.

智利ニ産スル「ファビアナ」、イムブリカタ」ノ枝尖ニシテ峻下泄性ノ樹脂及類鹽基「ファビアニン」ヲ含有ス煎劑(二十分ト十分ノ者一日二三鐘)及流動越幾斯(一日四乃至六食匙ヲ水ニ加ヘ用ユ)トナシ腎病、膀胱結石及慢性膀胱加答兒ニ與フ此點ニ於テハ本品ハ其特效劑トナス可キカ如シ又肝病ニ用ヒテ膽汁分泌ヲ催スヲ得可シ

麻酔鎮靜藥

○「ピスタチア」皮 *Cortex psidiae*.

本品ハ「ピスタチア」、エリトリナ」ノ皮ニシテ其產地ニ於テハ魚ヲ眩暈セシメテ之ヲ捕獲スルニ供スハミルトン氏ハ此皮ノ麻酔性能ヲ發見シ近時屢、本品ヲ阿片ノ代用品トシテ賞用セシカ不快ノ副作用ヲ呈セサリキワツト氏ハ本品ヲ冷血及温血動物ニ對スル麻酔藥トナセリ則チ反射機減退シ瞳孔散大シ唾液及汗液分泌増進シ脈搏減少、血壓亢進シ大量ノ後ハ心筋ノ作用減降シ呼吸麻痺ニ由リテ斃ルザイフェルト氏ハ強壯家ニ本品ノ酒精越幾斯○、二五—○、五ヲ投セシニ熟睡ヲ起シ瞳孔僅ニ散大スルノミニシテ翌朝輕ク頭部壓重ヲ殘セリ

本品ハ種々ノ不眠、疼痛症、神經痛ニ用ヒザイフェルト氏ハ肺癆家ニ與ヘシニ咳嗽刺戟ヲ除キ睡眠ヲ催ス本品二、○—四、○ヲ散劑トシ流動「ピスタチア」、エリトリナ」越幾斯二、○—四、○「乾燥酒精製越幾斯」○、二五—○、五ヲ用ユ

○「バスマール」 *Bismal*. 「メチーレン」ガ

本品ハ灰白藍色ニシテ約三十%ノ蒼鉛ヲ含有セル甚容積アル粉末ニシテ亞兒加里ニハ帶黃紅色ヲ呈シテ攝取セラレ此溶液ヨリ酸ヲ加フレバ再ヒ析出スヲエフェーレ氏ハ收斂劑トシテ殊ニ頑固ノ下痢ニ與ヘテ效ヲ得タリフランク氏ハ痔瘡及痲鈍性下脚潰瘍ニ撒布セリ用量ハ一日三四回一、○—三、○トス

○「バスマート」 *Bismulose*.

本品ハ蒼鉛ト蛋白トノ化合物ニシテ(蒼鉛二十二%蛋白約六十六%)白色無味無臭ノ粉末ヲナシ光線ニ遇ヘハ灰白色トナル水及其他ノ溶解劑ニ溶ケス加熱シテ酸ヲ加フレバ一部分溶解

シ稀薄亞兒加里ヲ加ヘテ殊ニ熱スルキハ二色性ノ液ヲ生ス
本品ハエツシエリッヒ及ルーゲンブル氏ハ小兒科ニ於テ胃腸ノ防腐劑トシテ内用シ外用ニハ
濕疹、痒疹、火傷ニ撒布セリ内用量ハ乳兒ニハ一日數回一小刀尖、小兒ニハ一日三四回半乃
至一茶匙、大人ニハ之ヨリ多量ヲ肉羹汁、水、蜂蜜ニ加ヘテ投シ又ハ澱粉ヲ加ヘテ灌腸ス

- 「ヒユアマソリバ」葉(呼吸器病ニ用ユ)
- 「ヒユインガン」(泌尿器病殊ニ膀胱結石ニ用ユ)
- 「ビクロアドニジン」(アドニスウエルナリヌ)ノ類鹽基)
- 「ビヒユリム」(下痢ニ〇、五―十、五ヲ與フ)
- 「ビコソ」葉(截瘻劑トシテ二分ト五分ノ者ヲ投ス)
- 「ビリガン」(吐劑)
- 「ピングイン」(肺癆家ノ營養劑)
- 「ビクナンテムム、リニフオリウム」(赤痢、腸加答兒ニ用ユ)
- 「ビレチーン」(解熱、鎮靜藥)
- 「パイリン」Piperinum. $C_{17}H_{19}NO_3$.
- 「ピペラチン」Piperazine. $(C_2H_5NH_2)_2$ 又(「ススルミン」ヲ見ヨ)

尿酸石溶解

無色稜柱狀ノ結晶ニシテ純粋ノ狀況ニ在テハ無味ニシテ僅ニ水ニ溶解シ酒精、依的兒、嚼囉仿誤
及「ベンツオール」ニ容易ニ溶解ス間歇熱、消化遲慢及一般衰弱ニ〇、四―〇、五ヲ與フ

性状 「ピペラチン」ハ無色濕潤ノ觀アル結晶塊ニシテ特異ノ微臭アリ本品ハ氣中ヨリ容易
ニ濕氣及炭酸ヲ引攝シテ炭酸鹽ニ變ス本品ハ常溫ニ於テ稍揮發スレド鹽酸ヲ近ツクルキハ
霧ヲ發生ス本品ノ水溶液ヨリ「ピペラチン」ハ透明ノ光輝アル板狀結晶ヲ析出ス化學的性
狀ニ從ヘハ本品ハ強鹽基ニシテ水ニ容易ニ溶解シ水溶液ハ紅色「ラクムス」紙ヲ強ク藍變ス
酒精ニハ稍溶ケ難シ

應用 本品ハ人體ノ神經系ニ興奮作用ヲ發スルノ說ハ試驗ニ由テ確定セズ之ニ反シテ
「ピペラチン」ハ尿酸鹽ト共ニ溶解性鹽ヲ形成スル性アルヲ證シタリ此性質ニ基キ本品ヲ尿
酸性體質ニ基因スルガ如キ疾患(急慢ノ痛風、腎石等)ニ賞用セリ即チ血中ヨリ尿酸ヲ除キ
關節及腎臟ニ於ケル尿酸沈着(尿酸砂及尿酸石)ヲ溶解スルニ用ヒタリ故ニ膀胱結石ハ「ピ
ペラチン」ヲ以テ洗滌スルニ由テ之ヲ溶解スルヲ得タリ又遊離セル此鹽類ハ二十度ノ溫ニ
於テ比較的ニ大量ノ尿酸ヲ溶解スルト本品ハ尿酸ヨリ生成セサル結石ノ結締質ヲ溶解シ且
之ニ由テ此結石ヲ脆軟トナシ粉碎セシメ得ルハ人體外ノ試驗ニ由テ確定シタル所ナリ
「ピペラチン」ハ尿ヲ經テ排泄セラル、者ニシテ其一部ハ服後數時間ヲ經テ已ニ尿道ヲ經テ
排泄セラレ其他ノ殘餘ハ尙體中ヲ循環シ徐々ニ排泄セラル
眼科ニ於テワルテル氏ハ二名ノ綠内障患者ノ同時ニ痛風又ハ佝僂質斯性自覺症アル者ニ本
品ヲ用ヒ著シク視力佳良トナレリ故ニ本品ハ綠内障ノ手術ヲ厭フカ又ハ其後治法ニ賞用ス
ベシ

本品ハ一日數回〇、一〇、五ヲ振盪合劑トナシ又一回量〇、〇五—〇、三—一日量二、〇ヲ皮下注射ス

〇「ピベラチジン」Pyberazithim. 合成的「スベルミン」

本品ノ醫療上應用セラル、ハ鹽酸「ピベラチジン」ニシテ美麗ノ小針狀結晶ヲナシ水ニ溶ケ易ク確砂様ノ味アリテ毒性ナシ本品ハ「スベルミン」ニ代用スル者ニシテ拳丸液ノ有效分ナリ

〇「ピオクタニン」Yokaninum. (メチールウイテレット)

本品ハ「アニリン」色素ヨリ製セル者ニシテスチルリング氏ハ紫兒色素ノ頗ル著キ殺菌力アルヲ發見セリ此兩品即チ「ピオクタニウム、コエルレウム」及「ピオクタニウム、アウレウム」、ト稱スル製劑ハ「メチールウイテレット」及「アウラミン」ナリ

性状 本品ハ種々ノ「アニリン」色素ノ混合物ニシテ水ニハ藍紫色ヲ呈シテ僅ニ溶解スル粉末ナリ

作用及應用 本品ハ強烈ノ防腐藥ニシテ之ニ由リテ生ゼル斑點ハ石鹼精或ハ酒精製香水ニ由リテ速ニ且十分拭除セラルスチルリング氏ハ防腐及化膿制止劑トシテ外科及眼科ニ賞用セリ創傷療法ニ效アルハ速ニ痂皮ヲ結ヒ其治療ヲ催スニアリモゼチツヒ、モールホフ氏ハ手術ス可ラサル惡性ノ腫瘍ニ本品ヲ注射シ又粘膜ノ結核性潰瘍ニモ應用セララル

用量 外科的ニ用ユル水溶液ハ千倍乃至五千倍トナス「器械ノ消毒ニハ一萬倍乃至二萬倍」繻帶料即「ガーゼ」綿ニハ「プロミルレ」ノ者「撒布末ニハ〇、一一、〇澱粉一〇〇、〇」

眼科的の用液ニハ一千倍ノ者「其他ハ軟膏(二乃至十%)及杆條トナス

〇「ピクロトキシニン」Perotoxinum. $C_{10}H_{15}O_2$

性状、應用、用量 本品ハ無色無臭光輝アル針狀結晶ニシテ百九十度乃至二百度ニ溶解シ冷水ニ溶ケ難ク(一分ト四百分)沸湯及酒精ニ溶解シ易シ温處ニ於テハ「フェリング」氏液ヲ還元ス

大量ヲ投スレバ知覺鈍麻及劇シキ痙攣ヲ發シ味極テ苦シ盜汗ヲ制止スルニ良效アリ殆ト亞篤魯必涅ト同效アリ少量ヲ用ユルハ不快ノ副作用ヲ發セサルヲ以テ亞篤魯必涅ヨリモ長ク投スルヲ得ヘシ本品ノ中毒ノ解毒劑ニハ抱水格魯拉爾ヲ最良トス

皮下注射及内用ニハ〇、〇〇八—〇、〇一ヲ水溶液トナシ用ユ即チ本品〇、一水二〇〇、〇ノモノ十五乃至二十滴ヲ内用セシム

〇「プリジン」Pyridinum. C_5H_5N .

鎮痙藥

性状及作用 「ピリジン」ハ骨油或ハ石炭釜兒ヨリ製シ又亞硝酸亞密兒ヨリ人工的ニ製シタル無色透明ノ揮發シ易キ液體ニシテ攝氏百十六度乃至百十八度ニ沸騰シ其臭氣刺ス

カ如ク其味灼ク如シ鹽物酸類ト化合シ溶解シ易キ鹽類ヲ生成ス水、酒精、依的兒、偏陣、脂油ニハ透明ニ混和シ比重〇、九八〇ナリジ―氏ノ說ニ由レバ呼吸中樞ノ反射刺戟ト興奮性ヲ減退スル效アリト犬ニ用ユレハ迷走神經中樞端ヲ刺戟スルモ血壓昇騰セズト

ハルナック、マイエル氏ハ蛙ニ就テ試驗セシニ痙攣中樞脊髓ノ運動神經中樞筋肉内神經ノ末

ピベラチジン—ピオクタニン—ピクロトキシニン—ピリジン

喘息ノ對症

端ノ興奮ヲ催スト又フオル及オイーンベルヒ氏ノ說ニ由レハ動物ノ粘膜ヲ刺戟シテ呼吸困難ヲ起シ遂ニ呼吸停止シテ斃レタリト

淋疾ニ效アリ

應用 「ピリジン」ハ容易ニ蒸發スルト大氣ニ混シ易キヲ以テ四、〇—五、〇ヲ布片ニ浸タシ一日三回二十乃至三十分時間喘息ノ對症藥トナシ吸入セシメ或ハ「ピリジン」ヲ充タセル壺子ヲ時々拔栓シ其蒸氣ヲ吸入セシメ或ハ四、〇—五、〇ヲ皿ニ盛り大約二十立方ノ室ニ自在ニ發散セシメ一日三回五六分時間同室ニ入り吸入セシメ偉效アリケンメン氏ハ本品ノ吸入法ヲ十九名ノ呼吸困難症ニ試ミ殊ニ神經性喘息ニ著效アリ氣腫性喘息ニハ唯其發作ヲ八乃至十二時抑制スルノミレンチ氏ハ本品ヲ心臟強壯劑トナシ心臟病ニ用ヒ良效ヲ得タリ又近時ラーデマケル氏ハ「ピリジン」ヲ尿道淋疾ニ注射スルヲ賞贊セリ(百瓦ノ水ニ六乃至八滴「〇、三」ノ者ヲ用ユ)三乃至四回注入スレバ本病治愈スルヲ以テ同氏ハ淋疾ニ對スル有效ノ劑トナセリ用量ハ心臟強壯劑トシテ六乃至八滴ヲ水ニ加用シ漸次二十五滴ニ増量ス可シ

〇「ピロカルビン」(效用「ピロカルピン」ノ如シ)

〇必魯加爾必涅 *Pilocarpinum.*

本品ハ發汗及吐涎ノ著效力アルモノニシテ其他下泄劑、吐劑トナス從來咽喉加答兒、子痢、腎臟炎、肋膜炎、眼病(綠内障、虹彩炎等)ニ用ヒタリシカ近時ハ左ノ諸病ニ內用セシメリ
(一)歇私的里癩癩ノ搗搦發作ニハ本品〇、〇—一、〇〇二ヲ皮下注射シ忽チニノ持續スル輕快ヲ得タリ(二)小兒ノ搗搦狀態ニ一歳以下ノモノニ於テ一日三回〇、〇〇二—一、〇〇五

皮膚病藥

ヲ灌腸セリ(三)重聽ニ本品ヲ皮下注射スルニ正常ノ聽官ヲ恢復スルヲ見タリ(四)感冒ノ頓挫藥トシテ〇、〇二ヲ內用セシムルニ之ニ續發スル症狀ヲ確然豫防シ數時間内ニ健康ニ復セリ(五)黃疸ニハ本品ヲ特效劑トス一日一二回〇、〇一ヲ皮下注射ス(六)實布垠里ニハ左ノ合劑一咖啡匙ヲ毎時(夜間ニモ)投ズベシ

鹽酸必魯加爾必涅 〇、〇二—〇、〇四 百弗聖 〇、六—〇、八 鹽酸二滴 水八〇、〇
(七)別拉敦那及亞篤魯必涅中毒ノ解毒劑トシテ〇、〇一—〇、〇二ヲ毎五時ニ用ユ
カロツサ氏ハ肺癆ニ對シテ本品〇、〇一五「コンドユランゴ」越幾斯二、二五甘草末適宜ヲ以テ三十九トナシ毎臨臥時二九ヲ久時持長セシメタリ

用量 本品ノ鹽類ヲ內用スルニハ丸劑(〇、〇一)トナシ一日二三回投シ皮下注射ニハ一分水五十分ノ液〇、五即チ本品〇、〇一ヲ以テ始メ用ユヘシ點眼ニハ硝酸鹽〇、一五ヲ水一〇、〇ノ溶液一滴ヲ點スベシ

本品ニハ左ノ諸鹽類アリ

(イ)鹽酸必魯加爾必涅

(ロ)硝酸必魯加爾必涅

(ハ)硼酸必魯加爾必涅

〇「ピトエコール」(肝油ト「カトラミン」ノ混合物ニシテ慢性肺癆ニ用ユ)
〇「ピロガ、ス」酸 *Pyrogallussäure. C_6H_3(OH)_3* (カロガ、ス)

必魯加爾必涅 ピロガ、ス酸

性状 「ピロガ、ス」酸ハ白色光輝アル小板狀或ハ針狀ノ結晶ニノ百五十度ノ温ニ溶解シ二百十度ニ沸騰ス其味苦ク水、酒精、依的兒ニ溶解ス水溶液ハ中性ニ反應シ亞兒加里ヲ存スルキハ好シテ空氣ヨリ酸素ヲ吸收シテ速ニ褐色トナル「ピロガ、ス」酸ノ水溶液ハ金、銀、水銀ノ亞酸化溶液ニ還元シ又硝酸ニ由テ褐色トナル石灰乳中ニ「ピロガ、ス」酸ヲ點滴スルキ深江色ヲ呈シ忽チ褐色ニ變移ス「ピロガ、ス」酸ノ水溶液ニ酸化亞酸化鐵液ヲ加フルキハ藍色ヲ呈ス

作用 「ピロガ、ス」酸ノ内用後、其一部ハ尿中ニ變セシテ證明スベク一部ハ從來詳明ナラザル產物ニ變シ強硝酸ヲ以テ熾紅色ヲ呈スパウマン氏及ヘルテル氏ニ從ヘバ「ピロガ、ス」酸ノ一部ハ動物體中ニ於テ依的兒硫酸鹽ニ移行シ大量ノ服後尿中前形硫酸ハ全ク消失ス

防腐作藥 ○ボウフェト氏ノ示セル如ク「ピロガ、ス」ハ恐クハ其猛力ノ還元機能ノ爲メニ強力ノ防腐性及醗酵制止劑ニ一乃至一、五%ノ溶液ハ數月間動物性組織ノ腐敗ヲ防キ二、五%ノ溶液ハ腐敗ニ陥レル組織中ニ含有スル有機體ヲ撲殺ス二%ノ溶液ハ全ク亞兒簡保兒醗酵ヲ妨害ス○中等ノ犬ニ本品四、〇ヲ與フルニ大ナル疲倦及目視スベキ粘膜ハ汚褐色ヲ呈ス、四時後尿ハ暗褐色翌日透明トナリ犬ハ恢復シタリキ、一、〇ヲ與ヘタル小犬ハ十五時ヲ經テ疲倦増加シ呼吸及脈搏緩徐トナリ體温三度内外ヲ下降シ甚シキ昏睡ヲ呈シ皮膚ヲ刺戟スルモ反應ナク隨意運動ハ減退シ死亡スレハ速ニ死後強直ヲ起ス膀胱中ニ存在セル帶紅褐色ノ尿

動物試驗

防腐作藥

體內變化

ハ「メタヘモクロピン」ノ吸收線ヲ呈ス

「ピロガ、ス」ハ「ジオキシペンツオール」及「フェノール」ニ類シ血球ヨリ赤色ノ血色素ヲ奪却シ之ヲ溶解スルノ性質ヲ有スルニ由リ「ヘモクロピン」尿ヲ發起ス其大量ニ由リ「オキシヘモクロピン」ヲ「メタヘモクロピン」ニ變ズ中毒セル犬ノ血液中ニ於テイユデル氏ハ血球及纖維素ノ量眞ニ減少シ「ヘモクロピン」ノ量ハ正常ノ血液ノ十分ノ一以上ヲ下降シタリ

中毒ノ例

○ア、ナイゼル氏ハ外用後ノ中毒症ヲ報告セリ即チ全身ニ十%ノ軟膏ヲ塗布シ殆ント十二瓦ノ「ピロガ、ス」酸ヲ吸收シタル者ナリシ此劑ハ皮膚ヨリ充分ニ吸收セラルル者ニ軟膏ヲ塗布セル身體ヲ「ゴム」紙ヲ以テ被包シ綑帶ヲ以テ固定シタリ此施行後少時ニ寒戰、下痢、嘔吐ヲ發シ四日ヲ經テ病者ハ虛脫増進シテ死セリ其四日間唯千六百立方仙迷ノ尿ヲ排泄セルノミ故ニ夥多ノ「ヘモクロピン」ヲ含有シタリキ又カボジ一氏及エ、ベスニル氏ハ屢全身ニ「ピロガ、ス」酸軟膏ヲ塗擦セシ病者ニ於テ尿ハ橄欖綠色ヨリ釜兒樣黑色ヲ呈シ惡心及中等ノ熱度ヲ發シタリシモ速ニ消散セリ

此中毒ニハ依的兒ノ皮下注射、酸素吸入、強度ノ誘導法ヲ行フベシ

應用 本品ハ顔面、生髮セル頭部ノ重症鱗屑疹其他小兒及刺衝セラレ易キ皮膚ノ人ニ著效ヲ呈シ「クリサロピン」及爾他ノ鱗屑疹制劑ニ優レリ「ピロガ、ス」ノ無臭ナルト之ヨリ製セル軟膏ハ毫モ副作用ナシ之ニ就テ「ピロガ、ス」ハ久時浸潤及ヒ正常ノ皮膚ニ接

醫治效用

ピロガ、ス酸

觸スルキハ先ツ其部ニ發炎シ上皮及水胞ノ脱落増加ス此外用ヲ持續スルキハ腐蝕シ健康部
分ヨリ多ク浸潤セル部ヲ侵シ從テ腐蝕セル部分ヨリ多ク浸潤セル皮部ヲ侵シ從テ腐蝕セル
部分ノ周圍ニ於テ炎症反應ヲ缺クト雖モ之ヲ發スルキハ密ニ限畫セラルウシナ氏ニ從ヘハ
「ピロガル、ス」酸ハ「レゾルチン」「クリサロビン」「硫黃等ノ如ク酸素ヲ奪却スル性アルガ爲
メ上皮細胞ヲ角狀細胞ニ變移セシムルニ由テ奏效スルモノトシ角皮成形劑ト名ケタリ

○「ピロガル、ス」酸ハ左ノ諸病ニ用ユベシ即チ

(一) 鱗屑疹ニハ五乃至十%ノ軟膏トシテ供用ス即チ之ヲ用ユルニハ溫浴後石鹼ヲ以テ洗拭シ
粗毛刷子ヲ以テ軟膏ノ可及的僅少ヲ稍強力ニ塗布スベシ此法ハ一日一回行ヒ多キモ二回ヲ
越ユ可ラス皮上ニ軟膏ヲ留著セシムル爲メ「フラネル」ヲ以テ被包スベシ入浴ハ一週ニ唯一
回ヲ許スベシ

(二) 「ピロガル、ス」酸ハ白癬ニ特效アリ即チ一%酒精液ヲ毎日朝夕二時間連用スベシ

(三) 十乃至二十%ノ「ピロガルロール」軟膏ヲ布片ニ塗擦シ皮上ニ貼用スルキハ上記ノ如ク腐
蝕スルニ從ヒ眞性狼瘡、紅斑性狼瘡、上皮腫ニ良效タリヅエボア氏ハ梅毒ノ肉芽性新生物ニ
十%ノ軟膏ヲ用ヒ效ヲ得タリ

其他「ピロガル、ス」酸ハ亦體質性肥大的癩痕ニ向テ效アリ○上皮ノ增生ヲ溶解セシムル機
能アルガ爲メカムバナ氏ハ爪彎曲及上皮肥厚ニ用ヒタリ又本品ノ酒精溶液ヲ毛髮ノ褐染料
ニ供ス

内科的效用

處方

○「ベミユルレル氏」ハ「ピロガルロール」ヲ膀胱加答兒ニ用ヒボウフェト氏ハ腦漏及肺臟癌腫
ニ用ヒタリウイダール氏ハ軟下疳及腐蝕下疳ニ於テ使用セリ○「ピロガルロール」ヲ肺癆家
ノ出血及出血性體質ニ○、○六ノ量ヲ毎時酒精、水溶液トシテ賞用セリ

○「ピロガルルス」酸一〇、〇 澱粉四〇、
○「ピロガルルス」酸 豚脂各一、〇「ラ
ノリン」八、〇

右爲軟膏外用(「ピロガルロール」軟
膏ノ方)

右爲散劑一二「ミリメートル」ノ厚徑
アル「カウトシユック」球ヲ以テ膿潰
セル面ニ散布シ綿ヲ以テ其上ヲ被包
スベシ(蔓延セル侵蝕潰瘍ニ外用ス)

○「ピロガルロール、ファイルモーゲン」 Pyrogallol-Filmogen.

顔面ノ尋常性鱗屑疹及紅斑性狼瘡ニ「ピロガルロール」療法ヲ施スニ當リテ黒染及紅斑狀炎症
ヲ避ケントスルニハレヲ、ライスコー氏ハ「ピロガル、ス」酸ニ「ファイルモーゲン」(「ニト
ロチエルローゼ」ノ「アチエトン」溶液)ヲ配伍シタリ此溶液ハ澄明ノ液ニ○「ピロガル、ス」
酸ヲ容易且神速ニ溶解シ皮膚ニ塗布スレバ甚嫩嬌微細ノ被蓋ヲ生シ之ヲ乾燥或ハ濕潤シタ
ル小布片ヲ以テ摩擦スレバ速ニ拭除スルヲ得ベシ唯治療シタル多數ノ場合ニ於テハライス
チコー氏ハ後治法ニノミ限局セラレタリ而シテ皮膚ノ黒染ヲ助成スル石鹼ヲ以テ洗滌スル
ハ嚴禁スル所ナリ數週間治療スルモ毫モ黒染ヲ發セス纔カニ晝間ハ撒布末ニ由リテ容易ニ

認ム可カラサラシメタル微褐色ヲ認ムルニ過キス勿論甚濃厚ナル「ピロガロロール」
「ピロガロロール」ヲ用ユ可ラスライスコー氏ハ二乃至五%ノ者ヲ用ヒタリ未タ曾テ一回モ此治
療ヲ中止スヘキ炎症性症狀ヲ發セサリキ

○「ピロフォルム」(「ピロガル、ス」酸ノ代用品ナリ)

○「ピラミドン」(「Pyramidon」「安知必林」)

鎮痛、鎮靜
及解熱藥

性状 本品ハ帶黃白色ノ結晶性粉末ニシテ水十分ニ溶解シ無味ナリ此無色ノ溶液ニ格魯
兒鐵液ヲ加フレバ濃藍紫色ヲ呈シ忽チ紫色ニ變シ速ニ淡色トナリ消失ス硝酸及硫酸ヲ加フ
レバ淡紫色ヲ呈シ速ニ淡白トナリ消失スレ之ニ比スレバ安知必林ノ綠色ハ久シク存留ス
「ピラミドン」ニ發煙硝酸ヲ加フレバ唯紫色或ハ汚穢「アメチスト」色ノ溶液ヲ得レモ安知必
林ハ初メ綠色ニシテ益々之ヲ加ヘテ煮沸スルトキハ紅色ノ溶液トナル

作用 フイレエネ氏ニ從ヘハ「ピラミドン」ハ神経系、血壓ニ影響シ健康動物ニ於テハ體
溫ノ放散充進スルヲ安知必林ニ似タリ又解熱作用ハ安知必林ニ於ケルカ如シ然レモ實地上

本品ハ此差異アルヲ以テ之ヲ用ユルニ當リ關係ナキニ非ス
「ピラミドン」ハ安知必林ヨリモ少量ニシテ效アリ蛙ニ於テハ之ヨリ四倍強ク溫血動物殊ニ
人體ニハ殆ト三倍ノ作用アリ其他本品ノ作用ハ安知必林ヨリモ漸次ニ發生シテ久シク持續
ス而シテ緩和階級的ニ且久シク持續シテ感應スルモノトス此性質ハ安知必林ヨリモ勝レル
者ト爲スベシ

應用

「ドクトル」ルドルフ、ラウデンハイメル氏ハ本品ヲ約百名ノ神經痛、及精神病患者
ニ用ヒタリ即チ肋間神經痛、偏頭痛、三叉神經痛、種々ノ頭痛、精神病等ニ應用シタルニ各鎮
痛及鎮靜ノ效ヲ收メタリ又急性關節痲痺質斯ニモ效ヲ得タリ不快ノ副作用ハ發汗其他一種
ノ苦悶感覺ナレモ毫モ虛脱ヲ認メサリキ

解熱劑トシ
テ應用

「ドクトル」コルト、ホルネツフェル氏ハ「ピラミドン」ヲ四十五名ノ患者ニ與ヘタリ其多クハ
皆高熱ニ惱メル肺癆家(二十三名)ナリシ又解熱劑トシ急性病(窒扶斯、肺炎、流行性感冒、丹
毒、猩紅熱)ニモ屢試用的ニ本品ヲ投シタリ又從來ノ實驗ニ由レバ神經痛、坐骨神經痛、偏頭
痛及種々ノ頭痛ニ適當スルガ如シ本品ノ服用法ハ頗ル短簡ナリ是レ殆ト無味ニシテ水ニ容易
ニ溶解スレバナリ即チ一%ノ溶液ヲ製シテ其一食匙(二十瓦ニ當ル)宛與フルハ許多ノ場合
ニ適ス服後患者ハ漸次熱度下降シ二三時間ノ後其極度ニ降ル用量ハ○、二ヲ投スルニ熱度
ニ從ヒ五分乃至二度五分下降ス鎮痛劑トシ本品ヲ五名ノ坐骨神經痛ニ用ヒタレモ效ナカリ
シモ三叉神經痛、諸種ノ頭痛ニ投セシニ頗ル良成績ヲ奏セリ同氏ハ自ラ久時少量ノ本品ヲ
服用セシニ何等ノ有害ナル作用ヲモ認メス唯○、七ノ服後約二十分ニ發汗シ輕ク頭部壓
重ヲ覺エタルノミナリシ

以上ノ實驗ニ由レバ「ピラミドン」ハ(一)解熱及鎮痛ノ即效アリ(二)熱度漸徐ニ下降シ又徐
ロニ昇騰スルト(三)著シキ不快ノ副作用ヲ發セス(四)數月間持長スルモ全身調和ヲ害セズ
又其效用ヲ損セズ是ニ由リテ同氏ハ必スヤ本品ノ賞用セラルベキヲ唱ヘタリ

ピラミドン

「ドクトル」多納榮一郎氏ハ千葉病院ニ於テ三十名ノ結核患者ニ本品ヲ試用シタル成績ニ由レバ多數ノ場合ニ於テ解熱作用確著ナリ用法ハ〇、一—〇、二五ヲ散劑トナシ一日三回分服セシム又同時ニ盜汗アル者ニハ「タン」ノ「フォルム」ヲ配伍シテ與フルヲ例トス本品ノ長所ハ他ノ解熱劑ニ比シテ用量少ナク作用持長スルト胃腸ノ障礙ナキト血行器變化ヲ生セサルトニ在リ

醫學博士栗本東明氏ハ〇、一—〇、一五或ハ「コーベルト」氏ノ法ニ從ヒ〇、二ヲ水一〇〇、〇ニ溶解シテ少量ツ、一時間ニ服シ了ル法ヲ用ヒテ效ヲ奏シタリト

好生館醫學士佐藤勤也氏ハ本品ヲ有熱ノ肺結核患者二十四名ニ用ヒテ著效ヲ得ラレタリ即チ一日量〇、五ヲ二回ニ分服セシメタルニ熱度忽チ下降セリ服藥間ハ熱度昇騰セサルモ休藥スルキハ再ヒ發熱ヲ來タス故ニ再ビ投藥セリ二週乃至三四週持長スルモ更ニ些ノ障礙ヲ呈セザリキ

氏ハ結論シテ曰ク(一)「ピラミドン」ハ無味無臭ニシテ服用シ易ク(二)殆ト副作用ヲ呈セズ唯稀ニ發汗スルヲアルノミ(三)本品ノ作用ハ久シク持續ス此點ト發汗セザルトハ他藥ニ優ル所ナリ(四)肺結核ノ日晡型熱ニハ少クモ半數(廿四名中十二名)ニ著效ヲ奏シ無熱トナシ他ノ殆ト半數(廿四名中十一名)ニハ適度ニ減熱セシメ唯稀ニ無效ナルヲアルノミ(五)他ノ結核性熱殊ニ腹膜結核、腺病性體質ノ發熱ニモ良效アリ(六)數日間持長スルモ無害ナルカ故ニ結核ノ如キ慢性病ニハ最適當ノ藥劑タリ(七)奏效長キカ故ニ間接ニ食欲ヲ増進シ體力

ヲ強ム故ニ肺結核療法中一ノ貴要ナル藥物トス

醫學士増山正信氏ハ腸窒扶斯患者十六名ニ一日一、二—二、〇ヲ投セシニ無效者四名ノ外十二名ハ一度乃至四度下降セリ服用ヲ止ムルキハ却テ體溫昇騰スルガ故ニ再ビ昇騰セサルマテ持長セサル可ラスト云ヘリ(東京醫事、一三四一號)

用量 大人ニハ〇、二—〇、四—〇、五ヲ水溶液トナシ一日二回與ヘ小兒ニハ一日量〇、一ナリ

尙撒里失爾酸「ピラミドン」ハ鎮痛ノ目的ニテ大人ニ〇、五—〇、七五ヲ用ユ

〇樟腦酸「ピラミドン」ハ水ニ溶解スル結晶ニシテ「ネー」氏等ハ結核ニ一日一、〇ヲ用ヒタリ此品ニハ中性(殊ニ解熱)及酸性(殊ニ浮腫減退)ノ二種アリ

〇「ピロジン」 *Pyridinum* (アチエチル「ピロジン」)

「アチエチル」
「ピロジン」
「ピロジン」
「ピロジン」

性状 「フエニールヒド」ラチン」液ニ氷醋ヲ加ヘ煮沸シ製スル者ニシテ純粹ノ「ピロジン」ハ白色光輝アル無臭ノ結晶狀粉末ニシテ酒精ニ溶ケ易ク熱湯ニ僅ニ溶解シ冷水ニハ全ク溶ケズ百二十八度ニ溶解ス

應用 本品ハ防腐、解熱及知覺脫失劑ニシテ軟膏(十分ト百分)トナシ鱗屑疹ニ外用シ又肺炎、猩紅熱、窒扶斯、偏頭痛、神經痛等ニ内用セシム但シ其内用スルニ臨ミ大ニ注意ヲ加フ可シ是レ本品ハ毒性アリ蒼青症、虛脫及赤血球ヲ破壊シ持續スル貧血ヲ發スレハナリツエルネル氏ニ由レバ唯數日用ユルモ上記ノ不快ナル症狀ヲ發スルヲナシ〇外用モ亦注意ス可シ

用量 一日量〇、一〇、一五ヲ用ヒ最大量〇、二一〇、三ヲ與フ一日二回一時間ヲ隔テ、各〇、〇五ヲ與フ可シ

〇「ヒルゴール」Hyrgol. 溶解性膠様末

本品ハ斷エス振盪シツ、甚シク稀釋シタル硝酸亞酸化亞鉛溶液ニ強ク稀釋シタル硝酸汞溶液ヲ加ヘ茲ニ生シタル濃褐色ノ液ニ濃厚ノ枸橼酸安母尼亞ヲ加フルニ液ノ褐色ハ黑色ニ變ス強熱スルヲ避ケツ、安母尼亞ヲ以テ中和シ之ヲ靜置シテ沈澱セシメ其上清ヲ傾瀉シ去リ硫酸乾燥器上ニ其尙稍流動スル軟泥ヲ乾燥シテ製ス可シ

本品ノ水溶液ニ酸類及鹽類ヲ加フルニ灰白色ノ尋常水銀ヲ生シ一二時ヲ經レバ集團ノ金屬性ノ水銀小球トナル〇本品ヲ試験管中ニ熱スルキハ忽チ水銀蒸氣ヲ發生シ管壁ニ小滴トナリ附著ス又試験管中ニ熱スルキハ酸化亞鉛ノ痕跡ヲ殘ス又加熱時ニハ焦樣產物ヲ生ス其安母尼亞ヲ發生シタルハ臭氣及「ラクムス」紙ニ由リテ證明スベシ」本品ハ硝酸ニ加フルキハ白色ノ雲絮ヲ析出シテ溶解シ此雲絮ハ硫化安母尼亞中ニ容易ニ溶解ス此溶液ヨリハ鹽酸ニ由リテ黄色ノ硫化亞鉛ヲ析出ス

本品ハ凡テ水銀劑ヲ用ユル場合ニ適用ス可シ
用量 此劑ハ溶液、硬膏、丸劑、軟膏、錠劑トナシ用ユ一日三回〇、〇一ヲ丸劑トナシ三乃至五個ツ、用ヒ皮下注射ニハ一―二%ノ水溶液ヲ用ユ

〇「ヒルゴール」〇、三―一、〇 白陶土屈 一 〇「ヒルゴール」〇、一―〇、六、〇 白陶土適

利設林 各適宜

右爲三十九、褐石末ヲ衣トス一日三

回食後一二丸宛

宜

右爲三十九、褐石末ヲ衣トス 同上

〇「ヒルゴール」軟膏 Unguentum Hyrgol. 溶解性水銀軟膏

(1) エーベル氏ノ製劑 溶解性膠様末五〇、〇ニ二五、〇ヲ加ヘテ研合シ某種ノ軟膏料(「モルリン」「ラノリン」ニ二十%ノ「ワセリン」ヲ加ヘタル者或ハ豚脂ニ十%ノ蠟ヲ加ヘタルモノ)四二五、〇ヲ加ヘ最精密ニ研合シ而シテ必要ナルキハ之ニ消臭料ヲ加ヘテ香氣ヲ附スベシ
(2) ウエルレル氏ノ製劑 溶解性膠様末一〇、〇ヲ水一〇、〇ニ溶解シ置キ又他ニハ豚脂八〇、〇及白蠟二〇、〇ヲ取リ共ニ溶解スベシ(七五、〇トナル)此軟膏料ニ少量宛溶解性汞溶液ヲ加ヘテ斷エス攪拌シツ、軟膏全ク同度ノ黑色ヲ呈スルニ至ルベシ然ル後チ硫酸依的兒一、五安息香酸依的兒三、五ヲ加ヘテ香氣ヲ附與スベシ
此軟膏ハ甚タ容易ニ吸收セラル、者ニシテ皮膚及口腔ヲ全ク刺戟セズ

〇莫兒比涅新鹽類

(イ) 安息香酸莫兒比涅(白色ノ粉末ニ熱湯「一分ト五分」ニ溶解シ喘息ニ〇、〇一―〇、〇二「一日量〇、一ヲ用ユ」)

(ロ) 硼酸莫兒比涅(本品ノ溶液ハ保存シ易キヲ以テ皮下注射、點眼水等ニ賞用セラル)

(ハ)「メコン」酸莫兒比涅(無色顆粒狀結晶ニシテ他ノ莫兒比涅ヨリモ胃及頭部ニ影響スルコト少シ)〇、〇〇五—〇、〇二トス)

(ニ)油酸莫兒比涅(黃色物ニシテ鎮痛劑ニ外用ス)

(ホ)「フタル」酸莫兒比涅(本品ハ疼痛ヲ起サ、ルヲ以テ皮下注射ニ適ス)

(ヘ)酒石酸莫兒比涅(結晶性粉末ニシテ溶解シ易キカ故ニ皮下注射ニ適ス)

○「モカラス」 *Mocharas*.

東印度ニ産スル「ボムバキッス」マラバリクム」ノ護謨樹脂ニシテ此根ノ如ク護謨モ亦收斂性アリ下痢、赤痢及子宮出血ニ〇、〇一三、〇ヲ與フ

○「モルリン」 *Mollinum*.

「モルリン」ハ十五%ノ脂肪及三十%ノ屈利設林ヲ加ヘ製スル微白色ノ軟石鹼ナリ之ヲ以テ製セル軟膏則チ水銀「モルリン」ヲ用ヒタルキハ再ヒ水ヲ以テ洗拭ス可シ本品ノ輕視ス可ラザル長所ハ其大ニ純潔ナルト毫モ斑點ヲ生セサルトニ在リ「モルリン」ハ沃度及沃度加里ヲ應用スルニ當リ殊ニ配伍スルニ適ス

○「石炭酸」「モルリン」ハ「モルリン」ト石炭酸ノ混合物ニシテ防腐及消毒性創傷劑トシテ洗滌ニ供ス

○「クレタリン」「モルリン」ハ「石炭酸」「モルリン」ヨリモ毒性少ク其應用、上ニ同シ

○「モルリシン」(巴把賓四分黃蠟一分ヨリ成ル新軟膏礎質ニシテ恰モ黃色)「ワゼリ

ン」ノ如キ觀アリ)

○「モル、ゴ、ストリクタ」 *Molugo stricta*.

本品ハ健胃強壯劑トス又此浸劑ハ月經ヲ催進スルニ用ユ

○「モネシア」 *Monesia*.

本品ハ「クリソファイルム」グリチフレウム」ノ樹皮ニシテ堅硬且重ク横断面ハ暗紅褐色ヲナス其味甘ク咀嚼スルキハ唾液ヲ紅變セシム

強壯健胃劑トシ其煎劑及水製越幾斯ヲ胃病、氣管枝炎、肺病、下痢等ニ内用セシメ又止血劑トシ内用及外用ニ供ス外用スルニハ甚タ稀薄ノ丁幾及越幾斯、軟膏(一分ト七分)トシ越幾斯〇、二—、五ヲ一日三乃至五回内用セシム

○「モリンガ」 *Moringa pterigisperma*.

此根ハ亞非利加ニ産シ亦ジャマイカ及東印度ニモ産スル樹根ニシテ卓效アル利尿劑トス日光ニ乾燥セル根ヲ以テ黃色ノ丁幾ヲ製シ水腫ニ用ヒ良效アリ未タ不快ノ副作用ヲ經驗セズ丁幾ハ毒性ナシ又食思ヲ興奮催進スル效アリ毎三時ニ丁幾十滴ヲ與フ

○「モルリン」 *Morhimum. C₁₀H₁₄N₂*.

肝油中ニ發見セル鹽基性物ニシテ其量及治療的作用ニ由レバ肝油ノ有效成分タリ一食匙ノ肝油ハ二「ミリ」瓦ノ「モルリン」ヲ含有ス稠厚油狀ノ液ニシテ水ニ殆ト溶解セズ酒精、依的兒ニ溶解シ消化ヲ催進スル效アリ肝油ノ代用品トス

利尿劑

強壯健胃劑

肝油ノ代用品

モカラス、モルリン、モル、ゴ、ストリクタ、モネシア、モリンガ、アテリゴス、ベルマ根、モルリン

○「モルルオール」(Morpholol)

性状及應用 本品モ亦肝油ヨリ得タル沃度、硫黃、磷ヲ含有セル物質ニシヤボトー氏ハ肝油ノ有效物質トナセリ肝油ニ炭酸曹達ヲ加ヘ九十%ノ酒精ヲ注キテ振盪シ蒸餾シテ製スル芳香性苦味アル物質ニシテ一部ハ已ニ常溫ニ由テ結晶シ肝油ヨリモ十乃至十二倍ノ沃度、貌魯謨及磷ヲ含ム肝油ノ如ク○、ニヲ膠囊トナシ本品○、ニハ肝油五、○ニ同シ小兒ニハ膠囊四個大人ニハ六個ヲ與フ

○「モルレニア」(乳汁分泌促進劑トシテ)○、○ノ浸劑ヲ用ユ

○石灰抱合物 *Calcium verbinungen.*

(イ) 磷酸乳酸鐵石灰 *Calcium ferro-phospho-lacticum.*

本品ハ溶解シ易キ鹽類ニシテ腺病、尙僕病ニ單含或ハ麥芽越幾斯ヲ加ヘ一日數回○、二一〇、五ヲ溶劑トナシ與フ

(ロ) 沃度酸石灰 *Calcium jodicum.*

石灰鹽液ニ亞兒加里沃度液ヲ加ヘ製ス光輝アル結晶ニシテ水ニ溶ケ難キモ酒精ニ全ク溶ケズ慢性膀胱加答兒ノ惡臭尿アル者ニ膀胱ヲ洗滌シ且内用セシム内用スルニ由リ尿ノ不快臭ヲ除キ或ハ減少シ尿ヲ透明ナラシム又本品ハ創傷ノ療法ニ良效アルモ其溶解シ難キヲ以テ(二分ハ水四百分ニ溶解ス)外用ノ防腐劑ニハ頗ル適セズトス然レモ無毒ニシテ刺戟性ナキヲ以テ一二ノ症ニ適スルコアリ

消毒防腐劑

(ハ) 酸性磷酸石灰 *Calcium phosphoricum actium.*

無色透明ノ液ニシテ一乃至二%ノ遊離磷酸ヲ含有ス局所結核ニ千倍ノ殺菌セル液ヲ皮下注射ス

(ニ) 磷酸屈利設林石灰(磷酸屈利設林ヲ見ヨ)

(ホ) 馬尿酸石灰(馬尿酸ヲ見ヨ)

(ヘ) 乳酸石灰(針狀結晶或ハ白色顆粒物ニシテ腺病、尙僕病ニ一日數回○、二一〇、五ヲ投ス)

(ト) 三鹽基性膠質加磷酸石灰(腺病、梅毒、貧血ニ用ユ)

(チ) 含糖石灰(壞疽創ニ用ユ)

(リ) 珊瑚寧酸石灰(白色無味無臭ノ粉末ニシテ腸内驅蟲劑トシテ○、○五ヲ用ユ)

(ヌ) 硫化石灰(灰白黄色ノ粉末ニシテ皮膚病ノ浴料、皮下蜂窠織化膿、蜜尿病ニ○、一五—〇、二一ヲ一日四五回服用セシム)

(ル) 硼酸石灰 *Calcium boricum.*

本品ハ白色粉末ニシテ殆ト味ナク水ニ溶ケス格魯兒石灰液及硼砂溶液并ニ溫屈利設林ニ溶解ス本品ハ濕疹、壞疽創、小兒ノ下痢ニ○、三一〇、四ヲ用ユ

(ヲ) 屈利設林磷酸石灰 *Calc. glycerino-phosphoricum.* (ノイロハハ)

本品ハ白色ノ結晶様粉末ニシテ冷水ニ溶解シ易ク熱湯及酒精ニハ殆ト溶解セズ本品ハ體中ニ

モルルオール 石灰抱合物 磷酸乳酸鐵石灰 沃度酸石灰 酸性磷酸石灰 硼酸石灰
屈利設林磷酸石灰

於ケル磷酸ノ含量ヲ増加シバセド―氏病、腰痛ニ〇、二―〇、三ヲ丸劑トシテ投ス

(フ)屈利設林亞砒酸石灰 *C. Elyero-arsenicum.*

本品ハ塊狀粉末ニシテ水及酒精ニ溶解セズ他ノ有機酸及鑛酸ニハ甚容易ニ溶解ス本品ハ吸收セラレ易キ確效アル砒石劑トス内服ニハ初量トシテ〇、〇一ヲ用ユ

飲料水ノ清
潔劑

(カ)過滿俺酸石灰 *C. permanganicum. (マンガン)*

本品ハ過滿俺酸加里ニ類スル者ニシテ水ニ甚能ク溶解スル結晶ナリ其殺菌及防腐ノ作用ハ過滿俺酸加里ノ作用ヨリモ百倍強烈ナリ此原由ヨリシテ飲料水ヲ清潔ナラシムルニ適ス乃チ佛國ニ於テハ本品ノ二千倍(二%)ノ液ヲ「モノール」ト名ケテ飲料水ノ殺菌ニ供セリ〇醫療上ニハ婦人科ニ於テ腔内及子宮内ノ洗注ニ用ヒ齒科ニ於テハ汚穢惡臭ノ口腔ヲ清洗シ又拔齒後ノ洗滌ニ供ス婦人科ニ於テハ〇、一五―〇、三%ノ液ヲ用ユ

(ヨ)「イヒチチアル」酸石灰 *C. ichthyicum.*

本品ハ無臭無味ニシテ胃ノ知覺過敏ナル者ニ用ヒタリ

(タ)沃度石灰 *C. jadalum. Ca J.*

本品ハ黃色ノ粉末ニシテ水及酒精ニ溶解ス喘息、肝臟炎、梅毒ニ於テ沃剝ニ代ヘテ一日三回〇、一―〇、三%一日極量一、〇ヲ用ユ

(ナ)沃度酸石灰 *C. jadicum. ca (JO₂) 6H₂O.*

本品ハ光輝アル無臭殆ト無味ノ結晶ニシテ水ニ溶ケ難ク酒精ニ溶解セズ防腐藥トシテスバント

ン氏ハ慢性膀胱炎ノ惡臭尿アル者ニ膀胱ノ洗滌及内用ニ供ス

(ニ)乳酸石灰 *C. lacticum.*

本品ハ針狀結晶或ハ白色顆粒物ナリ水及熱酒精ニ溶解ス尙僕病及腺病ニ一日數回〇、二―〇、五ヲ投ス

(ツ)含糖石灰 *C. saccharinum*

本品ハ水ニ溶解スル無色ノ鱗屑狀片ニシテ驅條劑其他消化不良殊ニ小兒ノ風氣膨滿ニ〇、六―二、〇ヲ用ユ小兒ニハ半量トス

(ネ)撒里矢爾酸石灰 *C. salicylicum.*

本品ハ無臭無味ノ白色粉末ニシテ冷水ニ溶ケ難ク熱湯ニ容易ニ溶解シ稀醋酸、鹽酸、硝酸ニ甚容易ニ溶解ス止瀉劑トシテ殊ニ小兒ノ胃腸炎ニ一、五ヲ單用シ或ハ硝蒼ト伍用ス

(ナ)珊瑚寧酸石灰 *C. santonicum.*

本品ハ白色ノ粉末ニシテ臭味共ニナク水及嘔囉仿謨ニ溶解セズ腸内驅蟲劑トシテポンペロン氏ハ珊瑚寧ニ優レリトナシ〇、〇五ヲ錠劑トシテ用ユ

(ラ)亞硫酸石灰 *C. sulfurosam.*

本品ハ結晶樣粉末ニシテ水ニ甚タ溶ケ難シ急性扁桃腺炎ニ一日數回〇、〇〇七五―〇、〇三ヲ與ヘテ良效アリ

(ム)過酸化石灰 *C. superoxydatum.*

屈利設林亞砒酸石灰 過滿俺酸石灰 イヒチチアル酸石灰 沃度石灰 沃度酸石灰
乳酸石灰 含糖石灰 撒里矢爾酸石灰 珊瑚寧酸石灰 亞硫酸石灰 過酸化石灰

本品ハ黄色結晶性ノ粉末ニシテ水ニ殆ト溶解セズ本品ハ善ク閉鎖シタル器ニ貯ヘサル可ラズ蓋シ濕潤スルキハ變敗スレバナリ防腐藥及酸性消化不良及小兒ノ夏季下痢ニ用ヒ其他石灰乳ニ代用ス用量ハ年齢ニ從ヒ一日量〇、一八—〇、六ヲ乳汁ニ加用スルヲ最良トス

○石灰水 *Aqua calcaria.*

本品ヲ「プロフェツソル」シユルツ氏ハ皮膚癢痒ニ毎朝空心時半食匙ヲ乳汁、麥汁、水ニ加ヘテ持長服用セシムルヲ可トセリ又近時鞭蟲ニ之ヲ灌腸シベールス氏ハ良效ヲ得タリ

○「セネチヲ」(疥癬、其他皮膚病、皮膚潰瘍ニ外用ス)

○「セチア、アクミナタ」(此流動越幾斯二、〇—六、〇ヲ驅蟲劑トス)

○石炭酸石鹼 *Sapocarbolum.*

本品ハ帶黄褐色舍利別様ノ液ニシテ石炭酸臭アリ水ヲ以テ透明ナル液ヲ得可シ防腐及消毒劑トス

○石炭酸 *Acidum carbolicum.*

ホイブネル氏ハ亞布答性口内炎ニ一—二%液ヲ塗布シ或ハ稀薄液ヲ吸入セシメ實布埜里或ハ猩紅熱ノ咽頭炎ニ〇、二%液ヲ一回〇、五宛一日二回扁桃腺其ノ他ニ注射シ偉效ヲ得タリト

醫學博士三輪信太郎氏ハ重症亞布答又ハ劇甚ノ壞疽性口内炎等ニ〇、三%ノ溶液ヲ一日二三回塗布シテ偉效ヲ收メタリ但シ中毒作用即特異ノ黑色ヲ呈スル石炭酸尿ニ注意スベシ

井深玄深氏ハ小兒ノミナラス大人ノ口内炎、實布埜里、壞疽性齒齦炎、鼻加答兒、扁桃腺炎等ニ用ヒ奇效アルヲ認ム氏ノ用法ハ純屈利設林ニ三十倍ノ比例ニ溶解シ筆ニテ塗布セリ

○接骨木皮 *Sambucus.*

本品ハ接骨木ノ直ニ本質ヲ被包セル白色菲薄ノ皮ニシテ近時之ニ著シキ利尿ノ效アルヲ認メテ治療上ニ應用セリ本品ハ心臟及血行ニハ毫モ影響ナシ此皮丸、〇—一〇、〇ヲ煎劑トナシ用ユ

○蟾蜍(ヒキガヘル)

本品ハ古來諸種ノ病(小兒ノ疳、勞瘦、胃病、水腫等)ニ用ヒタリ其皮膚腺ノ分泌液ハ實麥答利斯特同效アリト故ニ血行器病ニ蟾蜍皮ヲ用ユベシ用量〇、二—〇、六ナリ

○川芎(ラムナグサ)

本品ハ漢醫ガ頭部逆上、血ノ道等ニ用ユル者ニシテ、〇—八、〇ナリ

○「セルフトール」石鹼 *Seraphal-Soife.*

本品ハ〇、五%若クハ一%ノ沃度汞ヲ含メル中性加里石鹼ニシテ爽快ノ香氣ト善ク泡起シ費耗少クシテ日々使用スルモ皮膚ニ有害ノ副作用ナシ手ノ消毒劑トシテ賞用セラル之ニ固形及ヒ柔軟ノ兩種アリ又本品ヲ刀及器械ノ清潔及消毒ニモ亦用ヒ得ベシ何トナレバ沃度汞ハ昇汞ニ反シテ金屬器ヲ害セザレバナリ本品ノ殊ニ賞用スベキ品ハ亞鉛管ニ容レタル軟石鹼トス此品ハ患者ニ使用スルニ臨ミ隨意ニ挺出セシメ又用後ハ再ヒ閉鎖シテ貯フルヲ得レ

亞砒酸石鹼 過酸化石灰 石灰水 石炭酸石鹼 石炭酸 接骨木皮 蟾蜍 川芎 セルフトール石鹼

バナリ

吐劑

○石蒜 *Lycoris radiata Herb.*

石蒜ハ廣ク牧地ニ野生シ其球根横徑三仙迷、高徑四仙迷アリテ多クハ其形卵圓ナリ根皮ハ褐色ニノ内ニ平行脈絡層ヨリ成レル白色ノ肉質ヲ包有ス球根ノ基底ニハ副根ノ圈痕アリ花ハ繖形ニシテ其色赤ク且美ナリ秋風ヲ見テ開ク花梗ハ長ケレモ托葉ナシ冬季ニ入レバ球根ヨリ直ニ葉ヲ抽ツ其形狭長ニシテ平行脈絡アリ

醫學士森島庫太氏ハ石蒜ヨリ二種ノ有效成分ヲ發見シ一ヲ「セキサニン」*Sekisanin* 一ヲ「リコリン」*Lycorin* ト名ケタリ「リコリン」ハ無色ニシテ稍大ナル多角形結晶ヲナシ水ニ溶ケス依的兒、酒精及嘔囉仿謨ニ僅ニ溶解スルノミ酸類ト化合シテ鹽酸「リコリン」トナル鹽酸「リコリン」 $C_{16}H_{16}NO_4HCl$ ハ無色ノ結晶ニシテ水、酒精ニ溶ケ易シ

「セキサニン」 $C_{24}H_{34}N_2O_6$ ハ長四面結晶ニシテ臭氣ナク水ニ溶ケス酒精、嘔囉仿謨及「ペンツァール」ニ僅ニ溶解シ依的兒ニ溶ケ易シ

石蒜球根五〇、〇ヲ煎劑トナシ犬ノ胃中ニ注入スルニ五乃至三十分ノ後流涎ニ伴ヘル劇烈ナル嘔吐運動ヲ發シ胃内容物ヲ吐出シ次テ泡沫アル粘液後ニハ膽汁ヲ吐スルニ至ル次テ下痢ヲ來タシ大便稀薄トナリ數回ノ下痢相踵キ裏急後重ノ狀ヲ示シ後ニハ粘液或ハ血液ヲ排泄ス

古來俗間ニテ吐劑トナシ確效アリトローゼンタール氏ハ吐劑、下劑、利尿劑トシテ效アリト

云ヘリ俗間ニテハ球根ヲ一回ニ四分乃至一匁二分ヲ煎劑トナシ用ヒタリト 東京醫學會雜誌第九卷第七號東京醫學會新誌第十號 醫學士森島庫太氏

○柘榴根皮 *Cortex Granati* 及柘榴幹 (并枝)皮

醫學博士樫村清德氏ハ綿馬越幾斯ノ中毒症ヲ來タスヲ憂ヘ瑠篤寧、知母爾等ヲ與ヘテ效ナキ十二指腸蟲病ニ柘榴根皮ヲ用ヒテ良效ヲ得ラレタリト(中外醫事新報第三百十七號)其略ニ曰ク患者ヲシテ二回食ヲ休セシメ其後蓖麻子油一五、〇ヲ頓服シ腸内容物ヲ下泄セシメ後チ柘榴根皮五〇、〇ヲ水二〇〇、〇ニ煎出シタルモノヲ二回ニ分服セシメ再ヒ蓖麻子油ヲ投シタリ然ルニ數時間ヲ經テ非常ニ多數ノ十二指腸蟲ヲ排泄シ患者ハ少シモ苦痛ノ狀態ナシ後チ三日ヲ經過シ更ニ效否ヲ確メント欲シ尙一回前法ヲ反覆シタルニ既ニ一片ノ該蟲ヲ見サルニ至レリ其後該患者ニ接スル毎トニ此法ヲ試ミ常ニ同一ノ良效アル成績ヲ得タリト云フ

醫學士山田鐵藏氏ハ醫科大學教授ベルツ氏ノ示導ニ由リテ柘榴根皮ヲ赤痢并ニ腸加答兒ニ應用シテ良能アルヲ報ゼラレタリ(東京醫學會雜誌第九卷第三號)

今村縫之助氏ハ赤痢ニ向テ黃蓮及柘榴根皮著效アリト(九州醫學會誌第八)處方ハ黃蓮一五、〇柘榴根皮三〇、〇水三〇〇、〇ニ入レ煎出シテ二〇〇、〇トシ一日四乃至六回ニ分服セシム用法ハ初メ甘汞頓服次テ本劑ヲ用ヒ兼テ硝蒼ヲ投スルヲ良トス

○柘榴根皮三〇、〇 「シマルバ」皮一〇、〇 — ○柘榴根皮三〇、〇

石蒜 柘榴根皮

右細末トシテ二十四時間葡萄酒三〇〇、〇ニ冷浸シ橙皮舍利別二〇、〇ヲ加ヘテ一日數回ニ分服ス(二日ノ量トス)

右細末トナシ二十四時間甲州製白葡萄酒三〇〇、〇ニ冷浸シ橙皮舍利二〇、〇ヲ加ヘテ一日六回二日分服

平田吾一氏ハ柘榴幹皮(及枝皮)モ亦根皮ハ同シク條蟲ヲ驅除スル效アルヲ實驗セラレタリ(岡山醫學會雜誌第百二號)

○赤痢血清 *Dysenteric-heliserum.*

醫學士志賀潔氏ハ(赤痢病論、第十章治療法)數年來赤痢ノ研究ニ身ヲ委ネラレタリシガ、屢之ニ關スル業績ヲ公ニシタリ今回「赤痢病論」ト題スル一大篇ヲ公ニシ該病ノ原因、症候、豫後、療法ニ就テ精細ニ記述シタリ其血清療法ノ一篇ハ殊ニ讀者ニ趣味アリト認ムルヲ以テ左ニ其要項ヲ抄録ス詳細ハ同書ヲ見ルヘシ

赤痢血清注射液ハ病勢ノ輕重ニ從テ差異アリ

- 一 輕症 六、〇乃至一〇、〇立方仙迷 一回注射
- 一 中症 一〇、〇立方迷仙宛 一日二回注射(午前、午後)
- 一 重症 一〇、〇立方仙迷宛 二回注射、次日ニ輕快セスンハ更ニ同量ヲ反復シ二日乃至三日間持重スベシ

初ヨリ中毒症狀著シキモノ(不眠、吃逆、嘔吐、心窩苦悶等)ニ於テハ最モ細心シテ血清ノ注射液ヲ進ムルヲ要ス注射ノ部位ハ胸側ノ皮下ヲ良トス注射前ニ其局部ヲ亞爾簡保爾ニテ洗拭滅菌シ注射後ハ針痕部ニ二十倍ノ沃度仿謨古魯胃謨ヲ滴下シテ凝固セシムヘシ又注射器ハ使用前二十倍石炭酸水若クハ亞兒爾簡保爾ニテ丁寧ニ洗滌シ然後更ニ二百倍石炭酸水ヲ以テ洗滌スベシ

赤痢血清療法ハ赤痢ノ初期ニ施セハ病勢頓挫シテ速ニ治癒ス、病勢稍進ミタル場合ニハ便通ノ數頓ニ減ジ其注射ノ次日ニハ前日ノ殆ド半數トナリ此ノ如クニシテ遞次急速ニ減少ス便中ノ血液ハ注射ノ翌日ヨリ減少シ或ハ全ク消失シ粘液亦減少ス裏急後重及ビ痙攣止ミ熱下降シ食慾振ヒ全身症狀大ニ恢復ス

赤痢患者ニ對スル血清療法ハ血清注射ノ他ニ攝養法、理學的療法及ビ一二ノ藥劑ヲ處スルノミニテ足レリ其處置順序ヲ略述スレハ左ノ如シ

- (一) 患者ハ牀上ニ安眠セシメ診察終リタル後直チニ血清ヲ注射スベシ
- (二) 甘朮〇、五乃至〇、八或ハ「リチネ」油一〇、〇乃至二〇、〇ノ頓服ヲ命ス
- (三) 鹽酸里母那埤、酒石酸里母那埤、枸橼酸里母那埤或ハ此等ニ赤酒ヲ加ヘ與フ、或ハ亞兒加里劑ヲ處ス
- (四) 含嗽劑(鹽剝水)ハ常ニ必要ナリ
- (五) 灌腸 一%食鹽水又ハ重曹水(微温)二〇〇、〇乃至五〇〇、〇立方仙迷一日一回乃至二

回肛門ノ周圍ハ時ニ消毒藥ヲ以テ清拭スベシ
(六)食餌 流動食ヲ與フ

○水銀新製劑 *Neueren Quecksilberpräparate.*

(一)「エチール」格魯兒汞 *Hydragyrum. aethylchloratum.*

性状及應用 本品ハ無色光輝アル鱗屑狀結晶ニシテ不快ノ依的兒臭アリ水、依的兒、冷酒精ニ僅ニ溶解シ熱酒精ニ容易ニ溶解ス本品ハ昇汞ニ代用シ〇、五—一、〇ヲ一〇〇、〇ニ溶セル液ヲ皮下注射ス一回量〇、〇〇五ナリ

(二)「アルブミン」水銀 *H. albuminatum.*

本品ハ外科ニ於テ創傷ノ散布末ニ供用スルノミ(被覆劑)

(三)格魯兒安母尼亞水銀 *H. ammonio-chloratum.*

本品ハ氣中ニ潮解シ水ニ溶ケ易シ往時已ニ調製セル此汞劑ハ強烈ノ防腐劑トシテリステル氏カ應用セル所ナリ

(四)安息香酸水銀 *H. perzoica. (C₆H₅CO₂)₂Hg+H₂O*

性状及應用 白色無味無臭ノ細小結晶ニシテ冷水ニ溶ケ難ク熱湯及酒精ニ溶ケ易シスツウエンコッフ氏ハ梅毒ニ〇、二五縮水三〇、〇ニ食鹽〇、二五ヲ加ヘタル者ヲ皮下注射シ又本品ノ溶液(〇、〇六一〇、一八水三〇、〇)ヲ梅毒性潰瘍ノ覆法料トナシ淋疾ノ注射料(〇、〇六水四〇〇、〇)トス皮下注射ニハ古加乙涅〇、一—〇、一五ヲ加ヘ無痛ナラシムルヲ可

トス一回量〇、〇〇六一〇、〇一一ニシテ毎日皮下注射シ〇、〇二五ヲ限リトス淋疾ニハ上記ノ液ヲ一日三回注射ス

(五)格魯兒汞尿素 *Quecksilberchlorid-Harnstoff.*

格魯兒汞尿素ハ無色無臭ノ液ニシテ強鹹味ト弱酸性反應アリ光ヲ防キ貯フ可シ梅毒ニ皮下注射シ無痛ニ炎症ヲ發セス其一立方仙迷中、昇汞〇、〇一ヲ含有ス

(六)藏化水銀 *H. cyanatum.*

藏化水銀ハ無色透明ノ柱狀結晶ニシテ水及酒精ニ溶ケ易ク依的兒ニ溶ケ難シ猛毒物ナリ(解毒劑トシテ含水硫化鐵、含水苦土ヲ用ユ)梅毒其他質布埜里ニ用ユ一回ノ極量〇、〇二一日極量〇、一ナリ

(七)「アラニン」汞 *H. alaninicum.* 又「アミドプロピチン」酸水銀

本品ハ白色結晶性ノ粉末ニシテ水ニ溶解ス梅毒ニ皮下注射スルニ其溶解シ易キト刺戟性ナキトヲ以テ殊ニ適當ス他ノ汞劑ノ如ク内用ニモ供ス用量ハ〇、〇〇五—〇、〇一ヲ水一、〇ニ溶シ用ユ

(八)赤色過沃度汞 *H. biiodatum rubrum.*

近時殺菌的作用アルカ爲メ肺結核ニ霏散法トナシ賞用セラル即チ過沃度汞一、〇沃度加里一、〇水一〇〇〇、〇ノ溶液ヲ霏散器ニ容レ二氣壓ヲ與ヘ以テ霏散氣ヲ肺中ニ竄入セシム初メハ霏散法トシテ毎日一回次テ二回宛初メハ十立方仙迷、十五、二十、二十五立方仙迷ヲ用

水銀新製劑 エチール格魯兒汞 アルブミン水銀 格魯兒安母尼亞水銀 安息香酸水銀
格魯兒汞尿素 藏化水銀 アラニン汞 赤色過沃度汞

ヒシム此法ハ初メハ刺戟症ヲ發起セシムルコアレモ忽チ消散ス○本品ハ最良ノ防腐藥トシテ眼科ニ過沃度汞○、○五酒精二○、○水一○○○、○ヲ賞用ス

(九)鹽酸「グルチンペプトン」汞(白色引濕性粉末ニシテ驅梅藥トシテ梅毒ニ皮下注射ス)

(十)溶性「グリココール」汞(亦皮下注射ニ供ス)

(十一)大楓子酸汞(白色或ハ黃色稠厚越幾斯ニシテ殊ニ皮膚病ニ供用ス)

(十二)「イミド」琥珀酸汞 *II. imido succinicum*,

本品ハ白色絹糸様光輝アル結晶ニシテ水ニ溶ケ易ク中性反應ナリ皮下注射ニ適ス其溶液保存シ易キト疼痛少ク注射部ノ滲潤僅少ナルヲ以テ他ノ皮下注射ニ用ヒラル、汞劑ニ優レリ此藥品ニハ善ク堪ユルカ故ニ外來療法ニ適セリ本品ノ一、二%或ハ二%ノ水溶液一立方仙迷ヲ一回ニ注射ス之ニ一回量○、○一ノ古加乙涅ヲ用ユ之ヲ注射スル局部ハ石鹼及依的兒ヲ以テ豫メ善ク清潔トナシタル後日々軀幹後面ノ右側或ハ左側ニ施スベシ

(十三)「ペプトネ」化水銀 *II. Peptonatum*.

本品ノ秘密ニ製セル者ニ於テハ稍疑ナキ能ハスト雖モオ、カスバル氏ノ公示セル方式ニ從テ製セル者ハ應用スルニ足レリ初メ鹽様後チ僅ニ鹹味アル微弱酸性ノ黃色液ニシテ鹽酸又ハ曹達滷汁ヲ加フルモ毫モ變化セス之ニ反シテ硫化安母尼亞ニ過ヘハ黑色ノ硫化水銀ヲ沈澱ス本品ハ甚ク混濁シ大ニ沈澱アル者ハ廢棄シテ用ユ可ラス劇藥ニ屬シ甚大ナラサル瓶ニ

梅毒ノ皮下注射藥

入レテ光ヲ防キ貯フ可シ

緩和ノ水銀劑ニシテ皮下注射ニ供スベシ即チ注入スルモ疼痛ヲ覺エス亦膿瘍ヲ生スルコトナシ此劑ノ常量ハ一立方仙迷即チ一筒ナリト雖モ或醫家ハ之ヲ秘密ニ附シ世間ニ公明セサル者アリ

梅毒ノ特效藥

(十四)石炭酸水銀 *H. carbolicum*.

性狀 千八百八十七年ノ初メガムベリニ一氏ハ石炭酸水銀ヲ梅毒ニ對シ著效アル水銀劑トセリ此經驗ハ他ノ諸家モ亦確定シタル所ナリ本品ハ無色ノ針狀結晶ニシテ水ニ溶解セス冷酒精ニハ溶ケ難キモ沸騰酒精、依的兒、醋酸ニ溶解ス本劑ノ水銀ノ含量(C₆H₅O)₂Hgノ形式ニ從テ五十一、八○%ヲ含有スル者トス本品ハ劇藥ニシテ光線ヲ防キ貯フベシ

石炭酸水銀ハ梅毒ニ對スル特效藥トシテ賞用シ久時堪フル者ナリ從來ノ經驗ニ從ヘハ口内炎及流涎ヲ發スルコト甚稀ニシテ發起スルモ僅微ナリ此劑ノ水銀ハ速ニ吸收セラル、者ニシテ已ニ○、○六ヲ服スルノ後尿中ニ證明スベシシャードツク氏ハ殊ニ第二期梅毒ニ於テ塗擦療法ヲ行ヘル後ニ供用セリ大人ニハ一日三回○、○二一○、○三小兒ニハ一日二回○、○四一○、○五ヲ與フ

○石炭酸水銀一、二 甘草越幾斯 甘草末 各三、○

右爲六十九一日二九乃至四九(梅毒)

(十五)「ナフトール」汞(糊帶料、室扶斯、皮膚病ニ用ユ)

處方

イミド琥珀酸汞 ペプトネ化水銀 石炭酸水銀

有力ノ驅梅劑

梅毒ニ於ケル應用

淋疾ニ於ケル應用

- (十六)「ナフトール」醋酸汞(白色結晶性粉末ニシテ皮下注射ニ用ユ)
- (十七)油酸汞(黄色軟膏様物ニシテ灰白水銀軟膏ニ代用ス吸收サレ易シ)
- (十八)「フェノール」醋酸汞(皮下注射ニ供ス)
- (十九)亞硫酸汞(白色ノ水ニ溶ケ難キ重キ粉末ニシテ賞用セス)
- (二十)「チモール」硝酸汞及「チモール」硫酸汞(皮下注射用)
- (二十一)白堊加水銀(梅毒ニ〇、〇五ヲ六乃至九日間持長ス)
- (二十二)「アスバラギン」水銀(澄明無色無臭ノ液ニシテ梅毒ニ皮下注射スルニ疼痛ナシ一筒ハ〇、〇一ノ水銀ヲ含ム)

(二十三)撒里矢爾酸水銀 *H. salicylium.*

性状 撒里矢爾酸水銀ハ白色無臭無味無形ノ粉末ニシテ五十九%ノ水銀ヲ含有シ中性ノ反應ヲ呈ス水ニ溶解シ難ク酒精及食鹽溶液ニ溶解ス又飽和液ヲ稍熱シ後チ冷却スレバ寒天様ノ液體ニ凝固スルモノナリ

應用 本品ハ有效ナル驅梅藥ニシテ其食鹽溶液ハ甚吸收セラレ易ク他ノ汞劑ニ比スレハ消化機ヲ害セス汞毒性口内炎ヲ發セス其效、迅速確實ナルノ益アリエブスタイン氏ハ本品ヲ「オレーフ」油ト乳和シ皮下注射スルモ疼痛浮腫共ニ少シ又口内炎ヲ發スルコト少シト雖モ下痢ヲ發ス然レモ阿片ヲ與フレバ治スシルバ、アランジヨ氏ハ頑固ナル梅毒、淋疾、(〇、〇一水一〇〇、〇一ヲ一日三回注入)加答兒性及顆粒性結膜炎ニ效アリト〇同氏ハ〇、〇〇一ヲ一

節肉間注射ノ成績

丸トナシ毎朝牛乳ト共ニ服用セシメ患者堪ヘ得レハ増シテ二九三九遂ニ二十五丸ニ至ルベシト〇カー、スツアデツク氏ハ淋疾ノ注入劑トシテ本品〇、一飽水二五〇、〇重碳酸曹達一、〇一、三ノ混和液ヲ用ヒタリ毎常充分ノ奏效ナキモ多クハ使用後直ニ分泌物ノ大ニ減少スルヲ見タリ又諸種ノ梅毒性潰瘍及ヒ浸潤ニ本劑ト次硝酸蒼鉛ノ混合劑ヲ撒布料トシテ或ハ軟膏(〇、一乃至〇、五ニ付三〇、〇)トナシ使用セシメ癩痕形成及吸收ニ良效ヲ收タリ〇「ドクトル」ヤダソン氏及ツアイング氏ノ實驗ニ由レハ一〇%ノ液ヲ筋間ニ注入スルニ疼痛極メテ少ク且ツ其ノ浸潤ヲ遺スコト僅少ニシテ殆ト知ル克ハスト此ノ如キ成績ハ汞劑ニ望ムベカラズ之ヲ注入スルハ梅毒性ノ諸徵速ニ消失セリト云フ此ノ注入ハ大抵六回乃至八回ノ注入ヲ以テ満足スヘキ成績ヲ得ベシ通常此ノ注入ハ一定ノ時間ヲ隔テ之ヲ行フト雖モ必要ノ場合ニハ一時ニ二筒ヲ注入スルモ不快ノ副作用ヲ發スルコトナシ此ノ療法ヲ終ルノ後モ尚ホ暫時ハ水銀分子ノ尿中ニ排泄シ來ルヲ見ルベシト云フ

〇順天堂醫院高比良養太郎氏ハ醫學士佐藤佐氏ノ指導ニ由リ二十名ノ患者ニ實驗シ左ニ掲クル報告ヲ爲セリ氏カ用ヒタル混合液ハ「プロフェツソル」ノエマン氏ノ法ニ從ヒ水楊酸水銀〇、五甘扁桃油一五、〇ノ準リニ乳劑ヲ製シタル者ニシテ之ヲ注入スルニハ患者ヲ側臥セシメ臀部ノ皮膚ヲ清拭シ注入針ヲ深ク直線ニ大臀筋間ニ挿入注射ス注入ハ三日毎一回ノ比例ヲ以テ左右臀部ニ交互一筒宛施行ス之ニ先チテ予ハ論スニ該療法中ハ殊ニ攝生ノ貴重ナルヲ以テシ嚴ニ不消化物ヲ禁シ腸胃ノ整理ヲ求メ喫煙ヲ廢セシメ口内ヲ清淨セシメテ口内

炎ヲ豫防シ忍耐カヲ鼓舞シテ療法ノ目的ヲ達センコトヲ計レリ

(一)水楊酸油ノ注入ハ全身梅毒殊ニ第二期ニ效アリ
(二)概スルニ注入數四筒即チ水楊酸水銀量〇、一四三餘、治療日數十日ニシテ效驗顯ハレ注入數八筒即チ水楊酸水銀量〇、二八六餘、治療日數二十二日ニシテ症狀消散シ多クトモ十二筒ニ至リテ治セサルモノハ殆ント稀ナリ

(三)注入者ノ熟練注意ニ由レハ注入時ノ疼痛ハ至テ微、注入後ノ疼痛ハ不定ナレモ注入數三四筒ニ進メバ皆多クハ輕減ス

(四)嫌忌スヘキ作用即チ注入局部ノ膿瘍(吸收ノ容易ナルト消毒殺菌劑聯送止ノ效アルハ膿瘍發生ナキ所以乎)一般汞劑内用ニ由テ起ル中毒症狀ヲ發スルコトナシ

處方

〇撒里失爾酸水銀一、〇 華攝林二五、〇

右外用(梅毒性潰瘍)

〇撒里失爾酸水銀〇、二 護謨漿〇、三 餾水六〇、〇

右皮下注入料但シ二三日毎ニ注入シ

右爲六十九、一日三回三乃至六丸食後用ユ(梅毒)

(二十四)溶解性「フォルムアミダート」水銀 *H. formamidatum solutum.*

本品ハ無色弱亞兒加里性ノ液ニ腐蝕加里ニ由リテ沈澱セス蛋白ヲ凝固セス硫化水素或ハ硫化亞兒加里ニ遇ヘハ之ヨリ硫化汞ヲ析出ス

緩和ノ水銀劑

梅毒ノ初期硬結ニ外用シ皮下注射スルニ昇汞ヨリモ速ニ奏效シ且之ヨリモ疼痛微弱ナリ速ニ吸收セラル、ヲ以テ作用ヲ起スヲ速ナリ内用セシムルキハ作用弱シトス皮下注射ニハ一立方仙迷即一筒(昇汞〇、〇一ニ應ス)ヲ用ヒ一般ニ三十筒乃至四十筒ヲ注射ス輕症ニハ此半量ニテ足レリ然ルキハ隔日ニ行フカ或ハ等分ノ餾水ヲ以テ溶液ヲ稀釋シ毎日注射スルモ可ナリ

〇「フォルムアミダート」汞〇、二五 餾水一〇〇、〇

右用法料(梅毒ノ初期硬結)

(二十五)單寧酸水銀 *H. tannicum.*

本品ハ千八百八十四年ウインナノルドウイヒ氏製藥局ニ於テ創製シカボジ一氏ノ臨牀實驗ニ於テルストガルテン氏之ヲ醫療ニ供セリ

性状 單寧酸水銀ハ微弱光輝アル帶褐綠色ノ鱗屑片ニシテ粉粹スルキハ汚色ノ粉末トナル而シテ無味無臭ナリ尋常ノ溶解劑ニハ溶解セスト雖モ水及酒精ニ遇ヘハ單寧酸ヲ與フルヲ以テ濾液ニ於テ之ヲ格魯兒化鐵ヲ以テ證明スヘシ

本品ハ稀鹽酸ニハ著ク變化セスト雖モ殊ニ酒精ヲ加フレハ暫時ニシテ甘汞ニ變シ其際液中ニ單寧酸ヲ殘ス

應用 單寧酸水銀ハルストガルテン氏梅毒ニ於テ緩和ナル水銀劑トナシ著效ヲ收メタリ其良效タルヤ殊ニ亞兒加里性腸消化ヲ被リテ純水銀ニ變移スルニ在リトス故ニ此作用ヲ名

溶解性「フォルムアミダート」水銀 單寧酸水銀

處方

テ内部塗擦療法ト云ヘリ本品ハ一日三回半時乃至一時ヲ經テ〇、〇五—〇、一ヲ與ヘ下痢アルキハ單寧酸若クハ阿片ヲ加用セシム一日極量〇、三ナリ

○單寧酸水銀〇、一 乳糖〇、四

右爲一包、一日三回一包(梅毒)

○單寧酸水銀四、〇 甘草羔及甘草末各三、〇

○單寧酸水銀〇、一 單寧酸〇、〇五(若

クハ阿片〇、〇〇五)乳糖〇、四

右爲六十九、一日三九乃至五九(梅毒)

右爲一包、一日三回一包(梅毒)

(二十六)「チモール」醋酸水銀 *H. thymolo-aceticum.*

白色無臭無味ノ粉末ニシテ水及酸類ニ溶ケス稀薄亞兒加里液ニハ容易ニ溶解ス梅毒ニ皮下注射(〇、一流動巴羅賓一、〇ノ者ヲ一筒トス)シ又丸劑トス之ヲ注射スルニハ可及的高ク臀部ニ刺入ス可シ之ニ由テ病者ヲ不快ヲ減セシムレバナリ毎三日乃至五日ニ注入ヲ反覆シ二十一日乃至三十四日ニ療法ヲ完結ス可シ内用量ハ每丸〇、〇〇五—〇、〇一トナシ一日量〇、一二ナリ

(二十七)藏化亞鉛水銀 *Hydrargyrum-Zincum Cyanatum.*

白色結晶粉末ニシテ水ニ全ク溶ケズ皮膚ヲ侵サズ防腐藥トシテ繃帶料ニ供用セリ本品ハ著ク微菌ノ發育ヲ止ムルモ毫モ殺菌ノ力ヲ具ヘザルガ故ニ昇汞ト伍用スルヲ可トス

(二十八)沃度酸汞 *Hydrargyrum jodicum Oxidatum.*

本品ハ無形白色ノ粉末ニシテ殆ト水ニ溶ケス食鹽或ハ沃度加里ヲ加ヘタル水ニ溶解ス諸期ノ梅毒ニ與ヘテ有害ノ副作用ナシ實質内注射ニモ賞用セラル慢性腎臟炎アル者ニ用ユルモ更ニ血尿及蛋白ヲ泄サズ

一筒乃至一筒半ヲ毎二日乃至四日ニ注射ス

○沃度酸汞〇、一二 沃剝〇、〇八 餾水一〇、〇

右每二日乃至四日一筒乃至一筒半實質内注射

(二十九)「カゴジール」酸汞 *H. Kakodjilium.*

本品ハ白色結晶引濕性物ニシテ水ニ溶解シ酒精ニ溶ケ難シ依的兒ニハ溶ケス水銀十六%ヲ含ム梅毒ニ一日量〇、〇三ヲ筋肉内ニ注射ス

(三十)酸化藏化汞 *H. Oxyganatum.*

本品ハ白色結晶性粉末ニシテベルト氏ハ防腐藥トシテ千五百倍ノ液ヲ化膿瘡面ニ用ヒ粘膜ノ制腐ニ供セリ昇汞ヨリモ強キ效力ヲ具フ結膜病ニハ一—二%ノ水溶液ヲ用ユ

ミュンヘン府ノ藥劑師ビーフェルリング氏ハ各個〇、五及一、〇ノ重量アル藍色ノ酸化藏化汞錠ヲ製セリ本品ハ水ニ溶解ス硝子圓筒二十個ヲ容レ包裝シテ販賣セラル昇汞錠ヲ用ユルト同シク千倍ノ溶液トナシ使用セラル一、〇ノ一錠子ハ六立方仙迷ノ水ニ投スルニ一分間内ニ溶解セサル可ラス濾液ハ無色清澄ニシテ強亞兒加里性ナラサル可ラス稀鹽酸ヲ加フルニ瓦私ヲ發生ス可ラズ井水或ハ餾水ヲ加フルニ毫モ變化ヲ喚起ス可ラズ

チモール醋酸水銀 藏化亞鉛水銀 沃度酸汞 カゴジール酸汞 酸化藏化汞

○水銀「ビラクタン」 Hydrargyro-Potkanin.

本品ハ紫色ノ粉末ニシテ水ニ溶ケ難ク酒精及依的兒ニ溶ケス約十六%ノ水銀ヲ含有スチンク
レル氏ハ壞疽、淋疾、白癬ニ賞用セリ淋疾ニハ千倍ノ水溶液ヲ用ヒ壞疽ニハ澱粉ヲ加ヘテ撒
布末トス白癬ニハ十%ノ流動石鹼トス

○水銀油(灰白油) Oleum Hydrargyri.

本品ハ半流動灰白藍色ノ液ニシテ臨ミ少ク温ムルキハ全ク流動ス梅毒ニ皮下注射トス即
チ本品〇、一—〇、一五立方仙迷ヲ一日五乃至八回背部ニ注射スルヲ最良トス二三週ノ後ハ
症狀全ク消散ス本品ハ防腐的ニ保ツヲ大ニ緊要トナス

○水銀石鹼 Sapo mercurialis.

脂肪ニ富メル中性石鹼ニシテ皮膚ニ塗擦スルニ善ク乾燥ス水銀軟膏ノ如ク塗擦ニ供ス皮膚ヲ
汚穢ナラシメス且斑點ヲ殘サス

○「スコポベリア、ドユルシス」(強壯劑及健胃劑)

○水製白屈菜越幾斯 *Ext. chelidoni aquosum.*

本品ハ新鮮ノ白屈菜ヨリ製出シタル黃色ノ液ニシテニセンコ氏ハ癌腫ニ一回〇、一—一、〇
ヲ與ヘ一日〇、五—五、〇ヲ投セリ本品ノ癌腫ニ於ケル效力ハ或ハ良ナリト云フモ多數ノ實
驗家ハ良效ナシトナセリヨゼーフ氏ハ癩病ニ一日四回二、〇宛又ハ一日三回一茶匙ヲ内用
セリ

利尿劑

○「スコパリン」 Scopolinum. $C_{17}H_{21}O_4$.

本品ハ鮮黃色細小ノ結晶ニシテ冷水ニ僅ニ溶解シ冷酒精ニ稍多ク溶解シ沸湯及酒精ニ溶解シ
易シ

「スコパリン」ハ利尿ノ效アリ内用(〇、五—一、〇)皮下注射(〇、〇三—〇、〇六)ニ供用ス即
チ一、〇ノ縮水ニ溶シ安母尼亞ノ痕跡ヲ加ヘ或ハ〇、七五ノ縮水〇、二五ノ屈利設林ヲ混セ
ル者ヲ用ユ

○「スコポラ」 Scopolin.

(イ)「スコポラ、カルニヨリカ」 Scopolin carnolica.

本植物ハ南歐羅巴ノ中部殊ニカルバートンニ汎存スルモノニシテ此白色肉様根ハ別拉敦那ノ
如キ作用アリ數種ノ類鹽基殊ニ「ヒヨスチアミン」及「ヒヨスチン」ノ痕跡ヲ含ム近時此中ニ
發見セル鹽基即チ「スコパリン」ハ豌豆大ノ結晶ニシテ酒精、依的兒ニ溶解ス
本品ハ別拉敦那ノ代用品ニシテ越幾斯〇、〇三ヲ發汗劑及鎮痛劑トシテ用ユ

(ロ)「スコポラ、ヤポニカ」 Scopolin japonica. (莨菪)

本品モ亦別拉敦那ノ代用品ニシテ亦散瞳作用アル成分ヲ含ム此中ニ發見セル類鹽基即チ「ロ
トイン」及「スコボレイン」ハエ、シユミット氏ニ從ヘハ他物ノ混合ナラザル可カラス

應用ハ別拉敦那ノ如シ之ヲ内用スルニ別拉敦那ヨリモ咽頭ノ乾燥ヲ起ス一少シ越幾斯、丁
幾、軟膏、擦劑トナシ内用及外用ニ供スルコト別拉敦那ノ如シ乾燥越幾斯〇、〇〇五—〇、〇

水銀ピクタンニシテ水銀油、水銀石鹼、水製白屈菜越幾斯、スコパリン、スコポラ
コポラ、カルニヨリカ、スコポラ、ヤポニカ

二「流動越幾斯〇、〇五—〇、五」丁幾ハ〇、二五—一、五ナリ

(ハ)「スコボラ、ルリダ」*Scopola lurida*.

本品ハネーブル及ヒマラヤ山地方ニ産スル者ニシテ他ノ「スコボラ」屬ノ如ク散瞳作用アル物質ヲ含有セリ應用ハ別拉敦那ノ如シ

〇「スコボラミン」(貌魯謨水素酸「スコボラミン」ヲ見ヨ)

〇「スクテルラリン」*Scutellarin*.

北米ニ産スル「スクテルラリア、ラテリフロリア」ヨリ製スル者ニシテ癲癇、舞蹈病、不眠、間歇熱ニ〇、〇五—〇、二五ヲ丸劑トス

〇「ストロンチウム」製劑

(イ)貌魯謨化「ストロンチウム」*Sroutium Bromatum. SrBr₂+6H₂O.*

本品ハ長柱狀ノ破折シ易キ引濕性ノ結晶ニシテ水及酒精ニ溶解ス白金線上ニ之ヲ熱スルキハ紅色ノ火焰ヲ放ツ又攝氏百二十度以上ニ熱スルキハ凡テ結晶水ヲ失ヒ無水貌魯謨化「ストロンチウム」ヲ殘シ白色ノ粉末トナル〇本品ハ胃病殊ニ酸性過度其他ブラキト氏病及癲癇ニ賞用セラル一日量四、〇食時三回ニ分服セシム癲癇ニハ一日量一〇、〇ニ増量スルヲ得ベシ

(ロ)乳酸「ストロンチウム」*Sroutium lacticum. Sr(C₃H₅O₂)₂+3H₂O.*

本品ハ白色結晶性粉末ニシテ水ニ溶ケ易ク中性ナリ熱スルキハ「カラメル」様ノ臭氣ヲ發シテ

心臟調整藥

燃燒シ炭化ス〇チエ、グウール氏ハ本品ヲ種々ノ腎臟病ニ用ヒ尿ノ蛋白含量ヲ減少セシムルモ利尿ヲ起スナシ不快ノ副作用ナキヲ以テ本品ハ八、〇—一〇、〇ヲ用ユルヲ得ベシ

(ハ)醋酸「ストロンチウム」(條蟲藥)

(ニ)硝酸「ストロンチウム」(關節痲痺質斯二、〇—一〇、〇ヲ與フ)

(ホ)磷酸「ストロンチウム」(滋養強壯劑トシテ磷酸石灰ニ代用ス)

〇「スパルテイン」*Sparteinum. C₁₅H₁₆N₂.*

ステンホース氏ハ「スパルチウム、スコバリウム」ナル植物ヨリ一種ノ糖鹽基ヲ發見シ之ヲ「スパルテイン」ト名ケタリ該品ハ酸ト化合シ鹽ヲ生ス

性状及作用

濃稠油狀ノ苦味アル液ニシテ僅ニ水ニ溶解シ酒精、依的兒、嘔囉仿謨ニ容易ニ溶解シ此體ニ酸ヲ加ヘ中性トナシ蒸發シテ結晶セシメ針狀結晶ヲ生ス

グルヂンヌスキ氏ノ試驗ニ由レハ本品ハ血行器ニ對シ大ナル作用ヲ有ス殊ニ冷血動物ニ向テ其作用著シク蛙ヲ以テ試驗ニ供スルニ或ハ心臟ヲ暴シ其上ニ貼シ或ハ皮下若クハ靜脈ニ注入スルモ其作用同一ニシテ主ニ心力ヲ喚起シ又少量ナレハ血壓ヲ増進ス其因恐クハ迷走神經ノ刺戟ニアラス却テ心臟筋肉ノ興奮性減少ニ歸スルナルベシ末梢運動神經ニ對シテハ作用ヲ呈スルコトナキガ如シ又脊髓ニ對シテハ始メ反射亢進後ニ減退ス而シテ假死ノ狀ヲ呈シテ死ス恐クハ延髓及呼吸筋ノ麻痺ニ因ルナルベシ

應用 本品ノ鹽類則チ鹽酸「スパルテイン」、沃度水素酸「スパルテイン」及硫酸「スパルテ

スコボラ、ルリダ スクテルラリン ストロンチウム製劑 貌魯謨化ストロンチウム 乳酸
ストロンチウム スバルテイン

心臟病ニ於
ケル效用

イン「アリ硫酸」スバルテイン」ハ最應用セララル、者ニ「スバルテイン」ハ實斐答利斯「ヂキ
タリン」及「コンワラマリン」ノ代用品トスバギンスキー氏ハ官能的心臟神經病、初起心
臟瓣膜病者ノ實斐答利斯ニ堪ヘサル者其他初起バセドウ氏病、肺氣腫家ノ喘息發作并ニ
慢性氣管枝加答兒ニ效アリ

ゼルソンシー氏ハ其硫酸鹽ヲ心臟病者ニ用ヒタルニ能ク心臟力ヲ振起シ脈搏ヲ旺盛セシメ
心臟ノ縮張ヲ調節シ脈數ヲ増加セシム其作用ハ服後一時間若クハ二三時間ニ起リ服用ヲ
止メタル後三日乃至四日間持續ス〇クレルク氏ハ心病ノ他、小循環障害ヲ伴フ慢性肺病ニ
良效アリ即チ呼吸困難、心機亢進等ノ症狀ハ速ニ消失ス又喘息患者ニ「ピリヂン」ト併用シ
良效アルヲ報告セリ〇「ドクトル」レオ氏ハ二十四名ノ腎臟病及ビ心臟病患者ニ試ミシニ内
九名ハ著シク利尿ノ效ヲ奏シ七名ハ煩悶、心跳、心痛等ノ諸症退去シ八名ニハ全ク效ヲ見サ
リシト而シテ利尿作用著明ナルニ當リ脈搏血壓等變化ナキガ故ニ腎ノ上皮ヲ刺戟シテ尿ノ排
泄ヲ催進スル者ナランカ實斐答利斯ノ代品トシテ佛國ニ於テ大ニ賞用セララル

獸醫學博士武藤喜一郎、醫學士石坂友太郎ノ兩氏ハ東京醫科大學高橋博士ノ許ニ於テ精密
ノ動物試驗ヲナシ「スバルテイン」中毒ノ死因ヲ東京醫學會雜誌第十六卷第十六號ニ詳報シ
テ曰ク本品ヲ動物ニ與フレハ呼吸麻痺ニ由テ斃ル然レモ中樞麻痺ニ由ルカ橫隔神經末梢麻
痺ニ由ルカ未タ明ナラス兩氏ノ實驗ニ由レバ少量ナレハ橫隔神經ノ末梢ノミヲ麻痺セシメ
大量ナレバ全中樞ヲ侵ス事實ヲ確定セリ


〇硫酸「スバルテイン」*Spartium subericum*. $C_{15}H_{26}N_2H_2SO_4 + 8H_2O$.

本品ハ無色透明ノ大結晶ニシテ水ニ容易ニ溶解ス本品ハ脈搏緩徐、心機旺盛、縮期延長セシム
セルマン、シエー氏ハ本品ヲ心筋病(即チ組織變狀及衰弱狀態)其他脈搏不整緩徐ナルモノ
ニ用ヒタリ一日數回〇、〇二一〇、一ヲ溶液或ハ丸劑トナス「一日量〇、五ナリ

〇硫酸「スバルテイン」〇、四 甘草根末 〇硫酸「スバルテイン」〇、二一〇、五 縮
甘草膏 適宜 水一〇、〇

右爲三十九、石松子ヲ衣トス一日二
乃至四回一二丸宛 右一日二乃至四回二十滴ヲ糖水或ハ
葡萄酒ニ加用ス

(附錄)鹽酸「ヲキシスバルテイン」*Oxyspartium Hydrochloricum*.



本品ハ水ニ溶ケ易キ針狀結晶ニシ「スバルテイン」ノ酸化產物ナリ脈搏ヲ減シ心機ヲ亢進ス但血管緊張ヲ變スル
「ナシチエフエー」氏ハ之ヲ心臟病ニ〇、〇四投シ速ニ増量シテ一回〇、一二至リ皮下注射及内用トス本品ニハ
習慣スル「甚早クシテ奏效ナキニ至ル同時ニ阿片ヲ用ユルハ效力ヲ失ハシムカ故ニ之ヲ避ケ可シ

〇「スベルミン」*Sperminum*. (臟器製劑ノ條ヲ見ヨ)

〇「ステレヲソール」*Stereosol*.

本品ハ褐色稠厚ノ液ニシテ水ヲ加ヘ蒸發スルハ乳樣ニ混濁シ左ノ構成ヲ有ス即チ「ラツク
カ」二七〇分安息香一〇分篤榴拔兒撒謨一〇分結晶石炭酸一〇〇分桂皮油六分「サツカリ

防腐藥

硫酸スバルテイン 附錄鹽酸ヲキシスバルテイン スベルミン ステレヲソール

ン」六分及酒精一「リリーテル」ヨリ成ル本品ハ防腐「フィルニス」トシテベルリヲツ氏カ粘膜病、實布埜里、皮膚ノ結核性潰瘍ニ賞用セシ製劑ナリ

○「スクレロチン」酸 *Asinum sclerotinum*. (不純ノ「エル」
「オンチン」酸)

本品ハ鮮褐色無形引濕性ノ粉末ニメ水ニ容易ニ溶解ス多數ノ麥角製劑中最有效ノ品ニメ子宮ノ收縮ヲ起シ止血作用アリ本品ヲ胃ニ送ルキハ腸ノ醱酵素ノ爲メニ多分ハ分解セラレ無効トナルカ故ニ唯皮下注射ニ供スルノミ皮下注射ニ於テハ已ニ少量ニメ血壓甚シク下降ス
○癩痢ニ内用セシム本品ヲ溶解スルニハ千倍ノ「チモール」水ヲ良トス皮下注射ニハ〇、〇四—〇、〇五増量シテ〇、一ニ至ル「癩痢」ニハ一日〇、三ヲ投ス

○「ステノカルピン」(知覺麻酔ノ性アリ)

○「スクビラ」(此皮ノ流動越幾スヲ驅梅劑トス)

○水仙

京都醫科大學ノ山内停吾氏ハ水仙中ヨリ「アルカロイド」ヲ發見シタリ其「アルカロイド」ハ森島博士ノ葱根中ヨリ發見セル「リコリン」ト同一ナリトテ東京醫學會雜誌第十六卷第十三號ニ詳論セリ

○「スピゲリア、マリランジカ」*Spigelia marylandica*.

本品ハ外部紫褐色、内部黄色ノ根ニテ驅蟲劑トシ殊ニ蛔蟲ニ供用ス

○「スチルリンギア」*Silingia*.

慢性酒精中
毒ニ效アリ

南米ニ産スル「ステルリンギア、ジルファチカ」ノ根ニテ煎劑(三〇、〇水七〇〇、〇)根末、流動越幾スヲ吐劑及變質藥トシ體質性皮膚病、肺病(水腫、黃疸)ニ用ヒ又驅梅藥及腺病ニ賞用ス此根末或ハ流動越幾ス一、〇—二、〇其濃厚越幾ス〇、〇五—〇、一五ヲ丸劑トス

○斯篤里幾尼涅 *Seychinium*.

近時斯篤里幾尼涅ハ慢性酒精中毒及酒客譫妄ニ用ユルニ頗ル良效アリ此療法ハ正序的ニ行ヒ稍久ク持續ス可キヲアリ中毒症ニハ〇、〇三ヲ皮下注射シ重症ニハ〇、〇六ヲ注射ス此療法ノ間、飲酒ヲ禁スルハ蛇足ニ屬ス是レ病者自ラ飲酒ヲ廢スレハナリ

○「スチナチン」*Sypticin*. $C_{12}H_{11}NO_2 + H_2O \cdot HCl$. (鹽酸「スチ」
「ニチン」)

止血藥

本品ハ黄色無形甚タ苦味アル粉末ニメ水及酒精ニ容易ニ溶解ス本品ハ「ナルコチン」ヨリ得タル者ニメ「ナルコチン」ハ酸化試藥ニ由リテ「ラビアン」酸及「コタルニウム」ニ分解ス化學上ニ於テハ「コタルニン」ハ「ヒドラスチニン」ニ類ス此兩物體ハ近似ノ生理的作用ヲ具ヘ「コタルニウム」ハ「ヒドラスチニン」ノ如ク止血ノ效アリ

鹽酸「コタルニウム」ハ一日三乃至四回〇、〇五ヲ用ヒ持長スルモ善ク之ニ堪フ又止血作用ト共ニ鎮靜及催睡ノ性能アリ本品ハ種々ノ子宮出血、多量ノ月經、定期性出血、筋腫ニ用ユルニ適ス妊婦ノ出血及流産ニハ本品ヲ禁忌スベシ

ギーセン大學教授ハ、ワルテル氏ハ未產婦、處女及經閉期婦人ニメ他ノ惡性合併症ヲ有セザルモノ等ニ來レル諸種ノ月經過多症、月經以外ノ不整出血、殊ニ搔爬術後ノ出血、子宮

スクレロチン酸 水仙 スピゲリア、マリランジカ スチルリンギア 斯篤里幾尼涅

周圍炎及變位等ニ因スル出血等約一百例ニ本品ヲ應用シ、其七十五%ニ於テハ之ヲ他ノ諸手術ヲ施セルモノニ比シ甚ダ良好ナル成績ヲ得タリ搔爬後持續スル出血ニアリテハ本品ト十%ノ「エルゴチン」丁幾トヲ隔週ニ用キタルモノ三十例悉ク其效ヲ過タザリキ分娩後殊ニ流産後出血七例ハ敢テ「エルゴチン」療法ニ優レルノ結果ヲ見ズ卵又ハ胎盤片ノ殘留セルニ由リテ來レル出血ニハ本品ヲ用ユルモ效ナシ必ズ手術ヲ要スルモノナリ卵巢及喇叭管ノ慢性肥厚、癒著等子宮附屬器關ノ異常ニ因スルモノニ對シテハ特ニ有效ナル反射作用ヲ促スモノノ如ク「イヒチオール」ト併用シ全然出血ヲ防止スルヲ得タリ氏ハ又妊婦ニシテ出血性內膜炎ヲ患フルモノニモ亦奏效セルニヨリ其妊娠中ト雖應用ヲ妨ゲサルヲ實驗シ得タリ而シテ氏ハ數ヶ月ニ互ル實驗ニヨリテ結論シテ本品ガ鎮靜止血ノ效ヲ有シ解剖的變化ヲ伴ハザル出血竝ニ總テノ婦人病ニ因スル出血ニ應用スベキモノナルヲ認メタリ氏ノ用法ハ錠劑或ハ十%水溶液臀部皮下注射ニシテ一モ患者ノ自覺的苦惱ヲ訴フルモノナカリキ

近時本品ヲ鼻出血ニ綿或ハ「ガーゼ」ヲ以テ栓塞スルヲ賞用セリ「プロフェツソル」コムベマーレ氏ハ結核性出血殊ニ發熱アル者ニ本品ヲ用ヒテ甚良效ヲ得ラレタリ(十%水溶液ヲ日々三乃至四立方仙迷皮下注射或ハ毎日各錠〇、〇五ノモノ四乃至五個内服)咯血ニ於テ本品ノ止血效用アルハ全血行ノ緩徐トナルニ由リテ血塞ノ形成ヲ助成スルニ由リテ説明スベシ齒科ニ於テ拔牙後靜止シ難キ出血ニ有力ノ止血劑トシテムンク氏ハ賞用セリ同氏及プロツホ氏ハ本品ノ十%水溶液ニ綿小球ヲ浸シ出血スル齒齦ノ裂隙ニ壓抵シ或ハ本品錠劑ヲ裂隙

上ニ貼シ綿球ヲ以テ被フベシ然レモプロツホ氏ハ之ヲ溶液トセス粉末ヲ僅ニ濕シタル小綿球ニ附着シテ使用シ可及的、本品ノ甚シキ苦味ヲ感セザラシムルヲ賞讚セリ近時、チージング及ドルン氏ノ實驗ニ由レバ本品ノ錠劑、粉末、本品溶液ニ浸シタル綿球ノ壓抵ハ確實ナル止血法ニアラズ之ニ反シテ三十%ノ本品「ガーゼ」ヲ栓塞スル法ハ確效アリ蓋シ此「ガーゼ」ハ出血スル拔牙創面ノ諸部分ニ接觸シ得レバナリ

一日三回乃至四回〇、〇〇五—〇、〇五ヲ散劑或ハ膠囊ヲ以テ服セシメ皮下注射ニハ〇、一—〇、二ヲ臀部ニ注射スベシ

〇「ステプチシン」〇、〇二五—〇、〇五 〇「ステプチシン」一、〇 餉水一〇、〇

右爲一包、與十二包、一日三四回二包 (子宮出血)

〇「ステルリビクリン」及「ステルリトキシシン」 Scillipirin und Scillitoxin.

利尿劑

本品ハ「ステルラ、マリチマ」根ヨリ得タル有效成分ニノ甲ハ帶黃白色無形ノ水ニ溶ケ易キ粉末ニノ味苦シ乙ハ輕キ無色乃至黃色ノ塊或ハ生薑樣褐色ノ粉末ニノ酒精ニ溶解シ亦苦味アリ

此兩品トモニ利尿ノ效アリ實麥答利斯ノ如ク心臟藥トス「ステルリトキシシン」ハ「ステルリビクリン」ヨリモ作用頗ル強キカ如シ「ステルリトキシシン」ノ一回量ハ〇、〇〇一—二ノ一日量ハ〇、〇〇一—〇、〇四ナリ「ステルリビクリン」ハ一日量四、〇(?)ナリ

ステルリビクリン及ステルリトキシシン

燃燒料タル
固形酒精

- 「ステレソール」(潰瘍ノ塗布薬ト用ユ)
- 「スルフアルデヒッド」(催眠薬)
- 「スマラグジン」*Smaragdin*

本品即チ固形酒精ハ乾涸護謨様ノ感アル「スマラグト」綠色ナル爽快覆盆子様香氣アル物質ニシテ流動酒精ノ代用劑トス本品ハ地方ニ於テ器械ヲ殺菌スル灼熱劑トシテ賞用セラル本品ハ滴下及流動スルコトナク乾涸シツ、燃燒シ唯僅ニ灰狀ノ殘物ヲ貽ス爆發ノ危險ヲ免ルベキ者タリ全然費消セラレザル本品ノ殘物ハ次回ニ亦之ヲ燃燒スルヲ得ベシ本品ノ火焰ハ毎時本品立方體ヲ横置スルハ増大シ得ベク之ヲ傾斜スルニ由リテ縮小セラルベシ本品ハ常ニ固ク密閉シテ貯フベシ是レ空氣中ニ於テ流動酒精ノ如ク蒸發スレバナリ本品ノ硝子管ハ日光ヲ遮絶スベシ然ラザレバ強ク加熱スルニ由リテ本品立方體ヨリ酒精ノ一部分發散シ此硝子管ノ放冷スルハ液體トナリテ器底ニ沈澱スレバナリ「スマラグダ」管ハ鐵葉、燃燒皿及「スマラグデン」ヲ貯フル小筭函ヨリ成ル

○「ストロファンツス」*Strophantus*

心臓調整藥

性状 「ストロファンツス、ヒスピツス」ト稱スル植物ハ亞非利加西岸セネガムビヤギニヤ東岸ザンジベール沿岸ニ産シ土人ハ之レガ種子ヨリ毒ヲ製セリ「ストロファンチン」ハ此ノ種子ヨリ製スル白色無臭ノ小板狀結晶體ニシテ強烈ノ苦味ヲ具ヘ少シク酸味ヲ帶ヒ冷水ニハ僅ニ溶ケ熱湯ニ稍多ク溶解シ容易ニ酒精ニ溶解スルモ依的兒及「ペンツオール」ニハ溶

ケズ稀硝酸ヲ加フレバ「ストロファンチン」ヨリ其ノ分解產物タル「ストロファンチン」ヲ生ス

作用 フレーザ氏ノ說ニ由レハ本品ノ蛙ニ及ホス作用略々實麥答利斯ニ同ジク心臓收縮力殊ニ心室ノ收縮力ヲ増盛シ大量ヲ與フルハ心室甚シク收縮シ往々痙攣狀ヲ呈シ心動全ク歇止ス又同氏ノ說ニ曰ク其力、實麥答利斯ヨリ強烈ナルヲ以テ筋ノ收縮ヲ致スコト完全ニノ持績スルコト多ク就中、心臓ノ筋質ハ血液ヲ受クルコト多キヲ以テ藥力ニ感スルコト著シク且強烈ナリト云フ

ランガルトポイト兩氏ハ心臓作用ノ他、催眠作用ヲ實驗セリ即チ家兔ハ少量ヲ服スルノ後疲勞ノ狀ヲナシ大量ヲ用ユレハ麻痺症ヲ發起セリ又蛙ニ於テモ同一ナリ其麻痺症ヲ呈スルニ先チ僅ニ反射機興奮性ノ亢進ヲ致セリ是ニ由テ之ヲ觀レハ本品ハ腦脊髓ノ鎮靜藥ニシテ殊ニ血行違常甚シキノ後ハ能ク催眠ヲ起スモノトス

心臓病ニ於
ケル效用

應用 心臓ノ強壯藥及利尿劑ト用ヒ「ヂギタリン」ノ如キ作用ヲ具ヘ實麥答利斯ノ不快ナル副作用アルモ唯頗ル僅微ナルノミ「ストロファンチン」ハ毒性アリ本品ハ心臓瓣膜病ノ代償機障礙、心肉炎、脂肪心ブライト氏病、絞心發作等ニ供用ス本品ハ蓄積作用ヲ有セス本品ハ内臟出血ヨリ來ル急性貧血、血管動脈瘤アル者ニハ禁忌ス可シ

チウ氏ハ二十一歳ノ婦人ニテ心臓僧帽瓣閉合不全症ニ因スル全身水腫ニシテ脈搏細數百二十五、尿量一晝夜六〇〇、實麥答利斯、穿腹術ヲ施スモ效ナシ由リテ本品丁幾二滴ヅ、一日

スマラグジ ストロファンツス

心臓病腎臟
病ニ於ケル
效用

三回後ニ四滴ニ増量セリ二日後呼吸容易ク脈強實トナリ八十四搏ニ減少、尿量一八〇〇、
 ○ニ増加セシガ試ニ休養セシニ諸症増劇セリト報告セリ又同氏肋膜炎ニ試用シ良效ヲ得タ
 リト○ヅラシエ氏ハ三十名ノ心臓病者ニ試ミ其效、實答利斯「アドニス」ニ優ルト報告セ
 リピンス氏ノ説ニ由レハ實答利斯ニ優ルハ八乃至十週間持長スルモ蓄積作用ヲ呈セス速
 ニ呼吸困難ヲ治シ消化ヲ害セサルニアリ然レモ利尿ノ效ハ實答利斯ニ及ハス是レ心臓筋
 肉ニノミ其作用ヲ呈シ血管ヲ犯サ、ルニ因ルナリ

ピンス氏ハ瓣膜病、脂肪心、動脈硬變等ニ調節不全ヲ發シタル二十五名及ヒ三名ノ腎臟病ニ
 該丁幾ヲ一日三回五乃至十滴宛與ヘ毎常偉效ヲ得タリ即チ心機整理シ脈搏強實十二乃至十
 四搏ヲ減シ同時ニ尿量增多セリ其他呼吸困難又ハ喘息様ノ苦悶ヲ輕快若クハ全治セシメタ
 リ又ストロファンツスハ急性熱性病ノ經過ニハ敢テ影響ヲ與ヘサルモ心ヲ強壯ナラシメ
 タリ然レモ肝臟硬結其他門脈系疾患ニ因スル腹水、心臓神經性疾患ニ效ナカリキ

○「ストロファンツス」丁幾 *Tinctura Strophanthi.*
 「ストロファンツス」丁幾ハ「ストロファンツ」實ヨリ脂肪油ヲ壓搾シタルモノ一分ニ稀酒
 精十分ヲ加ヘタル者ナリ之ヲ濾過スルニ當リ尙分離スヘキ脂肪油ノ之ヨリ分層セラル、ヤ
 否ヤニ注意スベシ帶黃褐色ノ丁幾ニシキ苦味アリ」注意シテ貯フヘシ、

用量 酒精製丁幾(一分二十分)ハ一回量二乃至十滴ヲ水ニ加用シ一日量八十乃至四十
 滴或ハ一日二三回十乃至十五滴ヲ用ユベシ「ストロファンチン」一回〇、〇〇〇五一日〇、〇

○五ヲ極量トシ丁幾極量一回一、五一日五、〇トス
 ○「ストロファンツス」丁幾 十滴 餾水 ○「ストロファンツス」丁幾 三、〇 實
 八〇、〇—九〇、〇 覆盆子舍利別一 麥答利斯浸(一、五)—一五〇、〇 醋酸加
 〇、〇 里液 單含 各二〇、〇
 右每三時一小兒匙(八歳乃至十歳ノ 右混和每三時一食匙(心臓病、腎臟
 兒童) 病)

○「ストロファンツス」丁幾 一、〇—一、五—二、〇 水一〇〇、〇 橙皮含二〇、〇
 右一日三回分服

○「ストロファンチン」 *Strophanthinum.*

本品ハ「ストロファンツス」實ノ糖原質ニシテ白色結晶狀粉末ナリ「ストロファンツス」丁幾ニ
 代用シテ〇、〇〇〇二—〇、〇〇〇五ヲ丸劑トナシ用ヒ皮下注射ニハ強ク刺戟シテ痛アリ本
 品ノ製劑ハ其作用不同ナルカ故ニ賞用スルニ足ラス

○單寧酸「ストロファンチン」 *S. kaniicum.*
 本品ハ帶黃白色無形ノ粉末ニシテ水ニ溶ケス五八、一四%ノ「ストロファンチン」ヲ含有ス用
 量〇、〇〇〇五—〇、〇〇一ヲ丸劑トナシ一日二回用ユ

○「ストロファンツ」 *Stomach.*

古來獨逸國シユウエド州ダラルネノ人民ハ松樹脂ヲ咀嚼シ著シク健全且美麗ノ齒牙ヲ具フ

ストロファンツ丁幾 ストロファンチン 單寧酸ストロファンチン ストロファンツ
 スルフォールナール 八三九

ルノ事實ニ由リテ同地ノ齒科醫レンハルトソン氏ハ此樹脂ノ有效分ヲ洗口水トナシ供用セ
リ依リテ「ドクトル」ムスカート氏ハ毎日二回朝夕ニ本品二%ノ水溶液ヲ用ヒシニ全ク其無
害ニシテ防腐ノ效アルヲ見タリト

〇「スルフォナール」*Sulfonalm.* $(CH_2)_2=C(SO_2C_2H_5)_2$

「スルフォナール」ハ千八百八十六年「プロフェツソル」バウマン氏之ヲ發見シア、カスト氏
ハ本品ノ顯著ナル催眠藥ナルヲ確定セリ

性状 「スルフォナール」ハ無色無臭無味ノ稜柱狀結晶ニシテ溫暖ニ於テハ全ク揮發シ冷水
五百分沸湯十五分冷酒精六十五分沸騰酒精二分依的兒百三十五分ニ溶解シテ中性液トナル
熔融點ハ百二十五度乃至百二十六度ナリ本品〇、一ヲ粉末トナセル木炭ト共ニ試験管内ニ
灼熱スルキハ特徴タル「メルカプタン」臭ヲ發ス本品ヲ沸湯ニ溶解スル際ニハ(一分ト五十
分ノ比例)毫モ臭氣ヲ發生セス此水溶液ハ放冷後濃過シ硝酸重土液或ハ硝酸銀液ヲ加フル
モ變化ス可ラス過滿俺酸加里液一滴ニ此水溶液十立方仙迷ヲ加フルモ忽チ脱色ス可ラス
注意シテ貯フベシ

作用及應用

本品ハバウマン及カスト氏カ治療上ニ用ヒタル催眠藥ニシテ半時乃至二
時間内ニ睡ヲ催ス治療上ノ用量ニ於テハ直接ニ呼吸及心機ニ影響セス本品ハ神經性不眠ニ
最奏效スト雖モ疼痛狀態ニハ效少シトス鎮靜藥トシテ久時持續セル興奮狀態ニ反覆少量ヲ與
フルニ良效アリ又盜汗ニモ應用セラル初生兒牙關緊急ニモ亦然リ時トノ翌日ニ至ルモ睡氣

「ア、カス
ト」氏病狀
實驗

ヲ催ス「ア」副作用ハ耳鳴、眩暈、稀ニ嘔吐、下痢、發疹ヲ來ス「ア」久時應用セルキハ運動
性及知覺性抑壓狀態即チ麻痺性衰弱、歩行踉蹌、言語不明、睡氣、疼痛感覺ノ減退、皮反射ノ
衰弱或ハ消失、「ヘマトバルビリン」尿ヲ呈ス中毒ヲ發セルキ本品ノ服用ヲ廢シ重碳酸曹達
五、〇—一、〇、〇(一日量)ヲ服セシムベシ

「ゲ、ラバ
ス」氏病狀
實驗

「ア、カスト」氏ハ六十名ノ病者ニ就キ三百回之ヲ實驗シ左ノ報告ヲナセリ即チ「スルフォナ
ール」ハ催眠藥劑中ニ卓出ノ位地ヲ占ムル者ニシテ強テ睡眠ニ陥ラシムル眩暈ノ作用ヲ呈セ
ス正常定期性ノ睡眠ヲ補助シ且之ヲ缺クカ如キ時ニ睡眠ヲ喚起スル效アリ血液ノ原質ニ有
害ノ感應ヲ呈セス腸粘膜ニ局所有害ノ作用ナク心臟及ヒ血管ニハ大量ヲ與フルモ毫モ不良
ノ感應ヲ喚起スルコトナシト

〇「ドクトル」ゲ、ラバ「ス」氏ハ二十七名ノ精神病者ニ於テ二十回之ヲ供用シ次ニ掲グル條件
ヲ決スルヲ得タリ

「スルフォナール」ハ其中量(二、〇—三、〇)ニシテ大量ノ抱水「アミール」及「バラアル
デヒット」ヨリモ確實ノ良效アル睡眠藥ニシテ麻酔藥ニ習慣セル者ニ於テモ其效、確實ナリ其
他「スルフォナール」ハ其味ヲ有セサルヲ以テ此兩劑ニ優ル者ナリ抱水格魯刺兒ハ速ニ睡眠
ヲ催起スト雖モ「スルフォナール」ノ如ク永ク其效ヲ持續スルコト能ハズ「スルフォナール」
二、〇—三、〇ヲ一回ニ與フレハ通常興奮セル病者ニ於テモ亦良效ヲ奏シ久時服用セシムル
モ其量ヲ增加スルヲ要セザルガ如シ而シテ多クハ半時ノ後睡眠ヲ催シ六時乃至八時間持續シ

スルフォナール

其間醒覺スルコトナシ翌日午前尙一二時睡ヲ貪ルコトアリ其後效用ハ漸次ニ消失スル者ナリ其睡眠ハ全ク正常ノ者ニ同シ短小ノ時間ヲ以テ四、〇ノ大量ヲ二、〇—三、〇ノ少量ト交々使用スルモ全身ニ向テ更ニ有害ノ感應アルコトナシ一般ニ久時服用スルモ不快ノ副作用ヲ呈セス食思、消化、呼吸及心動ハ絶エテ侵害セラル、コトナシ（一病者ニ於テハ七回ノ嘔吐ヲ發シ他病者ニ於テハ十回下痢ヲ發セシガ「スルフォオナル」ノ作用ニ歸スベキヤ否茲ニ確言スルコト能ハス）久時持續スルモ「スルフォオナル」ノ心機能ヲ眞ニ障害セサルハ「クロラール」ノ如ク心臟ヲ衰弱セシムル者ニ比スレハ大ニ優レル所ト素ヨリ本品ト雖モ偶々其無効ナルヲ經驗シ眞ニ確實ナル麻醉ノ效ヲ呈セザルコトアリ

「ハイソリ
ツヒロツリ
ン」氏病牀
實驗

○「ドクトル」ハイソリツヒ、ロジーン氏ハ二百七十四回使用シ其經驗ヲ左ノ如ク報告セリ
諸般ノ際ニ用ユルニ「スルフォオナル」ハ莫見比涅及「クロラール」ノ如キ催眠藥ニ比スレハ確實ニ劣等ノ藥劑ニアラサルヲ認定シタリ其量ヲ倍シテ四、〇ノ大量ヲ用ユルモ有害ノ副作用ヲ呈セザルカ爲メ單純ノ不眠症ニハ甚タ實用スベキ藥劑ナリト

「カル、オ
エストライ
ヘル」氏病
牀實驗

カル、オエストライヘル氏ハ「スルフォオナル」ヲ左ノ諸症ニ用タリ即チ肺癆 一回 麻痺狂 九回 老耗狂 十八回 癲狂 十回 鬱憂病 十三回 相慮錯亂 十七回 歇私的里性精神障礙 四回 癲癩 十回 重症癲癩 一回 酒客錯妄 一回 心臟亂動ヲ有スル衰弱性精神病 一回 依ト昆垚里 二回 莫見比涅中毒 四十一回（多ク病牀日誌アレモ略ス）

モルヒネ中
毒ニ於ケル
「スルフォ
オナル」ノ
效用

「カル、オ
エストライ
ヘル」氏
實驗成績

從來莫見比涅中毒ニ於ケル「スルフォオナル」ノ效用ニ就テハ毫モ經驗ヲ公表セシ者ナシ故ニ余ハ莫見比涅服用ヲ廢止セル間ハ勿論其斷止後ノ第一周ニ於テ殊ニ久時不眠ハ頑固ナリシガ「スルフォオナル」ヲ以テ之ヲ鎮制スルヲ得タリキ

「スルフォオナル」ハ毫モ不快ノ作用ヲ呈セサル無害ノ催眠劑ニシテ呼吸脈搏及尿ノ分泌并ニ尿中蛋白ヲ呈出スルコトナシ持久服用スルモ障害ヲ發セサルヤ否ハ直ニ斷言スルコト能ハス無味無臭ナルカ爲メ殊ニ精神病者ニ於テハ抱水「アミール」及「バラアルデヒット」ニ優ル者ナリ其效用ハ眞ニ確實ナラスト雖モ多クハ「クロラール」ニ均シキ量ヲ以テ奏效シ心機ヲ危害スルコトナク亦更ニ眩暈狀及興奮症ヲ起スコトナシ莫見比涅服用廢止ノ後第一日ニ於テハ上記ノ三催眠劑ト同シク奏效少シトス其發起スル睡眠ハ往々上記ノ諸劑ヨリハ遅キ者ニシテ一乃至三時ヲ經テ發スル者ナリ然レモ其持續スルコト久シトス此劑ハ就眼前、數時ニ服用セシムルヲ稱用スルナリ

「イユリウ
ス、シユワ
ル」氏病牀
實驗

「ドクトル」イユリウス、シユワルベ氏ハ五十名ノ病者ニ就キ實驗ヲ報告セリ其内男子ハ二十九名女子ハ十七名小兒ハ四名ナリ

「スルフォオナル」ヲ供用スル五十名ノ病者中、三十三回即總數ノ六十六%ハ服用後半時乃至三時ヲ經テ確實ノ睡眠ヲ起セリ其成績ハ只五名ノ男子ニ僅微ナリシノミ其十二回即二十四%ハ比較的不良ナリ二十三回單純ノ神經性不眠ニ於テ「スルフォオナル」ハ二十一回即九十%三分ハ充分良好ノ奏效ヲ起セシモ之ニ反シテ原病自家ハ不眠ノ直接原因ヲナス症ニ在

テハ平均大量ニ於ケルモ唯十二回即十四%ノミ満足ノ效ヲ奏セリ

「ドクトル」シユワルベ氏ハカスト氏ノ實驗即チ「スルフォオナール」ハ催眠劑ナリト雖モ毫モ
麻酔ノ效ナシトノ事ヲ確定シタリ即チ(一)純粹ノ「スルフォオナール」ハ其無味無臭ナルヲ以
テ良好ノ藥物ナリトス(二)神經性不眠ノ症ニ於テハ催眠藥トシテ、〇—二、〇ヲ以テ其確實
ノ效ヲ奏ス既存ノ疾病ノ直接器質的障礙ヨリ來ル不眠症ニハ其效確實ナラス(三)「スル
フォオナール」ハ體溫、脈搏、呼吸ヲ侵害セサル故ニ其性質ニ從テ熱性病及心臟衰弱ヲ恐ル、諸
症ニ於テハ莫見比涅及格魯刺兒ニ優レリ殊ニ小兒ニ用ユルニ適ス(四)「スルフォオナール」ノ
自覺的副作用ハ幽微ナルカ故ニ一般ニ其使用上禁忌スヘキコトナシ

上記ノ試驗ハ「バイエル氏製」「スルフォオナール」、「Sulfonal」、「Bayer」ヲ以テ論述セル者ナリ
「リーデル氏製」「スルフォオナール」ニ至テハ之ヲ下條ニ論載セン

「ドクトル」バウルグツトマン氏ハ左件ヲ報告セリ即チ許多ノ病者ニ就テ「リーデル氏製」「ス
ルフォオナール」「Sulfonal」、「Richter」ノ二、〇或ハ「巴」ニ一、〇ヲ用ユルモ不快ノ副作用ナク數時連
續セル安靜ノ睡眠ヲ起スコトヲ得ヘシト「ドクトル」ラウト氏ハ兩氏製劑ヲ用ヒタルニ共ニ良
效ニシテ毫モ差異ナシト云ヘリ「スルフォオナール」ノ他諸劑ニ卓越スル所以ヲ簡短ニ總括スレ
ハ左ニ示スカ如シ

(一)本品ハ毫モ眩暈ヲ發スルコトナク健全安靜ナル定期性睡眠ヲ催シ其之ヲ缺クカ如キ
時ニモ睡眠ヲ起ス者ナリ其睡眠ハ全ク正常ノモノニ同シ(二)麻酔藥ニ習慣スルカ如キ

「スルフォ
オナール」ハ
他ノ諸催眠
藥ニ優ル

東京府巢鴨
病院實驗

者ニ於テモ其奏效確實ナリ(三)其無臭ニシテ全ク無味ナルヲ以テ他ノ睡眠劑ニ優ル者ナ
リ(四)久時服用セシムル時ト雖モ不眠ノ副作用ヲ存スルコトナシ(五)食思、消化、呼吸及
心機ハ毫モ侵害セラル、コトナシ(六)更ニ眩暈ノ状態ヲ起サス且興奮ヲ前發スルコトナシ

(七)合併症ナキ諸般ノ不眠症ニハ甚タ實用スヘキ者ナリ

○我醫科大學助手片山正義氏ハ東京府巢鴨病院ニ於テ時發性躁狂六名、躁狂六名、鬱憂狂六
名「ヒステリー」狂一名、急性幻覺性錯迷狂一名、痴狂一名合計二十一名七十一回實驗セリ一
回ノ用量ハ〇、七—三、〇通常一、〇—一、五ヲ以テセリ其内、良效ヲ得タル者五十五回、奏效
稍、少ナキ者九回、全ク效ナキ者七回ナリ之ヲ百分比例ニ算スルキハ七七、四六%ハ良效ア
リ二二、六七%奏效少ナク九、八六%ハ全ク效ナカリシ此實驗ニ由リ氏ハ左ノ如ク結論セリ
(一)「スルフォオナール」ノ精神病者ニ對スル催眠作用ハ之ヲ確實ナリトスルコト能ハスト雖
モ多クハ良效ヲ奏メ副作用ヲ發スルコト甚稀ナリ且其副作用ハ速ニ消退シ敢テ恐ルヘキ者
ニアラス故ニ之ヲ催眠藥トシテ精神病者ニ用フヘシ(二)慢性躁狂者ノ頑固ナル不眠、時發
性躁暴狂ノ發作ノ初メ病勢劇進スルキ及脊髓反射機モ亢進セルカ爲不眠ニシテ胸内ノ苦悶
甚シキ者ニハ「スルフォオナール」ノ奏效少ナシ(三)急性幻覺性錯迷狂ニハ著キ良效ヲ收メ
タリ殊ニ「スルフォオナール」ヲ用ヒタル翌日患者ノ幻覺大ニ減シ妄想大ニ衰フ是レルシエ
ウエイ氏ノ經驗スル所ニ全ク相反ス(四)「スルフォオナール」ハ一、〇—一、五ヲ以テ一回量
トナシ晚餐後久シカラズ之ヲ牛乳ニ和シ用ユヘシ或ハ之ヲ服スルニ溫湯ヲ以テスルモ

スルフォオナール

副作用

「スルフオナール」中毒ノ關係

可ナリ(五)「スルフオナール」ノ催眠作用ハ多クハ服後三十分乃至二時間ヲ經テ現ル或ハ四、五時間ノ後初テ效ヲ奏スルアリ(六)「スルフオナール」ニ因スル催眠ハ甚安泰ナル催眠ニシテ睡眠中夢ミルコトナシ大凡六時間多キハ十一時間ニ及フアリ(七)「スルフオナール」ノ副作用ハ稀ニ發スル者ニシテ神經系及消化器系ノ症狀ナリ此症狀ハ翌日晩頃ニ至レハ多クハ消失シ敢テ恐ルヘキ者ニアラス且此副作用ハ連夜「スルフオナール」ヲ用ユルハ發シ易シ(八)呼吸器及循環器系統ニハ著キ作用ヲ及ホスコトナシ然レモ心臟病ヲ患フ者ニハ之ヲ用ユル機會ナカリシ(氏ノ細論ハ東京醫學會雜誌第三卷第十號第十一號ニアリ)

○ロージンシユワルベフレンケルハール、シエウエイ氏等ハ不快ノ副作用ヲ報告セリ即チ服セル翌日患者疲勞ヲ覺ヘ四肢倦怠、神思茫然タリ又躁狂、麻痺狂ニ三、〇—四、〇ヲ與ヘタルニ翌朝嘔吐セリ又十日間連用セシニ食欲大ニ衰ヘ體重大ニ減セリ後服ヲ止シニ速ニ恢復セリ又下痢スルコト間、アリト云フカスト氏曰ク不利ニアリ即チ奏效遅徐ニシテ服後二三時間ヲ經過セサレハ睡眠セス睡氣、疲勞、倦怠等ノ猶翌日ニ及フ是レ水ニ溶解シ難キ分子ノ分解シ難キニ由ルナリ

「スルフオナール」ハ千八百八十八年カスト氏カ催眠劑トシテ賞用セラレタル以來短少ノ年月間ニ廣ク諸方ニ應用セラレ其速效アルカ爲メ殆ト缺クヘカラサル藥品トナレリ然レモ當初唱道セラレタル如ク無害ノ者ニ非ラス蓋シ其應用ノ初年已ニ本品ノ久用ニ歸スヘキ數多ノ中毒症ヲ公ニセラレタリシカ今ヤ本品ヲ使用スル者少カラサルニ拘ラス慢性中毒ノ初徴

用量ト中毒トノ關係

普ク知了セラレザルカ故ニ之ヲ用ユルニ臨ミ注意ヲ加フルヲ可トス

此慢性「スルフオナール」中毒ハ日々刻々患者ヲ監督シ得ル臨床的療法(精神病患者ニ最多シ)ニ於テ遭遇スルナリ故ニ屢、監督甚不全ナル所ノ一般實地治療ニ在テハ「スルフオナール」ノ應用ニ益、注意ヲ要ス但中毒ヲ喚起スル分量ハ各異ナルヲ以テ頗ル留心スヘシ即チチエストライヘル氏ハ一患者ニ六年間ニ本品千五百瓦ヲ用ヒシニ健康ノ障礙ヲ呈セザリキヘルチング氏ハ二百五日間ニ二百二十四瓦、九百七十一日ニ八百九十二瓦、九十一日ニ二百二十八瓦、八十四日ニ二百十八瓦及二百三十八日ニ百五十二瓦ヲ用ヒタレモ損害ヲ惹起セザリシ之ニ反シシユルツ氏ハ一ヶ月間ニ唯十六瓦ヲ服セシメタルニ慢性中毒ニ陥リ死セル一例ヲ報告シヘルウエグ氏モ三ヶ月内ニ九十瓦ヲ投シ慢性中毒ニ罹リ斃レタルヲ實驗セリヲスワルド氏ハ四ヶ月ニ百八十瓦、シヤアフェル氏ハ二百七十日ニ百八十瓦、ヘルチング氏ハ百十日ニ百二十八瓦ヲ用ヒタルニ中毒ヲ起セシヲ見タリト

是ニ由リテ見レハ用量ト中毒トニ著シク差異アルヲ見ル即チ一方ニハ數百瓦ヲ用ユルモ害ナクシテ之ニ堪ヘ他方ニハ甚小量(例之一ヶ月ニ十六瓦)ニシテ已ニ致命ノ「スルフオナール」中毒ヲ起セリ而シテ須ク注意スヘキハ此中毒ハ男子ヨリモ女子エ多キコト是ナリ本品服用ノ持續時間及用量ノ外ニ營養不良、高齡、概シテ身體ノ抵抗力微弱ナル者ハ中毒ヲ起シ易キハ數々唱道セラレタリシユルツ及ヘルチング氏ハ便秘ノ存在ハ中毒ヲ招キ易カラシムルト云ヘリ又カスト氏ハ「スルフオナール」ニハ其難溶性ナルト其ノ分子ノ化學的構成トニ歸スヘ

「スルフオナール」

キ一種ノ蓄積作用アルヲ報セリ本品ノ久用後ハ尿中ニ變化セサル「スルフォナール」ヲ見ル
モルロー氏ハカスト氏ノ説ニ反シテ「スルフォナール」ハ初メヨリ全ク分解セスノ其小部分
ハ直接ニ腎臟ヲ經テ排泄セラル、ヲ唱ヘタリ則チ日々之ヲ服用シ休業後三日ニ初テ再
ヒ尿中ニ排泄セラル、ヲ見ズ

斯ク或症ニハ中毒ヲ發シ或他ノ症ニハ發セサルハ其人々ニ素因(ムルロー氏)或ハ特異素質
(ヘルチング氏)アルニ由ルト稱スルモ亦已ヲ得ザルベシ

剖檢ニ徴スルニ此中毒ヲ確然解釋スベキ變化ヲ認ムル能ハス剖檢シタル許多ノ場合ニ於テ
ハ肝臟及腎臟ノ變性的變化ヲ認メステルン氏ハ一回心筋ノ脂肪變性ヘルウエグ氏ハ急性脊
髓炎ノ如キ下脊髓前角神經細胞ノ變性ヘルチング氏ハ一回腸粘膜腫脹シ諸處ニ潮紅部アル
ヲ見タリ變性的肝臟炎及腎臟炎ハ頗ル増進シタル中毒ノ徴ナリチットリヒ氏ハヘルチング
氏ノ發見シタル急性腸炎ヲ以テ中毒ノ發生ヲ説明スルニ緊要ナリトセリ實ニ許多ノ場合ニ
於テ胃腸症候ハ初發ノ中毒症狀ナリトス即チロツテンブルグ氏ハ一男子ニ本品一八、〇—
二〇、〇ヲ一週間内ニ投セシニ唯胃腸加答兒ヲ患ヘシ者ニ於テ中毒ヲ認メシユルツ氏ノ實
驗セシ患者ハ少量ノ「スルフォナール」ニ由リテ斃レタリシカ之ヲ投スルノ前ニ胃腸加答兒
ニ罹レル者ナリシガ「スルフォナール」ヲ與フルゴトニ甚シキ胃腸自覺症ヲ起シタリキ其他
數多ノ慢性「スルフォナール」中毒患者ハ胃或ハ腸ノ症狀殊ニ便秘ヲ患ヘ或ハ貧血性、衰弱シ
タル人、麻醉藥ニ由リテ衰弱セル老人ニノ胃腸ノ官能モ衰弱シタル者ナリシ此諸患者ニ於

中毒ノ原因

「スルフォ
ナール」中
毒ノ症候

テハ分解及吸收緩徐ニシテ亦全新陳代謝損害ヲ被ムルカ故ニ排泄從テ緩徐ナリ實ニ「スルフォ
ナール」ハ分解シ難ク從テ吸收セラレ難シ則チ體中ニ大量ノ毒質堆積シ其人ニ於テハ抵抗
力甚微弱ナルカ故ニ中毒症狀ヲ發シ易シ

慢性「スルフォナール」中毒ノ症候ハ初起ニ於テハ多クハ胃腸症狀ニシテ腹痛ヲ訴ヘ最多キハ
胃部ナレモ肝臟部ニモ現ハル而シテ嘔氣屢、頑固ノ嘔吐、許多ノ高度ノ便秘ヲ發ス肝脾ノ腫大
ヲ證明スル能ハス此初發症候ト同時ニ尿暗櫻紅色ヲ呈ス此尿ノ暗色ハ屢、中毒ノ初徴ニシ
「スルフォナール」尿ハ患者ノ襪衣ニ濃色綠アル特徴的紅斑ヲ殘ス忽チニシテ腦症候即チ初メ
共働機障礙、次ニ麻痺症狀ヲ發ス患者起立時、歩行時ニ振搖踉蹌タリ言語含糊トシ澁難ナリ
終ニ神識朦朧トナル瞳孔及腱ノ反射減弱或ハ絶止シ昏睡ニ陥リテ斃ル屢、危重ノ麻痺症狀
ヲ發スルコトナクシテ死スルコトアリ

屢、中毒ハ腦髓症狀ヲ以テ開始シ他ノ症狀ハ不明ナリ然ルモハ共働機障礙、言語障礙、神識
朦朧、頭痛熾盛ナリ但他ノ症候モ亦缺クルニ非ラス許多ノ場合ニ於テハ高熱二十九度以上
ニ及ブコトアリ

此兩類ノ症候即チ胃腸性症候及腦髓性症候ノ間ニ素ト各箇ノ症候ノ變遷及混同ヲ生ス若シ
夫レ一患者ニ久時間「スルフォナール」ヲ投スルモハ常ニ胃腸症候、襪衣ニ特異ノ斑點ヲ殘ス
所ノ尿ノ暗紅色、共働機障礙、言語障礙、神識朦朧ニ注意スベシ此ノ各個ノ徴アラバ本品ヲ
休服セシムベシ

尿暗色ノ理由

尿ノ暗色ハ本品ノ久服ト原因上ノ關係アリストクウイス、ハムマルステン及サルコウスキ
―氏ニ從ヘハ此暗色ハ「ヘマトボルフィン」ナル色素ニ由來スルヲ發見セリ此色素ハ血液
ヨリ來ル者ニソナルコウスキー氏ニ從ヘハホッペ、ザイレル氏ノ無鐵性「ヘマチン」ニ同シキ
者タリ之ニ反シテ或人ハ尿中ニ發見スル色素ハ毫モ「ヘマトボルフィン」ニ非ラスト唱フル
者アリ例之、クインケ氏カ尿ヲ檢セシ所ニ由レバ色素ハ「ヘマトボルフィン」ニ非ラスト
其性不明ナル他ノ色素ニ係ハルト稱スルカ如シ光圖鏡檢査ニ由レバ「ヘマトボルフィン」
ハ酸性溶液ニ於テハ二個ノ吸收線、亞兒加里性溶液ニ於テハ四個ノ吸收線ヲ呈スル者ナレ
ル同氏カ尿ヨリ得タル色素ハ酸性及亞兒加里性反應ニ於テモ唯一個ノ吸收線ヲ呈セシノミ
曹達滴汁ヲ加フルニ由リ生スル狭キ二吸收線ハ二個及三個ノ「ヘマトボルフィン」線ニ同
シカラス」此色素ノ由來ニ就テハ所説未タ一定セサルカ如シ

此尿ノ反應ハ常ニ酸性ニシテ貯ヘテ年餘ニ及フヲ得ヘシ此期間ヲ經テ尿ヲ能ク被蓋セサ
ルモ尿中毫モ絲狀菌ノ發生及醱酵ノ痕跡ヲモ認ムルコトナシ」スルフォナル」尿中ニハ殆ト
蛋白ヲ證明スル能ハス

「スルフォナル」尿ヲ顯微鏡下ニ檢スルニ赤血球、白血球、脂肪球、膀胱上皮ヲ認メ或ハ上皮
圓柱或ハ腎臟ノ有形原質、硝子圓柱等ヲ發見スルコトアリ

「スルフォナル」中毒ノ症候

慢性「スルフォナル」中毒ノ療法ニ於ケル注意 久時本品ヲ服用セシメントスル患者ニハ
一二週連用後ニ數日本品ヲ休服セシムルヲ宜トス此休服時日ハフリードレンデル氏ハ三四

毒物ヲ身體
中ヨリ驅除
スル法

日ニテ十分ナリト云ヒヘルチング氏ハ十乃至十二月ヲ要スト云ヒデットリッヒ氏ハ五日乃至
七日ヲ以テ足レリト云ヘリ畢竟スルニ若シ已ニ慢性中毒ノ症狀ヲ起セシキハ寧ロ休服時日
ヲ延長スルヲ得策トス

已ニ「スルフォナル」中毒症狀完成シタルキハ素ヨリ全ク本品ヲ休止スベシ然ルキハ先
ツ諸慢性中毒ニ於ケルカ如ク毒物ヲ身體ヨリ可及的速ニ驅除スルヲ計ルベシ(一ハ腎臟、一
ハ腸管ヨリ)腎臟ヨリ驅除スルニハ多量ノ飲液、乳汁ノ多服、炭酸水ノ服用ヲ命シ腸管ヨリ
ハ下劑或ハ多量ノ灌腸ヲ處スベシ多クハ頑固ノ便秘アルカ故ニ腸管ヨリ排除ヲ計ルハ蓋シ
適切ナリ此中毒ニ於テモ速ニ毒物ヲ除去スルカ爲メニ生理的食鹽溶液ノ皮下輸注法ヲ行フ
テ可ナルベシ

心臟狀況ノ
注意及處置

速ニ毒物ヲ排除スルノ外ニ心臟ノ狀況ニ著目スルヲ要ス何トナレバ往々處脱ニ由リテ命ヲ
終ルコトアレバナリ故ニ凡テ中等症及重症ノ中毒ニハ兼テ興奮藥即チ葡萄酒、「コンニヤック」
等ヲ投シ且速ニ實麥答利斯ニ由リテ心力ヲ盛ナラシムベシ若シ虛脱ヲ起セルキハ通常ノ藥
劑即チ「ストロファンツス」丁幾、樟腦、依的兒ヲ處シデットリッヒ氏ハ上記ノ液體多服及灌腸
ノ外ニ日一二回「ジウレチン」一、〇ヲ與ヘテ良效ヲ收メ大ニ賞讃シタリ是レ「ヂウレチン」
ハ腎臟ノ分泌機能ヲ催進シ心臟機能ヲ強盛ナラシムレバナリ」血液ノ亞兒加里性ヲ亢進ス
ルカ爲メニミユル氏ハ重炭酸曹達ヲ投シ且炭酸苦土一日五、〇―八、〇ヲ兼用セシムル
ヲ賞セリ亦此目的ニ醋酸加里ヲ處スルモ可ナリ然ルキハ利尿ノ益アリ

スルフォナル

其他ハ對症療法ニシテ嘔吐ニハ氷片、氷冷シタル乳汁、胃部ノ冷罨法ヲ處シ屢、甚劇シキ腹痛ニハ少量ノ阿片ヲ投シ神識朦朧ニハ頭部ノ冷布被包、軀幹ノ冷布被包、謹慎シテ微溫浴中ノ冷水灌注ヲ行フベシ神識朦朧久時持續スルキハ「カテーテル」ヲ用ヒテ尿ヲ泄スヲ怠ル可ラス

用量

内用一、〇—二、〇ヲ散劑、錠劑トス婦人ニハ最大量一、〇ヲ投スカスト氏ハ細微ニ粉末トナセル者ヲ二百立方仙迷ノ溫湯、肉羹汁或ハ茶ニ加ヘ毎夜七八時ノ頃ニ與フルヲ最良トセリ久時服用スル際ニハ慢性中毒ヲ避クルカ爲メニ本品ヲ數日間與ヘタル後ハ常ニ三日乃至四日休服セシム可シ「鎮靜藥」トシテ〇、五ヲ一日數回與ヘ一日量二、五—三、〇トス盜汗ニハ〇、二五—〇、五「小兒」ニハ一回〇、〇五—〇、一トス(極量一回二、〇「一日四、〇」)

〇「スルフォナル」〇、二五 結麗阿曹篤

〇「スルフォナル」一、〇—二、〇

〇、二「トルト」舍利別一五〇、〇

右爲一包、與六包、毎夜一包

右毎二時一咖啡匙(痙咳)

〇「スチグマツーム、マイジス」越幾斯 *Extractum stigmaturaidis.*

「スチグマツーム、マイジス」越幾斯ハ心臟病ニ用ヒ利尿ヲ催進スルノ效アリ而シテ患者極メテ善ク耐ヘ得ル者ナリ一日ノ用量一、五—三、〇毎食ノ一時前ニ舍利別トナシ三回ニ分服セシム

〇「スチラコール」(桂皮酸「グアヤコール」ヲ見ヨ)

防腐藥

〇「スルフォオバラアルデヒツド」(固形體ニシテ催眠ノ效アリ)

〇「スクロール」(「ドユルチン」ヲ見ヨ)

〇「スルファミノール」*Sulfaminolum.*

性状 鮮黄色無臭無味ノ粉末ニシテ水ニ溶ケズ亞兒加里ニ溶ケ易ク炭酸亞兒加里ニハ溶ケ易シ酒精并ニ氷醋酸ニ投スレバ此液ハ黄色ニ變ス

作用及應用 本品ハ防腐作用アル者ニシテ喉頭結核及上顎竇化膿ニ吹入シ又創傷、足潰瘍、瘰癧ニ撒布シ膀胱炎ニ内用セシム本品ハコーペルト氏ニ由レバ無毒ナリト同時ニ硫酸増加シツ、尿ヲ經テ「ヲキシジフェニールアミン」トナリテ排泄セラレ

用量 外用ニハ原品ヲ用ユ内用ニハ〇、二五ヲ一日三四回散劑トス

〇「スルファミノール、ライカリブトール」(「ライカリブトール」ニ八%ノ「スルファミノール」ヲ溶解シタル者ニシテ喉頭結核ニ塗布セシム)

〇「スルファニール」*Sulfamizure.* 「スラアミドマンツ

性状及應用

本品ハ菱形板狀ノ結晶ニシテ分子ノ結晶水ヲ含ミ冷水ニハ溶ケ難ク熱湯ニハ溶ケ易シ本品ハエールリツヒ氏カ急性沃度中毒ニ投シソーレンチン氏ガ急性鼻及喉頭加答兒ニ應用セル所ナリ五、〇—七、〇ヲ投スルモ身體ニ有害ノ作用ヲ呈セス四、〇—五、〇ハ著シキ解熱作用ナキカ故ニエールリツヒ氏ハ急性沃度中毒ノ發起後可及的速ニ本品四、五—六、〇炭酸曹達三、〇—四、〇ヲ加ヘ水一五〇、〇ニ溶シタルモノヲ服セシメタリ此

スチグマツーム、マイジス越幾斯 スルファミノール スルファニール酸
スルフトロトルツ

症ノ半数ハ用後一二時ニノ症状既ニ消散セリ

近時ワールンチン氏ハ本品ヲ急性鼻加答兒及喉頭加答兒ニ用ヒシニ其服用後二乃至四時ニシテ鼻甲介ノ腫脹、聲帯ノ潮紅、中耳ノ疼痛消散シタレモ全治スルニ至ラザリキ此作用ハ長ク持續セサルカ故ニ二十四時乃至四十八時ヲ經レバ再ビ同量ヲ反覆セサル可ラス然ラザレハ加答兒再ビ増進スレバナリ同氏ハ最大量八、〇ヲ一日ニ投セシモ全ク中毒ヲ發セザリシ四乃至六週間毎日一、〇―二、〇ヲ用ユルモ消化及他ノ官能ヲ害セサレモ唯時トノハ輕キ下痢ヲ發スルヲアルノミ

急性沃度中毒ニ於ケル用量ハ前記ノ如シ急性感冒ニハ一回量二、〇―一日量四、〇ナリ

○「スルファニール」酸一〇、〇 重曹八、五

水二〇〇、〇

五水二〇〇、〇

右ノ溶液四〇、〇―八〇、〇ヲ一日一回又ハ二回服用(急性鼻及喉頭加答兒)

右一回ニ服用セシメ又ハ毎二時一食匙(急性沃度中毒)

○「スルフソートジナル」 Sulfosol-sip.

本品(其百五十瓦中ニハ結麗阿曹篤硫酸加里一五、〇若クハ純結麗阿曹篤一〇、〇ヲ含ム)ハ全ク無臭、ニノ帶苦甘味アリ無害ノ液ニノ結麗阿曹篤ニ代用シ其價廉ナルヲ以テ貧民社會ノ肺癆ニ一日三四回一茶匙宛、小兒ニハ一日二回一茶匙ヲ單用或ハ水、乳汁ニ加用ス

改訂 新藥纂論 畢

新藥價額表

(藥品ノ價額ハ時々多少變動アルハ勿論ナレモ概略左記ノ如シ價額中ノ「、」ハ圓位ナリ此價額ハ主トシテ東京日本橋區本町四丁目島久商店ノ調査ニ由ル)

藥名	量目	價額	藥名	量目	價額
イトロール	弓	一、八五	ヘモグロビン	弓	一、五〇
イヒトアルビン	同	二、八〇	ヘマトーゲン	弓	二、四五
イヒチチール	同	〇、四四	ヘルミトール	同	一、四五
イヒタルガン	十五	二、四〇	純ヘロトリン	同	二、五〇
ロソフアン	十五	二、七五	含鐵ヘロチリン	同	二、五〇
ロレチン	弓	二、二〇	臭素ヘロチリン	同	二、五〇
バハイン	同	二、七五	ヘリチトロピン	同	三、五〇
パンクレアチン	同	二、四五	ヘルウコンニヤク	一リートル	四、五〇
パラフォルム	同	〇、八五	パレチリン	一瓦	二、四〇
パラアルデヒッド	同	一、二五	ホロカイン(鹽酸鹽)	弓	二、五〇
パラコトイン	同	〇、六〇	ホムアトロピン(鹽酸鹽)	瓦	六、五〇
抱水アミールン	同	二、〇〇	ドユルチン	十五	一、五〇
ヘロイン	二弓	三、二〇	ドユレチン	弓	二、四〇
ペロニン	一瓦	一、五〇	ドユゴイジン、	瓦	一、八五
ヘモール	弓	二、八〇	トリチナール	弓	二、八五

新藥價額表

トリザール	弓	三、四〇	ワゾーゲン	百瓦	三、八〇
トロバコカイン(鹽酸鹽)	瓦	三、五〇	沃度ワゾーゲン	弓	二、〇〇
トロポン	百瓦	一、八〇	イヒチチールワゾーゲン	弓	一、八五
ナトロフエン	弓	二、七〇	ワゾール	弓	三、九〇
チチコール	二十五瓦	四、一〇	ワニルリン	弓	〇、六五
チチール(四十%)	弓	一、二五	カツフエイン	弓	一、三〇
チチフオルム	弓	二、四〇	カイリン	同	二、〇〇
チチフエン	十五瓦	二、九〇	ガルラノール	同	二、五〇
チレチイジン錠	百個	一、五〇	ガロプロモール	同	〇、八五
チレチイジン	弓	二、五〇	カルニフエリン	同	三、五〇
チロヨジン	弓	七、五〇	カンナピン	十五瓦	二、八五
チギタリン	弓	二、〇〇	單寧酸カンナピン	弓	一、二五
チモタール	弓	二、〇〇	ガロアラルピン	弓	二、四〇
チチシナミン	弓	一、六〇	カプトール	二十五瓦	三、〇〇
チゲノール	百瓦	二、〇〇	ガラクトフェノン	弓	一、七〇
リゾール	一、千瓦	一、三〇	沃度チチプロミン	二十五瓦	二、八〇
リハニン	百瓦	一、八〇	ヨドール	弓	二、七〇
リセトール	十五瓦	三、八〇	沃度フエミン	十五瓦	一、八〇
ヌトローゼ	四弓	二、八〇	沃度必林	弓	二、五〇

ヨドチリン	弓	七、五〇	ソツチヨドール水銀	弓	四、八〇
ヨドホルモロゲン	同	二、四〇	ソツチヨドール加里	同	四、五〇
ヨシピン	百瓦	四、〇〇	ソツチヨドール曹達	同	四、五〇
沃度酸	弓	二、七〇	ツメノール	弓	一、八〇
タカジアスターゼ	弓	一、八五	ツツソール	同	三、八〇
タンナアルピン	同	〇、四五	ツベルクリン	二瓦	九、五〇
タンニーゲン	同	二、〇〇	ナフタラン	比	三、〇〇
タンノフォルム	同	一、八〇	ナフタリン	同	〇、二九
タンノン	二十五瓦	二、八〇	ナフトール	弓	〇、二二
タンノピン	同	二、二〇	ラクトフェニン	同	二、四〇
炭酸ゲアキコール	弓	〇、五〇	ラルギン	十五瓦	二、〇〇
レゾルピン	同	〇、八五	ラノリン	同	二、四五
レソルチノール	同	二、四〇	ウレタン	弓	一、八〇
レゾルチン	同	〇、三五	ウレア	同	〇、八五
ソマトーゼ	百瓦	二、八〇	ウロトロピン	弓	三、二〇
鐵ソマトーゼ	同	三、〇〇	ウロフエリン	同	三、八五
ソムナール	弓	一、八〇	ウリチエジン	同	二、四〇
ソラニン	瓦	二、五〇	ノゾフエン	十五瓦	二、五〇
ソツチヨドール	弓	四、二五	チイカイン(B)	弓	二、五〇

ナイカイン(A)	弓	二、五〇	クレチソール	弓	二、五〇
ナイロフエン	弓	四、八〇	クロラールアミツド	同	三、八〇
ナイキニン	十五瓦	二、四五	クレチリン	弓	〇、四七
ナイカジン	弓	一、五〇	アアチエン	弓	六、八〇
ナイフオリン	同	三、四〇	クレサミン	同	二、三〇
ナイゲノール	同	一、八〇	マラキン	同	三、二〇
ナイドキシ	同	二、〇〇	マルチン	同	三、〇〇
ナイフタルミン	瓦	二、〇〇	クレチソート	同	〇、四〇
ナイナトロール	弓	二、五〇	炭酸クレチソート	同	一、八〇
ナレキシ	同	六、二〇	油酸クレチソート	同	一、七五
單寧酸ナレキシ	同	五、五〇	磷酸クレチソート	同	〇、四〇
鹽酸ナレキシ	同	五、八五	桂皮酸	同	三、四〇
ナルトフォルム	同	三、五〇	フェナチエチン	同	〇、三〇
クロラローセ	同	三、八〇	プロムフォルム	同	一、五〇
グルトール	同	三、七五	フェノコルム(鹽酸鹽)	同	三、二〇
クレイテ氏溶解性銀	十五瓦	四、五〇	プロマイン	同	二、五〇
クレザロール(メタ)	弓	二、七〇	フェルロセリン	同	三、五〇
クレザロール(ナルト)	同	一、八〇	フェルロスチアチン	同	二、八〇
クレザロール(バラ)	同	一、七〇	フロレスチン	弓	二、五〇

フォルムアルデヒッド(四十%)	同	二、五〇	エウピリン(タイピリン)	十五瓦	一、四〇
フォルマリ	同	一、〇〇	アルマトール	弓	〇、三二
フアナジン酸	瓦	〇、八五	タイン(茶葉)	同	〇、九五
プロームエチール	二十五瓦	〇、八五	チチアロミン	十五瓦	一、八五
プロタアルゴール	弓	三、四〇	テルモジン	弓	二、八五
アエニールヒドラーチン	同	二、四〇	テルピネチール	同	〇、八五
鹽酸アエニールヒドラーチン	同	二、〇〇	アコイン	瓦	一、〇〇
フロリドゲン	十五瓦	一、八〇	アルムノール	十五瓦	一、五〇
プチアリン	弓	三、五〇	安知必林	弓	〇、二九
フロロケルチン	弓	一、〇〇	安知歌親林	廿	〇、九〇
古加乙混(純粹)	瓦	二、〇〇	アイロール	弓	一、二〇
鹽酸古加乙混	弓	八、〇〇	アクトール	同	二、二五
石炭酸古加乙混	瓦	二、四〇	アガリチン	瓦	〇、二八
エフエドリン	同	三、〇〇	アガチン	十五瓦	三、八〇
エキサルギン	弓	一、八〇	アルゴニン	同	一、四五
エビテルミン	四十五瓦	二、八〇	アネステジン	弓	二、〇〇
エメチン	瓦	二、五〇	アルバルギン	同	二、五〇
エラチリン	弓	一、二五	アルゲンタミン	同	一、八〇
エムルジン	十五瓦	三、二〇	アルプミン	同	〇、六〇

アコイン	五	二、五〇	アルブチン	弓	一、二五
アルザール	弓	〇、八〇	アスピラギン	同	二、五〇
アルゲンタミン	同	一、八〇	アセプトール	同	二、八五
アリストール	十五	四、五〇	サリピリン	弓	二、〇〇
アミロフォルム	弓	一、八五	サンガイナール	同	〇、七五
アボリジン	同	二、七五	サツカリン	弓	一、二〇
アルゲノール	同	三、八〇	サラチエトール	同	〇、四八
アスパラギン酸	十五	二、八五	サリシン	同	二、八〇
アコニチン	弓	一、二五	撒里矢爾酸水銀	同	二、四〇
アロイン	同	二、〇〇	サノフォルム	弓	四、六〇
アミグドフェニン	同	四、五〇	サナトールゲン	十五	三、五〇
アンチセプシン	同	一、八〇	サノーゼ	同	二、二〇
アンチネルウイン	同	一、八〇	ザロフェン	弓	一、五〇
アンチスパスミン	十五	一、二五	ザロール	同	〇、二四
アンチノシン	同	二、八〇	ザロコール	同	三、二〇
アナルゲン	同	一、八〇	サフロール	同	〇、八五
アニリピリン	同	二、八〇	キセロフォルム	同	一、二〇
アントラロピン	同	一、七〇	キシロール	同	一、五〇
アルソール	同	〇、五〇			

キニチイジ	弓	〇、七五	ビロジン	弓	二、八〇
メチーレン青(薬用)	同	二、五〇	スピルテイン	同	三、八〇
メナラール	同	一、七〇	スベルミン	同	〇、六五
ミグレニン	同	一、八五	スチプチチン	同	二、五〇
ミルトール	同	二、四〇	スルフオナール	同	一、五〇
シチニン	同	一、七五	ストロファアツス丁酸	弓	〇、四八
シアフタリン	十五	一、二五	スルフアニール酸	同	〇、三八
シアフトール	弓	二、四〇	スルフアミノール	同	一、五〇
シ沃度仿誤	十五	二、二〇			一、八〇
ヒヨスチン	同	六、五〇			
鹽酸ヒヨスチン	同	六、五〇			
プロム酸ヒヨスチン	同	六、八〇			
沃度酸ヒヨスチン	同	七、〇〇			
ヒヨスチアミン	同	三、八〇			
鹽酸ヒヨスチアミン	同	同			
ビロジン	弓	一、七〇			
ヒドラスチン	弓	〇、五〇			
ピタロトキシシ	十五	一、四〇			
ピハラザン	十五	二、五〇			

發 兌 書 林

東京市日本橋區通三丁目 丸善書店
 同 本郷區湯島切通坂町 丸善書店
 同 本郷區南江堂書店
 同 本郷區春木町二丁目 丸善書店
 同 本郷區半田屋書店
 同 本郷區吐鳳閣書店
 同 本郷區湯島切通坂町 丸善書店
 同 本郷區春木町三丁目 丸善書店
 同 本郷區積運堂
 大阪市心齋橋筋一丁目 丸善書店
 大阪市東區博愛町 丸善書店
 京都市寺町通二條下 丸善書店
 名古屋市本町一丁目 丸善書店
 福岡市博多中島町 丸善書店
 岡山 積善館支店
 岡山市邊中 丸善書店
 長崎市引地町 丸善書店
 安中市集榮堂

改訂 第六版 增補

改訂 須氏內科學

獨逸ストリウムベル先生著 ● 飯高芳康及原田八十八氏共譯

全十冊 各冊正價金七拾錢 ● 郵稅凡金八錢 ● 各冊凡二百五十頁 ● 挿圖全數百八十餘個 ● 石版色圖入

須氏內科學カ改版ヲ重ヌルニ從ヒ益々非常ノ喝采ヲ博シタルハ世ノ普ク知ル所ニ前數版ノ如キ
 ハ未タ完備セザルニ早クハ本年出版ノ新原書第十三版ヲ以テ其如何ニ好評ヲ得タルヤ知ルニ足
 ラン今同發行ノ本書第六版ハ本年出版ノ新原書第十三版ヲ以テ其如何ニ好評ヲ得タルヤ知ルニ足
 采ヲ博シシ書ナルハ英佛伊西露土各國其譯本アルヲ以テテ明ナリ此最新原書第十三版ハ每
 章始ト改竄ヲ經サルハ遠ナク殊ニ神經病編等ハ増補シタル處極メテ多ク前版ニ比シテ増補訂正
 ヲ異ニセリ著者ガ深遠ナル學識ヲ以テ學理ニ基キ剖檢シテ法トシテ更ニ臨牀的症狀ニ照シテ以テ
 ヲ施シ書中各處ニ幾多ノ新見ト斬新有益ナル論說ヲ候過豫後遺所ナク大ニ前版ノ增補訂正
 ヲ革新セリ待中記スル所ノ各病ノ原因剖檢シテ法トシテ更ニ臨牀的症狀ニ照シテ以テ増補訂正
 レサルハ言ヲ待中記スル所ノ各病ノ原因剖檢シテ法トシテ更ニ臨牀的症狀ニ照シテ以テ増補訂正
 ニ失セズ中庸ヲ具ヘ且各冊條下ニハ精圖ヲ挿ミ其事項ヲ明シテ實地家及學生ノ實驗講習ノ一
 知ル可シ譯義ノ正確ト行文ノ流暢ト期シ更ニ上ノ點ヲ變シテ以テ一讀ニ其理ヲ解シ得
 テルニ便ス則チ改訂補綴ノ廣クテ美類ニ非ラズ若シ此稟告ノ誣妄ナラサルヲ以テ他ヲ欲セハ
 誇唱ニ一冊ヲ編テ一讀セヨ以テ全約ノ眞價ヲ判スルニ足ラン請フ陸續愛願アレ

改訂 補增 第二十五版

氏診斷學一千八百八十九年第三版全譯
ハ氏カ一世ニ雄飛スル才學ヲ以テ病候症狀ノ由ヲ發シテ
診査檢法ノ由ヲ施ス所皆之ヲ理化學ノ原則ニ基ツキ嚴密
ノ新理ニ徹シ且テ數百個ノ實験ヲ加ヘ該博積用周知
未タ餘蘊ナキハ世ノ既ニ知セラルル所ニシテ更ニ要
故ニ同氏ノ書ノ未タ論及セサル所ニシテ其ニ補テ之
學ノ全豹ヲ觀ルニ足ルナリ現時同氏ノ全書ト共ニ大鳴
博セシ前代無比ノ診斷書ナリ江蘇諸産幸ニ陸續購讀
濟生學會會長 長谷川泰先生 序
醫學博士 橋本左武郎先生譯
同舍 田代義徳先生 校閱 第三版
同舍 大石榮三先生 纂著

訂改 外科類症鑑別

全壹册

菊判美裝本綴●綴紙數五百餘頁●圖畫總數九拾二個挿
入●正價壹圓八拾錢郵稅六錢
學ニ在テハ外科トシテ此學科ノ主ナル技術ニ故ニ外科手術
ノ精巧ハ多クノ書ニ先テ學識深遠ヲ要ス故ニ深遠ナル治法
ヲ發スル所加ニ此學科ノ船艦タル羅針盤ナル鑑別ニ至
テハ今此必要ノ下ニ成レル本書ハ如何之レ其名ノ示ス如ク體
ニ別チ甲乙ニテ一般症候診斷及鑑別乙ニテ於テ固有徵候及各
種ノ鑑別ヲ網羅シ且ツ反覆細説シ尙ホ密圖ヲ以テ其足ラザ
ルカハ請フ一讀ノ上ニ
醫學博士 橋本左武郎先生譯
醫學博士 橋本左武郎先生譯

產婆 試驗問題解答案

全壹册
正價金二拾五錢
郵稅金二錢

通眼科書ハ多クハ其ノ著作者ノ意ニ適スル所ノ療法ノミヲ提
ケ未タ曾テ眼科治療法ノ全般ノ照燈スルモノアルナシ原著者
之ヲ愛ヒ乃チ本書アル所以ニシテ塊塊諸大家ノ說ハ勿論佛英伊
蘭魯等ニ行ハルレ療法ニ至ル迄悉ク網羅シ其異同ヲ辨シ又實
験的ニ其利害得失ヲ懸述シ且ツ病名ノ異同原因診斷療法
要項ヲ摘記シ二百數十ノ處方ヲ載セリ今般印刷成リ發賣ス眼
科醫ハ勿論開業醫家諸君受讀アレ

理氏關節結核治療論

全壹册
正價金貳拾五錢
郵稅金四錢

外科療法ニ於テ關節結核ニ對スル處置ノ最モ困難ナルハ人
皆知ル所ナリ此書ハ和辻博士ガ「リキール」ノ關節結核療
法ヲ譯述セシモノニシテ本症治法ノ秘訣ヲ懇説詳論セリ故ニ實
地家之ヲ繕カハ其補益ハ蓋シ少ナラザルベシ

農科大學教授醫學士野島仙之介先生講述
農科大學獸醫科卒業生宇野家治先生筆記

訂改 畜內科醫學

全二册

脊クローリス本綴金字入美本上卷●正價壹圓八拾錢●郵
料貳拾錢●下卷印刷中
今ヤ畜産ノ本業大ニ勃興シ獸醫學ノ必要愈々切也此秋ニ當リ
未タ曾テ完全ナル畜內科醫學ノ著アルヲ聞カサルハ豈獸醫學
界ノ一大憾事ナラスヤ本書ハ最ニ泰西諸國ヲ巡遊シテ病理學
基奧ヲ極メラタル醫學博士野島仙之介先生ノ實験トニ
基ツキ農科大學ニ於テ講述セラレタル畜內科醫學ヲ野島氏カ
在學中瀾レナク筆記シ教授ノ細密ナル訂正ヲ乞フテ成リタル
モノニシテ全身病局處病ノ二類ニ大別シテ傳染病血液病
並消化器呼吸器泌尿器生殖器神經系運動器疾病及皮膚病
等ニ細別シ而シテ各病ノ原因剖檢症候鑑別法療法及詳論
其所說ハ新正確ニシテ行文ハ流麗簡潔ナリ眞ニ斯學ノ缺乏
醫スヘキ新良著ト謂フヘシ

醫學士 橋本左武郎先生譯

へノッホ氏小兒病學

全六册
菊判○各册
正價金十六錢
郵稅六錢宛

獨逸國柏林大學小兒科教授兼帝國しありて一病院小兒科臨牀
講堂教授獨逸醫學博士ハッホ氏カ著タルハ泰西諸名家ノ皆識認セル
過キテ尙嬰小兒科ノ牛耳ヲ執ルハ泰西諸名家ノ皆識認セル
所ニシテ業ニ已ニ世ニ出テタル最新ノ名說枚舉ノ遠アラズ就中
其所著小兒病學ニ至テハ實ニ同氏獨擅精神ノ傾注セルモノ所
論常ニ基礎ヲ氏カ五十年餘年ノ實験ニ取リ其各病ヲ詳述スル
ヤ他ノ小兒科書并ニ普通内外科書ノ如ク餘多ク病候療法等
安リニ列スルハ些事ト雖モ説述セシテ新説卓見顯ミテ出テ
後ニアラサレバ多クハ實例ヲ以テシテ人ヲ引クニシテ出テ
千ノ實験ヲ述ケタルハ感アラシム宜ナリ僅ニ數十年ヲ超エテ
フルヤ思フニハッホ氏ノ名聲ハ亦夙ニ我國ニ電馳シ杏林社
會同氏ノ名著アルヲ知ラサルモノナシ而シテ未タ電馳シ杏林社
キハ豈一大缺點ニアラザランヤ是ヲ以テ數店並ニ廣瀬氏ニ
乞ヒ其一千八百九十三年秋柏林出版ノ第八版ヲ譯述シ之ヲ上
梓レテ世ニ公ニセリ然ルニ悲キ哉先生其書ハ二卷ニシテ上
セラレタルハ於テ於テカ小田橋橋本先生ニ請ヒ其卷之三ヨリ
シテ時恰モ原書第八版出版ノ時ニ先生快ク之ヲ譯述シ之ヲ上
譯文ノ暢流譯義ノ正否ニ至テハ江蘇諸産ノ清判ヲ待ツノミ
獨逸「オーレマン」氏著諸角芳三郎先生譯

眼科治療學

全二册

用紙舶來上質●堅七寸五分橫五寸一分●印刷鮮明●上
九拾錢●郵稅金十錢
本書ハ千八百九十六年即チ昨午出版ノ獨逸國「オーレマン」氏著
眼科治療學全譯セル者ナリ蓋シ眼科學ノ長足進步ト共ニ其
治療法ニ於テ卓拔ノ新實験亦甚少ナカラズ然ルニ今日ノ普

備氏病理總論

全三册

獨逸「レヒ、ヒル」シユ「レド」氏著 廣瀬桂次郎氏譯
堅七寸一分●橫五寸●用紙●上質印刷鮮明●上欄
金壹圓八拾錢●郵稅拾八錢
本書ハ獨逸萊佛大學病理學及病理解剖學正教授「レヒ、ヒル」
シユ「レド」氏著千八百九十二年出版ノ病理總論全譯セ
シモノニシテ同氏カ歐洲ニ於テ卓然一大名家ナシ其學ノ深遠其
識ノ該博現今世人ノ信奉スル所ナルハ更ニ刻舌ヲ須キス本
ノ如キ亦同氏才學ノ咳唾ニ出テ學生ニハ病理學ノ心腹方計ヲ
開發シ醫學ニハ最近病理學ノ新習識ヲ與ルチ目的トシ初ニ病理
學說述シ其原因ヲ論シテ病變之變化ニ及ヒ然レ後疾病發生論
大抵氏カ實験卓説ニ出テテモ新新ノ學說ニ基カサルハナク特
ニ歐論論疾論ノ如キ覽者ナシテ一讀卷ヲ隔ク能ハサラシム
實ニ方今汗充ノ書籍中卓然新機軸ヲ出セル病理書ナリ江蘇諸
産幸ニ陸續御愛讀アレ

增補正第二版

飯高芳康纂譯

訂耳科攬要

全壹册

挿圖新加四十五個●綴紙數凡三百五十頁紙質精堅●
印刷鮮明●精圖●六十五個挿入●實價金五十五錢●
體裁完備●郵稅八錢
挿圖新加四十五個●綴紙數凡三百五十頁紙質精堅●
印刷鮮明●精圖●六十五個挿入●實價金五十五錢●
體裁完備●郵稅八錢
氏第一版●科專門家中ノ「泰斗」ポリツ「エル」
ノ新著ニ由リ數多緊要ナル條章ヲ增補改訂シ新ニ耳鏡的
變狀圖數十個ヲ加ヘ大ニ前版ノ面目ヲ一新セリ抑モ耳科
ノ學タルヤ我邦ノ醫家中近時眼科ニ比シレハ大ニ輕忽ニ看過
スルノ觀ナキ能ハス何ソ蘭ラン耳ハ最貴重ナル臟體ニ近接セ

カカ故ニ好テ病勢ノ優劣ヲ後リ加フルニ其病勢ハ劇迅ナラス
シテ却テ隱微緩慢ナル者多ク且ツ深ク骨實中ニ存セルヲ以テ
知ラス識ラス輕忽ニ流レ易シ其極 病微顯發シ初メテ著意スル

ノ頃ハ已ニ危篤ニ陥リ亦救治ス可ラサルノ悔アラシキ事ニ實ニ世
人ノ耳病ヲ等閑ニ附セルノ致ス所ト謂ハサル可ラサルナリ茲
ニ之ヲ謹告シ希クハ醫家ノ爲ク注意アラシムコトヲ

島郵信司先生譯補

新撰種痘全書

全一冊 正價金四拾錢 郵料金六錢
 一行三十六字 總紙數凡百九十頁
 豎七寸四分 橫四寸九分 〇一頁十四行

種痘法ノ人生ニ貴重ナルハ今茲ニ多辯ヲ俟タス然ルニ世人多クハ之ヲ輕視シテ一小技術ニ過キス
トナシ之カ學理ヲ研究セントスルモノ甚タ寥寥ナリ隨テ種痘ニ關スル書籍ニ乏シキハ醫學日進ノ
今日ニ於テ斯道ノ大缺點ニシテ識者ノ洪敷スル所ナリ島郵信司先生之ヲ憾ム久シ此頃獨逸ノグライ
スワルド博士大學教授醫學博士「バイエル」氏著種痘法其實施ト題スル新刊第二版ヲ獲テ之ヲ譯シ且
ツ譯者カ多年種痘ニ關スル内外史籍ヨリ蒐集セル材料ヲ以テ増補シタルモノナリ其大略ハ●痘種
歷史●痘種病原●種痘ノ人痘法●獸痘●種痘法并再種痘法●痘種ノ種類●痘種ノ採收及貯藏
●種痘事務●種痘ノ手術(刺種及切種)●種痘經過●接種病理解其他種痘ニ關スル現行規則手續
等盡ク網羅シテ漏スナシ江湖諸彦陸續愛讀アラシムコトヲ

原田八十八先生譯

醫用電氣學綱要

全一冊 總クロース仕立 〇金字入頗美裝 〇橫五
 寸二分 縱七寸六分 〇用紙船來上質 〇紙
 數二百五十頁 〇密畫八十餘個 〇紙
 正價金壹圓 郵料十二錢

電氣ノ察病ニ治療ニ必須缺クヘカラサルハ喋々ヲ要セス然レモ之ヲ應用スルニ自ラ其法アリ若シ
其法ニ通セシテ漫リニ之ヲ用キルハ雷ニ所期ノ效ナキノミナラス反テ奇禍ヲ速クノ虞ナシトセ
ス豈ニ察セサル可シヤ本書ハ獨逸國學士「ウヰンツ」氏著醫用電氣學法ヲ譯述シタル者ニ
シテ開卷先ツ電氣學ノ梗概ヲ叙シテ電氣診法ヲ説キ而シテ終リニ電氣療法ヲ揭ク蓋シ原著者
ノ主旨ハ專ラ實地家ニ電氣ノ用法ヲ教示スルニ在リ故ニ書中説ク所深ク理學ニ互ラスト雖モ其電
氣診斷及治療ノ方法ヲ述フルハ頗ル周到明徹殊ニ幾多ノ圖畫ヲ挿入シテ行文ノ意義ヲ明ニセルヲ

以テ一讀能ク電氣診療法ノ神髓ニ通スルヲ得ヘキ最新良書ナリ

醫學士 高洲謙一郎先生纂譯

藥劑療法汎論

全一冊 用紙船來上質 〇紙數二百餘頁
 正價 金五拾錢
 郵料 金六錢

本書ハ有名ナル「ペンツォルト」氏「スチンチング」氏内科病療法各論(千八百九十五年版)ヨリ其
一小部ノ藥劑療法總論ノミヲ抄譯シタルモノニシテ書中概目左ノ如シ
 一腸胃病藥劑療法總論(ペンツォルト氏著) 一膽汁分泌促進藥(ライヒテンステルン氏著) 一腸胃寄
 生蟲驅除療法(ライヒテンステルン氏著) 一腎臟病藥劑療法(ロイベ氏著) 一氣管枝病ノ藥劑療法
 (ジュルゲンゼン氏著) 一血行機障害藥劑療法總論(パウエル氏著) 一血液病藥劑療法(リツテン氏
 著) 一神經病藥劑療法及誘導法總論(スチンチング氏著) 一皮膚病療法ニ用キラル、藥劑(カボジ
 氏著)

遠山椿 吉先生纂譯
 植村碩三郎先生纂譯

新撰黴菌學總論

全一冊 總色クロース本綴美本金字入
 正價 金八拾錢
 郵料 金八錢

吾人ハ如何ナル形態ヲ斥シテ黴菌ト謂フカ、黴菌ハ如何ノ合成ヲナスカ、彼ハ如何ニシテ存立ス
ルカ、彼ハ如何ニシテ後裔ヲ遺スカ、彼ハ如何ナル動機ヲ營ムカ、彼ハ如何ニシテ傳染病ヲ發セシ
ムルカ、以上ノ數項ヲ詳解セル眞正ノ黴菌學中此本義ニ適スル總論ヲ有スルモノ幾何カアル、本書ハ
實ニ以上ノ數項ヲ詳解セル眞正ノ黴菌學總論ニシテ學理最新議論詳密斯學ノ汎識ヲ得ルニ於テ現
今多ク其比ヲ見ス而シテ黴菌ノ顯微鏡的檢査、培養及動物試驗等ノ方法技術ノ如キハ附録トシテ
末尾ニ附セリ學者幸ニ一讀シテ其眞正ヲ知ラレヨ

獨逸國萊府大學教授「ドクトル」デライン氏原著
東京櫻井病院副院長「ドクトル」新井古芳氏補譯

產科手術學

本書ハ獨逸萊府大學產科婦人科教授「ドクトル」デライン氏ノ新案ナル原著ヲ多年同國ニ留學シテ道ニ堪能シテ名アル新井「ドクトル」ガ其豐富ノ實驗ニ基キ補譯セラレタルモノニシテ文章ハ簡潔ニシテ記憶シ易ク圖畫ハ眞妙ニシテ理解シ易ク殊ニ一百ノ最新圖式ヲ挿入シアレバ一目產科手術ノ實相ヲ知悉スルヲ得ヘキ良書ナリ

櫻井產科婦人科病院院長醫學士 櫻井郁次郎先生校閱
副院長ドクトル 新井古芳先生譯述

產科婦人科全書

本書ハ維納府大學產科婦人科教授「ドクトル」デライン氏著第二版ヲ全譯シタルモノナリ抑モ婦人科學ト產科學トハ其關係極メテ親密ニシテ兩者各特立スル能ハズ然ルニ從來ハ強ヒテ之ヲ分離シタルカタクメ往々學者ヲシテ感ハシムル弊ヲ免レサリキ著者ノ本書ヲ編述シタルハ實ニ此弊ヲ一掃センカタクメニシテ蓋シテ斯學界ニ於ケル一新機軸ト謂フヘシ而シテ其體裁ノ如何ニ就テハ深キト事週報記者ノ評語アリ以テ其一斑ヲ微スルニ足ルヘシ曰ク「所論簡潔明晰ニシテ而モ含蓄深キト事週報記者トシテ通覽ニ便ナルト書中述フル所ハ空論臆說ニアラスシテ盡ク著者ノ豐富ナル精巧ニシテ眞ニ基ケルトハ本書ノ特色ナリ（中略）殊ニ書中挿入シタル幾多ノ圖畫ニ至リテハ皆極メテ精巧ニシテ眞ニ基ケルトル者ヲシテ恰モ實物ニ接スルノ感アラシム云々」譯者ノ曾テ歐洲ニ留學スルヤ著者ニ親炙スルコト多年書中記述スル事項ハ實ニ其間譯者カ親シク耳聞目睹シタル所ナリ其翻譯ノ正確ニシテ能著者ノ意思ヲ紙上ニ躍如タラシムヘキハ敢テ贅セズ

全六冊
各冊正價金壹圓拾錢
郵料拾錢

片假名試視力表

從來四五ノ試視力表アリト雖モ記號或ハ歐字表ノミニ我邦一般ノ開明ノ度ニ適スルモノナク弊店之ヲ憂ヒ先年青木氏ノ平假名表ヲ發行シ大ニ好評ヲ博シタリ今回發行セリ蓋シテ片假名表アリ線角圓形ニシテ斜線多ク視角ノ正確ヲ保チ難シク又文字ヲ解セサル人ニ適スル所謂萬國試視力表即チ形狀尤モ視力表ニ適シ歐字ニ優ルコト數等ナリ又文字ヲ解セサル人ニ適スル所謂萬國試視力表即チ武氏點表ヲ加ヘ表解ニハ片假名試視力表及ヒ書式ヲ以テ視力ヲ試驗スル法ニ武氏萬國試視力表即チ武氏點表ヲ加ヘ表解ニハ片假名試視力表及ヒ書式ヲ以テ視力ヲ試驗スル法ニ武氏萬國試視力表即チ近點遠點及ヒ調節力ノ關係ノ老視眼鏡表及ヒ書式ヲ以テ視力ヲ試驗スル法ニ武氏萬國試視力表即チ詳説シ且説明ヲ補フニ三箇ノ圖ヲ以テスル等惡篤周密普通眼科書ニ掲記セサルモノ極メテ多シ眼科醫ハ勿論一般開業醫ト雖モ軍人學生ノ體格檢査ニ必要缺クヘカラサル出色ノ良表ナリ

青木純造編○舶來上等厚紙○附錄一冊添
○精圖十三箇挿入○石版印刷極メテ鮮明
正價金二十五錢○郵稅金二錢

最新增補第一二版廣告

獨逸「クレンベル」氏者 飯高芳康譯
簡短ニシテ要領ヲ得タル診斷書ハ本書ニ如ク者ナシ

訂改臨床診斷學

本綴美裝金字入●正價金壹圓
拾錢●紙數四百五十頁●插圖
六十四個●郵料金拾貳錢

本書ハ本年發行第八版「クレンベル」氏診斷書ヲ譯セル者ニシテ此書ハ獨逸ニ於テ學生ノ講習ト實地醫家ノ參考トニ適スル小診斷學トシテ大ニ好評アル者ニシテ僅々數年ノ間ニ第八版ヲ重ネシヲ以テ其如何ニ價値アルヤヲ推知スベシ實ニ本書ハ實地診斷上緊要ノ事項ハ集録シテ毫モ漏サズ加フルニ數十ノ插圖ヲ以テ其說明ヲ補ヘリ其目次●診察ノ順序●既往症及現在症●急性傳染病●神經系病●消化器病●胃病●腸管腹膜炎●肝病●呼吸器病●打診●聽診●喉頭病●循環器●泌尿系病●尿管病●腎臟病●新陳代謝機病●血液病ノ診察●「ロエン」氏光線●動物及植物●檢脈法●檢尿法●腎臟病●新陳代謝機病●血液病ノ診察●「ロエン」氏光線●動物及植物

寄生(微菌検査法)ヲ論ジ且各診査法ノ終ニハ各系統ノ緊要疾病ノ症候ヲ掲ケテ其解斷ヲ誘導補助セリ實ニ現時ノ診斷書中、一種ノ新機軸ヲ具ヘ實地家ノ治療上、醫學生ノ講習上缺ク可ラサル簡潔明瞭ニ一讀此學ノ綱領ヲ得ベキ緊要ノ書ナリ今日醫學日進ノ風潮ニ乘ジ斬新適切ノ治療ヲ施シ益吾學ノ進歩ニ伴ハントスル諸氏ハ請フ一本ヲ座右ニ備ヘラレンコトヲ

斯氏試視力表

舶來上等厚紙 ○附錄一冊添
○正價金貳拾錢 ○郵稅金貳錢 ○石版摺鮮明

從來一二ノ視力試驗表アリト雖ニ象形記號或ハA B等ノ歐字ヲ用ヒ未タ嘗テ本邦一般ノ人民開明ノ度ニ適當スル者アルヲ見ス故ニ本邦字及記號、亂視放線狀試驗表ヲ連合編纂ノ石版印刷トナシ廣ク同好諸君ニ頒タントス該表ニハ視力檢査法及試驗表ヲ連合編纂ノ石版印刷ト法、亂視ニ要スル眼鏡ノ種類數十種ノ詳解、並ニ書式新式眼鏡ノ差異及度數改算法等普通眼科書ニ掲記セザルモノヲ附録トシ眼科醫、普通病院開業醫家ハ勿論軍人及學生ノ體格檢査ニ必要缺ク可ラザル他ニ比類ナキ良表ナリ諸君請フ御一閱アラント見本中：ハ本表言(60)ニハ或ハ半(30)トアルヲ略記セル者ナリ

增補 第三版發行

獨逸「ボアース」氏原著 飯高芳康譯述

增補 胃病診療新論

精緻木版圖三十三個入 ●美裝大本 ●全壹冊紙質堅牢 ●紙數三百廿餘頁 ●正價壹圓 ●郵稅拾錢

本第三版ハ近時獨逸國ニ於テ喝采ヲ博セル千八百九十七年發行第四版「ボアース」氏胃病診療其光輝ヲ失ヒ其官能的診斷法ヲ益賞用實施スルニ至リ其胃內容物診査ノ如キハ周到綿密ヲ極メ療

法ノ章ニ於テハ吾邦人未タ曾テ視聽ニ接セザル斬新ノ諸法ヲ集載シ其實地治療上ニ懇切ナル亦到ラザル所ナシ加フルニ書中各處精密ノ圖ヲ挿ミ說明ヲ補助シタルヲ以テ實ニ吾邦ノ如ク胃病ノ夥多ナル邦國ニ於テハ實地治療家ニ向テ最必要ナル書ナリ第三版發行以來日向淺キモ前版ニ倍シ益喝采ヲ博スルニ至レリ請フ陸續愛讀アレ

增補 第四版發行

獨逸「エスマルヒ」氏原著 飯高芳康譯述

應變人命救護法

美本 ●精圖百五十一個入 ●全壹冊 紙數二百餘頁 ●正價金六拾五錢郵料金八錢

●緒論 ●挫傷 ●創傷 ●出血 ●毒創 ●骨折 ●燒傷 ●凍死 ●溺水 ●人工呼吸法 ●窒息 ●中毒 ●失神 ●負傷者運搬法 ●看病法 ●其他附錄 ●毒 ●本第四版ハ獨逸國ニ於テ有識社會ニ好評噴々タル獨逸「エスマルヒ」氏原著ハ千八百九十八年發行第十五版危難救護法ヲ譯述セル者ニ急劇不慮ノ災害ニ遇ヒ一瞬間ヲ猶豫スルモノ貴重ノ生命ヲ失ハントスル者ヲ萬死ノ中ヨリ救濟シ一生ヲ回蘇セシムル者ニ就中諸急症ヲ救フニ必要ナル人工呼吸法等ハ精圖 ●病人看護法 ●重要ナル各病ノ特別看護法 ●其ヲ以テ了解シ易カラシメ本版ニ於テハ ●病者ノ生命ヲ重シムル人士ハ必ス一本ヲ携ヘ平生ニ熱讀シ自他ノ不幸ナル非命ノ死ヲ免ルルカ爲メニ緊要ノ良書ナリ

原田八十八先生譯述 ●飯高芳康先生校訂

診療醫範

全壹冊 本綴美裝金字入 ●紙數六百餘頁 精圖五百個 ●石版著色圖六個入 ●正價壹圓拾三錢 ●郵稅拾貳錢

本書ハ昨年獨逸新刊ノ「シムリング」氏著ニ係ル醫技綱要ヲ譯述セル者ニノ普通ノ診斷書及治療書ト其選ヲ異ニシ專ラ診斷治療ノ手技方法ヲ記載シタル者ナリ蓋シ從來世ニ行ハレタル治療書ハ診法則ノ要領ヲ叙スルニ止リ之ヲ實際ニ活用スル方法ニ至テハ等閑ニ附セリ隨テ醫學者之ヲ實地ニ應用スルニ臨ミ類ル隔靴搔痒ノ憾ナシトセス本書ハ實ニ此缺點ヲ補フ者ニノ理化學的診法、顯微鏡的診法、電氣診法、消息子送入法、用鏡諸検査法、諸內臟診法等ヨリ器械的療法、電氣療法、水鏡的診法、穿刺法、注入法等ニ至ルマテ一々挿圖(約五百個)ヲ以テ其方法順序ヲ丁寧親切ニ説明セリ故ニ從來開業ノ醫家殊ニ今ヤ學業ヲ卒ヘテ將ニ實地ノ業ヲ開カントスルノ士此書ニ據レバ病床ニ臨ミテ望洋ノ歎ナカルヘシ眞ニ診療上缺ク可ラサル必要書タリ

本書目次ノ概略左ノ如シ

第一編 診斷法 ● 視診 ● 觸診 ● 理學的診法(打聽診、檢溫法、體重測定、檢息法、等) ● 化學的診法(痰、血液、胃液、尿) ● 顯微鏡的診法 ● 電氣的診法 ● 用鏡検査(眼、鼻、喉頭、耳、口腔、食道、尿道、腔、直腸用鏡検査) ● 消息子検査(外科用、尿管、鼻咽頭、喉頭、尿道、子宮、直腸等) ● 「カテーター」送入法 ● 歐氏管、喉頭、膀胱、子宮ノ) ● 注射検査法 ● 呼吸器検査法(肺検査ノ方法、痰ノ顯微鏡検査等) ● 血行器検査(視診、打診、聽診、檢脈法、血液検査即チ光圖検査、血色素檢定、血球計算、血液ノ顯微鏡検査、血痕ノ法醫學的證明) ● 消化器検査(胃膨脹法、及吸出法、胃官能試驗、吐物検査、糞便検査法等) ● 泌尿器検査(尿ノ検査、定量、比重蛋白検査、血液、膽汁色素、糖分ノ證明等) ● 神經系検査(知覺機、運動機、反射機ノ試驗、腦神經ノ試驗、言語及歩行ノ検査等)

第二編 治療法 ● 電氣療法(平流電氣及感傳電氣ノ用法、電氣浴、平流電氣應用ノ定型、電氣燒灼及電氣分解法等) ● 器械的療法(按摩法、治療體操法) ● 水治法(全身浴、半身浴、局部浴、雨浴、洗拭、濕布擦、濕布纏包、卷法、冷却器、發汗法) ● 呼吸療法(蒸氣吸入等ノ諸治法、空氣療法等) ● 穿刺及吸引法(腹腔、胸腔、等ノ諸穿刺及吸引) ● 注射法及灌注法(鼻、耳、咽頭、注射、胃洗滌、灌腸法、尿道注射、膀胱洗滌、腔洗注、皮下注射、實質內注射、血清注射) ● 輸血法及輸注法 ● 種痘法 ● 消毒法、消臭法 ● 乳汁殺菌法 ● 知覺麻醉法 ● 人工呼吸法(其諸種ノ方式、橫隔神經電氣刺戟、氣管切開等) ● 小外科(瀉血法、刺絡、吸角、水蛭、亂刺、誘導法、止血法、壓抵法、腐蝕法等) ● 看護法(看護總論、看護各論、看病用器具ノ注意、用法、運搬用器、用藥器、分泌物及排泄物ノ處置、溫暖裝置、矯正裝置等)

50
製
7

終