婦人大全良方

二十之二十一

產後門

中醫

新編婦人大全良方卷之十一

產後遍身疼痛方論第一

論曰產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脉流散遇氣弱則經絡因分之間血多流滯累日不散則骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若醫以為傷寒治之則汗出而筋脉動惕手足厥冷變生他病但服趣痛散除

趣痛散方

牛膝半兩　甘草　蘼白各一分
當歸　桂心　白朮
黄耆　獨活　生薑各半兩

右㕮咀每服半兩水三盞並至盞半去滓食前服陳無擇許曰趣痛散不特治產後氣弱血滯並能治大陽經感風頭疼腰背痛自汗發熱若甚感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛況有勞諸證尤甚趣痛散脊不能療不若五積散入醋煎用却不妨

五積散

方見和劑

產後腰痛方論第二

論曰腎主腰脚產後腰痛者為女人腎位繫於胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣著腰故令腰痛也若寒冷邪氣連滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動盖胞絡屬腎腎主腰故也

療產後風冷腰痛不可轉

獨活

桂心 羣寄生 各六分 當歸 防風 各八分 芎藭 川芎 芍藥 續斷 生薑

右㕮咀以水三升煮取一升去滓空心分二服

廣濟療產後屋冷血氣流入腰脚痛不可轉

貝醬

當歸 各八分 川芎 芍藥 桂心 各六分 忌葱

右㕮咀以水二升煮取八合空心分溫二服並

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胞

滿氣急兩脇痛方

生薑一斤　淡竹葉一斤切

右二味以水二升煮取一升去滓分溫二服

千金瘴產後中風腰背強痛中風煩熱苦渴頭身皆重此因風冷所致及傷寒

大豆酒方

大豆五升炒令烟出　以酒一升投之密蓋令溫去豆服一升日夜數服臥取微汗避風亦有加羌活者亦佳

廣濟瘴產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手脚冬不下食

生地黃湯方

生地黃汁一升　芍藥　甘草各二兩　丹參四兩　蜜一合　生薑汁半合

右切以水三升煮取一升去滓內地黃汁蜜薑汁微火煎一二沸一服三合日二夜三利一兩行中間進食與藥更進服

陳氏如神湯亦効方見第四卷中論

右注料五積散加桃仁煎亦妙此藥逐瘀血去風濕

產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腰中重痛下注兩脛痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯於經絡不即通之有大痛處必作癱瘓宜桃仁湯恐作癱者預服五香連翹湯

桃仁湯方

桃仁去皮尖去皮麸炒　蘇木　生地黃各半兩　蟲出翹炒　水蛭炒各三十箇

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無時候惡露下即住服

五香連翹湯方（一方有大黃一兩）

木香　沉香　丁香
乳香　麝香　升麻
猬皮　桑寄生　連翹
木通（各二兩）

右為粗散每服五錢水二盞煎至一盞入竹瀝少許攪停去滓溫服

產後惡露不絕方論第三

夫產後惡露不絕者由產後傷於血虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿冷致氣血不調故令惡露淋瀝不絕廣濟療婦人產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞痛氣息急急療尊中三十六疾

乱髮（燒一兩）　阿膠（二兩）　代赭
乾薑（各三兩）　馬蹄（一首燒）　乾地黃（四兩）
牛角腮（五兩酥炙）

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心未飲下三四十圓日兩服

文仲葛氏療惡露不絕方

右以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差

療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸鬲悶

薑黃末酒服方寸匕日三四服（胡氏方三薑黃治惡露不止）

瘴產後血不止虛羸迫死亦治血氣（二方並出產寶）

蒲黃二兩水二升煎取八合頓服

猶聖湯 瘴產後亡血過多心腹微痛然後血下久而不止亦治赤白帶下年深諸藥不能療者良驗此京師祝景助教方

貫衆（大如指一箇全間不剉斷只掐去毛老蔓用之）

右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為細末用米飲調下二錢空心食前服

瘴產後七八日惡露不止

當歸（各六分） 芍藥

敗醬（各八分） 竹茹（各四分）

續斷（各八分） 川芎

生地黃（炒乾十四分）

右細剉以水二升煎取八合空心頓服

治產後虛羸腹內痛淋露不止或惡物不下方（養生必用）

當歸 白芍藥 甘草

乾薑 桂心

蒲黃（合半兩） 熟地黃

里豆（一兩炒）

右為細末溫酒調下二錢食前服米飲亦可（仍里神散）

牡蠣散 治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱不思飲食頭目昏重五心煩熱面黃體瘦

牡蠣 川芎 熟地黃

白茯苓 龍骨（合一兩） 續斷

當歸炒　艾葉酒炒　人參
五味子　地榆各半兩　甘草一分

右為末每服二錢水一中盞生薑三片棗一枚
煎至六分去滓食前服

產後惡露不下方論第四

夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞
絡挾於宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏於
血血則壅滯不宣積蓄在內故令惡露不下也
瘴產後三四日惡露不下呕逆壯熱

芍藥十分　知母八分　生薑
當歸　蒲黃各四分　紅花二分
荷葉中心蒂七箇　生地黃汁二合

右細切以水二升煎至七合去滓下蒲黃煎四
沸分溫空心三服

傍急丸　治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊等出產乳

右以錦紋大黃一兩搗為細末用醋醋半升同
熬成膏圓如梧桐子大患者用醋七分盞化五
圓至七圓服之須臾血下即愈亦治墜馬內損
惡血不出神効
此藥雖用大腎虛弱不可服仍調藥醋不宜大
酸便損肺藏全在醫者斟酌

荷葉散　瘴產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩　鬼箭羽　桃仁

劉寄奴　蒲黄各一兩

右為粗末每服三大錢以童子小便一大盞薑
鍼三片生地薑一分搗碎同煎至六分去滓無
時熱服

產濟療產後惡露不多下方

川牛膝　大黄各六分　牡丹皮
當歸各六分　芍藥　蒲黄
桂心各四分

右為末　生地黄汁調酒服方寸匕日二服血
下盡

治妊娠五積散　治產後惡露不快腹中疼痛或
腹有塊及發寒熱並加醋少許並通口服亦能療
血崩見易簡方不復重錄

產後惡露方行而忽然斷絶壅作寒熱脇腹百脉
皆痛如以錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作
氣所擁遏血蓄經絡宜**治藥圓**

當歸一兩　桂心　芍藥略半兩
桃仁去皮尖炒研　治藥研各一分　蜜丸去足翅炒
水蛭炒名十箇

右為末醋糊圓如豌豆大醋湯下三圓

產後餘血上搶心痛方論第五

論曰夫產後血上搶心由產後氣虛挾宿冷冷搏
於血則凝結不消氣逆上者則血隨上衝擊而心
痛也凡產後餘血不盡得冷則留結與氣相搏則

痛因重遇寒結血尤甚則變成血癥亦令月水否澁不通也

論曰產後心痛者何者曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏於血血凝不得消散其氣逐上衝擊於心之絡脉故心痛但以大岩蜜湯治之寒去則血脉温而經絡通心痛自止若誤以為所傷治之則虛極寒益甚寒心絡寒甚傳心之正經則變為真心痛朝發夕死夕發朝死藥不可輕用如此

大岩蜜湯方

生乾地黄　當歸　猬皮　芍藥　乾薑　甘草　桂心　小草各一兩　細辛半兩

右為散每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服許曰產後心痛雖非產蓐常疾庸或有九痛未必便是血痛設是岩蜜湯豈可用熟地薑熟地黄泥血安能去痛此方本出千金用生乾地黄耳茱萸一升合準五兩乾薑三兩細辛治陳寒在下焦方本一兩却減半兩制奇制偶量病淺深身有品數不可妄意加減然以岩蜜湯治血痛不若失笑散用之有効

失笑散 治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈與第八論紫金圓大同小異

五靈脂　蒲黃　等分

右為末先用醋調二錢熬膏入水一盞煎至七分食前热服是驗

經心錄蜀椒湯療產後心痛此大寒所為方

蜀椒二合　芍藥三兩　半夏

當歸　桂心　人參

甘草　茯苓各二兩　生薑汁五合

蜜一升

右切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去滓下薑汁蜜等更煎取三升一服五合至六合

產後惡露不盡腹痛方論第六

論曰產後惡露不尽腹痛者何若曰產後惡血雖常通行或因外感五邪內傷七氣致令斬然而止餘血停積壅滯不行所下不尽故令腹痛　產寶云皆因姙娠當風取涼則胞絡有冷至於產時其血必少或新產時而取風涼皆令風冷將於血血則壅滯不得宣通蓄積在內有時惡露不盡故令腹痛

澤蘭湯出溫隱居方療產後惡露不盡腹痛往來並胷滿少气

澤蘭炙　生乾地黃　當歸各三方

芍藥　生薑各十方

大棗十四箇　甘草六方

右細切以水九升煮取三升分為三服欲死產身得差

救急療忽露不盡腹脹痛

取亂髮如鷄子大以汁洗盡淨燒為末酒調服二錢

又療產後血不盡血痛問方

取荷葉燒作灰臨水和服煮取汁亦良

又方 以鐵拌錘一枚燒赤投酒五升中用此酒煮當歸三兩取二升去滓分溫再服千金同上方無當歸

療產後下血不盡腹內堅痛不可忍

當歸 芍藥 桂心 各三兩

桃仁一百二十枚製

右細切以水六升煮取二升分溫二服如未差加大黃三兩

療產後血結下不盡腹中絞痛不止

大黃別浸 生乾地黃 當歸 各十分 川芎 芍藥 桂心 各八分 甘草 黃芩 各六分 桃仁四十九枚製

右細切以水七升煮取二升半下大黃更煎三沸分溫三服

療產後血下不盡腹中痛無計

青木香 當歸 牛膝 川芎 黃耆 芍藥 各八分

大黄（十三分浸） 芒硝（十二分）

右細切以水七升煮取二升入大黄更煎三沸

分三服

瘴產後惡露不盡結聚小腹疼痛

當歸（三分） 香附子（一兩） 琥珀

泽蘭 赤芍藥

木香 桂心（各半兩）

右為細末以豆淋酒調下一錢

產蠱瘴產後餘血作疼痛並塊者

桂心 薑黄（等分）

右為細末酒服方寸匕血下盡妙

地黄散 治產後惡物不盡腹內疞痛產後常服甚

妙

生乾地黄 當歸（並略炒各一兩）

生薑（細切如塊頭太對尾炒令焦里半兩）

右為細末炒薑酒調一大錢服

卷荷散 治產後血上衝心血刺血暈血氣腹痛惡

露不快

初出卷荷 紅花 當歸（各一兩）

蒲黄（紙炒） 牡丹皮（各半兩）

右為細末每服二平錢空心温酒調下一腸內

只使童子小便調如纔產後便服此藥即諸疾

不生（出婦人方）

芸臺散瘴產後惡露不下血結不散衝心刺痛將

未纔冒寒踏去其血必往來心腹間刺痛有不可忍謂之血母塊但產後心腹諸疾並宜服之 出產乳

芸臺子 紙炭 當歸 桂心

赤芍藥 各等分

右為細末溫酒調服二平錢趕下惡物產後三日不可無此

產後兒枕心腹刺痛方論第七

夫兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臟腑風冷使血凝滯在於小腹不能流通則令結聚疼痛 各曰兒枕也 產室論產後心腹痛者由產後氣血俱虛遇風寒乘之與血氣相搏隨氣上衝於心或下攻於腹故令心腹痛若久痛不止則變成症癖也

延胡索散 治產後兒枕腹痛得効 出經驗婦人方

延胡索 當歸 各一兩 真琥珀

蒲黃 各一分炒 赤芍藥 半兩 桂心 三分

紅藍花 二錢

右為細末以童子小便合細酒溫溫調三錢食前服

治產後兒枕亦治赤白痢

丁香 三錢 罌粟殼 去穰蜜炙 香白芷 各半兩

百草霜 六錢重

右為細末每服二錢童子小便調下如痢疾未飲調下

產後兒枕痛不可忍

五靈脂慢火熬為細末每服二錢溫酒調下

天僊藤散 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛出經驗婦人方

天僊藤炒焦 為細末每服二錢產後腹痛用炒生薑小便和細酒調下常患血氣用溫酒調服効

蒲黃散 產後腹中有塊上下時動痛發不可忍此由妊娠聚血產後氣羸惡露未盡新血與故血相搏而痛俗謂之兒枕乃血瘀也宜服

真蒲黃研 飲調服二錢如悸渴者新水調

里神散 療產後血塊痛絞腸行後腹疼并絞腸不調

熟地黃 一分 陳生薑 半分

右拌同炒乾為末每服二錢產前烏梅湯調下常服酒調絞腸不通烏梅荊芥酒調下

療新產後腹痛惡血不盡行 里神散 方見局方

療新產後七八日腹痛兩脇痛

當歸 劉寄奴 苦梗 各十分

延胡索 刮為末 桂心 陳皮 各四分

茯苓 芍藥 各八分

右㕮咀以水二升煎取八合調延胡索末空心服

療先患冷氣因產後發腹痛

芍藥　吳茱萸　桂心　當歸
甘草各六分　茯苓　芍藥
桃仁十分
右㕮咀水七升煮取二升去滓分三服

桃仁芍藥湯　千金療產後腹痛

桃仁半　芍藥　當歸
川芎八日曝　乾漆碎熬　桂心
甘草四兩
右細切以水八升煮取二升半去滓分三服

廣濟療腹中絞痛不可忍

當歸　白芍藥　川芎
乾薑

右等分為末每服三錢溫酒調下一方加延胡索妙

必効方療產後腹痛方

芎藭治四兩切以酒二升煮取一升分服

千金治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏方

當歸　黃耆　芍藥各六分
乾地黃　白朮各八分　桂心
甘草各四分　棗十四箇

右㕮咀水二升煮取八合去滓空心作兩大服
忌生葱

千金茱萸酒　治心腹內外痛

吳茱萸一升酒三升煮取一升空心分二服

聖惠瘴同前

生地黄汁　藕汁　童子小便　各三合

右同前三二沸分温三服

薑黄散　治産後腹疼

没藥一分　川薑黄未三分

右以水童子小便各盞入藥並至一盞半分作三服通口服約行五七里再進一服即止不過三服便安

瘴血氣痛欲死

挹鷄半兩為末酒濃並頓服立愈

捠聖散　瘴産後腹痛

當歸為末每服三錢水一盞並至七分溫服

又方當歸散亦治産後腹痛不録

外臺瘴新産後腹中弦常堅絞痛無聊方

白蜜一升　當歸一兩

右當歸為末入蜜中並融二沸適寒溫頓服

産後小腹疼痛方論第八

夫産後小腹痛者此由産時惡露下少胞絡之間有餘血與氣相擊搏令小腹痛也因重遇於冷則血絡變成血瘕亦令月水不利也

延胡索散　治産後臍下痛

延胡索　桂心各半兩　當歸一兩

右為細末墊酒調下二錢

杏桂散　治産後臍下疼痛不止

川芎　當歸各一分

右為細末方寸匕三服每服酒一盞並三入小便少許煎至七分溫服甚者不過再差出博濟

又方　釜底墨醋炒令乾　延胡索　蓬莪茂子

桂心

右等分為末熱酒調下二錢

紫金圓　治產後惡露不快腰痛小腹如刺並熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調不思飲食並能治之亦可療心痛與失笑散同出產乳

五靈脂水淘去石塊乾　抒炒為末　真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和圓如櫻桃大每服一圓水與童子小便各半盞並至七分含藥化溫服之少頃再一服惡露即下久有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

產後六七日忽然腹痛皆由呼吸之間冷氣乘虛而入宜服當歸建中湯和四順理中圓若研再圓作小圓飲飲吞下極妙

產後寒疝方論第九

王丹亭云產後腹大痛由呼吸冷氣乘虛入客於血宜局方當歸建中湯

羊肉湯 療虛及產婦腹中痛虛眩不能支持兩脇
當臍急痛氣上衝前後相引痛治之如神

精羊肉 四兩 當歸 川芎 各半兩
生薑 一兩

右細切以水十盞煎至三盞掉去滓去滓分四
服空心熱服一日未盡再作兩日滓合為一日
並當一劑服 千金當歸湯療婦人寒疝虛勞
不足若產後腹中絞痛其方無川芎有芍藥
陳無擇云仲景羊肉湯治寒疝右用生薑羊肉
湯服之無不驗有一人產當寒月寒氣入產門
臍下脹滿手不得犯此寒疝也醫將治之以抵
當湯謂有瘀血或曰非其治也可服仲景羊肉
湯少減水二服遂愈

分臺 羊肉湯 療產後內虛寒氣入腹腹中絞痛下
赤白劑讖語見鬼

肥羊肉 一斤 當歸 甘草
芍藥 各一分 產室各一兩

右㕮咀以水一斗先煮羊肉取七升入藥更煮
取二升去滓分服

產寶療產後心腹切痛不能飲食乏氣忽然往來
寒熱

當歸 川芎 薑芩
人參 甘草 芍藥
防風 生薑 各三分 大黃 二分宜相人強

弱方可投之

右水七升煑取二升下大黄更煎三沸分作三服

桃仁八十箇

千金羊肉湯 無大黄人參桃仁有羊肉煑汁煎藥

崔氏同

產後兩脇脹滿氣痛方論第十

論曰產後兩脇脹滿疼痛由膀胱宿有停水因產後惡露下不盡水壅瘀與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿氣與水相激故令痛也

經効瘀產後血氣脇肋脹痛

當歸十二分　芍藥　枳殼各八分　桔梗　檀榔　桂心

蘇木　當歸各八分　紫葛各十二分　芍藥　生地黄汁三合　桂心　蒲黄各六分

右㕮咀以水二升煎取八合去滓空心分温二服

瘀產後惡露不下血氣壅瘀脹痛不下食

蘇木　當歸各八分　紫葛各十二分　芍藥　生地黄汁三合　桂心　蒲黄各六分

右㕮咀以水二升煎取七合下蒲黄分兩服

當歸散 治產後腹痛脇脇脹滿

當歸　乾薑等分

右為末每服三錢水一盞煎一盞八分入塩少許食前热服 醫奇方用酒煎

經物理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥八分　蒲黃　延胡索各四分

當歸八分　荷葉蒂三枚炙

右水二升煎取七合後入蒲黃空心分作兩服

產濟瘀產後腹痛氣腹脇下悶不下食無微利

茯苓　人參　當歸

甘草各六分　生薑　陳皮各四分

厚朴八分

右㕮咀以水二升煎取八合去滓分溫服

產後積聚癥塊方論第十一

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚為陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷於臟腑臟腑虛弱為風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也

桃仁散治產後餘血不散結成癥塊疼痛宜服

桃仁　當歸　鬼箭羽

大黃　赤芍藥

延胡索　鱉甲各四兩

桂心各半兩　琥珀各三分　川芎

右為粗末每服三大錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

京三稜散 治産後積血不散結聚成塊或時寒熱不思飲食

京三稜　熟地黄　鼈甲各一兩
桂心　當歸　川芎
牡丹皮　劉寄奴　赤芍藥各半兩
大黄　桃仁　牛膝各三分

右為粗末每服三錢水一大盞薑三片煎至七分去滓溫服

桂心圓 治産後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢羸瘦煩疼患飲食

青皮　乾漆炒烟尽各三分　沒藥
檳榔　當歸　桂心

赤芍藥　牡丹皮各半兩　大黄炒
桃仁　鼈甲　厚朴
三稜　延胡索各一兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大溫酒下三十圓

産後血瘕方論第十二

夫新産後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假也謂其痛浮假無定處也此由風冷血氣不治至産血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水輕則不孕重則不通也

鼈甲圓 治産後惡露不盡結成血瘕作寒作熱心腹脹滿不欲飲食四肢羸瘦或時口乾

當歸　木香　赤芍藥各半兩

鼈甲　大黃各一兩　牛膝
白朮　水蛭製　虻蟲製各一分
牡丹皮　桂心各三分　鬼箭羽半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大桃仁湯吞下二十圓食前服更宜加減不可連併服

治產後血氣不調腹中生瘕結而不散生地黃煎圓一名萬病圓方見第一卷第十論

產寶瘴血瘕痛無定處

童便三升　生地黃汁三升　生藕汁各一升

右先煎三味約三分減二次下薑汁慢火煎如稀餳每取一合暖酒調下

桂心　芍藥
蒲黃各六分　延胡索四分

右為細末空心溫酒調二錢匕

瘴血瘕痛脹下脹不下食

當歸　麒麟竭

右為細末空心溫酒調二錢匕服

千金瘴血瘕

生乾地黃一兩　烏賊骨二兩

右為細末空心溫酒調二錢匕服

凌霄花散　治血瘕血塊及產後獵露不盡兒枕急痛應手猝發痛漸成勞瘦悉皆治之

凌霄花一分　牡丹皮　山梔子仁
赤芍藥　瑩荷車　血竭
沒藥　硇砂　地骨皮

五加皮　甘草各二兩　紅娘子十一箇
桃仁　紅花　桂心
延胡索　當歸各一兩

右為細末溫酒調一錢服

葛氏方療腹中瘕痛

桂心為末溫酒調一錢

產後血瘕腹痛及喉痺熱塞欲人呼血瘕為兒扰

產後即起痛不可忍

鐵杵錘煅令通赤淬酒中候溫飲之用斧亦得

治產後血海氣虛腹臟疼痛心胸注悶每遇經脉

行或多或少及有塊績者　蓬莪茂散　出博濟

蓬莪茂　桃仁去皮尖麸炒　大黃濕紙裹煨

當歸炒各兩　桂心　川芎

木香　牡丹皮　延胡索炒

赤芍藥各半兩

右為細末溫酒調一錢空心臨卧服

產後餘血奔心煩悶方論第十三　虛煩當附于此

論曰餘血奔心蓋是方解了不便與童子小便并

擣心丁及卧去速並食不相宜之物所致但能依

方療之無不痊可

療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

川芎　生乾地黃　枳殼

芍藥等分

右為末酒服方寸匕日二服

廣濟療血氣煩悶方　竹瀝亦得千金同

生藕汁飲二升甚效

集驗療產後血氣煩方千金同

生地黄汁　清酒各一升

右相和煎一沸分為兩服

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉六分　延胡索八分　地黄汁二合

右水二升煮二味取八合下延胡索空心三服

忌肉食一日

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絶

羊血一盞頓服如不定更服立效

經效療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿

當歸　桂心　川芎　吳茱萸　橘皮　生薑各二兩　芍藥三兩

右㕮咀以水三升煮取一升去滓空心服

治產後餘血奔心

右用陳白梅搥碎濃煎湯啜

金黄散出博濟　治產後惡血衝心時發躁

延胡索一兩　蒲黄半兩　桂心一分

右細為末烏梅煎湯冷調下一錢

沒藥圓博濟　治產後心胸煩躁惡血不快

没藥研　　變薑　　延胡索
乾漆炒　　當歸　　桂心
牛膝　　牡丹皮　　乾薑等分

右為細末醋煮麪糊圓如梧桐子大並麝湯下
十圓至十五圓

產後虛煩方論第十四

薤白湯 治產後胷中煩熱逆氣方

薤白　　半夏　　甘草
人參各二兩　　栝蔞根三兩　　麥門冬半升

右六味㕮咀以水一斛三升煮取四升去滓分
五服日三夜二熱甚即加知母一兩

竹根湯 治產後虛煩方

甘竹根細切一斛五升水二斛煮取七升去滓
內小麥二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸內
甘草一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不差
更服取差短氣亦服之

人參當歸湯 治產後煩悶不安方

人參　　當歸　　麥門冬
桂心　　乾地黃各一兩　　大棗二十枚
粳米一升　　淡竹葉三　　芍藥四兩

右九味㕮咀以水一斛二升先煮竹葉及米取
八升去滓內藥煮取三升去滓分三服若煩悶
不安者當取數一升以水三升煮取一升盡服
之甚良

甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹 一升　人參　茯苓

甘草 各一兩　黃芩 三兩

右五味 㕮咀 以水八升煑取二升去滓分三服

日三

千金療婦人產後短氣欲絕心中煩悶不解必効

方

竹葉 麥門冬 小麥 各一升　甘草 一兩　生薑 二兩　大棗 十四箇

右六味細切以水一斗煑竹葉小麦取八升去

滓內餘藥煑取三升去滓溫服若虛悸加人參

二兩少氣力加粳米五合

一方用竹皮若胸中氣逆加半夏二兩忌如常法

與竹瓦湯後竹茹治大同小異

赤小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作赤以冷水和頓服之

治產後煩悶 **蒲萄散**

蒲萄以東流水和服方寸匕極良

尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不

知產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之

必死

新編婦人大全良方卷之二十一

產後口乾瘡悶方論第一

論曰產後口乾瘡悶者何者曰產後榮衛大虛血氣未定食麪太早胃不能消化麪毒結聚於胃脫上熏胸中是以口乾燥渴心下瘡悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服見現圓則愈

見現圓方

薑黃　三棱　草澄茄

陳皮　良薑　人參

莪茂等分

右爲細末用蘿蔔湯煮爛研細將汁煮麪糊圓

如栝桐子大用蘿蔔湯下三十圓

許曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩外傷燥熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因調之可也煩心宜四物湯去地黃加人參烏梅並若外傷燥熱看屬何經當隨經為治難以備舉飲食所傷見現圓却能作劾

四物湯 方見本卷第三論

產後血渴方第二

產寶療產後大渴不止

栝樓 人參 蘆根 切一升 茯苓 各三兩 大棗二十枚 甘草

麥門冬 生四兩

右以水九升煮取三升分三服煩服四劑即差

慈茲茅

楊氏家藏方 黃芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬 等分

右㕮咀每服三錢水盞半並至八分去滓溫服無時

栝樓根湯 集驗 療產後血渴

栝樓根 四兩 麥門冬 人參 各三兩 生乾地黃 甘草 各二兩 土瓜根 五兩 大棗二十枚

右㕮咀以水八升煮取二升半分三服 產寶 魚地黃麥

竹葉湯 門冬有杜粉等分千金 療產後虛渴少氣力

竹葉三升 甘草 人參

茯苓各一兩 小麥三合 生薑

半夏各三兩 麥門冬五兩 大棗十五枚

右㕮咀以水九升先煮竹葉小麥生薑棗取七升去滓內藥再煎取二升去滓一服五合日三夜一

延胡散 博濟 療產後血渴不止

延胡索 蔚金 乾葛

桂心 青皮 枳殼製等方

右並以好醋浸一宿焙乾杵為細末每服一錢冷橘皮湯調下不過三服差

產後作寒作熱方論第三 產後癍疹附

論曰產後作寒作熱者何者曰陰陽不和敗血不散能令作寒作熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則作寒陽勝則作熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作癍疹治之則謬生陰陽不和宜 增損四物湯 敗血不散宜 奪命丹 又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無它證者陰陽不和也 增損四物湯 不一皆隨病加減

增損四物湯方

人参　當帰　芍薬
川芎　乾薑各一兩　甘草四錢重

右吹咀每服四錢水一盞薑錢三片煎至七分去滓熱服無時候

評曰作寒作熱榮衛不和難以軽議若其敗血不散豈止入脾肺二藏邪大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血猶経流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血気與衛気解則休遇再會而復作

大調経散王積散入醋煎佳

大調経散　治産後血虚未滑気為敗濁凝滞榮衛不調陰陽相乗增寒發熱或自汗或膓滿皆

気血未平之所為也

大豆一兩半　竹茹五皮　茯神一兩　真琥珀一錢重

右為細末濃煎為豆蘇湯調下

五積散方見局方

産寶療産後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時乾嘔因之悶絶

人参　猪苓　白鮮皮
葛根　防風　青竹茹
遠志各六分　茯神八分　白歛十分
玄参十三分　竹瀝二升半

右銀一斤水一斗五升煎取三升分温三服忌魚酒麪等物

產後作寒作熱心痛月候不未如何答曰敗血充心痛遶臍腹面色無余繼然得効暫時安產不過三兩日又發脫局方星神散大効

知母湯 治產後作寒作熱通身溫壯胸心煩悶方

知母 二兩　芍藥 黃芩 各二兩

桂心　甘草 略一

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服一方不用桂心加生地黃

產後瘧疾附

評曰郭稽中云產後作寒作熱者多是敗血為害或陰陽不和所作若作瘧疾治之誤矣如陳無擇評曰只可云敗血循經流入閉諸陽則熱閉諸陰則寒血氣與衛氣解則休亦未盡善亦有產後病瘧而作寒熱有一日一發或一日二三發或間日一發或三兩日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但寒但熱者亦有產前病瘧而產後未愈者最難用藥如柴胡常山信砒等斷不可用今有經効之有効謨備撫閱如易簡方四獸飲亦可用六德補還

草菓飲子 治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱者

半夏 泡　赤茯苓　甘草 炙

草菓 炮去皮　川芎　陳皮

白芷錢各二　青皮去白　良薑
紫蘇錢各一　乾葛四錢

右㕮咀每服三錢重水一大盞薑三片棗二箇同煎至七分去滓當發日侵早連進三服無有不安

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻　草菓仁　厚朴生去粗皮
半夏　陳皮　甘草
大棗去核　生薑

右八味等分細剉和勻一半生一半用溫皮紙裹煨令香熟去紙與一半生者和勻每服秤五錢重水二盞煎至七分食前一服食後一服

產後蓐勞方論第四

夫產後蓐勞者此由生產日淺血氣虛羸將養失所而風冷客之平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏於血氣則不能溫於肌膚便人虛之勞倦乍臥乍起顏容憔悴食飲不消風冷邪氣而感於肺肺感微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受於風邪流注藏府復更頻發時有盜汗寒熱瘧背膊煩悶四肢不舉沉重著床此則蓐勞之候也

又論曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘之寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名曰蓐勞

石斛湯 療產後虛羸喘乏作寒作熱如瘧四肢疼痛面色痞黃名為蓐勞

猪腎一雙去脂膜四破　香豉一方無此有知母　葱白　粳米　當歸

芍藥各二兩

右以水三升煮取一小椀去滓分三服廣濟方無芍藥有人參

許仁則療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力遂覺頭腸肢節皮肉痛作寒作熱此為蓐勞

猪腎一雙去脂膜四破　當歸　芍藥　生薑　葱白切　桂心各一兩

右以水八升煮腎取六升下藥並取二升分溫為二服

胡氏方 人參鼈甲散 治婦人產後蓐勞皆由在產內未滿百日體中虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成蓐勞其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在床服此方效

人參　桂心　當歸　桑寄生　白茯苓　白芍藥　桃仁　熟地黃　甘草　麥門冬各半兩　續斷一分　牛膝三分　鼈甲炙　黃耆各一兩

右為細末每服先以猪腎一對去筋膜以水兩

大盞生薑半分棗三箇煎至一盞去滓腎薑棗
然後入藥末二錢人葱三寸烏梅一箇剉芥五
穗並至七分去滓空心晚食前温服此藥神妙

老孫太保增埵柴胡湯 治產後虛羸發寒熱飲食
少腹脹方出養生必用

地柴胡　人參　甘草
半夏　陳皮　川芎
白芍藥各等分

右㕮咀每服三錢水一大盞薑五片棗二枚煎
七分去滓食後温服日二服

熟地黄散 治產後薄勞皆由體虛氣力未復勞動
所致四肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟乾地黄　人參　白芍藥
白茯苓　白朮各兩　續斷
黄耆　柱心　五味子
當歸　麥門冬　川芎各三分

右㕮咀每服四錢水一大盞薑三片棗一箇煎
至七分去滓温服無時

白茯苓散 治產後薄勞蓋緣生產日淺久坐多語
運動用力逐致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀宜服

白茯苓一兩　當歸　川芎
柱心　白芍藥　黄耆
人參　熟乾地黄各半兩

右㕮咀先以水二盞入猪腎一雙去脂膜細切

以生薑三片棗三枚並取一盞去腎薑棗入藥半兩煮取七分去滓食前分温二服

黄耆圓 治産後虚勞寒熱進退頭目眩痛百骨節疼痠氣力羸乏

黄耆　鼈甲　當歸炒各一兩　桂心　續斷　白芍藥　川芎　牛膝　蓯蓉　沉香　柏子仁　枳殼各三分　北五味　熟地黄各半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大食後粥飲吞下四十圓

療産後大虚心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方

黄耆　白术　當歸各二兩　甘草　人參　生薑四兩

右先以白羊肉三斤去膜以水一斛九升煮肉取汁五升後下諸藥更煎取三升分温三服

療産後喘乏氣羸腹内絞痛白汗出

黄耆　人參　茯苓　白术　五味子　甘草　當歸各八分　澤蘭葉　芍藥　陳皮各六分　麥門冬　詞子各二十分　桂心　熟乾地黄各十二分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心温酒下三

四十圓日再服

胡氏牡丹散 治婦人產後虛羸發熱自汗欲變尋常或血氣所搏及經候不調及發寒熱自汗羸瘦並宜服之

白芍藥　當歸　五加皮
地骨皮　人參各半兩　沒藥
桂心各二錢　牡丹皮三錢

右為細末每服二錢水酒各半盞如不飲酒只用水一盞開通錢一錢麻油蘸之同煎七分去滓通口服煎不得攪喫不得吹

黃耆煎散 治產後虛勞肌膚黃瘦面無顏色或增寒壯熱四肢疲羸心煩頭痛

黃耆　鼈甲醋炙各一兩　桂心
當歸炒　桑寄生　白茯苓
白芍藥　人參　熟地黃
麥門冬去心　甘草炙各半兩　牛膝三分

右為細末每服用猪石子一對去脂膜先以水一盞入薑半分棗三枚煎至七分去滓并石子却下藥五錢更煎至四分去滓空心晚食前温服二滓併煎

產後虛羸方論第五

產宝論曰產後虛羸者因產傷損臟腑勞侵氣血輕者將養滿日即差重者日月雖滿氣血猶不調和故患虛羸也夫產後氣血虛竭臟腑勞侵若人

身苦少盛能節慎將養滿月便得平復如產後多
因血氣虛弱雖逾日月猶常疲乏或因飲食不節
調適失宜為風冷邪氣所侵搏於氣血流注於五
臟六腑則令肌膚不榮顏容瘦悴故曰虛羸

人參散 治產後虛羸脾胃之弱四肢無力全不思
飲食心腹脹滿

薑耆　人參　草菓仁
厚朴　附子各一兩　白朮
當歸　白茯苓　木香
川芎　桂心　甘草各半兩
陳皮　良薑　阿梨勒皮各三分
右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎至
六分去滓無時溫服

熟乾地薑湯 治產後虛羸短氣不能食

熟乾地薑二兩　人參　北五味子
石斛　白茯苓　白朮
鹿角膠　附子各一兩　桂心
當歸　川芎　沉蘭葉
薑耆　續斷各三分
右㕮咀每服四錢薑棗依前煎服

澤蘭補虛圓 州繁 療婦人虛勞或夾赤虛寒或產
後血脉虛竭四肢羸弱飲食減少血脉斷絕血脉
不通虛實依源

澤蘭葉九分　石膏一分　川芎

丑草　當歸各七分　白芷
防風　白朮　藁本
川椒　厚朴　乾薑
桂心　細辛各七分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下二三十圓
日再忌海藻菘菜桃李生葱萑肉

羊腎湯　治產後虛羸之力短氣

羊腎一雙去脂膜　麥門冬　羚羊角屑
北五味子　茯神　桂心
續斷　萱香　川芎
當歸　人參　附子炮
乾薑　熟乾地黃一兩

右㕮咀先以水二大盞煮腎至一盞去腎入藥
五錢椒二七粒薑錢二片棗三枚煎至五分去
滓空心溫服

羊肉當歸湯　治產後虛羸之弱無力喘急汗出腹
中疞痛

肥羊肉二斤　當歸　白芍藥各半兩
桂心　附子炮　川芎
萱草　人參　龍骨
白朮各三分　熟地黃一兩

右為粗末先以水五大升煮羊肉取汁二大盞
每服四錢汁一中盞薑三片棗一枚煎至七分
去滓溫服

黄雌雞湯 治產後虛羸腹痛宜服

小黄雌雞一隻去頭足翅羽腸肚細切 當歸 白朮 熟地黄 桂心 黄耆各半兩

右㕮咀先以水七升煑雞至三升每服藥四錢以雞汁一盞並至六分去滓温服日三

產宝瘴產後絰三朕諸疾退後身虛無力

澤蘭葉炒 細辛 熟乾地黄各五分 黄耆 當歸 防風各十分

麥門冬去心焙 石膏七分煅 藁本 白芷 川芎 柏子仁 五味子 丹蔘各四分 桂心

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心温酒下三四十圓

救危瘴產後羸乏不復者肥白方

大烏豆淨拭熟如造豆黄法去皮擣為末以臘月猪脂成煉者和圓如梧桐子大酒下五十圓日再服一月内肥白也無所忌

婦人方當歸散 治產後補虛益血

當歸 羌活各一兩 延胡索半兩

右為細末用猪腰子一隻切作片以水一盞入葉末二錢同煑至七分同腰子喫

佛手散 治產後血虛勞倦盜汗多困少力嗜嚥者疾

當歸　川芎　黄耆各一兩

北柴胡　前胡各一分

右㕮咀每服三錢水一大盞枇杷葉三寸棗子烏梅各一枚薑三片煎至六分去滓温服如有痰去烏梅

當歸羊肉湯　許仁則療產後雖無疾狀但覺虛弱羞心腹痛欲得補氣力

肥羊肉一斤去脂水一斗去肉取八升　當歸五兩　黄耆四兩　生薑六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡露下不盡加桂心三兩惡露下多覺有風加芎藭三兩有冷加茱萸一兩有氣加細辛二兩有熱加生地黄汁二合

療產後雖無餘苦但覺氣虛

當歸十二分　乾地黄十分　澤蘭葉八分　地骨皮　芎藭各七分　黄耆　防風　續斷各六分　人參二分　桂心各五分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大溫酒吞下二十圓

療產後羸羸

黄雌雞一隻去毛背上破　生百合焙三枚　白粳米半升

右依尋常煮五味調和維背合五味汁煮令熟

開腹取百合并餘相和汁作羹食之內亦食全
盡略卧佳
產寶療產後虛之不思飲食四肢皆倦心腹陳痛
補虛治氣
人參　芍藥　桂心
丑草　生薑各一兩　當歸一兩半
生地黄一兩
右㕮咀每服三錢水兩盞棗二枚並至一盞去
滓溫服日三服
古今錄驗療產後諸疾羸瘦欲令肥白飲食和調
地薑羊脂煎
生地黄汁一升　生薑汁五升　羊脂二斤
白蜜五升
右四味先煎地薑汁令餘五升下羊脂煎減半
次下薑次下蜜便以銅器盛著湯中煎令如飴
狀空肚酒一升取煎如雞子大投酒中飲日三
良

產後風虛勞冷方論第六

夫產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷客之冷搏於
血氣血氣不能溫於肌膚使人虛乏之疾頓致羸損
不平復若久不平復若久不差風冷入於子臟則
胞臟冷亦使無子謂之風虛勞損也
薑脊散　治產後風虛勞損羸瘦不思飲食四肢疼
痛

薑蒼　白术　木香
羚羊角屑　人參　當歸
桂心　川芎　白芍藥
白茯苓各半兩　甘草一分
右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一箇並至
七分去滓温服無時
木香散治產後風虛勞損氣攻心腹四肢疼痛不
思飲食
木香　人參　陳皮
白茯苓　白芍藥　薑蒼
川芎各三分　熟乾地黄　當歸
附子各一兩　甘草　桂心
白术各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚並至
七分去滓温服
人參散療產後風虛勞損羸瘦四肢無力不思飲
食
人參　薑蒼　熟地黄各一兩
羚羊角屑三分　桂心　川芎
防風　當歸　北五味子
白茯苓　白术各半兩　甘草一分
右為粗末每服三錢先用水二大盞猪腎一
雙切去脂膜薑棗同並至一盞去猪腎入藥煎
至四分去滓空心温服

拘杞子圓療產後風虛勞損四肢疼痛心神虛煩不飲食

拘杞子　牛膝　白茯苓
人參　黃耆各一兩　當歸
漏蘆　防風　桂心
酸棗仁　羚羊角屑　羌活
五加皮　白朮　川芎各三分
熟地黃　甘草半兩　麥門冬一兩半

右為細末煉蜜圓如梧桐子大溫酒下三十圓

荊芥湯亦可

治產後風虛勞損腹痛冷氣脚膝無力面色萎黃飲食減少日漸羸瘦補益白薇圓

木香葉　當歸　桂心
澤蘭　牛膝　白薇
牡丹皮　杜仲　人參
川芎　白朮
續斷　熟地黃　北細辛
赤石脂　龍骨　鹿餌根
黃耆各一兩　白茯苓　附子各三分
吳茱萸一分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大食前溫酒下三十圓

產寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉

黃耆　當歸　芍藥

人參各二兩　桂心　甘草

川芎　生薑各少分　大棗十二箇

右水七升煮取三升分溫三服

療產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出

當歸　人參　生薑各二兩正　黃耆三兩　澤瀉　猪腎一雙　糯米三合　薤白三合

右水一斗五升先煮猪腎取六升後下諸藥煎

至二升分為三服

又方　猪腎一雙煮入葱豉作臛如常食之

延年澤蘭圓　主產後風虛損瘦不能肥令肥悅方

澤蘭葉熬　當歸　甘草各七分

葶苈　蕪荑　為末各三分　石膏八分　人參

柏子仁　桂心各四分　白术五分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大酒服十五圓至

二十五圓日二服忌生冷鮓滑猪牛肉麪生葱

桃李雀肉海藻菘菜

古今錄驗澤蘭圓　產後風虛勞損羸弱百病必効

方

澤蘭葉六分　白芷　川椒

蕪荑仁　藁本　北細辛各四分

人參　白术　柏子仁

防風　桂心　厚朴
丹參各七分　川芎　當歸
甘草各七分　乾地黄十分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心温酒下二十圓至三十圓日二服忌如前

廣濟療產後患風虚冷気腹内不調補益肥白悅澤方

澤蘭七分　厚朴　人參
石斛　蓯蓉仁　續斷
防風　桂心各三分　川芎
白朮　柏子仁　北五味子
黄耆　遠志各四分　赤石脂

甘草　乾地黄各六分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下三十圓至三十圓日二服忌如前

延年增損澤蘭圓主產後風虚勞損羸瘦方

澤蘭各七分　防風　乾地黄
當歸　北細辛　桂心
茯苓　芍藥　人參
甘草　藁本　烏頭炮
麥門冬　石斛　紫菀
川芎各五分　乾薑　柏子仁
蓯蓉仁　厚朴　川椒各四分
白朮　黄耆各六分　紫石英

石膏 各八方

右為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下二十圓或三十圓

產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七

論曰產後腹脹滿悶嘔吐不定者何若曰敗血散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但脹抵聖湯則愈

抵聖湯方

赤芍藥 半夏 沉蘭葉 人參 陳皮 各一分 甘草 一錢

右㕮咀每服一劑用水一碗生薑焙乾半兩煎至半碗去滓分熱三服

產後嘔逆不食方論第八

夫胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤臟腑因產則臟腑傷動有時而氣猶盛者則氣乘腸胃腸胃燥澁其氣則逆故嘔逆不下食也

丁香散 治產後脾胃氣寒心胸滿悶吐逆四肢少力不納飲食

丁香 人參 檳榔 白朮 桂心 當歸 厚朴 前胡 各三分 甘草 半兩 良薑 一兩

右為粗末每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓温服空心

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服

訶子肉 兩半　人參 一兩　甘草 半兩

右三味為細末別以半夏半分生薑一分薤白二七莖水一大盞煎至六分去滓分為四服

瘴產後嘔逆不止 鄧和縣傳

橘紅 一兩　半夏麴 甘草 各半兩

藿香 三兩

右為細末每服二錢水一盞半薑三片煎至六分無時候

治產後更無它疾但多嘔逆不能食

白术 五分　生薑 六分

右細切酒水各二升煎取一升分三服

產後霍亂方論第九

產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下瀉故曰霍亂也經云渴而飲水者 **五苓散** 寒多不飲水者 **理中圓** 大腸虛冷者加附子 **未復丹** 亦妙 見角方

白术散 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白术　橘紅　麥門冬

人參　乾薑 各一兩　甘草 半兩

右為粗末每服四錢生薑五片水一盞煎至七分去滓溫服

附子散 療產後霍亂吐利不止手足逆冷

附子　白朮　當歸　吳茱萸　桂心　人參　丁香　橘紅　甘草各半兩

右為細末粥飲調下二錢無時候

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

人參　白朮　當歸　草豆蔻仁　乾薑各一兩　厚朴二兩

右為粗末每服三錢水煎服

高良薑散 治產後霍亂吐利腹中疞痛

良薑　當歸　草豆蔻仁

右等分為細末每服二錢粥飲調下

訶子散　胡椒湯亦妙（方見第七卷第二論）

新編婦人大全良方卷之二十一