



幼幼新書卷第二十七

吐噦霍亂

凡

十二門

後學古吳陳履端手始輯

爛溪周應愈公謹校

吐逆第一

巢氏兒啼不定氣息不調母遽乳之氣尚逆乳不下
停滯胃膈則胃滿氣急令嘔逆變吐又乳母將息取
冷冷入乳而壞不捏除之仍飲兒冷與胃逆則腹脹
痛氣息喘急亦令嘔吐又解換衣裳及浴露體不避
風冷客膚腠搏氣血則熱入胃亦腹脹痛而嘔逆吐

也唯冷乳非直嘔吐腸虛入大腸則為痢
漢東王先生兒吐乳有數般或風疾致吐勿止吐
夾痰纔吐即風生若止之風無止處更入外風則潮
心閉胃管變驚風胃主四肢被痰涎閉即搐心主神
被外邪干即驚神不定故變驚風是止住吐手足搐
搦口眼翻張頭項強直名藥不療

兒吐奶鼻青客風外傷肺鼻肺外應也夜煩躁肺氣
逆也身發熱肺主皮毛外邪傷故發熱也宜傷寒藥
後平胃氣卷第二十六

兒吐奶唇黑多笑唇脾外應被食傷故黑夾痰者脾
能生涎故痰衝胃而吐

兒吐奶身熱奶成片胃有熱積久則生風必四肢發
瘡多渴面黃

兒吐奶不化夾清水胃冷必面青唇白宜煖胃
兒吐奶早晚發熱是驚吐而不睡宜調驚

乳食不化腹急氣逆瀉塌氣丸二三服下却胃膈進
觀音散二三服和胃氣不但生胃氣藥皆可意與兒喫

冷乳氣逆肚疼或變瀉前藥調理不退用羌活膏

錢乙吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也悉宜

下奇續二三服胃不和則生胃疾胃不和則生胃疾

患眼兒無故吐乳因乳母冷熱不調啼中餵乳致胃

膈逆舊乳不化故多吐妳辦或帶酸氣謂妳積急用

牛黃丸風熱仍服勻氣平胃湯藥若胃脾虛滑喫食

多吐只服平胃丸嘔逆夾蘆會丸未若正二月間以

鮓湯丸利急慢太六胃不和則生胃疾

小方論熱甚而吐更服熱藥脾胃熱而胃口閉故吐

水穀不通凡湯藥乳食只伏在胃管胃膈不上不下

為結腸翻吐歌曰廉人取土數四上

得患初因是熱傷熱極吐逆也尋常醫人不會

看形候又服熱藥恣生當至令胃閉并脹結莫

服冷藥不須涼若還更取兒當死先須開胃後

通腸

寶鑑歌飲來無變色夫與氣虛者利胃也夫胃身不

風冷吹雙乳乳壞氣須凝乳兒成嘔吐氣喘腹

膨脝解脫當風下洗浴向簷前喘中還餵乳氣

逆在胃停皆成嘔逆病醫者貴調停

石壁歌

吐乳從來胃氣實妳滿胃中生吐逆吐多遍身
有風生驚邪本是從斯得吐定無過腦後溫吐
出妳來無變色先與定氣後除驚此是醫良不
費力

兒胃氣實乳母或氣不定或交妳或怒未息或行
房了便乳使劃時便吐妳不變色無害若色青黃
或如水或中有虫須涼隔以溫物煖腦後避惡風
吹風府既生其氣又涼上焦即止

形證論吐乳青色者驚黃色者風熱有涎者驚妳乳
鮮者傷乳成塊者胃冷

本草蘆節中虫如小蚕二枚煮汁飲

千金治吐妳補虛止渴牛乳入薑葱白煎量服

廣利刪木皮水煎服生廣南如桑株

聖惠丁香散治嘔吐不定

丁香

人參

白茯苓

木香

葛根

甘草炙

枇杷葉去毛炙

各一分

麝半分

細羅不時薑湯調半錢意裁

丁香散治嘔吐心煩不納乳

丁香

人參

茅根

麥門冬

甘草炙

陳皮去白焙各一分

粗羅一錢水小盞煎五分稍熱服量頻與

人參散

人參

白朮

乾薑炮

半夏炮七次炒

桑白皮

陳皮去白焙各半兩

粗羅一錢水小盞薑棗煎五分分服

張渙無乾薑名白米湯

治兒吐乳乳母服

人參兩一

薑焙

陳皮去白焙各半兩

篩三錢水中盞煎六分溫二服了乳兒

治吐乳黃色驢乳喫大腸稍利毒氣散

又搗韭根汁滲入口差

醫局療傳尸骨蒸痿痺肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂

吐痢時氣鬼魅瘴瘡赤白暴痢瘵血月閉瘵癰丁腫

驚癇鬼忤中人兒吐乳大人狐狸等蘇合香丸

蘇合香油入安息香膏

薰陸香

龍腦各一兩

朱砂飛

白木

丁香

青木香

白檀香

烏犀

華撥

安息香

末澄去沙無灰
酒一斗熬膏

香附

訶梨勒皮

麝各二兩

未安息香膏煉蜜和旋丸如桐子并華水溫冷任

意化服四丸老小一丸溫酒亦得並空心服蠟紙

裹一丸如彈緋絹袋盛當心帶一切邪神不敢近

消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍亂嘔吐治心

腹脹悶脅肋刺痛胃膈痞滿噎塞不通常服順脾胃

進飲食兒吐逆不定小丁香丸

丁香

三兩

肉豆蔻

卅個

五靈脂

十二兩

木香

兩半

巴豆霜

二百粒

細末麪糊丸如黍服五七丸溫薑湯下陳皮湯亦

得食後霍亂吐逆桃葉湯冷下兒吐逆三歲三丸

量加生薑桃葉湯下

殊聖方

乾薑炭火燒及八分研冷蜜湯調一字至半錢

嬰孺治吐下不止王子湯

嬰赤石脂九銖 黃連十銖 甘草炙 乾薑各六銖

黃芩二銖 膠指大 黃蠟彈大

水三升煮一升內蠟膠洋為三服意裁

漢東王先生羌活膏治吐逆不止

羌活 獨活 人參 白茯苓

防風者蚕頭 肉桂不見 全蝎炒 水銀各一兩

硫黃同水銀研 末蜜為膏旋與嬰兒黑豆大二三歲龍眼核大量

加薄荷湯化

張渙香參湯消寒痰治嘔吐

藿香葉 人參 船上丁香皮白茯苓

丁香各一兩 青皮去白 木香 甘草炙各半兩

羅末一錢水小盞薑二片煎五分溫服

溫膈湯勻氣治嘔吐

丁香 草豆蔻去皮 人參各半兩 青皮

檳榔 甘草炙各一錢

羅末半錢至一錢薑汁少許溫湯調下

香朴散調冷熱治嘔吐

丁香

麥門冬

各半厚朴薑

人參

細末一錢水小盞薑二片棗一枚煎五分溫服

香葛湯治嘔吐後渴甚津液少

藿香

白茯苓

甘草

炙各半兩

丁香

乾葛

人參

各一兩

羅麝一錢研服半錢至一錢薑湯調意裁

寶鑑治只吐不瀉腹中疼痛玉露散

寒水石燒薑水調半錢

衛生療吐逆草金散

爛大梔子

三枚草烏頭

小瓶盛泥固燒煙盡研細薑汁調一字

寶童治翻胃吐逆腹內虛鳴

天台烏藥

醋炙或炒

半夏

各半兩

白薑

羊屎

十枚腹內取

文武火炒末鎔蠟丸如麻子紅酒服五七丸

劉氏異攻散治胃氣不和藏府泄瀉不思乳食或嘔

妳嘔逆

藿香

白朮

炒

人參

白茯苓

陳皮

木香

肉苳蓉

煨麩

甘草

等分服小半錢紫蘇飴飲調

莊氏鎮驚化痰祛風止嗽定逆除一切驚積蝎梢丸

蝎梢炒

末

半夏

洗七次

丁香

棟炒

朱砂

白附子

炮裂各

末薑汁麩糊丸菜豈大服十九至十五丸不時薑

湯下

治吐妳

蓮子心

七個

丁香

三個

人參

末綿裹乳汁浸令兒吮

孔氏治兒吐胃虛生風胃氣欲脫醒脾散

人參

天南星

末旋抄服二味各半錢冬瓜子三七粒水盞半煎

兩茶脚許通口服不時胃氣生為度大人倍煎

王氏治久吐玉壺丸

半夏

白麩

各一兩

大天南星

一個

天麻

半兩

末薑汁化柳膠丸黃米大漿水煮四沸服十九十

五丸如無柳枝湯

吉氏豆蔻散治吐痢

肉豆蔻煨麩

草菓子一炮各一枚

宿砂

甘草炙

肉桂

不見火 各一錢 陳皮去白半錢

末半錢陳米飲調下

李劉中

川當歸洗

甘草炙各一分

桂心

不見火 去粗皮 枳殼炒

北五味子

各半兩

細末一錢水七分煎半瓊溫服

丁時發肉豆蔻散治脾胃不和寒熱腹痛嘔吐不食

白豆蔻

肉豆蔻

甘草炙

芩

陳皮

去白

枳殼

去毛各一分

黃耆炙

乾木瓜

人參

各半兩

末一錢水五分薑棗煎三分服

鄭愈治吐逆藿香散次加人參陳皮枳殼去藿香麩

藿香

赤麩各二錢

半夏薑製一錢

末半錢南木香湯或木瓜湯下三服

聖惠灸中庭一穴一牡在顛中下一寸陷中如麥炷

寶鑑灸上管中管各三壯

吐乳第二

巢氏兒哺乳冷熱不調則停胃膈更新乳哺前後相觸氣不宣流故吐乳脈輕浮者無咎

本草乳飽後乳出與吐逆不同

茅先生兒吐乳候吃奶不穩從口角自流出身微熱口鼻微冷面目青黃眼慢因乳女房室溼洩兒叫便乳陰陽不順胃膈不快乳停胃不消而胃冷所致先以睡驚沉香飲子

霍亂

夾丁香散與服

吐利

夾活脾

散調理愈

一胃氣不和

脾風 恐脾虛受熱狂躁不睡眠

偏微喘傳慢脾風不治

石壁歌

顛陷時時動不停吐中微覺乳生腥眼渾青碧

生白膜汗出津津脚似冰氣細元因傷胃冷氣

粗即是欲生驚是風從早宜醫療煖胃和脾氣

乃平

寒熱相勝使然氣急是胃實當涼則愈若顛門陷

下氣細當生胃氣若渾身熱甚目中白膜甚者氣

出喘粗不急治必作癰瘕

鳳髓氣散宜地黃散霍亂吐利氣粗宜葱湯丸取驚積

形證論此驚妳衝胃氣或交妳衝脾或氣妳或病妳

致吐遠聞腥氣與蚘蚋丸一切氣細脉沉與調胃散

積熱

肘後治嘔嘔吐下

甘草

人參

當歸

乾薑

末水一升煮五合分服日三內麝半分佳

嬰孺當歸湯治吐嘔

當歸

黃芩

甘草

芩

黃連

各一

細辛

乾薑

各二

甘草

入切水二升煮八合溫服半合日三

寶鑑治嘔乳玉真散

白朮

兩半

四歲半夏

七個

木小

枳

半斤

法

細末半字水一呷調下一字

下香

噦逆第三

白朮

各一

人參

巢氏兒哺乳冷冷氣入胃與胃氣逆故噦

千金翼胃中虛冷不能食者飲水即噦

千金治兒噦

薑汁 牛乳

各五合煎五合分二服

聖惠治噦不止丁香散

丁香 藿香

白茅根 各一 人參 兩半

花桑葉

羅散三四歲服一錢水小盞薑少許煎五分不時

熱服量裁

人參散治噦逆不止心神煩亂

人參

白朮

白茯苓 各半 甘草 炙

藿香

各一

粗羅一錢水小盞煎五分不時稍熱服量裁兼乳

女服訖即乳兒

麥門冬散治多噦心胃煩悶

麥門冬

淨一兩

甘草

炙一

人參

與

陳皮

去白

焙

厚朴

薑炙各半兩

粗羅三四歲服一錢水小盞煎四分稍熱頻服更

量

霍亂吐利第四

二煎味甘平煎湯服之

巢氏霍亂者陰陽清濁二氣相干氣亂腸胃間為霍
亂兒腸胃嫩弱因解脫逢風冷乳哺不消而變吐利
或乳母觸胃風冷食生冷物冷氣入乳令乳變敗兒
飲之亦成霍亂吐利挾風而挾實者則身熱頭痛體
疼而復吐利也兒霍亂須暫斷乳藥與乳母服令血
氣調適乳汁溫和若不止血氣變乳即發驚癇
千金翼嘔吐而痢為霍亂

漢東王先生嬰兒霍亂吐瀉往往變作慢脾慢驚宜
竹瀝膏調胃氣藥并沉香散

並痢久不止門

楊大鄴將息小兒之道擇乳母精神爽健精神詳慢
智慧深遠身無疾病脂肉肥潤溫厚淳善能調理乳
食何疾更生衆疾易愈緣不慎諸味如意恣餐孩兒
或變蒸或乘寒哺乳或蒸熱飼兒或醉後嗔怒或悲
啼不常驚亂神氣乳食失常即吐瀉可疑

患眼忽然吐瀉為霍亂若狂躁夜不睡喘促死

玉訣霍亂有兩證若胃冷霍亂身無大熱只微溫面
青黃宜銀白散調氣若腹痛多啼口吐清水面色不
定乾噦不常宜蘆會丸殺虫霍亂後調氣歌曰

霍亂皆因胃氣傷冷熱攻脾氣受殃或積或虫
寒與熱胃虛乾嘔不尋常
石壁經歌

先以青黃面色看定因風熱在脾間髮如直立
人多怕開眼無休定有涎胃逆更看風熱搐常
疑唇白口多乾舌若有瘡為熱極難過二七入
黃泉

青白滿面者冷痰在胃間主吐瀉若黃赤胃有熱
積亦主霍亂此胃虛實看候調治失治則口乾燥

煩渴若搐搦逆候口中瘡如雞子白滿口者不治
千金治霍亂吐利

人參

一兩

厚朴

薑製

甘草

炙各半兩

白朮

炮十銖

吹咀水升二合煮半升二月兒服一合更量乳母
忌生冷油膩一加乾薑一分或生薑三分

聖惠半夏散治霍亂後吐瀉不止煩悶

半夏

湯洗七次

黃連

乾薑

炮

陳皮

焙去白

人參

當歸

炒各半兩

黃芩

甘草

炙各一分

粗羅服一錢水小盞煎五分不時量服

治霍亂吐瀉不定丁香散

丁香

木香

甘草

葛根

枇杷葉

拭毛炙各半

藿香

人參

粟黃

各半

細羅不時麝香湯調半錢量服

治霍亂吐瀉不止食飲不下肉豆蔻散

肉豆蔻

一枚

丁香

枇杷葉

去毛炙

黃耆

各半

桂心

人參

白茯苓

甘草

各半

陳皮

去白焙一分

散一歲溫酒調半錢三歲加服

漢東王先生七寶散治霍亂吐瀉不食

木香

炮

丁香

炒

官桂

不見火

茯苓

麻黃

去節

當歸

甘草

炙

人參

大腹皮

訶子

川練子

去核

秦艽

炒各錢

地榆

炒錢

肉豆蔻

一枚

藿香

炒錢

未嬰孺一字三歲半錢四五歲一錢水半盞入棗

半片煎十沸溫服

沉香散補虛調胃定霍亂治吐瀉進飲食

沉香
茯苓各一
甘草炙
丁香炒

藿香各一
木香炮
官桂不見火
各半錢

未嬰孺一字二三歲半錢五七歲一錢量裁紫蘇

木瓜湯調下日三

張渙順正湯順陰陽治霍亂吐利

白豆蔻
高良薑炮
藿香
當歸洗

草豆蔻煨
陳皮去白
丁香焙

細末半錢至一錢溫粥飲調下

香連散清濁定霍亂吐利

木香
黃連各一
厚朴薑
人參各半

細末一錢粟米飲調下

寶鑑藿香散治霍亂吐瀉

藿香
香薷各一
白茯苓
白朮

研半錢薑湯下如人行五里再進連三服

霍亂第五吐或吐而不利或利而不吐或利而不吐利

本草主惡氣霍亂梳飲垢水和服

肘後治霍亂

人參
蘆薈各一
菟絲子
菟絲子
倉米撮

咬咀水二升煮五合分五服效千金止參米多木瓜

劉氏療霍亂空吐不利

人參六分 厚朴二分 陳皮一分

兔骨炙一兩

切水升二合煎四合服即利又以杏仁鹽阜角末

少許麩和硬搜如棗核綿裹內之便通妳毋忌熱

麩

療霍亂利而不吐

烏牛蒨草一圍蒨舒移切 生薑 人參各三分

切甜不醋漿水升半煎五合分服如渴取曲蘗糞

爛龍骨一兩煎澄清喫差

療霍亂不吐不利肚脹妨滿上下不通

甘草炙四分 當歸二分 石鹽三分

切漿水升半煎六合半牛黃麝各半錢研蜜半匙

和灌即通乳母喫漿水粥忌麩肉等

療乾霍亂渴熱壯熱眼色慢四大困悶

烏豆二升薑一兩水三升煎烏豆皮欲爛即濾汁

二合和少許蜜喫即變吐人行六七里又啣大小

並宜
療熱霍亂諸藥不差
不三升
盧葉二兩糯米三合水三升先煮取一升入蜜少許和服
葉葉薑白米為飲亦效
聖惠麥門冬散治霍亂不下乳
麥門冬一兩 白茯苓 人參 陳皮去白

乾木瓜各一 厚朴薑炙 茅香各半 粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時溫服
嬰孺半夏湯治心結堅實飲不下嘔逆欲死并霍亂

後吐下不止短氣煩滿
半夏四分 黃苓 甘草各二 乾薑

陳皮 當歸 人參各三

水四升煮升半二百日兒服三合若腹痛加當歸三分嘔逆甚加陳皮三分

玉訣銀白散取積虫後生胃氣使不霍亂

人參 茯苓 甘草炙 白朮炒

白扁豆去皮 等分末一錢紫蘇湯調一有藿香

切切所書

惠眼香參膏治霍亂瀉住吐不住

人參大一指

丁香粒十四

藿香錢一

糯米粒七十

丁香炒黃

未棗肉和膏服一指大鹽薑湯下

吐利第六

但吐利而不霍亂

巢氏兒解脫風冷入腸胃腸胃虛則泄利胃氣逆則嘔吐大體與霍亂相似而少輕不劇悶頓故直云吐

利

錢乙兒初生三日吐瀉壯熱不思乳食大便不化或

色白是傷食用白餅子下後益黃散和胃胃氣不和

兒生三日至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白

乳食不消此上實下虛也更兼見證肺主睡露睛喘

氣心主驚悸飲水脾主困倦饒睡肝主呵欠頓悶腎

主不語畏明當瀉兼葳補脾益黃散此多得于秋夏

夏秋吐瀉五月廿五日後吐瀉身壯熱此熱也兒葳

府十系中九系熱或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃

色主玉露散六月十五日後吐瀉身溫似熱葳府六

系熱四分冷吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食或

刀切斤書

不食食前少服益黃散食後多服玉露散七月七日
後吐瀉身溫涼三分熱七分冷不能食乳多似睡悶
亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不渴食前
多服益黃散食後少服玉露散八月十五後吐瀉止
冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐水當補益黃散勿
下
論吐瀉廣親五太尉病吐瀉不止米穀不化六月中
用薑汁調補藥一日加喘錢曰熱傷在內併石膏湯
三服衆謂補脾用丁香散三服錢曰服此三日必腹

滿身熱飲水吐逆謂六月熱伏腹中也一如所言衆
又行溫藥上焦亦熱喘而引飲三日當死衆不能治
復召錢錢見熱證用白虎湯三服更以白餅子下之
一日減藥二分二三日以白虎湯各一服四日用石
膏湯一服旋合麥門冬腦子牛黃天竺黃茯苓為丸
朱砂衣竹葉湯下五丸熱退安一有黃苓

論虛實下藥馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢曰
此子必多病面皸白神怯也黑睛少腎虛也黑睛屬
水本怯而虛縱長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易

實脾胃亦怯更勿縱酒慾若不保養不過壯年面無精神光澤如婦人失血今吐利不食壯熱者傷食也下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但以消積丸磨之如傷食甚則可下不下成癖實在內可下下畢補脾隨其虛實無不效吐瀉問難廣親七大尉病吐瀉時七月證全不食而昏睡睡覺而悶亂硬氣乾嘔大便或有或無不渴衆作驚治疑睡故錢以史君子丸補脾石膏湯退熱次日又下之錢曰凡吐瀉五月內九分下一分補八月

內十分補勿下此脾虛瀉下之死錢留溫胃益脾藥止之李醫曰何食而嘔錢曰脾虛不能食津少即嘔逆曰何瀉青褐水錢曰腸胃至虛極冷故也錢治愈兒吐瀉當溫補余每用理中丸以溫其中五苓散導其逆五苓最治兒吐連數服兼異攻散等溫藥調理往往便愈若虛損當速生胃氣宜附子理中丸并研金液丹末煎生薑米飲調灌多服效二三兩無害候胃氣生手足

漸煖陰退陽回然猶癩癧即減金液丹一二分增青州白丸子一二分同研服漸減金液丹加白丸子兼

異功散羌活膏溫白丸釣藤飲之類調理仍頻與粥
雖至危者往往死中得生十救八九其一二合醫者
聖惠白朮散治冷熱不調吐利不止

白朮

木香

丁香

陳皮

焙各

麥門冬

焙三

粗羅一錢水中盞煎五分不時稍熱服

治吐利兼胃脅脹滿草豆蔻散

草豆蔻

皮去

木香

五味子

人參

白茯苓

陳皮

炒各

訶梨勒皮

甘草

炙各

羅散一錢水小盞煎五分不時稍熱服量加

錢氏異功散溫中和氣治吐瀉思食凡治兒虛冷病
先與數服以正其氣

人參

茯苓

白朮

炒

甘草

炙

陳皮

等分末二錢水二盞薑五片棗二枚煎七分食前

溫服量與

張氏多白扁豆散飲調

玉露散一名甘露散

甘草

生一

寒水石

嫩微青黑中有細紋

石膏

堅白各半

細末一字半錢一錢食後溫湯調下

治壯熱白餅子又名玉餅子

滑石末二錢 輕粉 半夏二外煎 天南星二

泡七次 各一錢 巴豆一廿四粒淨水 一升煮盡

末糯米飯丸如小菘豆捏作餅三歲上三五餅葱

白湯臨卧服量加

金液丹治兒吐瀉虛實極妙

治脾胃虛寒吐瀉等及冷痰

齊州半夏一兩泡 七次培 陳米

吹咀三錢水盞半薑十片煎八分食前溫熱服

張渙勻胃散治三焦不調停寒膈上乳哺不消胃膈

痞滿甚則喘逆吐利肌體痿黃

甘草錢一 藿香 白豆蔻 人參各一

木香 乾薑炮 厚朴薑 丁香各半

細末一錢水小盞薑二片煎六分溫服

萬全人參散治脾胃氣虛止吐瀉

人參 白茯苓 白朮 乾葛

陳皮去白

厚朴薑炙

白朮

神藥

等分末半錢百沸湯點量服

惠眼沉香飲大治吐瀉

二六煎六分盛服

沉香

丁香

藿香

各半

肉豆蔻二枚

檳榔二個

甘草錢一

白豆蔻

人參錢一

末一錢水小盞老薑小指大槌同煎三兩沸溫服

劉氏人參異攻散治瀉痢止嘔逆順氣補虛

人參錢半

白朮兩半

青皮

陳皮

茯苓

甘草各一分

豆蔻

三個入

末一錢陳米飲調秋入訶子或紫蘇木瓜煎五七

沸早服兒傷寒以此正氣後以紅綿散夾驚傷寒門治

醒脾散治吐瀉脾困

人參錢二

丁香粒十

白茯苓

白朮

各一分

藿香

甘草錢一

天南星

一個重七八錢去心入砂仁十

粒麩

細末一錢水六分薑三片冬瓜子十四粒煎三分

不時溫服

張氏六神丹定吐瀉

肉豆蔻

訶子肉

丁香

木香

肉豆蔻

炮

訶子肉

史君子

各一分

薑會

二分

細末薄麩糊丸如菜豆粥飲吞七十四味煎三分

治吐瀉紫雙丸

代赭石

陳皮

去白巴豆半錢同炒

木香

杏仁

各一分

肉桂

去皮不見火

丁香

各半錢

藿香

錢二分

細末粟米飯丸小菜豆大服七粒藿香湯吞吐瀉

藿香陳皮湯吐棗湯

王氏治吐逆兼吐利不止

丁香

藿香

各一分

木香

錢一分

硫黃

兩半

滑石

錢二分

末錢半米飲調瀉附子一枚重半兩炮淨薑汁搗

成餅白麩裹慢火煨熟將附切焙羅末或吐兼瀉

入附末如藥三之一更因虛實米飲調下吐如激

水者亦定吐利不止成慢驚或已成者兼金液丹

趙氏白朮丸治吐瀉不止溫胃消食

白朮

木香

丁香

肉豆蔻

黃連

等分末麩糊丸如黃米米飲下十粒

吉氏治吐瀉不進食溫脾散丁香

蒼朮二錢油陳皮去白肉桂不見草果各半

桔梗各一錢甘草許少薑蚕許少魚金丹

末半錢棗湯調下一更因重實米始歸不吐

參苓散治吐瀉

人參米泔茯苓切山藥切乾葛切

麥門冬淨黑附子炮桔梗各甘草各半

蓮子心不見火木香各一錢藿香各蘇米

末一錢紫蘇米飲調下

朱氏大止吐瀉

鬱金一個刮去心入巴豆一粒麩裹煨末米泔汁

調一字

李剛中治夏秋吐瀉

好黃連一兩炒深黃色冷入蹄丹一兩炒丹焦為

細末麩糊丸如芥子服二三十粒僻土生薑湯吞

更量數服不妨

毛彬治胃氣不和吐瀉不止痰逆不食平胃引行諸

藥銀白散

半夏一兩洗七次

白扁豆炒

鴛粟米

人參

白朮焙

白茯苓

山藥各四錢

細末二錢水八分薑二片棗一枚煎六分溫服

治脾胃虛弱乘冷吐瀉不定不問冷熱可服桃紅散

人參

藿香

麴紅色

等分細末半錢米飲調下不時量服

吐利津液少第七

聖惠治渴不止

筍籊

扁豆藤

人參

細剉分六服每水小盞煎五分不時量分稍熱服

張渙三和散治吐利津液燥少

白茯苓

烏梅肉

乾木瓜

等分細末一錢水小盞煎五分溫時時服

治霍亂煩渴香豆散

藿香

肉豆蔻

白扁豆

人參

甘草

羅末一錢水八分薑薑二片煎四分溫服

丁時散人參散治虛熱及吐利煩渴踈轉後服

人參 茯苓 桔梗 乾葛 各半兩

生犀角 甘草 各一分 白朮 一分

末一錢水中盪燈心煎五分煩渴入新竹葉量服

吐痢心腹痛第八

聖惠兒冷熱不調乳哺不節使陰陽清濁之氣相干

而變亂腸胃間則成霍亂而心腹痛者冷氣與真氣

相擊或上攻心下攻腹故痛

外臺療霍亂心腹刺痛吐利

茯苓 桔梗 人參 各六分 白朮 五分

甘草 炙 厚朴 炙各四分

切水二升煮六合温服

人參散治霍亂心腹痛不食

人參 白朮 芩藟 草豆蔻

厚朴 薑炙 當歸 炒 陳皮 白去 丁香

桂心 各一分

羅散不時薑棗米飲調半錢量服

治霍亂乳食不消腹心滿痛

訶梨勒皮兩半木香兩當歸炒白朮

霍香各一陳皮去白各一

細羅不時薑湯調半錢量服

肉豆蔻散治霍亂吐瀉腹痛

肉豆蔻 桂心各一 人參 甘草炙各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量分服

冷吐第九

張渙溫脾散散寒濕治嘔吐

厚朴薑炙一兩 丁香 白朮 乾薑各半兩

肉桂一

細末一錢人參湯調

衛生療胃氣虛冷痰吐嘔逆流星散

大半夏生十枚 胡楸四十九粒

粗末半錢水一盞生油七滴煎四分溫服

莊氏丁香丸治胃虛寒腹脹吐逆

丁香 木香 藿香 牛黃各半兩

腦麝各一 膩粉

末麪糊丸小豆大熱湯化下一丸

相瀉治胃冷嘔吐肉豆蔻丸

肉豆蔻麩累煨

丁香

末麩糊丸如芥子藿香柿蒂湯下三五丸渴飲湯

丁時發治乳哺飲食溫冷過度傷于脾胃腹脅脹滿

多吐痰涎

人參

丁香

半夏洗七次

乾薑各半兩

白朮

陳皮各一

粗末麩糊丸如麻子溫湯下十九

熱吐第十

聖惠麥門冬散治嘔吐不止心神煩熱

麥門冬焙

淡竹茹各半兩

甘草炙

人參

茅根

陳皮去白焙

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分稍熱頻服量加

麥門冬散治嘔吐心胃煩熱

麥門冬焙

厚朴薑炙

人參各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚粟米五十粒煎

四系溫服量加

治嘔吐心煩熱蘆根粥

生蘆根

二兩

粟米

合

水二大盞煎一半去滓投米作粥薑蜜少許食

張渙治胃虛挾熱嘔吐不止丁香益胃湯

丁香

人參

訶皮

官桂

大黃

炮黑各半兩

細末一錢水小盞薑二片煎五分溫服

保命膏治吐逆不定服熱藥過多不差

川大戟

丁香

大黃

不灰木

燒紅

甘遂

各一分

朱砂

雄黃

飛各半兩

粉霜

水銀

錫結砂各一錢

巴豆

淨十粒

黃蠟四兩銀石器溶膏旋丸如黍末周晬一粒十

歲七粒新汲水下

挾驚吐第十一

張渙三香丹治挾驚嘔吐

藿香

丁香

半夏

洗七次

膩粉

各一分

龍腦

麝

各一錢

薑汁麪糊丸如黍人參薄芎湯下十粒量加

殊聖歸命丹

小兒驚膈吐還頻晝夜連連不輟停淚水槐黃
泔淀汁和虫乳食一時噴

丁香 藿香各一 生犀 牛黃各半

猪鯽狗蝟熊膽 等分共半兩

末丸如菜豆一歲下苦棟湯研二丸

治驚食胃管不快吐逆乳食或心胃發熱定吐丸

丁香 三枚 蝎稍 九條 半夏 三個洗

研煮棗肉丸如黍金銀湯吞七至十九傷暑霍亂

吐瀉香茹散送

良方治久患翻胃兒驚吐諸吐田季散

好硫黃半兩水銀一分研如黑煤薑四兩汁酒一

盞空心服三錢衣覆足指間汗出逸遲遍身如膠

腥穢難近差驗此極難調先澆水指緩研增湯令

和否則浮泛不可服

王氏睡驚丸治熱化痰鎮心神治驚悸吐逆

半夏 薑製 乳香 犀角

等分末薑汁糊丸如菜豆薄芎臨卧服七至十粒

毒氣吐第十二

巢氏春夏以湯與兒腸胃脆弱不勝藥勢遂吐下不止藥熏巖府煩懊頓乏為中毒氣吐下
千金藿香湯治毒氣吐下腹脹逆害乳哺

藿香

兩一

薑

兩三

青竹茹

甘草

各半兩

咬咀水二升煮八合服一合日三熱加升麻半兩

王氏消妳毒令兒吃乳無毒有毒亦解

升麻

兩半

大麻子

破一兩

酒浸辰與妳子喫一瓊臨乳捏去此

幼幼新書卷二十七 遍閱山樓刻

方瑞先刻

幼幼新書卷第二十八 泄瀉羸腫 凡十五門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應憲公章校

一切泄瀉第一

養生轉圜瀉者古皆謂利尋常水瀉謂利米穀不化

為米穀利或言下利清穀清冷也痢謂滯下言所下濡

滯膿血點滯痢有四寒熱疳蠱是也白多為寒赤多為熱兼以後重

赤白相雜為赤白相雜為隨證用藥不若今人之妄

茅先生霍亂吐瀉積瀉驚瀉疳瀉渴瀉傷瀉冷瀉熱

瀉形狀別而用藥殊如調一瀉證變眼視口瘡臍口
乾燥瀉久不止并下黑血顛門腫陷不能進食大渴
死兼看三關脉微微青黑腫起亦死

錢乙黃承務子二歲病瀉衆止之十餘日其證便青

白乳不消身涼加硬氣昏睡衆謂病篤錢以益脾散

三服胃氣不和補肺散三服喘嗽上三日身温而不硬

氣後以白餅子微下吐利與益脾散二服利止蓋利

本脾虛傷食十日不止上實下虛脾氣弱引肺亦虛

且便青為下藏冷下必大虛故補脾肺即身温不硬

氣病退而後下所傷食何至虛耶

驚風或泄瀉等諸病煩渴者皆津液內耗不問陰陽

宜儘飲錢氏白朮散彌多彌好胃氣不和

寶鑑乳母有孕氣血不榮于乳飲子則髮立腹急時

瀉胃皆皆熱夜啼肌瘦一如積聚

兒飲水時被驚或啼未住而飲水成水痢癰

茅先生諸瀉死候歌

大瀉應難止渾身熱困多緩晴溼泄滑顛陷見

奔波

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉

黃連並劉如豆白芍藥並劉如豆吳茱萸

等分釜內慢火炒赤杵羅服三錢七水盞半煎八

分空腹食前溫服日三四兒量與或以水浸蒸餅

丸如桐子或菘豆黃米大兒十五至二十九溫米

飲下作散沸湯或溫米飲調亦治泄瀉忌生冷魚

肉肥膩一方有木香無芍藥醋糊丸

治老虛人下利滑泄

赤石脂 乾薑

等分麩糊丸如桐子空腹溫米飲下廿九知為度

兒小丸赤石脂河東陝西有真齊州出者廼桃花

石

茅先生香連丸治瀉利

木香 黃連菜黃半兩同炒煙起肉豆蔻

訶子炮去核各半兩阿膠炒麩朱砂各一錢

末軟餅丸如米餅飲吞十九十四丸兒小碎之

乳香散治一切瀉痢

乳香二錢荷葉于炭火上炙半鎔

肉豆蔻

白薑

甘草炙

草果子各一

細剉醋麩裹熱灰煨赤為末入乳香服半錢一錢

陳米飲調

嬰孺治老小一切利及成疳者

白龍骨

白石脂各五

雞糞礬炒

黃連

胡粉炒

茯苓

阿膠炙各四

末蜜丸桐子大米飲下十五至廿九日二意裁

增減水藥皇子湯注下三四日服

龍骨

牡蠣煨各一兩

人參

乾薑

甘草炙

赤石脂各三

細辛

附炮各二

黃連五

水四升煮升半為三服日三兒量

張渙丁香黃耆散治脾胃虛弱不食漸損榮衛肌體

羸瘦時下利面青白

綿黃耆

丁香

當歸焙

白朮

鼈甲酥炙

人參各一兩

胡黃連

甘草炙各半兩

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服

人參散治胃氣虛弱泄瀉不止

人参 白茯苓 枇杷葉 甘草 炙各半兩

丁香 各一 肉豆蔻 仁二 藿香 煎五分 厚朴 薑製各一

青皮 各兩 當歸 各一 乾薑 炮各一

末半錢水半盞薑一片煎三分温服

惠眼溪螺散治瀉

船底下溪螺 四十九個 水浸出泥 乾葛粉 兩半

葛粉摻螺上碗盛盞蓋一宿取螺上粉曬服一錢

退猪湯調

張氏肉豆蔻散理瀉痢

肉豆蔻 大訶子肉 青皮 附炮去

厚朴 薑製炒熟各半兩

末大小加減空心粥調

莊氏治風冷入腸胃腹疼泄瀉虛風胃風湯

人参 官桂 去 白朮 芎

天麻 大附子 炮裂

等分末二錢水一盞入粟米煎七分温服

治脾癖乾瀉散

黑三稜 去 神麴 炒 鼈甲 生 蓬莪朮

陳皮

蝸牛殼

自乾死者

等分細末半錢米飲調不時服

孔氏茯苓丸治久新瀉痢不問冷熱分利水道

白茯苓

分五

黃連

兩一

阿膠

炒三分

末燒粟飯丸如菘豆米飲下廿丸

吳婆散治疳熱冷瀉腹虛脹肉瘦骨存瀉利不止

宣連

白茯苓

阿膠

人參

黃蘗

蜜炙

丁香

絡一

訶梨勒皮

煨二枚

桃白皮

沒石子

緊實者一枚

細散一二字不時白米泔調

王氏白朮散和中益胃散風濕治腸鳴泄瀉米穀不

化利下青白腹痛嘔逆脅肋脹滿氣痞不散體熱多

睡全不思食

芍藥

當歸

官桂

人參

白朮

茯苓

粟米

炒一兩

粗末一錢水六分煎三分溫服

溫胃固腸丸

肉豆蔻

縮砂仁

丁香

龍骨

呵子皮炙 赤石脂

等分白麩糊丸如菘豆服一二十九飯飲下量兒

治藏冷滑泄不止腸鳴腹痛公聖丸

青州棗廿五個黃丹二錢 肉豆蔻一個 訶子皮

草豆蔻麵裹燒 木香各半兩

末醋糊丸如小黃米米飲下廿丸

吉氏銀白散治脾胃氣弱泄瀉不食

王人參 茯苓 甘草炙 藿香

白扁豆炒微 白朮炒麩

等分末服半錢紫蘇餅飲下量加

朱氏木香散治脾胃不和瀉痢

木香 白朮各一 藿香 益智各半

肉豆蔻三個

末半錢或一字量兒木瓜紫蘇湯調

相瀉桑葉散治泄瀉虛滑頻數不止

人參 白茯苓 藿香 乾薑焙

等分末半錢桑葉湯調大人瀉一錢

丁時發開胃丸治乳食不消冷熱不調泄瀉頻併進

飲食止吐逆

木香未半錢白朮

人參

當歸各一

肉豆蔻半錢

細末麩糊丸如粟麝香温米飲下一二十九

積瀉第二

夾實瀉并積利附

茅先生兒積瀉面青黃眼微黃上渴肚脹嘔逆遍身

潮熱通下臭穢因食多傷脾先用青金丹下積積聚

勻氣散

和胃氣不和

醒脾散

一胃氣不和

香連丸

一泄瀉

門相夾調理

形證論冷瀉有積歌

積傷冷瀉有多般四體平和無熱看瀉終不定

休言止取積為先順氣安

冷食在脾身温無事阜角膏取調胃散補並積熱門

嬰孺治發熱腹內不調時下利不消顏色漸黃

厚朴

黃連各三

人參

龍骨各四

切水升八合煮升二合分温至夜服漸盡乳母忌

油膩果子生冷

治八歲上熱結痰實不能食自利

大黃分十三

柴胡分九

升麻

黃芩

枳實分六

竹葉切升半

梔子仁

芍藥分八

細辛分八

知母

薑

三分一無此有杏仁

水升八合煮升二合分温至夜漸服盡乳母忌油

膩果子生冷

大黃散治十二三歲結熱痰多壯熱食少結者自下

大黃分十二

柴胡

枳殼

升麻

芍藥

梔子仁

各十分竹葉升一

薑分三

知母

杏仁

淨各八分

水六升煮二升為四服十歲外為三服兒小量之

大黃湯治結實壯熱頭痛

大黃

柴胡

甘草炙

薑各十分

升麻

知母

黃芩

各七分

大青分五

石膏分十

芍藥

枳實

各六分

水四升七合煮升三合為四服量加

吉氏芍藥散治積痢

芍藥

枳殼炒

甘草

地榆各一錢

黃蘗兩半

川烏頭炮一個

焙末半錢白楊湯下

驚瀉第三

茅先生兒面青眼微青身微熱瀉青紅水或如草汁
因先驚積後喫冷物衝散為驚瀉用活脾散一胃氣不和門

一慢脾鎮心丸一切泄瀉門勻氣散胃氣不和門

調理

石壁經歌

瀉出還如藍靛青目光緊急黑添睛只看眼凸

脆青脉鳳髓只看眉中青色生便是驚傷冷瀉因

冷傷藏府次被驚致目睛青色轉甚眼白亦青目

睛與白睛高甚唇白亦青精神不足勿怕先溫脾

次去驚亦分水穀

治驚瀉大餅子

大附子破炮淨二片 韶粉附子大 藿香錢

丁香五十粒

末滴水為餅如棋子飯飲化

傷瀉第四

茅先生兒肚臃脹硬身微熱微嘔因父母愛子將粘

滑物與喫兒食噎着五歲停在胃膈不消瀉瀉下為傷瀉醒脾散一胃氣不和門勻氣散調二日和胃氣不和門

瀉漸疎用青金丹下所傷物積聚門再進勻氣建脾散

和胃氣不和門

千金大黃湯治下痢苦熱不食傷飽不乳

大黃六兩甘草

麥門冬各一兩

吹咀水二升煮一升二三歲分三四服

生金牛黃湯主積下不止發癩

生金

三銖或六銖用屑熟金成器者俱可

牛黃三銖

細辛半兩

麻黃二兩

乾薑

有熱生薑代

人參

黃連

甘草各一兩

吹咀水升六合煮八合臨卧研牛黃湯中

醫局開胃丸治歲府怯弱內受風冷腹脅脹滿腸鳴

泄瀉或青或白乳食不化又治歲冷夜啼胎寒腹痛

木香

蓬莪朮

白朮

人參

當歸炒各半兩

麝

芍藥

各一兩

羅炊餅丸如黍温米飲下十五新生兒腹痛夜啼

乳前服五丸

冷瀉第五

茅先生兒腹虛鳴身微熱腹脹滿為冷瀉因冷食傷

宜乳香散瀉門一切泄調中飲胃氣不和門

寶鑑兒冷瀉為脾虛胃冷不消五穀糞不結實腹脹

瀉氣酸乃有積

顛顛治水瀉痢并脾冷食乳不消喫乳頻吐温脾散

附子

乾薑

甘草

各半

白朮

兩

末空心米飲調半錢忌鮮魚毒物

千金温中湯治夏月積冷洗浴過度及乳母亦冷浴

兒飲冷乳壯熱忽值暴雨兒瀉如水胃虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔先調胃瀉止

乾薑

厚朴

甘草

當歸

桂心

茯苓

人參

白朮

桔梗

各二

呔咀水二升煮九合百日内服二合半更裁

張渙兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止川楝丸

川楝

淨慢火炒一兩

肉豆蔻

兩半

末粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

治泄注不止手足逆冷取胃丹

附子一枚重半兩炮淨

船上硫黃

乾薑炮

肉豆蔻

肉桂

白朮炮各半兩

末白麩糊丸如黍食前米飲下十九

粟煎湯治腸胃受風冷泄注身熱

白朮炮

當歸洗焙

川芎

人參

肉桂

芍藥各一兩

末一錢水小盞薑三片粟米一匙煎五分溫服

孔氏治藏府不調大便青色

白朮

人參

茯苓各一錢

甘草炙半錢

末一錢水小盞煎七分溫服

熱瀉第六

茅先生兒渾身微熱上渴驀地瀉如水為熱瀉因當風日或日下去被曬五藏受虛熱毒忽然喫水過多致不消化乳香散夾三聖丸瀉門切泄龍涎膏與服熱瀉

嬰孺治三歲兒熱實不脹滿下不止

麥門冬一兩

大黃五錢

甘草三錢

當歸

柴胡

人参

黄芩

各四

水三升煮升二合為三服大利止

張漢清胃散治挾熱瀉痢

川棟子

黃蘗

當歸

洗

地榆

黃連

炒各半兩

末一錢水八分煎四分乳前溫服

劉氏木香黃連等分末陳米飯丸菴豆大米飲下三五丸

五丸

洞泄第七

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風冷傷肌肉至夏飲食起居不調又被風冷入膈胃先後重沓為邪所乘則下利冷氣盛為洞泄不止為注下又不止多變驚癇亦變眼痛生障下焦癰冷結熱上焦熱重肝故也

聖惠厚朴散治脾胃不和洞泄下利羸瘦食少

厚朴

人参

訶皮

白朮

黃連

地榆

甘草

乾薑

肉豆蔻

地榆

甘草

乾薑

羅散粥飲調半錢日三四量加

張渙厚朴散治洞泄注下

厚朴薑製

訶皮炮

肉豆蔻各一兩

白朮

乾薑

炮各半兩

羅一錢水八分薑粟米各少許煎五分溫服

萬全龍骨丸治冷熱不調時洞泄

龍骨

黃連

白石脂

白礬

乾薑

木香

各半兩

末醋糊丸如麻子粥飲下五九日四更量

劉氏兒水瀉下注

黃連

石蓮

等分末半錢水瀉新汲水調白瀉粟米飲下

水穀瀉第八

聖惠寒溫失宜乳哺不節或當風解脫血氣俱虛為

風冷所傷留連肌肉因脾胃不和大腸虛弱風邪入

腸胃腸胃既虛不能制水穀故下利

千金治暴冷下水穀或乳冷下青結不消或冷實吐

下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服利藥實去

胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾除大黃若乳女洗
浴水氣未消飲兒為霍亂勿去大黃兒諸霍亂宜利
者用之不消利宜溫中者除之

溫中大黃丸

大黃六分

乾薑炮

桂心

厚朴薑製

甘草

炙各一分

當歸

人參

茯苓

白朮

炮各二分

桔梗

吐咀水二升半煮八合兩月內服二合量加

治卒大下利熱唇乾口燥嘔逆引飲瀉心湯

人參

甘草炙

黃苓

陳皮

苦蕒根

各一兩

黃連

二兩

半夏

洗淨三兩

乾薑

炮兩半

吐咀水六升煮二升分三服胡洽治老少利水穀

腹鳴心下痞乾嘔無橘皮苦蕒寒加附渴加苦蕒

嘔加橘皮痛加當歸仲景大棗十二枚

聖惠厚朴散治水穀利羸瘦面黃不食

厚朴薑炙

龍骨

黃連

炒各半

白丁香

當歸炒

白朮

肉豆蔻

各一分

木香

羅粥飲調半錢日三四量服

地榆散治水穀日夜無度

地榆炙

厚朴薑炙各三分

黃連淨炒一兩

阿膠炒黃半兩

羅散不時粥飲調半錢量加

醫局胃風湯治風冷瘵虛客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脅滿腸鳴疔痛及腸胃濕毒下如豆汁如瘀血日夜無度

人參

白茯苓

芍藥

桂皮

當歸

白芍藥

白木

等分粗散二錢水大盞粟米百粒煎七分空心稍

熱服量兒

暴瀉第九

亦名卒利亦名暴利

巢氏腸胃虛暴冷熱氣傷之為卒利熱則色黃赤冷則色青白冷熱相交變為赤白滯利

聖惠胡黃連散治冷熱氣不和忽暴下利腹內疼痛

胡黃連

母丁香

桂心

木香

肉豆蔻

當歸炒

麝香各一分

犀角半

細羅粥飲調半錢日三四意裁重與

龍骨散治暴利

龍骨

黃連炒各一兩

枳殼炒

當歸各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量與

張漢阿膠丹治泄利身熱及暴瀉注下

阿膠炙

乾薑各一兩

芍藥

當歸焙

川黃連

肉豆蔻各半兩

羅末蜜丸如黍米飲下十粒量加

補一切虛不熱男女小兒皆可服冷積暴瀉神仙玉

粉丹

精明船上硫黃

一斤去沙石盡打碎

獾猪肚七個旋取桑根白皮三斤寸剉猪肚一個

洗淨內硫黃線縫水二斗將桑皮一斤煮一伏時

餘肚慢火養勿令冷煮滿一伏時別換猪肚桑皮

同煮一伏時又換猪肚桑皮過三伏時不換桑皮

只換猪肚水耗添熱湯候滿七伏時已完七肚温

水淘淨研細烈日曬極熱再研煮糯米粉丸如梧

子空心米飲下十粒至十五丸大率驅除宿冷其

效無以老人經久可服

暴瀉第十

亦名暴利

聖惠秋夏晨朝多中暴冷之氣折其四肢則熱不得
泄入腹變利或赤白小腹脹痛肌體壯熱脉洪大急
數皆由冷熱氣相併連滯不差為暴利
外臺

甘草

茯苓各六分

人參

黃連各四分

厚朴炙

薑各二分

龍骨八分

切水一升煎三合欲卧先取鹽麩麝為小丸內下

部中服藥忌如常法藥多水少宜少增水

利久不止第十一瀉利

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風傷肌肉夏
因水穀利久不差腸胃虛易為冷熱冷變白膿熱則
變血冷熱相加赤白相雜久則腫滿亦變病墮亦令
嘔噦

鳳髓經滑腸瀉歌

宜冷熱利門香連丸下利腹
痛門紫霜丸並與吉氏同

脾中有積熱遲留至使終年瀉不休項軟見人

多硬氣更兼清水臍中流少間有似黃金色若

有垂腸更不收形證又看胃膈上胃前深赤汗

如油唇赤生瘡眼脉赤若不調脾命即休

千金七味散治利久不差

黃連八分 龍骨一斤 赤石脂一斤 厚朴一斤

烏梅肉各二升 甘草炙一斤 阿膠炙三斤 黃金一斤

篩水服二寸七日二兒一錢七煎不拉即煉良入

華陀治老小下利柴立不食入口即出命在旦夕

黃連 亂髮灰 醇苦酒 蜜各半雞子殼

白蠟方寸七 雞子黃一枚

銅器盛酒蜜蠟雞黃置炭火攪勻內黃連髮灰攪

煎可丸即丸一日夜盡

外臺療久痢無問冷熱疴痢悉主

棗一枚去核勿破皮內滿胡粉燒研米飲和服一

歲下分服三服差驗

聖惠治久利赤白漸羸胃虛不食丁香散

丁香 厚朴薑炒 黃連炒 當歸炒

訶梨勒煨 白朮炒 伏龍肝各半兩 木香一分

赤石脂一斤

搗散粥飲調半錢日三四更量

聖惠黃連丸治暴利經久不斷增減有時

黃連炒

人參

赤石脂

龍骨

甘草炙

黃芩

厚朴薑炙

白茯苓

枳殼

麩炒淨

烏梅肉炒

各半兩

羅散蜜丸如麻子粥飲下七九日三四量加

譚氏斗門散

小兒瀉利甚青黃久患時多轉滑腸下部脫肛

頻努嚙朝朝焦瘦漸羸疳

呵子

枳殼

地榆

等公末一錢米飲調一歲下半錢

嬰孺龍骨湯治下利不住

龍骨

甘草炙

黃連

各四

當歸

乾薑

各一

水四升煮升二合食前溫分三服

龍骨湯治服藥下後不止

龍骨

各五

甘草炙

乾薑

當歸

黃連

赤石脂

附淨

前胡

各三

水四升煮升二合為六服旦至午盡

黃連煎治冷熱利經時不止體羸不堪餘治差而又

發

好黃連二兩水七升蜜八合煎升三合百日兒服
半合量加

治下痢久不斷羸瘦脾胃冷弱食不化雞骨丸

宿雌雞胸肋骨一具

黃連分六

厚朴分三

麴炒

甘草炙

白朮各四分

麥蘖炒

烏毒肉各二分 人參

赤石脂

黃芩

白龍骨各五分 桔梗分二

末蜜丸小豆大白飲下廿五丸日二量與

漢東王先生治久瀉脾虛不食食即瀉米穀不化温

白丸

白朮米泔浸一分 丁香炒半 半夏泡七次

末薑汁糊丸如菜豆半歲三丸三五歲五七丸淡

薑湯吞早晚各一服

治久瀉脾困不思乳食恐作脾風惺惺散

天麻

全蝎炒各半錢

木香

糯米

人參

茯苓並微炒

白扁豆炒

山藥焙

甘草炙各一錢

刀斤書

卷二十八

三

末嬰孺一字二三歲半錢水半銀盞棗半片煎十數沸服

治久瀉脾虛發搐變慢驚慢脾等竹瀝膏

白朮蜜炒一錢大附淨泡一錢全蝎七個各用薄荷七葉果湯泡麻黃纏

厚朴甘草水煮一錢犀角錢一

末竹瀝為膏旋丸嬰孩黑豆許二三歲阜子大四

五龍眼核大薄苛湯化量加

張渙治瀉利久不差香礬丹

木香 白礬枯各一兩訶梨勒炮酸石榴皮

炒黑各半兩

羅末蜜丸如黍粥飲下十粒量服

劉氏

人參 白朮 茯苓 甘草

陳皮 藿香 丁香 木香

肉豆蔻

等分末二錢藿香合糯米煮粥飲調服

吉氏治久瀉不食丁黑散

丁香 肉豆蔻 陳紫蘇 陳皮

鹽木瓜

吉等分末半錢米飲調下

丁時發治冷熱作瀉熱藥不止

槐花

石榴皮

地榆

黃連

呵子

丁香

丁香

木香

等分末冷水調半錢

莊氏秋深冷痢不止灸臍下二寸三寸間動脈中三

壯

利渴不止第十二

瀉利同

巢氏水穀利津液枯竭府藏虛燥則引飲小便快者

利止渴亦止小便澀水不行于小腸滲入腸胃渴亦

不止利不斷此脾弱不能克水身亦浮腫上焦本熱

又利下焦虛上焦熱氣轉盛薰肝眼必痛而生障

外臺麥門冬湯治夏月藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬

甘草

枳實

黃芩

人參

龍骨

切水二升煮九合分溫服

聖惠黃耆散治利渴心胃煩悶不欲食

黃耆

麥門冬焙

黃芩

各三分

龍骨一兩

烏梅肉炒三枚

白朮

黃連

炒各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

黃芩散治利渴不止

黃芩

訶梨勒皮煨

樗株皮

各半兩

苦蕒根

黃連

當歸炙各三分

烏梅肉炒一分

羅散一錢水一瓊煎五分不時溫量服

當歸散治利渴腹痛不止

當歸炒

黃連

黃耆

各三分

乾薑炮

甘草

炙各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

龍骨散治利渴體熱煩悶

白龍骨一兩

胡黃連兩半

茯苓

人參

茅根

麥門冬

焙各三分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺子芩湯治大熱利兼渴增寒

子芩

枳殼炒

黃蘗

各四分

石膏十二分

竹葉升一分

檳皮十分

人參

七分

水五升煮升六合七歲兒三服量與

冬瓜湯治渴利不住

冬瓜八合

苦萋十二分

茯苓

知母各八分

麥門冬五分

粟米二合半

水五升煮升四合新布絞量與

寶鑑竹茹丸

好黃連

一兩剉塊菜萋一兩
澹蜜少許炒黃赤

末薄糊丸蘿蔔子大竹茹煎飲吞十九

王氏人參白扁豆散治脾胃不和不思飲食吐瀉渴

兒虛熱煩躁

人參

白扁豆炒熟去皮白朮

茯苓各一兩

鴛粟子

甘草炙

山藥各半兩

末二錢水中瑣薑二片棗半個煎七分通口服如

腹疼加紫蘇兒虛熱加薄荷

下利腹痛第十三瀉利同

聖惠黃連散治久赤白利不止腹痛羸弱不食

黃連

炒淨一兩

厚朴薑炙

乾薑

木香

艾葉

炒

龍骨各半兩

當歸炒

黃牛角腮

及各三分

烏梅肉炒一

細散粥飲調半錢日三四量與

木香

黃蘗丸治久赤白利腹脹疔痛

黃蘗炙

當歸炒各一兩

未煨大蒜丸如菜豆粥飲下七九日三四量與

木香散治久赤白利腹脅疼痛

木香

訶皮煨

臭樗皮炙

木賊

黃連炒各半兩

羅粥飲調半錢日三四量加

肉豆蔻散治久赤白利腹疔痛全不思食漸羸

肉豆蔻三枚

青皮去白焙

黃牛角炙焦當歸

地榆

厚朴薑炙

黃連炒各半兩

乾薑炮一分

羅粥飲調半錢日三四量加

下利羸瘦第十四瀉利同

巢氏腸胃虛弱受風冷聖惠作則下利利斷後脾胃

尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦

聖惠桔梗丸治利久不斷肌羸食不消

桔梗

神麴炒各一兩

麥蘗

烏梅肉炒

厚朴炙

白朮

人參

赤石脂

黃芩

龍骨

桂心

甘草

黃連

炒兩半

黃雌雞骨

一具酒浸宿炙黃

各兩半

末蜜丸如菘豆粥飲下五丸日三量加

雄黃散治久利不差羸瘦壯熱毛焦不食

雄黃

蘆會

青黛

朱砂

熊膽

麝

龍膽

黃連

黃蘗炙

當歸炒

白芷

細辛

甘草炙各

蚱蟬淨七枚

乾蝦蟇酥炙兩

細羅井華水調半錢日三四量加

治下利不止瘦弱雞子粥

糯米一合粥臨熟破雞子一枚攪入少醋空腹食

下利浮腫第十五瀉利

惠濟論兒利差後遍身腫歌宜塌氣散

冷利日久失醫治遍身浮腫却如吹脉洪是氣

化為水沉實還因積有之氣順腫消為上法氣

平兩日定多尿莫交食飽還憂滯此疾元因積

損脾

塌氣散

茴香 兩日 白牽牛 交合 甘草 炒 木香 各錢一

末半錢紫蘇湯下

王氏止渴聖效散治吐利氣虛津液減耗生疳煩渴

飲水不休面腫脚浮腹大頭細小便利白全不喫食

乾葛 下 白芷 黃丹 各半 細墨 各二

細末半錢倒流水調下

幼幼新書卷二十八

