

THUNELRG, Carol P.

Dissertatio entomologica sistens
insecta Svecica.

1784-95.

1784-95.

THU



L.C. 2850.4
6-83-61

D. D.

DISSERTATIO ENTOMOLOGICA
SISTENS

INSECTA SVECICA,

QUORUM

PARTEM PRIMAM,

CONS. EXPER. FACULT. MED. UPSAL.,

PRÆSIDE

Karl
etern
CAROL. P. THUNBERG,

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD.
CÆSAR. N. C. REG. SCIENT. HOLMIENS., SOCIET. SCIENT.
UPS. PATR. HOLMENS. BEROL. N. SCRUT. LUND.
HARLEM. AMSTEL. ET NIDROSIENS. MEMBRO;
NEC NON ACAD. MONSP. CORRESP.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT,


JOHANNES BORGSTRÖM,
BORGÖÄ-FENNO.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. XI. DEC. ANNO MDCCCLXXXIV.

H. A. M. S.

APUD JOHAN. EDMAN, DIRECT. ET REG. ACAD. TYPOGR.

UPSLAÆ,



SÆ RÆ M:TIS
MAXIMÆ FIDEI VIRO,
ECCLESIAE SVIO-GOTHICÆ
ARCHI-EPISCOPO,
ACADEMIAE UPSALIENSIS PRO-CANCELLARIO
REVERENDISSIMO ATQE EMINENTISSIMO,
S. S. THEOLOGIÆ DOCTORI,
DOMINO
**CAROLO FRIDERICO
MENNANDER.**

Chas. W. Richardson
Nov. 2, 1903

QL
482
S8T53
1784
ENTRB

Dissertationem hanc, novas & in Patria antea non
observatas insectorum species continentem, TIBI,
OPTIME MÆCENAS dicari finas, humillimus oro. Eo
certius & quidem sine arrogantia confidere ausim,
TIBI,

TIBI, SUMME VIR, haud displiciturum fore, quod
juvenilis ætatis tentamen NOMINE præfulgeat Tuo,
quo magis studiosam Fennonum juventutem ut ad
alia naturæ & disciplinarum studia, ita ad hæc quo-
que animalcula indaganda & propiori examine co-
gnoscenda TE facem quondam præferente, allectam
fuisse constat. Jam grandævus, nepotes quoque la-
boris Tui fructus carpere vides: quorum vestigia
si premere mihi datum non fuerit, pietate tamen &
veneratione in TE, Tantum nostræ non solum pla-
gæ, sed litterati totius orbis Decus, nulli secundus
ero, permansurus donec vixero

REVERENDISSIMI NOMINIS TUI

cuhor devotissimus
JOHANNES BORGSTRÖM.

PROOEMIUM.

Inter alia scientiarum & in primis Historiæ Naturalis Patriæ incrementa, quibus hoc quod vivimus saeculum superbit, scientiæ quoque Zoologicæ studium jure referendum videtur, quod felici opera celebrum virorum, Artedii, Linnæi, De Geerii, Clerkii, aliorumque civium, optime meritorum, id attigit fastigii, ut paucæ admodum sint Regiones, in quibus animalia indigena aut sollicite magis detecta aut accuratius descripta inveniamus, quam in nostra Patria. Omnibus tamen numeris absolutum animalium Svecicorum Catalogum expectare non licet, cum quotannis indefessis Naturæ scrutatoribus novæ fere offerant species, vel extra Patriam dudum cognitæ, vel antea omnino ignotæ. In primis inter exsangvia illa & visum nostrum facile fugientia Insecta, recentioribus annis vidimus ab australibus regionibus varia allata hue individua jure hodie civitatis donata; & alia, forsan nostro climati soli propria, sed a nullo antea auctore examinata, recentior

de-

detexit ætas & investigandi studium. Fauna Svecica, liber inter plurimos immortalis Linnæi vere aureus, prima vice numeris suis absoluta prelum reliquise videbatur; sed iterum mille animalibus aucta prodiit; jarnque, viginti tribus annis elapsis vel mille aliis speciebus adaugeri poslet.

Amplum itaque in hac palæstra mihi foret spatium, teneras exercendi vires; verum cum fructus tanti laboris vix paucis sperandus sit annis, haud ingratum saltem Curioso in carissima Patria Entomologo fore duxi, sit quasdam Insectorum species, in Svecia nuper lectas, descriptas sisterem atque delineatas; eo majorem apud hujus nobilissimi studii æmulos initurum gratiam confidens, quod pulchriori ex ordine Elegantissimorum Lepidopterorum & Phalænarum numerosissima gente, speciminum selectum fecerim.

IN-

INSECTA SVECICA.

Bombyx dispar: *alis deflexis, masculis griseo fuscoque nebulosis; femineis albidis: lituris nigris.*
Habitat in Uplandia.

Caput album antennis nigris, parum pectinatis.

Thorax albus fascia antica & puncto medio nigro.

Alæ anticæ supra albæ fasciis quinque nigris, undulato-dentatae cum puncto inter secundam & tertiam & plurimis terminalibus nigris. Subtus fasciis obsoletioribus. Posticæ supra albidæ, subtus fusco-fasciatæ.

Abdomen fusco-albidum, versus anum purpureum.

Pedes barbati, nigri annulis albis.

Bombyx grisea: alis incumbentibus cinereo-ferrugineis: fasciis duabus fuscis.

Habitat in Uplandia.

Magnitudine *P. pinguinalis*, tota subnuda, cinereo-ferruginea.

Antennæ dupli ordine pectinatae, fuscescentes.

Thorax anticæ & lateribus sanguineo-fasciatus.

Alæ incumbentes, tenuissime squamosæ, subnudæ, diaphanae, cinereo-ferrugineaæ: fasciis duabus nigris, undulatis, una ante & altera pone medium; alia fascia obsoletissima in medio, vix ad interiore marginem extensa. Subtus omnes alæ pallidiores puncto nigro in medio.

Abdomen & femora cinerea, pedibus fusco-annulatis.

A

Fe-

Femora antice sanguinea.

Noctua pyramidea: *cristata alis deflexis fuscis: strigis tribus undatis pallidis, posticis ferrugineis.*

Habitat in Uplandia, & in Svecia Australi.

Noctua pyramidea. Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 232.

Magnitudine N. *sponæ.*

Caput fuscum palpis recurvis.

Antennæ setaceæ, fuscæ.

Thorax subcristatus, fuscus, immaculatus.

Alæ deflexæ; *anticæ* supra cinereo-fuscæ fasciis tribus vel quatuor pallidis, flavescentibus vel albidis, undulatis, una in basi minima cum puncto albo inclusæ, alia ante medium postice nigro-marginata, tum ocellum album pupilla nigra, pone medium tertia fascia antice nigro-marginata intra marginem, & in ipso margine dentato quarta & quinta, obsoleta. Subtus cinereæ fascia fuscæ. *Posticæ* supra brunneæ, extus magis fuscæ; subtus cinereæ fascia & puncto nigro.

Abdomen cinereum subtus fasciis nigris.

Noctua evidens: *lævis alis incumbentibus griseis: strigis quatuor fuscis.*

Noctua quercus Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 214. an?

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudine N. *trapetzinæ*, tota grisea seu flavescentis punctis minutissimis, vix conspicuis nigris adspersa, oculis nigris.

Alæ *anticæ* incumbentes, supra fasciis quatuor, tenuibus, nigris, prima in ipsa basi vix observanda, secunda ante medium obliqua, tertia in medio

dio recta, quarta pone medium extus curvata. Puncta nulla ordinaria. Subtus fascia unica & punctum nigrum, uti & in posticis.

Noctua triangularis: *cristata alis deflexis fuscis: triangulo fasciaque dentata flavo-marginatis.*

Habitat in Hallandia P. Osbeck, in Uplandia Westrin. Magnitudo, statura & facies N. typica.

Thorax cristatus, cinereo-fuscus, antice nigro-trifasciatus.

Alæ deflexæ, fuscæ: *anticæ supra pallido nigroque undulatae & reticulatae.* In medio alæ versus marginem exteriorem macula magna triangularis, vix ad inferiorem marginem extensa, flavo-marginata. Pone hanc fascia dentata, postice flavo marginata. Ipse margo albo-nigroque dentatus. Intra imaginem ordo punctorum, circiter septem, nigrorum, lunarium, antice flavo-marginatorum: Stigmata ordinaria nulla distincta. Subtus ferrugineo-fuscæ, immaculatae uti & inferiores supra. Subtus inferiores ferrugineæ arcu puncto que fusco.

Pedes albo maculati.

Noctua typhæ: *cristata alis incumbentibus canis fusco striatis, margine postico nigro-punctato.*

Habitat in Typhæ angustifoliæ culmis; lecta in Westrogothiæ horto Prædii Comitisf. Ekeblad, Mariæ-dahl dicti.

Larva grisea, nuda absque pilis, 12 lineas longa, in pupam abiens intra culmos typhæ mense Julio, & in imaginem completam mense Augusto. Cl. Bierkander.

Magnitudine P. *pinguinalis*, tota cinerca seu cana,
glabra.

Antennæ setaceæ.

Thorax immaculatus, hirsutus, cristatus.

Alæ incumbentes, rotundatae. *Anticæ* fusco-striatae
striis obsoletis subramosis; intra marginem posti-
cum ordo punctorum octo nigrorum. Subtus
concolores punctis marginalibus vix conspicuis.
Posticæ supra immaculatae, subtus puncto in me-
dio nigro.

Geometra thymiaria: *pectinicornis* alis viridibus: stri-
ga obsoleta fusca albaque.

P. *Thymiaria* Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 241.

Habitat in Hallandia P. Osbeck.

Duplo minor G. *papilionaria* & viridior.

Antennæ pectinatae, cinereæ.

Alæ anticæ rotundatae, saturate virides: in medio
lunula & pone medium fascia fusca obsoleta; in-
tra marginem posticum fascia alba, undata, obso-
leta. *Posticæ* supra albidae. Omnes subtus cine-
reæ fascia fusca.

Geometra corylaria: *pectinicornis* alis fuscis: fascia
maculari media margineque postico flavo-maculato.

Habitat in Hallandiæ corylo. P. Osbeck.

Magnitudine fere G. *papilionaria*æ, tota fusca.

Antennæ pectinatae, thoracis longitudine.

Alæ omnes rotundatae, integræ, planæ. *Anticæ* fa-
scia in medio latissima, in margine externo inci-
piens & latior, marginem internum non tangens.
Juxta apicem macula & in margine postico ma-
culæ

cultæ quinque. Posticæ supra macula oblonga obsoleta in medio & sex in margine pestico. Subtus omnes concolores.

Variat forsan sexu: colore fasciarum & macularum flavo & aurantiaco; fascia media integra & ex maculis constante: macula apicis magna & minutissima.

Rœsel. Inf. T. 3. p. 17. t. 3. an?

Geometra vespertaria: *pectinicornis alis flavis: strigis duabus, posteriore limbum obscurum terminante.*

Phalæna vespertaria. Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 249.
Habitat in Svecia australi. Winbom Theol. Adj.

Media, tota flava seu aurantiaca.

Alæ rotundatæ, parum dentatæ. Anticæ fascia tenui curva, cum margine purpureo circulum constitente purpureum. Punctum in medio purpureo-fuscum. Fascia lata subabrupta purpurea marginem posticum terminat. Omnes subtus & Posticæ supra puncto minimo in medio & margine postico purpureo notantur. *Variat* quoque alis tenuissime punctatis.

Geometra dentaria: *pectinicornis alis subfalcatis dentatis pallidis: strigis duabus puncto margineque ferrugineis.*

Phalæna dentaria? Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 245.

Magnitudine G. *falcatariae* vel paulo minor, tota pallide lutea.

Antennæ pectinatæ.

Alæ anticæ falcatæ, dentatæ dentibus duobus majoribus; fasciæ duæ ferrugineæ, tenues in medio, anterior obliqua, posterior undata. Punctum minutum inter fascias versus exteriorem marginem. Margo posticus ferrugineus. *Posticæ* supra & omnes subtus pallidiores puncto fusco.

Geometra cultraria: *pectinicornis alis subfalcatis luteis: fascia punctoque saturationibus.*

Phalæna cultraria. Fabric. Sp. Ins. T. 2. p. 243.

Statura & magnitudine *G. falcatarie*, tota luteo-ferruginea.

Antennæ alterius sexus setaceæ.

Alæ omnes luteo-ferrugineæ, & subtus immaculatae; *Anticæ* subfalcatae; supra omnes fascia saturatione in medio, versus exteriorem marginem latiore & puncto fusco minimo notata.

Geometra deleataria: *pectinicornis alis viridi-albis: fasciis tribus lineolaque apicis nigra.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudo media seu *G. Vavariæ*.

Antennæ pectinatae, fuscæ.

Alæ albo-virescentes: fascia prima prope basin nigra, curva; secunda & tertia in medio, dentato-undatae, in margine interno concurrentes. Linea obliqua nigra in ipso apice. Subtus pallidiores area puncto nigro.

Geometra pictaria: *pectinicornis alis cinereis pulv- rulentis: fasciis duabus circumflexis punctoque nigris.*

Habitat in Hallandia P. Osbeck; Uplandia Ekelund.

Ma-

Magnitudine G. *vavariæ*, tota fusco-cinereâ & punctis minutissimis nigris irrorata.

Antennæ alterius sexus pectinatæ, alterius setaceæ, serratae.

Alæ anticæ bifasciatæ : fascia altera prope basin curva, altera intra marginem valde undulata & circumflexa nigra. Margo posticus nigro-punctatus. Punctum nigrum inter fascias & interdum flave-do conspersa. *Posticæ* arcu puncto que nigro.

Geometra fagaria : *pectinicornis alis cinereis pulv-
rulentis* : fasciis duabus dentatis puncto que nigris.

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudine media, tota cinerea seu albida punctis minutissimis nigris irrorata.

Antennæ pectinatæ, cinereæ.

Alæ anticæ supra fasciis duabus nigris, altera prope basin dentata, altera infra marginem, valde undulata & quasi e punctis nigris concatenata. Punctum in medio oblongum. In ipso margine puncta minutissima vix conspicua nigra. *Posticæ* & omnes subtus fascia postica & puncto nigro.

Geometra scopularia: *pectinicornis alis albidis* : fas-
ciis quatuor undatis nigris.

Magnitudine G. *vavariæ*, tota cinereo-alba.

Antennæ alterius sexus setaceæ.

Alæ anticæ fasciis quatuor undulatis nigris absque puncto ; subtus hæ fasciæ obsoletiores. *Posticæ* puncto fascia que unica nigris. Subtus omnes arcu puncto que nigris. Puncta marginis alarum nulla.

Geometra 4-fasciaria: pectinicornis alis cinereis: fasciis quatuor obsoletis fuscis.

De Geer Inf. T. 2. p. 357. t. 6. f. 4.

Phalæna plumbaria? Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 258.

Habitat Upsaliæ. In Westrogothia Leonh. Gyllenhahl.
Media alis cinereo-albis, nitentibus.

Antennæ alterius sexus pectinatae apice setaceo, alterius setaceæ totæ.

Alæ anticæ fasciis quatuor fuscis albæ adiectis, unde videntur saepe quasi fasciæ quatuor albæ pellucidæ margine altero nigro: prima fascia prope basin, secunda juxta hanc, utraque undulata; tertia pone medium, undata, saturatior; quarta prope hanc intra marginem undulata. Punctum oblongum fuscum inter secundam & tertiam fasciam, versus marginem externum. Posticæ pallidiores, immaculatae. Omnes subtus pallide fuscæ puncto nigro.

Geometra vittata: seticornis alis purpurascens: vitta pallido.

Magnitudine P. *purpuralis*, tota fusco-purpurascens, alis omnibus in medio vitta pallida recta.

Geometra immaculata: seticornis alis omnibus viridis: immaculatis.

Habitat Upsaliæ.

Major paullo G. viridata.

Antennæ setaceæ, supra niveæ, subtus cinereæ.

Alæ omnes rotundatae, integræ, saturate virides, immaculatae utrinque, sed subtus pallidiores.

Thorax & abdomen supra viridia.

Ab.

Abdomen subtus & *pedes* cinerei.

Geometra maculata: *pectinicornis* alis omnibus flavis: nigro maculatis.

Phalæna macularia. Lin. Syst. Nat. T. 1. p. 862.

Phalæna maculata. Fabric. Sp. Int. T. 2. p. 264.

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Media alis rotundatis flavis seu aurantiacis: maculæ oblongæ & inæquales per totam superficiem alarum omnium utrinque fuscæ.

Antennæ setaceæ, fuscæ.

Corpus fuscum.

Geometra pulverata: *seticornis* alis aurantiacis nigro-pulverulentis: puncto atro.

Magnitudine G. cratægatam superat.

Antennæ setaceæ, *caput*, *thorax*, *abdomen*, *pedes* fulca.

Alæ rotundatae, integræ, ciliatae. *Anticæ* supra fuscæ-ferrugineaæ, pulvere nigro dense adspersæ, puncto in medio & maculis marginalibus aliquot nigris obsoletis. Subtus concolores, sed pallidiores. *Posticæ* supra aurantiacea, parum nigro-pulverulentæ, puncto in medio magno nigro. Subtus obscuriores, magis nigro-pulverulentæ, puncto & fascia obsoleta nigra.

Geometra brunneata: *seticornis* alis ferrugineaæ: fasciis quatuor fuscis abruptis.

Habitat Upſaliæ.

Magnitudine G. chærophyllatæ, tota ferrugineo-pulverulenta.

Antennæ alterius sexus parum pectinatae, alterius setaceaæ.

B

Alæ

Alæ integræ, rotundatæ. *Anticæ* utrinque fasciis quatuor; *Posticæ* duabus fuscis. Supra hæ fasciæ abruptæ, nec omnes transversæ, interdum obsoletæ & vix conspicuæ.

Geometra similata: *seticornis alis ferrugineis*: fasciis quatuor transversis fuscis.

Inter minores, magnitudine P. *purpuralis*, tota ferruginea.

Antennæ setaceæ.

Alæ omnes integræ, rotundatæ, ciliatæ, fasciis quatuor undatis transversis fuscis supra & subtus notatæ, licet color & fasciæ subtus sint saturatores. Similis G. *brunneatæ*, sed duplo minor & fasciæ hec transversæ, undulatæ.

Geometra flavigata: *seticornis alis flavis*: fasciis quatuor duplicatis saturationibus.

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Inter minores magnitudine P. *purpuralis*.

Antennæ setaceæ & totum corpus flavum.

Alæ rotundatæ integræ, omnes pallide flavæ. *Anticæ* strigis quatuor parium, *Posticæ* duorum parium, undulatis, aurantiacis seu saturate flavis.

Anticæ puncto nigro in medio & *posticæ* basi albæ. Subtus concolores.

Geometra crenata: *seticornis alis dentatis ferrugineis*: fascia strigisque undulatis nigris.

Habitat in Hallandia: P. Osbeck.

Major G. *chenopodiata*, tota fusco-ferruginea.

Alæ anticæ supra fascia lata ab apice per medium ad apicem alæ oppositæ ducta, nigra. Strigæ ante-

te hanc paucæ, pone illam plurimæ undulatae nigrae. Margo posticus crenulatus. Posticæ supra basi pallidæ, dein totæ testæ strigis undulatis nigris, margine dentato. Subtus omnes cinereæ puncto & strigis obsoletis fuscis.

Geometra cuspidata: *seticornis alis flavis: fascia fusca dentata apicisque linea nigra.*

Habitat Upsaliæ.

Minor G. *populata*, tota lutea seu aurantiaca.

Antennæ setaceæ.

Alæ anticae supra fascia in basi obsoleta curva fusca; in medio fascia lata fusca seu purpurascens fulsa, antice crenata, postice dentata dente unico majore & magis exerto; in ipso apice linea fusca obliqua ut in G. *populata*. Subtus striga & linea apicis obsoleta. Posticæ pallide flavæ, immaculatae.

Geometra variata: *seticornis alis albis: fasciis tribus dentatis fuscis flavo-maculatis.*

Habitat Upsaliæ; in Hallandia. P. Osbeck.

Media seu G. *chenopodiata* paulo minor.

Antennæ setaceæ, cinereæ.

Alæ rotundatae, integræ. Anticae albæ nigro flavo-que fasciatæ: fascia prima in basi dentata; secunda in medio maculam albam includentem, extus latior, dentata dente uno maximo exerto: tertia in apice e pluribus strigis compofita & linea apicis nigra obliqua ut in G. *populata*. C nigrum obsoletum in media ala. Posticæ pone fordide-albæ, immaculatae. Omnes subtus fordide albæ strigis ob-

obsoletis. Flavedo sordida in primis ante fasciam apicis.

Variat valde hæc species.

Geometra obliquata: *seticornis alis albis: fasciis duabus obliquis, lineola apicis puncto fuscis.*

Habitat Upsaliæ.

Magnitudine P. *purpuralis*, tota cinereo-albida.

Antennæ setaceæ.

Alæ rotundatæ, integræ. *Anticæ* supra fascia in basi tenui obsoleta; alia ante & alia post medium a margine externo versus dorsum obliqua, cum puncto intermedio nigro. In apice lineola nigra continua in fasciam obliquam obsoletam, intra quam alia obsoleta parallela. *Posticæ* fasciis pluribus geniculatis fuscis.

Geometra reticulata: *seticornis alis anticus fuscis alto reticulatis, posticis albis fusco-fasciatis.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Media magnitudine G. *tavariae*.

Antennæ setaceæ, cinereæ.

Alæ anticæ rotundatæ, supra fuscæ, strigis albis curvis, undulatis, confluentibus reticulatæ. *Posticæ* albidæ strigis fuscis, in primis postice. Subtus omnes pallidiores, concolores.

Corpus & pedes cinerei.

Geometra nebulata: *seticornis alis cinereis: fasciis duplicatis undatis & nigro inscriptis.*

Media seu magnitudine G. *prunatae*.

Antennæ setaceæ, cinereæ.

Alæ rotundatæ, integræ. *Anticæ* supra cinereo-albi-

bidæ, fasciis confertis circiter sex parium, undulato-dentatis, fuscis; in media ala lineola nigra & pone hanc k nigrum minimum obsoletum. Posticæ albæ prope marginem posticum strigarum fuscum undulatarum pari & intra ipsum marginem striga nigra. In medio alæ rudimentum strigæ, obsoletum sæpe. Subtus omnes fordide albæ undulis obsoletis fuscis.

Geometra trifasciata: seticornis alis albis: fasciis duabus latis compositis strigis undulatis.

Habitat in Hallandia. P. Osbeck:

Media seu magnitudine G. *chenopodiatae*.

Antennæ setaceæ, fuscæ.

Alæ rotundatæ, integræ. Anticæ supra albidae, seu fascia lata alba in basi & alia latior in medio, cui c nigrum inscriptum. Ante medium fascia lata obliqua & alia in apice latior, composita e quatuor strigis dentato-undulatis fuscis. Posticæ albæ, versus apicem strigis tribus obsoletis fuscis. Omnes subtus fordide albæ puncto in medio & postice strigis tribus obsoletis fuscis.

Similis G. *nebulatae*, sed distincta fasciis albis.

Geometra furcata: seticornis alis cinereis: fascia simplici bifida & trifida fuscis.

Habitat Upsaliæ. Westrin.

Magnitudine G. *chenopodiatae*.

Antennæ setaceæ, fuscæ.

Alæ integræ, rotundatæ; anticæ cinereæ, nigro-pulverulentæ & fasciatæ: fascia tenuis in ipsa basi & alia prope hanc simplex: in medio fascia lata ver-

sus marginem externum bifida: in angulo ani fascia lata triplicem ramum exserens: Subtus canæ fasciis obsoletis. Posticæ utrinque canæ puncto & arcu vix visibili.

Geometra violata: *seticornis alis albis: limbo fascia terminali nigro-ferrugineo-violaceo-que undulata.*

G. succenjuriata paulo major.

Antennæ setaceæ, nigræ.

Alæ rotundatæ, integræ, niveæ: fasciæ duæ tenues obsoletæ ante medium fuscæ. Limbus marginis postici late fasciatus lituris confluentibus, valde undulatis, nigris & ferrugineis, inclientibus fasciam e maculis cœruleis. Subtus concolores sed magis obsolete.

Geometra oblongata: *seticornis alis niveis: macula fusca punctum nigrum includente.*

Magnitudo & facies *G. nymphæatæ.*

Antennæ setaceæ, fuscæ.

Thorax & abdomen albida.

Alæ oblongæ, basi angustatæ, rotundatæ, integræ, omnes niveæ: Anticæ supra in margine externo punctis tribus prope basin nigris minutis: in medio macula majuscula fusca, antice punctum nigrum lunatum includente; pone hanc fascia curva fusca & alia undulata intra marginem. Mar-
go albus punctis septem fuscis. Posticæ puncto in
medio minuto & fascia dupli undulata fusca in-
tra marginem nigro maculatum. Subtus alæ sor-
dide albæ, concolores.

Pyralis sacralis: *alis pallide flavescensibus: striga obli-
qua purpurea.* Pha-

Phalæna sacraria Linn. Syst. Nat. T. 1. p. 863. Fabric. Sp. Inf. T. 2. p. 252.

Magnitudo & facies omnino *P. forficalis*; tota pallide flavescens & immaculata præter fasciam purascentem, oblique ab apice alæ ad medium dorsi ducta.

Alæ inferiores albidae, immaculatae.

Pyralis ocellaris: *alis cinereis*: *fascia curva maculaque ocellari fusca*.

Palpi breves. *Antennæ* setaceæ.

P. forficali paulo minor, alis magis obtusis & inflexis apice, tota cinereo-flavescens. In *alis antecis* fascia obsoleta, tenuissima, fusca paulo intra apicem, versus marginem exteriorem curvata: ante hanc macula purpureo-fusca puncto atro. Ab hac macula interdum litura tenuissima fusca versus marginem interiorem ducta. Alæ *posticæ* immaculatae.

Differt a *P. forficali*: 1:o linea obliqua non ad apicem alæ, sed versus marginem exteriorem directa. 2:o alis obtusis. 3:o alis inferioribus fuscis.

Varietas hujus forte sexus, duplo minor e Japonia.

Pyralis nemoralis: *palpis recurvatis*, *alis griseis*: *strigis tribus fuscis*; *intermedia flexuosa*.

Phalæna nemoralis. Fabric. Sp. Insect. T. 2. p. 271. Syst. Entom. p. 642.

Kleeman Inf. T. 1. tab. 38. f. 9, 10. an?

Alæ flavo-cinereæ: fascia secunda tenuissima, valde flexuosa; tertia lunaris latior. Fascia tenuissima fusca intra cilia marginis

Pyra-

Pyralis fordialis: alis fuscis immaculatis.

Habitat circum Upsaliam.

Magnitudine P. *purpuralis* tota ferrugineo-fusca,
immaculata.

Antennæ setaceæ.

*Pyralis minialis: alis sanguineis: striga serrata or-
dineque punctorum nigrorum.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudine P. *glaucinalis*, tota sanguinea.

Antennæ setaceæ.

Alæ forficatæ; *Anticæ* margine externo produeto,
saturatius rubro ante medium fascia tenuissima, ob-
soleta, fusca; pone medium fascia tenuis, valde
serrato-undulata, obliqua, nigra. Intra marginem
posticum ordo punctorum circiter sex nigrorum,
transversorum. *Posticæ* immaculatæ.

Pedes punctis paucis nigris, uti & punctum nigrum
in ipsa costa alæ.

Quandoque extimus margo alæ prope costam niger.

*Pyralis sulphuralis: alis superioribus flavis: lineis dua-
bus, punctis quinque, fasciisque duabus nigris.*

Habitat in australioribus Sveciæ provinciis. Struve.

Magnitudine P. *purpuralis*, flava fasciis punctisque
nigris. Mea potius nigra lineis fasciisque luteis.

Antennæ setaceæ & *thorax* niger.

In *alis anticus* linea flava juxta marginem interio-
rem a costa ad medium dorsi. Intra marginem
fascia undulata flava & alia in ipso margine re-
cta; in exteriori margine lituræ tres circumflexæ,
cohærentes, flavæ. *Posticæ* supra fuscæ, subtus
flavæ, fasciis duabus puncto que fuscis. Py-

Pyralis atralis: alis atris: maculis duabus niveis.

Phalæna atralis. Fabric. Sp. Inf. p. 275. Syst. Entomol. p. 645.

Habitat in Finlandia, Borgoæ.

Magnitudine P. *glaucinalis*.

Antennæ setaceæ.

Lingua spiralis, ferruginea.

Thorax niger linea utrinque aurantiaca.

Alæ omnes atræ, margine postico albicante, maculisque in singulo duabus niveis rotundis, majusculis, & in anticis adhuc tertia minutissima vix observanda.

Abdomen nigrum cingulis albis.

Pedes albi.

Pyralis nivealis: alis griseo-fuscis: maculis duabus costalibus albis, corpore niveo.

Phalæna nivealis. Fabric. Sp. Inf. p. 274.

Magnitudine P. *purpurealem* parum superans.

Antennæ fuscæ, setaceæ, subannulatae.

Palpi breves, fuscæ.

Lingua, corpus, pedes, alæ posticæ subtus niveæ.

Alæ antice albidæ, fusco-irroratae; in margine exteriori fasciæ abbreviatæ fuscæ duæ & maculæ duæ seu tres albæ. Paulo intra marginem fascia obsoleta undulata fusca & alia in margine punctis nigris. Subtus alæ hæ uti & inferiores supra fuscæ. *Alæ* posticæ punctis marginalibus distinctis & plurimis minutissimis fuscis per paginam sparsis.

Pyralis punctalis: alis ferrugineis: striga flavescente, margine exteriori albo-punctato.

Phalæna punctalis. Fabric. Sp. Insect. p. 275. Syst. Entom. p. 644.

Magnitudine P. *ferricalis*, tota fusco-ferruginea. Antennæ peñtinatae, palpis duplo longiores.

Alæ anticæ fascia flavescens-fusca paulo intra marginem, etiam subtus conspicua: in margine exteriori puncta minima alba, circiter 5 vel 7. Posticæ fuscae immaculatae.

Tortrix fagana: *alis viridibus*: *strigis tribus obliquis albis*, *antennis pedibusque fulvis*.

Pyralis fagana. Fabric. Sp. Inf. p. 276.

Rœf. inf. Tom. 4. tab. XXII. f. 4, 5.

Habitat Upsaliæ Nic. Westrin.

Caput, thorax, abdomen, alæque virides.

Antennæ, pedes, margines alarum anticarum rufescentes.

Thorax villoso-subcristatus.

Strigæ tres obliquæ albidæ in alis anticis.

Similis admodum T. *prasinæ*, sed differt eo, quod illi Alæ anticæ virides strigis duabus albis.

Alæ posticæ, abdomen & pedes albi.

Tortrix coronana: *alis nigris*: *fascia obliqua dentata rubra*.

Habitat in Westrogothia, Cl. Bjerkander.

Magnitudo & facies T. *beracleanæ*, fusca tota.

Alæ anticæ supra nigræ, nitidæ margine externo & in primis postico ciliatae. Ante medium fascia obliqua, ferruginea, albo-marginata, antrorsum dentata, margines non tangens. Subtus pallidiores, unicolores. Posticæ alæ ciliatae cinereæ utrinque.

Fa-

Fascia alarum cruribus anteriora spectat & coronam omnino refert.

Tortrix purpurana: *alis purpureis: fasciis duabus marginineque ciliari flavis.*

Magnitudine T. holmianæ.

Antennæ setaceæ, corpore paulo breviores.

Alæ antice saturate purpureæ, margine postico ciliari flavo: maculæ duæ flavæ in margine exteriori, e quibus transit striga transversa tenuissima flava, quæ maculas has in margine opposito conjungit. *Postice* saturate purpureæ margine postico ciliari & *fascia* unica flava. Subtus alæ omnes coloratae ut in pagina superiori.

Pedes flavescentes.

Abdomen purpurascens.

Tortrix montiniana: *alis purpureis: macula dorsali marginalique trigona flavis.*

Habitat in Hallandia. P. Osbeck.

Magnitudine T. holmianæ.

Caput, thorax, & antennæ flavescentes.

Alæ antice supra purpurascentes, mucula dorsali communi & alia in margine exteriori trigona flava. Margo posticus ciliatus, flavus. Subtus flavescentes, immaculatae. Posticæ albidæ immaculatae.

Pedes albi.

Tortrix Osbeckiana: *alis antice albis: arcu nigro; postice ferrugineis: fasciis fuscis scabris.*

Habitat in Hallandia. Pastor Doctor Osbeck. Upfaliæ Nicol. Westrin.

Magnitudine T. Læflingianæ.

Caput & antennæ fuscæ.

Thorax albus.

Alæ anticæ a basi ad medium albæ puncto utrinque unico minimo nigro & arcu communi nigro, cruribus retrorsum spectantibus, e squamis elevatis scabris; postice ferrugineæ: fasciis fuscis obliquis, undulatis e squamulis elevatis scabris. Subtus alæ *anticæ & posticæ* totæ fuscæ, obsolete subundulatæ.

Differit ab P. asperana Fabricii: alarum anticarum arcu & pueris.

Tortrix scriptana: *alis ferrugineis nigro-irroratis, postice lineolis quatuor nigris, lituris marginalibus, albis nigrisque.*

Magnitudo, facies & similitudo summa *T. arcuata*, tota ferruginea, nigro-irrorata.

Alarum anticarum margo exterior variis litoris albis nigrisque alternis obliquis notatur. Intra marginem posticum litura plumbeo-argentea, curva & lineæ quatuor, breves, nigræ, parallelæ.

Pedes flavescentes, nigro maculati.

Tortrix scabrina: *alis cinereis fusco-subfasciatis scabris, margine exteriore exciso.*

Pyralis scabrina: Fabric. Sp. Inf. p. 284.

Magnitudine *T. Læflingiana*, supra albido-cinerea, subtus fusca margine omni albo.

Alæ anticæ minus scabré, quam in *T. litterana*, fasciis duabus fuscis, altera in medio arcuata cruribus antrorsum spectantibus, altera infra apicem obliqua undulata, abrupta. Intra ipsum marginem fascia tenuissima, fusca, obsolete. Por-

Tortrix litterana: alis virescentibus: squamis elevatis scabris.

Pyralis squamana: Fabric. Sp. Inf. p. 284. Syst. Entomol. p. 651.

Pyralis litterana Fabric. Sp. Inf. p. 284. Syst. Entomol. p. 646.

Magnitudine *T. Læflingianæ*, supra tota virescens, squamis elevatis scabra. Subtus fusca, lævis.

Variet. a. *Punctata* duo versus thoracem, in aliis anticis & in medio versus marginem exteriorem puncta alia duo nigra.

— b. alæ anticæ albido-virescentes absque punctis nigris.

Tortrix stræmiana: alis cinereo-fuscis: maculis duabus dorsatibus albis.

Pyralis stræmiana. Fabric. Sp. Inf. p. 280.

Habitat in Sveciæ, in primis australioribus Provinciis. In Hallandia Osbeck. In Westrogothia Bjerkanter. In Uplandia Joh. Mart. Ekelund.

Inter minores hujus generis, tota cinerea, nigro-irrorata.

Caput & thorax albidus.

Alæ anticæ basi versus interiorem marginem parum albantes; in medio versus marginem internum macula utrinque alba, sub quadrata, postice versus anum fascia cinerea obliqua. Margo exterior variis maculis bifidis notatur. *Alæ posticæ* fuscæ.

Pedes albi, nigro-maculati.

Interdum macula alba anterior & media communicant.

Tortrix Westriniana: alis flavis: fascia bifida punctis que duobus ferrugineis. C 3 Ha-

Habitat Upsaliæ & alibi.

Magnitudo & facies T. Lecheanæ.

Caput villosum, testaceum.

Palpi apice bifidi, villoſi, brevissimi.

Antennæ ferrugineæ, corpore triplo breviores,

Thorax ferrugineus, villoſus.

Alæ antice obtusissimæ, luteæ, nitidæ; supra prope basin macula oblonga, in punctum manifestum terminata & margo ferrugineus: in medio alæ a margine externo ad angulum ani fascia obliqua, lata, versus marginem externum & versus angulum ani bifida, in medio conjuncta lineola nigra: in ipso alæ apice litura minima & fasciæ aliquot tenuissimæ, undulatæ, ferrugineæ. Subtus fuscæ margine luteo. *Posticæ* fuscæ apice lutescente.

Abdomen & *pedes* flavescentes.

Tortrix Gyllenhahliana: *alis niveis macula baseos communi fuscæ apicisque triangulari ferruginea.*

Habitat in Westrogothia Bjerkanter & Leonhard.

Gyllenhahl.

Magnitudo & similitudo T. Moderianæ.

Caput, palpi, thorax, pedes, abdomen argentea.

Antennæ albo nigroque annulatæ, corpore dimidio breviores.

Alæ antice obtusæ; supra niveæ macula communi in interiori margine, subrotunda, fusco-ferruginea, obsoleta: a medio margine exteriori ad angulum ani fascia obliqua ferruginea, quæ cum marginali conjuncta triangulum album in externo margine includit. Litura una vel duæ in fascia postica plum-

plumbeo-argentea, vix observanda. Subtus uti & posticæ utrinque fuscæ margine ciliato, pallido.

Tortrix retusana: *alis luteis retusis, linea dorsali capiteque albis.*
Habitat Upsaliæ.

Magnitudine T. *beracleanae.*

Caput niveum oculis nigris.

Palpi porrecti, flavescentes, breves.

Antennæ albo nigroque annulatae, longitudine dimidia corporis.

Thorax flavus dorso albo.

Aleæ deflexæ; *anticæ* forficatae & retuso-subfalcatae, supra luteæ, testaceo tenuissime reticulatae, linea in basi & margine tenuiori angustissima alba. *Posticæ* fuscæ margine omni albo, ciliato.

Tortrix ferrugana: *alis ferrugineis puncto albo.*

Similis priori magnitudine & statura; sed caput, thorax & aleæ anticæ ferrugineæ.

Palpi brevissimi, porrecti.

Antennæ fuscæ, corpore triplo breviores.

Aleæ anticæ retusæ, unicolores, puncto in medio minimo, quasi e squama erecta, albido. *Posticæ* fuscæ margine albido, ciliato.

Tortrix punctana: *alis cinereis fusco-fasciatis, punctis distinctis nigris.*

Magnitudine T. *hamane.*

Caput cinereum *palpis* brevibus cinereis.

Antennæ fusco cinereæ, corpore triplo breviores.

Thorax antice fascia nigra.

Aleæ anticæ obtusissimæ, cinereæ fasciis tribus vel quatuor fuscis, undulatis, obsoletis: prope basin fascia obliqua e punctis tribus in singula ala; in medio inter fascias puncta duo nigra, interiore minori; ipse margo nigro-punctatus. Subtus fuscæ immaculatae. *Posticæ* utrinque albæ margine postico nigro.

Abdomen & pedes albi.

Pox.

Tortrix lunana: alis cinereis: fasciis duabus fuscis lunatis, antennis pectinatis.

Parva, magnitudine T. Bergmannianæ.

Caput, thorax, corpus, pedes & antennæ pectinatae, fuscæ. Alæ anticæ deflexæ, obtuse, cinereæ, fusco tenuissime irroratae, fasciis duabus nigris: altera in medio alarum, utrinque attenuata, lunata cruribus anteriora spectantibus; altera intra apicem, margine externo dilatata. Postice supra fuscæ. Alæ omnes subitus cinereæ, nigro-irroratae.

Tinea Bjerkandrella: alis fuscis nigro-undulatis: punctis sparsis argenteis.

Habitat in Kinnekulle Westrogothiæ.

Larva viridis, lateribus flavescensibus, tres lineas longa: caput brunneum; primi articuli prope caput punctis duobus nigris, reliqui tres punctis in triangulum positis. Larva deorsum flexa & filo pendens se demittit. Edit inulam salicinam, cujus folia cum caule connectit. Rete eodem modo ac T. Evonymella fabricat; ante metamorphosin sub terra se condit. Pupa mense Julio & post quatuordecim circiter dies Imago eodem mense prodit. Commminster Bjerkander, Observator indefessus & bene meritus.

Magnitudo & statura omnino T. strobilellæ.

Antennæ filiformes, albo nigroque annulatae, corpore dimidio breviores.

Palpi recurvi, fusi.

Thorax fuscus, auro renitens.

Alæ anticæ convolutæ, obtuse, fuscæ fasciis variis nigris, auratis: puncta plurima, sparsa, argentea: in basi duas oblongas & tertium minimum; tria in medio transversa & unum pone hoc prope exteriorem marginem; alæ intra apicem quasi impressæ, punctis circiter quinque circum lacunam in orbem dispositis.

Caput & pedes albi punctis fusco-argenteis.

Abdomen fuscum,



N. pyramidea



N. evidens



N. triangularis



G. vespertaria



G. pictaria



G. maculata



G. pulveraria



G. cuspidata



G. obliquata



G. furcata



G. violata



G. oblongata



P. ocellaris



P. ocellaria



P. nemoralis



P. Sulphuralis



P. alralis



T. coronana



T. obseckiana



T. lillerana



T. Wustriniana



T. Gyllenhahliana



T. punctana



T. Bjerkandrella



T. Bjerkandrella



D. D.
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA.
SISTENS
INSECTA SVECICA.

QUORUM
PARTEM SECUNDAM.
CONS. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE
CAR. P. THUNBERG,

EQUITIS AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD. CÆSAR.
NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LONDINENS. HOIMIENS. SOCIET. SCIENT. UPSAL.
PHILADELPH. PATR. HOLM. BEROL. NAT. SCRUT. LUNDENS. HARLEM. AMSTELD.
ZELAND. NIDROSIENS. HAIENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIM-
BURG. ET NAT. STUDIOS. [EIID.] MEMBRO; NEC NON ACAD SCIENT. PARIS. MONSPELIENS.
AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND.
OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT
PETRUS ERICUS BECKLIN,
STOCKHOLMIENSIS.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. X. DEC. MDCCXCI.
H. A. M. S.

UPSALIÆ,
LITTERIS VIDUÆ DIRECT. JOH. EDMAN.

DYGDÄDLA

FRU

SÖPPIELÄ ELLS. BECKLIN

FÖDD HOLJERT,

MIN GUNSTIGA FARMOR

De flere prof af godhet och ynnest, bvarmed min gunstiga Farmor täkts omfamna mig från spådaste barna åren, förbinda mig at af denna förstlingen af mina ungdoms öfningar, göra EDER et vördnadsfullt offer, hvilket om det synes alt för ringa mot EDER ömbet och välgärningar, likväl skall tolka den takfamma förbindelse, bvarmed jag till döden har åran framlefva.

MIN GUNSTIGA FARMORS

Lydigste Sonson.

PER ERIC BECKLIN.


HANDELSMANNEN
UTI
UPSALA
ÄDEL OCH HÖGAKTAD
HERR GUSTAF BECKLIN,
SAMT
FRU ANNAL. M. BECKLIN,
FÖDD SANDBERG.

MINE HULDASTE FÖRÅLDRAR

Tillåten värdaste Föräldrar! då jag offerar EDER desse blad, såsom första frugten af den ömhet och mōda i haft ospard på min upfostran, at jag då tillika tager mig anledning at åfven för det allmänna tala om den taksamhet jag är EDER skyldig, men icke altid haft tillfälle at yttra, då jag varit innesluten uti EDRA armar. Ågde min vältalighet den konst och det behag, som de fina djuren jag nu beskrifvit, kan hända jag då kunde smikra mig at tala få värdigt och få ömt, som ämnets vigt och min pligt fordra. Men nu, då dessa förmögenheter fattas mig, så är alt hvad jag kan göra, at önska EDER en få lång lifstid, at den, som J ämnat till hugnad på EDER älderdom, må få tillfälle at visa, huru omöjeligt han kan svika uti detta EDERT ömma hopp. Har åran till döden framlefva

MINE HULDASTE FÖRÅLDRARS

Lydigste Son
PER ERIC BECKLIN.



PROOEMIUM.

Prodiit editio prior Faunæ Svecicæ LINNEI anno 1746, 926 continens species insectorum; altera, quæ edita fuit 1761, emendata & ab auctore ipso aucta ac locupletata fuit speciebus adhuc 765, sic ut circa illud tempus 1691 species insectorum svecicorum fuerint cognitæ & maximam partem descriptæ. Hicce vero numerus sensim auctus fuit in Operibus aliis Illustr. LINNEI, ut in Systemate Animalium 1767 edito. ubi recensentur sequentes incolæ Svecicæ, scilicet:

<i>Scarabæus plagiatus.</i>	<i>Tenebrio minutus.</i>
<i>Ptinus imperialis.</i>	<i>linearis.</i>
<i>Silpha juccinæta.</i>	<i>Staphylinus cantbarellus.</i>
<i>fusca.</i>	<i>piceus.</i>
<i>atomaria.</i>	
<i>Coccinella 6-punctata.</i>	<i>Cimex semislavus.</i>
<i>10-guttata.</i>	<i>laniarius.</i>
<i>Chrysomela minutissima.</i>	<i>superciliosus.</i>
<i>fastuosa.</i>	<i>melanocephalus.</i>
<i>Attelabus melanurus.</i>	<i>ferrugineus.</i>
<i>Cerambyx deplanatus.</i>	<i>Phalæna dipsacea.</i>
<i>Leptura alni.</i>	<i>Brunnichiana.</i>
<i>Elatier dermestoides.</i>	<i>Podælla.</i>
<i>Tenebrio depressus.</i>	<i>Scopolella.</i>
	<i>occultella.</i>
	<i>Pbry-</i>

D

<i>Phryganea marginata.</i>	<i>Tipula virens.</i>
<i>Cynips inanita.</i>	<i>viridula.</i>
<i>Tenthredo nigra.</i>	<i>culiciformis.</i>
<i>vafra.</i>	<i>minutissima.</i>
<i>Sirex pygmæus.</i>	<i>Musca trilineata</i>
<i>Icbneumon fomentator.</i>	<i>furta.</i>
<i>formicatus.</i>	<i>subultans.</i>
<i>atomus.</i>	<i>cueullaria.</i>
<i>Sphex palmipes.</i>	<i>terrestris.</i>
<i>ephippis.</i>	<i>combinata.</i>
<i>Chrysis bidentata.</i>	<i>q-fundata.</i>
<i>succincta.</i>	<i>Conops subcoleopterat.</i>
<i>Apis Fabriciana.</i>	<i>Podura minuta.</i>
<i>Tipula enficornis.</i>	<i>vaga.</i>
<i>annulata.</i>	<i>Aranea a-lineata.</i>

Ec in appendice tertii Tomi seu Systematis Mineralium, anno 1768 impresso:

<i>Curculio trifoli.</i>	<i>Heunerobius cruciatus.</i>
<i>Tenebrio festinans.</i>	<i>Aranea tigrina.</i>

Longe tamen absuit, ut numerus Insectorum Svecicorum jam fuit absolutus. Detecta enim fuerunt multa alia individua, ante non visa; & quo magis crescit Entomologiæ studium, eo plures quotannis e latebris suis in lucem producuntur novæ species. Generosiss. Dom. Baro & Maresch. DE GEER non paucas memorat species, in elegantissimo suo opere Entomologico. Illust. Entomolog. Prof. FABRICIUS varias præterea species Insectorum, in Svecia reperitorum recenset, ut in Systemate Entomologico 1775 impresso:

<i>Hister brumneus.</i>	<i>Alucita dentella.</i>
<i>Byrrhus æneus.</i>	<i>sylvella.</i>
<i>Opatrum minutum.</i>	<i>lucella.</i>
<i>Coccinella impunctata.</i>	<i>flavella.</i>
13-maculata.	
<i>Curculio scabriculus.</i>	<i>Ephemera marginata.</i>
<tristis.< td=""><td><i>Pbryganea analis.</i></td></tristis.<>	<i>Pbryganea analis.</i>
<punctatus.< p=""></punctatus.<>	<i>pilosa.</i>
<obscurus.< td=""><td><i>Tenthredo obscura.</i></td></obscurus.<>	<i>Tenthredo obscura.</i>
	<i>pavida.</i>
	<i>opaca.</i>
<i>Elater striatus.</i>	<i>Ichneumon debellator.</i>
<i>Elapbrus rupestris.</i>	<i>variegator.</i>
<i>Hydromphilus 2-punctatus.</i>	<i>falcator.</i>
<i>Dytiscus depresso-s.</i>	<i>agilis.</i>
<i>Scarites clavicornis.</i>	<i>curvitans.</i>
<i>Cimex sylvaticus.</i>	<i>pedestris.</i>
clavipes.	
<i>Bombyx lata.</i>	<i>Andræna hemorrhoidalis.</i>
<i>Noctua oculata.</i>	<i>Nomada cingulata.</i>
<tristis.< td=""><td><i>Formica tuberum.</i></td></tristis.<>	<i>Formica tuberum.</i>
<i>Phalæna maculana.</i>	<i>Tipula fasciata.</i>
letana.	<i>cincta.</i>
rivellana.	<i>thomæ.</i>
strigana.	<i>Rhagio clavipes.</i>
depressana.	<i>Empis cinerea.</i>

In Speciebus Insectorum 1781 editis:

<i>Opatrum gibbum.</i>	<i>Staphylinus nitidulus.</i>
tibiale.	<i>Phalæna fuliginaria.</i>
<i>Dytiscus 6-pustulatus.</i>	<i>Tenthredo lateralis.</i>
inæqualis.	<i>Tipula sericea.</i>

D 2

In-

*) *Coccinella rivularis* minime in Svecia reperitur, sed habitat in Cap. bonæ spēi Africes.

Inqve Mantisla insectorum 1787 edita:

<i>Scarabaeus arenarius.</i>	<i>Staphylinus melanocephalus.</i>
<i>Dermestes pallipes.</i>	<i>ferrugatus.</i>
<i>lunatus.</i>	
<i>Bostrichus elongatus.</i>	<i>Cimex pallens.</i>
<i>Sphaeridium luteum.</i>	<i>vulgans.</i>
<i>Bruchus varius.</i>	<i>Noctua vaccinii.</i>
<i>Ips bimaculatus.</i>	<i>fimbria.</i>
<i>nigra.</i>	<i>occulta.</i>
<i>Tritoma glabra.</i>	<i>frigilis.</i>
<i>Cryptocephalus morio.</i>	<i>Pbalæna fulvata.</i>
<i>Cistela morio.</i>	<i>obscurata.</i>
<i>Curculio lythri.</i>	<i>Pyralis niveana.</i>
<i>fraxini.</i>	<i>borana.</i>
<i>tremule.</i>	<i>paykulliana.</i>
<i>jota.</i>	<i>abitana.</i>
<i>Rhinomacer attelabeoides.</i>	<i>populana.</i>
<i>Leptura pubescens.</i>	<i>Tinea pectinella.</i>
<i>Malaebius viridis.</i>	<i>obscarella.</i>
<i>Buprestis flavomaculata.</i>	<i>Ptryganea discoidea.</i>
<i>Gyrinus bicolor.</i>	<i>Ichneumon compresus.</i>
<i>Carabus picipes.</i>	<i>Musca erythrocephala.</i>
<i>agilis.</i>	<i>douci.</i>

Celeber. Dom. Præses in Entomologia non minus, quam in aliis Historiæ Naturalis partibus optimè meritus, in Novis Actis Upsaliensibus, Vol. 4, species quadraginta circum Upsaliam plerumque inventa describit. Et in Dissertationibus, quæ Ejus sub præsidio divulgate sunt, tam de Insectis Svecicis, quam de Musæo Academicо non paucæ describuntur & recensentur indigena insecta, quæ nuperius intra Patriæ fines inventa fuerunt. In Dissertatione nimisrum de Insectis Svecicis P. I. Species

55 enumerantur; & in Partibus Musæi Academicæ
43 species, patriam nostram inhabitantes colline-
morentur. Celeb Acad. Aboënsis Professor Domi-
nus EONSDORF in Dissertatione de Genere Curculio-
nis species plures novas Sveciæ; nonnullas quoque
Dom. Meg. QVENSFL in sua Dissertatione Lund-
ni habita notas reddiderunt; atque Monographiæ
Nob. Dom. PAYKULL Staphylinos circiter 43, atque
Carabos circiter 47 describunt. Præter insecta illa,
quæ in Aëris Novis Holmensibus ab anno 1780
usque ad præsens tempus descripta sistuntur, inter
quæ reperiuntur:

<i>Lucanus parallelipipedus.</i>	<i>Tinea betulinella.</i>
<i>piceus.</i>	<i>grandævella.</i>
<i>Serropalpus striatus.</i>	<i>Jagitiella.</i>
<i>Curculio napobrasificæ.</i>	<i>labyrintbella.</i>
<i>Anobium atrum.</i>	<i>Ichnneumon labyrintbelle.</i>
<i>Elater segetis.</i>	<i>Oestrus trompe.</i>
<i>Noctua tolifera.</i>	<i>Musca napobrasificæ.</i>
<i>Tinea rubiella.</i>	<i>avenæ.</i>

Novissima Systematis animalium Linnæi editio, studio
Illustr. GMELINI 1788 &c seqq. non edita modo, sed
summopere aucta & emendata, varia insuper insecta
memorat, quæ Sveciam inhabitare dicuntur, qualia sunt:

<i>Curculio dryades.</i>	<i>Noctua quereti.</i>
<i>Calopus pygmaeus.</i>	<i>alpium.</i>
<i>Elater melanoptbalmus.</i>	<i>Tribula incornata.</i>
<i>Gryllus cinereus.</i>	<i>Musca sybileon.</i>
<i>Coccus uva.</i>	<i>Araucaria undata.</i>

Tot novis intra Sveciæ limites detectis Insectis,
facile crederes, numerum illorum jam esse comple-

tum, pluraque posthac detegenda frustra quæri.
Tantum vero abest, ut omnia adhuc detecta sint;
ut potius quotidiane nova quædam indagentur. Conti-
git mihi in Collectione publica, quam Celeb. D.
Præses non modo Academias huic liberaliter dono
obtulit, sed quam erjam quotidie auget & ampli-
ficat indefessus, ingentem Insectorum in Patriæ variis
provinciis repertorum, numerum perspicere. Hæc
insecta vel omnino sunt ante ignota, vel etiam du-
dum ante apud exterros inventa & descripta. At-
que hæc exsangvia animalcula, longe plurima, o-
pera indefessa Amicorum & Discipulorum Celeb.
D:n. Præsidis, in variis regionibus collecta fuerunt,
quorum nomina, laude digna enumerari hec me-
rentur. Sic Animalcula hæc minutiora in *Hallan-*
dia investigavit venerandus Senex D:n. OSECK; in
Westrogothia Past. BJERKANDER, D:n. PENTZ, &
Entomologorum Sveciæ facile primarius D:rus Ca-
pitaneus LEONH. GYLLENHAL; in *Westmannia* D:n.
D. HALL; in *Bleking:a* indefcessus D. RHEN; in *Ver-*
melandia D. Licenciatus HOLMER & D:n. NOREN;
in *Ostrogothia* D. WESTRIN; in *Gestricia* D. PRINTZ;
in *Finlandia* D. HAST & Mag. TÖRNER; in *Nor-*
landia & *Lapponia* Prof. WINBOM, Mag. LILJEPLAD,
RUTSTRÖM, QVENZEL, Dom. EKHOLM; circa *Stock-*
holmiam D:r. STRUVE, D. DELÉN & SCHÖNHERR; in
Sinolandia Mag. LILJEPLAD & WAHLBOM; qui omnes
cum Celebr. D. Præside sua communicare voluerunt
detecta, quæ sensim publici juris erunt facienda. Meum
vero erit, tantum ex Lepidopterorum ordine pul-
chras nonnullas Species descriptas sistere atque tuo
B. L. scrutinio mitiori subjicere.

IN-

INSECTA SVECICA.

PAPILIO ISIS. P. D. F. alis integris ferrugineis supra immaculatis, subtus antice fascia alba ocelloque solitario, posticis arcu albo ocelloque sequialtero.

Habitat in Svecia Dom. DELÉN, alii; in Roslagia GEDNER.

Alæ integræ, supra ferrugineæ seu ferrugineo-fuscæ, unicolores absque ocellis. Subtus antice ferrugineæ fascia abbreviata alba pone medium, & pone hanc ocellus solitarius; posticæ fuscæ fascia undata alba in medio & intra marginem ocellus pupillatus cum adjecto puncto aliido coeco.

S. millimus P. pamphilo, sed duplo fere major & in pluribus distinctus.

PAPILIO MATUTINA. P. N. ph. Alis fulvis: fasciis flavis nigrisque, posticis septem-punctatis.

Habitat in Svecia Dem. AFZELIUS, GRÖNDAL, alii.

Caput hirtum uti & Corpus & alæ basi supra.

Antennæ albo nigroque annulatæ, capitulo nigro, apice ferrugineo.

Palpi porrecti lanceolati, ferruginei.

Alæ omnes fulvæ. Antice supra basi nigrae, tum flavæ fere ad apicem venis nigris; in disco flavo fasciæ nigræ duæ & fasciæ duæ ferrugineæ nigromarginatæ. Margo posticus niger; intra marginem ordo macularum triangularium flavescentium, tunc fascia dentata nigra. Posticæ supra basi & in-

te-

terius nigræ, ceterum fulvæ macula baseos, fascia maculari media & maculis marginalibus septem triangularibus flavescens. Margo niger; intra maculas triangulares fascia dentata nigra, & intra hanc ordō punctorum septem, subocellarium nigrocum. Subtus omnes subconcolores, sed pallidiores margine postico flavo, & basi fulvæ maculis luteis nigro marginatis.

Abdomen supra nigrum, subtus flavescens.

Pedes flavesentes.

Variat magnitudine

Similis *P. matutinae*, sed distinctus ordine punctorum imprimis.

Similis quoque Fig. ENGRAMMELLE, Papil. d'Europe Tab. 17, se 1 diversus.

PAPILIO PHOEBE. FABRIC Mant. Ins. Vol. 2. p. 58.
ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 249 tab. 61. fig. 88 a. b. bis.

Distinguitur a *P. Delia*, cui simillimus punctis nullis nigris in anticis supra, quodque paulo major.

Optime noscitur punctis quatuor in posticarum basi subtus nigris.

PAPILIO DÉLIA FABRIC. Mant. Ins. Vol. 2. p. 60.
ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 69 tab. 19. fig. 32. c. d. e. f.

PAPILIO DICTYNNA. FABRIC Mant. Vol. 2. p. 59.
ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 252 tab. 62. fig. 31 a. b. bis Suppl. 3 p. 3 20 tab. 4 fig. 31. k.

Valde similis *P. Atbuliae* a qua vix diversa, nisi quod fulca & minor.

PAPILIO DAPHNE. FABRIC. Mant. Ins. vol. 2.
pag. 64.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europ. p. 56 tab. 15 fig. 20
a. b. c.

Habitat in Svecia & in Lapponia. LILJEBLAD.

PAPILIO FRIGGA. P. n. ph. *Alis fulvis nigro-maculatis, posticis subtus basi purpureis: fascia dentata maculari argentea serieque duplaci punctorum.*

Habitat in Lapponiæ sylvis, locis uliginosis Salice Lapponum repletis, LILJEBLAD; QVENZEL.

Magnitudine P. Ligæe.

Caput, Thorax, Abdomen supra hirsuta, ferrugineo-nigra.

Palpi porrecti, lanceolati, hirti, ferruginei, longitudo capitinis.

Lingua involuta, ferruginea.

Antennæ filiformi-articulatæ, ferrugineæ, nigro-annulatæ; capitulo nigro, apice brunneo.

Aleæ omnes supra fulvæ, nigro-venosæ; Anticeæ basi fuscæ, margine interiori hirtæ, ultra medium nigro-fasciatæ fasciis subquinis dentatis sub-connexis; ipse margo albidus nigro-punctatus: intra marginem fascia nigra, intra hanc fascia e punctis septem nigris nervos interjectis. Posticeæ nigro-venosæ, basi cinereo-hirsutæ, ultra medium nigræ maculis duabus fulvis; ipse margo albidus: intra illum ordo punctorum sex nigrorum in ipsis venis: intra hæc puncta fascia nigra transversa subinterrupta, & intra hanc fascia vel ordo punctorum sex vel se-

ptem atrorum nervos interjectorum. Subtus alæ *Anticæ* paginæ superiori conclores; *posticæ* totæ purpureæ, basi tamen ultra medium saturatius & parum villosæ. Prope basin & marginem exterio-rem macula oblonga argentea purpuream inclu-dens; cum hac connectitur fascia dentata curva e maculis dissimilibus novem argenteis, sepe pul-vore ferrugineo irroratis. Margo denticulatus, al-bidus; intra illum inter nervos nigrantes ordo punctorum septem minutissimorum nigrorum & intra hunc ordo punctorum sex, quorum quatuor intermedia argenteo-pupillata.

Abdomen subtus, & tibiæ lutescentes.

PAPILIO PALES. FABRIC. Mant. Inf. vol. 2. p. 63.
ENGRAMMELLE. Pap d'Europ. p. 144. tab. 60. fig. 21
bis a. b. c. d.

Habitat in Svecia var. α . cum descriptione P. *Pales*
FABRIC. exæste conveniens. var. β . in Norlandia &
Smolandia. Locis paludosis D. Mag. LILJEBLAD,
var. γ . in Lapponia D. Mag. QVENZEL.

Var. β . magis hirsuta supra, alis anticis intra
marginem posticum late fulco-maculatis; alæ po-sticæ supra punctis majoribus cum marginalibus
confluentibus.

Var. γ . alæ posticæ supra basi fere usque ad mar-ginem posticum nigræ & minus hirsutæ.

PAPILIO FREIJA. P. n. ph. *Alis fulvis nigro-ma-culatis, posticis subtus ferrugineis: fasciis duabus maculisque plurimis nigris albisque.*

Ha-

Habitat in Vestrobothnia juxta flumina locis graminosis D. Mag. LILJEBLAD & in Lapponia D. Mag. QVENZEL.

Magnitudine P. *Ligeæ*, totus fulvus, alis posticis saturatoribus.

Caput, Palpi, Antennæ, Thorax, Abdomen, Pedes ut in P. *Dysa*.

Alæ omnes supra fulvæ seu ferrugineæ, nigro-venosæ. *Anticæ* basi fuscæ, hirsutæ; infra basin maculæ duæ atræ, tum fascia dentata, inde fasia undato dentata versus exteriorem marginem bifida; pone hanc versus marginem exteriorem litura; pone hanc ordo punctorum septem nervos interjectorum, deinde fascia dentata & tandem fascia marginalis intra ipsum marginem albidum. *Posticæ* basi versus marginem interiore hirsutæ, ultra medium nigræ maculis duabus minutis ferrugineis; pone medium fascia punctorum sex inter nervos versus marginem internum sensim majorum. Ipse margo niger ciliis albis; intra marginem fascia dentata nigra. *Subtus anticæ* paginæ superiori concolores, sed fasciis & maculis magis obsoletis & maculis albis marginalibus albicantibus magis extantibus. *Posticæ* nigro-quadrifasciatæ fasciis undulato-dentatis; fascia prima infra basin, brevis, prope marginem exteriorem; secunda ante medium marginem nullibi attingens, includens maculam albam puncto nigro notatam; tertia pone medium, curvata, a margine ad marginem extensa; quarta intra marginem posticum dentata, maculas septem

albas triangulares includens. Inter fasciam tertiam & quartam ordo punctorum nigrorum sex. Praeterea maculae quatuor albæ baseos, & plures triangulares atque quadrato-cruciformes inter fascias nigras priores; pone fasciam tertiam nigram fascia alba e maculis lunariibus.

Similis supra P. *Difœ*, subtus diversissimus & pulcherrime variegatus.

Sexus magnitudine variat.

PAPILIO NORNA. P. n. g. *Alis cincereo flavescentibus, posticis subtus fuscocarmoratis.*

Habitat in Lapponia, $\alpha.$ $\beta.$ juxta alpes LILJEBLAD, RUTHSTRÖM, & EKHOLM; $\gamma.$ QVENZEL.

Triplex occurrit varietas. Omnes alæ supra sordide flavescentes margine omni fusco, posticarum maculis triangularibus. *Antice* subtus concolores margine extimo & apice griseo irroratae. *Postice* subtus nigro alboque marmoratae, fascia tamen lata dentata in medio & margine magis obscuris.

Caput, Palpi & Corpus hirsuta, nigra.

Antennæ fuscoc-flavescentes.

Var. $\alpha.$ alæ *antice* supra punctis nigris sesquiterciis, subtus ocellis tribus minutis; *postice* supra puncto, subtus ocello uno.

Var. $\beta.$ alæ *antice* supra punctis duobus, subtus ocellis totidem; *postice* absque punctis & ocellis.

Var. $\gamma.$ alæ *antice* & *postice* utrinque absque punctis & ocellis.

Ale tenues, semipellucidæ, rotundatae, subdentatae, omnes pallidæ, flavescentes margine antico & postico nigris-

Si-

Similis quidem ENGRAMELLE Pap. d'Europ. p. 258 tab. 64 fig. 38 a. b. bis; differt, vero alis imprimis subtus dissimilibus.

PAPILIO DISA. P. n. g. *Alis fuscis, anticis fascia ferruginea quadripunctata; posticis subtus cinereis: fascia lata arcuque nigris.*

Habitat in Lapponia. Magist. QVENZEL.

Antennæ subtus albo annulatae.

Palpi, Caput, & totum Corpus nigrum, hirtum.

Aliæ anticæ utrinque fuscæ; intra apicem fascia, margines non attingens, ferruginea, in qua puncta quatuor cæca nigra, quorum duo extima approximata. *Posticeæ* supra fuscæ, iminaculatae; subtus cinereo-griseæ: fascia in medio curva, lata, dentata, fuscæ; margo nigricans; inter marginem posticum & fasciam latam arcus undulatus, transversus, niger.

Dif fert manifeste a P. *Lappona* & *Embla*, quibus similis.

PAPILIO LAPPONA. P. n. g. *Alis fuscis, anticis fascia rufa: punctis quatuor nigris; posticis supra fuscis, subtus griseis: fascia dentata fuscæ.*

Habitat juxta kengis Vestrobothniæ D. Mag. RUTHSTRÖM; in Lapponiæ sylvis LILJEBLAD, EKHOLM; in Lapponia QVENZEL.

ENGRAMELLE Papillons d'Europe pag. 259. tab. 64 fig. 42. a. b. c. d. bis. Suppl. 3. pag. 321. tab. 4. fig. 42. a. b. quint. valde similis, vix idem.

Antennæ fuscæ, basi albidæ, clava oblonga lutea compressa.

Caput & Palpi porrecti, villoſi nigri.

Alæ rotundatæ, sub-integræ, supra omnes fuscæ, *anticæ* supra fascia lata, abbreviata. ferruginea in qua puncta quatuor nigra, tertio obsoleto; *posticæ* punctis unico vel tribus nigris, sæpe obsoletis intra marginem. Subtus *anticæ* ferrugineæ marginibus spiceaque griseis punctisque quatuor nigris; *posticæ* cinereæ fascia dentato-undulata latiori punctisque intra marginem tribus, nigris, sæpe obsoletis.

Corpus supra nigrum, subtus cinereum.

Varietas triplex occurrit:

- α. fascia rubra latiori nigro marginata.
- β. pueto in posticis alis unico.
- γ. punctis quatuor in posticis supra.

PAPILIO EMBLA. P. n. g. *Alis fuscis: supra ocellis quatuor; subtus anticus quadriocellatis, posticis quadripunctatis maculisque duabus albis.*

Habitat in lucis Vestrobothniæ subhumidis, heris vespertinis. LILJEBLAD.

Antennæ fuscæ, albo-annulatae.

Palpi porrecti, hirsuti, fusi uti & *corpus* totum.

Alæ rotundatæ, vix dentatae, omnes utrinque fuscæ;

Anticæ supra infraque fascia marginem non attinente lutea, in qua ocelli quatuor, quorum extimus albo-bipupillatus, intimis cæcis. *Posticæ* supra ocellis quatuor, luteis pupilla nigra, subtus punctis quatuor minimis nigris; in medio fere alæ macula albida & alia marginalis obsoleta.

Ma-

Magnitudine P. Ligeæ, cui simillimus uti & similis
p. *Blandinæ*, satis tamen ab omnibus distinctus.

PAPILIO ADONIS. P. p. r. *Alis integris fuscocæruleis: nigrâ marginali, subtus cinereis: punctis ocellaribus; posticis macula centrali alba.*

Papilio Adonis. FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. p. 75.
ENGRAMMELLE, Pap. d'Europe p. 173 t. 39. fig. 82.

Habitat in Svecia D. Demonstr. AFZELIUS.

Valde affinis P. *Idæ*. LIN.

PAPILIO CORYDON. P. p. r. *Alis integris cæruscentibus margine nigro, posticarum ocellari; subtus cinereis: punctis ocellaribus lunulisque fulvis.*

FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. p. 74.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europe p. 174 t. 39. fig. 83.

Habitat in Svecia. LILJEBBLAD.

Valde variat.

PAPILIO OPTILETE. FABRIC. Mant. Vol. 2. p. 74.

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europe p. 311. tab. 84. fig. 85. tert. a. b. c.

Habitat in Svecia. DEM. AFZELIUS. LICENTIAT. HOLMER.

PAPILIO CLEOBIS. P. p. r. *Alis integris cæruleis, subtus canis: punctis oblongis nigrissimilibus.*

Papilio acis. FABRIC. Mant. Vol. 2. p. 73.

Habitat in Svecia. NOTAR. DELÉN.

PAPILIO MINIMUS. P. p. r. *Alis integris fuscis supra maculatis, subtus albidis basi cæruleis: luna fasciaque ocellari.*

ENGRAMMELLE. Pap. d'Europe p. 181 — 183 t. 42. fig. 88. e. f.

Ha-

Habitat i Vestmannia Dom. Doct. HALL.

Minor P. *Argiolo*, totus supra fuscus, immaculatus basi alarum cæruleo, nitenti.

Alæ subtus cinereo-albidæ. *Anticæ* lunula nigra fasciaque ocellari e punctis sex nigris; *posticæ* prope basin puncta duo nigra, ante medium lunula obsoleta; postice ordo punctorum ocellarium septem serie abrupta punctoque ocellari solitario intra marginem. Ocelli posticarum interdum valde obsoleti, ut vix manifesti.

PAPILIO HILLE. P. p. r. *Alis integris cæruleo-micantibus*, *subtus punctis ocellaribus numerosis*.

FABRIC. Mant. Vol. 2. p. 80.

Habitat ad Luloam antiquam frequentissime, 1788 a LILJEBLAD lecta.

Valde *Similis* P. *hippothoë*, sed supra non fulvus, verum cærulescens, nitidus, margine postico imprimis posticarum fulvo-fasciato; subtus similiores, sed hic duplo fere minor.

BOMBYX RECLUSA. *Alis deflexis plumbeo-ferrugineoque variis: fasciis tribus albis anastomosatis, macula apicis ferruginea: puncto marginali albo.* FABRIC. Mant. Inf. Vol. 2. p. 120.

ROES. Inf. tom. 4. tab. 11. f. 4. 5.

Habitat Upsaliæ. Prof. AURIVILLIUS, Præses, alii.

Simillima habitu & structura B. *curtulæ*, sed quadruplo minor, tota valde hirsuta.

BOMBYX LAPONICA. *Alis deflexis, anticis brunneis: punctis fasciisque flavis; posticis basi fuscis, apice fulvis: maculis quatuor nigris.*

Ha-

Habitat in Lapponia. D. GRÖNDAL.

Magnitudine & fascie B. Plantaginis.

Antennæ pectinatae, nigrae.

Caput, Thorax, Abdomen hirsuta, fulva.

Thorax flavo sexmaculatus, maculis 2 anticus, 2 lateralibus, singula in singula costa & duabus longitudinalibus in dorso.

Alæ antice supra brunneæ, fasciis quinque interruptis flavis, penultima denticulata transversa; posticæ basi fuscæ, apice fulvæ maculis quatuor nigris lunatis inæqualibus. Subtus omnes fuscæ fasciis & maculis eisdem.

NOCTUA DIVERGENS: *Cristata alis deflexis integris, anticis griseis: fasciis duabus fuscis signaque albo inscriptis; posticis flavis margine nigro.*

FABRIC. Mantist. Insect. Vol. 2. p. 162.

Habitat in Lapponia Prof. VINBOM, Doct. STRUVE; Mag. QVENSEL.

NOCTUA LEUCOPTERA: *Alis deflexis, anticis cinereis: fasciis tribus punctisque duobus nigris; posticis niveis.*

Habitat in Svecia.

Magnitudine media.

Corpus totum laxe, cinereum.

Alæ Antice utrinque cinereæ, supra fasciis quatuor nigris, 1 in basi interrupta, 2 ante medium undulata, 3 pone medium curva undata, 4 intra marginem obsoleta. Inter fasciam 3 & 4 punctum anterius minutum & macula posterius oblonga.

Posticæ utrinque totæ niveæ fascia tenuissima intra marginem e punctis nigris. Alæ posticæ basi ciliatae.

NOCTUA MELALEUCA: *Alis deflexis, anticis nigris cinereo-maculatis; posticis albis: margine nigro.*

Habitat i Lapponia, LILJEBLAD, EKHOLM, GRÖNDAL; QVENZTL.

Inter minores Noctuas, capite & toto corpore hirto, pilis albis nigrisque griseo.

Antennæ filiformes, setaceæ, nigræ.

Alæ Anticæ supra nigræ, ciliatae, subundulatae fasciis obsoletis griseis & maculis tribus, longitudinaliter positis griseis, quarum posteriores sensim majores. Subtus basi villosæ, fuscæ, maculis obsoletis albis marginalibus. Posticæ utrinque niveæ, margine extimo nigro-irrorato, postico limbo lato, atro.

NOCTUA MELANOPA: *Alis deflexis, anticis nigris griseo-irroratis; posticis albis: macula marginaque nigris.*

Habitat in Lapponia, LILJEBLAD.

Similis omnino priori; sed alæ posticæ minus albidæ, basi & arcu medio nigris, ciliisque marginis posticii niveis. Præterea alæ anticæ non totæ nigræ, sed albidæ, arcu medio & margine postico nigro.

NOCTUA LAPPONICA: *Alis deflexis albidis, anticis fasciis quinque atris, posticis puncto arcuque duplii nigro.*

Habitat in Lapponia, GRÖNDAL, Chirurg. Exp. ad Chinam Soc. Com. Svec.

Magnitudine N. Melaleucæ.

Corpus totum hirtum pilis nigris albisque.

Thorax antice sulcristatus, fascia atra albaque.

Antennæ filiformi-setaceæ, fulcæ.

Ale Antice albidæ punctis minutissimis atris adspersæ; fasciæ quinque undatæ nigræ, 1 in ipsa basi, 2 infra basin, 3 & 4 in medio interiori in margine approximatæ, 5 intra marginem posticum; margo posticus denticulatus e maculis albis nigrisque; *postice* alæ totæ fuscoe margine magis nigrante. *Omnis* subtus albidæ puncto medio, arcu limboque latiori marginali nigris; *margo posticus* albo nigroque denticulatus in posticis, in anticis albus.

TORTRIX PENZIANA: *Alis albis fusco-irroratis: fasciis tribus obliquis articulatis nigris.*

Habitat in Sveciæ meridionalibus Provinciis. Consiliari. D. PENTZ.

Tortrice Rosana paulo major & magis oblonga.

Caput album, hirtum.

Palpi compressi, clavati, albi.

Ale antice oblongæ, obtuse, supra albæ lineolis fuscois irrotatae; fasciæ tres obliquæ, atræ, subarticulatae articulis quadratis. Subtus fuscoe, immaculatae, ciliatae. *Alæ postice* supra fuscoe, subtus albidæ: margine exteriori fusco-maculato.

TORTRIX RHENANA: *Alis extus ferrugineis, intus albis fusco-irroratis: fascia communis maculaque duplice atra.*

Habitat in Blekingia. Dom. RHEN.

Tortrice Rosana paulo major.

Antennæ filiformes, apice attenuatæ, cinereæ, capite thoraceque longiores.

Palpi compressi, clavati.

Corpus & Pedes albidi.

Alæ anticæ extus ferrugineæ, fusco-fasciatæ, interiore marginè niveæ, nigro-irroratæ. Ante medium fascia communis, atra, marginem exteriorem non attingens. Pone medium macula in singula ala obliqua, oblonga, atra, margines non attingens. *Alæ posticæ* supra fuscæ, subtus versus marginem tenuiorem albidae, versus crassiorem fusco-irroratae.

Differet a T. Hermanniana.

TORTRIX FIMBRIANA: *Brunnea margine extimo niveo : fasciis punctisque brunneis.*

Habitat i Vestrogothia. Pastor BJERKANDER.

Corpus magnitudine *T. Rosanae.*

Antennæ filiformes, brunneæ, longitudine dimidia corporis.

Palpi ovati, porrecti, brunnei, subtus albidi.

Alæ supra brunneæ margine exteriori linea lata, nivea, apicem alæ non attingente: fasciæ undulatæ, subabruptæ, binæ & puncta sparsa brunnea; subtus fuscæ margine albido.

TORTRIX HIKUNDANA: *Alis brunneis, dorso late niveis maculisque marginalibus.*

Habitat in Svecia. BJERKANDER.

Corpus magnitudine *T. Rosanae.*

Caput, Antennæ, Palpi ut in antecedenti.

Thorax antice brunneus, postice niveus, medio fascia nigra.

Alæ in margine interiori late niveæ punctis obsoletissimis; in exteriori brunneæ, macula dupli baseos punctisque minutissimis subquaternis marginibus albis; margo posticus fusco alboque varius, ciliatus. Subtus alæ fuscæ, nitentes.

TORTRIX GROENDALIANA: *Alis ferrugineis: fasciis argenteis maculisque decem luteis.*

Magnitudine media.

Antennæ, thorax, alæ anticæ subtus & posticæ utrinque fuscæ.

Alæ anticæ supra ferrugineæ: fasciæ transversæ argenteo-plumbeæ sex, ultima intra marginem maculari; præterea maculæ majores luteæ, quinque in singula ala obtusa.

TORTRIX HALLIANA: *Alis canis fuso-punctatis: macula baseos marginaque exteriori brunneis.*

Habitat in Svecia. D. Dr. HALL.

Magnitudine media, tota supra infraque argenteocana.

Antennæ subfiliformes, fuscæ, corpore duplo breviores.

Alæ anticæ supra punctis minurissimis fuscis irroratae, in primis postice, obtusissimæ; in basi singulae macula & margo exterior a medio ad apicem late ferrugineæ, linea in media ala latissima. Subtus immaculatae, uti & posticæ supra.

TORTRIX GROSSANA: *Alis cinereis: fasciis duabus obliquis fuscis.*

Habitat in Vestrogothia, BJERKANDER.

Magnitudine T. hamanæ.

Caput luteum palpis brevissimis.

Antennæ fuscæ, corpore quadruplo breviores.

Thorax fuscus, immaculatus, lævis.

Alæ anticæ obtusæ, supra cinereo-albidæ, striis tenuisimis undulatis fuscis irroratae: fasciæ duæ, latæ, obliquæ, dentatæ, fuscæ altera juxta basin, altera a medio margine externo ad angulum aniducta, ubi saepe subbifida in medio valde angustata. Subtus uti alæ posticæ utrinque fuscæ, immaculatae.

Abdomen & Pedes cinerei.

Varietas occurrit capite nigro, fascia postica valde bifida, & colore alarum albidiore.

EXPLICATIO TABULÆ.

Fig. 1	Tortrix Penziana.	8.	Papilio Embla.
2	— — Gröndaliana.	9	Tortrix Halliana.
3	— — Fimbriana.	10	Noctua Lapponica.
4	— — Hirundana.	11. 11.	Papilio Norna.
5	— — Rhenana.	12	Noctua Melaleuca.
6.	Papilio Lappona.α.	13	— — Leucoptera.
7	Bombyx Lapponica.	14. 14.	Papilio Freija.

Insectorum Freccia. P. 2.



1.



2.



3.



4.



5.




6.



7.




8.




9.



10.




11.



12.



13.



14.



15.



16.

16

D. D.
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA.
SISTENS

INSECTA SVECICA.

QUORUM
PARTEM TERTIAM.
CONS. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAR. P. THUNBERG,

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD. CÆSAR.
NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LONDINENS. HOLMIENS. SOCIET. SCIENT. UPSAL.
PHILODIPH. PATR. HOLM. BEROL. NAT. SCRUT. LUNDENS. HARLEM. AMSTELD.
ZELAND. NIDROSIENS. HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIM.
BURG. ET NAT. STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD SCIENT. PARIS. MONSPELIENS.
AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND.
OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT
JAC. ÅKERMAN.
GOTLANDUS.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. IX. MAJI MDCCXCII.
H. A. M. S.

UPSALIÆ,
LITTERIS VIDUÆ DIRECT. JOH. EDMAN.

THESES:

I.

In toto Insectorum agmine, non minimam sane attentionem meretur numeroſa Phalænarum familia, tam ob uſum œconomicum, quam ob insignem illam noxam, quam nobis inferre ſoleat quandoque.

II.

Illum vero Historiæ Naturalis finem ut rite obſineamus, necesse eſt, ut ſpecierum Characteres, methodo facili & perspicua delineet Entomologus, ut certam individuorum notitiam conſequi queamus, ſine qua labor scrutatori numquam ſuccedit.

III.

Quamvis Lepidopterorum ſpecies coloribus ſat diſtinxiſſe videatur natura, tamen in eruendis illarum differentiis, ſæpius ballucinantur curioſi eorum contemplatores, adeo ut diſſicillime interdum detegantur ipsarum ſpecierum notæ genuinæ.

IV.

Quando melius uniuscuſusque regionis Inſecta deſcripta fuerint, non dubitamus, quin optimo emolumento nobis ſeſe commendet Entomologia.

V.

Ut omnes ſcientiæ auxiliares manus ſibi invicem porrigeſſe ſolent, ſic quoque ſcientia Botanica prodeſt ſtudio Entomologico, nec illa Inſectorum ſcrutatorumquam carere potheſt.

INSECTA SVECICA.

BOMBYX *serrata*: alis reversis anticis fusco-cinereis: strigis duabus nigris; posticis albis ciliatis.
Bombyx trepida. FABR. Mant. vol 2 p. 120.
Habitat in Vestrogothia. Dn. LEONH. GYLLENHAL:
Magnitudine B. vinulæ, tota hirsuta, cinereo-fusca.
Antennæ ferratæ, corpore dimidio breviores.
Thorax subcristatus, fascia lineisque duabus obsoletis nigris.

Alæ incumbentibus; *anticæ* supra fusco-cinereæ venis elevatis, hirtæ, ad angulum ani falcatae: supra basin fascia undata nigra; ante medium alia undata, versus interiorem marginem obsoleta; pone hanc lunula nigra; in ipso margine & intra illum ordo punctorum oblongorum, nigrorum; subtus albido-fuscæ, immaculatae. *Posticæ* reverae, medio ciliato-ferratæ, supra albidæ, margine fusco & bifasciato; subtus albidæ.

PHALÆNA *separata*: alis albo-canescensibus: fasciis tribus duplicatis nigris, postica obliqua.

Phalaena separata. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 75. c. fig.
Habitat in Svecia. Notar. DELÈN.

Magnitudine Pb. Wavariæ paulo major.

Antennæ setaceæ.

Alæ patentes, canæ; *anticæ* medio albidæ, fasciis tribus nigris, dupli linea constantibus:

prima in basi, secunda antenuato-acuta, marginem non attingens. Subtus canæ, macula marginali albida. Posticæ utrinque canæ, immaculatæ.

PHALÆNA ornata: seticornis alis niveis, puncto medio margineque postico undato fuscis. FABR. Mant. v. 2. p. 210.

PHALÆNA osseata: seticornis alis albis obscurius undatis: puncto medio nigro, anticis costa ferruginea. FABR. Mant. v. 2. p. 211.

PHALÆNA strigata: alis flavis apice fuscis, fasciis fuscis quatuor.

Phalaena strigata. Mus. Acad. Ups. P. 6 p. 75 c. fig. Habitat in Gestricia, D. PRINTZ.

Magnitudine Phalaenæ emarginatæ, tota pallide flava. Antennæ setaceæ.

Alæ patentes, anticæ flavæ, posticæ fuscæ, fasciis circiter quatuor tenuibus, recurvis, fuscis, subtus obsoletioribus.

PHALÆNA transversata: alis nigris: fascia lata media alba striga nigra interrupta punctoque in posticis albo.

Phalaena transversata. Mus. Acad. Ups. P. 6 p. 75. c fig.

Habitat in Vermelandia. D. HOLMER. in Gestricia, D. PRINTZ.

Magnitudine & facie Phalaenæ hastatæ.

Thorax niger, marginibus pectoraque albis.

Antennæ setaceæ, fuscæ.

Alæ planæ; Omnes supra nigræ maculis marginibus albis. Pone medium fascia lata alba, in qua striga

striga obsoleta fusca in anticis. In posticis macula simul alba pone fasciam; *subtus* potius albæ, puncto, fascia media & margine postico late nigris. Ipse margo albo-maculatus.

PHALÆNA paludata: alis canis: anticis fasciis quatuor nigris, tertia dentata, quarta reversa.

Phalaena paludata. Mus. Acad. Ups. p. 6. p. 76. cum fig. *Habitat* juxta paludes turfosas Vestrogothiæ, D. GYLLENHAL.

Magnitudine Phalaenæ incanatæ, tota cana.

Antennæ filiformi-setaceæ.

Alæ planæ: anticæ supra fasciis quatuor nigris notatae, prima angustissima juxta basin; secunda ante medium parum undata; tertia pone medium magis dentata; quarta apicis lunata, abbreviata, obsoleta. Posticæ supra immaculatae; subtus omnes rufescentes fascia punctoque fusco margineque albo maculato.

PHALÆNA rhamnata: alis dentatis fulcescentibus: fascia media dentata obscuriore; lunula atra puncto strigaque fuscis. FABR. Mant. v. 2. p. 198.

PHALÆNA rubiginata: alis niveis: fasciis duabus ferrugineis, posteriore dimidiata: puncto subocellari atro. FABR. Mant. v. 2. p. 205.

PHALÆNA hexapterata: alis fusco griseoque variis, posticis albis basi duplicatis. FABR. Mant. v. 2. p. 207.

Valde affinis *Phalaenæ didymatæ*, sed maxime distincta videtur alis spuriis, quas tamen vidi etiam in varietate quadam *Phalaenæ ferrugatae*; itaque hæc nota tantum sexus differentia?

PHALÆNA myrtillata: alis cinereis supra puncto fasciisque obsoletis fuscis.

Phalaena Myrtillata. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 75.
Magnitudine fere **Pb. Papilionariae**, tota fusco-irrorata, macula nigra anticarum supra fasciisque obsoletis fuscis; intra imaginem fascia albida, undulata.

Alæ planæ rotundatæ, subtus omnes cinereæ puncto fusco in medio.

Antennæ setaceæ, longitudine fere corporis.

PYRALIS hamalis: alis basi canis; macula fusca, apice nigris,

Pyralis hamalis. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 76. c. fig.

Habitat i Vermelandia. D. HOLMER; in Finlandia D. HAST.

Paulo major Pyrali purpurali.

Antennæ setaceæ, cinereæ, capite thoraceque longiores.

Caput & Thorax incana.

Alæ deflexæ, forficatæ; **anticæ** supra basin canæ macula marginis exterioris oblonga, fusca; in medio albæ, inde ad apicem nigræ. **Posticæ** basi albæ puncto nigro, apice nigræ. Subtus similes paginæ superiori.

Abdomen & pedes albida.

PYRALIS margaritalis: alis anticis pallide flavis, fasciis duabus punto margineque postico fulcis; posticis albis. FABR. Mant. Inf. v. 2. p. 218.

Habitat in pluribus Sveciæ provinciis. D. WESTRIN & alii.

Magnitudine PYR. *forficalis*, cui similis.

Caput, Thorax, Abdomen albido-flavescentia.

Anten-

Antennæ setaceæ, cinereæ, longitudine dimidii fere corporis.

Alæ deflexæ, forficatæ; *anticæ* flavescentes, margine postico fenugineo-fusco. Infra basin versus marginem externum, punctum minimum fuscum. Ante medium undataæ facia tenui undata & alia pone medium subferruginea. Subtus margo extimus, posticus & punctum ferrugineum. *Posticæ* supra albæ, margine postico parum fusco; subtus concolores.

TORTRIX chlorana: alis hombeis, anticis viridibus margine extimo albo. FABR. Mant. Inf. v. 2. p. 224.

Magnitudine & facie Tortricis viridanæ.

Caput niveum, *antennis* subfiliformibus, cinereis.

Thorax viridis, *pectore* pedibusque albidis.

Alæ deflexæ, obtusissimæ; *anticæ* supra virides margine extimo, imprimis basi, albo; subtus viridi-albidæ. *Posticæ* utrinque albæ.

Abdomen supra fuscum, subtus album.

TORTRIX Yentiana: alis planis cinereis macula punctisque duobus centralibus nigris. FABR. Mant. v. 2. p. 235.

Facies depressa & habitus *T. heracleæna*.

Palpi obtusi, breves.

Antennæ filiformes, corpore dimidio breviores, cinereæ.

Thorax, Abdomen & Pedes cinereo-flava.

Alæ incumbentes, truncatæ, planæ; *anticæ* cinero-flavescentes, tenuissime nigro-irroratae; in margine exteriori maculæ quatuor nigræ, in medio puncta duo minuta, & unum

unum majus nigra; in margine postico puncta minuta sex; subtus fulcescentia margine lutescente. Posticæ fusco-plumbeæ, ciliatæ.

TORTRIX applana: alis depresso-ferrugineis: punctis duobus ocelloque albo centralibus.

Pyralis applana? FABRIC. Mant. Inf. 2. p. 239.

Facies & similitudo summa cum *T. Yeatiana*, *Käckeritziana* & *heracleana*, quæ omnes, an specie differant, doceant ulteriores observationes & in primis metamorphosis.

Supra subferruginea, tota nigro tenuissime irrorata, subtus plumbeo-fusca, nitens.

Alæ planæ, incumbentes, anticæ in margine exteriori & postico obsolete nigro-punctatæ; ante medium puncta duo, minuta, nigra; pone hæc oculus albus cum punto albo vix perspicuo.

TORTRIX Smoothmanniana: alis albidis: fasciis duabus obliquis ferrugineis, anteriore abbreviata, posteriore interrupta. FABR. Mant. Inf. 2. p. 278.

Magnitudine vix *T. Alstroemeriana*; tota supra albido-flavescens, subtus fusca, nitens.

Palpi porrecti.

Alæ triangulares, postice sensim dilatatae, ciliatae. Arcus obliquus in medio dorso, margines exteriores non tangens, sed in margine macula ferruginea. Pone medium facia obliqua e tribus maculis.

D. D.

DISSERTATIO ENTOMOLOGICA.

SISTENS

INSECTA SVECICA.

QUORUM

PARTEM QVARTAM.

CONS. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAR. P. THUNBERG,

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,

MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD. CÆSAR.

NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LONDINENS. HOLMIENS. SOCIET. SCIENT. UPSAL.

PHIADELPH. PATR. HOLM. BEROL. NAT. SCRUT. LUNDENS. HARLEM. AMSTELD.

ZELAND. NIUROSIENS. HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIM.

EURG. ET NAT. STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD SCIENT. PARIS. MONSPELIENS.

AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND.

OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

CAROLUS FREDERICUS SEBALDT,

Sip. Reg. DALEK.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. XXIII. MAJI MDCCXCII.

H. A. M. S.

UPSALIÆ,

LITTERIS VIDUE DIRECT. JOH. EDMAN.

KONUNGENS
TRO-TJENARE OCH REGIMENTS FÄLT-SKÅR
VID DES DAHL-REGEMENTE

ÄDEL OCH HÖGACKTAD
HERR

JOHAN HENR. SEBALDT,

SAMT

HÖGÅDLA FRU
MARTA ELIS. SEBALDT,
FÖDD BEHM.

MINE HULDASTE FÖRÅLDRAR!

Tillågnas detta till bevis af tacksamhet
för åtnjutne välgärningar af EDER,

MINE HULDASTE FÖRÅLDRAR,

lydigste Son
CARL F. SEBALDT.

INSECTA SVECICA.

SPHINX *atropos*: alis integris, posticis luteis: fasciis fuscis; abdomine luteo: cingulis nigris. Fabr. Mant.

Inf. 2. p. 95.

Habitat in Uplandia & alibi.

BOMBYX *hieracit*: alis subreversis atris. Fabr. Mant.
Inf. 2. p. 115.

Phalaena *atre* Lin. Syst. anim. 12. p. 823.

Habitat extra Upsaliam & alibi.

Habitus & *magnitudo* *Tortricis* tota atra; alis plus vel minus pelluentibus rotundatis.

Antennæ pectinatae.

Corpus totum hirtum.

BOMBYX *fusca*: alis patentibus fuscis, puncto medio fasciisque duabus atris.

Habitat in Lapponia. D. GRÖNDAL.

Magnitudo & *habitus* *Tortricis*, tota fusca.

Antennæ bipectinatae radiis brevibus.

Alæ omnes utrinque puncto atro in medio notatae.

Anticæ supra fasciis binis atris extra punctum.

Posticæ subtus pallidiores, tenuissime atro-irroratae.

BOMBYX *signata*: alis incumbentibus griseis linea atra ocelloque sesquialtero notatis.

Habitat in Vestrugothia. Cap. GYLLENHAL.

Magnitudine fere *B. Bucephalæ* tota albido-grisea & hirsuta.

Antennæ sensim attenuatae, pectinatae, radiis duplice serie fuscescentibus.

Thorax cristatus crista fuscescente.

Alæ deflexæ; antice fuscō-subundulatæ & irroratæ, basi linea nigra subduplicata: in medio macula minuta oblonga alba nigro-maculata; paulo pone medium macula alba cum lineola curva atra adiecta; margo obsolete nigro-punctatus; *subius* cinereo-fuscæ, macula in medio & marginalibus obscurioribus. *Posticæ* pallidiores, sordidæ macula atra in medio & punctis 6 marginalibus utrinque.

BOMBYX pitbyocampa: alis reversis griseis: strigis tribus obscurioribus; posticis pallidis: puncto anali fuscō. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 114.

NOCTUA linariae: cristata alis deflexis fuscō-cineris, apice albo nigroque striatis, maculis ordinariis niveis. Fabr. Mant. 2. pag. 169.

NOCTUA italica: lævis alis deflexis fuscis, strigis ferrugineis maculaque transversa marginali alba. Fabr. Mant. 2. pag. 144.

NOCTUA sulphurago: cristata alis deflexis flavis; punctis numerosis strigisque fuscis. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 159.

NOCTUA aurago: cristata alis deflexis fuscescentibus litura baseos. fasciaque media late flavis. Fabr. Mant. 2. p. 159.

NOCTUA rutilago: cristata alis deflexis flavis ferrugineo-strigosis fascia baseos apicisque fusca. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 160.

NOCTUA flavago: cristata alis deflexis flavissimis: punctis fasciaque lata fuscis. Fabr. Mant. 2. p. 160.

NOCTUA arbuti: cristata alis deflexis fuscis, posticis nigris fascia flava. Fabr. Mant. 2. p. 184. Syst. Ent. p. 619.

NOCTUA porphyrea, alis deflexis carneo luteoque variis, stigmatibus albis.

Bombyx spreta? Fabr. Mant. 2. p. 123.

NOCTUA satellitia: cristata alis deflexis dentatis brunneis, anticis puncto flavo inter puncta duo alba. Fabr. Mant. 2. p. 165.

NOCTUA euphorbiae: cristata alis deflexis cinereis fusco-undatis: maculis ordinariis anteriori orbiculata, posteriori reniformi albidis. Fabr. Mant. 2. p. 174. 114.

NOCTUA jota: cristata alis deflexis, anticis ferrugineo-griseis i resupinato aureo inscriptis. Fabr. Mant. 2. p. 163.

NOCTUA strigula: cristata alis deflexis rufescens albo nigroque striatis. Mus. Acad. Ups. 6. pag. 72. c. fig.

Magnitude media, hirsuta, tota rufescens.

Antennæ setaceæ.

Thorax cristatus, variegatus fascia purpurea.

Alæ deflexæ albo nigroque fasciatæ & striatæ; ocelli in medio duo præter stigma posterius. Subtus fuscoculcentes, immaculatæ.

Pedes rufescentes annulis albis.

NOCTUA carneæ: cristata alis deflexis, anticis carneis: stigmate flavicante; posticis arcu punctoque fuscæ. Mus. Acad. Ups. 6. p. 72. cum figura.

Habitat in Hallandia. Doct. OSBECK.

Magnitudine media, tota fusco-rubra.

Antennæ setaceæ.

Palpi appendiculati.

Thorax cristatus, hirsutus.

Alæ anticæ deflexæ, rufescentes, ferrugineo-fasciatæ.

Stigma anterius cinereum, posterius flavescens; fascia cinerea intra marginem. Posticæ pallidiores, supra immaculatæ. Subtus puncto arcuque fusco.

Pectus valde hirsutum, fulvum.

NOCTUA masoreta: cristata cana, alarum disco litura punctisqve nigris notato. Mus. Acad. Ups. P. 6 p. 72. cum figura.

Magnitudine inter minores, tota cana.

Antennæ ferratæ.

Alæ incumbenti - deflexæ; *anticæ* supra utrinqve in medio litura brevis atra, loco stigmatis posterioris puncta nigra circiter quinque circulum formantia; in ipso margine puncta nigra obsoleta.

NOCTUA ligustri: cristata alis deflexis fusco virescentiqve variis, nigro subundatis: macula magna postica albida. Fabr. Mant. 2. p. 172.

NOCTUA templi: cristata alis deflexis obscure virecentibus: strigis undatis maculisqve ordinariis flavescientibus.

Noctua lucipeta? Fabric. Mant. 2. p. 169.

Habitat in Hallandia. Doct. OSBECK.

Magnitudine N. pñ.

Antennæ filiformi-setaceæ, longitudine capitis & thoracis.

Thorax cristatus, fusco-virescens.

Ale deflexæ; *anticæ* supra virescentes strigis undatis tribus vel quatuor obsoletis, maculisqve ordinariis flavescienti-cinereis, quarum anterior minima, posterior reniformis. *Posticæ* cinereæ fascia fusca. Omnes subtus cinereo-flavescentes fascia media fusca.

Pedes cinerascentes, hirsuti.

NOCTUA fontis: alis deflexis nigris, anticis margine postico cinereis, punctis lineaqvæ apicis nigris. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 72. cum fig.

Habitat in Hallandia. Doct. OSBECK; in Vermelandia. Lic. HOLMER.

Magnitudine & facie Pyralidis majoris.

Palpi porrecti.

Antennæ setaceæ.

Ale deflexæ; *anticæ* supra antice brunneæ, postice albidae: macula apicis obliqua, analis anguli, marginis exterioris & punctis minutis fuscis. *Posticæ* supra fuscæ; *subtus* omnes cinereæ fascia fusca.

NOCTUA cordigera: cristata alis anticis nigris: fasciis undatis stigmataqvæ albis; posticis flavis margine nigro. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 72. c. figura.

Habitat in Svecia meridionali. Lic. HOLMER.

Magnitudine inter minores.

Antennæ setaceæ.

Caput & *thorax* cristatus nigra.

Ale deflexæ: *anticæ* utrinque nigræ; basi macula marginalis, quadrata, albida; pone medium macula reniformis, alba; margo cinerascens fascia fusca: *subtus* macula albida. *Posticæ* flavæ margine late fulco utrinque.

PHALAENA *fuscaria*: pectinicornis alis omnibus fuscis, anticis lunula nigra.

Magnitudine P. chærophyllatam paulo superat.

Antennæ setaceæ, pectinatae, radiis duplii serie brevibus, fuscis.

Ale omnes planæ, fuscæ: *anticæ* in medio lunula nigra, margine cinereo maculato. *Posticæ* dilutiores puncto obsoleto in medio; intra marginem fuscæ, margine cinereo. *Subtus* concolores, dilutiores, puncto centrali obsoleto.

PHALAENA *circularia*: alis dentatis ferrugineis: fascia saturatiore; anticis margine maculis duabus lunulaque albis.

Habitat in Svecia. D. GEDNER.

Facies omnino P. *syringarie*, sed paulo minor.

Antennæ pectinatae.

Corpus cinereo-ferrugineum, glabrum.

Ale planæ, omnes dentatae, ferruginea maculis obsoletis albis; fascia saturatior in formam circuli, angusta. In margine extimo maculae subtriangulares albae & prope apicem lunula alba. *Subtus* concolores.

PHALAENA *vittaria*: alis fuscis: fasciis duabus nigris repandis. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 74. c. figura.

Habitat in Gestricia. D. PRINTZ.

Magnitudo P. *Wawarie*, tota cinereo-fusca.

Antennæ pectinatae, attenuatae.

Ale fuscæ, patentes: *anticæ* fasciis duabus undulatis nigris, altera ante, altera pone medium. *Margo* obsolete nigro-punctatus. *Subtus* omnes pallidiores, immaculatae.

PHA-

PHALAFNA angularia: alis albis nigro-irroratis: anticus puncto fasciisqve tribus dentatis albis.

Habitat in Blekingia. D. RHÈN.

Magnitudine P. atomariae.

Caput album, nigro-maculatum.

Antennæ in altero sexu pectinatae, in altero filiformis-setaceæ, albo-nigroqve annulatae.

Corpus albidum, punctis nigris conspersum.

Alæ planæ; omnes albæ, tenuissime nigro-irroratae; anticus punctum medium oblongum fasciæqve tres nigro-dentatae: prima ante medium, extus ramosa: secunda & tertia pone medium contiguæ, in medio fere anastomosantes. *Ipse* margo posticus nigro-dentatus. *Subtus* concolores, sed obsoletiores. *Posticæ* supra fere totæ albæ angulo ani & margine postico nigro-maculatis; *subtus* arcus punctum-qve nigrum.

Pedes nigri, albo-annulati.

PHALAENA abruptaria: alis cinereis: fascia obliqua punctoqve minutissimo fulso.

Habitat in Svecia. D. GEDNER.

Magnitudine P. Wawariae.

Antennæ fuscæ, setaceæ, bipectinatae.

Caput & *thorax* cinerea.

Abdomen cinereum cingulis nigris.

Alæ planæ; omnes cinereæ strigis vix perspicuis fusca fasciatæ: punctum in medio versus marginem exteriorem minimum nigrum, inqve margine postico tria minutissima: fascia obliqua, latior, fusca, ab apice ad apicem oblique ducta, in anti-

ticis subabrupta. Posticæ magis nigro-striatæ ante fasciam latam. Subtus punctum in medio strigæque punctorum nigrorum.

PHALAENA ferdaria: alis albis fusco-irroratis: ocello fascia margineque punctato-nigris.

Habitat in Gestricia. PRINTZ.

Magnitudine P. Atomariam superat.

Antennæ cinereæ, bipunctinatæ, setaceæ.

Caput, thorax, abdomen cinerea.

Alæ planæ; omnes fordide albæ, obsolete fusco-irroratae; ocellus cœcus in medio versus marginem exteriorem: in margine extimo maculæ binæ: pone medium fascia obsoleta, undulata: in margine postico fascia e punctis circiter septem nigris. *Subtus* concolores, sed obsoletius fusco-undulatae.

Similis P. punctaria & pendularia; sed major & fordide alba.

PHALAENA zonata: alis albis: fascia baseos apiceque nigris; posticis niveis.

Habitat in Uplandia. D. DELÉN; in Westrogothia. P. BJERKANDER.

Magnitudine P. Atomariæ vel paulo minor.

Antennæ filiformi-setaceæ.

Thorax & Abdomen fusco-alba.

Alæ planæ, omnes albæ; *Anticæ* supra prope basin fascia nigra & margo posticus late niger. *Limbæ* late albus, punctis minutissimis nigris irroratus.

Posticæ niveæ. *Subtus* omnes albæ puncto fusco.

PHALAENA cognata: alis fuscis: basi, fascia lata media punctoque fuscis.

Habitat in Svecia meridionali.

Magnitudo & *facies* omnino *P. juniperatæ*, cui simillima, licet diversa.

Antennæ setaceæ, uti totum corpus cinereæ.

Ale deflexo-planæ, omnes fuscescientes: *Anticæ* supra prope basin litura transversa, pone hanc alia dentata, pone medium alia dentata, inter quas litura brevis & in apice litura transversa nigra. *Subtus* omnibus in medio arcus fuscus cum puncto minuto.

PHALAENA arundinata: alis basi albis fascia nigra; apice nigris, fascia undata alba.

Habitat in Vestrogothia. D. GYLLENHAL.

Paulo minor P. lemnata.

Ale planæ: *anticæ* supra basi albæ fascia in medio fere alæ fusca obsoleta; a medio ad apicem nigræ, fascia undata, & striga intra apicem alba. *Posticæ* totæ, uti & omnes subtus, albæ ultimo apice obsolete fuso.

Abdomen albidum.

PHALAENA corylata: alis cinereo-albis fasciis subternis dentatis punctoqve fuscis.

Habitat in Finlandia. D. HAST; in Vestrogothia P. BJERKANDER.

Magnitudine *P. tristatæ* & similitudo *P. juniperatæ*, licet maior & diversa.

Antennæ filiformi-setaceæ, cinereæ.

Corpus album, nigro-irroratum.

Ale planæ; *anticæ* supra albidæ vel fuscescientes; fasciæ tres distinctæ, latæ: prima in basi striga alba

divisa: secunda in medio, extus lator, dentata, in qua punctum nigrum: tertia in apice strigis variis undatis albis notata. Posticæ albæ apice fuscescentes. Subtus omnes albidæ fascia punctoqve nigris. PHALAENA flavofasciata: alis albis: fasciis duabus flavescentibus litura albida divisis.

Magnitudo P. tristatæ.

Antennæ filiformi-setaceæ, cinereæ.

Thorax & abdomen cinereo-albida.

Alæ planæ, omnes albæ; *Anticæ* supra fascia obsoleta prope basin; in medio fascia lata, dentata, extus lator, flavicans; intra apicem fascia flavescentia, dentata, litura undata alba terminata. *Margo posticus* albo-flavoqve dentatus. *Posticæ* albæ. *Subtus* omnes bifasciatæ.

PHALENA pupillata: alis fuscis medio ferrugineis: strigis undatis albis, ocello duplice, altero pupillato.


Phalæna pupillata. Mus. Acad. Ups. P. 6. p. 75.

Habitat in Gestricia. D. PRINTZ.

Magnitudine Phalænæ atomarie.

Alæ plano-patentes. *Anticæ* nigræ, medio subferrugineo-fuscæ: strigis pluribus undato-dentatis albis, quorum tres imprimis magis extantes; apice fuscæ striga e punctis albis obsoleta; margo posticus albo-maculatus. In medio ocelli duo, quorum extimus pupillatus. *Posticæ* basi albæ, fuscoc-undulatæ, apice nigræ striga alba margineqve albo-maculato. *Subtus* omnes concolores.

Insectorum Svecica. P. 4.



B. Signata.




B. Fusca.



N. templa.



P. fuscaria.



P. Sordaria.




P. circularia



P. zonata.



P. abruptaria.



P. angularia.



P. arundinata.



P. corylata.



P. flavofasciata.



P. pupillata.

D. D.
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA.
SISTENS
INSECTA SVECICA.

QUORUM
PARTEM QUINTAM,
CONS. EXP. FACULT. MED. UPS.
PRÆSIDE

**CAROL. PET.
THUNBERG,**

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. NAT.
CURIOS. REG. SCIENT. LONDIN. HOLM. SOCIET. SCIENT. USPAl. PHILAD.
PATR. HOIM. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. ET HAFNIENS. HIST. NAT.
LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSIENS. TICINENS. IENENS.
HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT.
STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS.
MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN.
ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT
ISAACUS HAIJ,
STIP. KÅHREANUS WESTROGOTII.

In Audit. Botanico die 10 Maij 1794.
H. A. M. S.

UPPSALIAE,
LITTERIS VIDUE DIRECTOR. JOHANN. EDMAN.

VIRO GENEROSO
ET
NOBILISSIMO
DOMINO
PETRO THIAM,
AULÆ REGIÆ INTENDENTI,

Ob plurima tam in Paternam domum quam in se ipsum collata beneficia, in tesseram grati animi, cum omnigenæ felicitatis voto

D. D. D.

ISAACUS HAIJ.

INSECTA SVECICA.

HISTER ÆNEUS: elytris basi striatis apice punctatis. Fabric. Syst. Entom. p. 53. Mant. ins. vol. I. p. 33.

Habitat in Svecia. Notar. Delén.

Semine Secalis latior & paulo brevior, totus ater, nitidus.

Thorax politus lateribus papilloſis.

Elytra polita basi, apice & lateribus papillosa seu punctata; stria unica juxta suturam & in margine exteriori tres brevissimæ, tenuissimæ.

HISTER ELONGATUS: piceus linearis-oblongus, elytris striatis.

Hister oblongus Fabric. Entom. System. p. 75.

Hister paralellipipedus. Herbst.

Habitat in Svecia meridionali.

Magnitudine & forma similis *H. ferrugineo*, sed totus piceus, nitidus, depresso-ſculus.

Antennarum clava ferruginea.

Elytra apice & pedes inprimis picei.

Striae Elytrorum Sex, longitudinales.

HISTER DEPRESSUS: depresso-ſcus, ater, nitidus elytris extus striatis. Fabric. Mant. ins. vol. I. p. 32 Entom. Syst. p. 74.

Habitat in Svecia.

*Statura & magnitudine H. ferruginei, sed magis de-
pressus, totus ater, nitidus, pedibus & antennarum clava piceis.*

*Striae Elytrorum tres in singulo margine externo,
intra apicem desinentes.*

HISTER PUNCTATUS: piceus elytris obsolete
striatis, pedibus ferrugineis.

*Habitat in arenosis Westrogothiæ tempore vernali.
Gyllenhal.*

Magnitudine dimidia Tritici seminis.

Corpus totum lave, piceum, quadratum.

Pedes magis rufescentes.

*Striae Elytrorum quatuor, obsoletæ, brevissimæ, vix
dimidiā elytrorum longitudinem attingentes.*

HISTER FLAVICORNIS: ater, convexus, elytris
oblongis lavisimis, antennarum clava ferruginea.

Hister flavicornis Herbst.

*Habitat in Blekingia D. Gedner & Rhén: In Smo-
landia sub cortice pinuum emortuorum Sam. Tör-
ner. In Svecia Printz.*

*Magnitudine parum excedit H. pygmaeum. totus
oblongus, convexus, nitidus, lavisimus absque
striis, ater, sola clava antennarum ferruginea.*

Pedes picei.

HISTER GLABRATUS: supra æneo-niger nitens,
subtus ater, elytris striato-punctatis. Fabric. Entom.
Syst. p. 73.

*Magnitudine H. unicoloris mediocris, totus glaber,
supra nitidus, æneus, convexus.*

Caput, Thorax, Elytra æneo-nigra.

Abdomen & pedes atri.

Thorax valde marginatus.

Elytra punctato-striata, abdomen fere æquantia, truncata.

Striæ punctatæ plures, tenuissimæ.

HISTER ABBREVIATUS: ater elytris striatis: inferioribus striis abbreviatis. Fabric. Entom. Syst.

p. 75.

Corpus H. unicolor quadruplo minus, totum atrum, nitidum, pedibus paulo magis piceis.

Thorax marginatus.

Elytra in singulo margine externo striata striis tribus longitudinalibus: has inter & suturam utrinque striæ duæ abbreviatæ, sic ut ab apice vix ad medium Elytri versus superiora ducantur.

HISTER QUADRISTRIATUS: ater, nitidus pedibus piceis, elytris basi striis quatuor abbreviatis postice punctatis.

Habitat in Blekingia. **RHEN.**

Magnitudine fere H. brunnei, totus ater, nitidus, pedibus apiceque Elytrorum piceis.

Thorax tenuissime punctatus.

Elytra tenuissime punctata, basi & margine exteriori striis quatuor obliquis abbreviatis.

HISTER CÆSUS: niger thorace sulco transverso, antennis ferrugineis. Fabric. Entom. Syst. p. 77.

Habitat in Westrogothia **GYLLENHAL.**

Pulice minor, niger seu piceus, politus.

Thorax transversim sulcatus.

Elytra absque striis.

Similis D. *psyllii.*

HISTER FERRUGINEUS: ferrugineus, oblongus
elytris striatis.

Habitat in Nericia Smaræus. In Westrogothia GYL-
LENHAL. in Germania Schneider.

Magnitudine fere H. *depressi*, lineari-oblongus, totus
ferrugineus, glaber.

Elytra tenuissime striata: striis sex longitudinalibus.

Differit ab H. *brunneo*: 1. quod oblongus.
2. elytris magis abbreviatis.

HISTER SINUATUS: ater elytris macula media
lunata rubra. Fabric. Entom. Syst. p. 75.

Hister 4 maculatus Linn. Fn. Svec. p. 147. n. 443 a.

Magnitudine H. *unicoloris*, totus excepta macula
elytrorum lunata rubra, ater, nitidus.

Thorax marginatus stria intra marginem.

Elytra margine utrinque striis tribus longitudinali-
bus, valde abbreviata.

ELOPHORUS NUBILUS: griseus thorace elytrisque
sulcato-rugosis. Fabric. Spec. Ins. p. 77. Mant. p. 43.

Habitat hic inde in domibus.

Dimidio minor E. *aquatico*, cui valde similis & cu-
jus forsitan mera varietas.

ELOPHORUS FLAVIPES: niger thorace sulcato,
elytris striatis pedibusque testaceis. Fabric. Entom.
Syst. p. 205.

Satis vulgaris in aquis Uplandiæ & aliarum Provin-
ciarum.

Decuplo minor E. *aquatico*, cui simillimus.

Thorax sulcatus, cinereus, fuscus vel viridi-æneus.
Elytra testacea, punctato-striata, plerumque maculis
 duabus vel tribus fuscis.

Pedes pallidi.

ELOPHORUS ELONGATUS: niger, thorace pun-
 etato, elytris porcatis. Fabric. Entom. Syst. p. 204.

Magnitudine E. flavipedis seu pulicis, totus niger,
 thorace interdum virescente.

Thorax foveis 5 impressis.

Elytra costis elevatis notata, interque has lineæ duæ
 punctorum impressorum.

ANTHRENUS VERBACI: niger elytris fasciis
 tribus undatis albis. Fabric. Entom. Syst. p. 264.

ANTHRENUS PIMPINELLÆ: niger elytris fascia
 alba apice ferrugineis: litura alba. Fabr. Entom.
 Syst. p. 263.

OPATRUM SULCATUM: nigrum thorace lævi,
 elytris striatis.

Opatrium agricola. Fabr. Entom. Syst. p. 91.

Pediculo majus, subcylindricum, fusco-ferrugineum.

Thorax lævis, marginatus.

Elytra postice deflexa, obtusa, sulcata sulcis punctatis.

Antennæ & pedes rufescentes.

BYRRHUS ATER: oblongus, niger immaculatus.
 Fabric. Entom. Syst. p. 85.

Magnitudine & facie B. pilulae, sed totus sordide
 niger, lævis, glaber, immaculatus.

Striae elytrorum tenuissimæ, obsoletæ.

BYRRHUS VARIUS: viridi-æneus, elytris lineis
 abruptis atris.

Magnitudine Coccinellæ 2-punctatæ, totus fusco-cinereus, nitens.

Thorax fusco-aeneus, immaculatus.

Elytra viridi-aenea lineis pluribus interruptis atris.

BYRRHUS PULVERULENTUS: fusco-ferrugineus, tomentosus elytris lineis abruptis nigris.

Duplo minor B. vario, totus imprimis supra tomentosus, fuscus.

Elytra notata sunt lineolis abruptis nigris.

BYRRHUS MINUTUS: ater pedibus rufescentibus.

Habitat in Svecia. Capit. PFEIF.

Pediculi magnitudine totus ater, nitidus, pedibus rufescentibus.

Elytra tenuissime & vix conspicue striata.

BYRRHUS CINCTUS: fusco ferrugineus, thorace nigro maculato elytris fascia undata nigra.

Magnitudine & statura B. pilulæ, totus subtus pilosus, supra fuscus flavescenti tomentosus.

Thorax in medio punctis aliquot nigris confluentibus maculatus.

Elytra tenuissime striata, costa nigra & in medio fascia communis undata nigra, nullibi marginem exteriorem attingens.

BYRRHUS FASCIATUS: tomentosus, fuscus elytris fascia undata rufa. Fabric. Entom. Syst. p. 85.

Magnitudine fere B. pilulæ & summa similitudine, etiam lineolis obsoletis abruptis nigris, totus tomentosus, fuscus.

Elytra in medio dorsi fascia transversa albida vel rufescente, margines exteiiores non attingente.

Tbo.

Thorax vel fuscus, vel albidus macula fusca.

BYRRHUS DORSALIS: tomentosus, nigricans elytris macula communi rufescente. Fabric. Entom. Syst. p. 85.

Duplo minor B. pilula, totus tomentosus, fuscus.

Thorax ferrugineo-maculatus.

Elytra in medio dorso macula sublunata rufescente, punctis albis cincta.

BYRRHUS ALBO-PUNCTATUS: tomentosus, niger elytris in medio fasciatis ex ordine duplice undulato punctorum alborum.

Magnitudine B. dorsalis ejusque summa similitudine, totus tomentosus, niger.

Thorax obsolete ferrugineo-variegatus.

Elytra in medio dorso notantur arcu bis lunulato ex serie duplice punctorum alborum minutissimorum.

NITIDULA PUSILLA: fusca thoracis dorso, fascia elytrorum, antennis pedibusque rufis.

Magnitudine & statura N. colon, laevis, fusca.

Antennae & pedes toti ferruginei.

Thorax rufus margine tenuissime nigro.

Elytra fusca plaga rufa, seu rufa margine exteriori, apice & regione scutelli fulcis, truncata, abdomen breviora.

NITIDULA AENEA: viridi-ænea antennis pedibusque nigris. Fabric. Entom. System. p. 261.

Habitat in Blekingia. RHEN.

Pulice vix major, exceptis antennis & pedibus nigris tota viridis, polita, laevisima.

NITIDULA VIRIDESCENS: viridi ænea pedibus rufis.

Omnino similis præcedenti, exceptis foliis pedibus rufis.

Forsan prioris sola sexus varietas.

NITIDULA 4-GUTTATA: fusca elytris quadriguttatis.

Magnitudine N. colon, tota fusca, lœvis.

Thoracis margo exterior vix manifeste pallidus.

Elytra truncata, abbreviata, nigra: macula flava, parva in costa & alia major, subtransversa intra apicem.

Pedes & antennæ flavescentes.

NITIDULA 10-GUTTATA: fusca thoracis margine elytrorumque maculis decem pallidis. Fabr. Ent. Syst. p. 258.

Habitat in Blekingia. RHEN.

Inter minores seu minor N. 2-pustulata tota glabra fusca.

Thorax marginibus lateralibus & puncto baseos flavis.

Elytra margine flavescens, absque striis tenuissime subpunctata, maculis in singulo quinque pellucidis, 2, 1, 2 flavescensibus.

NITIDULA OBSCURA: nigra, opaca pedibus pallidis. Fabric. Entom. Syst. p. 255.

Silpha rufipes? Linn. Syst. p. 573.

Inter minores, vix pediculo major, tota supra fusca lœvis, opaca, pedibus pallidis.

NITIDULA VILLOSA: pubescens, ferruginea elytris lœvibus.

Habitat in Finlandia TÖRNER.

Ma-

Magnitudine & summa affinitate N. Pubescens, tota ferruginea & tenuissime pubescens, lævis absque striis Elytrorum, punctis impressis vix conspicuis.

NITIDULA MARGINATA: sulcata thorace margine, elytris margine discoque maculis ferrugineis.
Fabr. Entom. Syst p. 256.

Habitat in kinnekulle. Gedner.

Inter majores, magnitudine Cimicis, tota ferruginea & tenuissime villosa.

Thorax in medio nigro maculatus.

Elytra sulcata atomis variis atris.

Similis valde *N. verbasci*, sed villosa & quadruplo major, elytris sulcatis.

NITIDULA LIMBATA: nigra thoracis elytrorumque margine ferrugineis.

Habitat Calmariæ Magist. Wahlbom.

Inter minores, vix pulice major, oblongiuscula, lævis, fusca.

Thoracis margo, elytrorum limbus exterior & pedes ferruginei.

NITIDULA VERBASCI: fusca, lævis thoracis elytrisque margine lineola baseos fasciaque apicis fulvis.

Nitidula strigata. Fabr. Entom. Syst. p. 257.

Media seu magnitudine Coccinellæ 2 · punctatæ lævis, fusca.

Thoracis niargo anticus & laterales flavescentes.

Elytra margine flava absque striis; prope basin lineola flexuosa & punctum minutum, intra apicem fascia flexuosa flava.

Pedes flavescentes.

NITIDULA SORDIDA: lævis, fusca thoraci marginæ elytrisque maculis sparsis ferrugineis. Fabr. Entom. Syst. p. 258.

Habitat in Kinnekulle. Gedner.

Paulo minor N. *marginata*, tota fusca, opaca, lævis absque striis & vix manifeste villosa.

Thoracis margo ferrugineus, peliucens.

Elytra notantur maculis aliquot sparsis rufis.

Similis N. *Marginatae*, sed lævis, tota fusca & minor.

SILPHA GRANULATA: atra thorace anticæ truncato, elytris punctatisimis: lineis tribus elevatis abbreviatis.

Habitat in Svecia. PFEIFF.

Magnitudine S. *atra* am superat, tota atra.

Thorax anticæ truncatus, vix excisus, postice loba-to-rotundatus, tenuissime punctatus.

Elytra rotundata, frequentissime punctata, costis tribus elevatis politis lævibus apicem non attingentibus, exteriori breviori.

Os rufescens.

SILPHA LAPONICA: atra thorace pectoreque albo-tomentosis, elytris clathratis.

Habitat in Lapponia Doct. LILJEBLAD.

Statura & magnitudine S. *rugosæ* vel paulo major, tota atra.

Caput, pectus & thorax tomentosa villo albido.

Thorax excisus, postice rotundatus punctis nigris in tomento translucentibus.

Elytra postice parum excisa, in medio costis tribus elevatis integris abbreviatis, inter quas series quadruplex nodorum elevatorum.

Abdomen fuscum tomento vix conspicuo.

D. D.
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA
SISTENS
INSECTA SVECICA.

QUORUM
PARTEM SEXTAM
VENIA EXP. ORD. MED. UPS.
PRÆSIDE

CAROL. PET.
THUNBERG,

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD. ACAD. CESAR. NAT.
CURIOS. REG. SCIENT. LONDIN. HOLM. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PHILAD.
PATR. HOIM. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. ET HAFNIENS. HIST. NAT.
LUND. HARLEM. AMSTED. ZELAND. NIDROSIENS. TICINENS. JENENS.
HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT.
STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS.
MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN.
ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI OFFERT
SAMUEL KINMANSON,
STIP. HEDMANN. OSTRO - GOTH.

In Audit. Botanico die 3 Dec. 1794.
H. A. M. S.

UP SALIÆ,
LITTERIS JOH. FRED. EDMAN, REG. ACAD. TYPOGR.

INSECTA SVECICA.

SILPHA SINUATA: atra thorace scabro, clytris postice sinuatis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 252.

Magnitudine media, tota atra, depresso-convexa, opaca. *Caput* cinereo-pubescentia.

Thorax nodis elevatis scaber, tenuissime pubescentia.

Elytra glabra, lineis tribus elevatis costata, apice extus sinu excavata.

HYDROPHILUS ORBICULARIS: subrotundus, ater, glaber. Fabr. Entom. Syst. I. p. 184.

Duplo minor H. *Scarabaeoide*, & magis globosus, totus aterrimus, laevis, politus.

HYDROPHILUS TRUNCATELLUS: ovatus, ater thoracis margine postico ferrugineo, clytris abbreviatis.

Habitat in Vestro Gothia. **GYLLENHAL.**

Magnitudine pulicis, oblongus, totus laevis ater, antennis, angulo postico thoracis pedibusque piceis.

Elytra truncata, abdomine breviora.

Facies Gyrini, sed antennæ perfoliatæ.

HYDROPHILUS AFFINIS: ovatus luridus, thorace fusco.

Habitat Upsaliæ; in Vestro-Gothia. **GYLLENH.**

Magnitudine pediculi, ovatus, convexus, laevis, totus luridus capite thoraceque nigris.

HYDROPHILUS BICOLOR: ovatus, supra flavescens, subtus ater. Fabr. Entom. Syst. I. p. 184.

DYTISCUS PORCATUS: oblongus, niger thoracis elytrorumque margine externo flavo, elytris sulcatis glabris.

Habitat in Uplandiæ aquis, rarior.

Paulo minor D. *marginali*, sed major D. *Sulcato*, totus glaber, niger, exceptis marginibus thoracis & elytrorum lateribus flavis.

Elytron singulum 10 sulcatum, sulcis glabris abbreviatis. Differt a D. *marginali* thorace, cuius latera tantum externa flavescunt.

DYTISCUS FUSCUS: fuscus, thoracis margine flavo, elytris transverse subtilissime striatis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 189.

Magnitudine fere D. *striati*, a quo differt in primis striis elytrorum longe tenuioribus, & thorace magis fusco.

DYTISCUS AGILIS: niger, ore thorace elytrorum margine pedibusque ferrugineis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 194.

Habitat in aquis Uplandiæ, & alibi vulgaris.

Unguem longus & planus, fuscus.

Thorax ferrugineus, postice parum niger.

Elytrorum margo exterior ferrugineus.

DYTISCUS NOTATUS: fuscus thorace flavo: punctis quatuor nigris, elytrorum stria suturali tenuissima. Fabr. Ent. Syst. I. p. 195.

Habitat cum priori, vulgaris.

Eiusdem magnitudinis & staturæ cum D. *agili*, cui valde similis.

Thorax ruber, punctis quatuor nigris transversis,
quorum intermedia saepe coalta.

DYTISCUS BIPUNCTATUS: ater thorace flavo:
punctis duobus nigris, elytris flavo fuscoque va-
riis. Fabric. Ent. Syst. I. p. 192.

Magnitudine & statura D. agilis, laevissimus.

Thoracis puncta duo transversa.

Elytra flavescentia, fusco-irrorata.

DYTISCUS FENESTRATUS: supra ater, subtus
ferrugineus, elytris maculis duabus albidis. Fabr.
Entom. Syst. I. p. 192.

Habitat in Uplandiæ aquis, vulgaris.

Magnitudine dimidia D. striati, convexus, politus,
supra aterrimus, subtus piceus.

In basi capitinis puncta duo rubra.

Maculae duæ albæ in singulo elytro, altera fere in
medio prope marginem exteriorum linearis, altera
intra apicem lunulata.

DYTISCUS FULIGINOSUS: ater capite punctis
duobus sanguineis, thoracis elytrorumque lateribus
flavescens. Fabr. Entom. Syst. I. p. 191.

Magnitudine & statura D. fenestrati & uliginosus,
quibus valde similis, ater, politus.

Ceput ore & punctis duobus rubris.

Thoracis Elytrorumque margines laterales albido-fla-
vescentes.

DYTISCUS CONGENER: ater elytris piceis, mar-
gine pallidiore.

Habitat in aquis Uplandiæ, vulgaris.

Duplo minor D. Uliginoso, oblongus, politus:

Caput atrum punctis duobus sanguineis.

Thorax ater, immaculatus.

Elytra fusca seu picea margine pallidiore, immaculata.

DYTISCUS PLANUS: oblongus, depresso, piceus tibiis rufis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 195.

Habitat in Uplandiæ aquis; Calmarie WAHLBOM.

Magnitudine vix seminis Oryzæ, depresso, oblongus, politus, fuscos seu piceos, margine elytrorum parum pallidiore.

Tibiae rufescentes, femoribus piceis.

DYTISCUS NIGRITA: ater antennis pedibusque ferrugineis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 201.

Inter minimos, vix pediculo major, oblongus, convexus, ater, politus.

Antennæ & pedes rufescentes.

DYTISCUS PICTIPES: niger thorace flavo-maculato, elytris flavo-lineatis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 196.

Habitat in Uplandiæ aquis. DOM. DELÈN.

Magnitudine Seminis Oryzæ, oblongus, totus fuscos vel niger.

Thorax maculis flavis sparsis.

Elytra margine lineisque plurimis, tenuissimis, abruptis flavescensibus.

DYTISCUS LINEATUS: ferrugineus elytris fusco-lineis flavis obsoletis. Fabric. Entom. Syst. I. p. 200.

Inter minimos magnitudine vix pulicem superat, ovato-oblongus, convexus, totus ferrugineus.

Elytra fusca lineis flavescensibus, diaphanis, obsoletis, in singulo citciter quatuor, quarum ex-

te-

terior intra marginem longitudine elytri; reliquæ breviores.

DYTISCUS IMPRESSUS: flavescens, elytris punctatis impressis subocellaribus. Fabr. Entom. Syst. I. p. 199.

Inter minores, magnitudine pediculi, oblongus, anteice angustior, convexus, flavescens.

Elytra flavescenti-fusca, pulcherrime striata, punctis nigris impressis subocellaribus.

DYTISCUS DORSALIS: oblongus, niger capite thoracis margine elytrorumque puncto baseos & margine rubris. Fabric. Entom. Syst. I. p. 196.

Magnitudine feminis Oryzæ, oblongus, niger.

Rubra sunt os, margines thoracis & elytrorum, puncta duo transversa in thorace, & punctum unicum distinctum, rotundum in singuli elytri basi.

IPS SANGVINICOLLIS: atra thorace elytrorumque maculis duabus pedibusque rufis.

Mycetophagus Sangvinicollis. Fabr. Syst. Entom: I. p. 498.

Habitat in Vestro-Gothia, CAPIT. GYLLENHAL.

IPS 4-MACULATA: oblonga, atra elytris striatis: maculis quatuor rubris.

Habitat in Vestro-Gothia, GYLLENHAL; in Scania, QVENSEL.

Magnitudine & *statura* I. 4-pustulata, tota atra.

Elytra punctato-striata, maculis quatuor sanguineis, ut in 4-pustulata.

IPS FUNGORUM: ovata, punctata thorace flavo, capite elytrisque violaceis.

Tetratoma fungorum. Fabr. Entom Syst. I. p. 507.
Habitat in Scania, QUENSEL.

Paulo minor I. *bæmorrhoidalis*, cui valde similis,
 ovata, subcylindrica, punctata.

Caput nigro-violaceum.

Thorax & pectus rufescens.

Abdomen postice & pedes picei.

Elytra abque striis violacea.

DERMESTES CARNIVORUS: niger, elytris antice
 testaceis, abdomine albo. Fabr. Entom. Syst. I.
 p. 55. Mant. p. 34.

Habitat Upsaliæ.

DERMESTES TRIFASCIATUS: ovatus, niger ely-
 tris fasciis tribus undatis cinereis. Fabr. Entom.
 Syst. I. p. 228.

Habitat in Svecia. CAPIT. PFEIFF.

Magnitudine D. *pellionis*, facie omnino Anthreni.

Thorax postice cinereus.

Elytra fasciis tribus undatis, & puncto apicis cine-
 reis, villosis notantur.

DERMESTES ATOMARIUS: niger, elytris pun-
 etis fasciaque postica fulvis.

Mycetophagus atomarius. Fabr. Ent. Syst. I. p. 498.

Valde similis D. *maculato*, cuius forsitan sola varietas;
 totus ovatus, convexiusculus, tenuissime subvillo-
 sus, totus fusco-niger.

Elytra postice fascia flexa, saepe ex tribus punctis
 flavis constans, apice puncto & majori in basi
 praeter tria vel quatuor in medio sparsa, remota.

Pedes flavescentes.

DER-

DERMESTES MULTIPUNCTATUS: niger elytris punctis numerosis fulvis.

Mycetophagus multipunctatus. Fabr. Entom. Syst. I. p. 498.

Ips atomaria. Mus. nat. p. 116.

Ovato-oblongus, ater, convexus, punctis plurimis elytrorum inaequalibus, saepe confluentibus, pellucidis, flavis.

DERMESTES BICINCTUS: niger elytris fasciis duabus puncto que apicis ferrugineis.

Mycetophagus 2-fasciatus. Fabr. Entom. Syst. I. p. 500.

Culice vix major, laevis, ater.

Elytra in basi fascia ex punctis tribus saepe distinctis, alia pone medium & puncto apicis fulvis, diaphanis.

DERMESTES 4-MACULATUS: niger elytris punctis duobus rufis.

Mycetophagus 4-maculatus. Fabr. Entom. Syst.

I. p. 497.

Habitat in Svecia, DELÈN.

D. maculato minor, convexus, fuscus, antennis pedibusque pallidioribus.

Elytra fusca, substriata, punctis duobus in singulo flavis, altero in costa, altero intra apicem.

DERMESTES PUNCTATUS: niger, politus elytris basi thoraceque rufis.

Mycetophagus punctatus. Fabr. Entom. Syst. I. p. 499.

Magnitudine & facie D. maculati, convexus, niger.

Thorax piceus seu rufescens.

Elytra nigra, basi rufa raro intra apicem puncto rufo.

Pec-

Pedes rufescentes.

DERMESTES NIGRICORNIS: flavus antennis fuscis.

Mycetophagus nigricornis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 499.

Tenebrio pallens? Linn. Faun. Svec. p. 225.

Habitat Upsaliæ; in Blekingia. Dom. RHEN.

Magnitudine Seminis Oryzæ, totus flavo-testaceus, convexus, laevis oculis solis nigris.

DERMESTES TESPACEUS: oblongus, ferrugineus abdominis basi oculisque nigris. Fabr. Ent. Syst. I. p. 233.

Paulo minor D. *nigricorni*, convexus, ferrugineus totus, exceptis oculis basique abdominis nigris.

DERMESTES MACELLARIUS: niger, glaber pedibus piceis. Fabr. Entom. Syst. I. p. 228.

Habitat Upsaliæ in domibus & fenestris.

Simillimus D. *pellionis* sed absque punctis albis elytrorum, totus ater pedibus, inprimis tibialis, antennis & ore fuscis seu piceis.

Forsitan sola varietas D. *pellionis*.

DERMESTES FUMATUS: oblongus, tomentosus, cinereo-testaceus oculis nigris.

D. *Fumatus* & tomentosus. Fabric. Entom. Syst. I. p. 231 & 232.

vulgaris in Uplandia & alibi, in hortis.

Corpus oblongum, convexum, totum pilis testaceis virescenti fuscis testum, magnitudine seminis Oryzæ.

Oculi soli nigri.

Utraque species Fabricii non nisi varietates sunt vel sexu differunt.

DERMESTES FIMETARIUS: oblongus, niger, ni-

nitidus, pedibus ferrugineis. Fabric. Ent. Syst.

I. p. 231.

Pulice minor, clytris postice piceis.

DERMESTES UNIDENTATUS: oblongus, testaceus thorace unidentato. Fabr. Syst. Ent. I. p. 232.

Habitat vulgaris saepe in domibus.

DERMESTES LONGICORNIS: oblongus, fuscus thorace fovea impressa.

Habitat in domibus.

Similis priori magnitudine pediculi, fuscus.

Thorax in medio fovea impressa.

Elytra & thorax vel fusca vel picea.

DERMESTES CORDATUS: oblongus, fuscus thorace trisulcato.

Tenebrio minutus? Linn. Syst. p. 675.

Pulice minor fuscus.

Thorax obcordatus angulis anticks acutis, trisulcatus, marginibus elevatis.

DERMESTES CELLARIS: ovatus, fuscus thorace crenato. Fabr. Entom. Syst I p. 234.

Habitat Upsaliæ; in Vestmannia HALL; in Blekingia, RHEN.

Magnitudo pulicis oblongus, lœvis, fuscus vel testaceus.

Thorax rufescens, interdum subcrenatus.

Elytra quandoque basi rufescunt.

DERMESTES SERRA: ater antennis flavis: clava serrata. Fabr. Entom. Syst. I. p. 234.

Habitat Upsaliæ & alibi; in Blekingia, RHEN.

Magnitudo seminis oryzae, ovatus, convexus, ater, exceptis antennis & pedibus flavis; politus.

Antennarum clava latere altero fissa, ferrata.



TH. I.

Natura est systema earum legum, quas ad entium conservationem statuit Creator.

TH. II.

Nec est inanis opera, nec nimis curiosus, quam in hisce per vestigandis collocaverint mortales.

TH. III.

Ut naturae oeconomia recte percipiatur, necesse est, ut ad casus speciales animum attendamus; Itaque requiritur, ut species a se invicem distinguantur: hac vero nuda cognitione, ex superficie earum petita, nemo sapiens adquiescit.

TH. IV.

Ea est profectio varietas, ea cognoscendorum multitudo, ut methodum nobis necessario fingamus systematicam, qua in his rimandis utamur. Reliquis scientiis bac opus est; eam vero in Historia Naturali in primis necessariam existimamus.

TH. V.

Felicissimos in bac scientia recentiori aeo factos progressus, ingeniosissime eam tractandi methodo tribure, non dubitamus.

TH. VI.

Licet hoc seculo maxime exculta fuerint scientiae, pluribusque novis veritatibus jure gloriari queant; frequentioribus tamen inventis, nulla superbire potest, quam Historia Naturalis: quorum autem omnium pretium posteritatis erit dijudicare: nam hominum commenta delet dies, judicia confirmat.

D. D.
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA
SISTENS
INSECTA SVECICA.

QUORUM
PARTEM SEPTIMAM,
VENIA EXP. ORD. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

**CAROL. PET.
THUNBERG,**

EQUITÉ AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. NAT.
CURIOS. REG. SCIENT. LONDIN. HOLM. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PHILAD.
PATR. HOI M. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. ET HAFNIENS. HIST. NAT.
LUND. HARLEM. AMSTELD. ZEELAND. NIDROSIENS. TICINENS. IENENS.
HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT.
STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS.
MONSPLEIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN.
ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT
GUSTAVUS MAGNUS WENNER,
HOLMIENSIS.

In Audit. Botanico die 22 Dec. 1794.

H. A. M. S.

UPSALIÆ,
LITTERIS JOH. FRED. EDMAN, REG. ACAD. TYPOGR.

S:Æ R:Æ M:TIS
SPECTATÆ FIDEI VIRO,
CHIRURGO REGIS,
NOBILISSIMO ATQUE EXPERIENTISSIMO
DOMINO
JOHANNI LUDOVICO
WENNER,
PATRI INDULGENTISSIMO!

Si dici posset, quantum parenti debeat filius, jam mihi
gratularer occasione illud testificandi; quum vero inti-
mis animi sensibus exprimendis nulla sufficiat eloquen-
tia, præstabit silentio involvere, quam incomta oratio-
ne obterere venerationem, cuius sinceræ testificationi ni-
hil certe deesse voluerim. Votis nunquam desistam,
velit Supremum Numen per longam annorum seriem
salvum Te sospitemque servare. Permansurus quoad
vixero Tuus

INDULGENTISSIME PARENTS

filius obsequentissimus
GUST. MAGN. WENNER.

INSECTA SVECICA.

TINEA SPARGANELLA: ferrugineo-aurea, alis punctis tribus fuscis.

Habitat in Vestrogothia, Bjerkander.

Paulo minor *T. culmellæ*, cui similis, sed magis obtusa, facie Tortricis & tota aureo-ferruginea, nitens, lineis tenuibus albidis. In margine tenuiori puncta tria, fusca, saepe obsoleta, longitudinaliter digesta in singula ala. Alæ subtus fuscæ.

Palpi corniformes.

TINEA ANGULELLA: flavescens-fusca puncto in medio alæ nigro.

Habitat in Ostrogothia, Pfeif; in Vestmannia, Hall.

Magnitudine & facie *T. sparganellæ*, postice obtusa & facie Tortricis, tota ferrugineo-flavescens; margino exterior basi fuscus & paulo pone medium in pagina media alæ superioris punctum nigrum.

Palpi porrecti.

Subtus tota pallidior.

Variet colore magis flavo vel fulvo.

TINEA ARIDELLA: flavescens-cinerea linea fascia que fuscis.

Magnitudine & facie *T. culmellæ*, tota cinerea in medio alarum linea fusca; intra apicem fascia flexuosa & in ipso margine puncta aliquot nigra.

Alæ inferiores albidæ, immaculatae.

TINEA ABRUPTELLA: alis nigro-fasciatis linearisque: linea abrupta ramosa.

Magnitudine & facie T. culmellæ.

Palpi porrecti, subtus nigri, supra albi.

Antennæ attenuatæ, corpore breviores.

Alæ superiores nigro-irroratæ & ramoso-lineatæ; intra marginem fascia curva & ipse margo niger ciliis albo nigroque dentatis; in medio linea lata abrupta, alba, postice ramosa inque ipso apice macula alba. Alæ inferiores albæ, immaculatæ.

TINEA FERRUGINELLA: fusco-ferruginea, immaculata alis postice plicato-striatis.

Magnitudine & facie T. culmellæ, tota fusco-ferruginea, immaculata.

Palpi porrecti, capite longiores.

Antennæ parum fetaceo-attenuatæ.

Alæ superiores postice plicato-striatæ & margine externo pallido; subtus fuscæ marginibus pallidis.

TINEA DEALBELLA: argenteo-fusca linea marginali mediaque ramosa argentea nitida.

Magnitudine & facie T. pratellæ.

Palpi porrecti, cinerei, capite longiores.

Antennæ supra albæ, subtus fuscæ.

Alæ superiores ex argenteo-fuscæ, nitentes: margo exterior argenteus & in medio linea, postice rama, ramis liberis divaricatis argenteis; margo posticus ciliatus, immaculatus.

TINEA HAMELLA: cinereo-fusca linea medio hamata argentea; margine postico punctato.

Magnitudine & facie T. culmellæ.

Palpi porrecti, capite paulo longiores.

Antennæ cinereæ.

Alæ

Alæ superiores externe fuscæ, dorso cinereæ; in medio linea argentea, medio hamum exserens, postice abbreviata; intra marginem posticum linea fracta punctis quatuor nigris in plicis, & in ipso apice macula fusca intra maculam argenteam.

TINEA NEMORELLA: cinerea, albo-lineata puncto utrinque nigro.

Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal & alibi.

Paulo minor T. culmella, alis apice caudato-divaricatis.

Palpi porrecti, spina in medio ereta.

Antennæ filiformes, annulatae, longitudine dimidia corporis.

Alæ cinereo-flavescentes, albo-striatae seu ad marginem externum fuscescentes lineis ramosis argenteis, dorso pallidiore. In medio dorso versus marginem tenuiorem puncta duo nigra & versus posticum plura minutissima, sparsa.

TINEA OPPOSITELLA: atra alis maculis duabus oppositis albis.

Alucita oppositella? Fabr. Ent. Syst. 3. p. 344.

Minuta alis plano-convexis, duplo minor T. minutella Linnæi, tota atra exceptis punctis duobus ponere medium transversis in alis superioribus & annulis albis abdomini pedumque.

Palpi corniformes.

Antennæ dimidio breviores alis ciliatis.

Differet a T. minutella colore atro & maculis albis.

TINEA FORFICELLA: ferruginea linea marginali, punto & fascia obliqua fuscis.

Habitat in Svecia meridionali; in Ostrogothia, Vestrin; in Westmannia, Stickman.

Magnitudo & facies T. culmellæ.

Palpi porrecti, longitudine capitis & thoracis.

Antennæ tenuissime peñinatae, palpis paulo longiores.

Alæ superiores ferrugineaæ: intra marginem exterio-rem linea, pone medium punctum & ab apice extero ad dorsum ducta linea obliqua fusca, ut in *P. forficali*; intra marginem posticum ciliatum puncta aliquot nigra. *Alæ inferiores* albidae.

TINEA CUPRELLA: alis cupreo-aureis, capite thoraceque hirsutis, antennis longissimis.

Facie omnino T. Frischelle, subcylindrica.

Antennæ setaceaæ, nigræ, apice albæ, corpore duplo longiores.

Caput & thorax atra, valde hirsuta.

Alæ totæ cupro-anreæ, nitidae, apice ciliatae.

An Alucita Cuprella? Fabric. Ent. Syst. 3. p. 342.

TINEA ERXLEBELLA: antennis mediocribus, aliis anticis aureis, posticis purpureo-aureis, capite fulvo.

Alucita Erxlebella. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 340.

Facie omnino T. Frischelle, sed fere major.

Antennæ setaceaæ, fuscae, apice albidæ, longitudine corporis.

Caput hirsutum, fulvum.

Thorax aureo-nitens.

Alæ superiores totæ cupro-aureæ, nitidae, margine extero versus apicem cupreo-purpurascente, im-
ma-

maculatæ, apice ciliatæ; inferiores purpureæ, auro-nitentes margine imprimis extimo aureo.

Corpus nitidum.

Pedes fusco-fasciati, nitentes.

TINEA STRIGILELLA: fusco-aurea alis superiorebus fascia argentea, capite fulvo.

Habitat in Svecia, D. Gedner.

Similis omnino T. cinetella, sed decies minor, non atra, opaca sed aureo-fusca.

Caput omnino fulvum.

Alæ superiores postice & *inferiores* undique valde ciliatæ.

TINEA SPARMANNELLA: alis auro-purpureo-que variegatis nitidis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 324.

Habitat in variis Sveciæ provinciis.

Alæ superiores aureæ maculis majoribus minoribusque variegatis cæruleis vel purpureis; *inferiores* fuscae, ciliatæ.

TINEA FLAVIFRONTELLA: alis anticis cinereis immaculatis, capite fulvo.

Vulgaris, pelles & plumas in domibus destruens cum *T. pellionellæ*.

An varietas *T. pellionellæ*?

TINEA 4-GUTTELLA: alis nigris; punctis duobus longitudinalibus niveis.

Minuta, tota fuscida, fusca macula alba in singulæ. *Alæ superioris* medio & alia in apice.

Apices alarum uti & *inferiores* ciliatæ.

Dif fert a *T. atrella* punctis longitudinaliter positis altero in medio, altero in apice alæ.

TINEA 6 GUTTELLA: alis cinereis: punctis duobus aureis unoque niveo oblique transversis.

Minuta, tota cinereo-fusca, argenteo-nitens.

Antennæ annulatae, filiformes, corpore breviores.

Alæ superiores apice dilatatae, erecto-exstantes, ciliatae; in medio dorso prope marginem interiorem macula aurea, paulo posterius in medio alæ alia aurea & pone hanc in margine exteriori macula alba; omnes parvae; Apice elevatae, ciliatae.

TINEA PENICILLA: alis plumbeis: apice penicillato-plumosis.

Habitat in Svecia, Delén.

Minima magnitudine vix pulicis, tota supra plumbea, ipso apice ciliato & fusco.

Antennæ brevissimæ.

TINEA FARINELLA: facinaceo-nivea immaculata.

Similis T. argentellæ, sed minime nitida, verum farinacea, immaculata; alis superioribus subtus & inferioribus totis fuscis, nitidis.

Antennæ cinereæ.

Abdomen & pedes fuscescentes.

TINEA THORACELLA: flavæ thorace punctis tribus aliquæ fasciis duabus fuscis.

Habitat in Svecia, Delén.

Magnitudine pediculi, convoluta alis postice valde ciliatis.

Caput, thorax & *alæ superiores* flavæ. In thorace puncta tria fuscæ; in aliis superioribus fasciæ binæ, fuscæ, transversæ, altera prope basin, altera in medio.

TINEA AUROPUNCTELLA: fusca alis punctis
tribus aureis alternantibus.

Magnitudine dupla pediculi, tota fusca, aureo-nitens.
In alis superioribus prope basin fascia transversa au-
rea; in medio juxta marginem interiore macula
& alia intra apicem aurea, majuscula.

TINEA PAYKULLELLA: alis purpureis: fasciis
tribus aureis.

Habitat in Västergothia, Gyllenhal.

Minuta vix *T. cultella* major.

Alæ superiores totæ purpureæ seu auro-rufæ, niten-
tes, margine ciliatæ: fasciis tribus aureis, trans-
versis; una intra basin, altera in medio, tertia in-
tra apicem. *Alæ inferiores* fuscæ, immaculatæ,
ciliatæ.

Pedes & abdomen fusca uti & antennæ.

TINEA BIMACULELLA: alis fuscis: maculis dua-
bus aureis apicis dorsalique.

Media, facie Tortricis.

Alæ superiores fuscæ, obsolete aureo-nitentes. Ma-
cula magna communis in medio dorso aurea, &
alia magna intra apicem.

Caput, thorax & omnia subtus fusca.

TINEA GYLLENHALELLA: purpurea fascia pun-
ctisque decem aureis.

Habitat in Västergothia, Bjerkander.

Minuta, oblonga.

Caput villosum, rufum.

Antennæ purpureo alboque annulatæ, corpore pau-
lo breviores.

Tho-

Thorax fuscus, antice & loco scutelli flavescens.

Alæ superiores deflexæ, totæ purpureæ seu brunneæ, punctis minutissimis aureis micantes; apice ciliatæ; Ante medium fascia obliqua, communis, aurea; in medio marginis exterioris macula elongata, triangularis: in margine interiori paulo pone medium macula communis; pone hanc in margine externo alia, linearis, & in ipso apice prope marginem tenuiorem strigæ binæ parvulæ.

Abdomen album annulis nigris.

Pedes albi, nigro-irrorati.

Fascia prima interdum interrumpitur.

TINEA GLEICHELLA: alis planis atris: fascia media maculisque duabus oppositis argenteo-albis.
Fabr. Ent. Syst. 3. p. 323.

Vix major T. cryptella seu inter minimas.

Alæ superiores atræ: fascia in medio alba, transversa, communis; intra apicem puncta duo opposita in singula ala ut in T. oppositella.

Palpi corniformes.

Corpus fuscum, nitidum, uti & alæ inferiores.

TINEA BLANCARDELLA: alis auratis: lineola strigisque marginalibus argenteis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 427. Clerk. Icon. III. fig. 8.

Habitat in Vestrogothia, Bjerkander.

TINEA FORSTERELLA: alis fusco-auratis: arcu dorsali lineolisque marginalibus quinque argenteis, apice macula atra argenteo-pupillata. Fabr. Ent. Syst. 3: p. 329

Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal.

Pedes nigri argenteo - annulati.

Alæ inferiores fuscae.

TINEA STIGMATELLA: oblonga alis linearibus ferrugineis: macula costali alba. Fabr. Ent. Syst.

3. p. 304.

Habitat hinc inde in pluribus provinciis.

TINEA ATRELLA: fusca, plana tota nigro-irrorata, alis ciliatis, subtus albida. Mus. P. 6. p. 78.

Inter minores, tota supra atra, albido-irrorata; subtus albidior, nitida.

Antennæ filiformes, corpore breviores, albo-annulatae.

Palpi corniformes.

Alæ superiores planæ, apice ciliatae, tenuissime irroratae nigro-alboque, apice subpunctato.

Omnia subtus albida, fusco-irrorata, nitidiuscula.

TINEA ATROPUNCTELLA: nigra, punctis alarum sex atris. Mus. P. 6. p. 78.

Magnitudo, statura & facies T. Evonymella, tota nigra punctis tribus atris in singulo elytro longitudinaliter positis, excepto abdomine postice flavescente.

TINEA OBSCURELLA: alis obscure fuscis nitidulis immaculatis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 312.

Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal.

TINEA VIDUELLA: alis atris: fasciis albis media abrupta, capite thoraceque albis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 299.

Habitat in Sveciæ pluribus provinciis, etiam meridionalibus.

Palpi corniformes, albi.

Antennæ nigræ.

Caput niveum.

Thorax albus maculis atris.

Aæ atræ fasciis tribus albis, prima & ultima obliquis, media abruptæ; margo ciliatus albus; inferiores atræ.

Pedes atri, albo-annulati uti & abdomen.

TINEA VIRGELLA: alis anticis cinereis: fasciis quatuor atris, posticis atris, capite albo.

Habitat in Svecia, sat vulgaris.

Similis T. viduellæ, sed magis angustior.

Palpi corniformes, albi.

Antennæ annulatae, corpore paulo breviores.

Caput album, thorace nigro maculato.

Alæ superiores cinereæ, nigro-irroratae; fasciæ quartuor atræ distinctæ, prima & ultima obliqua, mediana duæ transversæ; margo ciliatus, nigro-punctatus.
Abdomen & pedes atri, albo-annulati.

TINEA SULPHURELLA: alis anticis auratis: maculis duabus sulphureis, posticis flavis.

Alucita sulphurella. Fabr. Ent. Syst. 3 p. 343.

Magnitudine & facie T. Degerellæ.

Palpi corniformes, antennæque mediocres, fuscæ.

Alæ anticæ fusco-auratae: in medio dorso macula lutea, in margine extimo minor; sæpe a costa linea brevis abbreviata, lutea; inferiores luteæ, apice fuscæ, ciliatae.

TINEA OCULELLA: fusco-cinerea: linea nigra terminata ocello albo.

Habitat in Svecia; in Vestmannia, Hall.

In-

Inter majores alis subforficatis, *Pyralidis* facie, tota fusca, fuliginosa, villosa.

Palpi porrecti, corniformes, breves.

Antennæ fuscæ.

Alæ superiores fuscæ, in primis versus marginem exteriorem; a costa ad medium linea nigra, terminata ocello pupilla alba; *margo* posticus niger ciliis cinereis; *alæ subtus* fusco-glaucescentes.

Corpus nigrum.

Caput interdum album.

TINEA FAGELLA: alis griseis: strigis atomisque nigris.

Habitat in Blekingia, Rhen.

Magnitudine *T. unguicellæ*, tota cinereo-albida, punctis atomisque nigris irrorata; alis alterius sexus postice augustatis, subcaudatis.

Palpi corniformes.

Antennæ annulatae, corpore breviores.

Alæ notantur in basi lineola atra; in medio litura V latino simili cum punctis duobus a latere externo & pone hanc litura obliqua nigra.

Pedes annulati.

Variat magis vel minus punctis nigris irrorata & characteribus existantibus.

TINEA FUNGELLA: alis superioribus cinereis maculis punctisque nigris irroratis, inferioribus fuscis.

Habitat in Svecia sat vulgaris; in Blekingia, Rhen.

Facie & similitudine summa *T. Boletellæ*, sed duplo minor, alis convexis, deflexis.

Palpi corniformes.

Antennæ fuscæ, obsolete annulatæ, corpore triplo breviores.

Caput & apices palporum lutescentes.

Alæ superiores cinereæ, totæ irroratæ maculis sub-quadratis & punctis nigris plurimis; in margine externo maculæ sunt majorcs & subfasciatæ.

Alæ inferiores fuscæ, immaculatæ, nitidæ.

Corpus cinereum.

Pedes annulati.

TINEA ATOMELLA: *cinerea, fusco-irrorata: arcu in medio nigro.*

Noctua lanceolata? Fabr. Ent. Syst. 3. p. 53.

Habitat in Svecia vulgaris.

Inter majores, facie Tortricis, sed alis non truncatis, verum sublanceolatis, rotundatis.

Tota cinerea punctis minutissimis irrorata. In media pagina alæ superioris pone medium arcus niger & margo posticus nigro-punctatus. Præterea sœpe in costa lineola atra, quandoque fracta.

Alæ inferiores cinereo-fuscæ, immaculatæ.

Palpi porrecti, breves.

TINEA LATERELLA: *alis anticis cinereo-albidis: lituris punctisque nigris, thorace linea utrinque nigra.*

Habitat in Svecia, Pfeif; in Vestrogothia, Bjerkander.

Facie, magnitudine & similitudine T. picarellæ, oblonga.

Palpi corniformes, breves.

An.

Antennæ fuscæ.

Caput & thorax hirsuta, alba: linea utrinque in theracis lateralibus atra.

Alæ superiores albidæ, cinereo-maculatae irroratae; in costa lineola atra, alia abbreviata versus marginem internum, & curva paulo posterius. In margine externo puncta aliquot magis distincta, nigra. Margo ciliatus. Subtus alæ superiores & inferiores totæ fuscæ, nitentes.

Corpus & pedes cinerei, nitentes.

TINEA BINOTELLA: cinereo-fusca alis punctis duobus atris.

*Magnitudine & statura *T. juniperella*, oblonga, planiuscula, tota cinereo-fusca, nitidula.*

Palpi corniformes.

Alæ superiores in medio notantur puncto atro & alio intra apicem quasi ex duobus conflato.

TINEA AXILELLA: cinereo-fusca alis axilla puncto hamoque nigris.

Similis priori, tota cinereo-fusca seu cinerea nigro tenuissime irrorata; in singula ala superiori ipsa basis costæ lineola atra, in medio lineola seu punctum obliquum, & pone medium hamulus ater.

Subtus omnia cinereo-albida, alis inferioribus glau-cis, nitidulis, ciliatis.

TINEA TRINOTELLA: alis cinereis punctis tribus nigris.

Habitat in Västrogothia, Bjerkander.

Media, tota cinerea, vix maculata.

Alæ superiores cinereo - flavescentes: in singulo pauculo ante medium puncta duo, transversa, atra, interiore majore, & pone medium solitarium. Oculo armato alæ videntur punctis tenuissimis nigris irroratae. *Alæ inferiores* ciliatae.

Tibiæ valde pilosæ.

Caput, thorax & omnia subtus cinerea.

A. T. tripunctella Fabr. diversa.

TINEA PARIPUNCTELLA: cinerea alis punctis sex nigris per paria digestis.

Habitat in Ostrogothia, Westrin.

Media vel inter minores, plana, cinerea.

Antennæ annulatae, corpore breviores.

Palpi corniformes.

Alæ superiores notantur in basi, medio & pone medium pari punctorum atrorum, transverse collocatorum & præterea margo exterior & apex notantur punctis nigris. *Alæ inferiores* glaucae, ciliatae.

Tibiæ annulatae.

TINEA TETRAPUNCTELLA: alis albis punctis duobus nigris, margine apiceque fuscis.

Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal.

Inter minimas tota cinereo - alba.

Palpi corniformes, fusi.

Antennæ albo - annulatae, corpore breviores.

Alæ superiores albidæ margine - externo postice fusco, uti & apice ciliato; prope costam videtur punctum

Etum oblongum, obsoletum; in medio versus marginem externum punctum nigrum minutum & aliud in media pagina pone medium. Alæ inferiores valde ciliatæ.

Pedes fusco-cinerei.

TINEA STANNELLA: plumbea, immaculata capite fulvo.

Magnitudine & facie *T. padellæ*, plumbea capite fulvo.

Antennæ fuscæ, corpore breviores.

Alæ supra nitentes, immaculatæ; subtus obscuriores.

TINEA DENTICULELLA: purpurea falcia alarum maculisque tribus argenteis.

Habitat in Svecia, Gedner.

Inter minores, tota purpurea; in alis superioribus fascia in media curva & maculæ tres argenteæ, quarum duæ in margine externo, una in interno, oblongæ vel subtriangulares. Margo posticus latior, ciliatus.

Alæ inferiores fuscæ, ciliatæ.

Antennæ fuscæ, longitudine fere corporis.

TINEA MARGINELLA: alis griseis: margine crassiori albo, palpis plumosis. Fabr. Ent. Syst. 3. p. 297.

Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal.

Magnitudine *T. albella*, cinereo-fuscâ, oblonga.

Antennæ filiformes, fuscæ, corpore breviores.

Palpi porrecti, plumosi, spina erecta.

Caput albidum.

Alæ

*Alæ superiores fusco-cinereæ: margo exterior ad medium usque albus; ipse margo posticus albidus uti & apex antice. In media pagina puncta duo nigra. Differt a *T. albella*, quod dimidia pars marginis antici tantum alba sit.*

EXPLICATIO TABULÆ.

Fig. 1. <i>T. aridella.</i>	Fig. 3. <i>T. Gyllenhalælla.</i>
2. — abruptella.	9. — viduella.
3. — hamella.	10. — virgella.
4. — forficella.	11. — atomella.
5. — memorella.	12. — fagella.
6. — sexguttella.	13. — laterella.
7. — auro-punctella.	14. — oculella.





D. D.

DISSERTATIO ENTOMOLOGICA
SISTENS

INSECTA SVECICA.

QUORUM

PARTEM OCTAVAM,
VENIA EXP. ORD. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAROL. PET.
THUNBERG,

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. NAT.
CURIOS. REG. SCIENT. LONDIN. HOLM. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PHILAD.
PATR. HOIM. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. ET HAFNIENS. HIST. NAT.
LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSIENS. TICINENS. IENENS.
HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT.
STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS.
MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN.
ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

JONAS KULLBERG,
STIP. VICTOR. VESTRO-GOTH.

In Audit. Botanico die 15 Dec. 1794.

H. A. M. S.

UP SALIÆ,

LITTERIS JOH. FRED. EDMAN, REG. ACAD. TYPOGR.

THESES.

I.

Quum fere quovis die infectorum sovi detegantur phalanges, cavendum est quam maxime, ne genera & species nimium multiplicentur.

II.

Quare eos judicamus studio novitatis addictos, qui vel fine rationibus sufficientibus novas distributiones verum faciant naturalium, vel veteres dilacerent atque tollant.

III.

Quo visibiliores & generaliores sint notæ, secundum quas infectorum sit distributio, eo facilius erit ipsum systema.

IV.

Natura in minimis est Summe admiranda.

V.

Hanc inter alias stabilivit natura regulam, ut quo minora sint animalia, eo magis semet multiplicent.

VI.

Atque contra ea quo majora sint animalia, eo pauciores edant partus.

VII.

Admiramur pulcritudinem sepe majorum animalium, sed parvorum intuentes formositatem sepius eximiorem esse confiteamur necesse est.

VIII.

Quo magis abditum quidquid est, eo etiam major admiratio nos rapit, quando istud investigamus.

INSECTA SVECICA.

TRITOMA BICOLOR: rufa elytris postice nigris.

Hypophlæus bicolor. Fabr. Ent. Syst. I. p. 501.

Linearis, oblonga, convexa, tota rubra exceptis

Elytris dimidiis postice & apice abdominis atris.

TRITOMA 2-PUSTULATA: fusca, glabra elytris puncto rubro.

Lyctus 2-pustulatus. Fabr. Ent. Syst. I. p. 503.

Habitat in Blekingia, Rhen.

Linearis, polita, fuscoc-ferruginea.

Elytra truncata, intra apicem puncto pallido diaphano.

TRITOMA CONTRACTA: ferruginea, polita elytris-striatis: sutura atra.

Lyctus contractus. Fabr. Ent. Syst. I. p. 505.

Similis priori, sed tota rufa elytris striatis, sutura atra.

TRITOMA PICIPES: lœvis, nitida, castanea antennis nigris.

Hypophlæus castaneus. Fabr. Ent. Syst. I. p. 500.

Habitat in Blekingia, Rhen.

Tota lœvis striis elytrorum obsoletis, brunnea, linearis-oblonga.

TRITOMA PALLIPES: nigra, depressa antennis pedibusque piccis.

Habitat in Svecia & in India Orientali.

Magnitudo pediculi, atra, depressa, elytris manifeste striatis, antennis pedibusque solis rufescentibus.

TRITOMA RUFIFRONS: atra fronte, maculis duabus elytrorum pedibusque ferrugineis.

Ips rufifrons. Fabr. Ent. Syst. I. p. 514.

An *Tenebrio linearis?* Linn.

TRITOMA SULCATA: atra pedibus ferrugineis, elytris sulcatis.

Colydium elongatum & filiforme. Fabr. Ent. Syst. I. p. 495, 496.

Habitat in *Vestrogothia*, Gyllenhal.

TRITOMA STERCOREA: tota ferruginea elytris striatis.

Habitat in *Blekingia*, Rhen.

Linearis, glabra, tota ferruginea.

Thorax obsolete punctatus.

Elytra striata.

SPHÆRIDIUM FERRUGINEUM: globosum, ferrugineum elytris striatis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 80.

Corpus globosum, magnitudine pediculi.

Elytra punctato-striata.

SPHÆRIDIUM RUBRUM: oblongum, ferrugineum elytris levibus.

Habitat in *Gestricia*, Printz.

Corpus magnitudine pediculi, oblongum, lave, glabrum, totum rubrum seu brunneum.

Elytra lavia absque striis & punctis.

SPHÆRIDIUM MARGINATUM: lave, atrum elytrorum margine pedibusque ferrugineis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 80.

Habitat in *Smolandia*, Hay.

Paulo minus S. Scarabæoide, lœve, atrum, margine extimo elytrorum & pedibus piceis.

SPHÆRIDIUM MORIO: atrum, holosericeum totum.
Tritoma morio. Fabr. Ent. Syst. I. p. 507.

Magnitudine pulicis, atrum totum, sed supra tenuisime villosum.

SPHÆRIDIUM RUFIPES: atrum, glabrum elytris striatis, pedibus rubris.

Habitat in Blekingia, Rhen.

Magnitudine pulicis, globosum, atrum, glabrum.

Elytra valde striata.

Pedes rubri.

SPHÆRIDIUM GLOBOSUM: globosum, atrum thorace rufo. Fabr. Ent. Syst. I. p. 78.

Habitat rarius in Svecia inventum.

SPHÆRIDIUM HUMERALE: atrum, glabrum elytris macula baseos rubra. Fabr. Ent. Syst. I. p. 79.

Habitat Upsaliæ in ligno putrido.

Corpus globosum, glabrum, atrum thoracis marginé, elytrorum basi, abdomineque rubris.

Variat elytris nigris & abdomine piceo.

SPHÆRIDIUM PLAGIATUM: pallidum, lœve plaga suturali nigra.

Habitat in Västrogothia, Gyllenhal; in Gestricia, Printz.

Magnitudine pulicis luteo-fuscum, lœve, glabrum, basi elytrorum & sutura nigra.

SPHÆRIDIUM NIGRIPENNE: rufum, nitidum elytris atris, antennis fuscis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 82.

Corpus magnitudine pulicis, globosum, involutum,

læve, nitidum, totum rubrum, exceptis elytris atris & antennis fuscis.

SPHÆRIDIUM RUFICOLLE: atrum, nitidum thorace pedibusque anticus rufis. Fabric. Entom. Syst. i. p. 82.

Simile priori, totum læve, oculis, elytris, abdome atris; pedibus, thorace, capiteque rufis.

SPHÆRIDIUM FLAVIPES: atrum elytris apice pedibusque rufis. Fabr. Ent. Syst. i. p. 81.

Habitat in Svecia; in Västergothia, Gyllenhal.

Magnitudine pediculi. totum glabrum, læve, atrum, elytris intra apicem puncto rufo, pedibus piceis.

SPHÆRIDIUM BICOLOR: supra atrum subtus piceum, elytris glabris lævibus: puncto rubro intra apicem. Fabr. Ent. Syst. i. p. 82.

Simillimum S. *Flavipedi*, a quo vix distinctum nisi abdome rubro.

SPHÆRIDIUM 2 PUSTULATUM: subvillosum, atrum macula humerali pedibusque rubris.

Corpus pulicis magnitudine, hemisphæricum, subvillosum, atrum humeris solis & elytris rufis.

Elytra lævia.

SPHÆRIDIUM BIPUNCTATUM: atrum, læve puncto elytrorum baseos pedibusque rufis.

Habitat in Svecia; in Västergothia, Gyllenhal.

Magnitudine pulicis, hemisphæricum, læve, totum atrum puncto in singulo elytro intra besin pedibusque rufis.

SPHÆRIDIUM TRITOMA: atrum, globosum elytris macula humerali coccinea.

Tritoma 2-pustulata. Fabr. Ent. Syst. I. p. 505.

Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal.

Subglobosum, glaberrimum, atrum costa elytrorum coccinea.

SPHÆRIDIUM IPS: atrum, oblongum costa elytrorum coccinea.

Ips 2-pustulata. Fabr. Ent. Syst. I. p. 511.

Simile Sph. *Tritomæ*, sed corpus oblongo-lineare, glabrum, atrum costa elytrorum coccinea.

CASSIDA MARGARITACEA: viridi-flavescens, punctata capite pectoreque nigris. Fabric. Entom. Syst. I. p. 297.

Magnitudine C. nobilis luteo-virescens, punctata capite pectoreque solis nigris.

CASSIDA FLAVEOLA: supra lutescens, subtus atra margine abdominis flavo.

Habitat in Vestrogothia, Gyllenhal.

Similis priori, sed abdomen, pectus, oculi atri, margine abdominis flavescente.

CASSIDA PALLIDA: flavescens, punctata oculis nigris.

Habitat Upsaliæ.

Similis prioribus, sed paulo major, tota exceptis oculis flava.

CASSIDA EQUESTRIS: viridis elytrorum basi striga argentea, abdomine atro-margine pallido. Fabric. Ent. Syst. I. p. 292.

Habitat Upsaliæ, in Hortis.

Paulo major *C. viridi*, cui similis, sed abdomen margine flavescit.

CAS.

CASSIDA VIBEX: virens sutura sanguinea. Fabr.

Ent. Syst. I. p. 293.

Habitat Upsaliæ rario.

Similis C. viridi, sed distincta sutura rufa.

CASSIDA BRUNNEA: brunnea margine elytrorum rufo.

Cassida limbata Fabr. Ent. Syst. I. p. 294.

Habitat Upsaliæ & alibi.

Magnitudine C. viridis, tota fusco-brunnea, margine rufo.

Elytra punctata.

CASSIDA FERRUGINEA: supra ferruginea, subtus nigra, elytris punctatis costatis.

Cassida ferruginea. Fabr. Mant. p. 62. Spec. Inf. p. 108. Ent. Syst. I. p. 294.

Habitat in Svecia sat frequens.

Magnitudine superat C. nobilem, tota supra ferruginea, immaculata; subtus atra.

Elytra punctata & lineis elevatis costata.

CASSIDA AFFINIS: elytris virescentibus nigro punctatis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 293.

Habitat vulgaris in Hortis.

Similis omnino C. nebulosæ, excepto colore viridi & elytris in primis postice magis nigro-punctatis.

CASSIDA MURRÆA: supra rubra, subtus nigra elytris nigro maculatis. Fabr. Ent. Syst. I. p. 294.

Habitat in Västrogothia; Gyllenhal.



D. D.
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA
SISTENS
INSECTA SVECICA.

QUORUM
PARTEM NONAM,
VENIA EXP. ORD. MED. UPSAL.
PRÆSIDE

**CAROL. PET.
THUNBERG,**


RECTORE MAGN. EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. NAT.
CURIOS. REG. SCIENT. LONDIN. HOLM. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PHILAD.
PATR. HOIM. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. ET HAFNIENS. HIST. NAT.
LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSSENS. TICINENS. IENENS.
HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT.
STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS.
MONSPENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN.
ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT
STENO EDWARDUS WESTMAN,
STOCKHOLMIENSIS.

In Audit. Botanico die 20 Maii 1795.
H. A. M. C.

UP SALIÆ,
LITTERIS JOH. FRED. EDMAN. REG. ACAD. TYPOGR.





IN SACRAM REGIAM MAJESTATEM
MAGNÆ FIDEI VIRO,
S. S. THEOLOGIÆ DOCTORI,
REGIORUM ORDINUM EQUESTRIUM
EPISCOPO,
PAST. STOCKHOLMENS. PRIMARIO,
ECCLES. S. NICOLAI ET SOLNA ANTISTITI,
MAX. VEN. CONSIST. URBICI
PRÆSIDI,

REVERENDISSIMO DOMINO
J O H n. G u s t.
F L o r e s c e n s,

ob maxima se a tenera inde ætate collata beneficia Opusculum hocce Academicum

SACRUM

D E B U I T
S. E. WESTMAN.

INSECTA SVECICA.

ANTHRENUS FASCIATUS: supra niger thorace
elytrorumque fascia cinerea.

Habitat in Svecia rario.

Magnitudine reliquis duplo major.

Cinereo-tomentosa sunt *caput*, antennarum *clava*,
abdomen, *pedes*, *thorax*, & *fascia* elytrorum ante
medium. *Elytra* nigra, lævia.

SCYMNUS ATER: totus ater ano rufescente.

Anthrenus ater. Mus. Acad. P. 3. p. 34.

Magnitudine pulicis, totus ater, glaber, ano solo
parum rufescente.

SCYMNUS AURITUS: ater capite thoracis angu-
lis anticis ano pedibusque flavis.

Habitat in Vestro-Gothia. GYLLENHAL.

Magnitudine minimi pulicis, ater, glaber.

Caput, thoracis anguli antici. *pedes* anusque flavi.

SCYMNUS BIPUSTULATUS: ater elytris intra
apicem puncto rubro.

Altica 2-punctata. Mus. Acad. P. 3. p. 42.

Magnitudine pulicis, totus ater excepto puncto ru-
bro intra apicem singuli Elytri.

SCYMNUS B MACULATUS: ater elytris basi pun-
cto pedibusque rubris.

Habitat in Uplandia; in Vestro-Gothia. GYLLENHAL.

Facie & *magnitudine* prioris, ater, glaber.

Caput & *pedes* flavescentes.

A

Ely.

Elytra in basi puncto rubro rotundo notata.

Variat capite nigro & flavo.

SCYMNUS SUTURALIS: ater plaga sanguinea.

Magnitudine pulicis, ater, glaber.

Elytra plaga lata, sanguinea; seu potius rubra margine omni nigro.

COCCINELLA ABBREVIATA: elytris rubris: fascia postica abbreviata punctisque duobus nigris; thorace atro: margine lineisque duabus albis. Fabr. Syst. 3 p. 269.

Habitat in Svecia rarer.

Magnitudine C. 7-punctatae.

Fascia abbreviata pone medium Elytrorum ex punctis duobus coalitis, cruribus apicem spectantibus. Punctum terminale intra apicem.

COCCINELLA SEX-MACULATA: elytris luteis: punctis sex nigris, thorace punctis nigris quinque.

Habitat in Svecia, HUMMEL.

Magnitudine C. 5-punctatae, pallide flava.

Thorax maculis quinque nigris; duæ in medio, tres in basi.

Elytron singulum punctis minutissimis tribus, uno in costa, duobus in medio, altero prope marginem externum.

Varietas datur puncto costali nullo.

Differet a C. Sex-maculata. Fabr. Ent. Syst. p. 274.

COCCINELLA FENNICA: elytris rubris: punctis septem nigris, thorace nigro: margine antico punctisque duobus flavis.

Habitat in Finlandia, Lect. BORGSTRÖM.

Ma-

Magnitudine C. 5 punctatæ.

Caput luteum basi oculisque nigrum.

*Thorax niger: margine antico cum hamo medio,
lateribus & maculis duabus luteis.*

*Elytra rubra: punctum scutellare commune, pone
medium singulo puncta duo nigra oblique posita,
& intra apicem unum minus.*

COCCINELLA OCULATA: elytris rubris: pun-
ctis novem nigris, thorace nigro: macula anta-
ca lutea.

C. Oculata. Mus. Acad. P. 3. p. 33. diversa a C. ocu-
lata Fabr. Ent. Syst. p. 287.

Magnitudine C. 5 punctatæ.

Caput nigrum, flavo-maculatum.

Thorax niger, angulo antico flavo.

*Elytra rubra: punctis 9 nigris, quorum 1 scutellare
commune, 1 in basi, 1 pone medium, 1 in ipso
margine antice & 1 intra marginem pone me-
dium singuli Elytri.*

Abdomen uti & pedes nigri.

COCCINELLA TRICUSPIS: elytris rubris: pun-
ctis nigris novem arcuque communi.

Habitat in Nericia; SMARÆUS.

Magnitudine C. 2 punctatæ.

Caput luteum oculis punctisque duobus nigris.

*Thorax antice luteus, hamos tres exserens, posti-
ce niger.*

*Elytra rufa: punctum baseos sub-quadratum, duo
in singulo medio transversa, quorum unum in ipso
margine, pone medium punctum marginale. &*

fascia arcuata communis cruribus antrorsum versis; in medio dorso macula magna communicans.

COCCINELLA ARCTICA: elytris nigris: punctis decem nigris, thoracis margine antico flavo.

Habitat in Lapponia; EKELUND.

Caput nigrum maculis duabus flavis.

Thorax niger margine antico flavo; saepe maculæ binæ in basi & rarius unica antice.

Elytra rubra: in singuli medio puncta tria transversa saepe coalita & intra apicem duo transversa.

COCCINELLA II. MACULATA: elytris rubris: punctis nigris undecim, corpore ferrugineo. Fabr.

Ent. Syst. I. p. 277.

Habitat in Svecia.

C. II. maculata. Mus. Acad. Append. I. p. 113. diversa a C. II. maculata Fabr. Ent. Syst. p. 277.

Magnitudine C. 2. punctata.

Caput nigrum punctis duobus flavis.

Thorax niger macula antica flava marginali.

Elytra rubra: punctum costale & scutellare commune, in medio & pone medium in singulo puncta duo obliqua nigra, quorum exteriora minora.

Varietas punctis confluentibus.

COCCINELLA TRIANGULARIS: elytris rubris: punctis undecim nigris, capite punctis duobus flavis.

Magnitudine C. 2. punctata.

Caput nigrum maculis duabus flavis.

Thorax niger in angulo antico macula flava.

Elytra rubra: punctum scutellare commune; in medio

dio puncta duo transversa, oblique posita; tum punctum minutum solitarium & tandem duo transversa. Puncta interiora & scutellare majora.

COCCINELLA 14-MACULATA: elytris rubris: punctis 14 nigris, thorace flavo: punctis 6 nigris.
C. 14-maculata. Fabr. Ent. Syst. p. 279.

Minor C. 2-punctata.

Caput luteum oculis nigris.

Thorax flavus punctis 4 anticis, 2-baseos nigris.

Elytra lutea: sutura punctisque 14 nigris, duobus in basi, tribus in medio, duobus intra apicem, omnibus obliquis.

COCCINELLA 16-MACULATA: elytris rubris: punctis sedecim nigris, thorace flavo: maculis septem nigris.

Magnitudine C. 5 punctatæ.

Caput flavum oculis nigris.

Thorax flavus: punctis nigris, duobus in medio & quinque in basi.

Elytra rubra: puncta duo in basi coalita; postea duo juxta marginem externum coalita; tum unum in medio prope marginem externum, majus cum linea futurâ abbreviata coalitum; tandem puncta duo versus marginem externum coalita, quasi fasciam formantia & ultimo punctum solitarium versus marginem internum.

Pectus & abdomen nigra.

Pedes toti rubri.

COCCINELLA 18-MACULATA: elytris rubris: pun-

punctis octodecim nigris, thorace flavo: maculis quinque nigris.

Coccinella 16 punctata Mus. P. 3. p. 34.

Magnitudine C. 5 punctatæ.

Caput flavum, basi nigrum.

Iborax flavus punctis duobus in medio, tribus basi nigris.

Elytra rufa: in singuli basi puncta duo nigra; in medio tria transversa; pone medium tria transversa, quorum intimum suturam tangit; intra apicem punctum solitarium.

Pedes flavi macula nigra.

COCCINELLA 12 GUTTATA: elytris luteis: punctis albis duodecim, thoracis lateribus albis.

Coccinella bis 6 guttata. Fabr. Ent. Syst. I. p. 284.

Habitat in Vestro-Gothia, GYLLENHAL.

COCCINELLA FLAVIPES: elytris nigris, capite thoracis margine pedibusque luteis.

Coccinella impustulata Fabr. Ent. Syst. I. p. 286.

Magnitudine C. 2-punctatæ, tota nigra, lævis.

Caput, thoracis latera, pedes anusque flava.

COCCINELLA MARGINELLA: elytris nigris: puncto baseos flavo, capite punctis duobus lateribusque thoracis flavis.

Inter minimas, tota atra glabra.

Caput nigrum ore punctisque duobus albis.

Iboracis margines laterales antice albidi.

Elytron singulum in basi juxta costam puncto & margine externo flavis.

Pedes flavi.

Vix varietas C. variabilis. cui similis?

COCCINELLA VARIABILIS: elytris nigris: punctis duobus lunatis submarginalibus rubris. Fabr. Ent. Syst. I. p. 287.

Habitat sat vulgaris in Svecia.

Caput nigrum punctis duobus albis.

COCCINELLA HÆMORRHOIDALIS: elytris nigris: macula media lateribus thoracis anoque rubris.

Magnitudine C. 5 punctata, nigra.

Margines thoracis, *abdomen* postice & macula in medio Elytri singuli rubra.

COCCINELLA COLON: elytris nigris: punctis quatuor luteis, thorace immaculato.

Inter minimas tota polita, nigra.

In singulo elytro puncta duo flava, longitudinaliter posita anusque ruber.

Differet a C. 4 pustulata: elytrorum punctis linea recta positis, minoribus, thorace immaculato & minori magnitudine.

COCCINELLA ABDOMINALIS: elytris nigris: punctis duobus abdomineque rubris.

Magnitudine C. 2-pustulata seu C. Caeti duplo minor.

Caput, thorax, elytra, pectus, pedes nigra.

Puncta duo elytrorum & abdomen imprimis postice rubra.

COCCINELLA REPPENSIS: nigra capite lateribus thoracis punctoque apicis elytrorum luteis.

Habitat in Vestro-Gothia, GYLLENHAL.

Inter minimas tota nigra, polita.

Caput totum flavum.

Thoracis margines laterales flavi.

Intra apicem singuli elytri punctum luteum.

COCCINELLA 4·VERRUCATA: elytris nigris: punctis rubris quatuor, uno rubro. Fabr. Syst. I. p. 288.

Habitat in Svecia, vulgaris.

COCCINELLA OCTOPUSTULATA: elytris nigris: maculis tribus lunulaque flavis.

Habitat in Svecia, SMARÆUS.

Magnitudo & similitudine C. hieroglyphicæ.

Caput & omnia subtus atra.

Thorax niger angulo antico flavo.

Elytra atra, laevia, glabra: in angulo baseos macula lunata; in medio baseos lineola flava; in margine exteriori macula & a medio marginis interioris ad apicem macula major lunata, cum opposita elytri alterius coalita.

COCCINELLA SIMILATA: elytris nigris: maculis decem flavis; thorace nigro: angulo antico flavo.

Habitat Calmariæ, WAHLBOM.

Magnitudo & similitudo summa, C. decem-guttatæ, sed thorace & punctis dissimilis.

Caput flavescens, nigro-marginatum.

Thorax niger angulo antico flavo.

Elytra nigra: in basi lunulæ binæ flavae; pone medium puncta duo rotunda & intra apicem macula solitaria in singulo elytro flava.

Abdomen nigrum uno flavo.

Pedes nigri geniculis luteis.

COC-

COCCINELLA DENTATA: elytris nigris: punctis duodecim albis, exterioribus margine connexis.

C. 10-pustulata (12-pustulata). Fabr. Ent. Syst.

I. p. 290.

Habitat in Svecia sat vulgaris.

Variat punctis magis discretis.

COCCINELLA LAPPONICA: elytris nigris: margine exteriori, lineola flexuosa suturali punctoque flavis.

Habitat in Lapponia, QUENSEL & EKHL. 1810.

Magnitudine C. 14-pustulata, oblonga.

Caput nigrum, flavo-maculatum.

Thorax niger marginibus lateralibus & antico cum hamulo flavis.

Elytra nigra, lævia: margo exterior sinuato-flavus; juxta suturam linea curva flava & pone medium punctum flavum.

Tibiae flavescentes.

COCCINELLA STRIGATA: elytris nigris: vitta duplo lutea, thorace nigro: linea lutea.


Habitat in Lapponia. Doct. EKELUND.

Magnitudine C. lapponica, ejusque facie, oblonga.

Thorax niger lateribus lineaque media flavis.

Elytra nigra margine flavo-dentato; juxta suturam alia linea flexuosa postice punctum nigrum includens.

Pedes toti flavi.



THESES.

I.

Diætam vegetabilem carneæ in non paucis præferendam merito censemus.

II.

Quemadmodum nullæ plantæ ex seminibus suis non progignuntur, ita minima animalcula non nisi ex ovis generantur.

III.

Quamvis scientia Botanica permagnam artis machanicæ cultori adfert utilitatem, hujus tamen scientiæ, quam late patet cognitio, practico non est omnino necessaria.

IV.

Præter magnam illam, quam proprie nobis adfert naturæ cognitio utilitatem, infimum non inter scientias eo quoque respectu occupat locum, quod absque ea innumeræ res mere naturales, prodigia & miracula haberentur.

V.

Non nisi opinioni deditus contendere sudeat, Medicinam minori, quam aliæ scientiæ gaudere certitudine.

VI.

Vix classis quædam Medicamentorum latiorem & efficaciorem nobis usum præbet, quam Emetica.

VII.

Regnum vegetabile multo majorem adfert usum, quam quidem regnum animale & minerale.



BERG, Carol P.

tio Ent. Sist. Ins. Svecica

