

漢書門
 一三六〇八
 九〇八
 函號類
 一三〇冊

內閣文庫
 漢書
 一三六〇八
 函號類
 一三〇冊

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (142)
函號	300 211

百八十一





通按聖濟總錄卷一百八十一

小兒疳積

疳積

小兒門

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風

小兒驚風


小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風



重校聖濟總錄卷一百八十一

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

小兒門

小兒語遲

小兒齒不生

小兒咽喉諸病

小兒誤吞物

小兒緊唇

小兒涎液不收

小兒胎赤眼

小兒癩瘡入眼

小兒眼生翳膜

小兒目赤痛

小兒聾耳

小兒語遲

論曰心為言肝為語其經屬手少陰足厥陰其氣上通於舌舌者聲之機若稟受之初母懷驚怖則子之心火不足而肝木弱故令機關不利氣不宣揚而語遲甚者有經數歲不能言者

芍藥湯方 治小兒心氣不足舌本無力語遲

赤芍藥

一兩

黃耆

剉三分

犀角

鎊

檳榔

剉

甘草

炙各半兩

右五味麤搗篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓量兒大小不計時候加減溫服

雞頭丸方 治小兒諸病後六七歲不能語

雄雞頭

燒灰一枚

鳴蟬

去翅足炒三枚

甘草

炙半兩

大黃

剉炒

麥門冬

去心焙各一兩半

當歸

切焙

黃耆

剉

芎

藟

各三分

遠志

去心

木通

剉各半兩

人參

一兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服以粥飲下五丸至七丸量兒大小加減不計時候

菖蒲丸方 治小兒五六歲不語

菖蒲 人參 黃連去鬚各半兩 丹參 赤石脂

各三分 天門冬去心焙 麥門冬去心焙

右七味擣羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服五七丸溫水下不拘時候日三量兒大小以意加減

小兒齒不生

論曰牙齒者是骨之所終髓之所養手陽明足太陽之脈並入於齒若血氣充實則骨髓強盛雖其齒損落猶能更生也若虛弱者血氣衰耗風冷乘

之致令齒久不生假令生者或齲或蟲落不能復生也

治小兒齒不生或因落不生方

牛糞中黑豆

右一味取二七枚小開去頭上皮此豆頭開處

注齒根上時注之當效

治小兒牙齒不生方

雄鼠糞二七枚

右一味每日用糞一枚齒根上拭至二十一日

其齒當生

又方

道傍遺稻粒

右一味於齒落處點三七下其齒自生

治小兒齒不生無問遠近皆得便生神效方

雄雞糞

二七枚
頭尖者

雌雞糞

二七枚
頭圓者

右二味燒灰存性先用鍼挑開齒斷上以雞糞
灰點之

小兒咽喉諸病

論曰咽喉者肺脾經所主也小兒肺脾有熱蘊積
上焦熏發喉間故令咽喉赤腫吞吐不利或塞或
壅憎寒壯熱欬嗽痰涎是其候也昔人謂臟熱則
咽門腫而閉塞豈虛言哉

款冬花丸方 治小兒咽喉中鳴咳嗽喘急

款冬花

甘草

紫苑

去苗
土

麻黃

去根節
煎去沫

焙乾各
半兩

貝母

麩
炒

麥門冬

去心焙
各三分

右六味擣羅為細末鍊蜜丸如菉豆大每服三
丸至五丸食後米飲下五歲已上以意加之日

三

朴硝散方 治小兒咽喉舌腫脹咽氣不利

朴硝一分 衣中白魚炒三枚 鹽少許

右三味搗研為細散每服以指搵少許在舌下

牛黃散方 治小兒咽喉項腫啼聲不出

牛黃研半分 代赭三兩 麝香研半錢 元參三分 厚

朴去麤皮生薑汁炙三分 升麻一兩 射干半兩 大黃剉炒

一兩一分 木香三分 白朮半兩 犀角鎊屑三分 甘草炙半兩

右十二味搗羅十味為細散入研藥和勻每服

半錢匕以人乳汁一蛤蜊殼許調下空腹日一

服三歲至五歲以上每服一錢匕棗湯調下米

飲亦得日再

牽牛散方 治小兒咽喉中鳴咳嗽痰壅

牽牛子炒半生半熟二兩 杏仁去皮尖雙仁炒 甘草炙 吳

茱萸湯洗焙乾炒 陳橘皮去白焙各一分

右五味搗羅為細散每服半錢匕空腹以沸湯

調下微利出惡物即差量兒大小加減服

麻黃湯方 治小兒咽喉腫熱肺脹氣急喉中似有物塞

麻黃 去根節煎 去沫焙乾 桑根白皮 剉 桂 去麤皮 各半兩 大

黃生 射干 杏仁 湯浸去皮尖 雙仁各一分

右六味麤擣篩每服一錢匕以水半盞煎至三分去滓溫服

黃蘗湯方 治小兒咽喉腫脹咽氣不利

黃蘗 去麤皮 蜜炙 甘草 炙各一分

右二味麤擣篩每服一錢匕以水半盞煎至三


四分去滓溫服不計時候

當歸膏方 治小兒熱病口爛咽喉生瘡水漿不下

當歸 去蘆頭 剉炒 射干 剉 升麻 剉各一兩 附子 半兩 炮去

皮臍 白蜜 肆合

右五味切以豬脂四兩先煎成油後內諸藥入於油中用文火熬令附子黃色濾去滓投蜜更熬一兩沸成膏以瓷器收每取杏仁大含化嚙津無妨日三四用之



生薑湯方 治小兒咽喉腫痛毒氣熱極咽塞不利

生薑 二兩切 升麻 二兩剉 射干 二兩剉 陳橘皮 一兩湯浸

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

升麻湯方 治小兒咽喉腫痛壯熱躁渴不止

升麻 射干 大黃 剉炒各半兩

右三味麤擣篩每一錢匕水半盞煎至四分去滓分溫二服早晨日午各一


玉芝散方 治小兒膈熱脣口生瘡咽喉腫痛

甘草 剉作半寸許劈破湯浸一日微炒 石膏 研如粉各一兩 山梔子 去皮微炒二兩 藿香葉 半兩

右四味擣研為細散每服半錢匕以新汲水調下量兒大小加減服

龍腦丸方 治小兒風熱咽喉腫塞生瘡搖頭煩悶及蟲咬心痛

龍腦 研半錢 白礬 銚子內鍊沸泣盡汁為度研 元明粉 一錢



蟬殼 三十枚去足炒研末 牛黃 研半字 蛇蛻皮 一條長二尺鐵器上

燂焦研為末

右六味再一處細研入沙糖少許和丸如梧桐子大冷水化破一丸服之

苦藥子散方 治小兒咽喉腫痛

苦藥子 白殭蠶 等分

右二味擣為細散每服半錢匕白礬水調下量兒大小加減

露蜂房散方 治小兒忽腫毒著咽喉

露蜂房 燒灰 白殭蠶 各一分

右二味細研每服半錢匕用乳香湯調下看見大小以意加減

升麻湯方 治小兒喉痺血氣結塞慎勿刺破但與藥通利

升麻 木通 剉 大黃 生 麻黃 去根節各一分 犀

角 鎊 石膏 碎 甘草 生剉各半兩 朴硝 研一兩

右八味麤擣篩每二錢匕水一盞煎至七分去滓量兒大小加減服

小兒誤吞物

論曰小兒多以珠璣錢鏤之類為玩弄之具或藏於口中因驚或啼遂誤吞嚥倉卒不得出為害亦大當隨物所宜以方術治之

治小兒誤吞錢在喉中不下方

麩炭研為細末

右一味以指彈少許入喉中少頃自吐出一方用羊脛炭研細為末

治小兒誤吞針方

慈石一塊小彈子大吸鐵緊者

右一味入口內吸令針出或絲繫定送咽喉引出亦得

治小兒誤吞鈎繩方

右凡吞鈎繩猶在手者莫伸引但以珠璣若穿了薏苡子之類就其繩穿稍稍推至鈎畔即急推前入纜鈎離刺處復緩緩引出

治小兒誤吞珠璣方

右燒銅弩牙令赤淬水一椀旋飲其物即出

治小兒誤吞銀環及釵方

右以飴糖隨兒大小多少食之若能多食釵環
卽隨出

治小兒誤吞髮方

右用木梳燒灰細研粥飲調下半錢匕不下再
服

治小兒誤吞梅李核方

右以溫水旋從小兒頭淋下却接其水與兒飲
之

治小兒誤吞環方

右以鵝毛半兩燒灰細研米飲調下半錢未效
再服

小兒緊唇

論曰脾主肉其華在唇脾胃有熱熏發於口則令
唇際生瘡又爲風邪寒濕之氣搏於腫處故焮結
不消濕爛汁出時發時差積久不愈謂之緊唇瘡
又名瀋唇也

順脾散方 治小兒唇瘡未已復被風冷所搏瘡

口濕腫此名緊唇

山芋一兩

人參三分

桂去麤皮一分

木香半兩

甘

草炙

白朮各一分

訶梨勒炮去核半兩

肉豆蔻炮去

殼二枚

白茯苓去黑皮

黃耆剉各半兩

白芷一分

右十一味擣羅為散每服半錢七沸湯點服量

兒大小加減

二鉛散傳方 治小兒緊唇瘡

鉛丹一分

鉛霜研半分

蛤粉研

晚蠶蛾微炒

麝香研一錢

右五味各為散用蜜合調傳瘡上

黃連散傳方 治小兒緊唇瘡腫皮急

黃連去鬚

黃蘗去麤皮剉

凝水石碎各半兩

檳榔生剉一分

右五味擣羅為散用蜜調傳瘡上頻換為效

烏蛇散傳方 治小兒緊唇及脾熱攻唇瘡腫

烏蛇燒灰

右一味細研以酥和傳瘡上頻換為效

白芨膏傳方 治小兒唇瘡

白芨 白斂 白蠟各一兩 黃耆剉 乳香研

牡丹皮 芍藥 丁香各一分 麻油二兩

右九味除油蠟外並細剉先煎麻油令沸次入前項藥以柳木枝不住手攪綿濾過去滓再煎入蠟膏成入銀石器中盛候冷不拘多少取傅瘡上

龍膽丸方 治小兒唇瘡不合

龍膽 大黃剉微炒 人參 梔子仁 朴硝

郁李仁去皮別研 茵陳蒿一分

右七味擣羅爲末鍊蜜和丸如麻子大每服五丸至七丸溫水下量兒大小加減

治小兒唇瘡方

黃蘗去麤皮爲細末

右一味濃煎薔薇根汁調塗瘡上立效

治小兒唇瘡方

桑根白皮細切

右一味擣取汁塗瘡上大效

治小兒唇瘡方

藍葉細切

右一味研取汁洗之日三上差

小兒涎液不收

論曰小兒因氣不升降膈腕否滯致令乳飲不化流入胃中隨氣上溢故令多涎其候胸滿短氣飲食遲化內經謂脾為涎當調脾胃升降其氣則病可愈

鉛霜散方 治小兒脾風多涎心胸壅悶不下乳食昏昏多睡

鉛霜研

牛黃研

半夏生薑汁製焙乾

龍腦研各半分

白附子炮

馬牙硝研

防風去

丹砂研

天竺黃研

犀角屑

細辛去苗葉

黃芩去黑

心甘草炙剉各一分

右十三味擣研為散再同研勻每服一字用生薑蜜溫水調下更量兒大小以意加減不計時候

防風湯方 治小兒脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食

防風去義 羚羊角屑 黃芩去黑心 人參 枳

殼去瓢 甘草炙到各一分 半夏半分生薑汁製焙乾

右七味麤擣篩每一錢匕水八分入生薑少許

煎至五分去滓不計時候量兒大小加減溫服

半夏丸方 治小兒脾熱乳食不下胸膈多涎

半夏半分生薑湯洗七遍去滑 皂莢子仁半兩

右二味擣羅為末用生薑汁和丸如麻子大不

計時候以溫水下三丸隨兒大小以意加減

半夏丸方 治小兒脾胃氣不升降氣溢於上涎

液不收

半夏微炒一兩 白礬生研半兩

右二味先以半夏為細末再入白礬和勻麩糊

和丸如粟米大每服五七丸量輕重加減食後

臨卧生薑湯下

清膈降氣丸方 治小兒胃氣上溢氣不升降涎

液不收

牛蒡子 梔子仁 甘草炙微赤到 川硝 鬱金

已上各半兩 枳殼一分麩炒 龍腦半兩

右七味擣羅爲末麩糊和爲丸如麻子大用薄荷水化下二丸至三丸不計時候量兒大小加減服之

桑白汁方 治小兒脾熱乳食不下胸膈痞悶涎

溢不收

新桑根白皮 不以多 少細剉

右一味取自然汁塗於兒口內立效如無新桑根白皮取乾桑根白皮一兩細剉用水一盞煎至半盞放溫塗兒口內極妙

小兒胎赤眼

論曰小兒眼胎赤者是初生洗目不淨令穢汁浸漬於眥中使驗赤爛至大不差故云胎赤眼也

黃連丸方 治小兒胎赤眥爛

黃連 去鬚 一兩 防風 去 義 龍膽 去 土 大黃 剉 炒 細

辛 去苗葉 各半兩

右五味擣羅爲末鍊蜜丸如菉豆大每服五丸至七丸溫熟水下日三更量兒大小加減

升麻湯方 治小兒眼胎赤風毒所攻腫痛

升麻 黃耆剉 元參 甘草炙各半兩 犀角屑

防風去義 蕤仁湯浸去皮研各一分

右七味麤擣篩每一錢匕以水七分煎至四分去滓分溫二服更量兒大小加減

麥門冬湯方 治小兒眼胎赤腫痛上焦壅熱

麥門冬去心焙 犀角屑 芒硝 防風去義 甘

草炙各半兩 旋復花一分

右六味麤擣篩每一錢匕水七分煎至四分去滓量兒大小加減溫服日四五

牛黃丸方 治小兒眼胎赤久不差

牛黃一分細研 黃連半兩去鬚 決明子一分 蕤仁一分湯浸

去皮 犀角屑半兩 龍腦一錢細研

右六味擣羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服以溫水下五丸日三四服更量兒大小以意加減

治小兒眼胎赤及生瘡怕見風日方

龍腦半錢細研 蕤仁一分湯浸去皮研 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁研

右三味滴少水都細研如乳汁每日三四度點之

治小兒眼胎赤癢痛方

龍腦

半錢
細研

桑葉

五兩燒
作灰

右二味水一升半先煎桑葉灰取半升綿濾去滓後入龍腦攪令勻日三四上少點

龍腦煎方

治小兒眼胎赤

龍腦

一錢

藍綠

半兩

麩仁

湯浸去
皮一分

右三味都研令極細以蜜調似面脂用點眼日三兩上

黃連膏方

治小兒眼胎風赤爛不以年月發歇

視物淚出澀痛不可忍

黃連

去鬚擣
一兩

盧會

研一
分

龍腦

一錢
別研

右三味先將黃連盧會擣研羅為末以新綿裹用水一盞於銀器中以重湯煮候藥汁三分減二卽去藥綿入龍腦攪勻以瓷瓶收每日三兩上點之

杏仁膏方

治小兒眼胎赤兼有翳膜

杏仁

去皮尖雙仁
研如膏一兩

膩粉

一錢

藍綠

黃連末

各一
分

右四味同研極細以真酥調如膏攤於銅椀內以熟艾如雞子大掘小坑子燒艾烟出便覆銅椀熏之勿令氣洩候烟盡更研令勻每取少許以綿裹用人乳汁浸一宿日三四度點之

銅青散方 治小兒眼胎赤經年月深遠者

銅青 賦粉 各一錢 龍腦 半錢 乾地龍 一條去土為末

右四味同研極細每用半小豆許點目皆日一兩度

小兒斑瘡入眼

論曰小兒脾肺壅熱或緣時氣溫病表裏俱虛邪毒發於肌表致生斑豆甚者徧體斑如瑇瑁頭作燂漿毒氣炎盛上攻眼目發於睛輪先須於臉膚上用藥貼熯次可調利脾肺切不得用藥點眼點藥則令斑瘡潰爛穿壞睛輪不可不慎也

連翹散方 治小兒斑瘡入眼

連翹 去子 芎藭 黃蘗 去麤皮 胡麻 三錢去油 甘

草 炙三分

右五味擣羅為散用白湯調放冷食後服五歲

以下半錢五歲以上一錢如眼內有白丁子者
不日退去

井泉石散方 治小兒熱盛攻眼及斑瘡入眼

井泉石 為末再研飛過 蟬殼 去土 蛇蛻皮 炙 甘草

炙各一兩

右四味擣研羅為散每服半錢至一錢七蜜水
調下

柳絮散方 治小兒斑瘡入眼


柳絮 穀精草 石決明 夜明沙 各等分

右四味擣羅為散每服一錢匕豬豬肝一片批
開摻藥在內以線子扎定米泔一大盞煮至五
分取出乘熱以湯熏眼良久服之日一服

烏龍散方 治小兒斑瘡入眼生翳膜遮睛

烏魚骨 貝齒 豬指甲 各一兩

右三味同入砂盒子內用鹽泥固濟令乾燒通
赤為度取出細研每服半錢匕用羊子肝一具
批開摻藥在內麻縷紮定粟米泔一盞煮熟為
度細嚼米飲下



如聖散方 治小兒斑瘡入眼成胞瘡

蛇蛻皮

尺一

皂子

十四枚

馬勃

一分

右三味以蛇皮裏皂莢子更用馬勃裏蛇皮入罐子中瓦蓋黃泥裏合暴乾炭火煨候烟欲斷即止取出油單貼入地中出火毒一宿研細入麝香少許再研每服半錢匕葱湯調下日三服忌一切發眼物

通聖散方 治小兒斑瘡入眼及生翳

白菊花

如無用甘菊花代

菘豆皮

穀精草

各一兩

右三味擣羅為散每服一錢匕用乾柿一枚生粟米泔一盞與藥同煎水盡為度只喫乾柿一日可三服不計時候若患十日以裏三五服即差一月以裏十數服差

妙應散方 治豆瘡子入眼

蛇蛻皮

一兩

蟬殼

二十枚

右二味用罐子泥固濟暴乾火斷過地上出火毒一宿研為末蜜水調下一字匕食後日三

蛤粉散方 治小兒出瘡子後眼內生青膜翳暈

蛤粉

一分

甘草

炙一分

握

右二味將甘草擣羅為末與蛤粉同研令勻每服一錢匕新汲水調下不拘時候

鰓蛸散方 治小兒斑瘡入眼成白膜但不作丁子者服之必效

桑鰓蛸

二兩

麝香

少許

研

右二味擣研為細散每服一錢半匕生米泔調下臨卧服

蠟殼湯方 治小兒瘡疹入眼成翳膜

蟬殼 羊子肝

右二味擣羅為末每服二錢匕用水煎羊子肝湯調下日三

治小兒斑疹入眼生翳膜方

穀精草

細蛤粉

以上各一兩

右二味擣研為細末每用一錢匕猪肝二兩批開摻藥在內捲了用青竹葉裏麻縷紫定水一碗煮令熟入收口瓷瓶內薰眼後取肝食之服不過十日必差日二

輕粉散方 治小兒斑瘡入眼

輕粉

一兩用銀器內炒令黑色

右一味如患左眼用紙撚纏左耳右眼亦如之
以填滿為度如耳根痛其膜自落

小兒眼生翳膜

論曰眼者肝之候也五臟六腑精氣皆上注於目
小兒體本挾熱將養過溫致腑臟積蓄邪熱熏漬
肝經上衝於目始則赤痛若不即治蘊結變生障
翳熱氣輕者生白翳如黍米大者如麻豆重者乃

生兩三翳又甚則翳生白障侵遮瞳人滿目悉白
遂致失明然障亦有輕者黑睛邊微有白膜來侵
黑睛漸染散漫當急治之即脫侵遮黑睛有瞽矇
之患

蕤仁丸方 治小兒熱毒氣盛翳膜侵睛兼赤眼

疼痛

蕤仁

湯浸去皮別擣一兩半

兔肝

炙一具

梔子仁

黃芩

去黑心黃連

去鬚各半兩

升麻

決明子

各三分

細辛

去苗葉一分

右八味擣羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服三丸至五丸溫水下早晨日晚各一服更隨兒大小加減

惡實散方 治小兒風翳散漫侵瞳人及風疳眼

惡實炒

木通剉

蒺藜子

炒去角各一兩

右三味擣羅為散每服半錢匕以水擣羊子肝汁調下早晨日晚各一服更量兒大小加減

決明子散方 治小兒眼赤或生翳膜或眼常合

不開

決明子

車前子

梔子仁

防風

去

黃

連去鬚各一兩半

右五味擣羅為散每服一字至半錢匕擣生豬

肝投熱湯取汁調下早晨日晚各一服更量兒

大小加減

龍膽飲方 治小兒肝受病目昏漸生翳膜散漫

侵睛因此失明須內外治之

龍膽

鈎藤

土瓜根

茯神

去木各半兩

甘草

炙

桑根白皮

炙

防風

去叉各一分

右七味麤擣篩每一錢匕水一盞入棗半枚去核同煎至六分去滓分作二服量兒大小加減早晚服

車前子湯方 治小兒肝熱眼生翳膜或生血輪腫脹切宜急治

車前子

防風

去

甘菊花

甘草

炙

人

參 菥蓂子

青菡子

各三分

梔子仁

黃連

去鬚各半兩

右九味麤擣篩每服一錢匕水一盞入淡竹葉

七片煎至五分去滓溫服日三量兒大小加減

煮肝散方 治小兒疳眼翳膜沙澀

黃連

去鬚

沙參

元精石

決明子

右四味等分擣羅爲散每半錢匕用羊子肝一片竹篦子切作縫子摻末在內線繫入沙罐子內垂掛勿令到底以米泔煮熟淡食羊肝每一片分作兩服或三服量兒大小與食

黃芩湯方 治小兒五歲以下肝臟熱毒目生丁

翳

黃芩去黑心 升麻 甘草炙判各半兩 菱麩 元參

犀角鎊各一分

右六味麤擣篩每一錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服量兒大小加減日三四服

車前子丸方 治小兒肝臟壅熱眼生瘡翳

車前子 甘菊花 芎藭 黃連去鬚 當歸

切焙各一分 大黃濕紙裹煨 黃芩去黑心各半分

右七味擣羅爲末鍊蜜丸如菉豆大每服五七丸量兒大小加減煎桑枝湯下

撥雲膏方 治小兒風熱疔氣攻眼赤痛障翳

桃仁 杏仁各四枚並去皮尖雙仁 麩仁 郁李仁各五枚並去皮

右四味同生研細濾入蜜龍腦麝香膩粉各少許再研極勻點之

如聖散方 治小兒因瀉痢日久眼生翳膜并疔

眼退翳

蛇蛻兩條用紙燭燒灰研 穀精草一兩 蟬蛻去土一分 附子

生去皮 石決明刮研一分 胡粉研四錢

右六味搗研為散每服一字半羊子肝一片批破摻末用麻皮線纏米泔煮熟先熏眼後與食量兒大小加減如未能食研汁灌之

珊瑚散方 治小兒眼有障翳七八歲瞳子未堅不宜點藥用蝕翳

珊瑚 半兩

右一味細研如粉每點時取如黍米大內翳上日再點

白礬膏方 治小兒目睛有膜

白礬 熬令炙盡一分

右一味以清水四合置熟銅器中煎取半合去滓入少許白蜜以綿濾過每日三度點如黍米大

小兒目赤痛

論曰目者腑臟之精華肝之外候也小兒臟腑有熱與膈間痰飲相搏氣不宣通熏漬於肝肝經受熱則血脈壅滯循經上衝於目故令目赤痛不即治熱甚則生障翳

重校聖濟新金 卷一百一十一 三十一 燕遠堂

決明湯方 治小兒眼赤隱澀不開膈中有熱

決明子炒 黃芩去黑心各一兩一分 苳胡去苗 大黃

碎炒各一兩半 升麻 石膏碎 梔子仁各一兩 甘草

炙 枳殼去瓢麩炒各半兩

右九味麤擣篩每一錢匕水七分入竹葉五片

同煎至四分去滓分溫二服隨兒大小加減食

後服

黃芩飲方 治小兒赤眼

黃芩去黑心半兩 寒水石一兩一分 升麻 甘草炙剉各一

分

右四味麤擣篩每一錢匕水七分入竹葉五片

同煎至四分去滓分溫二服食後臨卧隨兒大

小加減

決明丸方 治小兒赤眼

決明子 牛黃別研 麩仁等分

右三味擣研為末鍊蜜丸如麻子大臨卧時乳

汁下二丸隨兒大小加減如熱痛不可忍者用

豬膽汁丸立差

重校聖濟新金 卷一百一十一 小兒門 三十一 燕遠堂

白華散方 治小兒肝熱眼赤疼痛涼膈退熱

蛤粉水研飛 連翹 甘草剉 白藥子 白附

子炮等分

右五味搗研為散每服半錢匕用麥門冬蜜熟水調下量兒大小加減

清肝散方 治小兒目赤腫痛

芍藥 防風去義各一分 大黃剉 羌活去蘆頭 甘

草剉各半兩

右五味搗羅為散每服一錢匕水半盞入燈心

黑豆各少許煎五七沸去滓食後溫服量兒十

小加減

敗毒湯方 治小兒風熱眼赤痛

大黃剉碎麩炒 甜硝別研 甘草炙剉各二兩 陳橘皮去白

焙三兩

右四味麤搗篩每服一錢匕水七分入薄荷三葉煎至四分去滓食後量兒大小加減服無薄荷入乳香亦得

朴硝膏點方 治小兒赤眼

朴硝

燒令乾一分

黃連

去三分

右二味擣為麤末綿裹以乳汁浸之點眼良

黃連膏方

治小兒眼爛眥癢痛淚出不能視物

風傷則痛

黃連

去鬚三分

大銅錢

七文

白礬

燒灰一分

右三味以水并白蜜各三合用銅器盛於飯上

炊一次綿濾去滓貯瓷合內點眼

生地黄湯洗眼方

治小兒眼赤痛不開

生乾地黄

二兩

決明子

黃芩

去黑心

竹葉

各一兩

芍藥

半兩

右五味細剉以水二升煮五六沸去滓澄清洗

眼一日三次大人通用

黃蘗湯洗方

治小兒赤眼

黃蘗

去麤皮剉

秦皮

各一兩剉

麩仁

去皮半兩

右三味麤擣篩每用兩匙頭以水一碗入乾棗

三枚同煎三五沸去滓適寒溫洗眼

鉛丹丸洗眼

治小兒目暴赤痛

鉛丹

一兩再研

右一味用白沙蜜調如稀糊同入銀器內攪勻炒候鉛丹紫色可丸即丸如皂莢子大每用一丸沸湯化乘熱淋洗

大黃丸方 治小兒目赤澀痛漸生翳膜昏暗

大黃剉 鬱金 人參 黃連去鬚各二錢

右四味擣羅為末研鼠肝和丸如菉豆大每服三丸米泔下如食後服量兒大小加減

小兒聾耳百虫入耳附

論曰腎氣通於耳心寄竅於耳疏通不窒則其聽

為聰小兒心臟熱實貫衝耳脈開竅者塞結而為腫或生膿汁故謂之聾耳或因沐浴水入耳內停積不化亦為聾耳久不治則致聾聵

礬石散方 治小兒聾耳汁出不止

白礬熬令汁枯 龍骨 鉛丹炒各半兩 麝香 竹蚰末

各一分

右五味同擣研細先用綿裹杖子拭乾耳內以藥少許摻之

竹蚰散方 治小兒聾耳出膿汁疼痛不可忍者

竹蚰糞一兩 白礬熬令枯 半兩 雄黃二錢 麝香一字

右四味同研勻細先用綿裹杖子拭乾耳中次以藥少許摻之

赤石脂散方 治小兒聾耳膿血塞耳

赤石脂 白礬熬令枯 汁 黃連去鬚 烏賊魚骨去甲

各一分

右四味擣研為散每取少許綿裹塞耳中大人可用一錢匕一方無赤石脂有龍骨

夜明沙散方 治小兒聾耳

夜明砂二錢 麝香一字

右二味同研極細先以綿裹杖子拭去膿用藥半錢匕摻入耳中

螵蛸散方 治小兒聾耳出膿

桑螵蛸須桑上者 微炙末之

右一味入麝香少許同研先用物拭膿淨然後摻藥

紅白散方 治小兒耳聾膿出久不差者

白礬熬令枯 汁 染胭脂

右二味等分研為細末先以綿杖子纏去膿極乾用藥半錢匕糝之不過三兩次

如聖散方 治小兒水入耳內膿出疼痛日夜不止

箭筈內蚰末 如有蟲子同研 膩粉 麝香 各一錢

右三味同研細先以綿杖子拭乾耳取藥三刺耳子深糝入耳以綿塞定如覺刺割即是惡物要出去綿側耳令出甚者三度差大人亦可用

狼牙散方 治聾耳有膿水

狼牙 白斂 竹蛀屑 各一分

右三味擣研細每用少許糝耳內

礬脂散方 治聾耳膿水不絕

白礬 熬令汁枯 松脂 木香 花胭脂 各一分

右四味擣羅為散每用綿拭膿後滿耳填藥

治小兒聾耳汁方

黃連 去鬚三分 龍骨 燒研半兩 烏賊魚骨 去甲一枚炙

右三味擣研為末麻油調少許日三四度點耳

中

雄黃散方 治小兒聾耳汁出漬外生瘡

雄黃研一兩 黃芩去黑心 曾青研各半兩

右三味擣研為散以少許糝外瘡更用綿裹一
大豆塞耳中日再換之

胡麻枕耳方 治小兒涎蚰入耳

胡麻不拘多少

右一味先熬後擣貯以葛囊枕之即出

雄黃油方 治小兒飛蟲入耳

雄黃一分

右一味研細以麻油調抹耳中

桃心塞耳方 治小兒蟲入耳

桃心葉二七葉焙 胡麻子一升炒

右二味先以桃葉塞耳中其蟲必出如不出以

胡麻子炒令香以葛袋盛枕頭耳中蟲自出

治蟻子入耳方

炙肉

右一味安在耳邊蟻子自出

重校聖濟新金 卷一百一十一 耳

又方

韭

右一味搗絞取汁滴耳中

又方

藍青

右一味搗絞取汁滴耳中

又方

葱

右一味取涎滴耳中

