



丹溪心法附餘卷之十六

休寧東山古瘡方廣約之類

火鬱門

脇痛

七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛 木氣實 有死血 有痰流注 肝急

木氣實用蒼朮 木川芎 青皮 當歸 一頁 痛 者肝火盛

以當歸龍會丸

桃仁紅

花川芎 痰流注以
小川芎 肝苦急

急食辛以散之用撫芎川芎蒼木命入血藥中行血

治咳嗽脇痛以二陳湯加南星香附青皮青黛入姜汁

脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去尖并香附之類 有

火盛者當伐肝木 左金丸治肝火 有氣鬱而如脇痛

者看其脉沉澁當作鬱治 痛而不得伸舒者蜜丸龍

丸最快 脇下有食積一條杠起用吳茱萸炒黃連

涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加桃仁泥丸服 左脇

痛用推氣散出嚴氏方 左脇痛用前藥為君加柴胡

入方

小龍會丸

當歸 草龍膽 酒洗 山梔 炒 黃連 炒

川芎 各半 大黃 煨半 蘆會 三錢 木香 一錢

方有黃芩柴胡各半兩無大黃木香
方有牛草紫胡青皮及無當歸梔子

右為末入麝香少許粥糊丸如菉豆大每服五十九姜

湯下仍以琥珀膏貼痛處 龍會丸亦治有積因飲食

大飽勞力行房脇痛

當歸龍會丸 治內有濕熱兩脇痛元以琥珀膏貼痛處

却以生薑汁吞此丸 炒令熱服

草龍膽

當歸

吧子

黃連

黃芩各一兩

大黃

薑黃半兩

木香半錢

黃柏一兩

麝香半錢

右十味為末麵糊丸

一方加柴胡川芎各半兩

又方加青黛半兩

蜜丸

治脇痛 麴丸降肝火

柳青丸 瀉肝火

黃連半斤

右為末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散 治右脇疼痛腹脹不食

枳殼

桂心

片子姜黃各半兩一
本作薑黃

甘草炙一錢半

右為末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

枳芎散 治左脇痛刺不可忍者

枳實炒

川芎各半兩

粉草炙一錢半

右為末每服二錢姜棗湯下酒亦可

益煎散 和劑方 治男子婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不

能已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁去殼 甘草炙

伏苓去皮

草果仁去皮

肉豆蔻 川芎洗 茴香炒 葶澄茄

大麥芽 檳榔 良姜 枳殼

蒼朮 陳皮去白 羌活 厚朴

右吹咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分去粗空

心温服

沉香降氣散 御藥院方治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈

痞塞

沉香 檳榔各二錢半 人參 訶子煨去核

大腹皮炒各半兩 白朮 紫蘇葉 香附子炒

神麩炒 麥蘖 烏藥各一兩 陳皮去白

甘草炒 姜黃各四兩 京三稜煨 蓬莪朮煨

益智炒去殼 厚朴去皮姜製各二兩

右吹咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去滓温服

分氣紫蘇飲 治男子婦人胆胃不和胸膈噎塞腹脇疼

痛氣促喘急 見喘類

調中順氣丸 按粹方治三焦氣滯水飲停積脇下虛滿或

時刺痛

木香 白豆蔻仁 青皮去白 陳皮去白

三稜炮各一兩 大腹子 半夏湯泡七次各三兩

縮砂仁 檳榔 沉香各半兩

右為末水糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳皮湯送下

復元通氣散 和劑方 治氣不宜通或成瘡癰并閃剝腰脇

氣滯不散 方見腰痛

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇 方見氣滯

一方 治脇下疼痛如神效

小茴香 一兩 枳殼 五錢

右為末每服二錢鹽湯調下

十棗湯 治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用

其遂 芫花 慢火炒 大戟 各等分

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢入

實更加一錢量虛實加減

控涎丹 見痛風

二陳湯 見痰類

左金丸 見火類

小柴胡湯 見傷寒

琥珀膏 見積聚

○或謂予曰脇痛之証多是肝火上升不得條達之故

而局方鹽煎散沉香降氣散分氣紫蘇飲調中順氣

丸俱是辛溫之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其

於降火未之有也病源是火而用辛溫之藥治之則
是以火濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經
有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不
善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰
流注子每度之凡左脇痛甚者即是肝火盛木氣實
也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之凡右脇痛
微者即是痰流注并食積宜用益煎散順氣丸等藥
辛溫之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二
証婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄于中發則
上衝被濕痰死血阻滯而其氣而不得條達故作痛也
故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散
火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山
藥菴蓉男子之佳珍此之謂也

跌撲傷損

七十五

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白朮和中童便煎
妙在下者可先須補接後下瘀血在上者宜飲葦汁
或和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心
即死

入方 治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治顛傷骨折及血出者

用滑石其草為末人參湯調服次用生姜自然汁一盞米醋一盞獨核肥皂四箇敲破投於姜汁米醋中紗帛濾過去粗入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散

沒藥

乳香各五錢 自然銅一兩滑石二兩

龍骨三錢

赤石脂三錢 麝香一字

右為末好醋浸沒者多為上乾就炒燥為度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極效

○世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工惟在速効以圖利迎合病人之意而銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方

冬瓜皮 阿膠各等分

右炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芎藭湯 三因方 治打撲傷損敗血流入胃腕嘔黑血

如豆汁

當歸

白芍藥

芎藭

荊芥穗

百合

水浸半日等分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散 楊氏家藏 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有

瘀血停積於內心腹脹悶

紫金藤皮 二兩 降真香

續斷

補骨脂

無名異 煨細酒淬七次

琥珀 別研

蒲黃

牛膝 酒浸

當歸 洗淨

桃仁 去皮尖 大黃 紙裹

朴硝 別研各一兩半

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利

即安

復元活血湯 按粹方 治從高墜下惡血留於腸下及疼痛

不可忍

柴胡 五錢

花粉

當歸 各三錢

紅花

甘草 各一錢

大黃 酒浸一兩

穿山甲 三錢

桃仁 五十箇酒浸研如泥

右咬咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分

服以利為度

當歸道滯散 聖惠方 治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通

浮腫痛昏悶蓄血內壅欲死

大黃 一兩 當歸仁 二錢 射者 少許

右為末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒調下或以酒煎服亦可

雞鳴散 治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍

並以此藥推陳致新

大黃 酒蒸一兩 桃仁 七粒去皮尖 當歸尾 五錢

右為末酒一碗煎去粗五更雞鳴時服取下惡血即愈若氣絕不能言急以熱小便灌之即甦

奪命散 濟生方 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血

凝積心腹疼痛大小便不通

大黃 黑牽牛 各二兩 紅蛭 用石灰慢火炒

右為末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之瀉下惡血成塊以盡為愈

○已上諸方辛涼疎導瘀血之劑

花藥石散 和劑方 治一切金刃所傷打撲傷損身體出血

者急於傷處糝藥其血自化為黃水如有內損血入臟

腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立效若牛舐

腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線縫合肚

皮縫上糝藥血止立活如無桑白皮用生麻綫亦得並
不得封暴瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後糝
藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下
並用童子小便調下

硫黃

七色明淨者四兩搗為粗末

花藥石

兩搗

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一箇
候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上
書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己午時從下着
火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取
出細研以細絹羅子羅極細磁盒內盛依前法服

沒藥降聖丹和劑方治打撲閃肭筋斷骨折變急疼痛不

能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩佚皮
內刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力並皆治之

自然銅

火煨醋淬十二次研為末水漂過焙

川烏頭

生法去膽骨碎補去毛

白芍藥

沒藥別研

乳香別研

當歸洗焙各

生乾地黄

川芎各半

右並生用為細末以生姜自然汁與蜜等分煉熟和丸
每一兩作四丸每服一丸搥碎水酒各半盞入蘇木少
許同煎至八分去蘇木熟服空心食前服

治打撲內損筋骨疼痛 本事方

沒藥

乳香

芍藥

川芎

川椒

去目及閉口者當歸各半

自然銅三錢炭燒

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥霎時連

進有效

乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香

沒藥

川芎

白芷

芍藥

甘草

牡丹皮

生地黄

右為細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散 御藥院方治打撲損傷痛不可忍者

白朮

剉五兩

當歸

白芷

沒藥別研

肉桂去皮

乳香別研

甘草炒各兩

右為末入研藥并研令勻每服二錢溫酒調下不拘時

乳香黃耆散 應驗方治打撲損傷筋骨及瘡腫焮作疼痛

乳香

五錢

沒藥

五錢

黃耆

當歸酒浸

赤芍藥

川芎

甘草

麻黃

陳皮

各一兩

栗殼

去頂帶

人參法蘆

右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓

溫服

接骨散 和劑方治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可

忍著此藥能接骨續筋止痛活血

定粉二錢 當歸二錢 鵬石二錢

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

補損當歸散和劑方 療墜馬落車傷腕折臂等吸疼痛連

造此藥其痛即止筋骨接續

澤蘭炒 附子炮去皮臍 當歸炒

蜀椒炒出 甘草炙 桂心各三分 川芎炒六分

右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水

菘菜

治打損接骨方本事方

接骨木半兩 乳香半錢 赤芍藥 川當歸

川芎 自然銅各一兩煨醋淬十二次

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫衆手丸如龍眼

大如只打傷筋骨及閃肭疼痛者用藥一丸好陳酒一

盞浸化藥蒸熟服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後

服食

治打撲損傷骨折百一選方 此藥專能接骨

夜合樹俗謂之萌為即合歡花越人謂之烏顛樹

去粗皮炒 芥菜子炒

右為末酒調二錢溫酒臨臥服又以粗滓罨瘡上扎縛

之

治打顛骨折損斷經驗方服此藥自頂心尋病至下兩手

遍身遇受病處則颯颯有聲覺藥力習習往來則愈矣

乳香

沒藥

蘇木

降真香

松明節

川鳥去皮

自然銅火煨醋淬七

龍骨半兩生用

地龍半兩去土油炒

水蛭油炒半兩

血竭三錢

土狗十箇油浸焙乾為末

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下

食前服

治打撲傷損經驗方

用胡孫姜研爛取汁以酒煎服渣傳傷處

接骨散張子和方并治惡瘡

金頭蜈蚣一箇

金色自然銅半兩燒紅醋淬

乳香一錢研為細末

銅錢重半兩者或二文或五文燒紅醋淬研細

金絲水蛭一錢半每箇作三截瓦上燒去

氣道為度

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿先

用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打

勻又入前藥接骨散半錢再用銀釵子打成膏子用

雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便効

如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴

末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接定
不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方累經効驗
不可具述

神聖接骨丹 治打撲傷損跌折肢體

水蛭用糯米於砂鍋內炒黃去米三錢

兔絲子

髮灰

好綿灰

沒藥

乳香

血竭各一錢

半兩錢一文燒七次醋

射香另研

右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下
空心服約車行六七里聞骨作聲忌聽鐘鼓砧杵之聲
震動恐生蘆節已食驢肉一服見効

續股散 治折傷筋骨

用半兩錢七箇以桑柴火燒紅好醋內淬之取錢上碎
末再入珍珠末一分乳香沒藥少許同研極細好酒調
服

接骨散 治跌撲閃胸骨折疼痛

麻黃二兩燒灰

頭髮一兩燒灰

乳香五錢

右為末每服三錢溫酒調服立効

茴香酒直指方 治打墜肢體凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙炒

茴香炒

辣桂各一錢

右為末每服二錢食前熱酒調服

木香調氣散 治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香各二錢

藿香 甘草各八錢 砂仁 四錢

右為末每服二錢加紅曲末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅曲紅酒亦好

應痛丸 經驗方 治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼朮 一斤 破故紙 一斤半 骨碎補 一斤

舶上茴香 兩 炒 穿山甲 去膜去皮炒 脹為

生草烏 一斤 坐 度火灰煨亦可

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生姜二斤搗爛將草烏

一處淹兩宿焙乾連前藥一處焙為細末酒煮麵糊丸

如梧桐子大每服五十九酒湯任下忌熱物

○已上諸方辛溫散痛接骨之劑

乳香消毒散 御藥院方 治一切傷折蹉跌焮腫疼痛不可

忍著

乳香 另研 沒藥 另研 白欵 白芍藥 各一

白芥子 當歸 各半 黃柏 另研細 滑石 二兩

黃丹 三錢 加血竭 另研

右為細末入另研者一處再研勻每用新水調如稠膏

攤在紙花上貼患處

烏金散

應驗方

治打撲損傷敷藥

用小黃米粉四兩葱白細切一兩同於砂鍋內炒至黑色杵為細末用好醋調成膏子攤在紙上貼於損傷病處後用杉木皮或板以紙包裹四面四片用絹袋扎縛不可動搖三日一換內服前接骨藥

一方

用葱白砂糖二味相等爛研傳之痛立止且無癢痕

治打撲傷折手足

用菜豆粉新鉄銚內炒令紫色用新汲井水調稀厚傳損處以紙將杉木片縛定立効

走馬散

經驗方

治折傷接骨

栢葉

生少用

皂角

生多用

骨碎補

去毛

荷葉

生各等分

右為末於折傷揣定入原位以姜汁調藥加糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開看以溫葱湯洗之後再貼藥復加七日如痛甚加沒藥

治打傷損

醫方大成

南星

白芷

半夏

白芨

黃栢皮

赤小豆

各等分

右為細末姜汁調傳患處蜜糖亦好

沒藥散 按粹方 專治箭前傷止血定痛

定粉一兩 枯白礬二錢另研 沒藥另研 乳香另研各

風化石灰一兩

右各研為末和勻糝上

治諸般打撲傷損皮破血出痛不可忍者

右用赤石脂研末傅之効

金絲膏藥 應驗方 治打撲傷損閃肭疼痛風濕氣痛

當歸 川芎 蒼朮 香白芷

赤芍藥 木鱉子 大黃 草烏頭各半

香油四兩 瀝青半斤 松香半斤 乳香二錢半

沒藥二錢半

右前八味同香油四兩熬去粗瀝青松香看熬軟硬冬

軟些夏硬些乳香沒藥攤膏藥時用之

立應金絲膏 經驗方

當歸尾 香白芷 杏仁 草烏生剉用

猪牙皂角 不蛀者去皮各三錢 葱連葉肥者十莖

白膠香三錢 瀝青明者八兩 黃蠟一兩 乳香另研

沒藥另研為末 清油七兩

右將前項六味入清油內依法熬濾去粗入白膠香瀝

青鎔化攪勻入黃蠟又攪勻待冷入沒乳末攪勻

至聖黑龍膏

御藥院方治一切筋骨損傷疼痛

米粉

四兩於銀器內炒成塊子

乳香

沒藥

研細各半兩

右研極細每用以好酒或醋調如膏攤在紙花上貼患處

方

治跌撲損傷及金刃所傷此藥止血散痛消腫

風化石灰

重羅過半兩五月五日以韭汁和陰乾

海螵蛸

半兩

老松香

血竭

輕粉

乳香

沒藥

黃丹

飛過

無名異

土松白脂去皮各半兩

右為極細末濕者乾糝乾則水調蜜調傳患處

淋瀝頑荆散

治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荆葉

半兩

蔓荆子

白芷

細辛

去苗

防風

去蘆

川芎

桂心

丁皮

羌活

各一兩

右為末每用一兩鹽半匙葱白連根五莖漿水五升煎七沸去渣通手淋瀝痛處冷即再換宜避風

○已上諸方外治傳貼之劑

疥瘡

七十六

附天疱瘡
脚上爛瘡

楊梅瘡
頭面瘡
凍瘡

丹溪心法

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根稍用及引經藥則可。又云諸瘡以當歸黃連為君連翹其草黃芩為佐。諸痛痒瘡瘍屬火若稟受壯盛宜四物加大承氣湯下之。若性急面黑瘦而熱之人因瘡而痛宜四物加黃連黃芩大力子甘草在下焦者加黃柏。若肥胖之人生瘡而痛乃是濕熱宜防風羌活荆芥白芷蒼朮連翹取其氣能勝濕。

○諸瘡藥 膿窠治熱燥濕為主用無名異。乾疥開鬱為主用吳茱萸。虫瘡如癩狀退熱殺虫為主用蕪荑黑狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺虫樟腦松香退熱。頭上多

加黃連方解石蛇床定痒殺虫松皮炭主膿。腫多者加白芷開鬱。痛多加白芷方解石。虫多加藜蘆斑蝥。痒多加枯礬。陰囊加茱萸。濕多香油調。乾痒出血多加大黃黃連猪脂調。紅色加黃丹。青色加青黛。虫多加錫灰蕪荑檳榔。在上多服通聖散在下多須用下。脚腫出血分濕熱用藥。入方。瘡有三種。膿泡瘡治熱為主。

- 黃芩
- 黃連
- 大黃 各三錢
- 蛇床
- 寒水石 兩
- 黃丹 半錢
- 白礬 一錢
- 輕粉 少許

白芷五分

無名異少許木香少許痛者用

右為末油調傳

沙瘡

蕪荑二錢

剪草一錢

蛇床三錢

白礬

吳茱萸

黃柏各一錢

蒼朮

厚朴

雄黃各半錢

寒水石二錢

輕粉十貼

右為末油調傳

疥瘡藥 春天發瘡疥 開鬱為主 不宜抓破傳

白礬二錢

吳茱萸二錢樟腦半錢

輕粉十貼

寒水石二錢

蛇床三錢

黃柏

大黃

硫黃各一錢

檳榔一箇

右為末香油調傳

又方

蕪荑

白礬粘

軟石膏

大黃

樟腦各半兩

管仲

蛇床各一

硫黃

雄黃各二錢半

右為末香油調須先洗瘡去痂傳之

一上散

雄黃三錢半

寒水石一兩

蛇床

白膠香

黑狗脊各一兩

黃連半兩

硫黃三錢半

吳茱萸三錢

白礬枯五

班猫十四箇

右硫黃雄黃寒水石另研如粉次入班猫和勻蛇床狗脊等為極細末同研勻洗瘡令湯透去痂用臘豬油調手心中擦熱鼻中嗅三三次却搽上一上即愈如癩甚腫滿高起加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡中有虫加雄黃如毒火大湯洗加硫黃只嗅不止亦可愈也

附諸方

四物湯

見補損

大承氣湯

見傷寒

升麻牛旁子散

治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於頭

面胃腸之際

升麻

牛旁子

甘草

桔梗

葛根

玄參

麻黃

連翹各一

右咬咀姜二片水二盞煎一盞服

升麻和氣飲

治瘡腫癰疥痒痛增寒發熱

甘草

陳皮各一兩半

芍藥各一錢

大黃半兩

乾葛

蒼朮

桔梗

升麻各一兩

當歸

半夏

茯苓

白芷各二錢

乾姜

枳殼各半錢

右吹咀每服一兩水煎服

加味羌活飲三四方專治四氣外搏肌膚發為癩疹增寒

發熱燥痒

羌活

前胡各一兩

人參

桔梗

茯苓

甘草炙

枳殼炒

川芎

天麻各半兩

蟬蛻去膜

薄荷各三錢

右吹咀每服五錢水一盞姜三片煎七分温服

當歸飲子治內蘊風熱發為瘡疥風癬濕毒燥痒瘡

當歸

白芍

川芎

生藥

白蒺藜

防風

荆芥各一兩

何首烏

黃芩

甘草各半兩

右吹咀每服一兩水煎或為末每服一二錢亦得

苦參丸齊藥院方治肺受熱毒遍身生瘡

用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十九空

心米飲下

○已上諸方內消之劑

輕粉散

寒水石一斤 硫黃

朴硝各二兩

松香五兩

枯礬二兩 輕粉五錢

右為細末香油調搽

硫黃散

硫黃

川椒

石膏

白礬等分

右為細末香油調搽

立効散

全蠋三十枚

巴豆三十粒

皂角七箇

右為粗末以清油四兩熬至焦黃色去粗次入大楓子

蛇床子白礬末各一兩黃蠟二兩同熬成膏以篋器收

貯任意搽瘡

一方

白芷白礬各等分為細末入硫黃少許以香油調搽

治諸般疥癩瘡藥

蛇床子一斤為末大楓子四兩取肉白礬五兩為末

換榔末一兩

右用油半斤調搽小兒頭瘡少加松香輕粉

水銀膏

大楓子四兩取肉輕粉一錢

水銀要茶研不見星一錢

樟腦二錢檀生熟二錢

右先將楓肉研膏次入餘藥勻臘月猪脂和稀用絹布

裹任意搽

又秘方

...

...

...

...

黑狗脊

藜蘆

藁本

蛇床子

硫黃

井泉石

剪草

百部

藜蘆各等分

右礮為細末用香油搽手心內搽鼻聞之

一方治疥癬諸瘡

雄黃五錢

樟腦五分

大楓子取肉

班貓去足翅炒各十雙

狗脊

蛇床子

寒水石

硫黃各五錢

右為極細末疥瘡用柏油調搽癬瘡用柏油調搽亦可

治疥瘡

大楓子

杏仁各十粒

右同羊脂搗均絹暴火烘油出搽之

胡粉散濟生方治一切瘡癬癢痒甚者

胡粉一分

砒霜半分

大草烏一箇生用蜈蚣七枚

雄黃

硫黃各另研一分班貓一枚

射香少許

右為末先用羊蹄菜根蘸醋搽動次用少許藥搽患處

如意散宣明方治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸

牛旁子

荆芥穗各二錢輕粉半錢

信訛二分

牡蠣半兩

右為細末研勻每臨卧時抄一錢油調遍身搽摩上

半如後痒不止更少旋塗之股髀之間聞香悉愈

又治疥藥方

蜜陀僧

蛇床子

硫黃

枯礬

胡椒分等

右為末香油調傳

○已上諸方外散之劑

丹溪心法

○天庖瘡 用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒蜜調傳極

妙 從肚皮上起者是裏熱發於外也還服通聖散見斑

疹類

○楊梅瘡

新增

附諸方

治楊梅瘡方

硃砂一錢

雄黃半錢

苦參

荆芥穗

天麻

麻黃

牛房子

面粉

槐角子各三錢

右為細末用糖心雞彈為丸梧子大每服二十九用雞湯或羊肉湯送下一日一服表出毒氣再不服忌一月

房室神効

又方

土茯苓四兩牙皂

地骨皮

五加皮

白鮮皮各一兩

右作二十服用燈草車前子為引子煎服

又方

冷飯團一名土核 苓一升

五加皮

白鮮皮

防風

白芍藥

木瓜各一兩半

皂角子

白芷各三粒

生地黄酒洗

地骨皮

牛膝去蘆

黃連去酒

槐花

川芎

尋風藤

威靈仙

白茯苓

杜仲炒斷

白芷

當歸酒浸洗 各一兩

荆芥穗一兩

右剉作二十服每服水一鍾半酒半鍾共煎至一鍾飲

後溫服服動此藥可用後又開薰楊梅瘡藥並治

又方

當歸

連翹

羌活

荆芥穗

薄荷葉

枳殼

黃柏

茯苓

車前子

防風

木通

芍藥

川芎頭工用

山梔

桔梗

天花粉

姜蚕

白芷

甘草

金銀花

獨活各一兩

柴胡

前胡各半兩

右咬咀作二十服每煎用水一鍾煎至八分溫服上多

食後服下多食前服服此仍用煎藥並治

不啻

心法附錄卷之六

徐

薰湯梅瘡方

雄黃

沉香各三

乳香

沒藥

硃砂各五

血竭三分

黑鉛

水銀各一

右為末均作紙撚七條用香油點燈放床上令病人兩腿抱住上用單被通身蓋之口噙冷水頻頻換之則不損口頭一日用三條後每日用一條薰之有效

又方

水銀

板硃

黑鉛各二

白花蛇一錢

共研為末作紙撚七條頭一日用三條後每日用一條用香油點燈放兩腿單被連頭蓋了口噙冷水頻換

治楊梅瘡後腫塊方

冷飯團十五兩

防風

木通

薏苡仁

防己

茯苓

金銀花

木瓜

白鮮皮

皂角刺各五

白芥子四錢

當歸身七錢

右作三十服每服用水鍾半煎至八分空心午飯前晚飯前各一服忌魚雞生冷房事及煎炒茶酒十餘日立効如虛弱人加入參五錢其効不可盡述

一方 專治年久楊梅頑瘡

水花硃

錢枯礬

朱硃各一分

三味共研細末用全蝎酒煎膏為丸作六九分作三日

服用羊肉鮮魚等湯送下九日全好

一方 治楊梅癰

柏油二兩

全蝎三箇

蜈蚣一條

鉛粉一兩

右先將香油二兩煎全蝎蜈蚣待焦去滓次入柏油貼粉柳條攪勻攪成餅子照瘡大小攤貼三日一換九次全好

一方 治楊梅疔漏瘡

用大鱉甲一箇去肉湯洗淨加刺蝟皮一箇象牙末三錢共為細末棗肉為丸如櫻桃大每服一丸空心童子小便送下服七日後仍用三味末猪膽汁調傳

丹溪心法

○凍瘡 用煎熟桐油調蜜陀僧末傳

丹溪心法

○脚上爛瘡久不愈 先以豆腐漿水洗二三次懸鈎粗葉地菘粗葉搗細入鹽芫少盒之

附諸方

治凍瘡 百一選方

用茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

治手足皸裂 百一選方

瀝青二兩黃蠟一兩共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗

令皮軟拭乾將藥於慢火上略炙擦傳
治手足皸裂春夏不愈者澹寮方

生姜汁

紅糟

鹽

猪膏

臘月者佳

右研爛炒熟擦入靴內一時雖痛少頃使皮軟靴合再擦即安

治脚跟皸

用頭髮一大握桐油碗於瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯泡洗皸裂令軟拭乾傳其上即安一方加米粉

又方醫方大成

用五倍子爲末同牛骨髓填縫內即安

治手足裂張子和方

用白芨不拘多少爲末水調塗裂處

治脚指縫爛瘡

宰鷺特取其鳥掌黃皮焙乾炆灰存性爲末濕則糝之

治脚指縫爛瘡及因暑手抓而脚爛瘡

用細茶口嚼碎爛塗之鮮熱燥濕其瘡立愈

神應散 治脚指了濕爛

枯礬六錢 黃丹半錢

右爲細末乾糝患處經夕立瘥

○頭面瘡新增

附諸方

摩風膏聖惠方 摩風止痒消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡及肌肉裂痛者悉治之

沉香

白附子

木香

獨活

白斂

白芨

天麻各一錢半

當歸去蘆

白芷

檀香

陝陵香

藿香

杏仁去皮

桃仁去皮各三錢 芸丁香

甘草

防風

白芍藥各一錢半 川芎

木通各一錢

黃芪

龍腦研四錢

半夏研二兩

清油一斤

黃蠟冬月用九兩

大芥萹連糠一箇剉碎

右剉用油浸七日於石器內慢火煎候白芷微黃色以白綿濾去滓放淨罐內密封澄一宿再濾過於上等磁碗中慢火再輕溫動次下黃蠟攪勻放溫次下研細龍腦糝面於磁盒內盛定每用少許摩患處

治頭面生瘡燥痒黃水出

蜜陀僧

硫黃各二錢

輕粉少許

右為末酥油調搽

一方治白赤瘡

用金頭蜈蚣一條皂角不蛀一箇摩開去皮弦以蜈蚣

納入夾內以麻紮緊沉於糞盆底七日取出焙乾碾為細末先以溫湯將瘡浸洗濕潤然後敷之如乾以清油調搽數次除根

一方

用熟度烟膠一兩輕粉一錢研勻調搽又法用枯白礬同烟膠調搽亦佳

禿瘡藥

輕粉 五錢

黃蠟 二兩

右用鷲油一二兩調搽

治小兒禿瘡 聖惠方

用淡豆豉一合炒令煙出為末用飯飲調屋塵一團於炭火內煨令灰燼並細研入輕粉少許油調剃頭了搽之 一方治頭瘡無屋塵 一方有射香無輕粉

治面上耳邊浸淫瘡

聖惠方

有黃水出久不愈名香辨瘡

殺羊鬚

荆芥

乾棗

去核各二錢

右燒存性入膩粉半錢同研末先用溫水洗香油調塗玉粉散 治熱汗浸漬頭面及遍身成瘡腫痒癢痛

定粉 一兩

蛤粉 九兩

石膏

白石脂 各半兩

滑石 八兩

粟米粉

寒水石

燒出大毒各二兩

白龍骨 半兩

右爲末研令極細每用少許乾擦患處

癰疽

七十七

附腸癰

乳癰

丹溪心法

○癰疽只是熱勝血 六陽經六陰經有多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久未合必成死証遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵 陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱瀋陽

滯以寒治之陰滯以熱治之 人中年以後不可生癰

有痛腫參之脉症但見虛弱便於滋補氣血可保終吉若

用尋常驅熱拔毒紆氣之藥虛虛之過如指諸掌 內托

之法河間治腫焮于外根盤不深形証在表其脉多浮病

在皮肉非氣盛則必侵於內急須內托以救其害宜復煎

散除濕散鬱使胃氣和而平如或未已再煎半料飲之如

大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復

煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也然世俗多

用排膿內補十宣散若用之於夏小瘡與冬月時令即可

若潰瘍於夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐

雖有參芪難爲倚仗 一婦年七十形實性急而好酒腦
生沮纒五日脉緊急且瀦急用大黃酒煨細切酒拌炒爲
末又酒拌人參炒入姜煎調一錢重來兩時再與得睡而
上半身汗睡覺病已失此內托之意 又一男子年五十
形實色黑背生紅腫及脾骨下痛其脉浮數而洪緊食亦
嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附瓜蒌子甘草節
羌活青皮人參黃芩半夏生姜六貼而消此正內托之法
非精要內托散乳香菘豆等藥想此方專爲服丹石而發
疽者設不因丹石而發恐非必用之劑 瘡先發爲腫氣
血鬱積蒸肉爲膿故其痛多少瘡之始作時也膿潰之後
腫退飢寬痛必漸減而又痛者此爲虛宜補亦有穢氣所
觸宜和鮮風寒逼者宜溫散

入方

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破當養血
初腿腫以人參黃連茯苓各二錢瓜蒌子四十八粒作
二貼入竹瀝熟飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮作黃柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條
子苓體虛者加牛膝以生甘草爲使大料煎入姜汁帶

辣食前飲之病深者恐木栢桂枝十數貼發不動如少
麻黃二三貼又不動恐癰將成矣急掘地坑以火煨紅
沃以小便赤體坐其上以被席圍抱下截使熱氣熏蒸
腠理開氣血暢而愈

鐵圈散 治癰疽腫毒

乳香

沒藥半兩

大黃

黃柏

黃連

南星

半夏

防風

皂角刺

木鱉子

瓜蒌

甘草節

草烏

阿膠各一兩

右爲末醋調成膏砂石器內火熬黑色鵝翎傳之

團藥

諸般癰疽傳上消散

乳香

沒藥各三錢

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃柏

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌

阿膠

皂角刺各五錢

右爲研細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

團藥鐵井欄

貝母

南星各七錢連翹

五倍子

經霜芙蓉葉各一兩

右爲細末用水調傳四向腫處止留中間一竅出毒氣

隔皮取膿法

驢蹄細切一兩

蕎麥麵一兩 白鹽半兩

草烏四錢 去皮

右為末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末醋調成膏用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫自退

騎馬癰

大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙水盡為末入皂角炭少許作四服湯調頓服効

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用

敷疽癰方

草烏

世蓮

紫金皮

白芷

大黃

大卷皮

朴硝

粳米各等分

右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雄黃末圍定瘡穴大小前後敷前藥末

取朽骨 又疽及痔漏者有之

取烏骨雞脛骨以上等雌黃實之蓋泥固濟火煨通紅取出地上出火毒去泥用骨研細斂丸如粟大以紙撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸各半

瓜蒌仁二錢 代赭石一錢

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌仁

桃仁

草龍膽各等分

右改咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方

白殭蚕槐花為末酒調服 一方加酒大黃

附諸賢論

劉河間宣明論曰人之瘡腫因內熱之毒所生也為風濕

之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛

則膚腠開為風濕所乘脾氣濕而內熱即生瘡也腫者

皆由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風

邪內作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根結壅

盛則為膿赤核腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實

痒則為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也痒者美疾

也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也多之以火潰之以

湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚

縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而

以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結

不能散越怫熱內作故也瘡瘡皆為火熱而反腐出膿
水者猶穀肉菓菜熟極則腐爛而潰為污水也潰而腐
爛水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也
瘍有頭小瘡也疥浮而小癭疹也瘤氣赤瘤丹燥熱勝
氣火之色也

附脉理

脉訣舉要曰癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脉
數發熱而疼者陽不數不熱不疼陰瘡發癰之脉弦洪
相搏細沉而直肺肝俱數

附諸方

狗寶丸 治癰疽 專治癰疽發背附骨疽諸般惡腫將發時

先覺口中煩渴四肢沉重遍身壯熱乃其候也此藥功
効不可具述

蟾酥 一錢

金頭蜈蚣 七條全者
酥炙黃色

輕粉

雄黃

滴乳香

沒藥

烏金石 各一錢

狗寶

癰疽腹中得之
錢又云一兩

狗膽

一箇乾者用之
皮黑狗膽月者佳

鯉魚膽

一箇乾者用
臘月者佳

粉霜

黃蠟 各三錢

硃砂 半兩

麝香 一分

孩兒乳 一合頭

鉛白霜

一錢
本無此

右先將乳汁黃蠟放在罐內文武火化開次將各藥末

和成劑用時大人九葉豆大小兒九芥子大每服三九
病重者加至五九用白丁香七箇研爛新汲水調送下
腰以下食前服腰以上食後服如人行五里用熟葱白
粥投之即以衣被蓋定汗出為度已後只喫白粥常服
十宣散留頭其四邊以烏龍膏貼

烏龍膏

濟生方

治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子

去殼

半夏

各一兩

水粉

四兩

草烏

半兩

右於鐵銚內慢火炒令轉佳為末出火毒再研以水調
傳瘡四邊留頭出毒氣

追毒丹

濟生方

治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服狗寶丸

次貼烏龍膏收腫解毒去赤暈然後用針刀開瘡納追

毒丹覆以乳香膏使之潰去敗肉排膿然後用生肌藥

白丁香

一錢

雄黃

二錢

巴豆

七粒去殼皮心不去油研如泥

黃丹

二錢

輕粉

一錢

右研和加白麵三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納之上

覆以乳香膏追出膿血毒物痛瘡四壁死肌不去不可

治者亦以此法追毒去死肌生新肉疾小者一粒大者

加用之

乳香膏

濟生方

追膿血消惡毒

木鱉子

去殼

當歸尾

各一兩

柳桂

各八寸

此已上用清油四兩慢火煎令黑色次用

白膠香明淨者四兩共研細入油煎化以綿濾之

乳香

沒藥各半兩

右再治淨鐵鈔又傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩

半以兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起手

下直待注在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅

傾在水盆中出火毒搜成劑收之遇用以絹帛攤貼

桃花散宣明方一切瘡生肌藥

白芨

白欬

黃柏

黃連

乳香另研

麝香另研

黃丹各等分

右為極細末糝在瘡上二三日生肌平滿

○已上諸方治癰疽次第之劑如無狗寶丸以淵然真人奪命

丹代之

內疎黃連湯 治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便秘結脉洪

實者

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草各一兩

連翹二兩

大黃二兩半

右吹咀每服一兩入姜煎

秘方奪命散 治一切癰疽無名惡瘡皆可治之其効不

可盡述

當歸尾

乳香各一

穿山甲去毒

粉炒黃

皂角針燒

陳皮

金銀花各三

貝母一錢

赤芍藥

甘草節各六

沒藥二錢

花粉八錢

防風

白芷各五

右吹咀每服一兩用無灰酒一大碗煎至半碗紙糊口

勿令走氣病在上食後病在下食前服

當歸消毒散應効方治癰腫初發

荆芥

牛旁子

甘草

防風

當歸

赤芍藥各一

右用水二盞煎至八分去滓溫服食後

神仙活命飲 治癰疽發背發腦發髭發脇癰毒騎毒腫

肚癰腿癰附骨癰疽惡瘡惡漏瘡血塊氣塊面目手足

浮腫隨病加減並皆治之

金銀花一兩

五錢

皂角針一兩

五錢

貝母去心

天竺粉各四

當歸尾

滴乳香

大黃各五

沒藥

木鱉子去殼

甘草

穿山甲用蛤粉炒

黃去粉淨

赤芍藥各三

錢

防風去蘆

香白芷各二

錢

橘皮去白

錢半

右每服五錢水煎服若老人及體虛者加生黃芪半兩

若臟腑閉澁者服九寶飲量病上下服之

九寶飲

當歸

白芷

甘草

瓜蒌

黃芩

生地黄

赤芍藥

熟地黄

川芎各等分

右每服五錢水酒共一鍾半煎病上下食前服食後服

九珍散簡易方治一切癰疽瘡節腫毒因氣壅血熱而生

者

赤芍藥

白芷

當歸

川芎

大黃

甘草

生乾地黄

瓜蒌

北黃芩各等分

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱服兼治乳

癰及疔瘡

赤芍藥散 治一切惡瘡癰疽疔腫初覺不消增寒疼痛

金銀花

赤芍藥

大黃半錢

當歸

枳實

甘草各三錢

大瓜蒌一箇

右每服五錢水酒各一鍾煎至一鍾不拘時溫服

玄參散 治癰疽腫痛不進飲食

玄參一兩

升麻

麝香

大黃各五錢

甘草二錢

右每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時溫服

懸蔓散 張子和方 治發背惡瘡

懸蔓一箇 大黃 金銀花 皂角刺各一兩

當歸半兩

右剉碎每服五錢酒一碗煎七分去滓溫服如有頭者加鼠粘子

消毒湯 德生堂方 一名紫花地丁散治惡瘡膿已成未成

者腫大等証

紫花地丁去蘆 金銀花 當歸 大黃酒浸

赤芍藥 黃耆各半兩 甘草一錢 加升麻

右剉為末作二服每服酒一碗銀石器煎五分服

當 通玄論 治一切風熱癰腫瘡疽咽膈不利舌

腫喉閉鼻衄出血咳嗽痰實腸胃燥澀大小便結滯消 癰腫解風毒活血脉保真元宣通遍身結滯

連翹 當歸 大黃 梔子

芍藥 金銀花

右各等分每服五錢水二盞生薑二片煎至一盞去滓 熱服甚者加大黃

一方治發背惡瘡

瓜蔓一箇 金銀花 皂角刺各一兩 淡藥一錢

甘草節 當歸各半兩

右每服五錢以酒一碗煎至半碗服加鼠粘子更佳
治七十二種無頭惡瘡

荆芥

梔子各二錢半

茯苓

白朮

人參各三錢

川芎

芒硝

大黃

當歸

芍藥

升麻

薄荷

蒼朮

連翹

石膏

桔梗

滑石

黃芩各半兩

黃耆

甘草各二錢

右次咀病重者一兩病輕者五七錢葱白一根并金銀花同煎去粗熟服汗出為度如疼加乳香咽喉痛加竹葉燈心同煎

藤黃飲子秘方治一切疔腫惡瘡癰疽疼痛

大黃四兩

甘草

茯苓

牡蠣生用各兩

人參

川芎

梔子

赤芍藥

金銀花各半兩

木香

白芷各六錢

當歸七兩

右次咀每服八錢水二盞煎至一盞溫服

加減藤黃飲子應驗方治一切癰疽瘡腫

金銀花

黃耆

赤芍藥

薄荷

羌活

大黃

當歸

石膏

連翹

麻黃

白朮

白茯苓各八分

黃芩

桔梗

山梔子一分二厘半

荆芥 甘草各三 防風 川芎各八

人參二分 滑石一分七 芒硝二厘

右用水二盞生薑三片煎至一盞去滓食後溫服

漏蘆湯精義 治一切惡瘡毒腫丹瘤濕癩丁腫魚睛立愈

癩疽初覺三日便如傷寒頭空痛煩渴拘急惡寒肢體疼

痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱大便秘小

便赤黃並宜服之惟妊娠忌服

漏蘆 白欬 苦參去黑 麻黃去節

枳實麩炒 升麻 芍藥 甘草各一錢

大黃二錢 朴硝一錢

右作一服生薑三片水二鍾煎一鍾空心熱服

千金漏蘆湯精要 治証同前

漏蘆 連翹 黃芩 白欬

枳殼去穢 升麻 粉草多 麻黃去根節

大黃一錢半 朴硝別研

右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心熱服

鮮毒丸通玄論 治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬

牙驚悸一切熱毒並宜治之方見火類

○已上諸方辛涼內疎之劑

內托復煎散機要 癰疽托裏健胃

地骨皮

黃芩

茯苓

白芍

人參

黃芪

白朮

桂

甘草

防己

當歸

防風

右咬咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入前十

二味再煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之又煎

蒼朮粗為湯去粗依前又煎十二味粗分飲之

神效奪命丹

秘方

治一切發背疔瘡及破傷風陰証傷寒

枯礬

一錢

蝟牛

焙乾

血竭

二錢

銅綠

一字

蟾酥

一錢

輕粉

二錢

硃砂

三錢

右用小兒母乳汁和丸如梧桐子大硃砂為衣遇此病

令患人自嚼生功心一二根爛吐出畏極亦一丸吞內吞下

前藥丸藥未熟証之狀却以熱酒一二盃送如重車行

十里路遍身汗出天氣斟酌衣被蓋勿汗出毒氣腫自

消如病人昏沉人代嚼葱白如前服

淵然真人奪命丹 專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一

切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成

者服之立愈此乃惡証藥中至寶病危者服之亦可矣

萬無一失不可輕易

蟾酥

二錢

血竭

一錢

乳香

沒藥

銅綠

硃砂

各

輕粉

膽礬

寒水石

各一錢

雄黃

麝香

腦子

半錢亦可

無蝸牛

二十一箇

連殼用

蜈蚣

一條

去頭尾

炙

右為細末將蝸牛研作泥和煎藥為丸如棗豆大若丸

不就以好酒煮麵糊為丸每服只二丸先用葱白三寸

令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子展在葱白內

用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣被蓋覆約人

行五里之久再用熱酒數盞以助藥力發熱大汗出為

度如汗不出重者再服二丸汗出即効初覺者二丸即

消三五日病重者再進二丸如疔瘡疔黃過心者難治

汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗爛裹藥仍以熱酒

吞下瘡在上食後服瘡在下食前服後已冷黃瓜茄

子油麵猪羊雜肉魚一切發風瘡毒等物及婦人洗換

狐臭犯之難治

蟬酥丸

李俞甫方

治一切諸惡瘡已發未發服之微汗即

愈

雄黃

乳香

各一錢

蟬酥

一厘

右三味用黃酒熟麵糊為丸如棗豆大每服三丸葱白

湯下不退再服

止痛膏歸散

精養

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸

黃耆

人參

官桂

芍藥

甘草炙

生地黄各二錢半

右用米一盞半煎至一盞去滓溫服日進三服

內托散 治一切惡瘡不可忍神效

甘草半兩

御米殼半兩去項帶蜜炙

乳香

沒藥各二錢

右為細末用雌雄黑豆十粒生姜半兩棗五枚水一大

盞半同煎五七沸隨病上下食前後服

乳香散

本事方

治筋骨肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多

令人嘔吐

菜豆四兩

乳香好者一兩

右同研極細為末每服三錢新汲水濃調食後服

乳香護心散

治癰疽發背疔瘡預防毒氣攻心

菜豆粉四兩

乳香一兩

硃砂一錢

右為細末每服二錢濃煎甘草湯調下

一方治癰疽無頭者

用蜀葵花子一粒新汲水吞下須臾即破如要多破服

三四粒有驗

透膿散

瑞竹堂方

治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀

一服不移時而自透累有效驗

蛾口繭

用出了蛾兒繭兒

右將爾兒一箇燒灰用酒調服即透切不可兩箇三箇
爾兒燒服若服一箇只一箇瘡口服兩箇三箇即兩箇
三箇瘡口切莫輕忽

竹葉黃耆湯精義治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發六
渴者

淡竹葉二分 生地黃一兩 黃耆 黃芩去腐

當歸 川芎 甘草 芍藥

人參 麥門冬去心 半夏湯洗 石膏各四分

右用水一盞半竹葉五片生姜五片煎至一盞溫服

內托千金散瑞竹堂方治腦背癰疽乳便等惡瘡

人參 當歸 黃耆 芍藥

川芎 甘草 瓜蒌 白芷

官桂 桔梗 金銀花 防風各七分

右用水二盞煎至七分入酒半盞去滓溫服如痛甚者

倍加當歸芍藥或乳香二錢日進三服一服之後瘡口

內有黑血出者或遍身汗出皆藥之功效如病勢猛惡

須秤藥一兩水一大碗煎服未成膿者自散已成膿者

不用針破自透此藥累經功效

黃耆茯苓湯精義治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃耆 五味子 白茯苓 官桂去皮

麥門冬

川芎

各一錢半

右用水一盞半姜三片棗子三枚煎至一盞去滓溫服食前日三服

內補十宣散 精要 治一切癰疽瘡癤未成者自消之已成

者速潰敗膿自出不用手擠惡肉自去不用針刀服藥

疼痛頓減其効如神

黃耆

鹽湯潤焙

人參

當歸

各四錢

厚朴

桔梗

桂心

川芎

防風

甘草

白芷

各七錢

右為細末每服五錢熱酒調服不飲酒木香湯調下

內托散

綿黃耆

甘草

金銀花

牡蠣

煨淨二次各三錢半

右為末作一服水一盞煎至七分入酒一盞再煎七分

隨瘡上下食前後服

參蘇內托散

李俞甫方

川芎

當歸

薄荷

甘草

紫蘇

苦參

右吹咀用水二鍾棗二枚煎七分服不拘時

神効托裏散 和劑方 治癰疽發背腸疝癰無名腫毒癩作

痰痛增寒壯熱若傷寒不問老幼虛人並皆治之

癰疽

去付餘卷之六

四九

庚

忍冬草

五兩去梗

黃耆

五兩去蘆

當歸

八兩

甘草

八兩

右為細末每服五錢酒二盞煎至一盞病上食後病下食前少頃再進留滓外傳未成內消已成即潰也

○已上諸方辛溫內托之劑

一方 治癰疽發背初起

用獨蒜一片厚半指置患處以熟艾灸二七壯如無獨蒜大蒜亦可

南星膏

濟生方

治皮肌頭面上生瘡瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸

天南星大者一枚細研稠粘滴好醋五七滴和膏如無生者則以乾者為末醋調如膏先將小針刺腫處令氣

透却以膏攤紙上象瘤大小貼之覺痒則頻貼取效

消腫毒方

簡易方

專用塗諸瘡疽

川芎

蚌粉

草烏

海金沙

赤小豆

天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

蜀葵膏

直指方

治癰疽腫毒

以黃蜀葵花用鹽摻服入磁器密封經年不壞每用患處傳之如無花根葉皆可用

治發背未潰已潰最有神效 醫方大成

厚朴二錢 汁制 陳皮二錢 去白 蒼朮五錢 米泔浸 甘草二錢
右入桑黃菰五錢同為末瘡已潰則乾摻之未潰則油調塗之

拔毒散 消腫定痛

蒲黃 白芷 半夏 黃丹各一兩

赤小豆半兩 為末

右將半夏白芷為末入蒲黃黃丹豆末和勻金銀藤搗自然汁調傳四圍頻頻水潤腫退

拔毒膏 李俞甫方 治腫毒諸惡瘡神效

南皂角 五倍子各五錢 乳香 沒藥

雄黃各一錢

右五味各生用為細末用好酒明熬貼瘡上留頂

乳香散 止痛消腫

乳香 沒藥 粉霜 輕粉各一錢

黃米粉四兩 赤皮葱二兩 蝸牛十四箇 三味一處 砂鍋內炒黑

右為末津調紅絹攤貼留孔貼周圍

敷腫毒未破者

右用蝦蟇一箇先炒石灰後用剝開炒研泥用絹攤上

貼患處自破

拔毒散 治癰腫丹毒肉色變異或者四肢或在背背遊

走不定熈熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏一兩

寒水石三兩

黃蘗各半

右為細末水調時復以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調妙

水澄膏 治熱毒腫痛大効

黃連

黃栢

白芨

白欬各四

雄黃一錢

乳香

沒藥各五

右為細末水調雞翎掃在瘡腫處

治一切惡腫及發背高起未破膏藥方

草麻子一百粒

男髮一塊

右以熬膏入黃丹成膏貼之只一箇便消加黃蠟少許

鐵籬散

治諸般發疔瘡癰腫毒杖瘡

用芙蓉花及葉晒乾為細末以好醋調敷貼患處如杖

瘡赤腫用雞彈清調貼冷水亦可加皂角少許尤妙

一方 治癰疽發背及惡腫毒

飯姜石

一斤出雅安清河

野西瓜藤

茨菇箭各四

右為細末用雞子清調敷患處如乾汲井花水勤掃妙

一方

用五葉藤即五爪龍搗爛敷患處之瘡

一方 治癰疽不潰

用瓜蔓根赤小豆等分為末以醋調敷之

一方 治發背癰疽疔瘡腫毒吸出膿血惡水此法甚佳
用苦竹筒三五七箇長一寸一頭留節薄削去青皮大
小用之以蒼朮白歛烏柏皮厚朴艾葉茶芽白芨白蔘
藜等分爲粗末將竹筒并前藥水煮十數沸藥乾爲度
乘竹筒熱以手按上緊吸於瘡口上候膿血水滿自然
脫落不然用手拔脫易換竹筒如此三五次其毒盡消
即敷生肌藥肉滿後用膏藥即愈

一方

用蜂蜜同葱研爲膏先將瘡口擦動或見血或不見血
將藥塗在瘡上中留一孔一帛縛定如人行約五里其
瘡覺疼更待多時其丁自出然後敷生肌藥忌一切毒

物

一方

治癰疽腫毒

用蒼耳根及葉燒灰存性同乾鼈以醋和勻塗上乾易
之不過十餘次拔出其根

一方

用景天草一名慎火草不拘多少搗爛取汁塗之

水澄膏

治熱腫毒疼痛

大黃

黃柏

鬱金

白芨

天南星

朴硝

黃蜀葵花

曬乾各兩

右爲細末每服二錢以新水一鍾半攪勻候藥澄底去
面上浮水取藥攤紙上貼於腫處如覺燥津唾潤之若
皮膚白色者勿用

一方只用白芨末半錢水碗內沉下澄去水却於皮紙上
攤貼瘡上亦名水澄膏

圍藥 治諸般腫毒傳上消散

用黃柏白芨草烏南星白芷天花粉石膏鬱金甘草貝
母大黃木鱉子皂角刺各等分爲細末用雞子清調傳
神効加石灰尤妙

針頭散 治瘡疽毒腫如木石硬者

蟾酥

麝香

右同研極細以人乳汁調和如泥入瓷盒內盛乾不妨
每用少許以唾津調敷於腫處更以膏藥貼之主毒氣
自出不能爲瘡雖成瘡亦輕

針頭散 通玄論 治惡瘡追毒去死肉

人言

錢

雄黃半錢

乳香一錢

麝香少許

右爲細末每用少許以唾塗於瘡上用膏藥貼之

挑花散 通玄論 治一切惡瘡去死血生肌肉去風活血

龍骨

虎骨

白芨

白欬

烏魚骨

赤石脂

白石脂

黃丹少許

寒水石 用炭火燒赤放冷一兩六錢

右為細末量大小貼之立効

生肌散 治癰疽瘡毒斂口生肉

赤石脂 海鯨鱗 龍骨 各二錢 乳香

沒藥 血竭 各二錢 輕粉 一錢 朱砂

鬱金 黃丹 飛過 黃連 白芷 各五錢

右為細末糝瘡口上用燈心數莖却用膏藥貼之

木香散 治瘡口久不斂者

木香 換柳 各一錢 黃連 二錢

右為細末糝瘡上如痛加當歸一錢

紅玉散 治一切腫毒癰疽生肌肉

用寒水石不拘多少以鹽泥包裹火煨黃丹少許水飛

過用皮紙檯於火上烘乾為度研細末糝瘡上

洗毒散 通玄論 治諸般惡瘡風濕陰蝕瘡並宜此洗之

用蛇床子地骨皮地丁麻黃荆芥防風枯礬各三錢

右用水三碗葱白三根煎至二碗無風處洗

軟膏膏 治一切風熱瘡及小兒頭瘡

巴豆 七箇 瀝青 黃蠟 香油 各五錢

膩粉 一錢

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆

焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放於敷瘡上

神仙太乙膏治八發癰疽及一切惡瘡軟癰不問年月

深遠已成膿未成膿並宜貼之如蛇虎傷蝎螫犬咬并

湯火刀斧所傷打撲傷損者無不可治如發背先以温

水洗瘡淨用無烟軟帛拭乾却用緋絹帛子攤膏藥貼

之其膏藥可收十年不壞愈久愈烈可用磁罐盛之

玄參

白芷

川當歸去蘆肉桂去粗皮

大黃

赤芍藥

生乾地黃各半兩

右用麻油一斤浸春五夏三秋七冬十日熬白芷紫色

瀝去滓再熬油滾下黃丹半斤滴水成珠為度

善應膏

應驗方治

一切癰疽腫毒發背腦疽漏瘡癰子金

瘡便毒臙瘡及小兒頭瘡丹毒寒濕冷痺肢節疼痛手

足頑麻打撲傷損內疔瘀血蜈蚣咬蝎螫婦人乳癰月

間敗血臍腹疼痛並用此散毒氣立効先須洗淨瘡

腫然後貼藥

黃丹

半斤

沒藥

乳香各二錢

白斂

木鱉子

去皮

白芨

當歸

官桂

杏仁

白芷

各二錢

血竭

一分

槐枝

柳枝

各一兩二錢半各長三寸

真麻油

四兩

右件十味內除丹乳沒竭外七味剉碎入油浸三日文

武炭火鍋內熬黃色濾出粗藥方下黃丹以新柳枝長五六寸如小錢大攪勻令熬丹褐色撥下鍋子在地却用柳枝攪藥出盡烟方入乳香沒藥血竭入鍋內仍用柳枝攪勻三五十遍候藥冷傾在籠器內盛春三月間合如常貼用

千槌膏 治一切無名惡瘡

草麻子四十九粒 山豆仁 胡桃仁 杏仁各四十

楓香脂四兩 加乳香 沒藥各一錢半

右為一處搥一千下成絲者新水拔之為度

乳香善應膏 治癰疽發背諸般惡瘡打撲傷損筋骨疼痛並皆治之

乳香 沒藥 血竭各五錢 阿魏二錢

麝香一錢 另研 大黃 黃連 黃柏

防風 荆芥 芍藥 白芷

玄參 當歸 連翹 巴豆

蘇木 大楓子一兩 木鱉子八箇 穿山甲八片

黃丹一斤 飛過 槐桃柳嫩枝各二斤 清油二斤

右除乳香等五味另為末將其餘藥剉碎入清油內煎令黑色濾去滓入黃丹不住手攪成膏却入前五味藥末再攪令勻攤貼患處

蘇木 一斤 飛過 槐桃柳嫩枝 各二斤 清油 二斤

青金九龍膏 治癰疽瘡毒

香白芷 如棗大者 巴豆 去殼

草麻子 去殼 木鱉子 去殼

百二

槐條

柳條 各一十 乳香

沒藥 各三錢

白礬 五錢

黃丹 二十兩

香油 二斤

右將前藥同香油煎以槐柳條不住手攪熬香白芷紫色濾去粗再熬却下黃丹攪勻將白礬逐時入內後下乳香沒藥攪勻務要煎熬得法然後收貯攤貼忌婦人雞犬見之

千槌膏

瀝青 一斤

杏仁 四十兩

乳香

沒藥 各一

輕粉 二錢

香油 五兩

黃蠟 四兩

右將瀝青香油黃蠟同鎔化攪勻却入前四味取出於石上槌千餘下用紅絹攤貼之

綠膏藥 治諸般惡瘡腫毒軟癬

銅青

草麻子 去殼各一兩

松香 四兩

木鱉子 去殼五

杏仁 五錢

巴豆 五箇

乳香 二錢

輕粉 五十

右各為末搗令勻於淨石上用斧槌千餘下成膏收貯水浸旋用

紅膏藥 治臙瘡及諸般瘡毒湯火金瘡等傷

黃蠟一兩

香油三錢

黃丹半兩

右先以黃蠟鎔化次下香油黃丹攪勻再蒸以瓷罐收貯臨用攤貼

妙應膏 治療癰一切惡瘡腫毒及杖瘡

桃柳槐枝各半斤

當歸一兩

木鱉子半兩去殼

黃丹一斤

乳香

沒藥各半兩另研

右先將香油三斤慢熬次下桃柳槐枝木鱉子當歸候焦濾去粗再熬油滾方下黃丹候滴水成珠為度待冷入乳香沒藥仍以槐條攪勻用瓷罐收貯臨時旋攤用神効

○已上諸方外消之劑

忍冬酒 治癰疽發背初發不問何處或肩或頤或頭或

項或腰或脇或手足及婦人乳癰當服此藥神効

忍冬藤五兩搥碎不

甘草節一兩生用

右同入砂錐內以水二碗文火慢煎至一碗入好酒

一大碗再煎數沸去滓分作二次溫服一日一夜製盡

如病重一日一夜要服兩劑俟大小腸通利則藥力到

若無生藤乾者亦好若取忍冬葉研爛入白酒少許調

和敷疽瘡四圍中留一口洩其毒氣亦妙

遠志酒三四方治一切癰疽發背癰毒

用遠志一味洗淨去心焙乾爲末酒調二錢澄清服之
以濟傳患處

醉膏楊氏家藏方治發背發腦一切惡瘡

甘草半兩爲粗末沒藥研二錢半大瓜蒌一枚去皮

右用無灰酒二升煮至一升放溫頓服如一服不瘳
三次

一方 治癰疽發背疔瘡

野紅花即小蘗草五葉草即五爪龍豨薟草 大蒜一箇

右搗爛用好熱酒一椀調汁服之立効

一方 治發背癰疽惡瘡疔腫疥癬及遍身生瘡如蛇頭

用生白礬一兩爲末黃蠟七錢鎔開和勻爲丸如梧桐

子大每服十九至二十九不拘時米飲送下溫熱水

亦可如瘡未破則內消如已破則便合若服金石藥中

毒宜服此藥最妙欲治咳嗽化痰用人參五味子湯臨

卧吞下

一方 治癰疽疔腫惡瘡及黃疸

用茨菇連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾濾汁溫

服若以乾末每服三四錢溫酒調服

一方 治癰疽腫毒一切惡瘡

豨薟草一兩 天竺黃七箇 燒灰 乳香一錢

右爲末每服二錢熱酒調服如毒重連進三服得汗妙

○已上諸方專治之劑

救苦散和劑方治便癰疽等症

大黃

桔梗

金銀花

黃耆

甘草

梔子

紫花地丁

各等分

右吹咀每服一兩酒半碗煎隨瘡上下服

五聖散

聖惠方

治症同前

瓜蒞一箇

生姜一兩

大黃一兩

皂角刺二兩

甘草

金銀花各一兩

右吹咀每服一兩水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿

空心服

又方 治症同前

猪牙皂角

七箇燒存性

梔子七箇

穿山甲七箇

油核桃

七箇

右爲末作一服空心温酒調下

又方 治症同前

木鱉子七箇 甘草去殼

荆芥

當歸尾各一兩

右吹咀水酒煎露空心服併進三服成膿亦散

一方鼠黏子二錢炒細末入蜜一匙淨朴硝一匙温酒

空心服亦効

一方蜈蚣三條搗碎好酒調服有膿即散
一方牙皂為末商星生姜搗乘濕貼上

又方 治症同前

大黃

梔子

貝母

川芎

白芷

牡蠣

大瓜萋

當歸各等分

右咬咀水酒各一盞煎至二盞露一宿空心服

又方皂角膏

皂角炒焦

韶粉炒

右等分和勻以熟醋調仍以紙攤貼患處頻頻以水潤之即効

治便毒不問日久有膿者其効如神

大黃

梔子

木鱉子去殼

皂角

牡蠣

地丁

連翹

甘草各一兩

右咬咀水酒煎露一宿空心服以利為度

治毒散聖惠方治便毒

當歸

甘草

大黃各五錢

金銀花少許

右咬咀水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿空心温服

治毒飲 治便毒初發三四日可消

皂角刺

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草

瓜萋仁等分

此篇在前
治便毒之後

右咳吐水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立効
○已上諸方治便毒之劑

丹溪心法

○腸癰 大腸有痰積死血流注 桃仁承氣湯加連翹

秦尤近肝門破入風者難治防風之類

附脉理

脉訣舉要曰腸癰難知脉滑可推數而下熱腸癰何疑遲

緊未膿下以平之洪數膿成不下為宜

附諸方

桃仁承氣湯見吐血

復元通氣散 按粹方治諸氣遊耳聾腹癰便癰癰疽無頭

止痛消腫

青皮

陳皮各四兩

穿山甲炮

瓜蒌根各二兩

金銀花一兩

連翹一兩

甘草三兩生熟各半

右為細末每服二錢熟酒調下

治腹內癰腫

大黃

一兩取末四錢半

破故紙

一兩取末二錢

牛旁子

一兩取末一錢

牽牛

一兩取末二錢半

右和作二服蜜水調空心服以利為度

丹溪心法

此篇在後釘了
通前一篇係連
接後篇夫子起
接不得于男姑云

○乳癰 乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知
調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行
故竅不得通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿
亦有所乳之子膈有滯痰口氣熾熱含乳而睡熱氣所吹
遂上結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可
消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽
明之熱細研石膏行污濁之血以生甘草之節消腫導毒
以瓜蔓子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或
散或加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三
壯於腫處其效尤捷不可輒用針刀必致危困若不得於

夫不得於舅姑憂忿鬱悶昕夕積累脾氣消阻肝氣橫逆
遂成隱核如大碁子不痛不痒數十年後方為瘡陷名曰
妳岩以其瘡形嵌凹似岩穴也不可治矣若於始生之際
便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之
理

入方

乳癰方

青皮

瓜蔓

橘葉

連翹

薤仁

皂角刺

甘草節

如破多加參芪

右以水煎入酒服

乳癰妳勞炊腫

石膏煨

樺皮燒

瓜蒌子

甘草節

青皮各等分

右以水煎五錢溫服

治乳有核

南星

貝母

甘草節

瓜蒌各

連翹半兩

右以水煎入酒服

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮

連翹

瓜蒌

白芍

甘草節等

乳岩小破加

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥一錢

甘草

當歸各三錢

右作一服水煎入酒少許食後熱服

吹妳

金銀花

天蒼麥

紫葛藤等分

右以醋煎洗患處立消如無一二物只金銀花亦可

乳粟破

少青生必六補

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

連翹

白芍

甘草節等

右以水煎服食後

附諸方

秘傳湧泉散 應驗方 治乳婦乳脉壅塞乳汁不行及經絡

凝滯如乳脹痛或作癰腫

王不留行

白丁香

漏蘆

天花粉

白殭蚕

穿山甲

火炒以黃色各一錢

右為細末每服四錢用猪脂如湯調下

秘傳金銀花散 應驗方 治乳味小不行結成癰腫疼痛不可

忍

金銀花

當歸

苗耆 蜜炙

甘草

各二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾入酒半鍾去滓温服食後

橘皮散

聖惠方

治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍

者藥下即不疼神效蓋因小兒吹乳變成

陳皮

不拘多少湯浸去白

右為末麝香研酒調下二錢

治婦人吹乳奇効

用大車頭造油如圓如梧桐子大每服五十九温酒下

勝金丸

治吹乳

○廣按丹溪云癰疽之証陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱瀋陽滯以寒治之陰滯以熱治之此乃治癰疽之大法也請陳其旨夫所謂陽者氣也鬱而爲火無形之物也陰者血也鬱而爲痰有質之物也陽無形故浮而在表淺而大所謂癰也陰有質故沉而在裏深而細所謂疽也癰脉浮洪弦數陽之象也疽脉沉細弱瀋陰之象也癰屬氣滯於血疽屬血滯於氣總而言之皆是熱勝血也治癰以寒藥是正治之法也治疽以熱藥是從治之法也夫藥性熱則開行性寒則踈泄疽乃有形之陰非熱藥從治豈能開行之乎此古人用藥內踈內托乃正治從治之義也

疔癰七十八

丹溪心法

○疔癰用針刀鍍破頭上一以蟾酥敷之後用菘豆野菊莎末酒調飲醉睡覺即痛定熱除不必去疔自愈也 治二

切疔瘡用紫梗菊花根菘葉皆可研碎取汁滴口中飲之

○瘰癧 血氣痰熱 以牡蠣煨過爲末玄參搗膏爲丸

以桑椹黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者晒乾爲末湯調服

師云大田螺連肉燒灰存性為末入麝香少許濕則乾敷乾則油調敷 夏枯草大能散結氣而有補養血脉之功能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取效

入方 治瘰癧

海藻

洗去沙土晒乾

昆布

揉去土同上味先研為末

何首烏

木白搗為末

皂角刺

炒令黃色

公蛇退

樹上或插上是雄雌一條平地上者是雌

右五味為細末和勻

一處猪項下刀口肉燒熟蘸前藥末吃食後倒患處眠一伏時每核灸七壯口中覺烟起為度膿盡即安初生起時灸曲池男左女右

附諸方

寶鑑保生挺子

治疔瘡背疽癰癧一切惡瘡

金脚信

雄黃

硃砂

麝香

輕粉

巴豆

右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥合成挺子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

破棺丹

神聖膏 治一切惡瘡

當歸

藁本

沒藥

黃丹

黃蠟各二兩

乳香一錢

琥珀二錢

膽礬

粉霜各一錢

白膠香三兩

清油二斤

巴豆十五箇
去殼

槐枝

柳枝各一百條
木鱉子五十箇
去皮

右件一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下

餘藥熬至焦黑亦漉出不用將油澄清下黃丹再熬成

膏用緋帛攤之立効

千金托裏散 治疔瘡發疔一切惡腫

官桂

人參

甘草

川芎

白芷

芍藥各一兩

木香

沒藥各三錢

乳香二錢

當歸半兩

連翹二錢

黃芪一兩

防風

桔梗

厚朴各二兩

右十五味為細末每服三錢酒一盞煎三三沸和粗溫

服無時

破棺丹 治瘡腫一切風熱

大黃

二兩半生半熟 芒硝

甘草各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清溫酒任

化下童便半盞研化服亦得忌冷水

○已上數方治疔瘡次第之劑

蟾酥丹 危氏方治疔瘡

蟾酥 不拘多少

右以黃丹白麵等分搜和為丸如麥粒大針破疔瘡以一粒納之 又方單用蟾酥每用粳米大重者針瘡口納入輕者不須針用水澄膏以白芨末半錢水盞內澄去水脚於皮紙上攤開貼瘡上 聖惠方取蟾酥油調封瘡口立効

蟬蛻散 聖惠方 治疔瘡最有功效

蟬退殼

白殭蚕

各等分

右為末酸醋調塗四圍留瘡口候根出稍長然後拔根出再用藥塗瘡

一方不用醋只用油調塗

一方用蟬蛻為末蜜水調半碗服之仍以津唾調搽瘡上即愈

一方 治疔腫初發

用蒼耳根莖苗子一色者燒灰為末用醋淇調塗瘡上毒根即出或藍靛調尤好

一方用蒼耳草一大握生姜四兩同研爛入生頭酒二梳去渣熱服大汗即愈仍用渣傳瘡

回生錠子

精義方

治疔瘡

草烏

去皮尖

十二兩

麝香

一字用

蟾酥

七粒

巴豆

右為末麵糊丸作錠子如有疔瘡先針刺至痛見血用

此錠子紙入用膏藥貼之重者於疔瘡四面紙之三三
日根自拔下藥最宜緊用

立馬回丁丹 治疔瘡走胤不止

金脚信

蟾酥

血竭

硃砂

沒藥各五

輕粉

片礞

麝香各一

右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長大用時將瘡頭

刺破納入二錠第二日瘡嘔吐為效以膏藥貼之

雷楔 一名紫金錠子 治疔瘡諸惡腫毒

續隨子五兩 川烏頭

甘草各二

蟾酥

雄黃

白礬各一

麝香各一

辰砂各一

片腦二錢

人言

輕粉各五

桔梗各一

黃連三錢

白丁香三錢

巴豆四十九粒 去殼油心

右各為細末再入乳鉢內投蟾酥巴豆同研勻麪糊丸

成錠子如指彈大陰乾如遇諸瘡以井花水磨塗瘡上

如乾再搽

飛龍奪命丹 聖惠方治一切惡疔瘡

人言二錢

班貓去足翅

巴豆去殼油 硃砂三錢

硃砂

硃砂

乳香

沒藥

黃丹各二

南星水洗

半夏水洗各 血竭二錢

麝香分半

心法附錄卷之十一 疔瘡 三十一

右為末蟾酥汁為丸如紅豆大五分內分一分加入班
猫四箇然後捻成錠子如小麥大每一瘡針破下一錠
子用飯粘白紙封口用前四分內一丸齧在舌上覺麻
凉水吞下忌熱物片時如蟾酥乾用人乳汁化開
一方有雄黃二錢

○已上數方疔瘡外治之劑

一方 治疔瘡

用白芷二錢生姜一兩同搗爛熟酒一碗調服出汗立
愈

鐵柱杖 治疔瘡發背頭風

用草烏頭不拘多少去皮淨為末用葱白土龜頭葉搗爛
為丸如豌豆大以雄黃為衣每服一丸先將葱油嚼熟
酒送下或有惡心吐三四口用冷水一口止之即臥以
被厚蓋汗出為度

返童丹 瑞竹堂方 治十三種疔瘡

硃砂

膽礬 各一錢半

血竭

銅綠

蝸牛 各一錢 生用

雄黃

白礬 各二錢 枯

輕粉

沒藥

蟾酥 各五分

麝香 少許

右將七味為末和搗蝸牛蟾酥極爛和藥時先入藥內
為丸如雞頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在

手心將藥丸裹在葱白內用熟酒一盞吞下如重車行
五里許有汗出即瘥如不能嚼葱研爛裹藥下曾有一
僧貨此藥極有效子自合救人累獲効驗真妙方也
寸金丹 治疔瘡 又名返童丹再生丹延命丹延壽丹
來甦丸得道丸此藥嚥下即活

辰砂二分

蟾酥

輕粉各五分

枯礬

寒水石

銅青各一錢

海羊

二十箇

麝香一字

右為末研蝸牛一處搗爛丸如菘豆大難丸漆酒成之
病輕者二丸重者三丸未効再服服法先嚼葱白一大
口極爛置手心中放藥在內裹熟酒下暖處卧汗出即

愈忌冷水

○已上數方疔瘡辛温內托之劑

治魚臍疔瘡

醫方大成

虞刺葉

即絲瓜葉

連鬚葱

韭葉

各等分

右入石鉢內研末如泥以酒和服以滓貼腋下如病在
左手貼左腋下在右手貼右腋下在左脚貼左膝在右
脚貼右膝如在身中則貼心臍並用帛縛住候肉下紅
線處皆白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住
恐其顛倒則難救矣

一方 治疔瘡

用菊葉一握搗爛取汁灌入口即活用根亦妙

一方 治疔瘡

土蜂房窠全

蛇蛻一條

右作一處納瓦器中以黃泥封固火煨存性研為細末
空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡化為黃
水仍服五聖散

五聖散

大黃

生姜

金銀花

甘草各一兩

瓜蔓一箇

皂角針二兩

右吹咀每服一兩用好酒二盞煎至一盞溫服

破棺丹

瑞竹堂方

治疔黃走腫不止

甘草

京三稜各二錢

山梔子

牽牛各半

地丁

連翹

金銀花

牡蠣各一錢

瑞竹堂加大黃三錢

赤芍藥

當歸各一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用童子小便

化開服之食前忌酒并生冷硬物

治疔瘡醫方大成

黃連

羌活

白姜蚕

青皮

獨脚茅

防風

赤芍藥

獨活

蟬蛻

細辛

甘草節各一錢

右吹咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許姜一兩同
研爛熟酒和服然後用酒水各半盞姜三片煎服勢不
減後再加黃少許煎服畧下一兩行湯去餘毒更用
白梅蒼耳子研末貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之
甚若不切然効驗神速累試之驗

○已上數方疔瘡辛涼內疎之劑

連翹丸

濟生方

治癰癤結核已破或未破者

薄荷

新者二升
製取汁

皂角

一挺水浸去
皮製取汁

以上二味一處於銀石器內熬成膏次入

青皮

一兩不皂角子

慢火炮去皮取皂子
二鴉羅為末半兩

陳皮

一兩不連翹

黑牽牛

一兩半半
生半炒

右五味為末用前膏子為丸如梧桐子大每服二十九
煎連翹湯食前送下

治癰癤

楊氏家藏方

斑猫

二十八箇去頭
翅足糯米炒

荆芥穗

姜蚕

黑牽牛

各二錢

右為末臨睡時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時
再一服五更初却以溫酒調藥一錢服訖如小便無惡
物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白
糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末

一錢服之以小便內利去惡毒乃為愈也

一方 治瘰癧 張子和方

白殭蚕 炒去絲 直者

白丁香 直者 斑貓 去翅

磨刀泥

苦丁香

赤小豆 各等分

右為末十歲以上每服一錢二十歲以上服二錢病人不要吃晚飯五更時用新汲水一盞調服至辰時見效男子大便中女人小便中利下赤白色二三次或膿血如鼠狀為效當日食粥不得吃別物忌油膩患三四年者只一服七八年者再一服

剋効散 治瘰癧子瘡

官桂

硃砂 各半

赤小豆

粳米 各四寸九粒

斑貓 四十九箇 不去翅尾

右五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字煎商陸根湯送下空心服小便淋瀝為効如惡心嘔吐黃水無妨瘰癧日日自消矣

無比丸 治瘰癧

白木

檳榔

防風

牽牛 半斤

密陀僧

郁李仁 炮去皮

斑貓 糯米炒 各等分

右為末麵糊丸如梧桐子大每服二十九空心臨卧其草檳榔湯送下至一月後覺腹中微痛於小便中取下

癩子毒如魚眼大已破者自合未破者自消有驗

一方 治癩癧

用班猫一兩去翅足以粟米一升炒黃色去米細研入薄荷末四兩以雞彈清丸如菘豆大空心臘茶湯下一丸每日加一丸加至五丸每日減一丸減至一丸又每加一丸加至五丸後每日仍服五丸

一方 治癩癧

用烏雞彈一箇頂上開一竅攪清黃令勻以班猫一箇去頭翅足入雞彈中以細糊封之飯上蒸熟剥去殼去班猫空心喫雞彈一日一箇以瘡為度

一方 治癩癧

雄黃

鬱金各五

巴豆去油殼半錢

班猫七箇去頭翅足糯米炒

右為末麪糊為丸如菘豆大每服五七丸臨卧以冷茶

清送下

五香連翹湯精要方治一切惡核癭癧癰疽惡腫等病

舶上青木香

沉香

乳香

丁香

麝香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

射干

木通去節各七分

大黃蒸一

右用水二盞煮取一盞以上去滓取八分清汁空心熱服半日以上未利再喫一服以利下惡物為度未生肉前服不妨以折去毒熱之氣本方有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故缺之知者自當量入

一方有黃耆藿香無獨活麝香一名五香大黃湯

玉燭散 治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日

助効 方見婦人門

東垣升陽調經湯 治瘰癧遠頸或至夾車此皆出足陽

明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳於妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻 八錢

葛根

龍膽草 酒製 黃芩 酒洗

義米 酒洗

三稜 酒炒

甘草 炙

黃連 酒洗

連翹

桔梗 各三錢

生黃芩 四錢 歸稍

芍藥 各三錢

黃柏 酒炒

知母 酒洗 炒

右另秤一半作末煉蜜為丸菜豆大每服百餘丸一半

你咬咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七八錢水

二盞先浸半日煎至一盞去滓臨卧熱服足高於枕仰

卧噙一口作十次嚥下留一口在後送下丸藥服畢其

卧如常

○已上數方濕癩內消之劑

太乙膏 治癩子瘡神效

腦子一錢

輕粉

乳香各二錢

麝香三錢

沒藥四錢

黃丹五兩

右用清油一斤先下黃丹熬用柳枝攪又用葱兒葱七枝先下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手攪觀冷熱得所入腦子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤

一方

用瀝青草麻子去殼同研成膏先用葱椒湯洗瘡淨以紅絹攤膏貼患處

一方

用石灰一塊自辰時晒至午時將瀝青搥細杏仁四十四粒草麻子十四粒同搗成膏依前攤貼

一方

用白膠香一兩磁器內鎔開去滓再鎔以草麻子六十四粒研爛入膠內更入油半匙熬勻滴水中試軟硬得所量瘡大小以緋帛攤貼先以葱椒湯洗瘡淨後貼一膏可治三五瘡并治惡瘡軟癩皆效

一方

用荊芥煎湯待冷洗瘡淨揀黑紫處以針刺破却用雄

黃樟腦爲末清油調搽三四次候黃水出處仍取未見
日蝨蚓糞如雞彈大一塊火內燒紅穿山甲九片或十
一片微炙爲末入乳香沒藥少許香油調搽妙

一方

梧桐淚一錢巴豆去皮

皂角刺各一錢

右爲末於淨室中勿令人見以不語唾調和捻成錠子
如黃魚糞大陰乾每用先刺開瘡入藥一錠已潰者就
內入藥用紙封之勿令透氣待膿水出或有硬塊在內
擠出惡物瘡口自斂即愈忌生冷油膩葷腥麪食

又方

以雞肫脰燒灰末搽未破香油調傅已破乾搽

又方

用夏枯草不拘多少於鍋內煮爛陰草將汁熬膏貼之
治項上生瘰癧瘡未破灸法

以男左女右中指屈過用草量中節橫紋名爲同身寸
量三寸半爲則於手板盡處量三寸半臂中立穴灸兩
三壯半月瘰癧處水如泥惡物盡膿流出後以膏貼妙
○已上數方瘰癧外散之劑

諸疔瘡七十九

丹溪心法

○金瘡 五倍子紫蘇等分為末傳

又方 白膠香三錢龍骨一錢

金瘡及狗咬

五月五日午時用陳石灰一斤搗為末韭一斤搗汁和

成餅陰乾為細末敷之

治陽証腫毒并金瘡

大粉草剉細用竹筒一段割去青兩頭留節節上開一

竅入粉草在內滿後用油灰塞孔竅從立冬日放糞缸

內待立春先一日取起豎立在有風無日陰處二十一

日多最好却破竹取草為細末用傳金瘡乾者水調

附諸方

花藥石散 和劑方 治一切金刃所傷打撲傷損身體出血

者急於傷處摻藥其血自化為黃水方見損傷類

一方 治金刃所傷一切腫瘡及馬斷梁等瘡

用冬月黑牛膽一箇裝新石灰四兩白礬一兩陰二十

七日待乾取出再用黃丹一兩另炒紫色研細同一處

再研勻敷瘡即差

刀箭藥 治金刃跌撲狗咬湯火所傷

端午日採一去草花藥擇嫩者搗爛量入舊石灰搗極

勻或丸或餅陰乾碾為末濕則摻之乾則油調搽

一方

用初生小鼠同石灰搗勻陰乾傳金刃跌撲出血甚妙
如聖散 秘方 治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治大
有效驗

香白芷

川芎

防風

去蘆各五錢

細辛五錢

雄黃 二錢半

蒼朮

米泔浸一宿去皮二兩

草烏 去皮臍四兩

兩頭尖 去皮臍四錢

右為極細末血不止乾貼破傷風牙關緊急用熱酒一
盞調服一錢又貼破處風牙疼乾擦之流涎即愈狗咬

蛇傷煎鹽湯洗淨乾貼用熱酒調半錢服如重車行五
里並服三服如重服一錢小兒量力減服多年不効惡
瘡煎葱白鹽湯將水口含洗去膿血一二次拭乾貼一
切蜂蝎小虫所傷唾調於痛處貼之婦人產後敗血上
衝下注熱酒調服一錢忌腥葷麪食油膩之物

丹溪心法

○湯火瘡 臘月猪膽塗黃柏炙乾為末傳之

湯洗 以淋了第二次灰担傳患處

火燒

桐油 二錢

水膠 二錢 溶開入油

右二味以桃柳枝不住手攪成膏再入少水浴外用貓兒肚底毛細剪摻之

附諸方

治湯火傷未成瘡者

用小麥炒黑爲度研爲末膩粉減半油調塗之

赤石脂散 經驗方 治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃 各等分

右爲末以新汲水調塗傷處

治湯火所傷

用大黃當歸各等分爲末以清油調傳之濕則乾摻之

冰霜散 治火燒損傷熱油澆傷皮爛肉大痛

寒水石 生 牡蠣 煨 明朴硝 青黛 各一錢

輕粉 一錢

右爲末新水調或油調濕則乾散痛處立止如神

治火傷

凡被火傷急向火灸雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物激之熱不出爛人筋肉

一方 治火傷

以杉木皮燒灰存性爲末濕則乾摻乾用雞子清調塗治湯盪火燒瘡立効

用擗猪毛烧灰香油調搽患處

四黃散 瘡索方 治湯盪火燒熱瘡連痛

大黃

黃連

黃蘗木

黃芩

白芨

各等分

右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上

治湯火瘡

瘡索方

用螺螄殼多年乾白者火煨為末如瘡破用乾搽之如
不破輕粉清油調傳之

丹溪心法

○下疳瘡

蛤粉

蠟茶

苦參

蜜陀僧

各等分

右為末河水洗淨臘猪油調傳 兼治膝瘡

又方

米泔水洗瘡淨用頭髮以鹽水洗淨去油再用清湯洗
晒乾燒灰傳瘡上即時生靨

附諸方

治下疳

用黃柏以磁瓦割下細末同蛤粉末等分搽上即愈蓋
黃柏去熟蛤粉燥濕故也

又方

瘡瘡

法附餘卷下

八五

東

二百五

用米泔水洗瘡淨以雞肫脰內黃皮焙乾為細末傳之
又秘方

用透明白膠香為末入輕粉麝香少許乾摻乾則用油
調傳之

立効方 瑞竹堂方 治下疳

燈草灰入輕粉麝香少許乾貼

治下疳 秘方

旱田螺 燒灰 腦子

麝香

輕粉 少許

右為末香油調傳患處即愈

下疳藥 聖惠方

用五倍子為細末先以漿水洗淨瘡乾貼

治下疳妬精瘡 秘方

七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

聖粉散 治下注疳瘡蝕鼻腐爛疼痛不可忍

黃柏 蜜炙

蜜陀僧

黃丹

孩兒茶

乳香 各三錢

輕粉 半錢

麝香 少許

右為末用葱湯洗瘡後次貼此藥兼治小兒疳瘡

下疳瘡洗藥

黃連

黃柏

當歸

白芷

獨活

防風

朴硝

荊芥

右等分水煎入銅錢五十文烏梅五箇鹽一匙同煎溫洗日五七次用下藥敷

木香

檳榔

黃連

銅青

輕粉

枯礬

蜈蚣各等

麝香少許

右為極細末洗後至夜敷上

黃連散 治下疳

黃連

黃柏各二錢

蜜陀僧

輕粉

黃丹

沒藥各五分

右為細末瘡濕乾搽瘡乾香油調徐

麝香杏仁散 宣明方治婦人陰瘡

杏仁不拘多少

麝香少許

右為細末如瘡口深用小絹袋子一箇盛藥滿繫口臨上藥炙熟安在陰內

丹溪心法

○癬瘡

防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺

又紫蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯洗

又方

浮萍一兩

蒼耳

蒼朮

苦參各一兩半

黃芩半兩

香附二錢

右用酒糊為丸服

又方

蘆會一錢

大黃三錢

輕粉

雄黃各一

蛇床子三錢

槿樹皮三錢

檳榔三錢

右為末先刮癬後用米醋調藥末塗之

又方

蘆會研三錢

江子去殼十粒

草麻子去殼十粒

斑猫翅足

七箇去

白蠟一兩

右以香油二兩熬江子草麻斑猫三藥以黑為度去藥入蠟并蘆會末在內用磁罐盛貯微微利癬令被以油

塗上過夜畧腫即愈

附諸方

碧玉散 治癬

銅綠

硼砂

白礬各等分

右為細末香油調搽

椴皮散 治頭面荷葉癬

用川椴樹皮為末醋調湯頓如膠敷上候瘡癬抓破再搽數日即愈

連粉散 風癬濕瘡並皆治之

黃連一錢

輕粉五分

膩粉

黃柏

黃丹 枯白礬各一錢 龍骨 蘆葦石各五分

右為細末每用少許濕則乾搽乾則香油調搽

如聖散 治疥風癬瘡

蛇床子一兩 黃柏 苦參 藜蘆 前草各二錢半

白礬 狗脊 藜蘆 前草各二錢半

輕粉分半 錢二 胡粉分半 錢二

右為細末清油調搽

白礬散 聖惠方 治遍身生癬日久不愈上至頭面

用獨莖羊蹄根別搗白礬為末一處以極酸米醋調搽

破搽藥候痒極搽藥即止隔日重搽不過兩上即愈

又治癩風以苧麻刮熟以此藥搽之三四度愈

黃藥子散 經驗方 治疥癬瘡經年不瘥

黃連 玄參 赤芍藥各五錢

右件為細末隨以多少入輕粉少許蜀芝麻取汁調先

煎薤菜湯洗令淨以藥傅之愈

何首烏散 和劑方 治脾肺風毒遍身癬疥瘡痒或致肌肉

木麻并紫癩白癩風並皆治之

荊芥穗 威靈仙洗淨 蔓荊子去皮 蚶蜆草去土

何首烏 防風去蘆 甘草各等分

右為細末每服二錢食後溫酒調下

丹溪心法

○膿瘡

乳香

沒藥

水銀

當歸各半

川芎

貝母各二錢半

黃丹一錢半
云二兩半

真麻油五兩

右吹咀除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑去粗下黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨生用

血竭

赤石脂各三錢

頭髮如指大一塊

黃蠟一兩

白膠香二錢

香油不拘

右件先以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箸貼在外二日後番過再貼仍服活血藥

又方

用砂糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將葉貼瘡上日換三次

又方

以頭垢燒灰和棗肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉搽上却以前膏兩傘紙攤貼之

黃柏去粗皮切為末火龍丹即煤爐口上燒紅土或用伏龍肝即竈心紅土亦可

右各等分先將五味研為極細末後下輕粉用真香油調勻再用油單紙夾住勿令藥侵瘡貼上絹帶繫住一日三番拭去瘡上血沫

治外臙脚瘡秘方

用累經燒過窰竈黃土研極爛入黃柏赤石脂黃丹輕粉拌勻以清油調稀用油紙盛藥傳瘡上却以布絹縛定縱痒不可以手開動直候十數日後瘡愈却去之

○廣按此方與前方相類其用竈心黃土以燥濕清熱用黃柏之辛以散火邪真諸藥所不及但再加沒藥與乳香以散瘀血可謂十全大

又方

白膠香末以臘酒瓶上箬葉夾藥在內貼之

治遠年近日臙瘡聖惠方

黃丹飛 輕粉 蜜陀僧 龍骨各等

麝香少許

右為細末漿水洗淨瘡口乾貼之

又秘方

輕粉二錢 黃蠟一兩 猪膽一箇

右溶化攤油單紙上貼

○漏瘡新增

附諸賢論

劉宗厚曰諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭肉無互肉宜用附子浸透切作大片厚三二分於瘡上着艾灸之仍服內托之藥隔三二日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有膿水惡物漸潰根深者郭氏治用白麩硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易復隔四五日方用翠霞錠子并信効錠子互相用之紐入瘡內夕肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑

調理即瘥矣

附諸方

灸法 冷漏多在腿足之間皆是積熱所注又則為寒附子破作兩半用人唾浸透切成片安漏孔上用艾灸之內托散

川芎半兩

細辛

白芷稍

各二錢半

右為末每日作湯服之病在下食前服在上食後服着瘡大小討隔年黃麻根刮去皮燃成繩子入孔中至入不去則止瘡外膏藥貼之

內補十宣散

治冷漏在遍身用此內托補虛

方見癰疽類

當歸拈痛湯 治冷漏在腰腿之間用此以補虛散邪

方見脚氣類

翠霞錠子 治年深冷漏日久惡瘡有歹肉用之

銅綠

寒水石 煨

滑石 各三錢

明礬

膩粉

砒霜

雲母石

研如粉各一錢二分半

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡內深

淺維之如脩合此候天色晴明則可

信効錠子 治一切惡瘡

紅娘子

黃丹

砒霜

鷹屎

土硝

白炭 各半錢

銅綠 二錢半

腦子

麝香 各少許

右研細末廝兌乳汁和為錠子用中病即止

生肌散 歛口生肉

太乙膏 護瘡散邪 並見癰疽類

丹溪心法

○杖瘡瘰

黃栢生地黃紫金皮皆要藥熟血作痛一涼血去瘀

血為先須下雞鳴散之類 生地黃黃栢為末童履

調傳或加韭汁 不破者以韭菜葱頭春碎炒熟貼

冷則易 膏藥用紫金皮乳香沒藥生地黃黃栢大

黃之類

又方

用大黃黃柏為末生地黄汁調傅乾則再傅

又方

野生苧麻根嫩者不拘多少洗淨同鹽搗傅瘡上効

傷重多用鹽

附諸方

雞鳴散

見痰損類

乳香散

治林瘡腫痛

乳香另研

沒藥

另研各一錢

大黃

黃連

黃柏

黃芩各三錢

腦子少許

右為細末冷水調勻攤於緋絹上貼之

當歸散

乳香

沒藥各二錢

茴香四錢

當歸一兩

自然銅火燒醋淬七次

右為細末每服五錢温酒調服

五黃散

黃丹

黃連

黃芩

黃柏

大黃

乳香各等分

右為細末冷水調成膏攤緋絹上貼之

陳巡檢方

入黃

當歸

芍藥

川芎

木鱉子

巴豆

白芷

白芨

乳香

沒藥

射干

槐枝

柳枝

已上十三
味各一兩

黃丹

十三兩
飛過

香油

二十
六兩

右除乳香沒藥外十一味用香油浸三日熬至焦黃色

濾去滓入飛丹再熬滴水中不散為度候油溫下乳香

沒藥去火毒

丹溪心法附餘卷之十六

