

東晉國寶錄

東醫寶鑑內景篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

血

陰血生於水穀

靈樞曰中焦受氣變化而赤是謂血又榮出於中焦又曰穀入於胃脉道乃

行水入於經其血乃成○內經曰榮者水穀之精氣也和調於五藏灑陳於六府乃能入於脉也故

循脈上貫五藏絡六府也

血爲榮

內經曰血爲榮榮於內目得血而能視足得血步掌得血而能握指得血而能擗○劉宗厚曰榮者水穀之精也生化於脾總統於心藏受

於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能

視耳得之而能聽手得之而能擗掌得之而能握足得之而能步藏得之而能液府得之而能傳注

之於脉少則溢充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤爲血也是故血盛則形盛血

東西醫金匱卷二
衰弱則形

血爲氣配

夫血譬則水也氣譬則風也風行水上

有血

不運則血止

氣溫則血消氣寒則血澁氣有一息之

不行

病出於血調其氣猶可

脉法

脉經曰

脉得諸瀆濡弱爲亡血○脉訣曰諸證失

脉

皆見芤脉

黃沉細浮大難治○正傳曰芤爲失

失血澁爲少血又曰吐血之脉必大而芤

大爲發熱芤爲失血○靈樞曰衄而不止脉大者逆○內

經曰脉至而搏血衄身熱者死又曰腹脹便血脉

大時絕者死○難經曰病若吐衄血脈當沉細反

浮大而牢者死○仲景曰脫血而脉實者難治○

丹溪曰吐衄血脉滑者難治○吐唾血脉小弱

者生實大者死○諸矣

血證脉大且數者逆

熟能傷血

九熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗

熱能傷血心散所不可關火視熱能傷血四順清涼飲

煩悶又不可無也。○丹溪曰：諸見血皆熟證，所謂知其要者一言而終是也。又曰：血見熱則行見

寒，則凝。九口鼻出血，皆係陽盛陰虛，有升無降，血隨氣上，越出，上竅法當補陰抑陽，氣降則血歸經。

溢也。○亢血得熱，則淖溢，故鮮得寒，則凝。故瘀，瘀者黑色也。鮮者赤色也。

七情動血

內經曰：諸血者，皆屬於心。又曰：大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。又曰：怒則氣逆，甚則嘔血。

○怒氣逆甚，嘔血，暴癥內逆，肝肺相搏，則血溢鼻口。但怒氣致血，證暴甚，故經曰：抑怒以全

陰者，是也。否則五志之火動甚，火載血上錯經，妄行宜用保命生地黃散，防風下。○內傷七情者，暴

喜動心，不能生血；暴怒傷肝，不能藏血；積憂傷肺，過思傷脾，失志傷腎，皆能動血。又曰：五志火動，失

血，熱者解鬱湯，虛者保命散，防風又曰：大怒薄厥，此怒傷肝而嘔血，以黃連香附青黛柴胡甘草平疎。

其肝則自愈矣。○暴喜傷心，則氣逆而肝不納血，不出血，故肝無所受。暴怒傷肝，則氣逆而肝不納血，不出

血，無所歸。又房勞過度，以致陰火，沸騰血從火起，故錯經而妄行，薄厥。

內傷失血

靈樞曰卒然多食飲則脹滿

起居不節用力

過度則陽絡

脈傷陽絡脉傷則血內溢

居外溢血外溢則後血

溢則衄血陰絡脉傷則血內溢

血溢大小便血爲血泄無

失血諸證

失血諸證妄行於上則吐衄

衰涸於外則虛

滲透腸間則爲腸風

陰虛陽搏則爲崩中

濕蒸熱

瘀則爲滯下熱極腐化則爲膿血火極似水則血

色紫黑熱勝於陰則發爲瘡瘍濕滯於血則發爲

色紫黑熱

疹皮膚則爲冷癰蓄之在上其人喜忘蓄

之在下其人喜狂

○其從肺而上溢于口者曰嘔血吐血其咯血嘔

之在胃而上溢于口者曰嘔血吐血其咯血嘔

之在腎或從肺來也其出于肺也其痰帶血

辨血色新舊

新血鮮紅

舊血瘀黑

證色如烟

煤屋漏水

寒證

新血鮮紅

舊血瘀黑又曰風

證色青

○陽證溢出鮮血陰證下瘀血者愈重三便黑肝目綱○初便褐色變者以其火燥也如羊血在日色赤湏臾變褐色久則轉變而爲黑色此意也

蓄血證

蓄血即瘀血積蓄也

○傷寒熱病身黃屎黑如

藏

海藏曰喜忘發狂身

藏

黃屎黑疾已甚也但小腹滿示便不利者輕也

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○亢病日輕夜重便是瘀血又常喜漱水而不欲

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○下咽門○亢蓄血有上中之別以動嘔吐血

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○上焦則善忘宜壓角地黃湯防見血蓄中焦會滿

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○身黃漱水不欲嚥宜挑仁承氣湯傷觀血蓄下焦

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○則發狂糞黑小腹硬痛宜抵當湯丸須取盡黑物

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○日瘀血繫結宜用地黃湯通治三焦蓄血海藏目綱

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○木靈脂生地黃大黃甘草利而逐之

○海藏曰喜忘發狂身

藏

○韭菜汁善治胷脹間癥血甚效

○海藏曰喜忘發狂身

藏

生地黃湯

治蓄血證脉沉細微膚冷臍下滿或利老幼氣弱者尤宜或

生地黃半兩

汁一升無則用生乾地黃二兩乾漆炒

藍

葉一握剉無則用乾末半升蜜蠟二十箇水蛭

大黃一兩剉桃仁研半兩右水三升同熬

至二升放冷分二服先服至半日許血未下再服

之此藥比抵當湯九甚輕恐抵當丸下血不止故

以些湯主之藏海

血病吉凶

亢血逆行難治順行易治無潮熱者輕有潮

不得卧者重潮盛脉大者死又曰九竅出血身熱

盛則身涼不渴然血陰也身涼者易愈又曰如心

肺脉破血若涌泉口鼻俱出者不治門入靈樞曰

滯而脫形身熱色夭然白及後下血衃血篤重

是爲逆又曰衄而不止脉大是爲逆又曰咳且溲

血脫肉其脉小勁是爲逆又曰嘔血脅滿引背脉

小而疾是爲逆又曰腹脹便血其脉大時絕是爲

逆又曰㗍溲血形肉脫脉搏是爲逆○東垣曰諸

見血身熱脉大者難治難治者邪勝也身涼脉靜者易治易治者正氣復也又曰血溢上行或唾或嘔或吐皆凶也若變而下行為惡痢者順也上行爲逆其治難下行為順其治易故仲景云蓄血證下血者當自愈若無病之人忽然下血利者其邪欲進也今病血證上行而下行為惡利者其邪欲去是知吉也○仲景曰吐血咳逆上氣脈數而有熱不得卧者死○無故忽然鴻下惡血名曰心絕爲難治○傷寒太陽證衄血者病欲愈熱結膀胱而血自下者亦欲愈以此觀之則他病伏熱之人也雖然血既吐而自止則可矣

亡血脫血證

靈樞曰鼻頭色白者亡血也又曰衝脉為血之海血海不足則身少血色面無精光又曰血脫者色白夫然不澤其脉空虛○內經曰臂多青脉曰脫血又曰安卧脉盛謂之脫血○東垣曰六脉弦細而澁按之空虛其色必白而天不澤者脫血也通用四物湯方見三才丸

三才丸

補血虛天門冬熟地黃入參各等分右烏蜜丸梧子大每服百丸酒飲任下

衄血

鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出兼以陽明
鬱則口鼻俱出也又曰衄血出於肺宜莎芎散

黃散

三黃補血湯清衄湯解鬱湯入丹溪曰衄血以涼

雞蘇散陶氏生地芩連湯保命生地

黃湯入鬱金加片芩升麻

門○丹溪曰衄血以涼

芩升麻施子黃芩芍藥生

東垣曰衄血出於肺犀角升麻施子黃芩芍藥生

血行血爲主

犀角地黃湯入

犀角升麻

門○丹溪曰衄血以涼

芩升麻施子黃芩芍藥生

東垣曰衄血出於肺犀角升麻施子黃芩芍藥生

芩升麻施子黃芩芍藥生

辛紫菀丹參阿膠之類

主之○內經曰

脾移熱於

肝則爲驚衄又曰少陰所至爲

內經曰少陰所至爲

內經曰少陰所至爲

內經曰少陰所至爲

衄蟻又曰陽明厥逆

喘咳身熱善驚衄

又用止血諸方法○

衄不以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

衄不以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

衄不以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

衄不以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

傷寒當汗

汗不汗熱盛迫血必爲

衄宜麻黃升麻湯

門○丹溪心法芩附飲同

衄不以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

衄不以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

衄不以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

門○丹溪心法芩附飲同

莎芎散

治衄血香附子四兩川芎二兩右爲末每二

錢茶清調下不以時○丹溪心法芩附飲同

通肝使血歸於肝藏血歸火散於經絡川芎和血

香附開鬱行氣使邪火散於經絡川芎和血

門○丹溪心法芩附飲同

通肝使血歸於肝藏血歸火散其血立止門

三黃補血湯

治六脉虛芤而衄吐血升麻白芍藥各

二錢熟地黃一錢當歸川芎各七分半

門○丹溪心法芩附飲同

三黃補血湯治六脉虛芤而衄吐血升麻白芍藥各

二錢熟地黃一錢當歸川芎各七分半

生地黃柴黃芩牡丹皮各五分右剉作一貼水煎

片

雞蘇散

治衄血不止乃肺金受相火所割然也
葉黃芪生地黃阿膠珠白茅根各一錢
麥門冬

剉

苦蔓蒲黃炒貝母炒桑白皮甘草條各五分右
貼薑三片水煎服兼以黃丹吹入鼻孔

陶氏生地芩連湯

治鼻衄成流不止失神閉目撮空不省人事生地黃

黃芩黃連梔子川芎赤芍藥柴胡苦蔓犀角

甘草各一錢右剉作一貼大棗一枚同煎臨服以藕

汁磨墨汁調眼門

清衄湯

治衄血當歸赤芍藥生地黃香附子黃芩梔子側柏葉各一錢黃連七分赤芍芩苦蔓各

五分生甘草三分藕節五箇右

剉作一貼水煎入童便調服

解鬱湯

治衄血黃芩黃連黃芩黃地骨皮生地黃白芍藥各一錢右剉水煎服

犀角地黃湯

治衄血黑能消化瘀血不正及上焦瘀血面黃大便

錢犀角鏹牡丹皮各一錢右剉作一貼水煎
服門○回春加當歸黃芩黃連各一錢尤佳

麻黃升麻湯

治傷寒表未解熱鬱作衄俗呼謂紅汗
升麻赤芍藥黃芩石膏赤芍芩甘汗

草各一錢右剉作一貼薑
三片水煎熱服微汗門

麻黃桂枝湯

治傷寒不得汗作衄又治感寒衄吐血
麻黃白芍藥黃芪甘草炙各一錢桂枝

當歸各五粒右剉作一貼水煎服

麝香散

治衄血不止白礬枯白龍骨各三錢麝香一
分半右為細末每用少許先以冷水洗淨鼻

麝香散治衄血不止白礬枯白龍骨各三錢麝香一
分半右為細末每用少許先以冷水洗淨鼻

內然後吹入鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻尤妙得○
百草霜細末二錢水調服名曰黑神散又吹入鼻

中白末並吹入鼻中

中白末並吹入鼻中

治傷寒不得汗以致鼻衄纏見血急用此止
滑石丸之滑石末飯丸梧子大每十二微嚼破新水

止臘下立

止衄法

治鼻衄久不止
張或二張作十數摺

以大白紙一
撮冷水浸濕置頂中

以熱

熨斗

熨之至一二重紙乾則血立止

疎○治衄百

手中指

右鼻出血中指中節如左鼻出

血孔扎右

俱扎之

一方用色線扎左手中指如兩鼻出

血左右

水調塗

山根上大蒜一瓣立止仍以冷水調三錢服之

尤妙又方

大蒜一瓣細研作餅子如錢大左鼻出

血貼左腳心右

鼻出血貼右腳心如兩鼻皆出貼

藥冷水調塗

後頭最絕血路

上方觀

嘔血吐血

成椀有聲者為嘔成盆無聲者為吐

湯勑

有肺疽有傷胃內衄者出

鼻孔出是近從心

肺間流入胃中或如豆羹汁或

者是也得之於勞倦飲食過

之後毒熱滿悶吐後也

出肺疽者或飲半升酒

一外是也傷胃者因飲食大飽之後胃冷不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝蹴因傷裂胃口吐血鮮赤腹亦絞痛自汗其脉緊而數者為難治○傷胃吐血宜理中湯勸嘴加川芎乾葛肺疽吐血宜葛黃丸內効吐血湯加生地黃虛者葵芩補心湯人參救肺散○神景曰酒客咳者必致吐血此因極飲過度所至卽肺疽之屬也○暴吐紫黑血成塊者此因熱傷血瘀於中吐出爲好四物湯合黃連解毒湯勸門調之又曰吐血覺胷中氣塞桃仁承氣湯勸門調心丹○火載血上錯經妄行四物湯加山梔子煎○火載血止門○汗乃心液熱則變紅而逆出痰只治火則血止○汗乃心液熱則變紅而逆出多屬火寒失汗則熱毒入藏化為瘀血從口吐皆血證也輕者犀角地黃湯加黃芩梔子芩腹急滿節重者桃仁承氣湯抵當湯九方覘陳門冬湯。茅根藕汁煎宜大薊飲子蓮心散是齊白术散天門冬湯。茅根藕汁煎俱生宜四生丸蚌霜散黑神散五神散側柏散狗膾汁煎九散七生湯清熱解毒湯花藥石散

葛黃丸

一名葛連丸治飲酒多積熱以致吐衄血垂死者黃連四兩葛花二兩無則葛根代之右

九梧子大溫水下百丸

右韌

三黃湯

治吐血黃連黃芩各一錢加生地黃二錢右剉

作一貼水煎服

心氣獨不景○心氣不足吐衄血用瀉心湯

茯苓補心湯

治勞心吐血自芍藥二錢熟地黃一錢半當歸一錢三分川芎白茯苓人參前

胡半夏各七分右剉作一貼薑五片棗二枚煎服

葛紫蘿葉甘草各五分右剉作一貼薑五片棗二枚煎服

人參救肺散

一名救肺散治虛勞吐血人參黃芪白芍藥熟地黃當歸梢各一錢升麻柴胡

蒼朮陳皮蘿木甘草灸各五分右剉作一貼水煎服

大薊飲子

一名大薊散治肺痈大薊根桑白皮犀角升麻蒲黃炒各

杏仁一錢
苦蔓甘草各一錢
右剉作一貼水煎服

蓮心散治勞心吐血
蓮子心五分箇糊

米五十粒右爲末酒調服

是齊白朮散治飲食過度負重用力傷胃吐血
白朮二錢人參白朮芩黃芪各一錢山藥百

合各七分半甘草五分前胡柴胡各二分
半右剉作一貼薑三片棗二枝水煎服

天門冬湯治思慮傷心吐衄血天門冬遠志白芍藥
鷄膝麥門冬黃芪阿膠珠沒藥當歸生地

黃各七分入參甘草各三分
剉作一貼薑三片水煎服

四生丸治吐衄血陽乘於陰血熱妄行生荷葉生艾
葉生側柏葉生地黃葉各等分右攏搗取如

雞子大每九水一盞煎服或鹽
湯化服即一方無荷葉有生薄荷

蚌霜散治傷損吐血及酒食醉飽後低
頭擦積血妄行口鼻俱出諸藥

黑神散治傷損大吐血口鼻俱出深村鍋底百草霜
右爲末每二錢擣米飲調服

一錢方取三錢

冷
水
調
下

側柏散

治內損心肺吐血下血其出如涌水口鼻皆

錢兩

半荆芥穗燒灰入參各一兩右為末每三

藕汁散

治吐衄血不 止生藕汁生地黃汁各

七生湯

治葉生藕節生韭菜生芽根各一兩生薑五錢

濃磨京墨

俱擣取自然汁同服一劑和每服一小鐘

清熱解毒湯

治吐衄血升麻二錢生地黃一錢半黃芩子連翹甘草各五分

右剉苦蔓梔

作一貼薑三片水煎服

花蕊石散

治虛勞吐血五內崩損涌出升斗者花蕊石火煅研如粉右取童尿一鍾煎溫調三

錢或五

錢服之如男用酒一半女用醋一半與童尿繼以他藥調治

五神湯

治婦人吐血 生薦汁 刺薊汁 生地黃汁 白蜜
各一盞 右同煎三兩沸每取一

小麪粥

一錢調炒白

狗膽丸

治連日吐血不止 五靈脂為末 狗膽汁和丸
芡實大每一丸 薑酒化下不得漱口急進白

太粥不可

一方

治吐血不止 將本入血闌不臭可治若臭不可
服一錢或一錢二分以麥門冬煎湯調下血即止

薄厥證

景魁示之曰一人素無病忽吐血半斗 脉弦急陳
証也得於大怒氣逆陰陽

奔併用六君子湯

而得愈

咳血嗽血嘔血咯血

咳血者咳甚出血 本於肺龍腦雞

者痰嗽帶血本於脾

六君子湯加桑白皮片芩枳

五味子有火者加味逍遙散

六君子湯加桑白皮片芩枳

○唾血枳

者鮮血隨唾而出本於腎滋陰降火湯煩中而不不出甚咯則出或帶紅絲細如線此精血竭也
四物湯加竹瀝薑汁童便青黛或滋陰降火湯保命生地黃散方見聖餅子門○先見紅後見痰多是陰虛火動痰不下降四物湯加貝母天花粉以化痰山楂仁麥門冬牡丹皮以降火先痰嗽後見紅多是痰火積熱降痰火為急宜山楂地黃湯○痰嗽涎帶血出此胃口熱血蒸而出重者山楂者藍實頭○先吐痰後見血是積熱宜清肺湯先吐血後見痰是陰虛宜滋陰降火湯回○咳嗽唾喀血宜龍腦雞蘇丸河間生地黃散清火滋陰湯膏方見玄霜雪梨膏恩袍散
清喉湯清咯湯清唾湯坎离膏治咳嗽唾喀血薄荷一斤麥門冬四兩蒲黃阿膠各二兩甘草一兩半入參黃芪各一兩右為末別以柴胡木通各二兩剉用湯半椀浸二宿取汁用蜜二斤煉一二沸入生乾地黃末六兩攪勻入柴胡木通汁慢火熬成膏然後將前藥末同搗和為丸豌豆大熟水下二十丸

龍腦雞蘇丸

治咳嗽唾喀血薄荷一斤麥門冬四兩蒲黃阿膠各二兩甘草一兩半入參黃

芪各一兩右為末別以柴胡木通各二兩剉用湯半椀浸二宿取汁用蜜二斤煉一二沸入生乾地黃末六兩攪勻入柴胡木通汁慢火熬成膏然後將前藥末同搗和為丸豌豆大熟水下二十丸

玄霜膏

治咯血吐血虛勞嗽

神效烏梅汁

梨汁

柿霜

蕤芩末入兩用乳汁

浸晒九次

敷冬花紫菀末各

二兩共入砂鍋內熬成膏丸

如彈子大每一丸臨

臯下舍化門

加味逍遙散

治癆中見血赤芍藥桃仁貝母各一錢山梔黃芩

白芍各一錢半當

錢山梔黃芩炒

各八分苦棗七分青皮五分甘草三分右剉作一貼水煎服門

聖餅子

治咯血杏仁四升桂枝去皮尖研細同黃蠟炒入青黛一錢搘小餅子用時以乾柿一枚破

包煨研爛未飲調服

傳正濕紙

山梔地黃湯

治先吐痰後見血宜以降痰火為急山梔仁一錢天花粉牡丹皮麥

二分生地黃赤芍藥知母貝

母瓜蔓仁各一分右剉作一貼水煎服門

清肺湯

先痰後血是積熱也赤

蕤芩陳皮當歸生地

門冬各五分右剉作一貼水煎服門

黃芩桔子紫菀阿

膠珠

桑白皮各七分

甘草三分

右剉

一貼

桑二枚

烏梅一箇

水煎服

細

河間生地黃散

連地骨皮

天門冬白芍藥

黃芩黃芪

各七分

細

清火滋陰湯

治嘔吐

咳嗽咯血

天門冬麥門冬

山藥

生

生地黃熟地黃

丹皮赤芍藥

甘草各七分

細

清咳湯

治咳血當歸白芍藥

桃仁貝母炒各一錢

白

桔梗子炒黑各八分

青皮苦杏仁各一錢

白

各五分

甘草三分

右剉

一貼

水煎服

細

清咯湯

治咯血陳皮半夏

荳蔻知母貝母生地黃

各七分

細

桔梗子炒黑各七分

白

五分

桑白皮一錢

苦杏仁半錢

甘草五分

薄桂

細

清嚙湯

治嚙血知母貝母苦蘿黃

玄參遠志天門冬

麥門冬各一錢

乾薑

炒褐色熟

水

炒黑五分右剉作
一貼水煎服

玄霜雪梨膏

治咳嗽咯吐血除勞心動火勞嗽久不愈

雪梨六十箇去心皮取汁二十鍾
酸者不用生藕汁十鍾生地黃汁十鍾麥門冬煎
取汁五鍾生蘿蔔薑汁五鍾白茅根汁十鍾右汁合
和重瀝去渣火上煎煉入煉蜜一斤餘糖八兩拗
霜八兩薑汁半酒盞火上再熬如稀糊則成膏矣

每服三五匙日

恩袍散

治咯血唾血吐血真生蒲黃薄荷各一
兩右為末每三錢以桑白皮湯調下網

尿血

內經曰胞移熱於膀胱則癃尿血○仲景曰熱在
下焦則尿血○亢小便血出成淋作痛或雜尿而

出者從膀胱中來也如血出不痛乃心移熱於小
腸從精竅中出也○小便出血而不痛者為尿

血非淋也是血從精竅中來乃心移熱於小腸四
物湯加山梔滑石牛膝芩連或髮灰青琥珀散等

○小便出血是心伏熱在於小腸八正散方便加
麥門冬煎服之○尿血宜清腸湯清熱滋陰湯小

薊飲子 薑蜜湯或四物湯合五苓散 方煎服
傷尿血 純艾調血湯色傷尿血鹿角膠丸腎氣丸酒

鬱觀老入六味地黃丸虛勞婦人當歸散小兒立效散○有實熱當歸承氣湯下之防見

髮灰散 治尿血亂髮燒存性為末每二錢以醋二冷

治同髮灰以側柏葉斗調糯米粉和九梧子大白湯吞下五十丸傳

琥珀散 治尿血薄荷煎湯調二錢服之門

清腸湯 治尿血當歸生地黃梔子炒黃連赤芍藥黃柏瞿麥赤茯苓木通萹蓄知母麥門冬各七分

分甘草五分右剉作一貼鑿心分一團烏梅一箇水煎服翻鑿

清熱滋陰湯 治尿血及便血生地黃麥門冬梔子炒黑各一分知母黃柏並酒炒白朮

陳皮赤芍藥各五分知母黃柏並酒炒白朮
草各三分右剉作一貼水煎服鑿

小薊飲子 治下焦結熱尿血藕節二錢當歸一錢山梔仁八分小薊生地黃滑石通草蒲黃各

五分甘草三分右剉作一
貼竹葉七片同煎服

薑蜜湯治小便出血生薑七片蜜半
盃白茅根一握右水煎服

蒺藜調血湯治酒麴過度房勞後小便出血半赤蒺
藜一錢半赤芍藥川芎半夏麴各七分

前胡柴胡青皮枳殼善蔓桑白皮白茅根燈心甘
草各五分右剉作一貼薑五片蜜二匙水煎服

鹿角膠丸治房室勞傷小便出血鹿角膠一兩炒作
珠沒藥油髮灰各六錢右為末取白茅根

汁打糊和丸梧子大空心
益湯容下十九粒

當歸散治婦人尿血生地黃二錢半小薊葉二錢當
歸羚羊角屑赤芍藥各一錢半右剉作一貼

水煎服

立效散治小兒尿血蒲黃生地黃赤芍芩甘草各一
錢右剉水煎服

元散服之

妙齡門

便血

內經曰結陰之病陰氣內結不得外行血無所稟滲入釋

腸間故便血也其脈虛澀者是也○靈樞曰邪在下也平胃地榆湯結陰丹主之○仲景曰先停留之蓋邪犯五臟則三陰脉絡不和陰脉不和則聚血因滯則滲入

黃腸間而為便血門○仲景曰先便後血者近血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

散連殼○九加減四物湯○仲景曰先便後血者遠血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

散連殼○九加減四物湯○仲景曰先便後血者近血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

散連殼○九加減四物湯○仲景曰先便後血者近血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

散連殼○九加減四物湯○仲景曰先便後血者近血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

散連殼○九加減四物湯○仲景曰先便後血者近血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

散連殼○九加減四物湯○仲景曰先便後血者近血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

散連殼○九加減四物湯○仲景曰先便後血者近血也赤小豆當歸散○黃連散有實熱者當歸承氣湯

平胃地榆湯治結陰便血

蒼朮升麻附子炮各一錢葛根厚朴白朮陳皮赤茯苓

各五分乾薑當歸神曲炒白芍藥益智仁入參甘草炙各三分右剉作一貼薑三棗二水煎服

鑒實參甘

結陰丹

治結陰便血枳殼威靈仙黃芪陳皮椿根白芍何首烏荊芥穗各五錢右為末酒糊和丸

梧子大每服五七十九
陳米飲八醋吞下鑿

黃土湯

治先大便後下血竈中黃土三錢熟地黃白附子炮阿膠珠黃芩甘草炙各一錢右剉水

煎作一貼水

赤小豆當歸散

治先下血後大便赤小豆五兩浸令芽出曝乾當歸一兩右擣爲末漿水

調服二錢

日三服

清臘湯

治大便下血生地黃一錢當歸酒澆地榆各八分黃芩梔子炒黑黃柏炒各七分白芍藥

黃連側柏葉阿膠珠各六分川芎槐角炒各五分右剉

作一貼水煎服

榆砂湯

治結陰便血地榆四兩縮砂七枚研生甘草一錢半炙甘草一錢右剉水煎服

地榆散

治遠年下血地榆卷柏各五錢右剉砂餅煮十餘沸溫服

連殼丸

治內傷下血用此以解絡脈之結黃連枳殼各二兩剉以槐花四兩同炒棟去槐花右剉

末蒸餅和丸梧子大白湯下五、七、十九

門正傳枳殼湯同但剉五錢水煎服

加減四物湯治便血亦治腸風側柏葉生地黃當歸

川芎各一錢枳殼前茅槐花炒甘草灸

各五分右剉作一箇煎服

薑

槐花散治腸胃有濕脹滿下血槐花炒二錢蒼朮厚

陳皮當歸枳殼各一錢烏梅肉甘草炙各

五分右剉作一貼水煎服研

當歸承氣湯治實熱便血當歸二錢厚朴枳實大

黃芩芒硝各三分右剉水煎服

厚朴煎治便血及諸下血厚朴生薑各五兩同搗爛

炒黃白术神麴麥芽五味子各一兩同炒黃

右烏末水糊和丸梧子大米飲下百丸蓋脾胃本無血緣氣虛腸薄自榮衛滲入而下用厚朴厚腸

胃麥芽消酒食白术導水

血自不作多有奇效

酒蒸黃連丸治酒毒積熱便血肛門作熱黃連四兩剉酒淹一宿日乾右烏末粟米糊和丸

梧子大熟水下
三十五丸

腸澼證

詳見後陰

齒衄

入門日血從齒龈出謂之齒衄又曰牙床屬胃牙齒屬腎如陽明傳入少陰二經相併血出於牙縫

如吐者人多不覺其爲牙血以涼水漱口則血止以項又來者是外用綠袍散內服解毒湯傷寒合

犀角地黃湯或生地芩連湯防見

綠袍散

治齒縫出血不止黃柏薄荷芒硝青黛各等分右爲末入龍腦少許繆牙床即止門

荊槐散

治牙宣出血荊芥穗槐花炒各等分右爲末常擦牙或點服

齧金散

治齒齧凹血齧金白芷細辛各等分右爲末常擦牙仍以竹葉竹茹入鹽煎水含漱

小薊散

治牙宣出血百草霜小薊香附子蒲黃各五錢右爲末常揩牙齒上立止

又方

齒縫多出血以鹽湯常含漱口仍以益末金之青竹茹醋浸一宿含漱又竹葉濃煎入益舍

漱又濃煎茗湯含漱皆妙韓○治牙疼牙宣出血
香附子末薑汁浸一宿漱口後揩齒齶○滿口齒
湯先漱後喫瞬

舌衄

(入門日血從舌出謂之舌衄宜蛟蛤散○又方蒲
黃炒爲末摻之即止又槐花炒爲末摻之又赤小
豆一升搗碎和水取汁服之韓○又

蚊蛤散

(豆一升搗碎和水取汁服之韓○又方蒲
方髮灰二錢醋二合調服且摻之瞬
牡蠣粉右等分爲末摻患處瞬

血汗

(內經曰少陰所至爲衄蟻蛭并血汗宜定命散○河間
日膽受熱血妄行爲衄蟻蛭并血汗宜定命散○三
汗因日無病者汗出汚衣甚如胚染名日血汗亦日

紅卉由大喜傷心喜則氣散血隨氣行也宜黃芪

(建中湯飭覩薰服炒香散拭門以金銀器入小
麥門冬煎湯調下又產婦血汗宜葎草汁方

定命散

(治衄蟻蛭血汗朱砂寒水石麝香右
等分爲末每半錢新水調下瞬

葎草汁方

(治產婦因大喜汗出汚衣赤色葎草擣取
汁二升入醋二合和之空腹飲一盞或濃

煮服亦可。○謂皮肉主血汗燒灰米飲調服。

九竅出血

入卒大驚則九竅血皆溢出謂之九竅出血○傷寒少陰證醫者不識強發其汗則伏

熱逼血從九竅而出

○傷寒少陰證醫者不識強發其汗則伏

九竅出血宜側柏散上方

見又百草霜油髮及龍骨

屠未或吹入或繆之呼

○卒驚悸九竅血皆溢出新

屠猪羊血熱飲二升即止

又入有九竅四肢指歧

間出血乃暴驚所爲取新生犧子臍中屎燒灰和

水服日三四次又小薊搗取汁一盞酒半盞調和

頓服乾者爲末冷水調服

○又法井華水卒嘔

其面勿令病人先知之

○指縫瘻瘡成瘡有竅

傷損失血

詳見諸傷

失血眩暈

海藏曰一切去血過多則必致眩暈悶絕亢

後去血多皆有此證宜大劑芎歸湯飭人煎服投之○吐衄大甚不止當防其血晕茅根燒烟將醋灑之令鼻嗅氣以遏其勢或薦然少冷木噀其面使驚則止○失血多眩暉不省宜生地芩連湯服之又全生活血湯飭門亦佳○血暉者皆因去血過多虛而成暉脉微澁也急用芎歸湯效之地黃三五斤取汁連飲不暇取汁則生吃呷汁以繼用加味四物湯回○吐衄血過多昏迷不省生地黃三五斤取汁連飲不暇取汁則生吃呷汁以

繼用加味四物湯
地黃三五斤取汁連飲不吐
津塞鼻神效又好墨濃磨
汁飲之仍點入鼻中
○

生地芩連湯治婦人因漏大脫血或男子去血過
揚手擲足錯語失神鼻乾氣龕生地黃川芎當歸
各一錢半赤芍藥山梔子黃芩黃連各二分防風
二錢右剉水煎徐呷下
此危證也以此散之附

加味四物湯治血虛眩暉卒倒不可艾灸驚哭耳動
地黃熟地黃黃芪入參白朮陳皮白芍芍藥生
穂甘草各七分右剉棗二枚烏梅一箇煎服

黑藥止血

綱目曰燒灰諸黑藥皆能止血經曰北

方黑即止

者由腎水能制心火故也○

見黑

散十灰丸如百草霜松烟墨油

死拖子乾柿荊芥蓮房蟬皮

新絳灰棕櫚

五灰散

治一切失血及血崩存性等分加黃絳亂髮百草

黑蒲

牛角鰓之類皆可燒灰單服

黃炒松烟墨血竭共爲細末每三錢以生薑汁生

十灰散

治嘔吐咯嗽較血及虛勞大黃施子棕櫚大薑小薑柏

黃蓄汁調服之或蜜九米飲下五十丸亦可翻

生薑汁生薑根大黃施子棕櫚大薑小薑柏

十灰丸

治血崩及一切失血蓬蓮黃絳馬尾灰薦節灰

皮死新和九梧

艾葉灰蒲黃子大米飯下百九梧

禁忌

內經曰酸走血

少血病無多食酸又曰久視傷血

刺入多食酸

血過多皆爲禁忌

血

治血藥法

丹用

漢曰凡用血藥不可單行止又不可純
寒涼藥必加辛溫升藥如用涼藥用酒煮

通治血病藥餌

一切失血諸病通用

四物湯補榮湯保

命生地黃散清熱滋陰湯防風丸攻離膏

固榮散血餘散
側柏湯童子尿

四物湯

通治血病熟地黃白芍藥川芎當歸各一錢二分半右剉作一貼水煎服

藥川芎當歸各一錢二分半右剉作一貼水煎服

藥川芎當歸各一錢二分半右剉作一貼水煎服

川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸

川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸

川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸

夏加黃芩秋加天門冬

加桂枝梢○當歸和血

加桂枝梢○當歸和血

加桂枝梢○當歸和血

藥其四物之謂乎夫

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

藥其四物之謂乎夫

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

藥其四物之謂乎夫

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

行血通肝○劉宗厚曰欲求血

補榮湯

通治諸失血當歸白芍藥生地黃熟地黃赤

各五分右剉作一貼

水煎服

各五分右剉作一貼

水煎服

水煎服

水煎服

保命生地黃散

治鬱熱，衄吐，便尿諸失血，無寒證者。生地黃熟地黃拘杞子地骨皮天門冬。

冬白芍藥黃芪

柴胡各一錢黃芩

黃連甘草各五分

右剉作一貼水煎服

脉微身涼加桂皮丹

次禹膏

各四兩生地黃熟地黃

天門冬麥門冬各二錢

去陰虛火動致衄吐咳嗽咯血黃柏知母

杏仁七錢胡桃仁去皮淨四兩白蜜四兩

右先入童便三椀側柏葉一把煎至四

椀去渣又將天麥門冬生熟地黃入汁內添水二

錢去渣再煎去滓其滓再搗爛如泥另用

水一二椀蒸

杏桃仁搗爛再瀝去渣同蜜入

前汁內熬成膏磁罐收貯封口沉冰中一日去火

入

入

入

毒每服三五匙柏葉湯調

空心服終始忌銅鐵器

春

固榮散

治吐衄便尿一切失血

真蒲黃地榆各一兩

甘草二錢半右爲末每服四錢溫

酒調服

血餘散

治衄吐便尿一切失血

薰治內崩亂髮以皂角水淨洗晒乾燒灰爲末每二錢白茅根煎

湯調下或醋湯調下毋

○作丸名鬟灰丸塊

側柏湯治吐衄血崩血痢一切失血之疾採葉晒乾煎湯代茶吃止血滋陰一名柏湯一名柏相

茶皆同門

童子尿

諸虛吐衄咯血藥中每入童便一合其效甚速丸單用重湯頓服無不效應蓋溲尿降火滋陰又能消瘀血正吐衄諸血先賢有言允信矣用童便一鍾入薑汁二三點攬血服寒涼藥十無一生服溲尿者百無一死斯言信矣用童便一鍾入薑汁二三點攬

單方九種二十

百草霜深村鍋底者佳刮取細末用之凡血見黑則止此藥主之能治諸失血或吹入竅中或寫

散冷水調服或

井華水治九竅出血及衄血不止以水作丸服皆佳

生地黃治吐衄便尿一切失血取汁飲半升日三或和薄荷汁或和空心一升皆效

即

取汁飲半升日

車前草葉及根汁止衄吐尿血取

蒲黃止一切血破血即生用補血即炒用冷水調二三錢服

芎藭能行血治吐衄便尿一切失血煎服未服並佳

當歸治一切血能和血行血養血芎藭

茜根治吐衄便尿崩中一切血疾

白茅根能止血治吐衄便尿一切水煮服之茅花同功

艾葉治吐衄便尿一切失血

地榆止衄吐血偏主結陰

大小薊俱治一切血疾能破血止血生癆取汁飲一小盞或和蜜少許飲

欝金

止吐衄血破惡血爲末以童便薑汁好酒相和調服又治瘀血取末和韭汁童便服之其血自消

研可

白芨

治衄吐噦唾咯血冷水調末五錢服神妙米飲調亦可。白芨至血竅則填補故血止。昔有一死巴捺掠遍身吐衄並流血常服白芨末輒止。

槐花

涼血能止咯唾血及下血炒爲末熱酒取末二錢調服又治齒衄舌衄爲末摻之用炒煎服亦可

側柏葉

治吐衄便尿一切失血之證止血滋陰爲末米飲調服或煎服皆可取汁服亦佳

松烟墨

能止一切失血以生地黃汁濃磨服之或井水磨服之

生藕汁

消瘀血能止一切出血取汁飲之或合地黃汁熟酒童便服並得幹

韭汁

止吐衄咯唾血善消胃膈間瘀血凝滯取汁冷飲三四盞必會中煩躁不寧後自愈研取汁

亂髮灰

止一切失血吐衄便尔九竅出血皆治之取

末醋湯或井華水調二錢服作九服亦可

諸血

補人身血不足而無血色者並生飲之六畜及獐鹿之血皆可

○虛勞吐血飲黑狗血神效

蠣

○蠣人之血皆可

鍼灸法

○治衄吐血咳嗽痰血取汁八盞少許服之

蘿蔔汁

○治衄吐血好酒飲之即止蓋氣降則血止

上齶

○不正以三稜針於氣衝出立愈

○大陵神門大谿陽止衄血

關脉

○中上腕合谷內庭三里照海三里

○大陵元門神門目頭○吐血取

風府

○大傾會上星、頸○白大陵神門大谿陽止衄血

○大陵中上腕中腕氣海關元三里照海三里

○大陵元門神門目頭○吐血取

○虛勞吐血灸中腕三百壯又吐血唾血灸

○壯俞傷故也宜灸

○壯俞隨年壯又口鼻出血不止名腦効灸上星五

○下血不止量臍心與脊骨平於脊骨上

即灸

○七壯○生劑

夢

魂魄爲夢

允夢而爲夢

皆緣

魂魄役物又曰形接而爲事神遇

吉之真人其寢不夢寢不夢者

則魂魄飛揚紛紜

○心實則夢可憂可驚可怪之事虛

多夢宜別離散益氣安神湯門

○邪客使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於

心氣虛者其人多畏合目欲眠

遠行而精神

離散爲癲魂魄妄行陰氣衰者

○狂

翳仲

別離散

治心風爲病男

夢見女

夢見男宜此去邪

桂乾薑茜根各三錢

茴芽桑寄生各五錢

綑辛

白湯調下熱者

去雄附薑桂附子肉

菖蒲各二錢

右寫末每二錢

知母黃柏各

益氣安神湯

治七情六淫相感而心虛夜多夢寐

恍惚驚悸當歸熟地黃各一錢生

甘草黃連各四分牛膽

地黃麥門冬酸棗仁炒遠志人參黃芪蜜炒

南星竹葉各八分

分右剉作一貼

薑三片棗二
枝水煎服

淫邪發夢

黃帝問曰淫邪泮行柰何歧伯對曰正邪從外襲內而未有定舍反淫于藏不得定處與

築衛俱行與魂魄飛揚使人卧不安而喜夢是以陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽氣盛則夢大火而燔灼陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墮甚飢則夢取甚飽則夢與肝氣盛則夢哭泣心氣盛則夢善美忍畏脾氣盛則夢歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬○又曰厥氣客于心則夢見丘山烟火客于肺則夢飛揚見金鐵之奇物則夢見丘山火客于肺則夢見丘陵大澤則夢遊行客于腎則夢壞屋風雨客于腎則夢聚邑衢衢客于膀胱則夢闔訟自剗客于小腸則夢接內客于項則夢斬首客于股肱則夢行走而不能前及居深地客于大腸則夢居水客于膀胱則夢食客于膽則夢中客于大腸則夢田野客于小腸則夢于腑則夢入常夢與鬼神交驚怕異常及見神瀆便櫛司舟楫橋梁如此十五年竟無姪娘諸治

無效戴人曰陽火盛于上陰水盛于下見鬼神者

陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用也診之
兩手寸脉皆沉而伏知其膕中有痰實也疏三
涌三泄三汗不旬日而無夢一月而有娠和

五藏虛實爲夢肝氣虛則夢見菌香生草實則夢伏樹

下不敢起心氣虛則夢教火陽物實則
夢燔灼脾氣虛則夢飲食不足實則夢等垣蓋屋
肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉實則夢冤兵

戰腎氣虛則夢見舟船溺人

實則夢伏水中若有畏恐

陽氣之出入爲寤寐張而寤夜行於陰則目瞑而寐○

鄭康成曰口鼻之呼吸爲魂耳目之聰明爲魄以
耳目與口鼻對言則口鼻爲陽耳目爲陰以耳目

口鼻與藏府對言則耳目口鼻爲陽藏府爲陰故
陽氣行陽分二十五度於身口鼻爲陽藏府爲陰故
皆受陽氣所以能知覺視聽動作用而寤矣陽氣行
運動所以不能知覺而寐矣

聰明者豈非陽氣爲之乎

門入

昏沉多睡

靈樞曰足太陽有通項入于腦者正屬目

陽有通項入于腦乃別陰蹻陽

蹻陰陽相交

陽入陰陰出陽交于目銳皆當作目

陽氣盛則瞑目陰氣盛則瞑目

衛氣不得入於目

陰常留於陽

故留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛

不得入於陰故留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛

於陽故留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入

於陽閉目者

閉目者陰主闔也傷寒之邪傳入陰則多眠昏

證已解而多眠者不必藥也陽明證熱伏於裏而

寐多蓋眠者不必藥也陽明證熱伏於裏而

證已解而多眠者不必藥也陽明證熱伏於裏而

病但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

病但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

病但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

病但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

寒方少陰之證脉微細但欲寐則宜行小柴胡湯

桂枝多

桂枝多

桂枝多

桂枝多

虛煩不睡

靈樞曰黃帝問曰人之目不瞑不卧者何氣使

伯高對曰衛氣晝日行於陽夜行於陰

使然

○勞心膽冷夜卧不睡定志元祐加酸棗仁炒柏子仁炒朱砂乳香爲衣棗湯下五十丸加味溫

膽湯亦主之○醫鑑○癲狂不睡傷寒不睡

○醫鑑○

酸棗仁湯

治虛煩不睡及傷寒吐下後虛煩不睡石膏二錢半酸棗仁炒入參各一錢半知母

赤茯苓甘草各一錢桂心五分

右剉作一貼薑三片水煎服門

溫膽湯

治心虛怯觸事易驚夢寐不祥虛煩不得睡半夏陳皮白茯苓枳實各二錢青竹茹一分右剉作一貼薑五片棗二枚水煎服

鐵甘草三分

○驚悸怔忡失志不寐皆是痰涎沃心宜理痰

氣此藥主之

加味溫膽湯

治法同上半夏三錢半陳皮二錢二分竹茹枳實各一錢半酸棗仁炒遠志五分

味子人參熟地黃白茯苓甘草各一錢

二貼薑五片棗二枚水煎服回一錢右剉分作

味子遠志人參熟地黃也

○五味子虛者尤宜服之

心肝氣血虛者尤宜服之

老少之睡不同

黃帝問曰

老人之不夜瞑

少壯之不晝

何氣使然

歧伯答曰

壯者之氣血

盛其肌肉

滑氣道通榮衛之行不失其常故晝精

而夜瞑者之氣血衰其肌肉枯氣道澁五藏之

氣相搏其榮氣衰少而衛氣

內代故晝不精而夜不眠

靈

睡辨陰陽虛實

傷寒及雜病多睡者陽虛陰盛也無睡

喜暗者屬陰元氣虛也睡向外者屬陽元氣實也

元氣虛也睡向外者屬陽元氣實也

卧不安

人卧則血歸於肝今血不靜卧不歸肝故驚悸

安者何也岐伯對曰藏有所傷及精有所倚人不

能知其病則卧不安經十四友元主之亦治心肝

安者何也岐伯對曰藏有所傷及精有所倚人不

能知其病則卧不安經十四友元主之亦治心肝

虛者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不

能偃卧肺又曰足三陽者下行陽明者胃脉也

虛者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不

能偃卧肺又曰足三陽者下行陽明者胃脉也

虛者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不

能偃卧肺又曰足三陽者下行陽明者胃脉也

經曰胃不和則卧不安夫不得

卧而喘者是水氣之客也

內經

身重嗜卧

黃帝曰人之多卧者何氣使然

岐伯曰此人腸胃大皮膚濕而分肉不解焉

腸胃大則衛氣者晝

氣留久皮膚濕

則分肉不解其行遲

夫衛氣盡則寤故

行於陽夜行於陰故

陽氣盡則寐陰氣盡則寤故

腸胃大則衛氣行留久皮膚濕

分肉不解則行遲

留於陰也久其氣不精則目瞑故多卧矣

○肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩冤

釋曰肝虛則脾寡

于畏而體重腎虛則脾勝之而體重又曰脾病者

惡人欲獨處

內經曰足太陰之脈病身體皆重納

○急惰嗜

○臍而處又曰陽明厥則

惡人釋曰惋謂熱內鬱而煩也

寢睡法

臍而處又曰陽明厥則

惡人釋曰惋謂熱內鬱而煩也

○不得晝眠令人失氣又曰暮臍常習閉口

口開即失氣且邪惡從口入成病又曰屈膝側卧

益氣力勝正偃仰按孔子不尸卧故曰睡不厭覬
覺不厭舒允人尸睡則有鬼疰魔邪又曰人卧一
夜常作五度反覆逐更轉得○夜不安寢衾厚熱
壅故也當急去之仍拭汗孔或薄而寒即加之睡
自穩也飢而睡不安則宜少食飽而睡不安則宜
啜茶少行坐鍊○睡留燈燭令人神不安活人○
允入常卧不宜仰卧以手覆心上則必魘不得竊
若暗中着魘不得以火照之亦不得近前急呼但
捻下心上手然後慢慢喚覺以乞

辟惡夢

夜夢惡不湏說且以水面東持刀噀之呪曰惡
夢着草木好夢成珠玉即無咎矣又夢之美惡

並勿說爲吉○麝香久服不夢寤魘寐又將真
麝一劑安枕合中枕之除邪辟惡夢韁○蘇合香
令人無夢魘或服或帶之韁○虎頭爲枕枕之辟
惡夢除魘寐韁○犀角除魘寐或服或帶之韁○

羚羊角安心氣不令
魘寐除邪氣驚夢韁

用藥法

虛而多夢紛紛人參龍骨加而用之韁○膽實多
不眠寒也酸棗仁炒末竹葉煎湯調服膽實多

睡熟也。酸棗仁生爲末，以薑汁炒臘茶煎湯調服。

○一人因恐得病，如入蔭，捕睡卧不安，飲食不

知味。以人參白朮當歸身爲君，陳皮爲佐，加益炒黃柏、灸玄參各少許，爲使，煎服，月餘而安。此因恐

傷腎故以益炒黃柏、灸玄參引參歸等藥入腎也。

單方

九種十

鹿頭肉

治煩悶多夢及夜夢見鬼物者，飲食其肉，幹

安息香

治婦人夜夢鬼交，以雄黃合爲丸，燒熏丹穴，永斷。

苦竹葉

治虛煩不能睡。

小麥

治煩熱少睡。

酸棗仁

睡多則生，用不得熟，用之。

榆白皮

治不睡。嵇公云：榆令人瞑是也。初生葉，仁以作糜羹服之，令人多睡。

林檎治不睡多食則人好睡

木槿煮作飲服之令人得睡

巖食之令人多睡

蓴嗜睡人常食令人多睡

沙參治多睡常欲眠者服或作蘆食之

通草療脾疸常欲眠者煮之

烏梅治不眠飲令得睡

茶令人少睡除好睡溫服

苦菜及苦苣皆令人不睡久食之少睡

伏翼取血滴目中令不睡

馬頭骨主喜眠作枕枕

之不睡鞞

草決明子久服令人

不睡鞞

鍼灸法

膽寒得睡取竈陰○沉因睡多無名指第
二節尖屈指取之灸一壯瞤○驚悸不得眠取

陰交不得卧

聲音

聲音出於腎

心爲聲音之主肺爲聲音之門腎爲聲音
之根風寒暑濕氣血痰熱邪氣有干於心

肺者病在上脘隨證解之邪氣散則天籟鳴矣若

夫腎虛爲病不能納諸氣以歸元故氣逆而上唆
嗽痰壅或喘或脹胷腹百骸俱爲之牽掣其嗽愈

重其氣愈乏其聲愈乾矣搘○一小兒吐瀉錢氏

與瓜蔓湯方覩得愈其兒又不大小便他醫以藥
利之變身冷不飲食錢氏用益黃散使君子丸果

身溫而能飲食其兒又不語錢氏曰此因涼藥利

小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛用六味地黃

元方勸觀

虛勞

一月而痊

鐵○腎虛

聲不出

宜服人參

川芎當歸熟地黃

巴戟天

益智草

半夏

芍藥白芍

大麥子五味子杜仲

人參平補湯

治腎虛

聲不出

人參

川芎

當歸

熟地黃

巴戟天

益智草

半夏

芍藥白芍

大麥子五味子杜仲

戟橘

紅草

大麥子

各六分

牛膝白朮

破故紙

胡蘆巴

益智草

甘草

各三分

石菖蒲

二分

右剉

作一貼

薑

戟橘

紅草

大麥子

各三片

棗二枝

水煎

於五更初

腎氣開時

不許

咳

言語

默默服之

搘

回春名滋

腎湯

與此同

聽聲音辨病證

內經曰

視喘息

聽音聲

而知所苦

又曰

靈樞曰

病入語

聲寂寂然

善驚

呼者骨節間病

語聲喑喑然

不徹者心膈間病語

是中氣之濕也○靈樞曰

病入語

聲如從室中言

呼者骨節間病

語聲喑喑然

不徹者心膈間病語

聲啾啾然細而長者頭中病○

又曰

聞而知之者

聞其五音以別其病

謂之聖○

難經曰

聞而知之者

聞其五音以別其病

謂

也○假

如肝病則

聲悲

肺病則

聲促

心病則

聲雄

脾病則

聲緩○胃病則

聲速○膽病則

聲沉○大腸病則

聲長○小腸病則

聲微○膀胱病則

聲濁○木病則

聲微○春

○內經曰

聲合五音入門

曰金聲響

土聲濁

水聲微

火聲躁

土音如居深龕中

言又

曰濕勝則音聲如從龕中出

○土音如居深龕中

言又

長水聲清火聲燥○土音如居深龕中

言又

聲如從龕中出

○土音如居深龕中

言又

卒然無音

黃帝問曰人之卒然憂恚而塞何氣出行使音不彰願聞

其方少師答曰無音者何道之

答日

咽候者水穀之道也喉嚨者氣之所以上唇者聲音之竊也舌者聲會厭者聲音之戶也口唇者聲音之竊也

音之機也懸雍垂者聲音之關也頑頬者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者也故入之鼻

洞涕出不收者頑頬不開分氣失也是故厭小而薄則發氣疾其開闔利其出氣易其厭大而厚則

開闔難其氣出遲故重言也入卒然無音者寒氣容于厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故

無音○醉卧當風使人失音○卒失音宜荊蘇湯人參荊芥散射干湯○人患卒症取杏仁七錢半蒸桂心末二錢半和搗如泥取李核大綿裹

舍燕皮濃煎頻服本方苦竹葉濃煎服又搗

穗各一兩搗取汁○風冷卒失音紫蘇葉荊芥各一錢右剉作

荆蘇湯

治感風寒

木通橘紅

當歸

桂枝

芍藥

甘草

大棗

桔梗

白芷

荊芥

煎服

水

人參荆芥散

治感冒風寒言語不出咽乾鼻涕人參
荆芥穗陳皮苦棗半夏細辛杏仁通草

一貼薑五片水煎服

射干湯

治天行暴寒熱伏於內咳嗽不得息喉痙失聲或動嗽無聲喉中如梗半夏二錢杏仁陳

甘草各五分右剉

一錢射干當歸獨活一麻黃紫菀

因雜病失音

中風人飲食坐卧如常但失音不語俗呼

一錢或調子清音湯

可方醫觀下○因咳嗽失音

人參清肺散杏仁煎蛤蚧

丸○痰塞失音宜玉粉菖蒲

通歌失音宜響聲破苗丸

○因喉痛生瘡聲久瘡宜驅

通隱散咽○痘瘡後失音宜

○因喉痛生瘡聲久瘡宜驅

人參清肺散

治痰嗽咽乾聲不出人參陳皮貝母炒

枳殼杏仁黃連各一錢欵冬花七分麥門冬地骨皮甘草各五分五味子二十箇右剉分作二貼每服

水煎服

杏仁煎

治咳嗽失音聲不出杏仁泥白蜜砂糖屑生薑汁各一盞桑白皮木通貝母沙各一兩半

紫菀五升煎至半升去滓

入杏蜜糖薑再煎成稀膏每

取一匙含化嚥下或加知母款冬花尤效

擗

蛤蚧丸

治肺間積血作痛失音及久嗽失音蛤蚧一對醋炙阿膠珠生地黃麥門冬細辛

甘草各五錢右爲末蜜九如棗大每一丸含化

玉粉丸

治冬月寒痰結塞語聲不出半夏洗薑製五錢草烏熟炒桂心各二分半右爲末薑汁浸

蒸餅和九熖實大每一丸至夜含化年久者亦效

芎辛散

治熱癰瘍盛失音聲不出是燥熱所致用此即效川芎細辛防風苦蘿白芷羌活桑白皮

各一錢甘草五分右剉作一貼
入薑二片薄荷三葉水煎服

響聲破笛丸

治因謳歌失音薄荷四兩連翹苦黃甘草各二兩半百藥煎二兩川芎一兩半

清和丸彈子炒大黃酒炒各一丸臨丹鴉化嚙下

右爲末雞子

厥氣爲瘡

厥氣走喉而不能言手足清大便不利取足少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭兩瀕其血

脉濁氣乃辟會

厥乃發癰○一男子久病瘦嗽忽感風寒食酒肉

遂厥氣走喉病

灸豐隆二穴各三壯照海二

皮苦薑鴻臚氣

立出仍用黃芩降火爲君杏仁陳

佐服之良愈

瘡瘍有二

瘡者邪入於陰搏則爲瘡然有二證一曰舌瘡又

乃中風舌不轉運之類是也二日喉瘡

不能轉運言語而喉失

嘶音聲則如故也喉瘡但喉中聲
嘶而舌本則能轉運言語也

聲嘶

○五藏久咳則聲嘶聲嘶者喉破也非咽喉門病也得
用力顫掉聲嘶乃氣虛衛冷甚也門○咳嗽聲嘶者血虛受熱也用青黛蛤粉蜜調作丸舍

柴胡升麻湯

治傷寒咳嗽聲嘶或咽痛柴胡黃芩半夏升麻乾葛枳實苦棗知母貝母玄參

桑白皮甘草各七分右剝一貼薑三片水煎服

鑿

潤肺

丸治久嗽聲嘶語音不出訶子皮五倍子五味子片芩甘草各等分右爲末蜜丸櫻桃大每

一丸噙化

一丸噙化

蜜脂煎

治暴失音聲嘶常服潤肺豬脂二斤熬去渣入蜜一斤再煉少頃瀘淨入磁器內俟成膏

膏不拘時挑服一匙

腎怯與失音相似病吐瀉及大病後雖有聲而不能言此非失音乃腎怯不能上

接於陽故也當補腎地黃元芍觀
主之失音乃感風寒卒病耳驗仲

息有音

不得卧而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脉也

陽明逆不得從其道故不得卧也夫起居如故而

息有音者此肺之絡脉逆也絡脉之病入也微故

息有音也經起居如故而

不治證

內傷虛損咽瘡失音者無治法門○病人五藏已奪神明不守聲嘶者死漏○病人陰陽俱絕

失音不能言者三日半死讐

傷寒狐惑聲瘡

小兒疳痢聲瘡

並見本門

通治聲音藥

尋常聲音不清宜加味固本丸加味上清丸嘹喨丸發聲散訶子散訶子清音湯出

聲音

方

加味固本丸

治男女聲音不清或失音生乾地黃熟地黃當歸甘柏蜜灸白茯苓各一兩天

門冬鹽炒麥門冬益炒知母訶子附膠珠各五錢
人參三錢烏梅十五箇取肉入乳牛乳梨汁各一

擗湯右爲末和勻蜜丸黃豆大以訶子湯或蘿
蓄湯下八十丸或百丸門○醫鑑名鐵笛丸

加味上清丸清聲潤肺止咳嗽爽氣寧神白砂糖八

兩薄荷葉四兩柿霜四兩玄明粉鵬砂

寒水石烏梅肉各五錢片腦五分右爲末甘草
水蒸成膏和丸大每丸化茶湯下春

燎嘒丸治久失音聲症香椿芽汁四兩如無用淡香
火燒茅爲末四兩代之人乳白蜜梨汁各四兩

拘時服白湯送下春

發聲散治語聲不出黃瓜蔓一箇剉焙苦蓮七錢半
發聲散治語聲不出黃瓜蔓一箇剉焙苦蓮七錢半
發聲散治語聲不出黃瓜蔓一箇剉焙苦蓮七錢半

發聲散治語聲不出黃瓜蔓一箇剉焙苦蓮七錢半
發聲散治語聲不出黃瓜蔓一箇剉焙苦蓮七錢半

或薑湯調下藥

訶子散治咳嗽聲音不出黃瓜蔓一箇剉焙苦蓮七錢半
訶子散治咳嗽聲音不出黃瓜蔓一箇剉焙苦蓮七錢半

黃五錢半生半炒甘草二錢半生半炒木通

通

入生地黃汁一小盞臨臥去滓下心

三錢右剉分二貼每貼水煎去滓

小盞臨臥去滓下心

水煎去滓下心

津

清音散

治聲音不清與上訶子散同但苦蔓生用木通半生半炒鑿

訶子清音湯

治諸風失音不語訶子四十箇去核半生半炮苦蔓一兩半生半炮甘草二錢

錢半生

辛炎右爲龕末每服七錢水煎

童尿一盞調服不過三服愈

去滓入蜜調服不遇三服愈

鑿

一方

治一人患乾咳聲瘻用白朮二錢人參橘紅各一錢半夏白朮苓桑白皮天門冬

錢

各三分甘草青皮各三分五味子二十粒知母地

骨皮爪

甘草青皮各五分作一貼入薑三片煎服夏加黃芩五分仍與四物湯入童便竹瀝薑汁

并炒黃柏二藥晝夜相間服兩月聲出而愈

單方

九種

石菖蒲

出音聲煎服或未服並佳

燕覆子

續王藏斷絕氣使語

聲足氣常食之

通草

出音聲可煎服之佳

杏仁

可和酪作湯益潤聲氣○欲好聲杏仁一升去皮尖熬酥一兩蜜少許加九梧子大米飲下十

五十九或二十九鞞

桂心

治感寒失音取細末舍之薰汁○咽喉痒痛失音不語桂心杏仁各一兩爲末蜜丸櫻桃大綿

薰
計
鞞

苦竹葉

治卒失聲聲噎不出濃煎飲之鞞

橘皮

治卒失聲聲不出橘皮煨煮取汁頻服鞞

梨

主中風失音不語生搗取汁每服一合日再鞞

乾柿

潤聲喉可水漬常服之鞞

胡麻油

主瘡痘能潤肺拭也可和竹瀝薑汁童便等服之鞞

童子尿

主久嗽失音由其能降火故也又云人尿益聲可溫服之鞞

雞子

多食令人有聲以水煮兩沸合水服之

鍼灸法

卒然無音取天突靈樞○厥氣走喉不能言取照海靈樞○喉痺卒瘖取豐隆靈樞○暴瘖氣喘取

突廉泉

○暴失音取神門涌泉綱目○暴瘖

谷陽

交通谷天鼎期門支溝涌泉經乙

言語

肺主聲為言

難經曰肺主聲入肝為呼入心為言入脾

心爲言妄語

言語譖妄也

自言曰言答人曰語得○內經註曰譖亂語

人所未見事或

獨語或睡中呢喃或呻吟不已甚

則狂言罵詈俱謂之譖語皆因胃熱乘心故也

門參○問曰邪入陽明為譖言妄語此果陽明乎答

傷寒始自皮毛入是從肺中來肺主聲入于心

則爲言也又曰今口自言言所日用常見常行之

事即譖語也大開目與人語語所未嘗見之事即

爲狂言也。譖語者口出無倫邪氣勝也。春回
衣被不歛言語善惡不避親疎者此神明之亂也。

乃狂疾也。納言語。悲泣呻吟

言語譖妄此乃邪祟也。罔

瘡不得語。內經曰邪入於陰擇則爲瘡有舌瘡喉瘡之

瘡不得語異聲貌○不得語非止一端有舌強不語神

治風安神養氣血各從活法治之醫○有氣血虛

摸者有腎虛及老人忽言不出者宜於

十全大補湯方見

桂加菖蒲遠志門

痰塞亡血亦爲瘡足少陰之脉挾舌本是太陰之脉連

脈虛則痰涎乘虛閉塞其脉道而舌不能轉運言

語也若此三脉亡血則舌無血榮養而瘡內經曰

刺足少陰脉重虛出血爲舌難以言又云刺舌下

刺中脉太過血出不止爲瘡治當補血又此三脉風

熱中之則舌脉弛縱而瘡風寒客之則舌脉縮急

而瘡隨證治之。潮○瘡塞不語宜導瘡湯勃門加人參白术陳皮甘草菖蒲遠志門

菖蒲竹茹人參或芩連亡血不語宜四物湯

一方

一男子因傷寒發熱忽神昏而瘡作體虛有瘍治之以人參三錢黃芪白朮當歸陳皮各一錢

煎湯入竹瀝薑汁飲之十三日始能言一字半月舌轉運能言語熟除而瘡癒○一男子嗜酒多

吐血後舌不能語但渴飲水脉畧數與當歸芍藥川芎地黃各一錢白朮人參各二錢陳皮一錢半

甘草五分水煎入竹瀝童便薑汁服之至二十餘貼能言也○亡血癆

脉法

才口脉微而澁微則衛氣不足澁則榮氣無餘衛不足其息短其形燥血不足其形遂榮衛俱虛言

語謬誤○心脉濶甚爲瘡又曰手少陰之別脉名曰通里

別而上行入於心中繫舌本虛則不能言

鄭聲

鄭者重也言語重復不已聲音模糊有如鄭衛不出于春○鄭聲者聲戰無力不相接續造字

也正之音也詳見寒門○鄭聲者語不接續精氣脫

言微

內經曰言而微終日乃復言者奪氣也○靈樞曰中爲氣之海不足則少氣力不多言○易老曰

真氣虛弱脉微懶語宣入參

黃芪湯及益氣丸方並見

門

呼內

經曰肝在聲爲呼○爪甲青惡罵不休爲膽絕夫罵者怒之聲狂病不在此例汗金○手足甲青呼

罵多筋絕九

口定難述

調

笑

靈樞曰心氣虛則悲實則笑不休○內經曰心藏神有餘則笑不休神不足則悲○難經曰心外證而赤口乾善笑○皇甫士安曰心實則笑笑又曰喜與笑皆屬心火○

內經曰心在聲爲笑又曰喜與笑皆屬心火○皇甫士安曰心實則笑笑則喜○河間日喜爲心火之志也喜極而笑者猶燔灼

太甚而鳴笑之象也故病笑者心火之盛也治法此一婦人病喜笑不已已半年寒治無效冀入日

此易治也滄蕪成塊者二兩餘火啜令赤艾冷

研細河水一大盞同煎溫服三次以釤股探喉吐出熱痰四五升次服黃連解毒湯不數日而笑定

內經曰神有餘則笑不休神者心火是也火得風而焰故笑之象也五行之中惟火有笑音治一老

人笑不休口流涎以黃連解毒湯勑加半夏竹葉竹瀝薑汁服之笑止矣

歌

欲

上

高

而

歌

○

癲

狂

邪

祟

之

病

皆

或

歌

或

哭

○

脾

悲

則

好

音

樂

是

壽

也

哭

內

經

曰

肺

在

聲

爲

歌

○

靈

樞

日

足

陽

明

之

脉

病

悲

則

歌

欲

哭

外

證

面

白

善

嘆

悲

愁

不

樂

欲

哭

○

婦

人

藏

躁

悲

傷

欲

哭

詳

見

婦

人

門

呻

內

經

於

外

也

○

腎

病

好

呻

○

脈

訣

曰

呻

呻

者

呻

者

呻

者

呻

者

久

內

經

曰

腎

爲

久

○

難

經

曰

腎

病

面

黑

善

恐

數

文

○

黃

帝

問

曰

久

帝

問

曰

人

之

久

者

○

難

經

曰

久

者

○

難

經

曰

久

者

○

黃

帝

問

陰

陽

相

引

故

數

久

又

○

足

陽

明

之

脈

病

善

伸

數

久

又

○

二

陽

也

發

病

善

惡

○

氣

乏

故

久

伸

引

之

門

嚏

黃

帝

曰

人

之

嚏

者

何

氣

使

然

歧

伯

曰

太

陽

之

氣

云

認

面白善寢○嘆者鼻中因痒而氣噴作于聲也鼻爲肺竅痒爲火化是火乘金爲病也河間○腠理不密噴嚏不已綱○欠

爲氣乏嚏爲氣目通綱

噫與嗳氣同呴出飽

氣也詳見內傷

太息

黃帝問曰入太息者何氣使然岐伯對曰入憂愁則心系急心系急則氣道約約則不利故太息以出之樞○膽病者善太息又曰

足少陽之脉病口苦善太息樞

大驚不語

大驚入心則敗血頑痰填塞心竅故瘡不能言宣密陀僧散遠志丸研末

密陀僧散

治驚氣入心瘡不能言密陀僧研極細末茶清調下一方以熟酒調下有熱

遠志丸

治因驚言語顛錯遠志薑製南星牛膽製入參白附子白茯神酸棗仁炒各五錢朱砂三錢水飛麝香一錢金箔五片右爲末蜜丸梧子大朱砂爲衣薄荷湯下三十九日再服

東醫寶鑑卷之三
三十四

茯神散

治同上

生乾地

黃白芍藥川芎當歸苦

薑白茯苓遠志蜜製右爲末每二錢水二盞

澄心一錢大棗二枚同煎至七分服之有

年七十四歲因戎亂爲驚疾服二方得

效本婦

一錢大棗二枚同煎至七分服之有

年七十四歲因戎亂爲驚疾服二方得

效本婦

一錢大棗二枚同煎至七分服之有

年七十四歲因戎亂爲驚疾服二方得

效本婦

中風不語

詳見風門

語澁皆屬風

宜考風門

婦人產前不語產後不語

並見婦人

小兒語遲

詳見小兒

言語法

秘言語養內氣

禁○語過多成喉痙或失音

○允言語誦讀常想聲在氣海中

○語過多成喉痙或失音

○語過多成喉痙或失音

○語過多成喉痙或失音

○語過多成喉痙或失音

○語過多成喉痙或失音

初入後勿言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

○言誦讀寧待平朝也

故也○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

○臥勿大語損人氣力亦不用寢卧多言

發聲也○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

○行不得語若欲語須住脚乃得

不治證

病人著衣縫謹語者不可治

○病人著衣縫謹語者不可治

○病人著衣縫謹語者不可治

○病人著衣縫謹語者不可治

○病人著衣縫謹語者不可治

○病人著衣縫謹語者不可治

○病人著衣縫謹語者不可治

○病人著衣縫謹語者不可治

不能語者不在此例醫

鍼灸法

瘡溝

經甲

不能言

取合谷

涌泉

陽交

足三里

天鼎

期門

支正

不能言

又手

少陰

之別

脈名

通里

虛則

又能言

取此穴

靈

津液

身中津液

靈樞

曰腠理

發泄

汗出

溱溱

是謂津

津脫者

屬筋

屬伸

澤補

益腦

髓皮膚

潤澤

是謂液

液脫者

屬骨

屬屈

伸不

利色

夭腦

髓皮膚

潤澤

是謂液

液脫者

入于口

輸于腸

胃其液

別爲五

天寒衣薄

則烏

蒸與氣

天熱衣厚

則爲汗

悲哀氣

并則爲泣

泣中熱

胃緩則烏嗜邪

氣內逆

則氣爲之閉塞

而不行不

行則爲水脹

○腠理

發泄

汗出

溱溱

是謂津

津

上焦灌漑

皮毛充實

腠理若飲食不節

胃氣

不足

大腸小腸

無所稟受

故津液洞竭

焉

躁

胃躁

上焦灌漑

皮毛充實

腠理若飲食不節

胃氣

不足

大腸小腸

無所稟受

故津液洞竭

焉

食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重步行
汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搗體勞苦汗出於脾○衛氣虛則汗多榮血虛則無汗○風病多汗風散氣故也○風門視波證亦有汗頭眩嘔逆宜芎夏湯方見火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散炒潤主之潮

自汗

自汗者無時而流濶然出動則爲甚屬陽虛胃氣所以肥腠理司開闔者衛氣虛則腠理疎開闔無司而汗多矣○內經曰汗出偏沮使人口枯○多汗身敷者濕也心主熱脾主濕濕熱相薄如地之蒸氣爲雲雨霧露宜調衛湯玉屏風散胃熱者二甘湯門○自汗屬氣虛屬濕與痰氣虛用人參黃芪少加桂枝真陽虛則少用附子童便煮漱○凡內傷及一切虛損之證自汗不止者總用補中益氣湯白觀少加附子麻黃根浮小麥其效如神但升柴俱用蜜水製炒以殺其升發勇悍之性又發引其參芪等藥至肌表也○仲景桂枝湯治外感氣虛自汗之神劑也○補中益氣湯治內傷氣虛

妙方也。○傷寒自汗有九證詳見腰門。○自汗通用黃芪湯。

中湯方見參歸腰子壯筋散小建湯。

調衛湯治濕勝自汗。麻黃根黃芪各一錢。羌活各七分。

生地黃各三分。猪苓二分。蘇木紅花各一分。

五味子七粒。右剉作一貼水煎服。或生黃芩半錢。白术二錢。半防風黃芪各一錢。

玉屏風散治虛自汗。白术二錢。半防風黃芪各一錢。右剉作一貼水煎服。

二甘湯治胃熱食後。汗出如雨。生甘草炙甘草五味子。烏梅肉各等分。右剉每五錢薑二片。桑葉二錢。

服水藥。

黃芪湯治陰陽偏虛自汗或盜汗。黃芪蜜炒二錢。二分。白芍二錢。黃芩。黃柏各一錢。

甘草各七分。當歸一錢。二分。麥門冬一錢。五味子。浮小麦。一分。膏肓一錢。二分。麥門冬一錢。五味子。浮小麦。一分。防風五分。右剉作一貼水煎服。或。

嚴氏黃芪湯同但無龍骨
一味地黃去熟用生耳

參歸腰子

治心氣虛損自汗以此收斂心液入參當歸剉各五錢豬心一箇破作數片并心內

煎至八分取清汁吃猪心以汁送下令盡

牡蠣散

治諸虛不足體常自汗夜卧則甚久不至羸瘦心忪驚惕牡蠣殼麻黃根黃芪知母

各一兩右爲末浮小麥煎湯調二錢服之亦可○丹溪治自汗方防風黃芪白朮牡蠣粉

麻黃根各等分剉水煎服之亦佳

小建中湯

治表虛自汗方觀○黃芪建中湯乃本方加黃芪也治虛勞自汗○當歸建中湯乃

本方加當歸一兩也治血虛自汗○桂枝附子湯乃本方加桂枝五錢炮附子半箇也治自汗漏下

止每服七錢薑七片棗二枚水煎服

參芪湯

治自汗黃芪蜜炒入參白朮白芍芩當歸熟地黃白芍藥酒炒酸棗仁炒牡蠣粉各一錢

陳皮七分甘草二分右剉作一貼
投浮小麥一撮烏梅一箇同煎服
驗

木芩湯

治虛汗黃芪防風白芍芩白术麻黃根各五錢甘草炙二錢半右剉每服七錢浮小麥一百粒同煎

服瀝

鎮液丹

治自汗黃芪蜜炒二兩半大附子二兩煨去皮膚童便浸炒防風炒白芍藥酒炒

中桂各一兩右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒下五十丸加酸棗仁尤妙

參附湯

治陽虛自汗入參五錢附子炮

兩右剉依三貼薑三片水煎服

生濟

芪附湯

治氣虛自汗黃芪蜜炒附子炮各二錢半右剉依一貼薑三片水煎服

生濟

桂附湯治自汗漏不止桂枝附子炮

各二錢半右剉如前法服

盜汗

內經日腎病者寢汗出憎風註曰寢汗者盜汗也

或無已日盜汗者睡中汗出覺則止也○盜汗者

寐中通身如浴覺來方知屬陰虛榮血之所主也宜補陰降火傳○盜汗乃陰虛血虛有火也當歸

六黃湯甚妙又四物湯
加參术黃芪○盜汗腎火動甚宜正氣湯脾濕
盛者宜四製白术散○肝熱者宜龍膽散安眠目合
則汗出者膽有熱也宜小柴胡湯竅門通用當歸
散參芪湯牡蠣

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也黃芪二錢生地黃熟

分右熟地黃補陰血芩連黃柏各七

剉作一貼水煎服取○黃芪實表氣當歸生

正氣湯

降陰火止盜汗黃柏知母各一錢半炒

四製白术散

治盜汗白术四兩剉分四包以黃芪石

粟米只取白术爲末每三錢

蜜丸飲調下盡服爲妙

龍膽散

治肝熱盜汗龍膽草防風各等分左

當歸地黃湯

治盜汗氣血兩虛者當歸熟地黃生地

各一錢黃柏知母並蜜水炒陳皮各八分人參五分甘草三分右剉作一貼棗一枚浮小麥一人撮同

水煎服

牡蠣散

治盜汗及自汗牡蠣殼黃芪麻黃根各等分右剉每五錢浮小麥百粒同煎服三○又牡

蠣散治盜汗牡蠣粉白朮防風各等分

等分爲末酒調服二錢汗即止

類

參芪湯

治虛人盜汗人參黃芪白朮白芍芩白扁豆山藥陳皮乾葛半夏麴甘草各一錢右剉作

一貼水

心

童子盜汗

一童子自嬰至童盜汗七年諸藥不效用涼膈散三黃元火門三日病已蓋腎主五

液化爲五濕相火逼腎腎水上行乘心之虛而入手少陰心火炎上而入肺欺其不勝已也皮毛以是而開玄府不閉而爲汗先以涼膈散瀉胷中相火次以三黃九瀉心火以助陰分則腎水還本汗

自止

矣

頭汗

頭暉者諸陽之會

○頭者三陽之會

○搏諸陽津液上湊則汗見於頭

○蓋三陰之脉至會而還亢

○有汗也理○頭汗出自是陽虛故曰汗出爲陽微是陰不得

○蓋首者六陽之所會故汗出齊頸而還血證也額上偏多

○分言之則顧頭汗屬腎額心三焦之火潤其腎水溝

○偏多也也以部

○渠之餘迫而上入於心之分故發爲頭汗而額上

○陽家頭額出汗鱗門○陽

心汗

○在別處

○明水結胃實亦頭汗出

○偏多也也

○獨迫而上入於心之分故發爲頭汗而額上

○寒於心之分故發爲頭汗而額上

○陳艾湯又法青桑第二番葉帶靈茱陰乾

○調下又止盜汗門○允

○思慮過度以致心孔獨有

○處有汗思慮多則亦多病

○心汗出

○因驚得之大人乃心心血溢盛而常發赤者是也小兒

○心汗大入乃心心血溢盛而常發赤者是也小兒

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

○心汗出心腋盜汗久不正用參歸腰子

陳艾湯

○治汗自心

○二兩右

○補出者名

○每二錢

○亦治心腋盜汗

○陳艾湯益汗

調

下

茯苓補心湯

治心汗心汗者心孔有汗別處無也因七情鬱結而成白茯苓入參白朮當歸

生地黃

甘草

三分朱砂

五分別爲末右剉依一貼

麥門冬陳皮黃連各一

酸棗仁炒白芍藥

藥麥門冬

朱砂末右剉依一貼

浮小麦百粒

同煎調朱砂末服之

手足汗

手足有熱聚胃府逼而出之者此陽明證也宜大柴胡湯

方寒

後以八物湯加半夏

茯苓爲君

附子川烏

佐使服之其汗即無

目○治脚汗

方白礬乾葛

各五錢

爲末水三

煎十數沸逐日洗而繩之

目○治兩腋汗

丹治兩腋汗

五日自止

○牡礬丹

治兩腋汗

○治兩腋汗

陰汗

陰汗腎虛陽衰也宜局方安腎九

腰門○治陰汗

不正宜小安腎元

○治陰汗

細和蛤粉搗傳江處
鮮粉黃連五倍子各一錢二分半右爲末先以露

蟬房大腹皮煎湯洗後繙之揩

大蒜元治陰汗濕痒大蒜不拘多少以煨熟去皮爛研

豆豉末和九梧子大朱砂爲衣橐子燈

心煎湯空心吞下三十九粒

血汗

詳見血門

黃汗

詳見黃疸門

漏風證

黃帝問曰有病身熱懈墮汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯對曰病名酒風一名漏風漏風

之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身熱陽息衣常濡口乾善渴不能勞事綱自求之散主之

白朮散

治飲酒中風汗多不可單衣食則汗出如洗久不治必烏消渴防風二兩半白朮一兩二

錢牡鴟幾三錢溫水調下

每二錢右爲末

亡陽證

九汗多不止謂之亡陽又汗不得出亦謂之亡陽如心痞胃煩面白青膚潤者難治色黃手足溫者可治門○九汗漏不止則真陽脫亡故謂之亡

陽其身必冷多成痺寒矣門○九發汗過多則陽虛不固汗出多則津液亡而小便難四肢者諸陽

之本液脫者骨屬屈伸不利是以四肢拘急桂枝附子湯治傷寒發汗過多遂漏不止四肢拘急桂枝附子湯主之門○汗多亡陽宜用止汗法附子湯主之門○陽虛亡陽不得汗宜陶氏再造散敷門

桂枝附子湯治傷寒發汗過多遂漏不止四肢拘急桂枝附子炮各三錢白芍藥

薑二錢甘草灸一枚水煎服之門

止汗法汗出不止恐作亡陽宜以溫粉紅粉撲之又用獨勝散填臍○或牡蠣麥麸麻黃根葉本糯米防風白芷等分爲末周身撲傅○誤用麻黃令人亡陽汗出不止將病人頭髮水浸外用糯米粉

并龍骨牡蠣末

并撲傅之門

溫粉止自汗白芷藁本川芎白芷各等分右爲末兩入粟米粉一兩和勻綿裹撲身

紅粉

治同上 麻黃根 紅蠟粉 各一兩 赤石脂

得

龍骨

各五錢 右爲末 和勻綿裹 摆傳

獨勝散

治自汗 盗汗 五倍子 白礬 枯等分爲末 以津

調勻 填臍中 以帛縛定立效

鑿

○又方 何

調封臍中妙

首烏爲末 津嚙

嘲

無汗

汗者血之異名 故靈樞曰

奪血者無汗 奪汗者無

陽實

○盛夏浴食無汗 為表實者無汗 燥○三

真氣已虧

胃中火盛則汗出不休 胃中真氣已竭

若陰火已衰

則無汗 反燥乃陰陽俱衰 四時無汗

其形不久

○傷寒陰證皆無汗 緣隈○陽氣有

餘爲身熱

無汗 隱氣有餘 則無汗 而寒熱

身寒陰陽有餘 則無汗

而寒熱

謂出汗如珠不流

復旋乾也 內經○六陽氣

俱絕則絕汗乃出

朝占夕死 夕占朝死

經○六陽氣

二

柔汗

仲景傷寒論曰柔汗發黃爲脾絕釋曰柔

爲陰柔汗 即冷汗也

一云油汗即粘汗也

柔汗

即冷汗也

不治也

汗凝如珠 潤一不治也

髮潤一不治也

汗出如油

二

汗出凶證

傷寒熱症汗出

不治也

汗凝如珠 三不治也

不治也

汗出如油

二

頭汗如珠不流者陽脫即死○傷寒汗出髮潤與其出如油或大如貫珠着身出而不流皆爲不休治之證理○傷寒脉浮洪汗出如油髮潤喘不休爲命絕不治○傷寒陽病自汗有九證皆有治法陰病不得有汗惟陰毒則額上手背有冷汗甚者如水洗此是陽虛陰盛亡陽而消脫也其死必矣

禁忌冬月天地閉血氣藏縱有病亦不宜多出汗活人自汗大忌生薑以其閉腠理故也溯○自汗忌辛辣之味五辛之脣并忌食之

積氣生液古聖曰陽中生陰陰中生陽氣中生液液中日陽變陰合初生火水火氣也流动閃爍其體尚虛其形猶未定次生木金則確然有定形矣水火初是自生也○程子曰坎水也一始於中有生之最先者也魯齋鮑氏曰物之初生其形皆水水者萬物之一原也或問曰天一生水亦有可驗乎曰人之一身可驗矣貪心動則津生衰心動則淚乎

生愧心動則汙生慾心動則精生方人心寂然不動之時則太極也此心之動則太極動而生陽所以心一動而水生即可以為天一生水之證也○夫水生於陽而成於陰氣始動而陽生氣聚而靜○

則成水觀呵氣可見蓋神為氣主神

動則氣隨氣為水母氣聚則水生

理

泣

難經曰腎主液八肝為泣○黃帝曰入之哀而泣涕出者何氣使然岐伯曰心者五藏六府之主也目者

宗脉之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也

故悲哀愁憂則心動心動則五藏六府皆搖搖則

宗脉感宗脉感則液道開液道開則泣涕出焉液

者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣涕

不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見

矣命曰奪精擗○又曰五藏六府之津液盡上滲

于目心悲氣并則心急急心急則肺舉肺舉則

液上溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故咳而

液出矣○老入膽汁哩哭則無淚笑則

泣出矣○老入膽汁哩哭則無淚笑則

有淚火盛水齶也故膽熱者亦流淚耳

涕內經曰泣涕者腦也腦者陰也腦滲為涕○難經曰

涕主液入肺為涕涕者肺之液也○膽移熱於腦則

更名實卷之二

白僵蚕炒天麻羌活各五錢川烏鹽三錢

二錢右爲末薑汁糊和九梧子大

鹽裹

唾唾

者腎之液也內經

多唾腎熱則無唾

○水之在口曰華池亦曰玉泉

根者舌也

○大病新愈喜唾

中丸溫之仲景

○大病新愈喜唾

中丸方見

門加益智仁

○蟲

黃庭經曰玉泉清水灌靈根審能修之可長存靈

者胃口上停寒也

○大病新愈喜唾不似或唾白沫

中丸方見

門加益智仁

○蟲

而體復潤矣

○蟲

而體枯遇至

迴津法

真入日

常習不唾地

蓋口中津液是金鑾玉體

有光蓋人身以津液爲本

在皮爲汗在肉爲血在目

腎爲精在口爲津伏脾爲痰

在眼爲淚曰汗曰血

曰淚曰精已出則皆不可迴惟津唾則獨可迴

至

則生之意又續美有入喜唾液乾而體枯遇至

而體復潤矣

○蟲

而體枯遇至

而體復潤矣

○蟲

而體枯遇至

而體復潤矣

而體枯遇至

而體枯遇至

人教以迴津之術

自汗盜汗諸汗通用

中益氣湯內傷雙和湯

外感風寒

而體復潤矣

○蟲

而體復潤矣

○蟲

而體復潤矣

而體復潤矣

通治藥

方

自汗盜汗

中益氣湯

內傷雙和湯

外感風寒

而體復潤矣

○蟲

而體復潤矣

而體復潤矣

而體復潤矣

單方九種

二十

石膏

解肌細碎水煎服

出毒汗宜

葛根

解肌發表出汗開

腠理

之

草

麻黃

去節則發表出汗

開

腠理

之

草

生薑及乾薑

皆發表止汗水煎服

開

腠理

之

草

浮萍

發汗最捷

詳見

丹

下

荆芥

發表水煎服

出汗

薄荷

發毒汗解勞乏清頭目

水煎服

草

葱白

連鬚散風用解表

出汗

草

紫蘇葉

散表氣出同青皮煮

服

之即出

汗不

忍冬藤

散久積陳鬱之氣
能出汗水煎飲良

細辛

散風出汗水煎飲之可為末服令人氣塞不

杏仁

解肌發汗水煎服

豆豉

發汗○久盜汗豉一升微炒漬酒三升

白朮

止汗○治盜汗極驗白朮不拘多少剉成小塊浮麥一升水一斗同煮乾取出切片焙乾去麥

桂枝

錢別煎浮麥湯調服二

酸棗仁

止汗治睡中汗出酸棗仁炒入參白朮

桑葉

最止盜汗青桑葉帶露

杜蠣粉

麻黃根為末米飲調服身止盜汗又和

浮小麥

實表止自汗
之○允自汗多喫
水煎作飲常服

防風

止汗又止盜汗
煎服之葉尤佳
幹

黃芪

實表虛止自汗
許水煎常服○允
自汗春夏用黃芪
蜜水炒黃芪入炙甘草少

麻黃根

止自汗及盜汗
又和牡蠣粉身止
汗幹

椒目

止盜汗最妙微
炒為極細末取半
錢以生

烏梅

止好唾作
茶飲之

白茯苓

止自汗盜汗取為
末以烏梅陳艾煎
湯調下二錢

鍼灸法

盜汗不止取陰郄
瀉之○汗不出取曲
差○虛損盜汗

取百勞肺俞經乙
出合谷復溜俱瀉之

大妙

痰飲

痰涎飲三者不同

痰者津液之異名人之所恃以潤養肢體者也曰痰曰涎曰飲又有理一

者殊之別伏於包絡隨氣上浮客肺壅嗽而發動涎也惟飲生於胃府為嘔為吐此則胃家之病不可不知攏

痰飲分清濁

痰者津液因熱而成熱則津液熏蒸而稠濁故名為痰也○水之與飲同出而異

名也人惟脾土有虧故所飲水漿不能傳化或停於心下或聚於脇間或注於經絡或溢於膀胱往往致病矣○飲者因飲水不散而為病

謂之痰其實一也

王隱君痰論

痰證古今未詳方書雖有懸飲留飲支飲

四肢遊風腫硬似痛非痛或為齒頰瘡痛耳聾或頭風眩晕目昏耳鳴或口眼蠕動眉棱耳輪瘻痒或利咯之不出嚥之不下色如煤炁形如敗絮桃膠不

塊肉之類或心下如停水雪心頭冷痛時作或夢寐奇怪鬼魅之狀或足腕痠軟腰背卒痛或四肢骨節煩疼並無常所乃至手麻臂痛狀若挫閃或脊中每有一掌如冰凍之寒痛者或渾身習習如蟲行者或眼眶澀痒口瘻舌爛甚為喰閉等證又或遠項結核似癰非癰或胷腹間如有二氣交紐噎塞煩悶有如烟氣上衝頭面烘熱或為失志癲狂或為中風癱瘓或為勞瘵荏苒之疾或為風婢及脚氣之候或心下怔忡驚悸如畏入將捕或喘吐或嘔冷涎綠水黑汁甚為肺癰腸毒便瞞嚙破其為内外疾病非止百端皆痰之所致也蓋津液既凝為痰為飲而洶涌上焦故口燥咽喉乾而之則經閉不通小兒則驚癇擣搘治法宜先逐去敗瘻然後看虛實調理故製沉香滾痰丸方見為仲景治三焦痰飲之劑也○劉宗厚曰痰之為病仲景論四飲六證無擇叙三因內外俱為切當惟王隱君論人之諸疾悉出於痰此發前人所未發可謂深識痰之情狀而得其奧者矣製滾痰丸一方總治斯疾固為簡便較之仲景三因有表裏內外兩

分汗下溫利之法則疎濶矣况又有虛實寒熱之不同者哉

飲病有八

有留飲、癖飲、痰飲、溢飲、流飲、懸飲、支飲、伏飲等證，皆因飲酒冒寒或飲水過多所致。

留飲

胃中有留飲者，其人短氣而渴，四肢歷節痛，脈沉細，如手掌大，或短氣而

渴，四肢歷節疼痛，引缺盆咳嗽，轉甚。

○留飲者，水停心下，背冷如手，掌大，或短氣而

渴，四肢歷節疼痛，氣短脉沉，久則令入骨節。

○留飲者，水停心下，背冷如手，掌大，或短氣而

癖飲

水癖在兩脇下動搖，有聲。

○癖飲者，在兩脇下動搖，有聲。

痰飲

其人素盛，今瘦水走腸間，瀝瀝有聲。

謂之痰飲，宜支滿目眩。

○痰飲者，水停腸胃，瀝瀝有聲。

令人暴肥，暴瘦宜神术九門。

苓桂术甘湯

治痰飲，赤茯苓二錢，桂枝、白朮各一錢，半甘草一錢，右剉作一貼，水煎服，神术九門。

神术丸

治痰飲成窠，癟一斤爲細末，白脂麻五錢，水蒼术浸去皮焙乾。

以二盞研漚取汁大棗三十枚爛煮研去皮核取肉
時必臍微燥進山梔子散一百丸至二百丸初服

不躁熱

山梔子散

梔子一味乾之爲末沸湯點一錢服

溢飲

飲後水流在脇下咳唾引痛謂之溢飲十棗湯煎水在脇間動搖瀉瀉

溢飲

謂之溢飲小青龍湯煎主之

四肢身體

懸飲

飲後水流在脰下咳嗽引痛謂之懸飲十棗湯煎水在脰間動搖瀉瀉

有聲

○懸飲亦謂流飲水流在脰下咳嗽引痛

○懸

○思水

三花神佑丸主之

○門

○方

支飲

咳嗽倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲小青龍湯煎主之又曰其脉數必苦冒眩其人本有

支飲在胷中故也

○茯苓五味子湯亦主之

○仲景

○支飲水

停膈上咳嗽

喘息短氣

門

茯苓五味子湯

治支飲手足冷痺多唾小腹氣上衝
胃咽面熱如醉時復取冒赤茯苓二

錢

桂心

甘草各一錢半

五味子一錢

二分

辛右割

作一貼

煎服

當冒者

必嘔

嘔者復滿

加半夏以去其飲

飲去嘔則止

伏飲

膈上痰滿喘咳或吐發則寒熱背痛腰痛目淚自出其入振身瞞剔必有伏飲跡○伏飲者水停

膈滿

嘔吐

喘咳發

熱惡寒

腰背痛

目淚出

或身悶

瞞宜三花神祐

九防門

控延丹

方觀下

痰病有十

有風痰寒痰濕痰熱痰癆痰氣痰食痰酒痰驚痰痰之源不一有因熱而生者有因氣而生者有因風而生者有因暑而生者有傷苓而生者

生者

有因食而生者

有因酒而生者

風痰

多癰

瘻奇證頭風眩暈

風悶亂

或搐搦

動宜青州白圓子

導痰湯

或

青州白圓子

治風痰壅盛

嘔吐眩暈

及癰瘍風半夏

七兩天南星

三兩白附子

二兩川烏

五兩

附子

二兩川烏

五兩

川烏

五兩

川烏

錢右生爲細末清水浸春五夏三秋七冬十日朝夕換水候日數足乃取納生絹袋中，研過其滓再

研應過以盡爲度澄清去水晒乾又爲末以糲粥清和丸葦豆大薑湯吞下三五十丸，一丸，一丸，一丸。

導痰湯治風痰半夏薑製二錢南星炮橘紅枳殼赤芍各一錢右剉作一貼薑五片水煎服

寒痰

寒痰即冷痰也。骨痺四肢不舉氣刺痛無煩熱凝結清冷宜溫中化痰丸溫胃化痰丸新法半夏湯。

溫中化痰丸

治冷痰嘔噯惡心青皮陳皮良薑乾薑等分右爲末醋糊和丸梧子大米飲

丸，一丸，一丸，一丸。

溫胃化痰丸

治膈間有寒飲冷痰半夏製三兩乾薑白术焙陳皮各二兩右爲末薑汁糊

和丸梧子大薑湯吞下二三十丸。

新法半夏湯

治脾胃有冷痰嘔逆惡心不思飲食大半夏四兩切片以白礬末一兩和湯浸

一日漉出再用薑汁浸一日煮令汁盡焙爲末用甘草炎二兩搗紅縮砂神麴炒草果各一兩丁香

白豆蔻各五錢右爲細末每錢以薑鹽湯點服

細末

濕痰

身重而軟倦怠困弱宜神术丸

方見山術

山精丸

健脾清火燥濕痰蒼术治三日竹刀刮去皮陰乾二斤黑桑椹一斗取汁去渣將蒼术

浸汁晒乾如此九次搗爲細末拘杞子地骨皮各一斤右爲末蜜丸梧子大每百丸溫湯吞下

大用

三仙丸

治濕痰半夏南星各一斤爲末薑汁調作片置篩中以楮葉或艾葉覆之令發黃色晒乾收之須五六月間做麴每麴四兩入香附末

二兩薑汁糊和丸梧子大薑湯下五十丸

大用

熱痰

熱痰即火痰也多煩熱燥結頭面烘熱或爲眼爛喉門癲狂嘈雜懊憊怔忡宜清氣化痰丸加味潤

下丸小調中湯大調中湯黃芩利膈九理中藥

○熱痰黃色者是也

湯清熱導痰湯

○熟痰黃色者是也

清氣化痰丸

治熱痰半夏製二兩陳皮赤芍芩各一兩
薄荷荊芥各五錢右爲末薑汁糊和丸梧子大

薑湯

下五十丸此方乃二陳湯合涼膈散也研

加味潤下丸

善降痰火橘紅八兩半夏剉二兩以蓋
五錢化水拌勻二味煮乾燥入南星

黃芩

黃連甘草各一兩右爲末薑汁浸

小調中湯

治一切痰火及百般怪病善調脾胃神效
黃連煎水浸甘草甘草煎水浸黃連水

仁煎

水浸半夏半夏煎水浸瓜萎仁各炒水乾爲
度各等分右剉五錢薑三片煎服又四味爲末煮

良薑

取汁作糊和丸梧子大白湯下五十丸尤妙

大調中湯

治虛而有痰火最佳即前方加入參白朮
白茯苓川芎當歸生地黃白芍藥也

黃芩利膈丸

除胃中熱利膈上痰生黃芩炒黃芩各
一兩半夏製黃連澤鴻各五錢南星炮

枳殼

陳皮各三錢白朮二錢白礬一錢今加蘿蔔
子炒五錢皂角一錢右爲末蒸餅和丸梧子大白

理中豁痰湯

治膈上

胃中熱痰最妙

白朮白芍藥各

人參白茯苓半夏製

朱薑仁陳皮

黃連薑汁炒善

黃芩各七分

黃芩酒炒香附

子益水炒

枳實甘草各五分

甘草各三分

右四

作一貼水煎去滓入

薑汁

二匙竹瀝六匙調服

旋月

清熱導痰湯

治憎寒壯熱

頭目昏沉氣上喘急口出

傷七情以致痰迷心竅神

不守舍神出則舍空則痰自生也

黃連黃芩

爪薑仁南星炮半夏製

陳皮赤茯苓善

黃白朮人

參各七分

板實甘草各五分

右剉作一貼

入薑三片棗二枚同煎和竹瀝薑汁服

醫貼

欬痰

與老痰燥痰同即火痰

欬於心肺之間久則凝滯

膾膈稠粘難咯多毛焦

而色白如枯骨咽喉乾口燥

咳嗽喘促宜節齋化痰丸

湯瓜萎枳實湯

天膏

清火豁痰丸加減

二陳湯瓜萎枳實湯

天膏

節齋化痰丸

專治欬痰老痰膠

固稠粘難於咯唾

天

炒爪薑仁橘紅海粉各一

片芩酒

天膏

天膏

天膏

兩芒硝香附子鹽水炒苦蔓連翹各五錢青黛二
錢右爲末煉蜜入薑汁少許和丸櫻桃大細嚼一

允清湯送下或如黍米大
淡薑湯下五七十丸

抑痰丸治燥痰鬱痰乾嗽爪薑仁一兩貝母炒五錢
半夏稟二錢右爲末蒸餅和丸菉豆大薑湯

九下百

霞天膏治虛痰老痰稠黏膠固於脣臆依附盤泊於
腸胃當用此膏吐瀉不致虛損如癩癆鼓喧

於補虛藥中加之以去痰積可收萬全服此比之
倒倉更穩丸治實痰新痰用南星半夏燥之橘紅
枳殼散之猪苓茯苓滲之黃芩黃連降之
巴豆附子流通之竹瀝爪薑潤下之詳見吐門

清火豁痰丸治上焦鬱火痰涎壅盛脣膈不利咽喉
煩燥噎塞如有所硬吐不出嚥不下大

黃酒拌九蒸九晒二兩半白朮炒枳實麸炒陳皮
鹽水炒各二兩黃芩酒炒黃連酒炒梔子炒南星
半夏二味以白礬皂角生薑各一兩浸七日各一
兩半貝母炒一兩三錢連翹天花粉白茯苓神麴

炒亡芥子炒各一兩玄明粉七錢青礞石以硝
一兩同煅如金色青黛甘草各五錢沉香二錢右

茶清下六十九梧子大

鑒

加減二陳湯

治老痰燥痰熱痰核

錢二分枳實黃芩炒杏仁一錢白朮貝母

炒便香附各九分白茯苓天花粉益水炒各七分

防風連翹各五分甘草三分右作一貼水煎服

瓜萎枳實湯

治痰結咯吐不出脅痛不能轉側或痰結脣滿氣急或痰迷心竅不能言

瓜萎仁枳實苦梗赤茯苓貝母炒陳皮片芩施子

各一錢當歸六分縮砂木香各五分甘草三分右

剉作一貼水煎入竹瀝

五匙薑汁半匙和服

氣痰

七情鬱結痰滯咽喉形如敗絮或如梅核咯不出
嚥不下脣瞼痞悶宜清火豁痰丸王粉丸加味四

七湯潤下丸二賢散前胡

半夏湯加味二陳湯門

玉粉丸

治氣痰以三仙丸加橘紅末二兩也

門

加味四七湯

治瘧氣鬱結窒碍於咽喉之間咯之不下謂之梅核氣者半夏陳皮

赤茯苓各一錢

神麌炒枳實南星炮各七分

青皮

厚朴紫蘇葉搘榔縮砂各五分

白豆蔻益智仁各

三分

右剉作一貼

入

薑五片水煎服

鑑

潤下丸

治痰積氣滯及痰嗽降痰甚妙陳皮一斤去鹽二兩以水化同煮爛焙燥甘草二兩炙

右爲末湯浸蒸餅和丸梧

子大白湯下三十丸

九

二賢散

清肺消痰下氣解酒毒橘紅一斤甘草四兩鹽半兩水浸過一指許鍋內煮乾焙爲末每

日早晚各二匙

淡薑湯或白湯調下

綱

○回春一名

二賢湯

前胡半夏湯

治氣痰壅盛前胡半夏赤茯苓各一錢陳皮紫蘇葉枳殼各七分木香甘草各

五分右剉作一貼

薑五片烏梅一箇水煎服

加味二陳湯

治氣痰窒碍咽喉成梅核氣半夏陳皮赤茯苓枳殼苦杏仁各一錢片芩梔子炒

各七分紫蘆子白豆蔻仁甘草各五
分右剉作一貼薑三片同煎服

醫

食痰

卽食積痰也因飲食不消或挾瘀血遂成窠囊多爲癥塊痞滿宜青礞石丸黃芩丸正傳加味二

陳湯

醫

青礞石丸

治濕熱痰去食積痰青礞石二兩同焰硝二兩入罐內益泥固濟晒乾火煅紅候冷

取出天南星二兩

白礬末五錢和水浸二日半夏

皂角水浸二日

片芩薑汁炒赤茯苓枳實麴炒各

三兩風化硝用蘿蔔

蓄同煮硝化去蘿蔔瀝淨入牛

膽內風乾取五錢

右為末薑汁煮神麴為糊和丸

梧子大白湯下三十

丸七藥重在風化硝門

黃芩丸

治食積痰丸蔓仁半夏麴山楂肉神麴炒各等分右為末丸蔓汁和丸梧子大以蔓

湯竹瀝下三

五十丸門

正傳加味二陳湯

治食積痰導痰補脾消食行氣山查肉一錢半香附子半夏各一錢

川芎白术蒼术各八分橘紅茯苓神麴炒各七分
縮砂研麥芽炒各五分甘草炙三分右剉作一貼分

薑三片棗二枚水煎服傳正

酒痰

因飲酒不消或酒後多飲茶水但得酒次日又吐
食不差嘔吐酸水宜瑞竹堂化痰丸香附爪蔓

青黛丸小子加內觀半夏乾葛各一錢煎服傳正

調中湯滌痰散又對金飲

瑞竹堂化痰丸

治酒痰消食快脾順氣半夏南星生薑白礬皂角各四兩同入砂鍋內水

煮以南星無白點爲度去皂角不用入青皮陳皮

乾葛蕷子神麴麥芽山楂肉蘿蔔子香附子杏仁

各一兩右爲末薑汁浸蒸餅和丸梧子大

每五七十丸食後臨卧茶酒任意下門

香附爪蔓青黛丸

治燥痰鬱痰酒痰上三味爲末蜜大丸食後及臨卧時

噙化噙下丸積痰非

青黛丸姜不除門

驚癎

或成癩癇結成塊在胷腹發則跳動痛不可忍
人多有之宜妙應丹滾痰丸

妙應丹

治一身牽引隱痛不可忍走易不定或疑風
毒或為癱瘓或謂癱瘓皆非也乃殘延伏在

心臟變為此疾但服此藥其疾如失方見○

一名控延丹聞

脉法

脉變為此疾但服此藥其疾如失方見○

一名控延丹聞

喘短氣

○肺沉而弦者寒飲也○肺飲不弦但苦

中節傷飲

○脈沉而弦者懸飲內痛○脉浮而細滑

○提綱曰痰脉弦滑○三因曰飲脉

皆弦微沉滑○脉沉弦細滑大小不勻皆痰飲為

病也

○久得滯脉沉弦細滑大小不勻皆痰飲為

病也

皆弦微沉滑○脉沉弦細滑大小不勻皆痰飲為

病也

痰飲外證

靈樞曰尺膺龕如枯魚之鱗者水溢飲也○

色鮮明者有留飲又曰脉大心下有留飲其

入背寒冷如水

○水在心下堅築短氣惡水不欲飲○水在肺吐涎沫欲飲水○水在脾少氣身

重○水在肝腸下支滿噎而痛○水在腎心下悸

○凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色

眼胞及眼下如灰烟熏黑者痰也用控延丹○

不效關上脉伏而大者痰也用控延丹○

方觀下○藥

一切水證痰證食少肌色如故

一切水證脹硬心下怔忡門

痰飲諸病

痰之為患者新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結咯之難出漸成

惡味頭痛發熱類外感表證久則潮咳夜重類內傷陰火又痰飲流注肢節疼痛類風證但痰證曾滿食

減肌色如故脉滑不勻不定為異耳門○痰之作

恙為喘為嗽為吐為嘔為眩為風癇為狂迷為

忪惒或吞酸或短氣或痞闌或腫脹或寒熱或疼

痛痰實主之鼈○俗云十病九痰誠哉斯言門○

冗人手臂或動不得或骨節遍身痛坐卧不寧此

骨痰入骨也○又曰眼黑而行步呻吟舉動艱難者入

四肢痠痺屈伸不便者風濕痰也○眼黑而頰赤或面黃色者熱痰

促者驚風痰也○眼黑而氣短下痛也○咯痰不出者是痰結也又曰脇

也○寒熱痰不出者是痰結也又曰脇

辨痰色

寒痰清濕痰白火痰

膠門

痰飲流注證

凡人忽患脅背手腳腰膝隱痛不可忍連

分

醫不曉謂之走注便用風藥及針灸皆無益又

疑

風毒結聚欲爲癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰

延伏在心膈上下變爲此疾或令人頭痛不可舉

或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠黏夜間喉

中如找鋸聲多流睡延手脚冷痺氣脈不通誤認

爲癰瘍亦非也凡有此疾只服控涎丹其疾如失

得

○濕痰流注上行攻臂臂不能舉

或左右轉移消痰茯苓丸主之

方見

控涎丹

一名妙應丹治痰飲流注作痛甘遂紫大戟

白芥子各等分右爲末糊丸梧子大晒乾臨

臥薑湯或溫水下七丸至十九丸

神效驚痰加朱砂爲衣痛甚加全蝎酒痰加雄黃臂痛加木薑子桂

心驚痰成塊加穿山甲

鯉甲玄胡索蓬术

痰病有似邪祟

血氣者人之神也神氣虛乏邪因而入理或有之若夫血氣兩虛痰客中焦妨

碍升降不得運用以致十二官各失

其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死

○先宜多飲

薑鹽湯 探吐之或竹瀝香油
多灌之次服 陶氏導痰湯

治痰迷心竅或似鬼祟半夏一錢赤芍

芩天南星枳實各八分陳皮黃芩黃連

陶氏導痰湯

治痰迷心竅或似鬼祟半夏一錢赤芍

白朮瓜萎仁各五分苦杏四分人參三分甘草二分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎臨卧入竹

薑汁調服先吐

去痰次服此藥門

痰厥

痰厥者皆因內虛受寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺

癲厥

暈倒暎沉經宜服加味二陳湯清火化痰湯鶴頂丹小兒方奪命散亦可

加味二陳湯

治痰厥半夏製陳皮白茯苓當歸枳實苦杏仁各一錢良薑縮砂各五分木

香桂皮甘草各作一貼薑五片水煎服

右剉

清火化痰湯

治熱痰結在脅膈略吐不出溝悶作痛名痰結半夏製陳皮赤芍芩各一錢苦杏仁各七分黃連黃芩梔子貝母蘿子

桑白皮杏仁各五分木香甘草各三分右剉

作一貼薑三片同煎至半納芒硝
熔化去津又入竹瀝薑汁調服春

鶴頂丹治痰熱塞咽喉聲如拽錫及癥結胃膈滿痛

明白礬一兩心紅五錢減礬丹右爲末每取

以薄荷入磁器內熔化乘熱撫作九櫻桃大每一丸

丹各一兩火煅爲末麪糊和九麻子大治諸頑痰

迷塞關竅不通聲音不出取三十丸研末入全竭

少許薑湯調灌之吐痰立愈

癰塊

人身中下有塊如腫毒多在皮裏膜外此因濕流注作核不散問其平日好食何物用藥吐下

後方用消癰散核之藥二陳湯加大黃連翹柴胡苦薑白芥子黃連薑汁炒煎水入竹瀝多服自消

肿○癰飲流注於脣背頭項脰膀腰腿手足聚結硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡

薄不熱堅如石破之無膿或有薄血或清水或如紫汁又有壞肉如敗絮或如瘰癧在皮肉之間如

雞卵可移動軟活不硬惟覺咽喉痰結作寒作熱宜返魂湯動觀加南星半夏鹽○遍身有塊多是

痰注宜加味小胃丹竹瀝達痰丸○痰塊宜開氣消痰湯又天南星草烏等分爲末薑汁調如膏

敷核上立消醫○治痰核商陸根生南星合擣令爛塗付立消謹○渾身有腫塊或骨體串痛都是

濕痰流注經絡也通用二陳湯加減春

加味小胃丹

治風痰痞積眩暈喉痺瘻瘍不語腹中痞塊等證神效小胃丹一劑防見加南

星半夏並用白礬皂角薑汁水煮十五次各二兩半蒼朮用米泔白礬皂角水浸一夜炒二兩杏仁並以白礬皂角水泡去尖紅花酒蒸陳皮枳實並用白礬水泡半日炒白术白芥子炒各一兩右爲末薑汁竹瀝煮神麴爲糊和九蒸豆大每服二三十丸薑湯下門○醫鑑一名導痰小胃丹○

回春一名竹瀝化痰丸

竹瀝達痰丸

能運痰從大便出不損元氣妙丹溪曰痰在四肢非竹瀝不開此藥是也半夏

薑製陳皮去白白术微炒白茯苓大黃酒浸蒸晒乾黃芩酒炒各二兩入參甘草炙各一兩半青礞石

石碑二兩焰硝一兩同火煅如金色沉香五錢右爲末以竹瀝一大碗半薑汁三匙拌勻晒乾如此時以米飲或薑湯吞下門○一名竹瀝運痰丸

開氣消痰湯

治胷中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者善薑便香附子

白殼夏枳實羌活荊芥陳皮片芩枳殼各七分前胡半夏枳實炒各一錢陳皮片芩枳殼各七分後半夏枳實各三分右剉作一貼

喜唾痰

胷中有寒則喜唾痰渴○脾虛不能剋制腎水多吐痰而不能者宜服八味元虧觀又云八

味元治脾腎兩虛多唾痰而不咳咽○大病後多

唾痰者此胃冷也宜理中湯方覩門○病人多

唾痰宜半夏溫肺湯或二陳湯加丁香縮砂

白沫乃胃口上停寒也加益智仁研○喜唾

半夏溫肺湯

治中脘有痰水心下洋嘈雜多唾吐

涎宜半夏陳皮旋覆花人參細辛桂心苦薑白芍藥赤茯苓甘草各一錢右剉作一貼

半夏溫肺湯治中脘有痰水心下洋嘈雜多唾吐

涎宜半夏陳皮旋覆花人參細辛桂心苦薑白芍藥

痰結

喉中有物咯不出，熏不下。此是老痰重者，吐之輕者用瓜

蒂散

坊

氣

實

者必

用荊

瀝

明

○痰結核在咽

喉化

痰丸

最妙

方

見

此等老

痰飲

酒

之入多有之

酒熟

上升

鬱于肺

胃而

成此痰

天門

冬片

芩

泄肺火也

海粉

芒硝

礬

以

堅

也

瓜萎仁

潤肺降

痰香

附子

開鬱降氣連翹

苦

蔓

火皆不

用半夏

南星

辛燥之劑

珊瑚

痰病不卒死

大丸病久淹延卒不死者多因食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰積所養飲食不便虛故也

痰病難治證

氣實熱痰吐難得出或成塊吐咯不出氣鬱滯者難治又曰氣實痰熱結者難治明

○喉中漉漉有聲喘為咯痰不出者難治又日服藥後咯吐痰出為效若咯痰不出者難治回○痰涎等病不一兩足惟勞瘵有痰為難治最宜早灸膏肓四穴

○資生鉤繖○肺胃經虛則生粘痰痰

者肺胃所出也。痰涎凝滯在於咽喉如牽鋸之聲時復瘻癰或因吐瀉所致脾虛肺亦虛痰涎流溢變成癲癇尤爲難治旌

痰飲吐法

宜痰在膈上必用吐

○膠固潤者必用吐

○痰在經絡中

非吐不可吐中就有發散之意不必在出痰也○

凡用吐藥宜升提其氣便吐也防風旋子川芎苦

蔓芽茶生薑蘆汁之類或以

二陳湯探吐或用瓜蒂散咽

痰飲治法

實脾土燥脾濕是治其本也○虛人中焦有

痰胃氣亦賴所養卒不可便攻攻益則愈虛

而多法當補脾胃清中氣則痰自然運下乃治

生而多法當利藥過多致脾氣下虛則痰反易

本之法也明○治痰順氣爲先分導次之然氣升

屬火因氣動者曰痰氣宜順氣導痰湯因火動者

日痰火宜清熱導痰湯

○陽虛腎寒冷痰溢上或昏

痰湯通用二陳湯

○陽虛腎寒冷痰溢上或昏

暈夜喘上氣者八味九

○脾虛不能運化者六君子湯加竹瀝薑汁或

門入

○脾虛

○黑錫丹方門鎮墜之

○君子湯加竹瀝薑汁或

補中益氣湯加半夏竹瀝薑汁門○張子和曰飲
亦有挾寒挾虛之證又有血氣虧乏之人治人常愈然
去痰滯又當補接兼行又有難拘於子和之人理宜導
火鑿○痰生於脾胃治法宜實脾燥濕又隨氣而升
者因咳而動脾之濕也半夏能泄痰之標不能泄痰
宜順氣爲先分導次之又氣升屬火順氣在於降
心研○火鑿○難經曰腎主五液化爲五濕濕能生痰痰
者因咳而動脾之濕也半夏能泄痰之標不能泄痰
痰之本泄本者泄腎也十棗

湯三花神祐丸是也並覲

寒熱痰則清之用石膏青黛梔子黃芩黃連

夏乾薑附子肉桂

燥痰則潤之用瓜蒌仁杏仁五味子天花粉

白朮厚朴梔苓

濕痰則燥之用蒼朮白朮厚朴梔苓

南星皂角白附子竹瀝

風痰則散之用海石芒硝瓜萎仁枳殼便香附

南星皂角白附子竹瀝

老痰則軟之用甘草以補脾白朮半夏以燥濕陳皮青

山楂子神麴麥芽

食積痰則消之用大要人參甘草以利氣茯苓

澤鴻以滲水研

順氣道痰湯

半夏南星花苓枳實陳皮香附子烏藥

各一錢木香沉香甘草各五分右剉作

一片煎服

六君子湯

治氣虛痰盛半夏白朮各一錢半陳皮白

茯苓人參各一錢甘草灸五分右剉作一

○貼薑三片生棗二枚煎服

傳正

痰飲通治藥

適用二陳湯茯苓半夏湯芎夏湯蠲飲枳

實九千金指迷丸敵痰丸小胃丹痰飲苓

證宜五飲湯破痰消飲元濕熱痰飲宜滾痰丸木

香和中丸食積痰飲宜清氣化痰丸虛人老人痰

飲宜竹瀝枳术

丸霞天膏丸

二陳湯

主治痰飲諸疾或嘔吐心或頭眩心悸或

苓各一錢甘草灸五分右剉

依一貼薑三片水煎服

○方氏曰半夏豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯

苓降氣滲濕甘草補脾和中

蓋補脾則不生痰利氣降氣則痰消解可謂體用

濕滲濕則不生痰利氣降氣則痰消解可謂體用

無該標本兩盡之藥
用者隨證加減附

茯苓半夏湯

通治停痰留飲發鳴諸病半夏製三錢
赤茯苓二錢右剉作一貼薑七片煎服

半夏茯苓湯同

大半夏湯

治同上半夏製陳皮赤茯苓各二錢
半右剉作一貼薑五片水煎服附

芎夏湯

逐水利飲通用川芎半夏製赤茯苓各一錢
陳皮青皮枳殼各五分白朮甘草炙各二分

半右剉依一貼薑五片水煎服附

蠲飲枳實丸

逐飲消痰導氣清喝而牽牛子取頭末三兩枳實麩炒半夏製橘紅各一兩右

爲末麩糊和丸梧子大每取五十丸薑湯下

千金指迷丸

治一切痰飲爲患半夏麵二兩白茯苓剉虛八乳汁拌蒸瘦人縮砂同酒浸蒸

去縮砂又生地黃汁浸蒸枳殼用麥芽醋水炒各一兩風化硝二錢半右爲末薑汁糊和丸梧子大

每服三五十丸。薑湯下。可日以徃大便。滑是潛消痰積之驗也。門○脾胃痰神麴糊和丸○血分痰酒糊丸○氣分上焦痰蒸餅糊和丸○骨節四肢痰鹽酒丸○薑汁糊和丸○足痰牛膝膏和丸○痰病深痼牛膏和丸多服可以汗吐下。如伺倉法。

敵痰丸

治痰飲通用黑牽牛子取頭末三兩。皂角酥灸二兩。白礬枯半夏麪陳皮去白各一兩。右

爲末水九十九粒

湯下四五十九粒

薑

神仙墜痰丸

通治痰飲諸病。黑牽牛子取頭末三兩。皂角酥灸一兩。六錢。白礬生一兩。右爲

末水九十九粒

梧子大酒

下三十五十九粒

小胃丹

取膈上濕痰熱積上可取胃膈之痰下可利腸胃之痰。惟胃虛少食者忌用。又云治風痰

熱痰濕痰食積痰。芫花醋浸一夜宿炒黑甘遂麴裹

煨熟水浸半日晒乾。大戟長流水煮乾各五錢。大黃湯紙裹煨再用酒浸炒熟一兩。黃柏炒二兩

右爲末粥丸。麻子大每十丸。臨卧津嚥下。研

大黃湯紙裹煨再用酒浸炒熟一兩。黃柏炒二兩

方白术膏和丸蘿蔔子大臨下
津液聯下二三十丸白湯送下

五飲湯

治五飲一曰流飲二曰癖飲三日痰飲四日溢飲

茯苓厚朴半夏澤鴻豬苓前胡桂心白芍藥甘草各七分右剉作一貼薑十片水煎服最效

破瘀消飲元

治一切瘀飲青皮陳皮三稜炮蓬术炮

良薑煨乾薑炮草果煨各一兩右爲末

滾痰丸

治濕熱痰積生百病大黃酒蒸芩去朽定盐泥固濟晒乾火煅紅候冷取出以礞石如金色爲度沉香五錢右爲末滴水和丸梧子大禁清

溫水任下四五十丸服藥必須臨睡送下至咽即便仰卧令藥在咽喉之間徐徐而下漸逐惡物入

腹八腸方能見效○允喪心失志癲狂每服百丸○中風癰瘍痰盛便秘常服三五十丸○遍身筋

骨疼痛未能調狀者每服七八十丸○發氣吞酸胃中氣塊閉塞嘔吐涎飲每服七八十丸○心下酸

怔仲陰陽關格變生怪證每服七八十九丸○頸額腫硬違項結按或
閉赤眼每服七八十九丸○頸額腫硬違項結按或
口糜舌爛每服五六十九丸○心氣冷痛如停冰塊
或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處
腫起軟浮或痒或痛或此消彼長漸成篤疾皆係
毒痰內攻或作腸癰內疽每服七八十九丸○痢疾
不問赤白或帶血塊惡物每服八十九丸○允莊
華之疾内外諸般雜證百藥無效方書未嘗載其
疾醫者不能辨其證服之無不效王隱○按此方
以大黃黃芩大瀉陽明胃中濕熱之盛礞石以墮
下積痰沉香則引諸氣上而至天下而
至泉也四○一方加朱砂二兩為衣

木香和中丸

化痰涎除濕熱利胃膈和脾胃黑牽牛子頭末二兩

二錢沉香二錢右爲末水丸梧子大薑湯或茶清下

五十丸治濕熱痰盛胃膈煩滿

中丸治

一切痰飲及食積酒積成痰壅盛南

藥

○

一方又名沉香和

清氣化痰丸

治半夏以白礬皂角生薑各二兩同水

治

一切痰飲及食積酒積成痰壅盛南

浸一宿並剉作片同煮至商星無白點晒乾各二
兩神麴炒麥芽炒各一兩半陳皮枳實白术白茯
苓蘿蔔子炒葛黃連各五錢附米山楂肉白豆蔻
各一兩青皮乾葛黃連各五錢黃芩八錢海粉七
錢右為末以竹瀝薑汁泡蒸餅和丸

竹瀝枳朮丸

治老人虛人痰盛不思飲食健脾消食

化痰清火去眩暈半夏南星以白礬皂角生薑同煮半日去皂角焙乾枳實條芩陳皮蒼朮泔浸鹽水炒山查肉白芥子炒白茯苓各一兩

黃連薑汁炒當歸酒洗各五錢右為末神麴六兩
作末以薑汁竹瀝各一盞煮糊和丸梧子大淡薑湯或白湯

湯或白湯

下百九門

單方

九種二十

白礬

去胃中痰飲取一兩水二升煮取一升入蜜半合頓服須臾即吐未吐則當飲少熱湯

蒼朮

消痰水能治痰飲成窠囊極效即上神朮丸也性燥能勝濕

貝母

消痰又治脅膈痰氣最妙
○
貝母丸取貝母

前胡

治熱痰又治痰滿脅病
○
剉取三錢水煎服之

乾薑

治寒痰又消痰下氣
丸服煎服皆可
附去形下氣又去冷痰調胃氣
生薑去皮生薑四錢附子生二錢右剉水煎服

半夏

治寒痰能勝脾胃之濕所以化痰
涎去胃中痰滿
○半夏丸治痰加黃芩風加南星痞加陳皮白

九

梧子大薑湯下三五十丸
半夏麴及法製半夏方皆見于門下

半夏

麴痰分之病半夏爲主然必造而爲麴又入霞
天膏白芥子薑汁熬湯竹鹽造麴治痰積沉

病者

自能使腐敗隨大小便出或散而爲瘡此半
夏麴之妙也○佐以南星治風痰○佐以薑汁酒

以

炒枳實薑片浸蒸海粉之類治老痰○佐以佐

蒼白术俱米泔薑斗浸炒甚至乾薑
烏頭皆治濕痰○製法詳見雜方

法製半夏

大半夏一斤石灰一斤滾水七碗入盆內

攬掠澄清去滓將半夏浸之手攬日晒夜

換

水三次撈起控乾用白礬八兩皮硝一斤滾水七

洗

八椀入盆內攬掠浸半夏七日日晒夜露取出水

洗三

四次淹三日每日換水三次取出控乾入甘

草薄荷各四兩丁香枳實木香白薑陳皮青皮枳

殼五味子縮砂各五錢自豆蔻肉桂各三錢沉香

一錢右切片滾水十五碗將半夏同藥共入盆內

泡二

七月日晒夜露攬之日足取出藥與半夏用

白布包住放在熱炕用器皿覆住三炷香時藥與

半夏分胎半夏乾收用有痰火者服之一日大便

出似魚膠一宿盡除痰根永不生也此藥化痰如

神若不信將半夏七八粒研入痰椀化爲清水有

痰疾中風不語研七八粒井水送

下以手摩運腹上即醒能言

麻

瓜萎仁治熱痰酒痰老痰燥痰潤肺化痰降氣

洗滌膏膩中垢膩作丸或煎服皆佳

明

瓜萎仁治熱痰酒痰老痰燥痰潤肺化痰降氣

洗滌膏膩中垢膩作丸或煎服皆佳

明

蕁藺子

除胃中痰飲能逐肺經之水未服煎服皆可
韓

旋覆花

消胃上痰結疎如膠漆除心

枳實

除胃腸痰水煎服或丸服韓

枳殼

消痰散胃脯痰帶煎服末服皆可
韓

天南星

治風痰炮黃色入生薑七片水煎服或薑汁糊九服
韓

青礞石

治食積痰同焰硝火煅服能利痰

積從大便而出作丸服或末服皆可
門

木爪

消痰止痰唾韓取肉研搗篩去滓量入煉蜜薑汁竹瀝攪和

木爪蒸

作煎下日三四次

烏梅

去痰止渴可

白芥子

主胃膈痰冷韓茶飲
芥子不能達未服煎服皆佳

瓜蒂

用

瓜蒂散

吐痰塞

心胷令人悶絕

三方

規

海粉

熱痰能降濕

痰能燥結痰能軟

頑痰能消

胃

蛤粉

能陞痰

軟聖即固

濟火煅

海粉

入湯可入丸藥

用粟法詳見雜方

海粉

不可入湯可入丸藥

用粟法詳見雜方

海粉

蜋殼

燒為白灰

飲調服

除心胷痰水

韓

針灸法

諸痰

飲病取

豐隆中腕

○溢飲取中腕

○中

○中

○中

○中

○中

水氣攻不食

足三里

○中封

○腎俞

○中封

○腎俞

○中封

○腎俞

○中封

○中封

○中封