

**Vorkurs Mathematik****Arbeitsblatt 5****Übungsaufgaben**

AUFGABE 5.1. Man gebe ein Beispiel für eine Cauchy-Folge in  $\mathbb{Q}$ , die (in  $\mathbb{Q}$ ) nicht konvergiert.

AUFGABE 5.2. Sei  $a \in \mathbb{R}$  eine nichtnegative reelle Zahl und  $x_0 \in \mathbb{R}_+$ . Zeige, dass die rekursiv definierte Folge mit

$$x_{n+1} := \frac{x_n + a/x_n}{2}$$

gegen  $\sqrt{a}$  konvergiert.

AUFGABE 5.3. Bestimme die Dezimalentwicklung von  $\frac{5}{7}$  anhand des in Satz 5.5 besprochenen Rekursionsschemas.

AUFGABE 5.4. Bestimme die rationale Zahl, die im Dezimalsystem durch

$$0,11\overline{05}$$

gegeben ist.

AUFGABE 5.5. Bestimme die Ziffernentwicklung im Dualsystem derjenigen reellen Zahl, die im Dezimalsystem durch  $0,\overline{3}$  gegeben ist.

AUFGABE 5.6. Man gebe Beispiele für konvergente reelle Folgen  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  mit  $x_n \neq 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , und mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  derart, dass die Folge

$$\begin{pmatrix} y_n \\ x_n \end{pmatrix}_{n \in \mathbb{N}}$$

- (1) gegen 0 konvergiert,
- (2) gegen 1 konvergiert,
- (3) divergiert.

AUFGABE 5.7. Bestimme die Ziffernentwicklung im Dreiersystem derjenigen reellen Zahl, die im Dezimalsystem durch  $0,\overline{17}$  gegeben ist.

AUFGABE 5.8. Es sei  $I_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , eine Intervallschachtelung in  $\mathbb{R}$ . Zeige, dass der Durchschnitt

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$$

aus genau einem Punkt  $x \in \mathbb{R}$  besteht.

AUFGABE 5.9. Es sei  $I_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , eine Intervallschachtelung in  $\mathbb{R}$  und sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine reelle Folge mit  $x_n \in I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Zeige, dass diese Folge gegen die durch die Intervallschachtelung bestimmte Zahl konvergiert.

AUFGABE 5.10. Es sei  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  die Folge der Fibonacci-Zahlen und

$$x_n = \frac{f_n}{f_{n-1}}.$$

Zeige, dass diese Folge in  $\mathbb{R}$  konvergiert und dass der Grenzwert  $x$  die Bedingung

$$x = 1 + x^{-1}$$

erfüllt. Berechne daraus  $x$ .

Tipp: Zeige zuerst mit Hilfe der Simpson-Formel, dass man mit diesen Brüchen eine Intervallschachtelung basteln kann.

Vor der nächsten beiden Aufgabe erinnern wir an die beiden folgenden Definitionen.

Zu zwei reellen Zahlen  $x$  und  $y$  heißt

$$\frac{x + y}{2}$$

das *arithmetische Mittel*.

Zu zwei nichtnegativen reellen Zahlen  $x$  und  $y$  heißt

$$\sqrt{x \cdot y}$$

das *geometrische Mittel*.

AUFGABE 5.11. Es seien  $x$  und  $y$  zwei nichtnegative reelle Zahlen. Zeige, dass das arithmetische Mittel der beiden Zahlen mindestens so groß wie ihr geometrisches Mittel ist.

AUFGABE 5.12. Es seien  $b > a > 0$  positive reelle Zahlen. Wir definieren rekursiv zwei Folgen  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  durch  $x_0 = a$ ,  $y_0 = b$  und durch

$$x_{n+1} = \text{geometrisches Mittel von } x_n \text{ und } y_n,$$

$$y_{n+1} = \text{arithmetisches Mittel von } x_n \text{ und } y_n.$$

Zeige, dass  $[x_n, y_n]$  eine Intervallschachtelung ist.