

## Algebraische Kurven

### Vorlesung 14

#### Algebraische Funktionen auf Varietäten

Was ist ein Morphismus zwischen zwei affin-algebraischen Mengen  $V$  und  $W$ ? Wir betrachten zuerst die Situation, wo  $W = \mathbb{A}_K^1$  die affine Gerade ist. Sei  $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$  als abgeschlossene Teilmenge eines affinen Raumes gegeben. Dann liefert jedes Polynom  $F \in K[X_1, \dots, X_n]$  eine Abbildung  $F: \mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{A}_K^1 = K$  und damit auch eine Abbildung auf  $V$ . Das haben wir schon bei der Definition des Koordinatenrings betrachtet. Ebenso liefert ein Element  $F \in R$  in einer endlich erzeugten  $K$ -Algebra  $R$  eine Funktion auf  $K\text{-Spek}(R)$ , nämlich

$$K\text{-Spek}(R) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, P \longmapsto F(P).$$

Dies ist auch die Spektrumsabbildung, die zu  $K[T] \rightarrow R, T \mapsto F$ , gehört.

Für die offenen Mengen  $D(F) \cong K\text{-Spek}(R_F)$  ist  $1/F$  nach Satz 13.4 eine wohldefinierte Funktion. Wir werden allgemein für eine Zariski-offene Menge  $U \subseteq V$  erklären, was eine algebraische Funktion auf  $U$  ist. Die folgende Definition ist so strukturiert, dass die Bedingung „algebraisch“ eine *lokale Eigenschaft* ist.

**DEFINITION 14.1.** Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K\text{-Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Sei  $P \in V$  ein Punkt,  $U \subseteq V$  eine Zariski-offene Menge mit  $P \in U$  und es sei  $f: U \rightarrow \mathbb{A}_K^1 = K$  eine Funktion. Dann heißt  $f$  *algebraisch* (oder *regulär* oder *polynomial*) im Punkt  $P$ , wenn es Elemente  $G, H \in R$  gibt mit  $P \in D(H) \subseteq U$  und mit

$$f(Q) = \frac{G(Q)}{H(Q)} \text{ für alle } Q \in D(H).$$

Die Funktion  $f$  heißt *algebraisch* (oder *algebraisch auf  $U$* ), wenn  $f$  in jedem Punkt von  $U$  algebraisch ist.

Natürlich definiert jedes Element  $f \in R$  eine algebraische Funktion auf jeder offenen Teilmenge des  $K$ -Spektrums. Es ist aber im Allgemeinen eher schwierig, die algebraischen Funktionen übersichtlich zu beschreiben.

**BEMERKUNG 14.2.** In der Definition ist die vorausgesetzte Stetigkeit überflüssig, da sie aus der lokalen algebraischen Bedingung folgt (siehe Aufgabe 16.10).

Ebenso ist die Bedingung  $D(H) \subseteq U$  nicht wichtig. Wenn es eine Beschreibung für  $f$  mit  $f = G/H$  auf  $D(H)$  mit  $P \in D(H)$  gibt, so betrachtet man ein  $H'$  mit  $P \in D(H')$ ,  $D(H') \subseteq U$ . Dann kann man zu  $D(H) \cap D(H') = D(HH')$  übergehen, und dort die Darstellung  $f = (GH')/(HH')$  betrachten.

Wenn es im Punkt  $P$  eine Bruchdarstellung für  $f$  als  $f = G/H$  gibt, so kann man diese Darstellung für alle Punkte aus  $D(H)$  verwenden. D.h.  $f$  ist auf der ganzen offenen Menge  $D(H)$  algebraisch. Insbesondere muss man nicht mit unendlich vielen verschiedenen Darstellungen arbeiten, sondern man kann sich auf die (endlich vielen) Darstellungen  $G_i/H_i$  zu einer Überdeckung  $U = \bigcup_{i \in I} D(H_i)$  beschränken.

Bei  $K = \mathbb{C}$  ist eine algebraische Funktion auch stetig bezüglich der metrischen Topologie, und bei  $R = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$  ist sie *holomorph*.

BEISPIEL 14.3. Sei  $V = V(WX - ZY) \subseteq \mathbb{A}_K^4$  und sei  $U = D(X, Y) = D(X) \cup D(Y) \subset V$  die durch  $X$  und  $Y$  definierte Zariski-offene Menge. Auf  $U$  ist die durch

$$f = \frac{Z}{X} = \frac{W}{Y}$$

definierte Funktion algebraisch. Die beiden rationalen Darstellungen liefern offenbar eine algebraische Funktion auf den beiden offenen Teilmengen  $D(X)$  und  $D(Y)$ . Damit es eine Funktion auf  $U$  definiert muss sichergestellt werden, dass die Brüche auf dem Durchschnitt, also auf  $D(X) \cap D(Y) = D(XY)$ , die gleichen Funktionswerte haben. Sei also  $Q = (w, x, y, z) \in D(XY)$ ,  $Q \in V$ . D.h.  $x, y \neq 0$  und  $wx = zy$ . Dann ist aber sofort

$$\frac{Z}{X}(Q) = \frac{z}{x} = \frac{w}{y} = \frac{W}{Y}(Q).$$

LEMMA 14.4. Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K\text{-Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Es sei  $U \subseteq V$  eine Zariski-offene Menge. Dann bildet die Menge der algebraischen Funktionen auf  $U$  einen Unterring (und zwar eine  $K$ -Unteralgebra) des Rings der Funktionen von  $U$  nach  $K$  (wobei die Operationen in  $K$  ausgeführt werden).

*Beweis.* Wir müssen zeigen, dass die konstante Nullfunktion und die konstante Einsfunktion auf  $U$ , das Negative einer algebraischen Funktion, und die Summe und das Produkt von zwei algebraischen Funktionen auf  $U$  wieder algebraisch sind. Wir beschränken uns auf die Summe der algebraischen Funktionen  $f_1$  und  $f_2$ . Sei  $P \in U$  ein Punkt. Nach Voraussetzung gibt es Elemente  $G_1, H_1, G_2, H_2 \in R$  mit

$$f_1(Q) = \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \text{ für alle } Q \in D(H_1) \subseteq U, P \in D(H_1),$$

und

$$f_2(Q) = \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)} \text{ für alle } Q \in D(H_2) \subseteq U, P \in D(H_2).$$

Sei  $H := H_1 H_2$ . Dann ist  $P \in D(H) = D(H_1) \cap D(H_2) \subseteq U$ . Für einen beliebigen Punkt  $Q \in D(H)$  ist dann

$$\begin{aligned} (f_1 + f_2)(Q) &= \frac{f_1(Q) + f_2(Q)}{\frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} + \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)}} \\ &= \frac{G_1(Q)H_2(Q) + G_2(Q)H_1(Q)}{H_1(Q)H_2(Q)} \\ &= \frac{(G_1H_2 + G_2H_1)(Q)}{(H_1H_2)(Q)}, \end{aligned}$$

was eine polynomiale Darstellung der Summenfunktion in der Zariski-offenen Umgebung  $D(H)$  des Punktes  $P$  ergibt.  $\square$

DEFINITION 14.5. Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K\text{-Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Sei  $U \subseteq V$  eine Zariski-offene Menge. Dann bezeichnet man mit

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \{f : U \rightarrow K \mid f \text{ ist algebraisch}\}$$

den *Ring der algebraischen Funktionen* auf  $U$ . Man bezeichnet ihn auch als *Strukturring* zu  $U$  oder als *Schnitttring* zu  $U$ .

Aufgrund von Lemma 14.4 handelt es sich in der Tat um einen Ring. Das Symbol  $\mathcal{O}$  (sprich „O“) bezeichnet die sogenannte *Strukturgarbe*.

LEMMA 14.6. Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K\text{-Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Es seien  $U_1 \subseteq U_2$  offene Teilmengen von  $V$ . Dann gibt es einen natürlichen  $K$ -Algebra-Homomorphismus

$$\Gamma(U_2, \mathcal{O}) \rightarrow \Gamma(U_1, \mathcal{O}).$$

*Beweis.* Die Funktion  $f : U_2 \rightarrow K$  liefert sofort durch Einschränkung eine auf  $U_1$  definierte Funktion. Die lokal-algebraische Beschreibung, die für  $f$  an jedem Punkt  $P \in U_2$  vorliegt, kann direkt auf der kleineren Teilmenge  $U_1$  interpretiert werden.  $\square$

Die im vorstehenden Lemma beschriebene Abbildung heißt *Restriktionsabbildung* oder *Einschränkungsabbildung*.

LEMMA 14.7. Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K\text{-Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Es sei  $F \in R$  und  $U \subseteq D(F) \subseteq V$  eine offene Menge. Dann ist es egal, ob man  $\Gamma(U, \mathcal{O})$  mit Bezug auf  $V$  oder mit Bezug auf  $D(F) = K\text{-Spek}(R_F)$  definiert.

*Beweis.* Natürlich hängen die stetigen Funktionen auf  $U$  nur von  $U$  selbst ab, nicht von einem umgebenden Raum. Wir müssen zeigen, dass die lokal-algebraische Bedingung ebenfalls nur von  $U$  abhängt. Sei  $P \in U$ . Eine Beschreibung

$$\varphi = \frac{G}{H} \text{ auf } D(H) \text{ mit } P \in D(H) \text{ und mit } G, H \in R$$

liefert sofort eine Beschreibung als Bruch auf  $D(HF)$ , da man ja  $H, G$  sofort in  $R_F$  auffassen kann.

Es liege nun umgekehrt eine Bruchdarstellung

$$\varphi = \frac{\tilde{G}}{\tilde{H}} \text{ auf } D(\tilde{H}) \text{ mit } P \in D(\tilde{H}) \text{ und mit } \tilde{G}, \tilde{H} \in R_F$$

vor. Es sei  $\tilde{G} = G/F^r$  und  $\tilde{H} = H/F^s$ . Dann gilt für jeden Punkt  $Q \in D(HF)$  die Gleichheit

$$\varphi(Q) = \frac{\tilde{G}(Q)}{\tilde{H}(Q)} = \frac{G(Q)/F^r(Q)}{H(Q)/F^s(Q)} = \frac{G(Q)F^s(Q)}{H(Q)F^r(Q)}.$$

Dabei haben wir im letzten Schritt mit  $F^{r+s}$  erweitert. In der letzten Darstellung sind Zähler und Nenner aus  $R$ , und es ist  $HF^r(P) \neq 0$ , also ist  $D(HF^r)$  eine offene Umgebung von  $P$ .  $\square$

LEMMA 14.8. *Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K - \text{Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Es sei  $U \subseteq V$  eine Zariski-offene Menge,  $P \in U$  ein Punkt und es sei  $f: U \rightarrow K$  eine algebraische Funktion, für die es die beiden rationalen Darstellungen*

$$\frac{G_1}{H_1} \text{ und } \frac{G_2}{H_2}$$

*gebe mit  $G_1, H_1, G_2, H_2 \in R$  und mit  $P \in D(H_1), D(H_2) \subseteq U$ . Dann gibt es ein  $r \in \mathbb{N}$  mit*


$$H_1^r H_2^r (G_1 H_2 - G_2 H_1)^r = 0 \text{ in } R.$$

*Ist  $R$  reduziert, so gilt sogar  $H_1 H_2 (G_1 H_2 - G_2 H_1) = 0$ .*

*Beweis.* Wir betrachten das Element  $F = H_1 H_2 (G_1 H_2 - G_2 H_1)$  auf  $V$  und behaupten, dass dies die Nullfunktion induziert. Sei  $Q \in V$ . Bei  $H_1(Q) = 0$  oder  $H_2(Q) = 0$  ist  $F(Q) = 0$ , sei also  $H_1(Q), H_2(Q) \neq 0$  vorausgesetzt. Dann ist  $Q \in D(H_1) \cap D(H_2)$ , und dort gelten die beiden rationalen Darstellungen für  $f$ , nämlich

$$\frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} = f(Q) = \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)}.$$

Daraus folgt  $G_1(Q)H_2(Q) = G_2(Q)H_1(Q)$  und somit ist die Differenz null. Insgesamt ist also  $F$  die Nullfunktion auf  $V$  und daher gibt es nach dem Hilbertschen Nullstellensatz ein  $r$  mit  $F^r = 0$ .  $\square$



Der Graph einer globalen Funktion auf  $\mathbb{A}_K^2$ .

**SATZ 14.9.** Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine reduzierte  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K\text{-Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Dann ist

$$\Gamma(V, \mathcal{O}) = R.$$

*Beweis.* Ein Element  $F \in R$  liefert direkt eine algebraische Funktion auf ganz  $V$ , was einen  $K$ -Algebra Homomorphismus

$$R \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O})$$

ergibt. Wenn dabei  $F$  an jedem Punkt die Nullfunktion induziert, so ist nach Satz 11.1 und wegen der Reduziertheit auch  $F = 0$ . D.h. die Abbildung ist injektiv.

Sei nun  $f : V \rightarrow K$  eine algebraische Funktion. Dann gibt es zu jedem Punkt  $P \in V$  zwei Elemente  $G_P, H_P \in R$  mit  $P \in D(H_P)$  und mit  $f = \frac{G_P}{H_P}$  auf  $D(H_P)$ . Die  $D(H_P)$  bilden eine offene Überdeckung von  $V$  und das bedeutet nach Korollar 11.5, dass die  $H_P$  in  $R$  das Einheitsideal erzeugen. Dann gibt es aber auch eine endliche Auswahl davon, die das Einheitsideal erzeugen, sagen wir  $H_i = H_{P_i}$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Dann wiederum überdecken diese  $D(H_i)$ ,  $i = 1, \dots, m$ , ganz  $V$ .

Auf den Durchschnitten  $D(H_i H_j) = D(H_i) \cap D(H_j)$  haben wir die Identitäten

$$f(Q) = \frac{G_i(Q)}{H_i(Q)} = \frac{G_j(Q)}{H_j(Q)} \text{ für alle } Q \in D(H_i H_j).$$

Daraus folgt nach Lemma 14.8 und der Reduziertheit, dass

$$H_i H_j G_i H_j = H_i H_j G_j H_i$$

in  $R$  gilt. Wir ersetzen  $H_i$  durch  $H_i^2$  und  $G_i$  durch  $G_i H_i$ . Dann ist nach wie vor  $G_i/H_i$  eine lokale Beschreibung für  $f$ , und die letzte Bedingung vereinfacht sich zu  $H_i G_j = H_j G_i$ .

Da die  $H_i$  das Einheitsideal erzeugen, gibt es Elemente  $A_i \in R$  mit

$$\sum_{i=1}^m A_i H_i = 1$$

in  $R$ . Wir behaupten, dass das Element

$$F = \sum_{i=1}^m A_i G_i$$

auf ganz  $V$  die Funktion  $f$  induziert. Dazu sei  $Q \in V$  ein beliebiger Punkt, und zwar sei ohne Einschränkung  $Q \in D(H_1)$ . Dann ist


$$\begin{aligned} f(Q) &= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \\ &= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \left( \sum_{i=1}^m A_i H_i(Q) \right) \\ &= \sum_{i=1}^m A_i(Q) \frac{G_1(Q) H_i(Q)}{H_1(Q)} \\ &= \sum_{i=1}^m A_i(Q) G_i(Q) \\ &= F(Q). \end{aligned}$$

□

**KOROLLAR 14.10.** Sei  $K$  ein algebraisch abgeschlossener Körper,  $R$  eine reduzierte  $K$ -Algebra von endlichem Typ und sei  $V = K\text{-Spek}(R)$  das  $K$ -Spektrum von  $R$ . Es sei  $F \in R$  mit zugehöriger offener Menge  $D(F) \subseteq V$ . Dann ist

$$\Gamma(D(F), \mathcal{O}) = R_F.$$

*Beweis.* Dies folgt direkt aus Lemma 14.7 und Satz 14.9. □



Nicht jede außerhalb der Gerade auf dem Kegel definierte Funktion lässt sich auf den affinen Raum ohne die Gerade fortsetzen.

BEISPIEL 14.11. Wir betrachten den Standardkegel, der als abgeschlossene Teilmenge

$$V = V(X^2 + Y^2 - Z^2) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

gegeben sei. Es sei  $U = D(X, Z - Y) \subseteq \mathbb{A}_K^3$  die offene Teilmenge mit dem Schnitt  $V \cap U = D(X, Z - Y)$  (in  $V$ ), der eine offene Menge in  $V$  ist. Wir behaupten, dass der zugehörige Ringhomomorphismus

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{O})$$

nicht surjektiv ist. Das liegt daran, dass links einfach der Polynomring in drei Variablen steht (vergleiche Aufgabe 14.8). Dagegen ergibt sich aus der Gleichung

$$X^2 = Z^2 - Y^2 = (Z - Y)(Z + Y),$$

dass es auf  $U \cap V$  die algebraische Funktion

$$\frac{X}{Z - Y} = \frac{Z + Y}{X}$$

gibt, die nicht im Bild der Abbildung liegt, da es keine Funktion auf dem ganzen Kegel ist.





## Abbildungsverzeichnis

Quelle = Monkey Saddle Surface (Shaded).png , Autor = Benutzer Inductiveload auf Commons, Lizenz = PD	5
Quelle = Cone intersects line.png , Autor = Benutzer Pmidden auf Commons, Lizenz = PD	6